


Ϝ Hippocratis

~ omnia ~

1564





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3183/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3183/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3183/A


A. 7. 0

3183 A


Contra Altus







Ex Libris Franci de Mollo
Regis Medici



42940

principis , Opera quæ
apud nos extant
omnia,

*Per Ianum Cornarium Medicum Physicum
Latina lingua conscripta.*

Accessit Hippocratis De Homini Structura liber,
Nicolao Petreio Coreyrao interprete,
antea non excusus.


Cum Indice rerum copiosissimo.



L V G D V N I,
Apud Antonium Vincentium.

1564.

Exhibita



AUGUSTISSIMIS

AC PRUDENTISSIMIS,


HONESTISSIMISQUE VIRIS,

Senatui populoque Imperialis urbis Au-

gustae Vindellicorum, Ianus Corna-

rius Medicus Physicus,

S. D.



ON alienum, nec ab re esse arbitror, Augustissime Augustae urbis Senatus, hoc in loco, hac instituta ad amplitudinem tuam, in Hippocratis Cei medicinae principis scriptorum, à me in Latinam linguam translatorum editionem, praefatione, paulò altius repetere, qualis fuerit nostro hoc ævo rei medicae, & simul etiam aliarum artium ac studiorum status: qualis factus sit progressus: quantum accesserit incrementi: & quid de toto hoc studiorum genere sit sperandum. Nam & necessariam esse Hippocratis librorum editionem, lectionem, ac cognitionem, inde clarè constabit: & me hæc vel peractorum laborum gratia, meminisse iuuabit: & qui ista legent, non inutilem consequentur huius narrationis cognitionem: & Amplitudo tua, spero, harum rerum memoria iucundè afficietur, & si quid praesidij ac opis ad hæc studia conseruanda opus fuerit, (sicut reuera vestram, urbiū Imperialium opem desiderant ac implorant) huc libenter incumbet, quo literæ unicū totius vitæ ornamentum durent ac vigeant, in Germania nostra, ne si hæc corruant ac iaceant, verè neutra vita vocari mereatur, haud secus quàm neutrum corpus medicis dicitur, quòd neque sanum, neq; aegrorum appellari potest. Talis autem futura vita mihi videtur, vt miti ac familiari nobis similitudine, res omnium tristissima, & perpetua nocte obscurior adumbratur, si horum studiorum lux extinguatur, si literarum decus deturpetur, si robur illud, quod & pacem, & rerum publicarum ac priuatarum tranquillitatem retinet, elanguescat.

AA 2

Quæ.

Epistola

Quum itaq; primū animū ad medicinæ studia adiicerem, magna erat bonorū & professorum, & librorū penuria: adeo ut Hippocrates & Galenus medicæ sectæ optimæ, rationalis illius, principes, ne nominibus quidem suis iustis, in scholis satis noti essent, quū vulgo Hippocras & Galienus à plerisq; omnibus appellarentur. Itaq; quum essem adolescēs viginti natus annos, ex Petri Mosellani, viri & eruditi, & imprimis sua eloquēti facundia ornatī auditoribus. (Nam neque hūc, neq; alium vllum vnquā priuatum præceptorē habui, post primā grammaticæ rudimēta) in literis vtriusq; linguæ eo progressus, ut nō modo grāmatica docerem, sed etiā Poetas ac Oratores Græcos publicē enarrarem, plurimū mox ab initio, ab honestissimæ artis discendæ proposito decidēbam. Auertebāt enim me barbari scholarū magistri, & nō multo expositōribus suis potiores scriptores, quibus tum medicorū scholæ pro optimis autoribus vtebātur, Auicenna, Rasis, Albucasis, Auenzoar, Mesuas, & alij nō citra tadium nominandi, Arabicum hominū genus. His accedebant practices scriptores superioris seculi ac illius quoque, gens per omnia inepta, sordida, ac impura, & tam spurcē Latine loquēs, ac tam infeliciter id quod docere vult tradens, ut penitus desperare ex tam putidis libris fore posse, ut vnquam ad medicinæ cognitionem peruenirem, eam videlicet quam ex Hippocratis aliquot libellis, aphorismis dico, prognostico, & eo qui de vitæ ratione in morbis acutis inscribitur, olfecissem: & quā mihi ex Galeni aliquot libellis Latine itidem extātibus delineassem. Erant autem hi Leonicieni interpretatione, De febrium differentiis libri duo, & Copi versione sex libri De locis affectis inscripti. Et his interpretibus, tum extabant quoque Hippocratici illi libelli. Ac in philosophia quidē eo tempore extabat sua lingua Plato, Aristoteles, Theophrastus, Xenophon, & Plutarchus, magno erga bona studia Aldi Manutij beneficio. Verū in medicina nihil Hippocratis ac Galeni ipsorum lingua habebatur, præter Hippocratis aphorismos, quos Philippus Melanchthon mihi cōmunicauerat, & vnā Galeni methodum, quam Romæ si rectē memini, excusam, apud amicum quēdā videram. Hic ego dum ambiguus quid facerem sæpe mecum cogitarem, tandem illud statui, quod præsens esset boni consulendum esse, donec aliquando

Nuncupatoria.

do dies meliora proferret. Proinde relictis magna ex parte Arabibus illis scriptoribus, & ex practicis quoque paucis aliquot, melioribus ut fieri solet in malorum electione, assumptis: videbantur autem tales esse, Bertrutius, Gatina-
ria, Guainerius: his ad prædictos libellos Hippocratis ac Galeni additis ac collatis, sed magno interposito interuallo, aliquot annis medicinæ studia sectatus sum, donec cum his simul magister magnus artis vëter persuasit mihi, ut artis periculum facerem, quod iam per annos vigintiquinque facere pergo, ab eo tempore quo primum animum ad medicinæ studia, velut dixi, adieci. Quanto verò meo commodo hoc fecerim aut etiam aliorum utilitate, non est quod multum iactem. Diligentiam meam & fidem, tum in docendo qualiacunque didici, tum in curando qualia ars præstare potuit, multis cognitam esse scio. Opes velut studiorum impedimenta, non anxie quæsiui, & ea quoque quæ contingere potuissent, contempsî. Hoc nondum scio an commodum, aut potius incommodum dici debeat, quòd totum istud studiorum priorum genus, per totos nouem annos à me tractatum, relinquere ac quasi dediscere coactus fuerim, quum iam magnam Europæ partem, rerum medicarum experiendarum gratia peruagatus, Basileam peruenissem. Et quod quidem incommodum hoc sit, tot horas malè collocasse in studiis dediscendis, nemo non intelligit, etiam ex his quibus non dediscenda, sed amplectenda esse illa adhuc hodie videntur. Quòd verò commodum sit, totam barbaram medicinam à me esse relictam, & Græcam assumptam, productam & non parum per me etiam auctam, & ampliatam, nondum persuasum esse scio plerisque, qui adhuc cum Gryllo grunnire malunt, & glandibus vesci frugibus optimis repertis. Profectò horum ingenia velut ineptissima, & iudicia velut nihil sani habentia auersatus, tum mox toto pectore ad Hippocratem Græcum, ac Galenum, itémq; Paulum me contuli, paulo ante Veneriis ex Aldi itidem officina allatos: quibus etiam alienis ad tempus utebar, atque in his ita versabar, ut vel totum Hippocratem ad Latinos trāscribere me posse non desperarem, si tam magni laboris præmium alicunde affulisset: nedum de Galeno ac Paulo ambigerem, quos faciliores esse, vel leuiter Græca scientibus con-

stat: si quis modo non penitus rudis eos autores aggredi conetur. Et extant libelli duo Hippocratis eo anno à me conuersi, alter de aere, aquis, & locis: alter de flatibus inscriptus, qui animum meum studiosis satis declararunt, quantum voluerim medicinam illinc adiutam. Nec deerāt nobis inhortatores ad rem tentatam strenuè obeundam, inter quos magno erga optima studia merito præcipuè mihi nominandus est Des. Erasmus Roterodamus, cuius etiam scripta ad me epistola extat, qua ad me constanter prosequendum id quod in Hippocratem medicinæ principem orsus essem, inhortatur. Ad idē me institutū Frobenius ac Episcopijs, qui prius etiam aliquot mihi commentationum fuere autores, tātum non cogebant: digni profectò propter sua in doctos homines merita, vt ab omnibus bonis viris aduersus *improbes* amulos instar ignauorum fucorum insidiantes libris ipsorum sumptibus & industria in lucem editis, foueantur & tueantur. Quum igitur hæc mea tunc fuerit voluntas, & nō omnino desperata etiam præstandi facultas, Cur, inquit aliquis ex illis, ad tot annos dilatum est, quod propter communem utilitatem, si ita est veluti ipse dicis, quàm primum inuulgari oportuerat? Fatebor sanè hic quod res est. Primum quidem voluntatem meam remorata est maxima operis difficultas. Nam vt glossas & voces penitus obsoletas omittamus: vt dicendi genus breue illud, & quo velut per anigmata, innuere magis quàm significare sententiam voluit, ne producamus: adeò vt ne Galenus quidem se ex omnibus extricare valeat: vt nihil etiam dicamus de lectione varia, ac subinde à plurimis priscis Hippocratis exppositoribus mutata, & temporis insuper iniuria corrupta: vel ipsa verustatis reuerendi senis maiestas detertere posset, ne quis familiarius versare doctissima, & per omnia grauissima scripta audeat. Quod verò tantæ grauitatis, maiestatisque scriptor sit Hippocrates, idēque optimus methodi doctor, etiam Plato testatum de ipso reliquit, cuius verba ex Phædro adscribere non pigebit. Flerine posse putas, inquit Socrates, vt quis animæ naturam prodignitate consideret, absque vniuersi natura? Si quidem Hippocrati Asclepiadarum generis credere oportet, inquit Phædrus, neque corporis, circa hanc methodum. Bene, inquit Socrates, amicissime Phædre, Hippocrates dicit. Oportet

ret tamen insuper ad Hippocratem, etiam rationem expen-
dere, & an consona est, videre. Ita sentio, respondet Phædrus,
Proinde de natura considerare, inquit Socrates, quid tandem
dicit Hippocrates, & ratio vera? Nonne hoc modo? De cuius-
cunque rei natura considerare oportet, primum simplexne
sit, an multarum specierum, id in quo artifices esse volumus,
& alios ut tales sint facere. Deinde si simplex est, vim ipsius
considerare, quam à natura habeat, ad hoc ut in aliud faciat,
quid, aut quam ut ab alio patiatur. Si verò plures species ha-
buerit, his enumeratis, id quod in vna, hoc in singulis consi-
derare, quidnam à natura facere solet, aut quid ab alio pati.
Consequens, inquit Phædrus, hoc est ò Socrates. Proinde me-
thodus, ait Socrates, absque his similis est itineri cæci. Hæc
nunc Plato. Et non sunt quidem hæc ita ad verbum in Hippocra-
te, sed talis est omnino doctrinæ methodus libri De natura
hominis inscripti, ut de nullo alio loqui hæc videatur Plato:
quāquam similis methodus etiam in aliis huius viri scriptis
genuinis esse videatur. Quare quum hætenus reperti sint,
qui Platonem, qui Aristotelem, qui Theophrastum, qui reli-
quos Græciæ philosophos ac scriptores, ad Latinos conuer-
tere aggressi sint, & aliquid operæ præcij præstiterint in Hip-
pocrate nemo hoc feliciter tentavit, ex toto, ut ne in minu-
tissimis quidem libellis aliqui satis aptos artifices se declara-
uerint. Non igitur nihil est quod & nos de difficultate hu-
ius scriptoris queramus, qui hætenus omnes ex æquo à se
auertit: etiam si nunquam ex toto à nobis desperatum sit, fo-
re ut aliquando omni difficultate superata, Latinus à nobis
factus Hippocrates legatur. Accessit ad hanc difficultatem
alia remora ex temporum infelicitate. Quum enim per vi-
ginti ferme iam annos medicina Græca renouiscere cœpe-
rit: reducti sint Hippocrates, Galenus, Aetius, Paulus, Diosco-
rides: & hi non sua solum lingua, sed Latini etiam magna ex
parte (vno Hippocrate hætenus saltem excepto) tum per do-
ctos aliquot viros, tum per nos quoque facti, tamen ea est se-
culi infelicitas, ut nemo tantæ artis, quæ ipsam etiā vitam,
qua nihil homini preciosius esse potest, conseruat: pretium
agnoscat. Vidimus ardens primum studium multorum cir-
ca linguas addiscendas: deferbuit hoc paulatim. Vidimus
maximum studiosorum cōcursum ad discendā theologiam,

quum primū in Germania sincerior pietatis doctrina illu-
cesceret: Durauit hic aliquot annis. Transiitum est ad stu-
dium Iuris ciuilis: Nec puto vllō vnquam tempore tot fuisse
studiosos, qui leges Imperatorias sequerentur, aut doctorum
titulis insignirentur. Sola Medicina vbique contempta
iacet, frigent gymnasia, torpent professores, ars ipsa in
ἀρετήν abiit, & non nisi apud delyras aniculas, & recutitos
Apellas, & eos qui multorum periculis de sua ignorantia ex-
perimenta faciunt, eius vsus quæritur: paucis quibusdam bo-
nis medicis non in vsum publicum, sed in priuatum sibi the-
saurum, vera medicinæ studia possidentibus. Quāquam ego
quidem grauiorem adhuc, ac similem timeam optimæ artis
ruinam, si continget vt altius aliquando euehatur, qualem
videlicet Christianæ religionis studium pertulit, & qualem
iuris scientia minari videtur. Sicut enim dum pij aliquot vi-
ri euangelium Christi purum ac sincerum reducere conati
sunt, factum est vt apud plerosque Christus penitus fabula
factus sit, & parum adhuc in paucorū cordibus hæreat: Ita ex
magna iuris scientia eò peruenitur, vt ius sit in armis ac vi-
positum, vt sint qui quiduis sibi licere adstruant, adulterare,
scortari, prædari, prodere, rapere, agere, capere, & cælum ac
terram miscere, modo apex sit in iure scripto, qui vt ipsorum
cupiditatibus inseruiat cogi possit, quomodo summum ius
summam iniuriam esse, iuxta vetus adeò verbum, atque ita
omnem optimarum legum doctrinam, vsum ac necessita-
tem intercidere, nemo non sentit. Atque vtinam non similis
casus maneat rectissimum medicinæ studium, si quando etiā
hoc ad summum adductum fuerit: & ex scholæ vmbra, ad
publici exercitij theatrum productum. Sed quis prohibere
potest malos vt ne sui similes sint, in quocunque studiorum
genere peruertendo: & ea quæ ad multorum salutem inuen-
ta sunt, partim per ignorantiam, partim ex malitia, ad per-
niciem abutendo? Propter tales cessandum à nobis non est, vt
non optima faciamus, doceamus, ac in lucem proferamus, &
artem per se optimam ad summum statum euehamus. Nos
certè vt quod possumus huc conferremus, & vt & ocij, & ne-
gocij nostri ratio publicè omnibus constaret, sæpe in partia-
libus editis libellis promissum sæpe repositum sæpe repeti-
rum Hippocratem nostrum Latinum tandem etiam his in-
felicissi

felicissimis tēporibus, quibus præter ea quæ iam relata sunt, omnia perpetuo metu consternata grauātur, infidiis pertentantur, proditiōibus obtinentur, bello expugnantur, incendiis consumuntur, edere voluimus atque hunc inæstimabilibus laboribus, & non leui sumptu ac rei familiaris iactura, perpetuis quindecim annis absolutum. Non quòd hos totos in hoc solum opus impenderimus: hoc enim verè esset suo sibi iumento malum accersire: sed quòd nunquam hanc curam reiecerimus huius quoque operis absoluendi, dum illa partim de Græcis plurima translata, partim à nobis scripta ac commentata, in publicum emisimus, non omnino nulla nostra priuata vtilitate. Fatendum enim & prædicandum quoque hoc est, quum & magnorum principum, & præclararum vrbium, magnificentiam ac liberalitatem simus experti, & ad hæc præstanda quali fomite quodam coaliti, ac prouecti. Superauimus autem hanc operis difficultatem, tum sæpe repetita Hippocratis lectione, tum locorum subinde alibi ab ipso Hippocrate repetitorum collatione, tum perlecta denuo tota Galeni Græca ac Latina editione, eo studio vt totum aliquando editurus sim Galenum, aliqua parte ex mea translatione, & reliquis itidem versionibus ad veram Græcam lectionem correctis. Et profectò longum esset hic declarare, quibus rationibus inductus, multa ex lectione Aldini, plurima præter lectionē Frobeniani exemplaris, à nobis ad multa manuscripta exemplaria collati ac editi, in hac nostra Latina Hippocratis cōuersione mutauerimus. Statuimus autem huc impendere quinquennium plus minus, vt si deus vitam tamdiu prorogarit, totius nostræ conuersionis ratio ac aliqua expositio extet, in diurnaliorum siue coniecturarum libris, tot à me scribendis, quot omnino existunt libri Hippocratis scriptorum. Interim tamē hunc præcipuū nobis fuisse scopum, studiosos omnes non celabimus, quem etiam pro iustissima lege Galenus agnoscit, dum sic scribit: Hæc, inquit, Lex mihi in exponendo ac interpretando obseruatur, vt vniuscuiusque scripta ex illo ipso declarentur & non vanis opinionibus, & pronunciata citra demonstrationem sententia quisque quicquid velit deblateret. Hanc legem nobis in scopum, in Hippocratis libris Latine conscribendis proposuimus, & omnes obscuros locos, collatione ad

AA § alios

Epitola
alios facta, vbi hoc fieri potuit, exposuimus, reddidimus ac
expressimus, multis immutatis, non paucis reiectis, plurimis
appositis, quæ nec in impressis, nec manu scriptis codicibus
ita habentur: sed tamen vt alicubi vestigia veræ lectionis
etiam ex illis odorati simus. Quorum omnium iusto opere à
nobis ratio reddetur. Atque hæcenus suffecerit protulisse me
studiorum nostri æui statum, progressum ac augmentum, &
præcipuè rei medicæ. Cuius primum, summum ac maximum
authorem, tandem ego Latinis hominibus non minorem, sed
aliquanto, nisi penitus fallor, meliorem quam Græcis extat
legendum produco, edo ac publico. At ne ego mihi tanti be-
neficij publici gratiam expetere videar, aut ne tanti autho-
ris ac operis patronum præstare me posse, aliundè confidere
puter: ad te Augustissime Senatus Augustane confugio. Tuæ
amplitudini hanc authoritatem defero, Tuæ erga literas &
litteratos benignitati hanc gratiam deberi confiteor, quod
Hippocrates Latinus noster publicè extat, habetur, legitur:
quod rebus mortalium iuuandis opus expositum est, ultra
duo millia annorum ab omnibus in Latina lingua desidera-
tum. Nec verò videri possum aut velut ignotus, aut temerè,
ad tantorum virorum præsidium confugisse, dum in publicè
recepto illo more dedicandorum ac consecrandorum libro-
rum, ad vos viri Augustenses me recipio. Nam quam vestra
Respublica, per omnem non modo Europam, sed orbem ter-
rarum celeberrima sit, à bonis legibus, à probatis ac graui-
bus moribus, à seuera in malos animaduersione, à clementi
erga bonos benignitate, à pietissimo religionis cultu, ab in-
genti erga literas & bona studia fauore, à doctissimis consi-
liisq; ac prudentia præstantissimis viris, videri non debeo te-
merè magis quam recto iudicio, ad tam augusti senatus, ad
tantorum virorum tutelam, Hippocratis & pariter meum opus
attulisse. Nec ignotus ego vobis esse possum, cuius scripta ac
opera tot principes viros, tot claras vrbes fouere ac tueri non
dum, quod sciam, pœnituit. Hic non referam quibus viris
semper Respubl. vestra floruerit. Non recensebo Fuggaros,
non Paungaitneros, non Ilfongos, non Vuelseros, non Here-
brotios, non alias magnas familias principum opes adæ-
quantes, & simul pietate, prudentia, fortitudine, magnificen-
tiâq; ac summa liberalitate præstantes. Non dicam de Mo-
nopol

nopolliorum apud vos extantiū vtilitate, per quæ fit vt Germani ab hominibus sub polo Antartico habitatibus, & ab ipsis Antipodib⁹ mercimonia, in quotidiano vsu habeat. Nō dicā de plebis sedula opera, & laudatissimis operibus, vnde linei generis, biliciorum, triliciorum, quadriliciorum variis texturis, multiplicibus tincturis, non modo Germania, sed omnes exteræ etiam nationes redundant. Nec dicam de vrbis magnitudine, splendidis extructionibus ac ædificiis, & populositate, quæ vt peculiare laudes vrbium sunt, ita & loci optimum situm, & terræ, ac nascentium omnium copiam ac vbertatem coarguunt. Verū studiū vestrum circa literas, bonas artes, pietatem ac rectam religionem conseruandam non tacebo. Quum enim videretis studiorum omnium fluctuationē, sursum deorsum omnia iactari, in præcipiti omnes linguas, artes, ac disciplinas cōsistere, nullo vnquam tempore plures in omnibus scriptores extitisse, partim sua magnificē iactantes, partim aliorum & veterum quoq; scripta damnantes: Vos optimos semper apud omnes rectē sentientes habitos authores Græcos, magna copia per occasionem nuper adeō vobis oblatos non neglexistis, sed velut rem reipub. imprimis vtilem, eorum opera ac libros cōparastis, comistis, ac pro ingenti thesauro, velut reuera est, reposuistis, habetis, & possidetis: non tamē vt priuatā vtilitatē hinc vobis quaratis, sed publicum bonum iuuetis, vt si opus sit, inde rebus humanis subsidium afferatis. Neq; enim quicquā ad respub. optimē instituendas ac retinendas, vtilius est bonorum virorum bonis scriptis. Sicut contra mera pestis est, quæ ex malis malorū libris hauritur. Rectæ enim artes, boni mores, optimæ disciplinæ traduntur ac seruantur in bonis libris. At sine rectis artibus, sine bonis moribus, sine optimis disciplinis, & in summa, sine literis vita non est vita censenda, velut supra ab initio dixi, & vetus illud chaos, rudis indigestaq; moles reducitur. At vos sane in illo librorū Græcarum thesauro vestro, non vnus alicuius liberalis artis aut disciplinæ authores habetis sed ex tota philosophia, medicina, mathesi, ac Theologia optimos, & eos neq; hætenus typis excusos, neque multis adeō adhuc visos, imō ne nominibus quidem plerisque omnibus notos, & fortassis nusquā alibi extantes, velut ex indice cognoui, quem multarum re-

rum

rum usu ac experiētia clarus medicus apud vos Geryon Seilerus ad me misit. Imò non modo indicem hic amicus noster misit, sed quæ vestra est viri Augustens. erga recta studia benignitas, de vobis eorum librorum etiam usum mihi promissit, multa simul de vestra magnanimitate, ac magnifica voluntate mecum loquutus, ac mihi pollicitus. Quamquam autem antea mihi virtutum vestrarum gloria nō ignota esset: (Quī enim ignota esse possit, quæ per totum orbem decantata est?) tamen ex referēte plura cognoui, & propius introspexi, quàm antea ex auditu & aliorum scriptis intellexeram. Accessit ad huius narrationem vir excellenti iuris scientia, & eximia prudentia præditus Claudius Peutingerus, clariss. Iurisconsulti Conradi Peutingeri filius, non modo in paternis virtutibus referēdis, sed in maximis etiam rebus ac negotiis, pro patria obeundis ac gerendis, non iam spem, sed ipsam rem præstās. Cum hoc viro ante paucos annos mutua aliqua cognitio mihi intercessit, quæ sanæ iudicii de vobis meum confirmavit, & in id consilij me abduxit, & breuiter effecit, ut non dubitauerim Hippocratē hunc Latinum meum ad vos referre, vobis inscribere ac dedicare, ære ac libra vestrum facere. Cæterum erunt fortassis qui vel hoc nomine Hippocratē à nobis Latine cōscriptum impetent, quod præstiterat Græcum legere, ac satis fuerat Græcum extare. His sanè larga data est eius rei faciendæ etiam per me copia. Nam & Græcum exemplar per me editum ex Frobeniana officina, non paucis locis melius ac correctius est quàm Venetum. Et si vere Hippocratis studiosi sunt illi, nō pœnitebit ipsos vel ambo coemere, habere, ac legere, ambo etiam plura inquirere, quo tandem emendatissimus sua lingua loquens Hippocrates habeatur. Quin & ego semper ita sensi, melius esse quosuis scriptores in sua lingua, qua ipsi scripserunt legere, quàm optimè etiam in aliam trāsatos. Sed quid facient hi qui Græcum non intelligunt? Antea ostendi huius autoris difficultatem, breuitatem, & ænigmati similem obscuritatē. Quandiu verò expectādum nobis est hoc seculum, in quo medicinæ studiosi ex æquo omnes ad legendum ac intelligendū Hippocratem Græcum sufficient? Esse autem Hippocratem talem rei medicæ autorem, ut sine ipso res medica integrè consistere non possit, & saepe

Nuncupatoria.

sæpe aliàs dixi, & nunc non minus asseuerantissimè affirmo. Totus enim Galenus omnem suam doctrinam ad Hippocraticam methodum, velut adamussim direxit. Idem fecerunt & antè, & post Galenū, optimi quinque tum medici, tum philosophi, vt ineptissimos, pariter ac indoctissimos se esse declarauerint, qui vnquàm ab Hippocrate descuerunt, aut ipsius dogmata impetuerunt, quorum multos adeò in libris suis hinc inde, ex omni occasione Galenus reuellit, ac explodit. Demus autem hoc seculum spem nobis iniicere de futuris. Nam reuera nullum antea fuit, in quo per omnem ferè Europam pariter vtriusque linguæ cognitio in tantum aliquandiu floruisse. At quid vetat, aut quid adeò obfuerit, hæc etiam accessionem linguæ Latinæ contingere, vt Hippocrates Latinus pariter & Græcus legatur? maximè quum etiam Græcus ex nostra Latina interpretatione clarior euadat, & expolitionis Græci vicè Latinus supplere possit. Verum mihi, velut antea quoque dixi, videntur omnia nunc ingenia, omnes artes ac disciplinæ in summo ac præcipiti stare: atque vtinam sic retinerentur, non retro vt reuerent, & esset aliqua saltem spes in paucis, qui in posterū suis magistris discipuli euaderent præstantiores. Ego profectò quum multis annis à scholis absuerim, à docendi munere abhorruerim, studiis meis ad scribendum, & ad exercendam medicinam collatis: proximum ferè triennium rursus professor medicinæ consumpsi, non omnino surdo ac muto auditorio, in Heforum ac Cattorum principis Academia Marpurgensi. Sed vt verum apertè fatear, longè infra meam spem, & inferiore successu quàm Illustriss. Herois Philippi Heforum principis, vel erga me. vel erga studiosos, magnifica liberalitas deprecere videtur. Non tamen desunt huius rei causæ. Pleriq; omnes fugimus immensum studiorum laborem, delicias ac voluptatem in his consecramur. Itaque vel quantum iucundum est, vel minimè molestum didicisse satis esse putamus. Alij ad ea studia se conferunt, vnde quàm breuissimo tempore, ac minima impensa assequantur, quo ventri sit cōsultum, & *πρὸς τὰ ἀλφειά* respiciunt. non cogitantes plerunque quàm sint ad ea tractanda appositi. Medicina verò requirit naturā idoneam, à puero institutionem, doctrinam linguarum, literarum, philosophiæ, mathematicarum, & totius naturæ

Epistola

naturæ cognitionem: multā insuper industriam ac diligentiam, locum studiis commodum, & longissimū etiam tempus. Si non hæc sunt quæ studiosos à Medicina auertunt, libenter patiar alium potiores causas afferre. Ego Hippocrati in libro De lege hæc referenti accedo. Detineo amplitudinem tuā Augustissime Senatus longius quā proposueram: Vnum si adhuc retulero dimittam. Non conatus sum in hac mea translatione Ciceronianus videri, non quòd omnino improbem hoc nouæ sectæ hominum genus, qui per omnia Ciceroni in dicendo similes fieri student: aut quòd penitus negem fieri posse, vt omnes artes ac disciplinæ, Ciceronis dictione in imitationem assumpta ac seruata, tradantur. Sed vt simpliciter dicam, primū quia non placet. Deinde quòd videam magna ex parte longum & inutilem laborem, & postea etiam omnibus factis, conatum infelicem, ac successu carentem, quo plerique ex illis referunt Ciceronem, non aliter quā Nero princeps Catonē, aut vt vicinius comparem, cuculus lusciniæ. Accedit his seruilitas & mancipatio, nullam linguæ, imo ne cogitandi quidem diuersum aliquid, libertatem relinquens. Et quando desinemus esse turpitudinis simiæ, pulcherrimum hominum genus creati? Sed oportuit hoc quoque ad reliqua seculi incommoda accedere, vt haberemus qui non solum loquendo ac scribendo, Ciceronis simiæ vt essent, se excruciant, sed etiam Græca omnis generis scripta in Latinam linguam conuertendo, tanta sui mancipatione, vt si modo Ciceronis verbis vndique conquisitis loqui videantur, etiam à sententia subinde excidere nec vereantur, nec animaduertāt: quasi magni adeò referat Ciceronem ita exprimere, & quasi nemo alius bonus Latinus scriptor extet, quem sequi oporteat, ipso etiam Cicerone, si cognoscat, risuro suos *κακομήλας*, præsertim si quomodo se ad Lælios, Scipiones, Terentios, atque alios composuerit, in memoriam reuocet. Et tamē hic nihil dicam de his rebus quas medicus tractat, quas ne ipse quidem Cicero Ciceronianè eloqui posset, etiam si à Medico de his edoceretur: quum fanè aliàs non multus sit in rerum naturæ tractatione, nimirū intra moralis ac rationalis philosophiæ limites cōclusus. At cum demum Simia verè simia est, quum etiā supra hominē præstare quid molitur. Hoc itaq; agant hi quibus istud placet,

Nuncupatoria.

cet, ac datum est, ego neminē prohibeo. Sed sic sentio, Hippocratem istos fucatos ornatus auersari, & amare ut sicut in sua, ita in omni lingua, brevis & verbis, & sententiis, & tamen plenus ac gravis, clarus item ac dilucidus, quantum ad eius aetatem posteris assequi datur, & quod potissimum est, rectus legatur. In hoc si quid praestiti, quod volui sum assecutus: nec est quod verear vltos nasos, vel *ῥιπνικώτας*, quantum in cornu exacutos. Quo verò sciant studiosi aliquam huius operæ à nobis transactæ partem, Habent in hoc nostro Latino Hippocrate librum De aëre, aquis, & locis, duplo auctum, & nisi fallor integrum: Habent libri de capitis vulneribus principium, quod in Græcis codicibus impressis deest: Habent librū verum *μολινίον*, id est Vestiarium eundemque De ossibus inscriptum: quæ omnia in Græcis exemplaribus partim desiderantur, partim alieno loco posita, iustis locis restituta sunt. Quorum omnium gratiam ut vobis viri Augustenses, medicinæ studiosos debere volo, ita nec pudebit, nec pigebit vos, spero, summum medicum Hippocratem vestra autoritate tutum, vestro favore commendatum, in publicam utilitatem, & meæ erga Augustissimum Senatum voluntatis declarationem, vobis inscriptum ac dedicatum prodisse. Valete viri magnifici. Marpurgi Hessorum. Calendis Septembribus. Anno Christi M. D. XLV.

INDEX LIBRORVM IN HOC volumine contentorum.

Hippocratis vita ex Sorano,	De natura hominis.	23
folio	1	De salubri diæta, Polybi.
Hippocratis iusiurandum.	2	De genitura.
Lex Hippocratis.	3	De natura pueri seu foetus.
De arte liber.	4	34.
De veteri medicina.	8	De carnibus.
De medico.	16	De septimestri partu.
De decenti ornatu.	18	De octimestri partu.
Præceptiones.	21	De superfætatione.
		De exsect

Index.

De exsectione foetus	58	morbis mulierū adiecta	
De dentitione.	59	298	
De corporum resectione.	60	De sterilibus.	301
De corde.	61	De morbis popularib ⁹ liber	
De glandulis.	62	primus.	310
De ossium natura.	65	Liber secundus.	320
De locis in homine.	71	Liber tertius.	328
De aere, aquis, & locis.	83	Liber quartus.	338
De flatibus	94	Liber quintus.	344
De medicamentis purganti-		Liber sextus.	354
bus.	98	Liber septimus.	363
De diæta siue victus ratione,		De victus ratione in morbis	
liber primus.	98	acutis.	379
Liber secundus.	108	De iudicationibus.	396
Liber tertius.	118	De diebus iudicatoriis.	399
De insomniis.	124	Prænotiones.	401
De alimento.	128	Predictionum, liber primus.	
De humidorum vsu.	130	408	
De humoribus.	133	Liber secundus.	413
De morbo sacro.	137	Coacæ prænotiones.	423
De morbis, liber primus.	143	De vulneribus capitis.	444
Liber secundus.	154	Chirurgiæ officina.	450
Liber tertius.	172	De fracturis.	454
Liber quartus.	180	De articulis.	469
De affectionibus.	192	De vlceribus.	498
De internis affectionibus.		De fistulis.	503
203		De Hæmorrhoidibus.	505
De virginum morbis.	224	De visu.	507
De natura muliebri.	225	Aphorismi.	508
De morbis mulierum, liber		Hippocratis epistolæ.	520
primus.	242	De hominis structura	540
Liber secundus.	273		
Notha ad finē primi libri de			

FINIS.

INDEX COPIOSISSI-

mus in opera Hippocratis.



- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------|
| Bortus grauio | rum curatio | 229.a |
| res quā par- | Acetabulorum vteri pituita | |
| tus 263.f | plenorum curatio | 258.a |
| Abortus pluri | Acida pituitosa | 81.e |
| mi in pri- | <i>ἀποχρῆν</i> | 116.f |
| mis quadraginta diebus | Acyli | 114.c |
| 49.b | Acuti morbi iudicium | 397.a |
| Abortus deformes quando | Ad hominis generationē se- | |
| fiant | mē ex oībus & viri & mu- | |
| 37.f | lieris mēbris manat | 180.c |
| Abortus sanatio | Admonitio sufficiens rerum | |
| 168.e | omnium vicissitudo | 528.f |
| Abortus variæ causæ | Ad mulierē parere nequeun- | |
| 251.a | tem medela | 305.d |
| Abscessus tabidorū qui me- | Adolescens in foro decum- | |
| liores | bentis historia | 330.e |
| 416.c | Adolescens in Melibœa ex | |
| Abscessus iunioribus, quarta | venerē calfactus mortuus | |
| næ senioribus magis fiunt | 317.d | |
| 407.c | Adolescēs multo meraco po- | |
| Abscessus quo tēpore magis | tus periit | 352.f |
| fiant | Adstringentia & corroboran- | |
| 407.c | tia | 199.e |
| Abscessus circa aures | Aegri quæ sibi nocent quā | |
| 411.d.e | quæ iuuant assumere ma- | |
| Abscessus circa aurem | lunt | 5.f |
| 398.b | Aegri quatuor signis seruan- | |
| Abscessus in febribus | tur | 34.c |
| 134.e | Aegris non semper creden- | |
| Abscessus boni | dum | 7.c |
| 320.f | Aegro petenti omnia, modo | |
| Abscessus humorum quid fa- | non noxia, danda | 200.c |
| ciat | Aegrorum variæ historiæ | |
| 357.c | 366.367. 68.375 | |
| Aceti facultas | Agrotorum sedecim narra- | |
| 132.a.b.113.a | tio | 333.e |
| Acetum mulsum quibus de- | | |
| tur | | |
| 76.e | | |
| Acetum mulsum in morbis | | |
| acutis quale esse oporteat | | |
| 386.b | | |
| Acetum biliosis magis con- | | |
| fert | | |
| 386.e | | |
| Acetum mulieribus magis | | |
| quā viris aduersatur | | |
| 386.e | | |
| Acetabulorum pituita pleno | | |

B B

Aegro

Index.

- Aegroti variis morbis corre
 pti 321.e.f.322.a.d.325.a
 Aegrotus quis 24.f
 Aegroti cur non pareant 5.f
 Aegrotum quæ vexent 23.e
 Aegrotantis ac medici error
 259.d.e
 Aegrotantis cupiditas 22.d
 Aegrotatium varia historia
 338.a.b.339.& 340.341
 Aegrotantium victus 202.f
 Aegrotorū quatuordecim va
 riè agitatorū histor. 316.b
 Aegrotorū duodecim histo
 ria 328.b.329.330.331
 Aequinoctium 118.c
 Aes optimum 105.e
 Aesculapius & Hercules in
 hominum vtilitatem nati
 538.f.2.d
 Aetatis transmutatio 337.e
 Aestas & hyems in fracturis
 quid poscat 464.d
 Aestas bilem, ver autem san
 guinem parit 136.a
 Aetatum singularum morbi
 512.a.b
 Aetatum & locorum differē
 tiæ 417.a.b.106.e
 Aetas sana & morbosa 106.
 a.b
 Aetati cuiq; cōueniētia 106.c
 Aetatum cognitio 106.d
 Aetas omnium morborum
 capax quæ 439.f
 Aetatis cuiusq; vitia 529.e
 Aetates tibi obnoxia 436.e
 Aegyptiæ terræ benignitas
 & fecunditas 51.c
 Aegyptij inter se similes 90.e
 Aegyptij & Lybici Asiaticis
 similes 89.b
 Affectus morbo neapolitano
 similes 332.a
 Affectuū variorū causæ 11.c
 Africani cur non sanarentur
 137.f
 Aglaidæ filia 314.f
 Alia cōtrariis alia similibus
 curantur 80.f
 Alimentum vnde tale 129.b
 Alimētum hominis, humor
 leuis 188.b.c.d
 Alimentorum vnum genus,
 species verò plures 128.d
 Alimento copiosiore qui e
 geant 509.c
 Alimenta plura quando &
 quare adhibenda 509.c
 Alui secessus quos enecaue
 rit. 332.f
 Alui liquidæ curatio 389.f
 Alui fluxus variij 311.c.312.c
 408.b
 Alui profluvia 420.c
 Alui egestiōes 397.d.f. 403.c
 Alui solutio 395.f.298.f
 Aluum subducentia 158.d
 Aluus plena, vel vacua quid
 efficiat 189.a
 Aluus turbata, quibus sit ma
 lum 145.f
 Aluus nimis soluta hominē
 enecat 176.e
 ἀλὺδης 116.f
 Allij natura 393.e.113.b.211.f
 Alumen melium 500.f
 Amphictyones populi 535.e.f
 Amyg

Index.

Amygdala	114.c	tia	112.c.d
Anaxionis Abderitani histo- ria	335.d	Animas vnà cum corporibus purgandas	525.c
Anaxyridæ	92.e	Anni partibus morbi proprij	511.c.512.a
Andreas Hippocratem infamauit	1.c	Anni constitutiones quæ sa- lubriores	511.c
Androgyni, id est, effemina- ti	105.b	Anni quatuor partes	118.d
Anethum	113.c	Annus omnis, particeps	4.
Anhelationis muliebris cu- ratio	238.e	qualitatum	26.c
Angina eiùsque signa	174.e	Antiquorum ac recentium morborum curatio	79.e
Angina siue Cinanche	155.f	Antilochus & Aleuas	321.d
159.e		Antiphonis agri historia	313.e
Angina & eius curatio	78.f.	A pituita in aquam inter cu- tem transitus	211.e
79.a.299.b		Apium	113.c.202.a
Anginaquãdofiat	388.f.389.b	Aphtha & ei⁹ curatio	165.e.f
Angina secūda & ter.	160.b.c	Apollonij Abderitani histo- ria	336.e.f
Anginæ vexatio	360.c	Apollo nomius	138.c
Anginæ varietas	406.f.359.f	Apollinis responsum	536.a
Anginæ, lippitudinis, & ïntesti- ni vulnerati curatio	327.f	Αποπληξία	64.d
Anginosa cur moritur	353.f.	Apoplexiæ vel Syderationis caussæ	97.c
366.c		Απορία	14.c
Anginosorum affectus	123.a	Apparentia quo tēpore fiant	125.d
Aĩa admiscetur animę	105.c	Apparitiones in somnis	517.f
Animæ similitudo cum car- bonibus	105.c	Appendices	72.f.73.a
Anima in somnis vigilās non est sui iuris	124.f	Apprehensio venarū brachij	17.f
Anima hoīs vsq; ad mortem semper producitur	358.c	Aqua potabilis	130.e
Anima quales ab æthere sūt fluxus somniat	126.d	Aqua in morbis acutis	186.e
Animæ hominis qualitas & temperamentum	101.d	Aqua curandis vulneribus qualis	452.e
Animalia quibus conseruen- tur	135.c	Aquæ leuioris cognitio	322.c
Animaliū & carniū differen-		Aquæ potus	110.f

Index.

Aquæ facultas	112.f	Argumentis septē probatur	
Aqua calida oculis utilis		potum in pulmones non	
132.e		deerrare	191.f
Aqua frigida qb' p'sit	132.c.e	Aristoteles & Plinius taxan-	
Aqua cœlestis	179.e	tur	43.a.b
Aqua cur hyeme calida, æsta		Aristochidis ægi historia	
te frigida	41.a	313.c	
Aqua fontis profundī qualis		Arithmeticæ vsus	532.f
41.b		Arteria & vena caua	45.b.
Aquæ quæ morbosæ, & quæ		60.d.66.d.67.b.68.c	
salubres	85.c	Arteria vulnerata & curatio	
Aquæ palustres	85.c	166.e	
Aquæ potoribus familiares		Arteriæ conuulsæ curatio	
morbi	85.d.e	204.b.c	
Aquæ optimæ	85.f.86.a	Arteria magna ventrem &	
Aquæ falsæ	85.f.86.b.c	intestina depascitur	62.b.
Aquæ pessimæ	68.a	c.69.a.435.c	
Aquæ pluuiiales	86.c.d	Arteriæ à renē ortæ	326.b
Aquæ ex niue & glacie om-		Articularis morbus eiúsque	
nes malæ	86.f	curatio	198.c.d
Aquæ inuectitiæ	87.b	Articuli pulmonis conuulsi	
Aquarū robur ex ventis	87.b	& curatio	167.a
Aquarum per somnum bibe		Articuli manus	73.a
re quid significet	128.a	Articuli pedum	73.c
Aquarum & ciborum quali-		Articuli parui ī corpore	73.c
tas	358.a.83.d	Articulorum generatio	46.b
Aqua intercus ab hepate &		Articulorum tumores	132.d
splene cum curatione	212.	Articulorum curatio & repo-	
d.e.f.213.a.b.c.d		sitio	493.a.495.c.497.a
Aquæ inter cutē caussa	212.a	Ars quid	19.d
Aquilo qualis & Auster	141.	Ars exercēdi corpora & me-	
e.f		dicina contrariæ	79.d
Arbor quī plantetur, & cre-		Ars tam nocentibus quā etiā	
scat	39.f	iuuātibus cōprobatur	5.c
Arbor multum tenera fru-		Ars vaticinandi & medicina	
ctum non producit	40.d	ferè similes	103.a
Arcturus	88.d.311.c.313.f	Artes quæ probandæ	19.a
Arcturi ortus	118.b	Artis medicæ magna pars iu-	
Archigenes	136.f	dicium	337.f
		Artium	

Index.

Artium variarum partes & officia	103.a b	193.c.358.d	Aurifices	103.e
Artificum differentia	380.a		Auster à similib. Borea natu- ra regionibus spirat	109.d
Ascarides quando magis ve- xent.	320.c		Austri facultates	109.
Ascaridum eiectio	293.a		Autumnus lethalis	313.b
Asiana pulchriora & maiora	88.c		B	
Asianorum genus cur imbel- le	90.b		B Alnea quibus profint	387.d e
Asianorum & Europæorum differentia	90.a		Balnea calida	115.b, 29.f. 124. a b. 101.f
Asiatici imbelles & effœmi- nati	89.a. 90.a b		Balnea frigida	115.c
Asparagus	113.d		Balneorum vsus	387.b
Aspretudines culicum mor- sibus similes	323.f		Barbarorum victus ratio	9.f
Astra visa per somnum splen- dida quid significant	126.c		Beta refrigerat	123.e. 113.e
Astrorum cognitio necessa- ria medico	100.a		Biduum sine cibis viuitur	184.d
Astrorum exortus	88.d		Bilis & pituita homini con- genitæ	144.b
Astrorum obseruatio utilis medicina	83.e		Bilis corpus possidet	26.b
Astrorum iudicium	126.f		Bilis eductio	300.b
Atheniensium 2. historia	346.b		Bilis, sanguis, pituita quomo- do fiant	180.d
ἀριχμία	5.c		Bilis per æstatē effectus	135.e
Atra bilis qualis	28.f		Biliosa ac pituitosa mulieris signa	301.d
Attenuatio vnde	185.a		Biliosi lassitudine affligun- tur	74.a
Attoniti siue stupidi	107.d		Bionis ægri historia	313.d f
Atriplex	113.d		322.f	
Auditus qui fiat	47.a. 71.e		Bitonis ægri historia	330.e
Auena comesta	111.b		Blitum	111.e
Aures purulentæ	64.e		Bona vel mala à medico fa- cta	146.a b
Auriculæ fractura	480.c		Bonis aut malis præter ratio- nem factis nihil creden- dum	510.c
Auris dolor quando lethalis	406.d		Boreas frigidus	109.c
Auris incisæ curatio	480.f		Botri	114.b
Aurium doloris curatio	74.c		BB 3	Brachij

Index.

Brachij fracti coaptatio		Calfacientia sunt dulcia, aci-	
457.b		da, salsa, amara, austera &	
Brachij caput	66.b	carnosa	114.f
Brachij luxati signa	472.d	Calor & frigus nō putrescit	
Brachiū antrorsum & retror-		14.c	
sum luxatū quale	468.b.c	Calligenis curatio	373.d
Brassica	113.e.202.b	Caluiciei causa	256.c
C		Caluus in Larissa quarto die	
Adentes tā ex alto, quā		moritur	335.a
ex plano quid patian-		Caluitij causa	38.e
tur	446.d	Calūnia, artis ignorātia	4.b.c
Cæcitatis signum	399.e	Canales an cruribus fractis	
Calamintha	113.d	supponendi	460.d
Calcanei cura in tibię fractu		Cancris curatio	328.a
ris	462.b	Cancris occulti futuri signa	
Calculi varia causa	190.f	& curatio	280.f
Calculi quę signa	190.f.87.d	Cancris occulti nō curādis	17.d
Calculi causa & curatio		Canicula	88.d
208.f		Canicies vnde	38.e
Calculi duo vel plures quī		Canis à natiuitate	38.e.f
fiant	191.a	Cātharides	217.d.227.a.229.
Calculus puerorū vnde fiat		Carbunculi æstiuī	320.b
190.c		Carcinoma mulierem eneca-	
Calculi cur pueris fiant	28.a	uit	353.e.377.d.378.a
Calculi cū ferro similitudo		Carnes roborantes	201.b
190.e		Carnes leuissimæ & graues	
Calidi seu ætheris vis & actio		201.e	
44.c		Carnes fluxu laborantibus	
Calidus vel frigidus cur quis		dandæ	277.e
fiat	152.a	Carnes piscesque dandi pitui-	
Calida aqua copiose vtētib ⁹		tos	211.d
quid accidere soleat	131.b	Caries ossis cap.155.d.159.c.d	
Calidum hoc vel contra ne		Carnes conditæ	114.c
fit, certum non est	12.e	Carnis cuiusque animalis fa-	
Calida apposta	82.e	cultates	111.d.e.f.112.a
Calida spiritū emittunt	34.f	Carnium attracticū indicia	
Calidiores tenaciore habent		359.a	
memoriam	107.f	Carnosi oēs & inter se similes	
Calfactio	131.a	qui Riphæos incolūt	91.c
		Carno	

- Carnosorum affectus 122.d
 Caro quâ fiat 46.a
 Caro est medijs temperamētis
 int̄ ventrē & venas 102.c
 Caro cū generatur, quid fiat
 36.d
 Capillū fluentē sistētia 293.b
 Capillorum vel pilorum na-
 tura & origo 38.c.46.f
 Capitis repentinus dolor
 158.f.193.b
 Capitis & colli differentia
 16.a
 Capitis vlcera ac vulnera ma-
 gna 48.d
 Capitis dolor assiduus quan-
 do lethalis. 406.d.410.a
 Capitis dolor in febre quid
 significet 396.c
 Capitis dolorē sedātia 260.a
 Capitis vulnera lethalissima
 418.a
 Capitis grauitas quâ fiat 155.a
 Capitis dolor duplex 421.c
 Capitis dolor grauidis perni-
 ciosus 410.e
 Capitis torpor 156.b
 Capitis tumor. 357.e
 Capitis dolentis curatio 355.
 e.174.c.239.c.292.d.80.a
 Capitis fluxio 79.c
 Capitis os qua parte robu-
 stius sit 445.a
 Capitis vulneribus confere-
 tia & contra 418.b
 Capitis dolor vocem inter-
 cipiens. 155.c
 Capitis rheuma 148.c
 Capitis vuln' incurabile 446.a
 Capitis rigor, dolor ac febris
 cum curatione 157.f.158.a
 Capitis dolor cum febre vn-
 de 96.c.397.b.398.f
 Caput quale 63.e.15.d
 Caput purgantia 75.b
 Caput oblōgum & ceruices
 321.b.c
 Caput lapide percussus pe-
 riit 351.a
 Caput vlceribus plenū 156.f
 Caput piruita locus, cor san-
 guinis, lien aquæ 183.e
 Caput instar cucurbitulæ tra-
 hit 181.d.e
 Caput brachij fractum 468.e
 Caprinæ carnis facultas 394.a
 Caulis siue pudendum 69.d
 Causæ morborū non statim
 cognoscuntur 7.c.129.a
 Causæ varia. 129.a
 Causi solutio 398.c.d.400.b
 Καὶ σθ 153.a.310.c
 Cautio in admouendo tere-
 bello 450.c
 Cautio circa os in vulnere cu-
 rando 448.d
 Cauæ partes 44.e
 Cauma, Rheuma. 14.a
 Casei facultas 112.e.393.f
 202.b
 Caseus esu malus 14.e.f
 Castanæ 114.c
 Cataplasma ad fluxus 293.f
 Cataplasmata vlcerati pudē-
 di 240.c
 Cencron ventus. 90.a
 Ceba 113.b.201.f
 Ceratum in deligaturis qua-
 le

Index.

le	452.e	Χυμός	15.b
Cerebri corruptio cum cura		Chirurgiæ officinæ quæ con	
tione	173.d	ducant	450.d
Cerebri vsus & situs	533.b	Chirurgo prospicienda quæ	
Cerebrum glandulæ simile		450.e	
64.a b		Chirurgi manus & digiti	
Cerebrum in vtero purgatur		quales esse debeant.	451.a
139.c		Chœnix	179.f
Cerebri tumor cum curatio-		Cholericæ affectiones qui &	
ne	172.e	quando fiant	374.d
Cerebri situs ac sensus	444.f	Cibaria leuissima & grauiâ.	
Cerebri venulæ superuomē-		200.e f	
tes	154.e	Cibaria describuntur	9.c
Cerebri repletio dolorosa e-		Cibi quantitas	81.b c
iúsque curatio	173.a	Cibi vel potus conferentes &	
Cerebri corruptio	155.b	contra	201.a b
158.e. 159.c		Cibi & potus omnia irrigant	
Cerebri ac capitis morbi, &		& augment	46.e
curationes	158.b c	Cibi quatenus medicamen-	
Cerebri biliosi morbus & cu-		ta sint	98.d
ratio	Ibidem.d	Cibi distributio per singulas	
Cerebri madētis signa, & cu-		atates	130.a
ratio	157.d	Cibi quo tempore facilius	
Cerebro, osibus, dentibus,		coquantur	509.d
neruis frigida inimica, ca-		Cibi hora cū præterit quid	
lida verò amica	131.c d e	faciendum	11.b c
Cerebri membranæ duæ	71.f	Cibis vexantibus quid agen-	
Cerebri affectiones	64.f	dum	202.e
Cerebrum quale	44.f	Cibi & labores vires habent	
Cerebrum quorum sit causa		contrarias.	99.f
142.b		Cibi si mox in corpore gra-	
Cerebrum quando insaniat		ueolent quid fieret	184.e
Ibidem.c		Cibi si eodē die excernerentur, quid eueniret	Ibidē.e
Cerebrum hominis duplex		Cibi plus æquo in ventriculo	
139.a		retenti quid faciant	Ibidē
Cervix	65.f	Cibi perturbantes	12.d
Cherionis ægri historia		Cibi frigidissimi qui	358.f
330.a		Cibi ac potus facultates mul-	
Χερσονήσος.	116.f	tas	

tas ex terra trahunt	181.c	tus	318.e
Cibi qui celeriter excernan- tur	510.a	Cleanactides graui morbo li- beratus	317.f
Cibo non augeri, malum	510.c	Clyster mitissimus	211.a
Ciborum varietas	130.b.c	Cnicus	111.d
Ciborum varietas	359.a	Coagulum asininum	293.e
Ciborum facultates	128.e	Coccus cnidius	165.c
Ciborum ac potuum singu- lorum vis	110.a.202.a.c	Coci obsonia parant	103.d
Ciborum comparatio	10.c	Coctiones ac cruditates quid significent	312.e
Ciborū facultas quā cogno- scatur	200.d	Cœlestis vis quid efficiat	187.d
Ciborum facultas multis cō- paratur	103.c	Cœli clementia & soli vber- tas in Asia	88.f
Cibus sanorum ægrotis no- cet	10.b	Cognitio vera quid præstet	19.e
Cibus sensim augendus	118.a	Coitus voluptas vtriusq; est	32.d.115.c
Cibus in vigore morbi dete- rior	384.c	Coitus quibus proffit	358.f
Cibus quando morbum ge- neret	510.a	Coitus ebriis quid proffit	414.f
Cibus in tabido qualis	166.c	Coi singulis annis Hippocra- ti sacra faciebant	1.c
Cicer album	111.c	Colli dolor pessimus	409.e
Ciceris facultas	393.f	410.c	
Circuitus, constitutio & de- cretoria	134.d	Columellæ vuluæ curatio	298.e
Citharædi	47.f	Collutio biliosa & pituitosa	270.d.f.271.b
Citra sanitatem nihil vtile ef- se potest	120.b	Collutiōes purgatorię	270.e
Clauda membra quæ & quo modo fiant	418.c	Collutiones variæ	198.c
Claudi vel cæci partus vnde fiant	49.f	Collutiones ad fluxus	294.b
Claudicatio vnde	73.d	Collutiones pudendi	240.d
Claucule fractę curatio	474	Collutionum mēsurā	269.a
c.d.e.& caussæ.465.b.e.f		Colon	60.f
Claues pectoris	66.b.72.f	Color ossis capitis	444.d
Clazomenius sanitati restitu-		Colorū mutationes à corde	70.e
		Comitiales morbi vnde	

- 388.e
 Comitialis morbus cur non
 magis diuinus quàm alij
 putandus sit 137.b
 Comitialis morbi liberatio
 510.f
 Comitialium cur os spume-
 scat 97.f. 98.a
 Comitialis morbus senes ma-
 ximè tollit 416.f
 Comitiales omnibus sensi-
 bus priuantur. 97.f
 Commotiones. 116.e
 Compressa à seipsis calidiora
 40.cd
 Conceptus in vtero qualis
 47.f
 Conceptus signa 48.a b. 32.f
 Conceptus varietas 53.a
 Conceptui tempus aptum
 250.d
 Cōceptus qui paretur 55.b c
 Cōceptus restauratio 56.a b c
 Conceptum impediētia 56.b
 420.e. 240.b. 266.b
 Conceptus qui vltra plenu-
 mium fit 53.b
 Conceptus fallacia quid por-
 tendat 421.b
 Conceptus à quo morbo li-
 beret 227.b
 Conceptus, partus, abortus &
 morborum decretorium
 50.c
 Concepturæ mulieris signa
 varia 302.b c
 Conceptus virgines à dely-
 rio liberat 225.a
 Conceptorum summū 307.b
 Concubitus mox à partu mu-
 lieri morbi est causā. 226.a
 Congeniti homini 4. primi
 humores 25.e
 Conchylia 112.c
 Coniectores quæ non asse-
 quantur 125.a b
 Coniugio permutato cur per-
 mutetur & soboles 33.c
 Conformatio partus 36.d e
 Conformationis in vtero tē-
 pus 50.e
 Consideranda medico in vi-
 ctus ratione describenda
 509.cd
 Consideranda initio morbi
 34.c c
 Consideranda in ægro quæ
 391.a b c
 Consideranda in muliere ste-
 rili, & fluxu laborante
 274.d e
 Constantes homines 107.a
 Constitutiones morborum
 & vigores quando magis
 aut minus, citius aut se-
 rius fiant 344.a
 Cōstitutionis tēporis pestilē-
 tis & morborū in ea graf-
 santiū descriptio 331.e 332
 Consuetudo victus multum
 potest 382.d
 Contenta in manibus ac pe-
 dibus 38.b
 Cōtraria tollūt cōtraria 94.c
 Contraria commista nō læ-
 dunt 13.a
 Contusionis species 445.d
 Conuulsionis curatio 79.f
 Conuulsionones

Index.

Conuulsiones quibus vtilis	334.a.b	Corpora formæ peregrinæ	visa quid velint	127.f
Conuulsio puerperæ	326.f	Corpus post calidam frige-	scit magis, post frigidam	
Conuulsiones faciles quæ	440.c	verò calefcit		131.f
Cor quid	61.d	Corpus ac venæ in icterico	quales	217.c
Cordis ventriculi, siue finis		Corpus quo pacto humores	4.ex cibis trahat	180.c
Ibidem.d.e		Corruptio omnium mutua		101.b
Cor quale	61.a.45.c.60.d.	Corna		114.a
66.d		Κωρυκομαχίη		116.f
Cordis latentes pelliculæ	62.b	Costæ	66.ac.72.e	
Cordis natura	45.b	Costæ quanto tempore coa-	lescant	485.d
Cordis & præcordiorum fa-		Cotylidonū natura		307.a.b
cultates	143.b	Coxa		65.f
Cordis & arteriarum consen-		Coxendices		73.b
sus	67.c	Coxendicum dolor qua æra-		422.f
Cordis dolentis curatio	321.e	te affligat.		
Cordis alimētum vnde	62.c	Cratiæ ægri historia		313.f
Cordis auriculæ	61.f	Crapulæ morbi cum curatio		ne
Cor creatoris optimi sum-				198.a
mum opificium	62.a	Cranonis populares morbi		320.b
Cor cur non afficiatur, caput		Crapula morborum parens		393.b
& lien multum	183.e.182.e	Cratistonax		315
Cor calidissimum	45.c	Crisæorum calamitas quan-		ta
Cor & venæ semper mouen-				535.e
tur	Ibidem	Crysus primus murum con-		scendens
Cordis tunicula	61.a			536.d
Coriandrum	113.c.202.a	Crisæi populi		535.d
Corpus quale	71.d	Critonis mors secundo die		ab initio morbi
Corpus humanū medici sub-				318.d
iectum	Ibidem.d.e	Critobuli ægri historia		313.e
Corpus impurum puro ali-				
mento læditur	509.f			
Corpora attenuata quomo-				
do reficienda	Ibidem			
Corporis repentini labores	384.e			

Κρίσις

Index.

Kp̄iois quid	23.e	Cur Hippocrates capite te-	
Crisis morborum acutorum		cto pingatur	2.a
427.b		Cur corde nō sapimu⁹?	143.a
Critiæ ægri historia	313.f	Curationis lassitudinis facul-	
Cubiti & tibiæ ossa qualia		tas	117.f
467.c		Curationes variæ	327.c
Cubiti repositio	ibidem.e	Curatio vlcerū capitis	156.f
Cubiti ossa vbi fracta, quid		Curatio morbi à capite	156.
agendum	455.c	c d	
Cubiti luxati curatio	476.	Curatio cum quis sanis ocu-	
a b		lis non videt	508.a
Cucumeris agrestis facultas		Curatio anceps	210.b
358.f.114.c b		Curatio celeris	121.c
Cucumeris sylvestris radix		Curatio ex victus ratione	
78.d		122.a	
Cucurbita	113.e	Cursus longi	116.c
Cucurbitulæ forma cur talis		Cursus vestiti	Ibidem.d
15.c.17.d		Cursus recti	Ibidem.
Culpa ægrotantium medico		Cursus circulares	Ibid.
sæpe adscribitur	20.f	Custodia ac scientia multa	
Cum foetus mortu⁹ crus aut		prægnantibus opus est	
manum præmittit, quid		251.c	
agendum	263.a	Cutis capitis læsa periculosa	
Cū morbus repullulat quid		444.a	
agendum	157.b	Cutis vstulata pilos non pro-	
Cū loc⁹ cucurbitulæ admotē		ducit	38.d
aperitur, quid agendū.17.e		Cydonia	114.a
Cum foetus manum aut crus		Cyceonis facultas	110.e
præmittit quid agas.262.f		D	
Cuminum Aethiopicū.179.d		Damnatur ars medica	
Cur modo mares, modo fœ-		etiam cum deplora-	
minæ gignantur	33.a	tos non curet	4.a
Cur de articulis scribat	483.	Dætharsei ægri historia	313.e
a b		Deambulationes post exerci-	
Cur quædam natura sine la-		tia	116.a c
te sint, quædam eo ante		De aqua cur in corpore au-	
tempus destituatur. 264.a		geatur	182.c
Cur homo imparibus diebus		Dealcis vxoris historia	337.c
moriatur	186.a	Debilitatis signa	397.c
		Debilitas	

Index.

- Debilitas à partu 230.b
 Decimestres maximè educā-
 tur 50.b
 Decimestres, vndecimestres,
 & septimestres quando pa-
 riantur 52.f.53.a
 Decretoria februm 400.f
 406.a b
 Decretoria paria vel impa-
 ria 315.f
 Decretorij dies cur impares
 tantum sint 185.d.186.d
 Decretum Atheniensium in
 gratiā Hippocratis 534.c
 Decubitus qualis 401.e
 Decubitus ægrotantium pro
 morborū varietate eligen-
 di sunt 20.f
 Defriktionis potestas 453.a
 Deglabratio quā fiat 299.f
 Deligatio duplex 451.c
 Deligatione in fracturis qui
 non egeant 464.d
 Deligatio pedis & manus cur
 diuersa 460.b
 Deligamēta qualia esse oportet
 451.f.452.b d.455.d
 Deligandi modus 451.d e.
 453.b.454.f
 Deligatura, in qua duo maxi-
 me profunt 17.a b
 Delyrij causa 224.f
 Delyrij vehementis signa
 384.b c.391.d.509.f
 Delyrij curatio 225.a
 Delyratio quibus profit 359.
 b c
 Democrit⁹ insanus putat 1.d
 Democriti de mundo senten-
 tia 530.f
 Democritus quæ in vita vi-
 deat 528.a b
 Demonstratio iucundior quæ
 opere fit quàm quæ sermo-
 ne 8.c
 Dentati cur nascantur 46.c
 Dentes pueris quando rena-
 scantur 48.e
 Dētes posterius nascunt 46.c
 Dentes pueris quando ena-
 scantur 48.e
 Dentes stupefunt molarum
 attritu 135.a
 Dentitionis varietas 59.e
 Dentium generatio 46.c
 Dētium stridor quid porten-
 dat 402.a.409.b
 Dentium dolor 193.e
 Deploratos non expedit tan-
 gere 6.c
 Desidiosorū morbi & curatio
 122.d e f.123.b c d.124.b c
 Desidiosi copiosiore labore
 quàm cibo egent 122.f
 Desidiosorum victus ratio
 123.b d f.124.a
 Desilientium ex alto curatio
 258.a
 Destillationis remediū 358.e
 Destillationis signa 13.e
 Destillatione oculorum 13.f
 Deterior victus meliori quā-
 do præferendus 510.e
 Deus rerum humanarum po-
 tissima causa 225.b
 Diarrhœa eiusque curatio
 197.f
 Diata recta multum confert
 107.d

Index.

107. d
Diata hominum perquiren-
da 83. d
Diebus imparibus omnia æ-
grotantia discernuntur
186. b
Dierum obseruatio 50. e
Dies ac menses quātum pos-
sint 50. c d
Dierum parium obseruatio
Ibidem. d
Dies in crisibus considerandi
510. b
Dies qui ossium repositionē
non admittant 466. a
Differentia inter Asiā & Eu-
ropam 88. e
Difficultatis spirādi curatio
274. c
Digiti tanquam rami postre-
mo disparātur 38. a b. 73. a
Digitorum articuli quot mo-
dis luxentur 497. c
Digiti luxati repositio & cu-
ratio 477. a
Dignoscenda in principio
134. b c
Dilatio ab arte aliena 525. e
Diligens inquisitio contrarij
ac certissimi remedij 11. f
Discenda etiā quæ malè suc-
cesserunt 484. e
Disciplina nulla probatur,
quæ vitæ humanæ nō con-
ferat 18. f
Disparationis ossium cubiti
signa 476. c
Dispositio Athletica non est
à natura 129. f
Dispositio hoīs bona 14. d
Dissectio & sedes idē 446. f
Distentio maxima vbi fiat
453. a
Distortiones faciei 422. d
Diuersa medicamenta men-
ses detrahentia 264. b c d e
Diuersa ex oculis cognitio
327. c
Diuersa eiusdem morbi cu-
ratio, vnde 150. e
Diuersi terræ humores 181. c
Diuersitas cōsideranda 129. d
Diuersitas languentiū 414. a
Diuersorum morborum cu-
ratio 328. a b c
Doctrina, vnā cum prudētia
comparanda 3. d
Dolor vnde 15. f
Doloris sedatio 298. b
Doloris hepatis solutio 436. f
Doloris & vlceris vterorum
curatio 298. d
Doloris subiti curatio 398. d
Dolores in lumbis & vesica
breues 209. c
Doloris circa lumbos aut co-
xam curatio 373. f
Doloribus circa caput quid
prosit 421. d
Dolores ex itinere qui 393. b
Dolor auriū magnus tertio
diē hominem tollit 359. c
Doloris ad clauiculam cura-
tio 381. f
Doloris sub diaphragmate
curatio Ibidem.
Domorum structura 103. c
Dormientium consideratio
401. e

Index.

401. e
 Dormiens internis, vigilans
 verò externis partibus ca-
 lidior 358. a
 Dormire diu, quibus condu-
 cit 31. a
 Dorsalis morbus cum cura-
 tione 167. f
 Dorsi vlcus 502. e
 Dracon Thessali frater 537. e
 Dromeada vxoris puerperæ
 mors 319. a b
 Duorum victuum differētia
 10. b c
 Δυσεντερία 69. e
 Dysenteria eiúsque curatio
 197. b f. 121. b. 300. c
 Dysenteria in quæ degene-
 ret mala 392. e
 Dysenteria mala quæ 419. f
 Dysuria cum delirio homi-
 nem enecat 137. b
 E
 Ebrietatis morbus & cu-
 ratio 159. a b. 155. d
 Edere aut bibere per somnū
 quid sit 127. f
 Elementorum quatuor vires
 & situs 44. c
 Epaminondas 314. f
 Epaminonis ægri historia
 313. e
 Epicratis vxor graui morbo
 liberata 317. c. d
 Epiglottis 61. b
 Epileptici cur oculi distor-
 queantur 140. a
 Epileptici cur os spumescat
 Ibidem. b
 Epileptici cur suffocentur
 140. b
 Epileptici cur calcitrent pe-
 dibus Ibid.
 Epilepsia inueterata, incur-
 bilis est 141. d
 Epileptici casuri fugiunt
 Ibidem.
 Epilepticis ventorū mutatio
 quid afferat 141. e. 142. a
 Epilepsia cur pueros suffocet
 140. c
 Cur adultos non occidat
 Ibidem. e
 Cur senes perimat Ibid. e
 Cur dextram partem po-
 tius occupet Ibidem. f
 Cur vere periculosior sit
 141. b
 Equestre certamen 539. e
 Equitatio continua quæ ma-
 la afferat 91. f. 92. e
 Erasini Bootis historia 318. c
 Eratonis ægri historia 313. d
 Error medicorū in sorbitio-
 ne exhibenda 381. c
 Errores ab initio commissi
 facilius corriguntur 383. f
 Errores quando patent 11. a
 Eruca tithymalidis 55. f
 Eruum 179. f. 111. c
 Erysipelas 145. f
 Erysipelas pulmonis 147. e.
 & eius curatio 167. c
 Esus carniū in somno quid
 velit 127. f
 Etesia 311. c. 313. b. 123. d
 Euacuatio dolorem excitat
 25. a
 Euagon

Index.

- Euagon Diapharsis filius 314. f
 iuxta natura quædã est 23. a
 Eunuchi cur non coeant 32. a
 Eunuchi in Scythia adorantur 92. a
 Eunuchi non caluescunt 38. e
 Europæi inter se dissimiles 92. e
 Europæi bellicosiores quàm Asiatici 93. a
 Europæi Asianis corporum forma magis inter se discrepant 92. f
 Europæi cur seniores Ibidẽ.
 Euryphon medicus 1. d
 Euryanactis filia historia 330. c
 Ex abortu morbi ac curatio 354. a b
 Exacerbationũ indicia 509. b
 Excrementa cur urinam odore referant 171. d
 Exercitationis facultates 185. b
 Exercitatorum morbi & curationes 124. b c d
 Exercitationis in puluere & oleo differentia 116. f
 Exercitationes desidiosorum 121. e. 123. c e. 124. a
 Exercitia 30. e f
 Exhalatio humoris quomodo fiat 186. f
 Ex morbis, anni temporibus & tempestatib⁹ omnium sit coniectura 136. b
 Ex partu flux⁹ curatio 256. a
 Ex partu vomitus sanguinis curatio Ibidem.
 Ex rigore qui pereant 423. e
 Excreationes in febrib⁹ quales 513. e. 519. d
 F
 Fabæ alunt & c. 111. b
 Fabula de Amazonidib⁹ 487. c
 Faciei consideratio 429. a b
 Faciei ornamenta 293. b
 Faciei singularum partium situs & vtilitas 533. c
 Facies bona in malis tam magna quàm paruis quid significet 355. f
 Faciei rugas leuigãtia 293. b
 Facilitas quibus insit 146. d
 Fames quo soluatur 510. b
 Farina puræ & cum aliis mixta, facultas 111. a
 Farina ordeï pleni 179. e
 Fauces 44. d
 Fauces cruentæ 418. f
 Faucium exulceratio & inflammatio 96. f
 Fauciũ dolor 408. c. 410. a f
 Faucium exulceratio 406. e
 Faucium inflatio 193. d
 Fauis sicci 179. c
 Fauonius 118. b
 Februm quatuor species 28. e
 Februm differentia 354. f
 Februm duo genera 95. c
 Febris communis & peculiaris causa Ibidem.
 Febris ex mala diætã Ibidem.
 Febris ardens recidens 398. b
 Febris interficiens, & eius curatio 170. c
 Febris

- Febris continua & tertiana 189.c
 cum curatione 162.d.e.f
 Febrium omnium propria
 & species 315.d.e
 Febris continuæ varietas
 Ibidem.e
 Febres à bile & curatio 162.
 b.c
 Febris & vomitus contraria
 80.e.f
 Febrium omnium causa spi
 ritus transitus 96.c
 Febrium effectus 137.c
 Febre ardente quando mo
 riantur 153.f
 Febris ardens, & curatio 169.
 d.173.e
 Febris ardentis constitutio
 332.c
 Febris ardens quæ fiat 387.f
 388.b
 Febres erroneæ unde fiant
 224.f
 Febres erroneæ acutæ 246.d
 Febres incōstātes donec cōsti
 terint finire oportet 390.d
 Febriū acutarū causa 509.c
 Febris continua 397.f
 Febris quartana & curatio
 163.a
 Febricitatiū medicamē 99.a
 Febris diuturnæ signa 510.c
 Febris vexātis curatio 78.b
 Febrium diuersæ species 311.
 d.e.315.d.333.b
 Febres leues ac lethales 396.d
 Febres hybernæ obseruandæ
 194.f
 Febris post frigus quæ fiat
 189.c
 Febres in glādularum tumo
 ribus exceptis diariis ma
 læ 324.d
 Febris singultiens cum cura
 tione 169.e
 Febris à pinguiore tantū hu
 more 186.c
 Febres in Perintho grassan
 tes 323.e
 Fel 66.d.70.c
 Femur 73.b
 Femoris ossis fracti curatio
 461.c.d
 Femur fractum quorum coa
 lescat ibidem
 Femur retrorsum luxatum
 489.a
 Femoris luxati signa 488.b
 Femoris luxati reposicio
 494.b
 Femur atrorsū elapsū 490.c
 Femoris articulus quot mo
 dis excidat 486.c.d
 Feræ magnæ in Riphæis mō
 ribus non nascuntur 91.b
 Ferulæ quales esse deceat
 452.e.469.c
 Ferulæ quando apponendæ
 460.f.463.d.469.c
 Ferulæ quādo firmādæ 456.c
 Fibra à ventre in vesicā 73.d
 Ficus 114.b
 Ficus quibus profit post cibū
 122.a b
 Figmentum de morbo sacro
 cur productum 138.c
 Figura fracturarum commo
 dissima 469.a
 CC Figu

Index.

- Figurarum summa 453.c
 Filij Cydis agri histo. 364.d
 Fissuræ carnis & intercus
 morbus qui fiant 97.a
 Fistulæ caussa & curatio 503.
 d.e.504.a.b.c.
 Fistulæ tam faciles quàm dif
 ficiles curatu 439.b
 Fistulæ pulmonis folium vel
 epiglottis quid faciat 191.f
 Flatus quid agat 15.f
 Flatus omnium morborum
 caussa 98.b
 Flatus in vteris purgatio 291.
 f.292.b.298.c
 Flatus in vterum quomodo
 inducantur 308.d
 Flumina quæ salubria 93.c
 Fluminis cursus per somnū
 visus quid præsignet 127.b
 Fluor cruentus ante partum
 periculum affert 54.d
 Fluxio in aures 74.d
 Fluxio in oculos 74.f.75.a
 Fluxiones de capite septem
 sunt 74.a
 Fluxiones à frigore ac calo
 re 73.c
 Fluxionis caussa 96.d
 Fluxionis diuturnæ signa ac
 curatio 257.f
 Fluxum resiccantia 294.e
 Fluxum sistentia, & dolorem
 sedantia 293.f
 Fluxus diuersi, eorumq; cura
 tio 277.278.a.b.239.b
 Fluxus vteri caussa ac cura
 tio 274.e.f.275.a
 Fluxus diuersæ ætatis caussa
 273.e
 Fluxus suppressi signa 259.e
 Fluxus ex partu corripientis
 curatio 237.d
 Fluxus pituitosus quid effi
 ciat 247.b
 Fluxus consuetudo 246.f
 Fluxus albi signa ac curatio
 228.d.e.f.276.b.277.b
 Fluxus à partu aut labore cu
 ratio 275.d.e.276.a
 Fluxus aquosi purgationes
 294.f
 Fœcunditatis præparatio
 250.d
 Fœcunditatis experimētum
 267.d
 Fœmellæ procreatio etiā tri
 plex 105.c
 Fœmina cur ex coitu magis
 valeat 32.e
 Fœminæ corpus 65.b
 Fœminæ humidiores & fri
 gidiores 106.e
 Fœminis quid in coitu acci
 dat 32.d
 Fœtu corrupto & secūdis nō
 exeūtib⁹ qd sit agēdū 256.f
 Fœtus conformatio 130.a
 Fœtus qua parte existat 55.a
 Fœtus in vtero quo tempore
 moueatur 38.f.263.d
 Fœtus quomodo ex vtero pel
 latur 236.f
 Fœtus in vtero, aut mortui,
 aut debilis signa 251.e.f.
 54.d.f
 Fœtus in vtero mortui expul
 soria varia 273.b.c.308.a
 Fœtus

Index.

- Fœtus quo pacto erumpat 37.c.42.b
 Fœtus in vtero per vmbilicū inspirat & respirat 42.a
 Fœtus in vtero quomodo cre-
 scat 35.f
 Fœtus in vtero terræ nascentibus comparatur 41.f
 Fœtus immobilis expulsio 268.f
 Fœtus in vtero qd agat 45.d
 Folia viridia cum incenduntur spirant 35.a
 Fomenta calida dolorem mitigant 96.d
 Fomenta vtilia 107.e
 Fomenta pudendi 240.f
 Fomenta diuersa ad fluxus 294.a
 Fomentum ad vteros 281.a. 282.a.296.c
 Fomenta vterum durū purgantia 297.c
 Fomentum ex stercore bubulo 225.e
 Fontes iiii. pleni semper corpori distribuunt 83.a.180.b
 Fontes, putei visi in somno, quid velint 127.b
 Fontes humanæ naturæ 61.f
 Foris aut intus quæ prosint vel noceant 135.b
 Fortuna bona, aut infortuniū omni morbo accedit 4.f
 Fortuna sui iuris semper nec optanti sese offert 81.f
 Fracturarum & luxationum curatio 468.f
 Frictio 23.a
 Frictio ex oleo & aqua 117.a
 Frigefactio 131.a
 Frigidæ noxa 515.a.b
 Frigida sæpius vtentes quid patiantur 131.b
 Frigida & humida aluū subducunt 81.e
 Frigidum calido est alimentum 45.d.35.a
 Frigidum exulcerat 324.a
 Frigus vehemens quid faciat 356.q
 Frumentum & vinum inter se differunt 202.d
 Fulcimenta quibus adhibenda 453.e
 Fullonum tubercula magna 374.c
 Furoris causa bilis redundans 527.b
 G
 Galeæ conones quales 488.a.473.f
 Gargarismus 159.f
 Gemellorū procreatio 105.d
 Gemelli cur inter se similes Ibidem.e
 Gemelli vno coitu fiunt 43.e
 Gemelli aliquādo masculus & femella generantur 43.f
 Gemellos gestans, eadem die parit, velut concepit 54.e
 Geometriæ vtilitas 532.f
 Generationes hoīs tres 105.b
 Genituræ per venas via quomodo fiat 38.c
 Genuinus dolor 25.a
 Genu luxatum facillè reponitur 73.c.467.c
 CC 2 Glan

Index.

Glandulæ quales	62.e.f	Hepatis & partium interna-	
Glandulæ qua parte sint	63.b	rum descriptio	533.d
Glandulæ periculosa	473.c	Heracleius	315.a
Glandulæ intestinorum qua		Heragoras	321.b
les	64.a	Heraclidis ægri historia	313.c
Glandulæ intestinorum ma-		Herba brevis melior pecori-	
iores	63.d	bus	471.f
Glandulæ renum	Ibid.	Herbarum facultates à qua-	
Glandulæ morbum generat		litatibus	113.e.f
Ibidem.f		Hermocratis ægri historia	
Glandulæ & pili eiusdem uti		328.f	
litatis participes	Ibid.b	Herophon graui morbo libe-	
Gnato	115.a	ratus	317.a
Gracilium victus ratio	30.a	Heropythi Abderitani histo-	
Grammatica	104.a	ria	335.e.f
Grauedinis curatio	300.a	Herpetes mitiores	417.f
Graueolentiæ in pudendis cu-		Herpetes quibus familiares	
ratio	238.d	Ibidem.c	
Gratis nonnulli curadi	22.b	Hiatus præcedit febres	96.a
Gulæ effigies	60.e.61.b	Hiantia nihil attrahunt	15.c
Gutturis dolentis curatio		Hippace quid	91.a.187.e
3.27.e	H	Hippocratis diuersa curandi	
H Abit' boni causa	185.c	ratio à Cnidiis medicis	
Habitus bonus quando		379.b	
mutandus	508.b	Hippocrates contemptor pe-	
Hæmorrhoidum causa & cu-		cuniarum	2.b
ratio	505.f.506.a.c.f.507.	Hippocratis laus & genealo-	
b.325.c		gia	520.d
Hæmorrhoidum cognitio		Hippocrati oblata ab Artax-	
506.b		xerxe rege	Ibidem.f
Hæmorrhoidarum utilitas		Hippocratis ad Democritū	
136.d		aditus	526.c.d
Hæmorrhoidas patientes, à q-		Hippocratis inuētum	120.b
bus morbis tuti sint	377.b	Hirundo	118.b
Hemitriteos eiusque signa		Homo humores quatuor	
310.e		semper habet	26.c
Hepar iaculo percussus sta-		Homo totus ex natiuitate	
tim moritur	15.f.351.b	morbus est	529.f
Hepati infestissima	214.e	Homo quatuor locis purga-	
		tur	

Index.

- tur 184.a
Homo omnium artium par
ticeps 104.c
Hominis temperamentum
Ibidem
Hominis fundamentum, seu
materia 11.e.f
Hominum species & colores
boni 417.b
Homines sicuti arbores nu-
triantur 41.c.118.c
Hominis calefacti historia
319.b.c
Hominum sancita mutabi-
lia 102.e
Hormini semen 111.e
Horrentes quales 424.b
Horror qualis 151.f
Horroris ante febres causa
95.f
Hortandus æger, vt bene spe-
ret 22.f
Humerorum dolor 422.c
Humerorum luxatio 469.d
Humeri luxati repositio
470.a.b.d. & vltio 473.a
Humeri summi auulsi cura-
tio 474.a.b
Humida cōpressa magis, sic
ca minus putrescunt 40.c
Humidæ magis supernæ par-
tes quàm infernæ 73.f
Humidi quatuor species 31.c
Humidum & liquidum calo-
ris quid habeat 46.a
Humorum observatio & ef-
fectus 134.f
Humorum differentia ex pō-
dere 187.f
Humores quatuor in homi-
ne imitatur quatuor anni
tempora 26.d
Humorum impetus & fero-
citas 133.c
Humorum qualitates 151.e
Humorū quatuor fōtes 180.b
Humores in corpore quo pa-
cto minuantur 183.f
Humores, succive & sapes
in homine 12.c
Humoris aquæ in vtero si-
gna ac curatio 225.d
Hydropis duo genera ac cu-
ratio 394.c
Hydropis causæ 188.e
Hydropis origo 402.f. & di-
uersitas 74.b.403.a
Hydropis signa 97.b.192.b.
196.d.f
Hydropis præcognitio 136.c
Hydropicorū curatio 77.b.
398.e.351.e.360.f.415.d
Hydropicorum catapotia
395.b.f
Hydropis curat. anceps 77.e
Hydropis in muliere causa
259.a
Hydropicæ mulieris affectus
Ibidem.b
Hydropis in vteris purgatio
291.c.d
Hydropico cur solus venter
turgat 192.c
Hydropi febris levis ac bre-
uis oboritur 188.3
Hydropis in vtero signa ac
curatio 258.b.d
Hyems frigida quos morbos
CC. 3 iæue

Index.

inuehat	84.a b c	Imperitia, malus thesaur ²	3.e
Hyemales morbos æstas suc		Impetiginis curatio	293.c
cedens transmutat	337.e	Impetigines, leucæ, & lepræ	
Hygea	2.d	vnde fiant	423.d
Hyslopum	113.e	Incertæ morborū prædictio-	
I		nes quæ	510.a
Icteri curatio	78.c	In cōceptus cupiditate quid	
Icterus niger & curatio		agendum	104.e
161.f		In Dealcis horto decumben-	
Iecur	45.e.60.e.66.d	tis historia	329.b
Ieiunium qui facilius ferant		Indicationes variæ	314.c
509.b		Indicia ex egestionibus	510.
Ignarorū graphica depictio		a.513.a.442.c	
4.c		Indicia ex atra bile	513.a
Ignis	115.c	Indicia crisis	509.f
Igni aquam superate quales		Indicia ex somno	Ibid.e
fiant homines	107.e	Indicia ex febribus	513.e.f
Ignis & aqua omnia consti-		514.a	
tuunt	100.c d	In doloribus quid agendum	
Ignis & aqua quæ à seinuicē		359.a	
secernant	Ibid.e	Industria medicinæ cultura	
Ignis & aquæ vires	Ibid.de	3.e	
Ignis humiditas in vena ca-		In exacerbationibus obser-	
ua	102.c	uanda	134.c
Ignis quæ gubernet	Ibid.d	Inexercitati cū laborant,	
Ignis tres partes	Ibidem	quid patiantur	117.b c
Ignis inimicus nervis	473.e	In Helide morbi populares	
Ignem sacrum ab vlceribus		345.c	
prohibentia	500.b	In febre acuta siticulosis vo-	
Ignorantia vbi malum	409.d	mitus ex aqua frigida pro	
Ignorata à medicis	379.f	dest	345.a
Ignis sine spiritu non viuit		Inflationis parientis curatio	
94.f		238.e	
Illyrica pestilentia	537.d	Inflammatio ad palatum	
Imagines præ oculis cursitā-		161.a	
tes	72.a	Inflammationis curatio	
Impedimenta quominus exa-		299.b	
cta victus ratio describi		Initio morbi purgandum ef-	
possit	118.b c	se	510.c
		Infecun	

Index.

- Infœcundæ victus ratio & curis constitutio 313.a
ratio. 56.d e f
In locis siccis nata. 114.e
Inobediētia ægri causa mor-
tis. 6.a
In Oeniadis morbi popula-
res. 345.d.f. 346.
In Perintho morbi popula-
res qui. 323.d
Infania citra medelam sana-
tur. 525.e
Infantiæ aut cerebri corrupti
causæ. 2. & vtriusq; cogni-
tio. 531.c
Infantiæ species. 107.e
Infanientis signa. 328.c
408.d
Infantiæ solutio. 398.c
Inſita proprium fructum fe-
runt. 41.e
In ſomnis quæ obueniant.
124.f
Insomnia phreniticū 408.b
Insomnia quæ vexent. 399.e
Insomnia & ebrietas animū
immutant. 97.e
Instauratio facilior qui fiat.
509.f
Instrumenta. 17.a
Instrumenti cōstructio 483.d
Insularum qualitas 109.b
Intelligentia & prudentia à
cerebro non à præcordiis
142.f
Intemperantia moriētium,
mortis causa. 5.e
In tempore quæ veniunt, bo-
na sunt. 145.e
In Thaso qualis tertia tēpo-
ris constitutio 313.a
Intestinorum morbi vnde
64.a
Intestinorum diuturna leui-
tas 322.e
Intestini recti inflammati cu-
ratio. 504.de
Instrumenta chirurgo in prō-
ptu sint & ministri 451.b
Instrumenta medico in prom-
ptu esse debent. 20.b
Instrumentorū omnium for-
tissima quæ 465.f
Inuentio medicinæ 9.f. 8.f
Inuentum Hippocratis 128.b
Ionia regio & Peloponesus
181.a
Irio. 111.c
Ischiados causa & curatio
222.f. 77.c. 400.b. 198.b c
Iuuantia & lædentia. 81.a
Iudicationes bonæ vel malæ
316.a
Iudicium sine signo iudica-
tionis malum 324.d
Iuniores cur magis seniori-
bus afficiuntur 151.b c
Iunonis templum 310.f
Iuuenum victus ratio 29.e
Iusiurandum. Hippocratis
2.d
- L
- L** Abor viris quid cōferat
243.c
Labor quando noxius 510.a
Labor quando vlcera excitat
358.f
Labores cibos præcedant
358.b

Index.

Labores in circuitibus	325.d	Lateris tubercula qui fiunt	149.d
Labores subeundi in aestate	118.ef	Lateris tuberculum, & eius curatio	168.f
Laboris effectus	186.d.187.c	Laudandi potius quam vituperandi qui vel tantillum vitam humanam adiuvant	99.d
Laborum vis	115.ef	Lectus agri qualis esse debeat	384.c
Lac cur fiat	39.a	Legumina in Aeno	357.f
Lac nutrimentum	129.c	Leguminum facultates	193.f
Lac asininum pro sero coquitur	277.d	Legumina, arborei fructus & similia spiritum habent	35.a
Lac pustulas excitat	322.c	Lenientia, exasperantia, claudentia, & aperientia vterum aut locellos	57.b
Lac extinctum quam reuocent	256.b	Lentes aestuosa	111.c
Lactis facultas	110.e	Lentis ac Lupini vires	393.f
Lactis copia quando	39.b	Lethales alui egestioness	443.c
Lactis procreatio	263.f	Letargus & eius curatio	170.a.173.d
Lactis potus	209.d.222.d	Lex Hippocratis	3.b
Lactis varietas	130.a	Leges sibi posuerunt homines non intelligentes	102.e
Lactis supressi remedia	239.d	Libri Hippocratis in controuersiam adducti	2.b
Lachryma calida & salsa	419.b.342.f	Libum vestitus	191.d
Lachrymae inuitae fluentes	314.d	Libya, Delos & Scythia pro omnibus regionibus ponuntur	407.f
Lachrymae vltroneae & inuolutariae	354.c	Lien	70.c
Lactuca	113.c	Lienosorum signa	356.a
Laesio ex aceto mulso	386.d	Lienosi eorumque curatio	196.c
Lagopyrus	501.c	Lienosi passiones	134.f.135.a
Lapis Magnesiae	211.c	Lien	
Lapis in vesica qui fiat	190.d		
Lapsus ab equo quid attulerit	340.d		
Larinx	66.d		
Laesitudines spontaneae morbos denunciant	509.e		
Laesitudinis curatio	117.c.d		
Lateris dolor, ex sputis biliosis	410.c		
Lateris sinistri grauitas	317.c		

Index.

Lienteria eiúsque curatio	197.c.399.f	Locum suum singula seruant	101.c
Lienteria symptomata	437.c	Locus morborum differen-	tiam facit 94.e
Ligationum species	451.c	Locus affectus spiritu occu-	patur, vnde rupturæ 97.a
Ligna ardentia spiritum e-	mittunt 34.f	Locus ad disciplinam aptus	est velut eius nutrimen-
Lignum medico paratum	quale 495.a	tum 3.c	
Linisemen	111.c	Locri populi	535.d
Lingua saliuosa	399.c	Lucis ratio	16.e
Lingua vis	103.d	Lucis species duæ	450.e
Lingua affectæ causæ & no-	tæ variae 358.e	Lucta	116.e
Lingua vocisq̃ue diuersitas	311.b	Lumborum dolor	409. b & mala alia 410.d e
Lingua obscuritas vnde	23.d	Lumborum doloris curatio	238.e
Lingua spasmi & tremor	408.d	Lumbi aut latera vexata eo-	rúmque curatio 230.b
Lingua immobilitas	313.a b	Lumbrici lati qui nascan-	tur 189.d
Linimentum omnia educens	297.b	Lumbrici rotundi pariunt	non autem lati 189.e f
Linteola	16.f	Lumbricus longus	190.a
Lintea in deligaturis qua-	lia 452.a.453.d.455.d	Lumbrici lati signa	190.b
Linteorum in deligaturis	quantitas 463.f	Luna per somnum pati visa	quid portendat 125.f
Linteorum subligationes	duæ 452.d	Lupinum	111.c
Lippitudinis solutio	398.f	Luxationum curatio	472.c
Lippitudinis curatio	508.a. 299.e	Luxationis curationi com-	munia 476.e
Lippitudinis crisis	419.a	Luxationis summa	491.b
Loca corporis vacua	7.a	Luxationis articulorum pe-	dis curatio 468.a
Loca alta & squallida	108.f	Luxationis veteris repositio	471.c
Loca faucia curatu diffici-	lia 417.c	Luxationum mala	459.f
Locorum mutatio quos iu-	uet 359.c	Luxus domesticus prohibe-	tur 16.f
Locus bilis fel	283.d		

Index.

M

- M** Achinamenta quibus
partibus adhibean-
tur. 464.e
- Macri** signa. 321.c
- Macrocephali.** 89.c
- Maculas solares purgantia.**
291.c
- Madefactio.** 131.a
- Meotis palus Europæ & Asiæ
terminus.** 89.b90.d
- Magi & expiatores.** 137.d
- Magi vel venefici quales.**
138.a
- Mala odorata.** 180.a
- Mala punica.** 114.b.202.a
- Mala dulcia.** 114.a
- Mala sylvestria.** 114.a
- Mala ex usu veneris.** 356.d
- Malorum humorum causa.**
14.a b
- Mala homini unde accidunt.**
14.b
- Malum ex articulo non repo-
sito.** 490.a
- Malū à bono non fit nec con-
tra.** 154.e
- Maligniora quæ derepente ap-
parent.** 325.f
- Malagmata pudendi.** 240.e
- Malienſis curru onuſto calca-
ti historia.** 348.e
- Malicorium.** 214.d
- Mamma.** 65.a
- Mamma exasperatæ curatio.**
292.f
- Mandibula.** 72.e
- Maniacis seu atrabiliaris
quid contingat.** 523.c
- Manus natura est descriptio.**
454.c
- Manus luxatæ signa, reposi-
tio ac curatio.** 476.e.f
- Mantum latio quid porten-
dat.** 402.a.410.c
- Mare & fontes unde hyeme
caleſcant & turgeant.** 40.d
- Mare perturbatū in ſomno
quid velit.** 127.b
- Mare quibus proſit.** 132.a
- Marium corpus.** 65.b
- Mas & femella qui gignantur.**
104.e
- Maſculi in omni genere cali-
diores & ſicciores ſunt.**
106.e
- Mas aut ſœmina quomodo
generetur.** 57.a
- Maſculus dextris in vtero he-
ret.** 327.f
- Matutinæ deambulationes.**
116.b
- Maxillæ ſolæ inter omnia of-
ſa venulas habent.** 46.d e
- Maxillæ luxatæ repositio ac
curatio.** 477.a d
- Mazæ facultas.** 110.b c.12.b
- Meatus capitis ſeptem, totq;
fluxiones.** 64.c
- Meconium quid.** 396.a
- Medicina quid.** 4.e.94.d
- Medicinæ antiquitas.** 8.f
- Medicina qualis.** 81.
- Medicinæ viæ ſeu partes.**
20.a
- Medica ars quibus conſtet.**
312.f
- Medicina cur ſapientiæ ſo-
ror.**

Index:

ror	533.a	Medico cōsideranda ante cu
Medicina varia	126.b	rationem. 5.f.20.d.401.c
Medica ars nihil ceteris si-		Medici ad duos fines mili-
mile habet	7.c	tant. 525.e
Medicina diuīsa in chirurgi-		Medicū quæ nosse oporteat.
cen, pharmaceuticen &		143.c
diæteticen	10.c	Medicus quæ præstare de-
Medica ars cur refelli non		beat. 143.c
possit.	5.e	Medicus deos potissimum
Medicina quæ doceat.	81.f	colit. 19.f
Medicina constans & firma		Medicus Philosophus deo æ-
tota.	81.f	qualis. 19.c
Medicinæ pars potissima.		Medicus qui laudandus
399.a		379.e
Medicina non statim scitur.		Medicorum error in arenæ
80.b		iudicio 209.f
Medicinæ voluptates & mo-		Medicus assidue legat 23.c
lestiæ.	94.a b	Medico quid agendum erga
Medicina morbos omnes nō		agrotantes 356.b.357.f
sanat.	4.e	Medicus considerat morbos
Medicinæ artis præstantia &		in corpore præualentes
contemptus.	3.b	26.e
Medicinæ comparatio ad a-		Medici præparatio ad articu-
griculturam.	3.d	lorum repositiones 459.c
Medica ars esse, & vera affir-		Medico præstanda in fractu-
matur.	8.e	ris 454.a
Medicina ars est de rebus vel		Medici imperiti taxantur
morbis vulgo notis.	9.b	454.b
Medicinam homines coacti		Medico curāda in capite vul-
sunt inquirere.	9.b	nerato 444.b
Medicus qualis esse debeat.		Medicus morbum, vbi nouit
16.c.e		facile pellit 7.d
Medici munus.	312.f.401.a	Medicus etiam rudes sciscita-
508.d		ri debet 21.f
Medici munus in rectè tra-		Medicus admonetur 23.d
ctandis mulieribus.	225.e	Medicus de quib⁹ iniuste ar-
Medico diligenter obseruan-		guatur 149.c
da.	361.d.e f.362.10.a	Medicus agros crebro inui-
133.c.d		sere debet 20.e
		Medici

Index.

- Medici plures conuocandi
22.e
- Medicus de rebus vulgo no-
tis tractat 9.a
- Medicis non vtentes sanari
posse 5.a
- Medici fama multi, re pauci
3.c
- Medici personati Ibidem.
- Medicus malus qd agat 22.c
- Medici nauium rectoribus
comparantur 10.e
- Medici alimentum salubre
excogitauerunt 9.e
- Medicorum quorundam opi-
nio 24.b
- Medicamentorum vires & a-
ctio 81.c. 191.c
- Medicamentorum modus
324.b
- Medicamenta pro natura cu-
iusque danda 98.e
- Medicamenta ad cōceptum
295.a de f. 266.a. 272.c
- Medicamenta cōceptum re-
parantia 302.f
- Medicamentum cōtra abor-
tum 55.d
- Medicamenta valentia mor-
bis acutis, debilia mitiori-
bus exhibenda 81.d
- Medicamenta valētia ad vl-
cera 500.d e f
- Medicamenta, cruda adhuc
materia quæ noceāt 88.d
- Medicamenta non adhiben-
da 79.b
- Medicamenta danda Ibidem.
- Medicamentis quæ nā & quan-
do mouēda 509.d e. 512.d
- Medicamenta nulla quando
adhibenda 509.d
- Medicamēta quibus non ex-
hibenda 532.d
- Medicamentum in repletio-
ne reicitur 121.d
- Medicamenta purgantia &
sistentia non satis sunt ad
conualescentiam 5.d
- Medicandum perperam non
esse 145.e
- Medicamenta sine fortuna,
sed meli⁹ cū ea sanāt 82.a
- Medicamētum tetragonum
220.f
- Medicamentum sanguinem
sistens 395.b
- Medulla ossis alimētū 130.d
- Medulla spinæ, improprie
medulla 45.a
- Medulla spinæ cur resiccetur
208.c d
- Medullæ spinæ affecta signa
418.e
- Mel 113.b. 202.c
- Mel Atticum 223.b
- Mel semicoctum 82.f
- Melancholici & comitiales
communicant 362.d
- Melancholicum cacoēthes
408.c
- Melidia graui morbo libera-
ta 319.f
- Melissus 24.b
- Melos insula 346.b
- Membra adnascencia 51.b
- Membrorum confirmatio
104.d

Membro

Index.

- Membrorum origo 71.a b
 Membrana tunica 44.e f
 Mens hominis obscura 102.f
 Mens quando non fallitur 399.b
 Mentis situs 62.c
 Mente valere in morbis, bonum 510.d
 Menses cur à natura inuenti 302.f
 Menses quādo pauciores qđ agendum 235.a.301.f
 Menses quos morbos extrudant 440.c
 Menses mali qui 439.c
 Menses educentia 515.c
 Menses quibus diu permaneant 354.c
 Mēses diutius quā quatuor diebus fluētes, malū 245.f
 Mēses diutius suppressi quos morbos excitent 243.e
 Menses sex mensibus retenti incurabiles 243.f
 Mēsiū varius affect⁹ 244.a b
 Menses cum in pudendum non procedant Ibidem.c
 Mensium modus & qualitas 245.f
 Mensibus septem annis suppressis qđ euenerit 343.a
 Mensium biliosorum signa 246.c
 Mensium pituitosorum effectus 247.a
 Mensium plus iusto fluentiū curatio 306.a d e
 Mensium prouocatio 264.a
 Mensium purgatoria 241.c
 Mensium suppressorum curatio 238.a f.239.a.244.c 229.a b
 Mēsiū defectu mortua 262.e
 Mēsiū cognitio 271.b.247.d
 Menstrua diutius retinentibus quæ ægritudines contingant 36.c d
 Menstruarum purgationum circuitus est 325.e
 Menstruorū in iunioribus & senioribus differentia 83.a
 Mentha 113.d
 Meretrices quæ docuerunt 48.a
 Mespila 114.a
 Mesocolon 66.d
 Meton vehementi febre correptus 318.b
 Milium quid sistat 321.e
 Milium alit 111.c
 Militarium vlcerum curatio 18.c
 Ministri quales ægrotis dandi 21.a
 Mira & brevis tum humorū tum partiū animalis enumeratione 129.c
 Missio sanguinis vbi & quando facienda 17.c d
 Missiones in hoīe bonæ 14.d
 Modicis impleri & pluribus vacuari quī contingat 115.a
 Molæ in vtero generatio & expulsio 292.a
 Mollæ cōceptus causa, signa accuratio 307.b c.363.c d
 Mollitoria 267.b
 Mollit

Index.

- Mollitoria vteri varia 296.c
Μυοαρία 115.e.200.b
 Moræ 113.f
 Morbus typhos dictus cum
 causis ac curatione 218.a
 b.219.a
 Morbus biliosus 223.c
 Morbus sanguineus. Ibidē.d
 Morbus liuidus & curatio
 170.e
 Morbus ructosus eiúsq; cu-
 ratio 170.f
 Morbus pituitosus eiúsq; cu-
 ratio 171.b.223.c
 Morbus magnus, à renū mor-
 bo 210.a
 Morbus crassus sex annos ve-
 xat 222.c
 Morbus locellorum 225.d
 Morbos ex abortu dolorem
 vicinis vteri partibus com-
 municans 225.d
 Morbus regius 338.d.313.c.
 373.d.396.e.398.a.400.c
 Morbus regius acutus eiúsq;
 curatio 175.a.180.a.198.e
 Morbos æstiuos hyems succe-
 dens soluit 337.e
 Morbos latentes opinio po-
 ti⁹ quàm ars iudicat 94.c
 Morbus imaginationis 64.d
 Morbus à venis ortus 62.c
 Morbus niger eiúsque cura-
 tio 172.a.b.c
 Morbus stercoris vomitū fa-
 ciens 123.f
 Morbus corruptorius eiúsq;
 curatio 172.d
 Morbus aliquo modo affinis,
 bonum 510.d
 Morbus quando debiliior &
 quando fortior 510.e
 Morbus sacer quibus diis tri-
 buatur 138.c.d.e.143.c
 Morbus sacer sanabilis 138.f
 Morbus desiccatorius & cu-
 ratio 170.b
 Morbos iudicare quid 194.b
 Morbi laterum causa & cu-
 ratio Ibidem.a.f
 Morbi pituitosi causa & cu-
 ratio 211.d
 Morbi crassi & hydropis ea-
 dem est curatio 222.e
 Morbi estate vexantes eorū-
 que curatio 195.a.c
 Morbi hepatici causa, signa
 ac curatio 213.f.214.
 a.b.d.e.215.b
 Morbi varij 332.e
 Morbi æstiuī & autumnales
 310.e.311.c
 Morbi lethales 228.b.c
 Morbi qui ante pubertatem
 non fiunt 439.b
 Morbi natura 327.e
 Morbi popularis cura 27.b.c
 Morbi ex mensibus suppres-
 sis 439.e
 Morbi post canem sydus qui
 363.a.b.364.365.&c.
 Morbi à spiritu fiunt 95.b
 Morbi.ii.à pituita cum cura-
 tione 199.a
 Morbi cur obsecuri 7.b
 Morbi obsecuri multi, mani-
 festi pauci 6.e
 Morbi ex ptu curatio 284.a
 Morbi

Index.

- Morbi paulatim accedunt 100.c
 Morbi cuiusq; vterorum se-
 datio 298.a
 Morbi vernaculi 84.c
 Morbi acuti vnde 399.d
 Morbi lethales 151.d.144.c
 Morbi ex abortu causa & cu-
 ratio 259.f.260.d
 Morbi comitialis diuersi af-
 fectus 139.f
 Morbi ex repletionem curatio
 & cōtra.510.b.120.f.122.b
 Morbi à capite orti 156.b
 Morbi partium anni 135.e
 Morbi mutilantes 144.d
 Morbi longi Ibidem.e
 Morbi citò decernētes Ibid.
 Morbi in alios transeuntes
 Ibidem.
 Morbi necessario ex aliis su-
 peruenientes Ibidem.f
 Morbi acuti qui 379.c
 Morbi connutriti curatio
 358.d
 Morbi dubij 144.d
 Morbi ab hepate & splene
 321.d
 Morbi diebus imparibus iu-
 dicantur 180.d
 Morborū causa.186.e.187.f.
 24.f.26.f.135.d.144.b.
 193.a
 Morbi vnius signa septē Ibi.
 Morborum tria principia
 187.a
 Morborum quinq; crassorū
 causa & curationes.221.a
 b.f.222.a d
 Morborum acutorum natu-
 ra 195.a
 Morborum causa aer & vi-
 ctus ratio 27.a
 Morborū ex victus ratione
 curatio 393.c
 Morborum diuersi effectus
 338.b.340.b
 Morborum omniū commu-
 nes solutiones 393.a
 Morborum vteri ferè omniū
 curatio 283.e
 Morborū cognitio & obser-
 uatio varia 315.c.197.c
 Morborum modi 135.c
 Morborum effectus diuersi
 130.f
 Morborum omniū idem mo-
 dus 94.e
 Morborū duo genera 534.a
 Morborum natura medicus
 358.c
 Morborum decreta 185.c
 Mores fieri 84.c
 Moribūdīs in Perintho quæ
 acciderent 324.b
 Mori appetentium curatio
 79.f
 Morituri & futuri supstitēs
 quibus noscantur 408.e.f
 Morituri ex vulnerato capi-
 te signa 449.c
 Mors Hippocratis 1.f
 Mors quo tempore accadat
 327.e
 Mors vnde contingat 51.a
 Mortis signum 409.c.418.c
 Morum diuersa ratio in Eu-
 ropæis atque Asianis 92.f.
 93.2

93. a
Mucus à natura 73. d
Muliebris menstrui causa
243. c
Mulier vterum gerens cur à
mensibus non doleat 36. a
Mulier præter naturam pin-
guis non concipit 55. d
Mulier quæ prægnans fiat
239. e. 241. a
Mulier cur sit viro calidior
243. c
Mulier ab vtero quo modo
stranguletur 246. b. c
Mulier concipere solita cur
non concipiat 304. d
Mulier bimestrem aut gran-
diorem foetum cur perdat
55. d
Mulier lienosa 356. c
Mulier Larissa decimo men-
se abortit 346. c
Mulier concipere cupiens
349. f
Mulieris non concipientis
purgatio 241. d. 305. a. 247.
c. 250. a
Mulieris à partu non purga-
ta curatio 227. b
Mulieris corpore malè habè-
re menses pauciores fluunt
246. e
Mulieris cibum, ob vteri do-
lorem, auersantis curatio
237. c
Mulieris semen retinētis sed
non concipientis curatio
308. d
Mulieris inuita abortum fa-
cientis curatio 308. f
Mulieris quæ diu non conce-
pit, curatio 237. d
Mulieris præ obesitate non
cōcipientis curatio 303. d. f
305. f
Mulieris decumbentis in lit-
tore historia 319. d
Mulieris apud Tisamenū de-
cumbentis historia 330. f
Mulieris à morbo vteri ob-
mutescantis curatio 287. b
Mulieri post viri cōgressum
quid agendum 248. b
Mulieri semen non cōtinen-
ti quid agendum Ibid. d
Mulieres rariore carne & te-
neriore quàm viri 243. a
Mulieres cur steriles fiāt 301.
b. d. 303. c. 226. f. cur nō con-
cipiant Ibid. b. f
Mulieres crassæ cur non con-
cipiant 229. d
Mulieres etiam hydropem
patiuntur 192. d
Mulieres quæ grauius è mē-
sibus ægrotent 242. e
Mulieres à vatibus deceptæ
quid Dianæ consecrarent
225. a
Mulieres quæ paterentur
313. e
Mulieres in conceptu errant
49. e
Mulieres, quæ longius quàm
decem menses vterum ge-
stasse visæ sunt, falluntur
42. d
Mulieres nihil aut parum la-
ctis

Etis habentes 43.a
 Mulieres vterū nō gerētes à
 sup̄p̄sis mēlib⁹ dolēt 36.b
 Mulieres menstruis carentes
 non concipiunt ibidem.
 Mulieres plus vel minus in
 partu laborantes 37.b
 Mulieres cur falsò se vterum
 gerere credant 280.e
 Mulierū diuersæ naturæ, tū
 à coloribus, tum ab ætati-
 bus petiæ 225.c
 Mulierum affectus 360.b
 Mulierum victus ratio 30.e
 11.a.c
 Mulierū diuersi morbi 341.e
 Mulierum trium ægrotan-
 tium historia 331.a.b.c
 Mulierum fœcunditatis co-
 gnitio 420.c
 Mulierū Scythicarū formæ
 fluxæ 91.e
 Mulierib⁹ iudicio p̄ditis de
 parrub⁹ fides habēda 49.d
 Mulieribus omniū morborū
 causæ vteri 82.b
 Multi valetudinarij nascun-
 tur 52.c
 Multi etiam imprudentes in
 medicinam incidunt 5.a
 Multi priore cibo perierunt
 9.d
 Multa ex vno quo modo gi-
 gnantur 39.e
 Mundi imitatio 102.c
 Musculi solidiores 130.c
 Musica 103.c
 Mustum 113.a
 Mutatio ciborū quī fieri de-
 beat 382.c.383.
 Mutatio subita & magna pe-
 riculosa 383.b.384.f
 Mutationes locorū ac victus
 morbos gignunt 52.e
 Mutationes locorum, varios
 homines procreāt 93.b.c
 Mutationes mentem excitāt
 90.b
 Mutatiōes quæ cauēdæ 357.a
 Mutationes tēporis & aeris
 morbos pariunt 511.b
 Mutationes temporum ob-
 seruandæ 88.d
 Mutationes temporum mor-
 bos pariunt 136.a
 Mutus cur fiat qui comitali
 morbo corripitur. 130.f
 Muti vnde 47.e
 Mutili à natiuitate curabi-
 les 491.d
 Myli ægri historia 313.d
 N
 Nares repletæ nihile mū-
 gentes 120.c
 Nares humidæ habētes qua-
 les sint 359.d
 Narium qualitas 71.e
 Nasi fracti curatio 478.f
 479.b
 Nasturcium 113.c
 Natationes somniare quid
 velit 127.d
 Natura facienda demon-
 strāt. 8.a
 Natura repugnante omnia
 irrita fiunt 3.d
 Natura calidior quantum à
 cæteris variet 108.a
 D D Natu

Natura in omnib ⁹ dux	19.c	Nervorum qualitas	72.c
Natura ossium, nervorum, venarum, carnis & alio- rum humorum, qu ⁱ co- gnoscatur	359.e	Nexus qua parte procedat	451.d
Naturæ humanæ descriptio	533.b	Nicodemi Abderitani histo- ria	336.a.b
Naturæ actio	7.f	Nihil temerè iudicadū	355.e
Naturæ conatus & vis	103.b	Nocumentum nullum à me dico bono, aut ab arte me- dica oritur	5.d
Naturæ & morbi quib ⁹ aque in potu salubres	86.a	Nomæ, lethalissimæ	417.f
Naturæ diuersæ ignis & a- quæ varia temperatura fi- unt	107.c	Nomina artibus ex specie- bus imposita	4.d
Naturæ variæ variis sensib ⁹ percipiuntur	107.c.d	Nomina lege naturæ indita	4.e
Naturæ calidioris victus ra- tio	107.f.108.b	Non eadem via seminis & vrinæ	31.f
Naturæ diuersæ victus	107.f.108.a	Nosse morbos & curare eius- dem est scientiæ	7.c
Naturæ quæ nulla cura aut victu mutantur	108.c	Notæ ex collo & faucibus	430.e
Naturæ fastidium	7.d	Notæ ex præcordiis & vêtre	431.a.b.d
Naturæ modum excedēs ni- hil bonum	509.e	Notæ ex lumbis	432.a
Naturarum cognitio	106.c	Notæ ex sanguinis eruptio- ne	Ibidem.d
Nebri qui dicantur	536.b	Notæ ex dentibus	429.f
Nebula quid	40.f	Notæ ex maxillis, labiis, gin- guis, sputis & secretioni- bus	430.e
Necessaria medico futuro	3.d	Notæ ex voce	Ibidem.b
Nervus torpidus	66.c	Notæ ex dysenteria	437.c
Nervi quomodo facti	44.d	Notæ ex vrina	441.a
Nervi ubi non sunt	72.d	Notæ ex sputo	434.e.435.f
Nervi à cerebro	68.c	Notæ ex prægnatib ⁹	439.d.e
Nervi non lædendi	473.c	Notæ ex variis affectibus	436.a.b.438.d
Nervi cur dolore minus affi- gantur	15.f	Notæ ex puris mixtiōe	415.c
Nervorum generatio	46.b	Notæ ex lethargo	426.e
Nervorū distributio	326.c.d	Notæ ex verrigine	421.f
		Notæ	

Index.

- Notæ ex oculo rupto & pro
minente 417.c
- Notæ ex doloribus aurium
428.c.d.f
- Notæ ex morbo regio 428.e
- Nota vberioris alimenti
509.f
- Notæ ex hydrope, tabe, poda
gra & morbo sacro 415.d.
416.d.e.f
- Nuces 114.c
- Nuclei 114.b
- Nyctalops qui curetur 507.f
422.a.359.f
- Nyctalopica affectiones in
pueris 360.b
- O
- Obesorum victus ratio
29.f
- Oblivio malum 409.d
- Oblivio & nocturna vocife-
ratio vnde 142.d
- Oblivio dysenterici quæ
374.a
- Oblivionis causa 531.c
- Obseruanda in ægris 343.d
324.b
- Obseruanda medico in mor-
bis dignoscendis 531.a.b
- Obseruanda, ac cauenda cir-
ca victus rationem 394.e
381.e
- Obseruanda circa vlcera tra-
ctanda 417.a
- Obseruatio varia 414.b
- Obseruatio variorum peru-
tilis 133.f. 34.a.b
- Obseruatio præcipua in ocu-
lorum lippitudine 419.f
- Obseruatio in Typho mor-
bo 218.e
- Obseruationes morborum
26.f
- Obseruationes præcipuæ
414.e
- Obseruatione digna 99.f
100.a
- Obseruationis modus ad præ-
dictionem 414.c.d
- Obsonium in renum morbis
209.f
- Obsonia ex variis intritis
præparata 115.b
- Occasiones tēporum 144.f
21.c
- Occasiones morborum con-
sideranda 357.b
- Occasiones curandi tempe-
stiuæ 145.b
- Intempestiuæ. Ibidem.c
- Ochri siue phasioli 111.b
- Octimestris partus 48.c
- Octimestres non superstites
manent 49.e
- Octimestria & trimestria
cur non viuunt 51.e. 2.a
- Oculus totius corporis tem-
peraturæ index 358.b
- Oculi confractio mala 410.a
- Oculi corrupti qualitas & cu-
ratio 507.c
- Oculi humor 47.d
- Oculi fulgentes 75.e
- Oculi situs & vtilitas 531.b
- Oculi distortio malū 409.d
40.b
- Oculorū doloris curat. 517.c
- Oculorū consideratio 429.c

Index.

- Oculorum medelæ 395.e
 Oculorum fluxiones 355.f
 Oculorum fluxionis in nares
 auersio optima 373.f
 Oculorum signa 354.f.e
 Oculorū sordes siccae 419.a
 Oculorum tumor Ibid.b
 Oculorū notæ 399.d.401.d
 Oculorum tumor 75.c
 Oculorum remedium 130.e
 Oculorum tres tunicae 71.e
 Oculis nullum pharmacum
 adhibendum 75.c
 Oculis potius quàm opinio-
 nibus credendum 100.f
 Oculis incōmodi cibi 373.f
 Ocymum 113.d.202.a
 Olera 201.f
 Oleum & oleosa 202.c
 Oleū Aegyptiū album 229.f
 Oleum quibus vlceribus in-
 utile sit 499.c
 Olerum quoddam bonum
 396.b
 Olfactus causa 47.b.71.e
 Olfactum malè afficientia
 133.f
 Omentum quando putrescat
 144.f
 Omne vnum est Ibid.a
 Omne incōcretū cauum 6.f
 Omnes doloris causæ ad idē
 referuntur 10.b
 Omnia terræ nascentia suæ
 terræ naturā sequuntur 93.f
 Omnis attenuatio laxat ac
 corrugat cutem, renutri-
 tio contra 357.a
 ὀφθαλμία 64.d.311.e
 Opifex, naturæ vel artis in-
 strumentis utitur 6.b
 Opinio in medicīna perni-
 ciosa 19.d
 Opisthotonos eiūsq; curatio
 175.c.d.400.a.224.a
 Oratio Hippocratis ad aram
 consistentis 534.e
 Oratio legati ad Athenien-
 ses 535.b
 Ordei facultas 110.b
 Ordeum Achileum 179.d
 Odeum torrefactum Ibid.f
 Origanum 113.e
 Origo venarum & arteriarū
 129.e
 Oris malè olentis purgatio
 292.e
 Oris vteri plus quàm in men-
 sibus hiātis curatio 289.f
 Oris vteri inflammati cura-
 tio 282.c.283.a
 Oris vteri semen præ duritia
 non suscipientis curatio
 288.b.c
 Oris vterorum occlusi cura-
 tio 235.f.289.c.307.f
 Oris vteri humidi curatio
 229.e
 Os vteri siue vuluæ conclu-
 sum 243.c.d
 Oris vteri vlcerati curatio
 237.f.239.b
 Os capitis duplex 444.d
 Os capitis tenuissimū quod
 Ibidem.e
 Os eminens quando præsecā-
 dum 460.d
 Os femoris quàm periculo-
 sum

Index.

sum	492.f	Palæstra & Pædotriba	104.a
Os intro cedit multis modis	445.e	Pallidorum curatio	80.c.d.e
Os quæ patiatur	46.d	Palpebrarum curatio	507.f
Os sacrum	65.f.326.d	Palpebrarum ficus	332.e
Os tibiæ eminens	492.e	Panacea	2.d
Osculi vteri aliò inclinati cu	d80.d	Panificia varia	9.d.103.e
ratio	44.f	Panis varietas	110.f
Ossa quæ fiant	44.d	Panis differētia	12.a.b.201.c
Ossa vnde	456.c	Panis calidus sitim, & alia in	283.c.111.b
Ossa quare à propriis locis	449.a	ducit	111.d.114.b
discedant	Ibid.b	Papauer	47.c.d
Ossa rupta minus periculosa	65.e. & 66.c	Pupilla qualis	33.f
quæ	448.b.c	παράδωμα à cucumere	180.c
Ossa puerorū qualia	326.f	παράδωμα à rosa & allio	
Ossa digitorū, manus, pedis	462.c	Paracynanche eiusque cura	
& articularū	449.d	tio	174.f
Ossis maioris abscessus	38.a	Partheniū microphilū	501.b
Ossis rupturā ambiguum co	68.d	Parij ægri historia	333.e.f
gnoscendi ratio	43.c	Pariunt statuto tempore pe	
Ossis capitis confracti cura	48.c.e	cora	43.c
tio	43.f	Pars robustissima cur in coi	
Ossis simplex fractura	53.a	tu secernatur	31.f
Ossis suppurati signa	101.d.e.f	Partes mensis aliquot	
Ossium cautorum actio	195.b	Partes singulæ quæ nutrian	
Ossiū, neruorū, carnis, cutis	43.c	tur	
& venarum in corpore v	48.c.e	Partium internarum feruor.	
fus	325.f		
Ossium fractorū & eminen	346.c	Partus qualis	
tium curatio	33.c	Partus septimestris	
Ossium coactio	322.e	Partus gemellorum	
Oscitationum assiduarum	225.f	Partus quo morbo liberet	
curatio	346.c		
Oues & capræ comitiales	33.c	Partus cū vlcere in coxa no	
141.c	32.b	no mense editus	
Ouorum facultas	30.a	Partus cur non omnes robu	
Oui candidum		sti edantur	
P		Partus quādo piclicant	
Alati fluxio		Part' macillēti ac tenuēs	

Index.

Partus septimo mense quid agat 49.b	curatio 457.e
Partus quo pacto educat 53.e	Pedum tumor 502.e
Partus quomodo edantur 53.e	Pedum calor febris solutio nem denotat 389.e
Partus mortuus quo pacto e- duceretur 53.f. 58.e	Pedum frigiditas febrium accessum significat 389.e
Partus varia similitudo 33.d	Pedum torporem quid discu- tiat 224.f
Partus acceleratio 43.b	Pedibus manibusq; distētus actort' curatur 79.f. 80.a
Partus retinēdi curatio 250.b	Pellicula spumosa 68.f
Partus difficultas qui tolla- tur 253.a.b	Pellicula ab aere præfrigido superinducitur 46.b
Partus appropinquantis si- gna 252.f	Pellium tinctorum 103.e
Partus difficultas unde 252.d 84.e	Penicilli plūbei præparatio & vsus 281.c. 282.a. 304.a
Partus frustulatim extractio 58.e	Percussus in palpebrā sine o- culi læsione sanatus 350.c
Partus directio 59.a	Perdiccas rex phthiſicus cre- ditus 1.c
Partus conceptio 102.a	Perforationis modus quis 449.f
Partum accelerātia 266.b.c	Perfrigeratio malū 409.d.f
Partum iuuantia 265.c	Periclis Abderitani hīstoria 335.b
Patella 65.f	Periculū mortis in prægnan- te 252.a
πατella 15.b	Perinthus 320.d. 323.d. 4.f
Puris in vtero semen corru- pentis purgatio 304.d.e	Peripneumonia qui fiat 152. b.d. 179.d
Pecora prægnantia à potu & cibo pinguiora fiunt 39.b	Peripneumonia & eius cura tio 163.f. 64.b. 176.a. 193. f. 194.b. 392.d
Pectoris dorsive disruptio 207.b	Peripneumonia qui suffocet 153.f
Pecten 69.d	Peripneumonia quid faciat 400.d
Pectinis præ fluxu dolentis curatio 29.a	Peripneumoniacæ affectio- nes 391.a
Pectus 66.b	Perip
Pectus in dorsum ruptum & curatio 169.c	
Pedis cum manu collatio 457.e	
Pedis & ossiū eius fractorū	

Index.

- Peripneumoniæ causse 194.
cf
Peripneumoniæ & pleuriti-
dis signa 435.b
Peripneumoniæ & pleuriti-
dis differentia 75.ef
Pernicies fœminarum 409.f
Pernionum curatio 373.f
Perpendenda in luxationi-
bus 471.d e
Persarum bellũ contra Græ-
cos 526.f
Pestilentia obsidentium sum-
ma 535.f
Petenda in vulneribus capi-
tis 418.a
Petenda à diuturnas fluxio-
nes patientibus 421.b
Phagedænosus puer quæ pas-
sus sit 319.f
Phanocritus 315.a
Pharmacum daturus quid
prius agat 98.ef
Pharmacum quid agat 25.e
Pharmacũ post dolores dan-
dum 261.a
Pharmaca fortuna reperta
200.c
Pharmaca cautius exhiben-
da 198.f
Pharmagoræ ægri historia
313.c
Phasianorum descriptio 89.f
Phasis incolæ 89.e
Phasis qui fluat Ibidem.f
Pherecydis ægri historia
374.e
Φηγυα λεινόν 196.b c
Philistis in Thaso ægri histo-
ria 329.f
Philini vxoris puerperæ Tha-
sæ mors 317.a b c
Philisci ægri historia 313. e.
314.f. 316.c
Philonis filia cur mortua
314.d
Phreneticus moritur 334.f
Phrenetici signa 408.c
Phrenetici qui pereant 153.f
Phrenitis qui fiat 153.c
Phrenitidis solutio 398. c.
408.b
Phrenitides cum curatione
174.d. 193.f. 194.c f
Phthisis 64.f
Φυμα 63.a
Physicus hominis habitum
acrobur considerat 306.f
Phylam Alexandri pellicem
Perdiccas deperibat 1.d
Physiognomia 326.e
Pilarum vsus in fracturis
464.f
Pinguedo conceptum impe-
diens, quomodo curanda
sit 56.f
Pinguis signa 321.e
Piper dentes iuuat 359.e
Pira 114.a
Pisa infant 111.b
Pisces, edulium leue 201.f
Pisces erronei 112.b
Pisces grauiiores & leuio-
res Ibidem.b c
Pisces salsi Ibidem.c
Piscium facultates Ibid.a b
Pittacus 321.c
Pituita eiusque curatio 110.e
DD 4 Pis

Pituita cur hyeme augeatur	25.f	borandum hyeme	119.b
Pituita alba eiusque curatio	171.d.398.e	Pluuia clemens visa in somno quid significet	126.e
Pituitæ ex ore ac naribus fluentis signa	253.e	Pneumonis siue pneumoniæ eiusque curatio	204.d
Pituitæeductio	300.a	Pneumonix causa	205.b
Pituitæ vires	181.f	Podagra	198.d
Pituitosæ ac biliosæ mulieris purgatio	289.a	Podagra qui laborent & quando fiat	517.c. 517.f
Pituitosi & biliosi furores quales sint	142.c	Podagræ curatio & signa ex eadem	416.d
Pituitosi in ediam facilius ferunt	383.a	Podagræ medela	299.b
Planta spiritum habet	39.f	Podagrici morbi	397.c
Pleiades	88.d.310.b	Pœna quæ malis medicis irrogatur	3.c
Pleiadum occasus	339.b.e. 340.c	Polenta ex ordeo	201.c
Pleiadum ortus	118.d	Polentæ recentes	111.b
Pleiadum occasus	Ibidem.b	Polypus cum curatione	161. b c d e f.193.e
Plenitudinis signa	120.d. 121.a	Poma	113.f.118.e
Plenitudinis curatio	120.d e. 121.b c f.122.b 125.e	Porcinæ carnis vires	394.a
Pleuritis quæ fiat	152.b c	Porrum	113.b.202.a
Pleuritis quando enecat	159.f	Portulaca	113.d
Pleuritis ex dorso eiusque curatio	177.c d e	Positio partis vulneratæ qualis	452.f
Pleuritis sanguinea & eius curatio	178.b	Postrema in morbis qualia	314.b
Pleuritis sicca, & eius curatio	77.f.78.a	Post canem febres quales	351.f
Pleuritis & eius curatio	163. b c d.177.a.193.f	Post purgationem exhibenda	199.f
Pleuritides sicca & biliosa	177.b	Post partum quæ eueniant	256.c d
Plus quiescendum quam laborandum hyeme	150.a	Potestas mala res	539.b
		Potio ad fluxum rubrum	293.c
		Potio ad omnes morbos ab vteris ortos	Ibidem.d
		Potio ad fluxum album	295.a

295.2
 Potiones mensium & secundarum purgatoria 271.f.
 272.a
 Potiones refrigerantes in febre ardenti 119.c d e f
 Potiones in promptu habenda. 20.c
 Potus via 66.d
 Potus in pulmonem non deuenit 191.b
 Potissimum in fracturis curandis 464.a. 462.e.
 463.b
 Prandium 115.f
 Præcautio ad conuulsionem 30.e
 Præcisa, quæ non coalescant 146.c
 Præcognitio & cognitio quid 120.c
 Præcordiorum inflammatio nes vnde 388.c
 Præcordiorum dolor 410.b
 Præcordiorum tumores 397.b
 Præcordiorum notæ 402. c d
 Prædicendum nihil quando 414.b
 Prædicendum quid sit medico 413.c
 Prædicendum prudenter 413.e
 Prædictio ex hæmorrhoidibus Ibidem.d
 Prædictionis modi qui derideantur Ibidem.a
 Prædictiones ex potu & cibo immodico 414.a c
 Prædictiones exemplis confirmantur 413.d
 Prædictiones ex stercore 415.a b
 Prædictiones ex lippitudinis signis 419.e
 Prægnans non vtens coitu, facilius parit 54.e
 Prægnans vnde moriatur 228.a
 Prægnans quæ cognoscatur 240.c
 Prægnans cur sit pallida 252.e
 Prægnantis lienosæ affectus Ibidem.b
 Prægnantis varia signa 302.e d. 54.f. 55.c
 Prægnantis fœtum menstruum gestantis curatio 229.c d
 Prægnantes quando purganda 512.d. 515.c d. 516.a b
 Prægnantium morbi 250.e f. 251.c
 Prægnantibus terram vel carbores edentibus quid eueniat 54.f. 55.a
 Præmium medico constituendum 21.f. 22.a
 Prænotio futurorum quæ pareretur 83.d e
 Præsentia bona & mala ex insomniis 125.c
 Præsentia ex temporum qualitate 87.e f. 88.a b c
 Primiparæ magis in partu laborant 43.d
 Primus dies in ægro obseruand

uandus	390.e	Pudendi puerperæ obturati	
Principium alimenti	129.e	causæ & signa	255.e
Principium sanationis cur		Pudendi exulcerati curatio	
nullum	146.d		238.b f. 239.b. 240.c
Principia artis supponenda		Puellæ cur tardius confor-	
44.b		mentur	37.f
Priores artis medicæ taxan-		Puellæ à pueris qui diffe-	
tur	8.d	rant	50.f
Procreatio diuersa	104.f	Puer à mulo percussus	349.e
Priuatorum hominū victus		Puer in caput prius naturali-	
ratio in hyeme, vere, æsta-		ter procedit	42.c. 43.d
te, & autumnō	29.c d e	Pueri cur semen non emit-	
Produtionis & exacerbatio-		tant	32.b
nis morbi causæ	336.f	Pueri situs in vtero	41.f
Profluuium alui diuturnum		Pueri quid peculiare à natu-	
398.e		ra habeant	50.f
Profluuium alui	30.f. 197.d	Pueri liuidi ac mortui expul-	
Profluuium alui & vomitus		sio	268.f
quibus conferat	508.d	Pueri natura	327.d
Profluuij alui ex partu cura-		Pueri carnosī minus lactis su-	
tio	270.a	gunt	59.d
Prominentiæ capitis priore		Pueri sugentes simul & me-	
parte	444.c	ientes	Ibidem.e
Proprium medicæ artis	8.b	Pueri modò parui, modò ma-	
Prospicienda medico	83.b	gni nascuntur	33.f. 34.a
Prudens natura quātum pos-		Pueri cur mutilati nascantur	
sit	31.d e		34.a
Prudentis viri consideratio		Pueri sani & integri fere sem-	
31.c		per ex mutilis nascuntur	
Ptisana	179.e	Ibidem.b	
Ptisana integra	179.f	Puerorum hydropicorum cu-	
Ptisana quando exhibenda		ratio	77.f
380.c		Puerpera gemellarum Cy-	
Ptisane laus	Ibidem.b	zicena mortua	337.b
Ptisane succus	176.f	Puerperæ plus satis purgatae	
Ptisane conficiendæ ratio		signa	255.b e
380.e		Puerperæ recens enixæ cu-	
Ptisane incommoda	380.f	ratio	58.b e
Pubertatis causæ	38.c	Puerperæ diuersa purgatio	
			267.a

Index.

- 267.2
Puerperæ Cyzicenzæ histo-
ria 337.b
Puerperæ in Thaso decum-
bentis historia 334.b
Puerperæ in quæ mala facilè
intidant 242.e f
Puerperæ non purgatæ cura-
tio 254.c d
Puerperæ non satis purgatæ
affectus 254.f
Puerperæ à secunda non libe-
ratæ curatio 256.c
Puerperæ cum non bene pur-
gantur periculum 37.d
Puerperij purgationis men-
sura & color 261.e
Puerperij purgationes. 266.d
e. 253.e
Puerperij non purgati mala
253.f. 254.c. 255.b
Pulegium 180.b. 113.e
Pulmo. 45.e. 60.d. 129.e
Pulmo cordis calorem mode-
ratur 61.e
Pulmo cor humectat 61.b
Pulmo tumens præ calore
cum curatione 174.a
Pulmo consumitur 64.f
Pulmo cum nihil plenus ex-
purgat, malum 404.c
Pulmo repletus & curatio
168.c
Pulmo ad latus prolapsus
cum curatione 168.d
Pulmonis arteria exulcerata
venæ rupta 203.a b
Pulmonis morbus & cura-
tio 166.d
Pulmonis suppurati signa
176.c
Pulmonis inflammatio 205.
c d
Pulmonis hydrops & eius cu-
ratio 169.a
Pulmonis & arteriarum di-
uersitas 151.a
Pulmonis tuberculum 149.a
Pulmonis tuberculum qui sa-
netur Ibidem b c
Pulmonis erysipelas, eiusque
curatio 205.f
Pulsus venarum 327.f
Pulsus & respiratio, signa sa-
nitatis & morbi 110.c
Pulsus circa tempora 96.c
Pura omnia à deo dari quare
per somnū videntur 126.e
Purgatio puerperæ in caput
progressa quid efficiat
251.e
Purgatio in faciem progres-
sa Ibidem.f
Purgatio qua parte ducen-
da 509 d
Purgatio sursum aut deor-
sum quando fiat 512.f
Purgatio ventris quibus vice-
ribus prosit 495.e
Purgationem quid præcede-
re oporteat 502.f
Purgationes quot diebus
fiant 37.f
Purgationes menstruæ mul-
te unde fiant 245.d
Purgationes diuersæ 271.f
Purgationes quomodo æsti-
manda 509.d e
Purg

Index.

- Purgatorium molle aquam
& pituitam ducens 242.c
Purgatorium ad multa
271.c d
Purgatorium molliens 241.e
242.c
Purgatorium tepidum 242.f
Pus è pectore sectione vel
vstione educitur 204.f
Pus collectum quid faciat
76.c
Pus quì fiat 499.a
Pus ex tumore interiore quì
educatur. 164.e
Pus vlceris alimentum 130.d
Pus optimum quale 402.f
Puris emissio 206.f
Pustulæ ex lassitudinibus
340.f
Pustulæ totius corporis vnde
227.f
Pustulæ latæ 355.e
Pythicum templum 535.d
Pythionis ægri historia 328.
d e 334.d
- Q
- Q**ua cura Hippocrates
Græciam à pestilen-
tia liberauit 1.e
Quæ aduersa vel secūda for-
tuna fiant 82.a
Quæ ægrè ac facilè pariant
53.d
Quæ congelent 115.f
Quæ attenuètur & colliquè-
tur in hydropico 192.a
Quædam citius, quædam po-
sterius pariunt 43.e
Quædam opifici, quædam o-
peribus imputanda 6.d
Quæ ex terra gignūtur quo-
modo crescant 39.d
Quæ ex rupe ceciderat sup-
stes mansit 350.e
Quæ generātur & pereunt,
commiscentur & discer-
nuntur 100.f. 101. a b c
Quæ fœtum expellant
267.e.f
Quæ fœtum perdere cona-
batur, mortua est 359.e
Quæ mulieres facilius sup-
pressos menses ferant
242.f
Quæ præstare debeat medi-
cus 2.f
Quæ prius conformentur
51.f
Quæ prospicienda medico
12.b. 15.a
Quæ recidiuas faciant 320.e
Quæ sint morborum princi-
pia 180.d
Quæ sint in natura hominis
24.f
Quæ superfœtant 53.e
Quæ vulnera poscant 17.a
Qualis panis & maza 12.d
Qualitates fortissimæ 12.e
Quando in partu matres fœ-
tūve pereunt 43.d
Quanto tempore brachium
fractum coalescat 457.c
Quantum ab omnibus cole-
retur Hippocrates 1.e f
Quare nōnulli ab aliis diffe-
rant

- rant 92.d
 Quare hoc calidū, illud con-
 tra putatur 12.f
 Quare morborum calor nō
 statim cessat 13.d
 Quartana quo tempore, &
 qua ætate grassetur 28.f
 Quartana à quibus immu-
 nes præster 359.b
 Quartanæ longæ, & breues
 quæ 510.b
 Quartanæ diurnæ 355.d
 Quartanæ erroneæ 311.d
 Quartanas diurnas potio
 soluens 532.d
 Quatenus medicina vitupe-
 retur 4.f
 Quatuor paria nervorum
 27.d
 Quibus diis supplicaretur
 126.f
 Quī calor, & frigus cōcipia-
 tur 13.b
 Qui causas morborū probe
 nouit, potest cōmoda ad-
 ferre remedia 94.c
 Qui cito moriantur 409.e
 Quicquid fit, finis alicuius
 gratia fit 5.d
 Quid patiantur, diu à cibis
 abstinentes 11.d
 Quid per niues gelūque iter
 facientibus accidat 13.c
 Quid spectarint primi medi-
 cinæ inuētores 12.b.c
 Quid primum obseruet me-
 dicus 16.e. 10. a b d. 21.f
 Quid oporteat medicos sci-
 re 14.d
 Quid sit homo & quomodo
 gignatur sciat medicus
 14.e
 Quies quibus conducatur 31.b
 Qui ex agris perirent in ma-
 gna morborum multitu-
 dine 314.e
 Qui humores singulis anni
 tēporibus augeſcant 26.a
 Quis error in agris 10.e
 Qui probè augeantur 52.d
 Qui sani diutius perseuerēt
 105.f
 Qui sine medicis à morbis
 conualescunt aliqua re sa-
 nantur 5.b
 Quòd diutius quàm decem
 mensibus non contingat
 vterum gestare 42.e
 Quo gestu inuisendus sit æ-
 ger. 16.d
 Quomodo omnia gignan-
 tur 24.e
 Quo pacto sua quisque ſons
 facultate trahat 183.c
 Quo plus cibi sumpsimus eo
 plus expetimus 183.d
 Quota inedia 48.b
 Quota ossium coalescentia
 130.b
 Quot morbos ex vteris fieri
 contingat 284.e
 Quoto tēpore pedis ossa fra-
 cta sanescant 457.f
 Quum partus non ritè pro-
 dit, quid agendum
 262.e
 Quum plus iusto comeditur
 quid agendum 202.d
 Radix

Index.

R

Radix humanorū mor-
borum caput 534.b
Raphanus 113.c
Rapum 113.e
Ratio cur de humano victu
scribat 99.c
Ratiocinatio 21.c
Recidiua quid portendat
427.2
Recidiuarum causa 509.f
Rectè & non rectè quæ fiant
145. c d e
Regij morbi quatuor cū si-
gnis & curationibus 216.e
217. a b f
Regio sterilis quales gignat
93.d
Regio montosa quales pro-
ferat 93.e
Regio alta quales producat
93.d
Regio pinguis quos gignat
93.e
Regiones insalubres 109.f
Regionum situs & natura
105.e f
Regionum inter se differen-
tiæ 89.b
Reiicitur à schola Hippocra-
tes falsa secta imbutus 23.f
Relicta post iudicationem
recidivas facere solent
324.f. 325.c
Remedia singulis exhiben-
da 78.c
Remedia secundas ac men-
ses educentia 230.c d. 237.
232. 233. 234

Remedia solū disciplina ac
natura inueniuntur 6.c
Remedium quibus tāquam
desperatis nullū adhibea-
tur 277.f
Renes 45.f. 60.c. 66.d
Renum affectus quibus sa-
nentur 361.b
Renum morbi quatuor 208.
e. 209. a b c
Repletionis mala 121.b
Repositio per scalam 470.f
Repositio optima 460.f
471.e
Responsio aduersus eos qui
mortuos medicis assignāt
5.e
Rigor lethalis 511.e
Rigor in morbis vnde 151.
d e
Rigoris causa 188.f
Rigoris ex partu aut abortu
curatio 238.c
Rigores vnde incipiant 356.
e. 325.c
Riphæi montes 91.a
Robur ac carnem producen-
tia 200.f
Robusti ex robustis cur non
generentur 3.e
Rumex 113.d
Ruptiones qui fiant 149.e f
Ruptura 79.f
Ruta 113.d

S

Sacer morbus 84.d e
Sacer morbus qui fiat
87.c e

Index.

- 97.c e
 Sacer morbus pituitosis acci-
 dit 138.f.139.c
 Sacer morb' cur nō diuinus
 sit. 138.a
 Sagitta percussus præter om-
 nem opinionem sanatus
 350.b
 Salaminus anchora vulnera-
 tus 349.e
 Salua suppressa & curatio
 159.f.160.a
 Salua 113. d
 Salutis & mortis causa
 185.f.198.b
 Sanguis in somno intro ma-
 gis fugit 358.f
 Sanguis ex naribus fluēs qui-
 bus proficit 359.d
 Sanguis albus ex glandulis
 erumpit 62.f
 Sanguis cur circa nervos cō-
 pingatur 245.c
 Sanguis quomodo mittēdus
 394.f
 Sanguis coagulatur 45.f
 Sanguis diutius in vtero re-
 tentus totum corpus affi-
 cit 36.b
 Sanguis prudentiam iuuat
 97.d
 Sanguis putris in pus conuer-
 titur 96.f
 Sanguis calidus natura non
 est 62.e
 Sanguis quomodo sistatur
 158.f
 Sanguis serosus in quibus fiat
 356.a
 Sanguis ex naribus quibus
 erumpat, & pueris quādo
 incipiat 356.f
 Sanguinis fluxio in vlceri-
 bus quid faciat 499.b
 Sanguinis effectus & vis
 97.e f
 Sanguinis & aliorum humo-
 rum varietas 129.f.130.b
 Sanguinis vomitus causa &
 curatio 270.a
 Sanguinis venarum suppress-
 siones quæ faciant 360.d e
 Sanguinis eruptionis malæ
 quæ 411.c d e
 Sanguinem ex partu vomen-
 tis curatio 237.d
 Sanguinem ex vteris fluen-
 tem sistencia 293.e
 Sanguinem ex naribus sisten-
 tia 253.e
 Sanitas quæ contingat 184.a
 Sanitas & mors vnde contin-
 gant 50.c
 Sanitatis exercitatio qualis
 38.a
 Sanitatis & mortis causa
 cui attribuatur 530.c.531.e
 Sanitati qui restituantur &
 qui non 422.d
 Sanitati conducentia 200.f
 Sanus quis 24.f
 Sapa 113.a
 Saperda 215.d
 Sapientia qualis describen-
 da 19.e f
 Sapientie author aēr 142.e
 Sapientie & desipientie caus-
 æ & signa 106.f
 Sapien

- Sapientissima anima & memoria valentissima prædicta 107.a
 Sapientum victus & exercitatio 107.b
 Sata quomodo nascantur 39.c
 Satyrus pollutione mortuus est 362.c
 Sauromatae 90.d
 Sauciati signa 447.a
 Scapulæ 66.b.72.f
 Scythia 15.b
 Scientia facile ac feliciter discitur 81.f
 Scientiæ votum ac opus 4.b
 Scientiæ & opinionis differentia 3.f
 Scretio phrenetici 408.b
 Scripturo de humano victu necessaria 99.e f
 Scymnus 315.a
 Scytharum gens fulua 91.e
 Scythia gens infœcunda 91.a
 Scythicum hominum genus 90.d
 Scythæ Nomades qui viuant 90.f
 Scytharum ditissimi potius quàm pauperes steriles cur efficiantur 92.c
 Scythæ minimè ad coitum valentes 92.e
 Scythiæ mulieres vnde steriles 91.f
 Scythæ Eunuchi muliebria officia subeuntes 92.a
 Secretio morbi causa 120.f
 Sectio 17.b
 Secundam quæ educant b.268.a b.515.f.54.a
 Secundæ relictæ causa 256.e f.
 Secundarum hærentium expulsiō 237.f.239.a c
 edes reli quid, & eius species 445.f
 Sedis procidentia 420.c
 Sedis procidentis varia curatio 505.a b
 Sedis ex partu laborantis curatio 257.b.270.a
 Segnities 115.e
 Semel cibum sumere in die quos & quando oporteat 30.f
 Semel cibum capere quando conducat 123.f
 Semen lini 179.a
 Semen cur spumescat 31.e
 Semen fauo simile 66.d
 Semē in vtero cum permanferit quid agat 34.e.35.b
 Semen masculum & foemineum in vtroq; inesse 33.a
 Semē in pellicula tanquam ouum continetur 35.d
 Semen genitale ab omnibus corporis partibus procedit 89.d
 Seminis, quod in vtero sex dies extiterat, forma 35.c d
 Seminis genitalis varietas diuersas efficit formas 92.f
 Seminis in vtero putrescētis curatio. 249.b
 Seminis statim post coitum fluentis

Index.

fluens causa & curatio 248.f	Siccum corpus citius humi- do agrotat & dolet 71.b
Seminis clandestinus fluxus 166.c	Sideratio 64.d
Semina ubi non nascantur 63.c	Sideratus morbus vel homo 155.c.159.d
Semina & plantæ cur contra riam habeant germinatio nem 40.a	Signa ab Erysipellate 406.f
Senes paucis fomitibus opus habent 505.c	Signa agrotantis 129.c
Seniores & iuniores à quib⁹ suppurationib⁹ magis mo- riantur 405.f	Signa bene curati & deligati 455.c.f
Seniorum & iuniorum affe- ctiones 150.f	Signa bonæ fidei 404.d. & malæ e.
Senum victus ratio 29.f	Signa breui morituri 397.f
Senum morbus & curatio 159.a	Signa ex angina 433.d.e
Sensus maximus circa thora- cem 70.e	Signa ex colore 421.f
Sensus humanus septem figu- ris contingit 104.a	Signa ex conuulsione 514.e
Sententiæ variæ de hominis natura 24.a	Signa ex decubitu 428.d.e
Septenarij annorum in cor- poribus prævalent 51.b	Signa ex distentione & sudo- re 433.d.440.f
Septimestres cur edantur 49.a	Signa ex doloribus circa ar- ticulos 423.b
Septimestres cur pauci super- stites maneat 49.b	Signa ex hæmorrhoidæ & cõ- uulsione 433.b.c
Septimestres alij plus, alij minus afficiuntur 49.b	Signa ex hydrope 437.a
Septum transversum 60.f 68.c	Signa ex lienteria 420.a eiusque curatio. b
Sermonis facultas 47.e	Signa ex lingua 408.b.429.e
Siccantia alimenta 200.a	Signa ex lippitudine 418.f
Siccitates multæ post fauo- nium 353.b	Signa ex morbis acutis 427. b.c
	Signa ex oculis 409.b
	Signa ex pallore 422.a
	Signa ex perfrigeratione 423.f
	Signa ex pleuritide 434.a
	Signa ex pupillarum colore 419.d
	Signa ex sanguinis mictione 415.c
	Signa ex soporosis affectio- nibus F E

Index.

nibus	428.a.b.c	Silphium vbi nascatur	181.b
Signa ex spiritu	430.d	Similago	111.a
Signa ex splene sano	422.c	Similitudo genituræ obser-	
Signa ex sputis varia	344.f	uanda	36.f
Signa ex tabe	436.e	Similitudinem iuuantia	
Signa ex timore & tristitia		51.d	
line causa	433.f	Simulatores & deceptores	
ex ignorantia & obliuio-		104.b	
ne	Ibid.f	Sinapi	113.c
ex rigoribus soporosis		Singula naturam suam con-	
Ibidem f	424.a.b	seruant	81.c
ex horroribus	424.a.b	Singultus quando malus	
ex vrina suppressa	Ibi-	408.e	
dem.c		Singultus curatio	391.f
Signa ex variis capitis dolo-		Si re vna homo cōstaret nun-	
ribus	427.d.e.428.a	quam doleret	24.c
Signa ex variis affectibus,		Sitis quando mala	409.c
maximè febribus & phre-		Smegma	261.d
nitide	424.d.425.426.	Sol	115.c
Signa ex voce	409.b	Sol fructus coquit	39.f
Signa ex vomitu	440.d	Sol, luna, cœlū, ac stellæ per	
Signa ex vrinis	397.c.d	insomnium visæ quid si-	
514.c		gnificent	125.d
Signa ex vrina crassa	415.e	Sol pati visus per somnum	
Signa inherentium telorum		quid significet	125.f
in corpore	18.d	Solanum	113.d
Signa maris & fœminæ in		Solstitium æstiuum	118.f
utero	302.d	Solstitium brumale	311.c
Signa mortis & vitæ	318.b	315.a.338.d.118.b	
165.b		Solum mutare in lōgis mor-	
Signa obseruanda	129.d	bis, bonum	358.c
Signa suppuratorum & tabi-		Somnia diligenter obseruan-	
dorum	416.c	da	125.b
Signum venularum cerebri		Somnia veneris quibus fiant	
superuolumentum	155.a	31.f.22.a	
Sileni ægri historia	313.c.d	Somniare vestes & calceamē-	
314.f.316.f		ta	127.d
Silentium in febribus perni-		Somniantium curatio	127.d
ciosum	409.c	Somniare mortuos quid sit	
		227.c	

Index.

127.e		Spiritus densus quid signifi-	
Sōnij Hippocratis interpre-		cer	402.a
tatio	525.a	Spiritus omnia inter cœlum	
Somniorum diuersorum cō-		& terram replet	94.f
sideratio & curatio	128.a.b	Spiritus semper adducitur	
Somniorum diuersorum ob		vel exhalat	95.b
seruatio	126.a	Spiritus varietas	355.b
Somnus	115.e	Spiritus vocem edit	47.f
Somnus frigefacit	97.d	Spiritus vsus quàm sit neces-	
Somnus hydropici qualis		sarius	95.a
403.b		Splen	45.f.60.f
Somnus interdiu vitādus ple		Splen turgidus	77.d
thorico	120.d	Splen tumefactus quid effi-	
Somnus quando est medela		ciat	182.d
358.2		Splenis morbi quinque, eo-	
Sonitus aurium vnde	139.d	rūmque curationes	215.
358.a		216.a	
Sopor vbi malus	409.d	Splenis natura	259.a
Soranus Cous	1.c	Splenis vehementer dolentis	
Sorba	114.a	curatio	278.c
Sorbitio in vasis pulmonis		Splenis curatio	77.e
ruptis	204.a	Splenem attenuantia	215.e
Sorbitiones	399.e	Spleniorum delectus	452.c
Sorbitiones validæ	200.c	Spleniorum numerus	464.c
Sorbitionibus quando vten-		Splendidi viri quī generen-	
dum	385.a	tur	105.a
Sordes aurium quid porten-		Spongiformes, lien, pulmo,	
dant	358.c	& mammæ	15.d
Spasmi solutio	398.f.400.a	Sponte sua quæ in morbis	
Species fortunæ nuda	5.a	fiunt, tum bona, tum mala	
Specillum quale	56.c	145.e	
Spectanda in vulnerato capi		Sputi consideratio	404.b
te	446.b.449.b	Sputi cruenti impedimen-	
Spina	65.d	tum	357.c
Spina gibbosa	481.d	Sputum in pleuriticis, & pe-	
Spinæ natura pernoscenta		ripneumonicis quale	
482.c		434.d	
Spinæ obliquatæ curatio		Sputum liuidum à sanguine	
483.c.d		Ibidem.e	
		EE 2	Spura

Index.

Sputa quæ mala	404.c	397.c.c	
Sputa rotunda quid agant		Sudor multus quando malus	
359.d		409.c	
Sputum subcruentum & liui		Sudoris caussa	151.f
dum	153.d	Sudores	115.c
Statuarij	103.f	Sudores in febribus	513.c
Stercus quî fiat	46.e	Sudores in diebus iudicato-	
Stercus omnium quale esse		riis	519.f
debeat	415.a	Sudores qui excitentur	96.b
Steriles vnde fiant	242.f	Sudores qui boni	396.b.&
Sterilitatis naturalis caussa		contra	402.b
301.e		Suffitus varij ad fluxus	294.c
Sterilitatis fluentibus etiam		Suffimentum vteri	292.c
menstruis curatio	238.d	Suffocationis ab vtero cauf-	
Stomachus	60.f	sa	246.a
Stomachus vteri	302.e	Suffocationis ab vtero cura-	
Stomachus os vuluæ	53.d	tio	229.f.278.e.395.
<i>stomata</i>	61.f	b.c.295.f.296.a.239.c.252.	
Strangulationis ab vtero co-		c.257.c	
gnitio	395.f	Suffocationis curatio	214.c
Stranguria.	156.c.311.d	Suillæ carnis facultas	394.a
Stranguria quare inflamma-		Sulphij facultas	393.f
tis intestinis succedat		Superfoetationes quomodo	
504.f		fiant	105.e
Stranguriæ solutio	318.a.	Supercilia	72.e
238.b.297.e.298.d		Superstites ex suppuratis &	
Stranguriæ signa & curatio		contra	405.c
ex forbitionibus, potioni-		Superstites post partum	50.a
bus & victus ratione	273.	Superuenientia quomodo vi-	
f.274.a.b		ribus adæquentur	188.a
Strumæ quos corripiañt	417.b	Suppurati	74.b.75.f
Succi dulcioris sunt quæ iux		Suppuratus à vulnere	150.b
ta aquas nascuntur	525.d	Suppurationis caussæ	147.d.
Succorum facultates	128.f	150.d	
Succorum seu saporum con-		Suppurationis curatio	355.d
sideratio	16.a	Suppurationes diuersæ	
Sudor sani	397.f	404.d	
Sudor decretorius	397.a	Suppurationis principiū con-	
Sudor frigidus pefsimus		siderandum	404.f
		Suppu	

Index.

Suppurationis signa	76.c	165.e	
435.c			
Suppurati pulmonis signa		Tabes mulierum	416.b
146.e.f		Tabes dorsalis, & eius cura-	
Suppuratorū remedia	76.f	tio	166.b.c
Suppuratorum signa	405.a	Tabes erronea	311.a
Suppurati vteri causa & au-		Tabes grauiſſima	333.c
xilium	55.f	Tabis tres species	206.f
Suppuratus venter superior		Tabis triplicis causſæ & cu-	
quot modis fiat	147.e.f.	rationes	207.a.b.c
148.a.b		Tabis curatio in ſecundo, ter-	
Surditas in quibus malum		tio ac quarto menſe	208.
408.f		a.b	
Surditatis curatio	373.b	Tabidi à quibus male ha-	
Surditatis mala	429.a	beant	361.a
Sutor ſubula læſus periit		Tabidi quo tempore morian-	
350.a		tur	416.b
Sutura capitis longior & bre-		Tabidorum bona ſigna	
uior	444.c	416.a	
Suturæ capitis H. literæ ſimi-		Tabidorum forma	333.e
les	444.d	Tabidorum curatio	77.a
Suturæ capitis diuerſæ	444.	Ταχύτητα	69.c
b.72.e		Taxantur qui de ciborum fa-	
Suturæ x. literæ ſimiles	444.	cultate iudicauerant	110.a
d.		Thaſiæ mulieris morboſæ hi-	
Syderatus eiufque curatio		ſtoria	336.c
173.c.359.f		Telebuli ægri hiſtoria	313.e
Syderationes repentinæ ma-		Telorum varietas	446.f
læ	409.f	Temeni neptis mors	321.a
Sylueſtria omnia prius fue-		Temeton bonum non eſt	
runt	181.c	14.f	
		Temperaturæ diuerſæ	199.e
		Templum Herculis	334.
		Templum Apollinis	536.e
		Tempus quid	21.c
		Tempus calidius quibus vul-	
		neribus proſit	499.d
		Tempus concubitus	249.e.f
		Tempus coaugmentationis	
		in vtero	37.a
		EE 3	Tem
T Abes	74.b.76.a.b.		
64.e			
Tabes ſicca	69.c		
Tabes ſpinea & eiuf ſigna			
76.d. & curatio.	77.d		

Index.

Temporis in sex partes diu- sio	118.c	tur, expelluntur	184.b
Temporis autores, sol & lu- na	51.e	Tetani mala. 398.a. & species	399.f
Temporum & hominum va- rietas	89.c. 310.b	Tetani tres eorúmque cura- tio	223.e f. 175.b
Tempora cur periculosa	444.f	Tetanus lumborum	392.e
Temporũ dolores quid por- tendant	422.b	Thalij morbi	310.b. 311.b
Temporum varietas quos producat	93.d	Theatrum Epigenis	314.e
Terebella aqua frigida sæpe intingenda.	450.a	Thesalus Dracóque Hippo- cratis filij	2.c
Terra æstate rara & leuis	40.e	Thymbra	113.e
Terra qualis	102.c	Thymum	113.e
Terra omnem habet humo- rem	39.c	Tibia	73.c
Terræ qualitas	83.d	Tibiæ ofsis luxati curatio	492.a b. 459.a
Terræ facultates infinitæ	181.c	Tibiæ ofsis vtriufque fracti curatio	459.f
Terræ vires	180.c	Tibiæ ossa duo.	458.f
Terræ motus circa solstitium hybernum	340.e	Tibiæ ossa quanto tempore coalescant	460.f
Terræ inferiora cur hyeme calida, æstate frigida sint	40.b	Timiditas & virilitas vnde	93.a
Terræ motus vel domus in somnia quid significet	127.c	Tinesmus	197.e
Terræ inundationem som- niare quid velit	127.c	Tinnitus auris qualis	408.d
Terram nigram somniare quid præsignet	127.c	Tritici facultas	110.e
Terroris ac timoris causa	141.c	Tonsillarũ vlcera	59.f. 60.a b
Tertianæ naturales	355.d	Tonsillæ ac vicinæ partes	156.a b. 160.f. 63.e
Tertio quoq; die quæ sumun- tur, expelluntur		Torpori pruriginoso quid profit	421.e f
		Tosta vel assata.	114.d
		Tremorem crurum ac pallo- rem quæ faciant	135.b
		Tremuli & gibbosi vnde	139.e
		Tres morborum obseruatio- nes	399.b c
		Triduo excernenda sunt ex- crementa	184.c
		Trifolium	180.a
		Trip	

Index.

Triplicia nutrimenta omnium animantium corpora sus- tentant	94.e	na	359.f
Trichiasis curatio	395.c	Tusses hyeme flantibus au- strinis	352.c
Trygis, id est Tragus	111.b	Tussicula aurium abscessus mollit	411.e
Tuberculum ventris ab igna ris male sectum	244.c	Tussientes ex manuum agi- tatione	344.c
Tuberculum sub lingua, vel hypoglossis	161.a	Typhi morbi causa	219.c.d
Tuberculum lateris	206.c	Typhi color qui leniatur	218.c
Tuberculum in pulmone & eius curatio	168.a	V	
Tubercula bona & mala	354. d.198.f	Vacuacionis faciendae si- gnum	509.f
Tubercula circa aures, qui- bus fierent	310.c.313.d.314 d.315.a.340.d.357.d.363.f	Valetudinis signa	390.f
Tuberculorum in pulmone suppuratio & curatio	212.b	Validis eduliis alij facile vtū tur, alij laeduntur	9.d
Tumor narium	74.d	Varietas rerum in Asia	88.f
Tumoris circa poplitem aut aliā partem curatio	461.f	Variae sententiae de sumendis cibis	11.a
Tumoris causa	187.c	Variorum affectuum enume- ratio	372.b
Tumoris interioris signa & curatio	164.d	Varix testium quid possit	326.c
Tumores ad articulos	354.d	Varix interior	147.c.d
Tumores quid portendant	355.a	Varicis curatio	147.d
Tumores praeter naturā ele- uati prauum	325.f	Varices tibiae	503.a
Tussis cum febre	312.a.b	Velocitas & tarditas vbi ad- hibenda est	17.b.c
Tussis pueri qui discutiatur	298.f	Vena iccoralis	139.a.152 f.62.a
Tussis sedatio, testium tumor & contra	320.f	Vena splenica	139.b.152.e
Tussis varietas	360.a	Vena nervosa	69.d
Tussis siccae curatio	327.a 355.d.361.a	Vena humeralis	68.f
Tusses circa solstitia hyber-		Vena mammaris	68.f
		Vena principalis	69.a
		Vena ex sinistris partibus	70.d
		Vena conuulsa percalefcit	150.a
		Vena magna	60.e
		EE 4	Vena

Index.

Vena cordis	67.a	Venarum varij colores	357.b
Vena pulmonem occupans	69.c	Venarum descensus	67.d
Venæ costarum	66.f	Venarum in fœminis distributio	69.e
Venæ sinum cordis sinistrū perflant, arteria verò alterum	62.a	Venarum temporum consideratio	355.c
Venæ sinistræ morbus & curatio	210.d	Venulæ & arteriæ totius corporis	45.c
Venæ iugulares	182.e.183.e	Venulæ oculorum	71.e
Venæ crassæ	67.c.d.139.a	Venulæ in osse	444.e
Venæ in spinam insertæ	69.c	Venter humidus	102.b
Venæ capitis quadripartitæ	68.e.71.f	Venter	60.f
Venæ in lignum insertæ	68.e	Ventris morbi	312.c
Venæ à ventre	67.f	Ventris tubercula	397.b
Venæ sectio	Ibidem		402.e
Venæ hepatis & aliarum distributio	325.f.326.a.b	Ventris obdurati solutio	292.a
Venæ & arteriæ pulmonis ruptæ curatio	203.c.204.b	Ventris quotidiana purgatio quâ fiat	207.f
Venæ ruptæ signa	147.b	Ventris diuersitas	202.e
Venæ rhenum	66.f	Ventris combusti curatio	214.f
Venæ post aures sectæ sterilitatem inferunt	92.b	Ventrem superiorem nō mouendum	279.a
Venæ iuxta aures incisæ procreationem tollunt	32.b	Ventrem infernum non turbandum	280.c
Venæ plures supra sunt quā infra	73.f	Ventrem ac vrinam subducentia	199.c
Venarum distributio	27.f	Ventrem perturbantia	21.c
Venarum natura	ibidem.d	Ventres quando calidiores	509.c
Venarum multarum & nervorum actio	7.a	Ventres humidi quando deficcantur, & contra	510.a
Venarum ex omnibus corporis partibus in pudendum concursus	31.e	Ventriculus infernus quâ purefcit	148.d
Venarum distributio.	67.a	Ventriculus animalibus, quæ terra plantis præstat	135.c
	68.a.69.f.70.a.b.c.72.a.b	Ventriculi qualitas	Ibidem
Venarū quatuor paria	67.d	Ventriculi corporis sunt plures	

res	6.f	529.d	
Ventriculi cum hydia colla		Vertebrae	66.c
rio	135.c	Vertigo vnde	155.a
Ventris finitio & vis	94.f	Verticula spinæ	480.f
Ventri qui vtilis & qui inuti			481.a
les	109.e	Verticula obliquata	484.e
Venti ab vrsis Riphæis perpe		Vesica	44.e.60.e.15.d
tui	91.b	Vesicæ signa	406.a
Venti mediterranei sicci		Verita à magis	157.d e
109.f		Via qua medico procedendū	
Venti montani insalubres		fit	21.d
Ibidem		Victus humidus quibus con-	
Ventorum natura & facultas		ferat	509.e
109.b.511.b		Victus simplex securior ad sa-	
Ventorum cum animalibus		nitatem	381.d
similitudo	109.c	Victus ab æquinoctio ad hye-	
Ventorum qualitas	83.b	mem	120.a
135.f		Victus hyemalis	18.d e
Ventorum cæterarūque re		Victus ratio in fracturis &	
rum necessaria obseruatio		vlceribus	456.e.457.d
135.f.136.a		Victus refocillās vires	260 a
Venus vnde augeatur	39.c	Victus debilis ac robustus	
Veratri purgatio	358.f	quis?	358.a e
Veratrum quibus proffit, &		Victus ratio post potiones	
contra	531.a.532.a b		261.c
Veratrum quando periculo-		Victus ficans	101.c
sum	512.f	Victus æstatis	118.d e
Veratro purgandi quibus à		Victus hydropici à pituita	
capite fluxio fertur	391.a		211.f
Veritas in arte medica non		Victus ratio conceptum iu-	
semper attingitur	11.e	uans	303.d
Veritatis nullum testimoniū		Victus tenuis quibus impe-	
530.d		randus	508.f
Veris ac æstatis mutata tem-		Victus consuetus etiam si ma-	
peratura	311.c.313.a b	lus fuerit, faciliior, & con-	
Vermes stercorarij	55.f	tra	381.c
Versutiæ malorum infinitæ		Victus ratio somniantium.	
529.a			125.e
Versutiarum causa auaritia		Vigilia	11.e
		EE 5	Vig

Vigilia immodica	385.b	genitura nec mēstrua sint	
Vigor ætatis	23.d	38.c	
Vinum Mendesium	208.c	Viriles & magnanimi leges	
Vinum dulce, austerum	131.b	auerfantur	90.c
Vinum acidum	113.a	Virtutis labor insania iudi-	
Vinum alimentum	129.e	catur	530.e
Vinum Coum	215.d	Visa diuersa quæ sanitatem	
Vinum Thasium	179.f	præsignant	126.f
Vinum Mendæum	210.a d	Visio Hippocratis	524.ef
Vinum quî extenuetur	201	Visus quî hebetetur	154.c
d.202.b		Visus quo alatur	71.e.72.a
Vinum aquosum quas partes		Visus caussa	47.c
iouet	185.d	Vita hominis septē dierum	
Vini albi facultas	385.c	est	47.f.78.b
Vini dulcis facultas	385.b	Vita Hippocratis	1.a
Vini fului vsus	385.c	Vitæ modus	118.c
Vina quæ aluum subducunt		Vlcus cur tardius, aut nun-	
201.a		quam sanescat	150.c
Vina alba aquosa	179.e	Vlcus ferinum	78.c
Vinorum differentiæ & fa-		Vlcus mortiferum	79.b
cultates	112.f	Vlcus vteri cur cito curandū	
Vir in coitu cur maiore volu-		301.d	
ptate afficiatur	32.e	Vlceris cum igni sacro mixti	
Vires singulorū simplicium		purgatio	499.e
quî detrahantur & augeā-		Vlceris in capite curatio	
tur	114.d	447.cd.448.e.449.f	
Virgæ corneæ	464.f	Vlceris in ore curatio	371.c
Virgo lata manu in sinciput		Vlceris in vtero & ore eius	
perculsa periit	350.d	curatio	273.a
Virginis Larissæ historia		Vlceris pus cum vrina con-	
336.d		fertur	397.a b
Virginis Abderitanæ historia		Vlcere in alterutra parte	
335.c		existente, quid patiat	
Virginis à mensstruis dolen-		420.f	
ti curatio	58.a	Vlcere fanato locus qualis	
Virgines cur delyrent	224.d	420.f	
Virgarum numerus & dispo-		Vlcera ac tubercula iudican-	
sitio in fracturis	465.a	tia febres	357.b
Virginibus cur interdū nec		Vlcera capitis vnde	154.d
		Vlcer	

Index

Vlcera fame curanda	78.d	Vocis maximæ caussa	
Vlcera maligna quæ	361.b		338.b
Vlcera ne inflammētur quid		Volsella	18.a
agendum	498.f	Volucris ad hominem colla-	
Vlcera pueris vtilia	139.d	tio	42.b
Vlcera quæ non coeant		Volucrum abundantia quan-	
	499.e	do	318.b
Vlcera secanda quæ	447.e	Voluptas coeuntium	69.e
Vlcerum curatio	473.e.	Voluulus arcuatus	220.f
	498.e	Voluulus quando desperatus	
Vlcerum in pudendis cura-			176.a
tio	238.d.239.b	Voluuli mobi eorūque cu-	
Vlcerum mutilata curatio		ratio	220. b c d.175.e.
	18.c		196.e
Vlcerum pudendi curatio		Voluulus redit etiā post duos	
	272.f.273. b	annos	220.e
Vlcerum quatuor viæ	18.b	Voluulus hamatites	220.f
Vmbilicus	43.d	Vomitionis caussa	153.d
Vmbilicus quando non sta-		Vomitionis remediū	299.a
stim secandus	54.e	Vomitionis modus	118.f
Vmbilicus abruptus, aut re-		Vomitur	115.d.123.e
cisus ante tempus	54.c	Vomitur bonus quis & con-	
Vmbilicus trahit secundam		tra	404.b.408.c.
Ibidem.b			409.c
Vmbilici tormina	133.f	Vomitur preparatio	327.b
Vmbilici vsus	52.e	Vomitur quī fiat	210.b
Vmbra	115.c	Vomitur quomodo cietur	
Vnctio	Ibidem		30.c d
Vngues cur densi.	38.b	Vomitur qui prouocēt	261.c
Vngues quando puero de-		Vomitur sanguinis quibus	
lunt	55.e	profit	440.e
Vnguium generatio	46.c	Vomitur ventrem soluit &	
Vocis exercitatio	122.e	sistit	115.d
Vocis interceptiones	408.e	Vrbes aquas falsas habentes	
Vocis interceptæ caussa & cu-			84.a
ratio	388.d	Vrbis calidæ situs	83.f
Vocis labor & cæterorū quid		Vrbium situs	83.c.84.c f.
ferat	370.a		85.a b c
Vocis restitutio	327.a	Vrina magis morbos indi-	
		cet	

- cat 8.b
 Vrina delyrium soluēs, qua-
 lis 359.d
 Vrina bona quæ 396.c.403.e
 Vrina genitali semini simi-
 lis 36.a
 Vrina rubra 66.f
 Vrina cruenta 342.b
 Vrina turbata quibus inno-
 xia 411.c
 Vrina multa vnde fiat 154.b
 Vrina copiosior quàm pro po-
 tus ingesti ratione 333.a
 Vrina qualis & ex ea signa
 415.b
 Vrina crassa vnde fiat 153.c
 Vrinæ diuersitas 28.d
 Vrinæ crudæ 398.b
 Vrinæ interceptio 409.b
 410.f.411.b
 Vrinæ morborum soluentes
 397.a
 Vrinæ clandestinæ 408.e
 Vrinæ suppressæ 354.c
 Vrinæ malæ 409.e
 Vrinæ crassæ effectus 136.f
 Vrinarum cognitio 390.d
 Vrinarum varietas 339.c
 Vstio quæ 208.e.205.f.17.b
 Vstionis ferramenta qualia
 473.a
 Vfus egregius magister 94.c
 Vterus 15.d
 Vterus ad hepar accedens
 quid faciat 25.f.296.a
 Vteri à grumo sanguinis affe-
 cti curatio 236.c.d.280.d
 Vteri ab vlceribus inflamma-
 ti 246.f
 Vteri ad cor progressi cura-
 tio 238.c.395.d
 Vteri ad caput cōuersi signa
 ac curatio 237.c
 Vteri ad crura & pedes con-
 uersi curatio 237.c.287.a
 Vteri ad hepar conuersi cura-
 tio 279.c.d
 Vteri ad inguina incumben-
 tis curatio 296.b
 Vteri ad latus allapsus cura-
 tio 235.c.280.a
 Vteri ad lumbos procedentis
 signa & curatio 258.c.
 280.b.295.e
 Vteri ad præcordia consisten-
 tis curatio 279.b
 Vteri ad sedem conuersi cu-
 ratio 237.f.284.f
 Vteri ad ventrem nutantis
 curatio. 237.b
 Vteri ad viscera conuersi cu-
 ratio 238.f.295.c.e
 Vteri affecti curatio 82.c.d.e
 Vteri affecti causa & signa
 373.b
 Vteri commoti & prolapsi
 curatio 236.e.238.f.281.d
 Vteri conclusi curatio 238.f
 280.e.288.e.f.289.d
 Vteri cū prociderint, curatio
 226.a.280.c.286.b.287.a
 296.d.58.b
 Vteri deficcati curatio 230.c
 Vteri dolentis curatio 239.a.
 b.d.290.f.292.e
 Vteri ex partu vlcerati cura-
 tio 256.f.257.f.260.e.
 261.b.d.e.f.262.b


Vteri


Index.

- Vteri ex partu inflāmati cura-
ratio 257.a b d e. 270.b
- Vteri ex partu dolentis cura-
tio 257.c
- Vteri ex partu ad dextrā con-
uersū curatio 285.b
- Vteri ad sinistram declinan-
tis curatio Ibidem.c
- Vteri transuersi vel obliqui
curatio Ibidem,
- Vteri extra naturā progres-
si causa & curatio Ibidē.
e f
- Vteri vlcerati & foras prola-
pi curatio 286.e. 308.a
- Vteri huc & illuc vagātis cu-
ratio 285.f
- Vteri erysipelas, eiūsq̃ue cu-
ratio 227.f. 291.a
- Vteri fixi curatio 230.a
- Vteri gracilis curatio 305.e
- Vteri inflāmati mōrbi peri-
culosi signa ac curatio
227.d. 230.a b. 238.a. 239.a
290.b c
- Vteri inflammati & aliorum
affectuum curatio 279. e f
- Vteri inflati curatio 236.b
238.c. 287.d. 295.e
- Vteri in callū indurati caus-
sæ ac curationes 287.d e
- Vteri in coxam decumbentis
curatio 515.f
- Vteri leuigati curatio 237.a
301.c
- Vteri leuitatis signa 250.b
- Vteri molestiæ 82.b
- Vteri obdurati curatio 235.c.
d. 249.f. 287.d. 288.d
- Vteri obliqui curatio 236.a
- Vteri obtorti curatio 236.d.
248.f. 301.c
- Vteri oris angusti mala 255.b
- Vteri oris obdurati curatio
229.d. 288.e. 305.f
- Vteri oris pinguis curatio
249.a
- Vteri plus æquo aperti cura-
tio 290.a
- Vteri præ duritia non conci-
pientis curatio 241.b
- Vteri præter naturā hiantis
signa & curatio 228.b.
289. e. 236.f. 249.a. 301.e
- Vteri procidentia causa ac
curatio 287.b
- Vteri purgatorium 241.a
- Vteri puerperæ inflati cura-
tio 252.f
- Vteri purgationes 237.e.
239.d. 248.a. 307.d
- Vteri qualitas bona 420.d
- Vteri refrigerati curatio
292.e
- Vteri sani non concipientis
curatio 248.e
- Vteri semen non recipientis
purgatio 292.c
- Vteri semen non cōtinentis,
& eructātis curatio 309.a
- Vteri siccioris & humidioris
curatio 249.c.d
- Vteri transmoti curatio 236.
a. f. 239. a. 284. e. 287. b.
295.f
- Vteri vlcerati signa 254.b.
255.a. 259.e. 260.c
- Vterum gerentis victus ra-
tio.

Index.

tio	228.a	Vuæ passæ	179.c
Vterum gerentibus octauus mensis grauis	49.c	Vulnus carne replētia	199.d
Vterū purgantia	57. b c d e f	Vulnus quando non lauan- dum	327.b
Vteri cū adglutinati fuerint. quid agendum sit	226.d	Vulnus circa sinciput cur pe- riculosius	444.e
Vteri quib⁹ rebus facilè pro pellantur	285.a	Vulnus refrigerantia	199.c
Vteri vbi extra pudendū ex- ciderint , quid agendum	226.b. 239.b. 285.c. 286. b c. 309.c d	Vulnus omne quietē poscit	498.f
Vterorum affectorum reme- dia	237. e	Vulneris in capite modi ac species	445.c d
Vterorū , cum ad coxam de- currerint , curatio	226.f. 283.e. 284.b d. 305.f	Vulneris obseruatio	418.d
Vterorum fomenta	241.b	Vulnera magis lethalia quæ	417.c d
Vterorū oris cōplicati signa & curatio	226.e f. 286.d	Vulnera curanda	417.e
Vterorū pituita oppletorū, si- gna & curatio	227.c. 257.f	Vulnera lethalia	439.a
Vterorum variij morbi	244.f	Vulnera non lethalia	439.a
Vterorum dolor quī sedetur	297.f	Vulnera fortia sine tumore, malum	325.e
Vteros aperientia & purgan- tia medicamenta	242.b	Vulneratorum curatio	199.c
Vtilitas in dignoscendis so- mniis	125.a	Vxoris Hermoptolemi ægræ historia	366.b
Vua morbus	156.a. 160.c	X	
Vuæ tumor	193.d	X Enophanis ægri histo- ria	313.f
		Z	
		Z Oilo ex tussi matura quæ contingerint	324.c
		F I N I S.	





AHIPPOCRATIS

COI VITA EX SORANO,

IANO CORNARIO ME-
DICO PHYSICO IN.

TERPRETE.

*



B

HIPPOCRATES genere Coos fuit, Heraclidæ & Praxitheæ filia Phe-
naretis filius. Ad Herculem autē &
Aesculapium originem generis sui
referebat, ab altero que se vigesimū,
ab altero decimumnonum se nume-
rabat. Eius autem genealogia Era-
tosthenes mentionem facit, & Phe-
recydes, & Apollodorus, Arius item
Tarsensis. Cæterum parentis sui Heraclidæ discipulus fuit,
deinde Herodici, & ut quidam tradūt, Gorgiam Leontinum
rhetorem audiuit, & Democritum Philosophū Abderiten.
Floruit temporibus Pelopōnesiacis, natus (velut Istomachus
in primo de Hippocratis secta tradit) primo octogesimæ O-
lympiadis anno. Soranus verò Coos: qui Coorum bibliothec-
as perscrutatus est, addit, sub Abriadæ monarchia, Agriani
C mensis septima & vicesima die, in qua etiam vsque in hunc
diem Coos Hippocrati omnia sacra facere tradit. Porro quū
in arte medica totūq; disciplinarum orbe exercitissimus
esset, functis vita parentibus, ex patria discessit, ut quidem
malignè de eo Andreas, in eo quē de Medicinæ origine scri-
psit libro prodit, propterea quòd publicam Cnidiorum bi-
bliothecam igne concremasset. Alij autem eo proposito eum
patriam reliquisse dicūt, ut rei medicæ effectus & successum
per multos locos cognosceret, & in his variis modis exerci-
taretur. Quemadmodū verò Soranus Coos narrat, Somnus
Deus eum per somnium admonuit, quo se ad Thessalorum
regionem inhabitandam conferret. Cæterum per omnem
Græciam Medicinæ gloria omnibus admirationi fuit, adeò
ut etiā à Perdicca Macedonū Rege, qui tunc laborare puta-
batur,

Coi singu-
lis annis
Hippocra-
ti parenta-
bant.
Andreas
Hippocra-
tem infamavit.

Soranus
Coos.

Perdiccas
phthisicus
creditus.

Hippocratis vita.

Euryphon batur, vocatus publice sit, ad ipsumque vnà cum Euryphon- D
 medicus. to, qui ipso ætate maior erat, peruenit animique hunc re-
 gis affectum esse certis signis deprehendit. Post mortem
 enim Alexandri parentis, vnā ex pellicum eius numero
 Phyla Ale Phylam nomine Perdiccas deperibat, ad quam quum rem
 xandri pel- ipsam Hippocrates detulisset, postea ex illius conspectu o-
 lex a per- maino illum mutari obseruauit, atque ita morbo depulso
 dicca ada- regem conseruauit. Vocatus est & Abderam, quo præsens
 mata. ipse Democritum ab insania liberaret, atque eo sanato à to-
 Democri- ta vrbe pestem depelleret. Quin & in Illyricum plurimā-
 tus insanus que barbaras terras peste ingruente, & illarum gentium re-
 putatur. gibus ipsum ad se vocantibus, quum à legatis ipsorum, qui
 Qua cura Græciam à ventī in illis regionibus vigerent, didicisset, ipsos re infecta E
 pestilentia liberauit. dimisit. At verò quum prudenti ratiocinatione pestem in
 Artaxerxes vsque ad Persas diuulgaretur, atque ea gratia ab Artaxerxe
 Helleston- per Histanidem Helleponti præfectum, magnis muneribus
 ti hippar- & precibus vt ad ipsum veniret inuitaretur, ob honestatem,
 chos. argentique contemptum, ac Græciæ amorem, regi id dene-
 garit, quemadmodum & hoc ex epistola eius ad illum ma-
 nifestè ostenditur. Propriam porro patriam liberauit, quum
 Athenienses ei bellum illaturi essent, Theſſalis ad auxilium
 Quantū ab ferendū rogatis. Quapropter splendidos honores apud Coos
 omnibus co consequutus est: imò & apud Theſſalos Argiuosque & Athe- F
 leretur Hip- nienses, qui cum Eleusiniis sacris secundum ab Hercule pu-
 pocrates. blice initiarunt, & ciuem conscripserunt, atque in Prytaneo
 alimenta tum ipsi, tum posteris eius dederunt. Liberaliter
 autem & minimè inuidiose studiosos artem edocuit, decen-
 ti iureiurando prius adstrictos. Vita functus est apud Laris-
 Mors Hip- seos, quando & Democritus obisse traditur, atque alij qui-
 pocratis. dem nonagesimo ætatis suæ anno, alij octogesimo quinto,
 alij centesimo quarto, quidam verò centesimonono, deces-
 sisse tradunt. Sepultus autem est inter Gyrtone & Laris-
 sam, vbi vsque in hunc diem monumentum eius cernitur, in
 quo sanè ad multum tempus examen apum mellificantium
 erat, quo melle ad infantum oris vlcuscula iuxta tumulum
 illito, nutrices ea facile persanabant. Porro in multis ima-
 ginibus

A ginibus velato capite pingitur, ut quidam aiunt pileo, quod nobilitatis signum est: nam hoc modo etiam Vlysses Pileatus cernitur: Alij autem pallio velatum dicunt, atque ex his aliqui decoris gratia id fieri asserunt, quandoquidem caluus erat: aliqui vero ob capitis imbecillitatem id fieri perhibent: aliqui autem significanter id ab eo factum volunt, nimirum quod principem rationalis animæ sedem probè munitam & contextam esse oporteat. Alij signum peregrinationes amantis esse ferunt: alij verò rursus obscuritatem scriptorum ipsius per hoc significari contendunt. Alij postremum in testificationem id fieri volunt, quod etiam sanitatis tempore ea quæ lædere possunt cauere debeamus. Quanquam B quidam affirmant, quod in administratione rerum gerendarum, ne quod à circumfluo pallio manus ipsius impedi-
rentur, id ipsum complicatum in caput reicere consue-
rit. Ceterum de scriptis ipsius multa dissensio est, quare fit ut
quum alia alij opinentur, non facile sit de ipsis certum quid
pronuntiare, ob multas præsertim causas, quæ iudicii cer-
titudinem obfuscant: velut est primum quidem cognomen.
Secundo quod dictionis characterem possibile sit seruare.
Tertio quod vnus & idem modo robustiore, modo remissio-
re dictione per ætatem vtatur: neque desunt etiam aliæ præ-
ter has causas, si referre libeat. Pecuniarum autem penitus
contemptor fuit, moribusque sanctis, ac Græcorum amator,
quare etiam gentiles suos summa diligentia curauit, adeo
C vt à peste omnes ipsorum ciuitates liberarit, quemad-
modum suprà dixi. Vnde & splendidos honores
non apud Coos tantum, sed & apud Argiuos
& Athenienses est consequutus. Filios à
morte reliquit duos, Thessalum &
Draconem, discipulorum verò
magnum numerum. Cla-
rissimi verò ipsius fi-
lij fuisse perhi-
bentur.

Cur capite
tecto cer-
natur.

Libri Hip-
pocratis in
controuer-
siam addu-
cti.

Thessalus
Dracóque
Hippocra-
tis filij.

HIPPOCRATIS^D

COI IVSIVRANDVM,

IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSICO

INTERPRETE.

*

Apollo.
Aescula-
pius.
Hygeia.
Panacea.



Quæ præ-
stet medi-
cus.

POLLINEM medicum, & Aescu-
lapium, Hygeamque ac Panaceam
iuro, deosque omnes, itemque deas
testes facio, me hoc iusiurandum, & E
hanc contestationem conscriptam
pro viribus & iudicio meo integrè
seruaturum esse. Præceptorem sanè
qui me hanc edocuit artem, paren-
tum loco habiturum, vitam com-
municaturum, eaque quibus opus habuerit impertiturum:
eos item qui ex eo nati sunt pro fratribus masculis iudicatu-
rum, artemque hanc si discere voluerint, absque mercede
& pacto edocturum: præceptionum, ac auditionum, reli-
quæque totius disciplinæ participes facturum, tum meos,
tum præceptoris mei filios, imò & discipulos, qui mihi scri-
pto cauerint, & medico iureiurando addicti fuerint, alij ve-
rò præter hos nulli. Caterum quod ad agros attinet sanan- F
dos, diætam ipsis constituam pro facultate & iudicio meo
commodam, omnèq; detrimentum & iniuriam ab eis pro-
hibebo, Neque vero ullius preces apud me adeò validæ fue-
rint, ut cupiam venenum sim propinaturus, neque etiam ad
hanc rem consilium dabo. Similiter autem neque mulieri
talem vuluæ subditicium, ad corrumpendum conceptum,
vel fœtum dabo. Porro præterea & sanctè vitam & artem
meam conseruabo. Nec vero calculo laborantes secabo, sed
viris, chirurgiæ operariis eius rei faciendæ locum dabo. In
quascunque autem domos ingrediar, ob vtilitatem agrotan-
tium intrabo, ab omnique iniuria voluntaria inferenda, &
corruptione cum alia, tum præsertim operum venereorum
abstinebo, siue muliebria, siue virilia, liberorumve hominū
aut

A aut seruorum corpora mihi contigerint curanda. Quæcun-
que vero inter curandum videro aut audiero, imò etiam ad
medicandum non adhibitus, in communi hominum vita co-
gnouero, ea si quidem efferre non contulerit, tacebo: & tan-
quam arcanà apud me continebo. Hoc igitur iusiurandum
mihi integrè seruanti, & non confundenti, contingat & vita
& arte feliciter frui, & apud omnes homines in perpetuum
gloriam meam celebrari. Transgredienti autem & peieran-
ti, his contraria eueniant.

H I P P O C R A T I S
B C O I L E X, I A N O C O R-
N A R I O M E D I C O P H Y-
S I C O I N T E R-
P R E T E.



C **M**EDICINA omnium artium præcla- *Medicæ ar-*
rissima est. Verum propter ignoran- *tis præstan-*
tiam eorum, qui eam exercent, & ob- *tia.*
vulgi ruditatem, quòd tales pro me-
dicis iudicat & habet, iam eo res de-
uenit, vt omnium artium longè vi-
lissima censeatur. At verò hoc pec-
catum ob hanc potissimum causam
mihi committi videtur. Soli nanque *Quæ pæna*
Medicinæ nulla pæna in rebus publicis statuta est, præter- *malis medi-*
quam ignominia, verum hæc ipsa non afficit, neq; contingit *cis irroge-*
eos, qui ex composito personam ipsius induerunt. Similimi- *tur.*
enim huiusmodi Medici sunt personis, quæ in tragædiis in-
troducuntur. Quemadmodum enim illi figuram quidem &
habitum ac personam eorum quos referunt habent, illi ipsi
autem verè non sunt. Sic & Medici fama quidem & nomine
multi, re autem & opere valde pauci. Quisquis enim Medi-
cinæ scientiam sibi vere comparare volet, eum his ducibus
voti sui compotem fieri oportet, Natura, Doctrina, Loco
2 3 studiis

Hippocratis Lex.

Necessaria studiis apto, Institutione à puero, Industria, & Tempore. Pri- D
medico fu- mum quidem igitur omniū Natura opus est. Natura enim
turo. repugnante, irrita omnia fiunt. Si verò natura ad optima viā

Disciplina
cōparatio
ad agricul-
turam.

tum quidem igitur omniū Natura opus est. Natura enim repugnante, irrita omnia fiunt. Si verò natura ad optima viā demonstraret, artis Doctrina facile contingit, quam sanè cum prudentia sibi comparare oportet, ita ut à puero institutio accedat, atque id in loco à natura ad disciplinam apto. Amplius autem & industriam adhibere oportet: eamq; ad multum omnino tempus, quo disciplina ipsa insita, feliciter & cum profectu fructus suos producat. Qualis enim eorū quæ terra producit consideratio est, eiusmodi etiam disciplinæ Medicinæ per omnia similiter existit. Natura enim nostra, velut ager est, dogmata præceptorum, velut semina sunt. Institutioni à puero cum eo conuenit, quòd opportuno tempo- E
re semina in aruum cadere oportet. Locus autem in quo disciplina contingit, est velut ambiens aer, à quo è terra nascentibus nutrimentum accedit. Industria autem, cultura est. Tempus postremum hæc omnia corroborat, ut perfectè enutrientur. His igitur ad artem medicam allatis, & vera ipsius cognitione comparata, tandem per vrbes obambulādo, non sermone tantum, sed & opere medicos haberi conuenit. Imperitia verò malus thesaurus est, & infelices opes, his, qui eam repositam habent, & insomnium, aut potius somnium diurnum, & maxime verum, alacritatis fiduciæque ac veræ exultationis expers, timiditatisque & audaciæ nutrix. Ti-

Sciētia mul-
tum differt
à persua-
sione.

miditas equidem impotentiam, audacia verò ignoran- E
tiam artis significat. Duo enim sunt, Scientia & Opinio, quarum altera quidem scire facit, altera verò ignorare. Caterum res sacræ sacris hominibus demonstrantur, prophanis id fas non est, prius quàm scientiæ orgiis initientur.

H I P P

A HIPPOCRATIS

COI LIBER

DE ARTE,

IANO CORNARIO

MEDICO PHYSICO

INTERPRETE.

B



VNT QUIDAM qui artem putant, reliquas artes turpiter incedendo dehonestare, atque id quidem veluti putant non transigunt, ut ego sane assero, sed propriam cognitionem ac scientiam ambitiose ostentant. Mihi verò inuenire aliquid eorum, quæ nondum inuenta sunt, quod ipsum notum, quàm occultum esse præstet, scientiæ votum ac opus esse videtur. Similiterque & semiperfecta ad finem perducere & absolueret. At verò verborum inhonestorum arte ad ea quæ ab aliis inuenta sunt confundenda, promptum esse, nihil quidem corrigendo: eorum verò qui aliquid sciunt inuenta apud ignaros calumniando, non sane scientiæ votum aut opus esse videtur: sed proditio magis naturæ suæ, aut ignorantia artis. Solis enim artis ignaris hoc ipsum factum conuenit, qui contentiose quidem gestiunt ac conantur, nequaquam verò possunt malicie sufficere, ad hoc ut aliorum opera quæ quidem recta sunt, calumnientur, quæ verò non recta sunt, reprehendant. Eos quidem igitur qui in alias artes hoc modo irruunt, quibus hæc curæ sunt, quorumque id interest, & præstare hoc possunt, prohibeant. Præsens verò sermo his, qui medicinam eo modo inuadunt aduersabitur, confidens quidem & animatus propter vtilitatem eorum, quos infestatur: copiosus verò ob artem, qua præstat & auxiliatur: potens autem ob sapientiam, qua est eruditus. In vniuersum itaque nulla videtur mihi ars esse, quæ non existat. absurdum

dum enim est aliquid esse putare quod non est, quoniam eorum quæ non sunt, quānam substantia conspecta aliquis denuntiare possit quod sint? Si enim non existentia videre non datur, quemadmodum existētia, haud equidem scio quomodo quis mente concipere queat ea quæ non sunt, quemadmodum ea quæ sunt, quæ certè oculis videre est, mentēq; intelligere quod sunt. Verūm vt ea nec videas nec intelligas, non similiter contingere potest. Sed existentia quidē semper videntur ac cognoscuntur: nō existentia autem, neque videntur neque cognoscuntur. Cognoscuntur itaque demonstratis iam artibus, & nulla est ars quæ non ex specie quadā rerum videatur, arbitrōrque sanè ego etiā nomina artibus ex speciebus accipi & imponi. Absurdū enim est existimare ex nominibus species rerū germinare & prouenire, imo etiam impossibile existit. Nomina enim lege quadā naturæ indita sunt, Species autem rerum nō lege sancitæ sunt, sed naturæ germina existunt, atque hæc quidē si quis ex prædictis non ad plenum intelligat, in aliis sermonibus fortassis clarius edocebitur. De Medicina verò, vtpote de qua hic institutus est sermo, claram demonstrationem faciā, & primū sanè definiā quod sentio, Medicinā esse morbos ab agris intotum tollere, & morborū vehementes impetus obtundere, & eorum qui à morbis victi sunt curationē nō aggredi, quum id in cōfesso sit, quod Medicina tales sanare nō possit. Quomodo igitur hæc Medicina faciat, & quali omnino facultate præstet, de hoc iam reliquum sermonem instituā. Cæterū in artis demonstratione simul etiam sermonē illorum qui eam dehonestare contendunt, quatenus quisq; eorū sibi quid transēgisse visus est, reuellā. Principiū itaque sermonis hoc erit, cui omnes assensuros scio. Quod quidem aliqui à medicina curati sanitati restituuntur, confitentur. Quod verò nō omnes ob hoc iam ars ipsa vituperatur: aiuntq; hi qui eā peius incessunt, quod hi qui à morbis apprehenduntur, eosque euadunt, fortunæ ope euadāt, & non auxilio ipsius artis. Ego verò nō priuabo quidem ipse fortunam tanquam nihil operæ precij faciat, puto enim morbis qui malè curātur vt plurimum infortunium accedere: qui verò bene, eos bonam fortunam nancisci. Postea verò interrogo: quomodo possibile est sanatos aliud quā artem causari, siquidē eius vsu & mi

Medicina
quid.

Medicina
mala omnia non sanat.

Quatenus
medicina
non probetur.

A & ministerio sunt sanati. Nudam enim fortunæ speciem eos *Species for*
 respicere ac sequi noluisse, ex hoc apparet, quod se ipsos arti *tunæ nuda.*
 concrediderunt quare à gratia fortunæ referenda liberi sunt:
 ab ea verò quæ arti debetur minimè se vèdicare possunt, quo
 minus ei sanitatem acceptam ferant. In hoc enim quod se ei *Huc spe*
 commiserunt ac concrediderunt, palàm est ipsos speciem *mitis*
 eius esse contemplatos, vim verò eius patrato opere cogno-
 uerunt, Dicit sanè hic aduersarius, quod multi iam agri etià *Medicis nò*
 citra medicorū vsum sunt sanati: & ego id dicentibus credo. *vtentes non*
 Videtur autè mihi omnino fieri posse, vt & qui medicis non *negat pos-*
 vti sunt in medicinam inciderint, non tamè vt scierint quod *se sanari.*
 in ipsa rectum fuerit, & quod non rectum: alioqui contigif-
 set vt se ipsos eodem penitus modo curassent, quo curati fuif-
 sent, si medicos adhibuissent. & hoc tandem magnum signū
 est substantiæ ipsius artis, nèpe artē esse, & quidè magnam,
 quando sanè etiam hi qui eam esse nō putant, per ipsam ser-
 uati apparent. Valde enim necessarium est nosse, eos qui me-
 dicis etiam non sunt vti, si agrotauerunt & conualuerunt, *Qui sine*
 quod aut facientes aliquid, aut non facientes sanati sunt. Aut *medicis sa-*
 enim inedia, aut edacitate, aut vberiore potu, aut siti, aut bal- *nantur, ali-*
 neis, aut illuue, aut laboribus, aut quiete, aut somnis, aut vi- *qua re sa-*
 gilia, aut his omnibus promiscuè vtentes, conualuerunt. Et sa- *nantur.*
 nè propterea quod opem senserunt, valde necessarium est ip-
 sos nosse, quod fuerit aliquid quod opem tulerit. Et rursus si
 quid detrimenti acceperunt, necesse est & detrimentū nosse,
 & quod fuerit aliquid quod damnum dedit ac læsit. Non e-
 nim quiuis cognoscere potest ea quæ commoditate & detri-
 mento sunt disparata. Si igitur is qui agrotauit, siue lauda-
 re, siue vituperare nouerit quid: ex diata, per quam conua-
 luit, omnia hæc Medicinæ esse comperiet, & sunt nihil mi-
 nus ea quæ damno fuerunt, quàm ea quæ opem tulerunt, in
 testimonium arti, quod ars ipsa sit. Quæ enim profuerunt, ob
 rectum vsum profuerunt: quæ verò nocuerunt, ob id quod *legi vni*
 non rectè vsurpata sunt, nocuerunt. Atqui vbi rectum, & nō *Artes*
 rectum vtrunque suum finem habet, quomodo quis hoc ar- *arxix.*
 tem esse neget? Hoc enim ego artis expertus esse dico, vbi ne-
 que rectum neque non rectum aliquid existit. Vbi verò vtrū
 que horum inest, quomodo hoc non artis opus, sed potius in-
 artificialitatis existat? Amplius autem si ex phar macis pur-
 gan

Hippocratis Liber

Medicamē gañtibus, & aluum sistētibus solū, tum Medicina, tum Me- D
 a purgan- dicis sanationem facerent, infirmus sane sermo meus meri-
 tia, & sisten- to iudicaretur. Nunc verò hi qui inter medicos maximè lau-
 tia nō satis dati sunt, & diata, & aliis medicaminum formis sanāt, quas
 unt ad con- ne idiota quidem artis ignarus si audiat, nedum Medicus ar-
 alescētia. tis esse negare queat. Vbi igitur nihil neque in ipsis bonis

medicis, neque in arte medica inutile est, sed in plurimis eo-
 rum quæ ex terra nascuntur, & eorum etiam quæ fiunt, spe-
 cies & formæ insunt medelarum & pharmacorum: non est
 quod amplius aliquis eorum qui sine medico conualuerunt,
 casum spontaneum vero sermone vehere possit tanquā cau-
 sam suæ sanationis. Spontaneum equidem nihil esse appa-
 ret ac deprehenditur. Omne enim quod fit, propter quid fie- E
 ri comperitur, atque etiam in singulis adeò propter quid fie-
 ri videtur. Spontaneum verò nullam substantiā habere com-

Medica ars peritur, sed nudum tantum nomē. Medicina autem tum ex
 cur refelli his quæ propter quid de industria excogitata sunt, esse ad-
 non possit. paret, tum substantiam amplius habere conspicitur. Quare
 his quidem qui fortunæ sanitatem acceptam ferunt, artique

Quid con- derogant, hæc quæ dixi respondere quis possit. Cæterum
 tra eos qui eos qui ob morientium calamitatem, artem demoliri con-
 mortuos tendunt, miror quānam memorabili ratione commoti, in-
 medicis as- temperantiam quidem morientium causam mortis nō sta-
 signant, di- tuunt, scientiam verò eorum qui medicinam exercent, accu-
 cat. sant: tanquam sanè Medici quidem ea quæ non conueniant: F

imperare possint, ægri verò quæ imperata sunt, transgredi
 non possint. Atqui longè magis rationi consentaneum est,
 ægros non posse facere quæ imperantur, quàm medicos non

Quid medi- conuenientia iubere. Medici nanque sana mente sanèq; cor-
 cus cōside- pore rem aggredientes, & præsentia considerant & de præte-
 ret ante cu- ritis similiter iuxta præsentia ratiocinantur, intantum etiā
 ram. vt aliquando palàm gloriari soleant ægri, se illorum opera

Cur lāguē sanitati restitutos esse. Aegri verò neque qua parte laborent,
 tes non pa- neque ob quam causam laborent, neque quid ex præsentibus
 reant. futurum sit, neque quid ex horum similibus fiet scientes,
 medici imperio subiacent, dolentes quidem ob præsen-
 tia, timentes autem futura: & pleni quidem morbo inanes
 autem ciborum, ea quæ morbo grata sunt, quàm quæ ad san-
 nitatem faciunt assumere malunt, mori quidem non aman-
 tes,

Ates, sed tolerare tamen non potentes. Hoc modo autem affectos, utrum verisimilius est, hos à medicis imperata facere, an alia facere quæ medici non iusserunt? aut medicos tales quales superiori sermone declaravi, non cōvenientia imperare? Nonne multò magis hos quidem quæ conueniant iubere: illos autem temere & impotenter nolle obedire? atque sic inobedientes in mortem incidere? Quæ sanè qui non rectè considerant, causas ad hos qui inculpabiles sunt, referūt: eos verò qui maximè accusandi sunt, à culpa liberant & defendunt. Porro sunt item quidā qui ob eos qui victis à morbis curam adhibere nolunt, medicinā ipsam reprehendunt, dicuntque quòd morbi quos sanare aggrediuntur illi, per
B seipso fuissent sanati: qui verò auxilio opus habēt, eos non contingunt. Oportebat autem, inquiunt, siquidem ars erat, omnibus æquè morbis sanitatem asserre. Qui igitur hæc dicunt, si medicis indignarentur, quòd ipsorum talia dicentium, nō ut delirātium curam habeant, meritò sanè succensuerint magis, quàm quòd illa reprehendunt. Si quis enim ab arte potentiam in ea quæ non proficitur, aut à natura facultatem in ea ad quæ nata non est, exigat: is ignorat insaniam dementiae potius quàm ignoratiæ cōuenire. Quorum enim instrumentorum siue naturæ, siue artium facultatem obtinemus, per ea sanè opifices esse possumus, per alia verò minimè licet. quum igitur homo morbo afficitur qui vehementior est quàm medicinæ instrumēta, ne sperare quidem
C oportet ut à medicina exuperetur. Exempli enim gratia, Inter ea quæ in medicina vrendi vim habent, ignis extremè vrit, verum eo minus etiā alia multa. An verò ex eis præstantiora leuiore morbos curare non possint nondum satis constat, valentissimos autem morbos, potentissima etiā instrumenta curare nō posse, quomodo non sit manifestum? Quæ enim ignis non efficit, quomodo ea quæ ab illo non sunt domita non ostendant, quòd alia arte opus habeant, & nō ea in qua ignis instrumentum existit? Idem sentio & de aliis instrumentis quæcunque medicinæ opus adiuuant, quorum omniū singulatim successum si nō assequitur medicus, vim
affectiōis accusare oportet, mea quidē sententia, nō ipsam artem. Qui igitur eos reprehēdunt qui victis à morbo manu adhibere recusant, hortantur etiā ut ea quæ nō conueniunt attingant,

Damnatur
 ars medica
 quinetiā cū
 deploratos
 non curat.

Deplora-
 tos nō ex-
 pedit rā-
 gere.

Hippocratis Liber

attingant, non minus quàm ea, quæ contingere interest ar- **D**
tis, quod quum faciunt, his quidem qui nomine medici sunt,
admiracioni sunt: ab his verò qui arte præstant, deridentur.
Nec verò adeo desipientes huius artis experti sunt: neque vi-
tuperatoribus neque laudatoribus indigent, sed ratione, ad
quam sanè actiones opificum absolutæ, plenæ sunt, & quæ ab
ea destitutæ, mancæ. Amplius vero etiam defectus aliquos
quidem opificibus imputare oportet, aliquos vero ipsis ope-
ribus. Quæ quidem igitur ad alias artes pertinent aliud tem-
pus, aliūque sermonem requirunt. Quæ vero ad medici-
nam, qualia sunt, & quomodo iudicanda, partim quidem su-
periori sermone ostendimus, partim vero præsentī oratione
docebimus. Sunt enim his qui hanc artē probe norunt, mor- **E**
bi partim non in obscuro positi, & non multi: partim non in
manifesto loco hærentes, & multi sunt, Qui enim ad inter-
na vertuntur, in obscuro siti sunt. Qui vero ad superficiem
corporis erumpunt aut tumescunt, manifesti sunt. exhibent
enim sese ut tum visu, tum tactu, & soliditas & humiditas
ipsorum percipiatur, & qui calidi sint quique frigidi sentian-
tur, qui sanè singulorū aut præsentia aut absentia tales exi-
stunt. atque horum quidem omnium in omnibus certas ac
infallibiles medelas esse oportet, non ob id quòd faciles sint,
sed quòd certo inuento constent. Neque verò à quibusvis vo-
lentibus inveniuntur, sed ab his qui volunt itēque possunt,
possunt autem quibus tum disciplina non minus, sed pro-
pè & largiter contigit, tum natura non infelix liberaliter **F**
accessit. Ad manifestos quidem igitur morbos hoc modo ar-
tem diuite facultate præditam esse oportet. Neque verò ad
minus manifestos eam inopem ac dubiam hæere conuenit.
Sunt autem morbi minus aperti, quique ad os, quique ad ven-
triculum sunt conuersi. Habet autem corpus non vnum ven-
triculum sed plures. Duo enim sunt qui cibum suscipiunt &
demittunt, aliique præter hos plures, quos norunt hi quibus
hæc res curæ fuit. Quæcunque enim membra carnem in or-
bem circumscitam habent, quam musculum appellant, ea om-
nia ventriculum habent. Omne enim incōcretum & quod
non coaluit, siue pellicula siue carne contegatur, cauum est.
Impletur autem dum sanum est flatu, dum ægrotat sanie.
Habent itaq; brachia talem carnem, habent & fœmora, ha-
bent

Quædam
re quædā
artifici dā-
la.

Mala pa-
entia pau-
a sunt, con-
ra quæ nō
patent mul-
ta.

Corporis
ventriculi.

- A** bent suræ. Quin & in macilētis & ex carnibus partibus eius-
modi caro inest, similiter vt in carnosus esse demonstratum
est. Nam & qui thorax appellatur, in quo hepar continetur,
& capitis circulus, in quo cerebrum concluditur: ipsūque
adeo dorsum, ad quod pulmo vergit, horum membrorum
nullum est quod non & ipsum vacuum sit, ac multis segmen- *Loca cor-
poris va-
cua.*
tis plenum ac quasi discriminatum existat, quæ parum ab-
est vt vasa existant, quorum tamen aliqua habentem lædūt,
aliqua vero eiam profunt. Præter hæc autem & venæ mul- *Venæ, ner-
ui quid fa-
ciant.*
ta, & nerui non in carne sublimes, sed ad ipsa ossa producti
ligamentum sunt articulorum: ipsi etiam articuli in quibus
ossium quæ mouentur commissuræ inuoluuntur: & horum
B nullum est quod non subspumofum sit, & circa se forulos ha-
beat, quos sanies prodit, quæ deductis ipsis, multa & magno
multorum mœrore egreditur. Ex prædictis itaque omnibus
nullum est quod oculis conspicienti videre ac cognoscere
contingit, quapropter etiam obscura mihi appellata sunt: &
ab arte quoque obscura esse iudicata sunt, non tamen quod
obscura permaneant & nos vincant, sed quantum possibile *Quæ cau-
sa cur non
cognoscan-
tur morbi
statim.*
est cognoscantur & superentur: possibile autem est quātum
agrorum naturæ ad considerandum conferunt, & quantum
eorum qui perscrutaturi sunt naturæ ad perscrutandum ap-
ptæ sunt. Cum multo enim labore, & non modico tempore
præ oculis videntur & cognoscuntur. Quæcunque enim ocu-
lorum conspectum effugiunt, ea mentis oculis obtinentur
& superantur. Quæcunque vero ob id quod non statim co- *Causæ mor-
borum non
statim co-
gnoscentur.*
gnoscantur agri mala perpetiuntur, ea non ad medicos cu-
rantes ipsos, tanquam ad ipsorum autores referenda sunt,
sed ad naturam ipsius egri, itidēque ipsius morbi. Medicus
enim quum non possit malum neque visu assequi, neque au-
diēdo ex aliorum narrationibus cognoscere, ratiocinatione
ipsum persequitur. Etenim ipsi quoque agri qui obscuro mor- *Languen-
tibus non
semper cre-
dendum.*
bo laborant, si conentur medicis de morbis suis narrare, ex
opinionē magis quā scintia narrant. Nam si sciuisent, in
ipsos sanē medicos non incidissent, quum eiusdem scintia
sit morborum causas nosse, & morbos ipsos omnibus medi-
camentis quæ augescere morbum prohibent, curare posse.
Quando igitur neque ex egri narrationibus ad infallibilem
certitudinē peruenire possit, aliò certe respicere medicum
neceſſe

Quid au-
deat natu-
ra.

Medicus
cum mor-
bum mouit,
facile pel-
lit.

Medica ars
nihil cete-
ris simile
habet.

Natura
quid agar,
videto.

neceſſe eſt. Quare huius tarditatis non ars ipſa, ſed corporū D
natura cauſa exiſtit. Hæc enim malum ſentiens, mederi ma-
gnopere geſtit, conſiderās tamen ne temeritate magis quàm
conſilio, & vt facilitate magis quàm violentia medeatur.
Medicus verò ſi quidem ſuffecerit ad cognoscendum, ſuffi-
ciet etiam ad ſanandum. Si verò iſ in quò morbus cognolci-
tur, ſuperetur, ob id ſane quòd ſerius medicum accerſit, aut
ob morbi celeritatem peribit. Si enim ex æquo proceſſerit
morbus cum medicina, velocior non eſt. Si verò præoccupa-
uerit, velocior omnino exiſtit. præoccupat autem tum pro-
pter corporum anguſtiam, in qua non in conſpicio inhabi-
tant morbi, tum propter ægrorum negligentiam. Differunt
enim & cunctantur, atque vbi iam à morbis ipſis apprehen- E
ſi ſunt, tum demum curari volunt ac expetunt. Quare artis
potentiam magis ex merito admiremur, ſi quem ex clande-
ſtino morbo ægrum reſtituat, quàm ſi impoſſibilibus & de-
ſperatis opem ferre moliatur. Nequaquam vero in vlla ali-
qua iam inuentarum artium tale quiddam ineſt, ſed quæ ex
eis igne opificium exercent, igne non præſente, otioſæ ſunt.
Vbi verò illum contigerunt, operoſæ. Quæ item tractabili
rerum materia artem ſuam exercent, veluti aliæ quidem li-
gnis, aliæ coriis, aliæ ſculpendo tum ære, tum ferro, aliis que
ſimilibus rebus earum quàm plurimæ. Opera porro quæ ex
hac materia, & cum huius materiæ inſtrumentis ſiunt, tam
etſi facile retractari ac corrigi poſſunt, tamẽ non magis ve-
locitate, quàm velut decet perficiuntur, neque deſunctoriẽ F
transiliuntur, verùm ſi quod inſtrumentũ deſit, interim quie-
ſcunt, quanquam etiam illis cunctatio & tarditas ad opus
commodius abſoluendũ impedimento ſitiat tamen opus lau-
datur & præfertur. Medicina verò aliquibus quidẽ ex ſuppu-
ratione thoracis, aliquibus verò iuxta hepar & renes, aliis
autem per omnes corporis vètriculos ægrotantibus, eorum
omnium inſpiciendi potentia priuata eſt: quod ipſum apud
omnes in cõfeſſo exiſtit, alias tamen facultates coadiutrices
adiuenit. Vocis nimirum claritatem & tarditatem, itẽm-
que fluxiones quæ ſingulis locis, per quos exitus eis dantur,
deſtillare conſueuerunt, quarum modo odores, modo colo-
res, deinde etiam ponderatam tenuitatem ac craſſitiem ob-
ſeruat, ex eiſque ſigna tum eòrum quæ ægri iam perpetiun-
tur,

A tur, tum quæ perpeti possint, colligit. Quum verò hæc significationem de se præbeant, neque ipsa natura voluntaria dimittat, vires amplius ac necessitates medicina ipsa inuenit, quibus natura coacta indemnitas tamen concedat. Natura autem stimulata & impulsæ, artis peritis quæ facienda sunt demonstrat. Cogit autem partim coalitum in nobis calorem, pituitam per ciborum ac potuum acrimoniam diffundere, quo intelligat quid sibi visum sit de illis, quæ ut viderentur ipsa machinata est: partim verò spiritum velut delatorem, tum viis arduis, tum cursibus accusare ac prodere cogit. Quin & sudores per prædicta ducens ac excludens, humorum calidiorum exhalationem perficit. Sunt præterea
 B quæ per velicam pergressa magis morbum ostendere possunt, quàm quæ per carnem exhalant. Inuenit igitur & tales potiones itémque cibos, qui calidiores aliàs calefacientibus existentes, illaque & eliquant, & profluere faciunt, quæ sanè non profluxissent si non hoc modo tractata fuissent. Alia itaque ex aliis, & alia per alia prodeunt, quæ corpus pergressa morbum ipsum produnt, ut nihil miri sit ipsis serius fidem haberi, & medendi conatus ac aggressiones tardiores esse, quum sic per peregrinas interpretationes ad medendi scientiam ac cognitionem medici perueniant ac erudiantur. Quòd igitur & rationes in seipsa plenas & ad ferendum auxilium abundantes habeat medicina, & quòd morbis qui corrigi non possunt meritò auxiliares manus negat, aut si
 C fortè opem ferre molita est, citra culpam eam exhibet, id ipsum tum iam habitus sermo manifestum facit, tum etiam artis peritorum demonstrationes palam documentum præbent, quas sanè ex operibus iucundius, quàm ex sermonibus ostendunt: utpote qui dicendo non magnopere exercitati, multitudini fidem sinceriolem ex his quæ videat, quàm quæ audiatur facere malint.

•
 Lotium magis morbos indicat.

•
 Proprium artis medicæ.

HIPP

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE VETERI

MEDICINA, IANO COR-

NARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

Prioris ar-
tis medicae
scriptores
saxantur.



Medicam
artem esse,
& veram
asseuerat.

Medicinae
antiquitas.
Certa esse
inuenta in
hac arte.

VICVNQVE de medicina dicere
aut scribere aggressi, dicendi sco-
pum sibiipsis ac fundamentum sup-
posuerunt, calidum aut frigidum,
aut humidum aut siccum, aut aliud E
quodcunque voluerint, rem in com-
pendium contrahentes, principium
causae, tum morborum, tum mor-
tis, hominibus omnibus idē, vnum
aut duo proponentes, hi in multis quidem quae dicunt ma-
nifesto errasse deprehenduntur. Iustior autem querela est de
arte, qua omnes in maximis vtuntur, & bonos artifices ma-
ximè colunt. Sunt autem opifices, alij viles, alij longè prae-
stantes, quod sanè si non esset omnino medicina, neq; in ipsa
obseruationes essent, neque quicquam inuentorum, non vti-
que extaret, sed omnes aequaliter eius ignari & inexperti es-
sent, & per fortunam omnes aegrotorum res gubernarentur. F
Nunc verò res non sic se habet, sed quemadmodum aliarum
omnium artium opifices multum inter se differunt, tum ma-
nu, tum mente, sic etiam in medicina. Quapropter non cen-
seo ego ipsam inani fundamento indigere, velut obscura &
dubia. de quibus si quis dicere conetur, necesse est fundamen-
to vti. Velut si quis de sublimibus in aere rebus, aut de sub-
terraneis dicat, & quomodo habeant sciat, tamen neq; dicenti,
neq; audientibus manifestum satis fuerit verane sint an secus.
Neque enim est ad quod quis se conferat, cuiq; innitatur, vt
veritatem cognoscat. Medicina autē iam ab antiquo existit,
& principium & via inuenta, per quam inuenta & multa &
probe habetia comperta sunt, per multum adeo tempus, & re-
liqua deinceps inuenientur, si quis sufficiens sit, & iam inuen-
torum gnarus, ex his ad perquirendum procedat. Quicūque
verò

Averò his reiectis ac omnibus reprobatis, alia via aliâque forma inquirere conatur, & quid inuenisse gloriatur, falsus est & fallitur. Impossibile enim id est, verum ob quas necessitates impossibile sit, ego demonstrare conabor, docens ac demonstrâs quod ars existat. Ex hoc autem palam fiet, impossibile esse aliquo alio modo inueniri. Videtur autem mihi maximè, de hac arte dicturum oportere vulgo ac plebeis hominibus nota dicere. Neque enim de alio quopiam, neque querere neque dicere conuenit, quàm de affectionibus, ex quibus illi ipsi ægrotant. Ipsos quidem igitur suas ipsorum affectiones condiscere, quomodo fiunt ac desinunt & quibus occasionibus augescunt ac deficiunt, quum idiotæ sint non est facile, verum ab alio inuentas ac proditas, procliue. Nihil enim libentius quisque recordatur quàm quæ sibi ipsi accidisse audit. Si quis autem idiotarum sententia destituetur, & audientes non afficiet, ille etiam veritatis compos non fiet, & propterea neque fundamēto neque scopo opus habet. Et enim Ars medica neque inuēta ab initio fuisset, neque quædiætā vterentur, & assumerēt quæ sani edunt ac bibunt, imò etiam alterius diætæ vsus eis profuisset, si non alia fuissent his meliora. Nunc autē ipsa necessitas homines coegit Medicinam inquirere ac inuenire. Quoniam ægrotis eadem in cibo assumentibus quæ sani solent, non fuit vtile, velut neque nunc vtile existit. Quin vt rem altius expendamus, neque ipsam sanorum diætā ac alimoniam qua nūc vtuntur, inuentam fuisse censeo, si suffecisset homini idem cibus ac potus, qui boui ac equo, & omnibus aliis præter hominē, veluti sunt ex terra nascentia, fructusq; ac herbar & fœnum. Ex his enim nutriuntur, & augescunt, & illæsi degunt, nō indigentes alia diætā. Quanquam ego sanè ab initio etiā hominem tali victu vsu esse putem. Quæ verò nunc inuēta sunt edulia, multa arte excogitata & multo tēpore producta esse mihi videntur, quum multa & grauia, ex forti ac ferino victu homines paterentur, qui intemperatus, & magnas vires habens ingerebatur. qualia sanè etiam nunc ex ipso paterētur. doloribus vehementibus & morbis obnoxij, & breui etiam morti. Verisimile est autem hæc mala tunc minus perpeffos ipsos esse, propter consuetudinem: quanquam etiam tūc ve-

De rebus
cōmunibus
tractat me-
dicina.

Medica ars
est de re-
bus mor-
bisve vul-
go notis.

Quæ de ci-
baris dicat
aspicito.

b

hemen

Hippocratis Liber

Multi prio
re cibo peri
bant.

Panificia
varia.

Medici hūc
cibū exco
gitarunt.

Principia
medicinæ.
Barbarorū
victus.

hemēter afflicti sint, & cōsentaneū est plurimos & debiliore **D**
natura præditos periisse, eos verò qui victū illū superare po
terāt lōgiori tēpore durasse ac restitisse. Quēadmodū etiam
nūc ex validis eduliis aliqui facilē liberātur, aliqui cū mul
tis doloribus ac malis. Ob hāc itaq; necessitatē etiā illi mihi
videntur quæsiuisse victū naturæ cōuenientem, & inuenisse
hunc, quo nūc vtimur. Ex tritico igitur macerato, & à corti
ce purgato, molitōq; ac cribrato, & subactō, ac affato, panem
fecerunt. Ex ordeo verò mazā, aliāq; multa ex hoc excogitā
tes, coxerunt, & assarunt, & miscuerunt, fortiāq; & intempe
rata, debilioribus temperarunt, effringentes omnia iuxta ho
minis naturam ac vires, quæ quidem fortiora essent, ab ipsa **E**
natura non posse superari, si ingesta essent, existimantes: ab
his ipsis quoque dolores & morbos ac mortes oriri iudican
tes: cōtrā ab his quæ natura domare posset, alimentū & aug
mentum & sanitatē. Porro inuento huic quodnā iustius aut
magis cōueniens nomen quis imposuerit quā medicine?
quandoquidem ad hominis sanitatem alimentūq; ac salu
tem inuentum est, in permutationē illius victus ex quo do
lores & morbi fiunt. Si verò ars ipsa esse non putatur, nihil
absurdi est. Nā cuius nemo ignarus est, sed scientes omnes,
ob vsum & necessitatem eius non cōuenit aliquem artificē
appellari. Atqui inuētum ipsum & magnum & multæ artis
ac considerationis existit. Quinetiā in hunc vsq; diem exer
citorum & reparandarum virium curam gerentes, semper **F**
aliquid amplius adinueniunt, iuxta eandē viam inuestigan
tes quod quis edens ac bibens maximē superet, ac seipso for
tior euadat. Consideremus itaque & confessam ab omnibus
medicinam, eam videlicet quæ propter ægros inuēta est, an
& nomen & artifices habeat, & ipsa dominari ipsis velit, &
vnde tandem initium sumpsit. Mihi equidem, velut in prin
cipio dixi, nemo ne quæsiuisse quidem medicinam videtur,
si idem victus & ægrotis & sanis conuenisset. Itaque vsque
in hunc diem hi qui medicina non vtuntur Barbari ac Græ
cis confines, eodem modo quo sani visitant ad voluptatem,
& à nulla re quam concupiscunt, abstinēt, neque quicquam
deuitant. Cæterū qui Medicinam quæsiuerunt ac inuene
runt eandem cū illis de quibus superiori sermone dictū est,
sententiam habuerunt, & primū quidem ex his ipsis cibis
copiam

A copiam detraxerunt, & pro multis paucos statuerunt. Quum verò ipsis aliquādo hoc ad aliquos agros sufficeret, palamque fieret quod prodesset, non tamen omnibus, sed essent quidā ita habentes, ut neque modicos cibos superare possent, imbecilliore sanē quo piā tales indigere illis visū sunt, sorbitionesque inuenerunt pauca ex fortibus multa aqua permiscen-
 tes, & robur ipsum tēperatura ac coctura detrahētes. Quod si qui neque sorbitiones superare possent, his detraxerunt etiam ipsas, & ad potiones peruenerunt, obseruaruntque ut hætum vsu, tum copia moderatē haberent, & neque plures quā oportet, neque meraciores & intēperatiores, neque defectuosiores offerentes. Probē autē nosse oportet quibus sorbitiones in morbis non cōducunt. Nam statim ubi hoc fecerint exacerbantur ipsis febres ac dolores, & manifestum sit, quod assumptū morbo quidem alimentum ac incrementum præbet, corpori verò tabes & infirmitas existit. Quicūque verò homines in hac affectione existentes siccum cibum assument, aut mazā, aut panē, etiam si valde modicū, decuplo magis & manifestius læduntur, quā si sorbitione vti essent, ob nullā aliā causā quā fortitudinē edulij ad affectionē, in quo sorbere cōducit, edere autē non. Si enim plura comederit, plus utique lædetur: si verò pauca, dolebit tamen omnino. Omnes itaque doloris causæ ad idē reducuntur, nimirū fortissima edulia maximē manifestissimē hominē lædere, siue sanus sit, siue ægrotus. Quid igitur aliud cogitasse videri queat hic appellat⁹ Medic⁹, & cōfessus artifex, qui agrorum dietā ac victū adinuenit, quā ille qui ab initio omnib⁹ hominib⁹ victū quo nūc utimur, ex agresti illo ac ferino reperit ac subornauit? Mihi equidē videtur idē modus, & vñ quoddā ac simile esse inuentū. Hic enim ea quæ natura humana sana superare nō potuit incidētia & ingesta, propter feritatem intēperatiāmque, ille verò qualicūque tandē vnus cuiusque affectione teneretur, ut superare nō posset, eadem detrahere quæsiuit ac institit. Quid hoc ab illo differt? præterquā quod multiplicior & variegatior ac maioris negotij est hæc species. Verū principiū fuit illa quæ prius est producta. Si verò quis cōsideret quæ sit ægrotorū diætā, cōparatione ad sanorū dietā facta, is inueniet hæc agris nocētiorē quā eā quæ ferarū est & aliorū animalijū sanis. Etenim vir laborās morbo

Sorbitionū
& potionū
inuentio.

Quid ob-
seruandum
medicis.

Cibus sanorum
languē
tib. obest.

Duorū ho-
rum nutri-
catuum dif-
ferentia.
Medicina
in Chirur-
giam, phar-
maceuticā,
& Diæti-
cen.

Ciborū cō-
paratio.

Hippocratis Liber

neq; difficili & intolerabili, neq; rursus leui & despicabili, si panē aut carnē, aut aliud quid ex his quæ sani edētes iuuantur, comedere volet, nō multū, sed multo minus quā sanus poterat, cōtingat autē vt nec sit qui eum delinquere admoneat. Alius contra sanus naturam habens non omnino debilem, neque rursus fortem, si comederit quid eorum quæ bos aut equus comedens iuuatur, & edat sane eruum aut ordeū, aut aliud quid huiusmodi, non multum, sed multo minus quā potest. Sanus vtique qui hoc fecerit, minus, & dolebit & periclitabitur quā agrotus ille, qui panē aut mazā intē pestiue ingessit. Hæc itaque omnia signa sunt, quod ipsa ars medica via ac methodo quæ sita inueniri possit. Si quidem igitur simpliciter, velut aliqui putant, quæ fortiora sunt, nocerent, quæ debiliora, prodesse & nutrire, tum agrū, tū

quis erret in ægrotis. sanum, facilis sanē res erat. Multum enim de securo detrache oportebat vt ad debilissimum deduceretur. Nūc autē non minus delictum, nec minus lædit hominem, si pauciora & defectuosiora quā satis est, assumantur. Fames enim magnā potentiā in naturā hominis habet & sanandi & debilitandi & occidendi. Multa verò etiam alia mala, diuersa quidem ab his quæ ex repletionē fiunt, non minus autem grauiā, vacuationis sunt, quapropter multo variegatior est, & maiorem diligentiā requirit. Oportet enim modū aliquem coniectare. Modum autem neque pondus, neque numerum aliquem, ad quem referas cognosces: certitudinem enim exactam nō reperiēs aliā quā corporis sensum. Quapropter operosum est ita exactē cōdiscere, vt parum in alterutrā partem delinquas: quanquā ego etiā cū medicum vehemēter laudarem, qui parum delinquat. Certitudinē autem exactā raro videre contingit. Quare plerique Medici eadē quæ magistri gubernatores in se admittere mihi videntur. Etenim illi quum in tranquillitate gubernantes delinquant, non fiunt manifesti: quum verò deprehenderit ipsos ventus magnus & tempestas, palām iam cōspicui sunt omnibus hominibus, quod ignorantia & culpa erroris sui nauem perdiderūt. Sic sanē etiam mali & plurimi medici, quū curant homines nihil graue patiētes, in quos si quis etiam maximē delinquat, nihil graue faciat. Sunt autē multi tales morbi, & multo sepius quā graues hominib⁹ accidunt. In talibus sane delinquentes, non

Medicos nam
uiri rectori
bus compa
rat.

l. de san.

A tes, nō fiunt manifesti idiotis hominibus. Vbi verò obtigerit magnus & fortis & periculosus morbus, tunc ipsorum delicta & ars omnibus in conspicuō sunt. Neque enim longè ab-
sunt singulorum pœnæ ac cruces, sed breui adsunt. Quod au-
tem non minores afflictiones ab intempestiua vacuatione
quàm à repletionē hominibus cōtingant, probè discemus si
in sanis rem expenderimus. Sunt itaque aliqui ipsorum qui
bus semel in die cibum capere conducit, & hoc proper utili-
tatem sic obseruant. Alij etiam prandent, propter eandem
necessitatem, sic enim ipsis conducit: Sed & quidam nō pro-
pter utilitatem, sed aut ob voluptatē, aut ob alium aliquem
casum alterutrum faciunt. Plurimorū enim hominum nihil
B interest vtrum tandem faciant, siue semel tantum edant siue
etiam prandeant, hac consuetudine vti. Sunt autem quidam
qui non possint extra utilitatem facientes facile degere, sed
contingit vtrisque ipsorum, per diem vnum atque eum non
ociosè permutatibus, immēsa afflictio. Alteri enim si pransi
fuerint, idque eis non conducit, statim graues & corpore se-
gnes fiunt, itēq; mente pigri, hiatūq; ac oscitatione & dor-
mitione & siti pleni. Si verò etiam insuper cœnauerint, &
flatus, & tormina, & aluus effringitur, & multis magni mor-
bi principiū hoc fuit, si eosdē cibos quos semel insumere cō-
sueuerunt, bis assumant, & nihil his ampliūs. Alteri verò si
prandere consueuerunt, idque ipsis conducit, & non pransi
fuerint, mox vbi tēpus praterierit, statim impotentia vehe-
C mēs, tremor, animi deliquiū, postea oculi pallidi, vrina cras-
sa & calida, os amarum, & viscera pendere ipsis videtur, ver-
tigo, iracundia, tristitia, hæc autem omnia vbi cœnare tenta-
uerint. deinde autē pransuri cōsumere nō possunt quæ prius
cœnarunt. atq; hæc ipsa cū tormine ac strepitu descendētia
aluum concludunt, ipsiq; agrè dormiunt, insomniāque con-
turbata ac tumultuosa habet, plerisq; verò etiam horū hoc
magni morbi principium fuit. Cōsiderare porrò oportet ob
quas causas hæc ipsis acciderūt. Et sanè puto his qui semel ci-
bum sumere cōsueuerunt, quod nō expectauerunt iustū tem-
pus, donec ipsorum vter prius ingestos cibos perfectè con-
sumpsisset & exuperasset, euacuatūque esset ac quieuisset,
sed in feruentem adhuc & fermentatum nouos ingesserunt.
Eiusmodi autē ventres multò tardius concoquūt, & maiori

Quando er-
ror patet.

Sumēdi ci-
bi varietas.

Hæc eadē
de omni-
bus aut

Cū hora ci-
bi præterit,
quid fiat vi-
deto.

Cur variè
hi affician-
tur.

Qui diu ci-
ho abstinēt,
quid patia-
tur.

Cum nō sem-
per in arte
medica at-
tingitur ve-
ritas.

Suppositū
hominis,
materiæve.

Hoc consi-
derato.

Potissimū
auxilium.

opus habent cessatione ac quiete. His verò qui prandere af- **D**
fueti fuerunt, quòd nō vbi citissimè alimento corpus indige-
bat, & iam priora consumpta erant, nec habebat aliquā am-
plius fruitionem, statim ipsi nouum alimentum suppedita-
tum est: deficit autē & cōsumitur præ fame. Nā omnia quæ
tales homines perpeti dixi, fami imputo. Dico autem etiam
alios omnes homines, qui duos aut tres dies in ediam pertu-
lerint, eadem passuros esse, quæ de impransis dixi. Caterū
tales naturas quæ citò & fortiter eiusmodi delictis offendū-
tur, imbecilliores aliis esse censeo, proximus est autem im-
becillis languenti: verū imbecillior est languens, & plus
laborare contingit ipsum, vbi iustum tempus nō est assequu-
tus. Quum itaque eiusmodi exacta certitudo circa artē exi- **E**
stat, difficile est semper quod rectissimum est assequi. Multæ
autem species in Medicina ad tantam certitudinem perue-
niunt, de quibus dicetur. Non censeo itaque propter hoc ar-
tem velut non existentem, neq; probè inuestigatā, veterem
oportere reiici, quòd non habeat circa omnia certitudinem
exactā. Verū multò magis propterea quòd propinqua est
recto, simulque ratione possit ad ipsum peruenire, admirari
oportere censeo ea quæ ex multa ignoratiā sunt eruta & in-
uenta, quòd probè & rectè adinuenta sunt, & non à fortuna
aut casu. Porro ad eos qui nouo modo artē ex scopis ac fun-
damentis suppositis quærunt, sermonem reducere volo. Si
enim calidum est aut frigidum, aut siccū, aut humidū, quod
hominē lædit, & oportet rectè medentem auxiliari, calido **F**
quidem in frigidum permutato, frigido verò in calidum,
sicco in humidum, humido in siccum contingat mihi homo
non fortis naturæ, sed ex debilioribus, hic autem triticum
edat quod ex area sustulit crudum & nō elaboratum, & car-
nes crudas, & bibat aquam. Hoc victu vtens satis scio quòd
multa & grauiā perpetietur, Nam & doloribus vexabitur,
& corpus debile euadet, & venter corrūpetur, & multò tem-
pore viuere non poterit. Quòd igitur auxilium præparare
oportet sic habenti? calidum an frigidum, vel siccum, vel hu-
midū? simplex enim est quodcunq; ex istis. Si enim id quod
ipsum lædit aliquod ex his est, contrario soluere oportet ac
liberare, quæadmodū ipsorū sermo testatur. Atqui certissi-
mū & manifestissimū medicamentū est, victū quo utebatur
auferre

A auferre & pro tritico panem dare, pro crudis verò carnibus coctas, insupérq; vinum propinare. His permutatis impossibile est non fieri sanū, nisi penitus fuerit tēpore ac victu corruptus. Quid itaque dicemus? Num quòd ipsi à frigido afflicto calida hæc oblata auxiliū tulerunt, aut contrà? Equidem opinor me multam hæsitationem interrogato præbiturum esse. Nā qui panem ex tritico parauit, calidū, aut frigidum, aut siccum, aut humidū abstulit: panis enim & in ignem & in aquam datur, & multis aliis elaboratus est, quorum singula propriā vim & naturā habent, & aliqua quidem à natura in ipso existentia abiicit, aliis autē temperatur ac permiscetur. Sed & hoc scio, quòd in corpus hominis refert pa-

B nis purus, aut cui nihil furfurum decessit, & ex tritico nō decorticato aut decorticato, & multa aqua subactus, aut contrà, & superassatus aut crudior, aliāq; præterea infinita. Similiter etiam de maza, & singulorum adeò vires magnæ, alteraque alteri nihil simile habet. Quicunq; autē hæc nō considerans nō nouit, haud scio quo modo ille affectiones in homine cognoscere possit: ab vnoquoque enim horū afficitur & alteratur homo, vel hoc, vel alio modo, & ex his omnis vita & sano, & ex morbo cōualefcenti, & ægroto. Nihil igitur vtilius neque magis necessariū quàm hæc cognouisse: quod & probè & cōuenienti ratiocinatione inuestigātes, iuxta hominis naturā hæc primi inuentores inuenerunt, iudicaueruntque artem dignā quæ deo adscriberetur, quemadmo-

C dum etiam est receptū. Non enim siccum neque humidum, neque calidum, neq; frigidum, neque aliud quicquam ex his putauerunt hominem lædere, neque aliquo horum homini opus esse opinati sunt, sed quod in vnoquoque forte & humana natura potentius est, quòdque non possit superare, hoc ipsum lædere duxerunt: & hoc auferre quæsiuerunt. fortissimum autē est inter dulcia, dulcissimum, inter amara, amarissimum, inter acida, acidissimum. & in omnibus adeò rebus vigor ipse ac summū. Hæc enim & in homine inesse viderunt, & hominē lædere. Inest enim in homine & amarum & salsum, & dulce, & acidum, & acerbum, & fluidum, & alia infinita, omnigenas facultates habētia copiāque ac robur. Atque hæc quidē iuxta ac inter se temperata, neque conspi-

cua sunt, neque hominē lædūt. Vbi verò quid horū secretum

Panis differe-
rentia.

Maza.
Quæ pro-
spicienda
medico.

Quid spe-
ciant pri-
mi artis in-
uentores.

Quæ valen-
tissima.
Qui humo-
res succive
& sapores
sint in ho-
mine,

Quæ per-
turbent.

Qualis pa-
nis, puls, ma-
záve.

Calidū, hoc
vel contra
ne sit, cer-
tum nō est.

Quare hoc
calidum il-
lud contra
putatur.

fuerit, atque ipsum in seipso fuerit, tunc & conspicuum est, D
& hominē lædit. Quin & ex cibis quicunque nobis incom-
modi sunt, & ingesti hominē lædunt: horum vnusquisq; aut
amarus est & meracus ac intemperatus, aut salus, aut aci-
dus, aut alius quis intemperatus & fortis: & propterea turba-
mur ab ipsis, quemadmodum etiā ab his quæ ex corpore ex-
cernuntur. Omnia autē quæ edit aut bibit homo, talia edu-
lia palām est minimē hoc intemperato, & dissidente ac ex-
cedente succo participare, velut sunt panis & maza & his si-
milis, quibus adfuetus est homo plurimis & semper vti: ex-
ceptis his quæ ad voluptatē ac delicias condiuntur ac præ-
parantur: & ab his plurimis in hominē ingestis turbatio ac
secretio corporis facultatū minimē cōtingit. Verum robur E
& augmentum, ac alimentū præsertim, per nihil aliud con-
tingit quā quod probe temperatum est, & nihil habet in-
temperatum, neque forte, sed totū vnum factum est & sim-
plex & non forte. Et valde sanē dubitō ego, quōnam modo
hi qui talē sermonem proferunt, & artem ex hac via ad sco-
pum abducunt, curaturi sint homines, quemadmodū propo-
nunt. Non enim est ipsis, velut ego opinor, inuentum quid,
ipsum in seipso calidum, aut frigidū, aut siccum, aut humi-
dum, quod nulla alia specie communicaret. Verū arbitror
eosdem potus ac cibos ipsis esse, quibus omnes vtimur. Ap-
ponunt autem alij quidem, quod sit calidus, alij frigidus, alij
quod siccus, alij humidus. Quoniā illud sanē dubium est, im-
perare agroto calidum quid assumere: statim enim interro- F
gabit quid sit illud, vt nugas producere necesse sit, aut ad ali-
quid eorum quæ sunt cōfugere. Si autem est calidum quod-
dam acerbum existēs, aliud vero calidum fluidum, aliud ca-
lidum tenue, sunt enim & alia calida etiam alias vires sub-
contrarias sibi ipsis habentia, quod igitur ipsorum assumere
oportebit? calidum & acerbum, an calidum & fluidum, aut
simul frigidum & acerbum? Nam & hoc est, itēque frigi-
dum & fluidum. Etenim quod ego scio, totum cōtrarium ab
vtroque ipsorum euenit, idque nō solū in homine, sed etiā
in corio ac ligno, & aliis multis rebus quæ magis stupidum
sensum habent quā homo. Non enim calidū est quod ma-
gnam vim habet, sed ipsum acerbum & fluidum, & alia quæ
à me relata sunt, tum in homine, tum extra hominem, siue
edantur,

A edantur, siue bibantur, siue forinsecus illinantur, aut quomodocunque formata adhibeantur. Frigiditatem autem & caliditatem ego omnium facultatum minimè potentes esse in corpore existimo, ob has sanè causas. Quo equidem tempore ipsa inter se permixta simul frigidum ac calidum fuerint, non lædunt. Temperamentum enim & moderatio contingit frigidum à calido, & vicissim calidum à frigido. Vbi verò seorsim vtrunque secretum fuerit, tunc affligit. In hoc itaque tempore quum frigidum intus generatur, & cito hominem affligit, primum propter hoc ipsum adest calidum inde adeò ex homine ipso, nullo alio auxilio, neque præparatione opus habens, atque hoc & in sanis hominibus & in

Contraria
cōmixta nō
lædunt.

B ægrotis operatur. Itaque si quis sanus hyeme corpus perfrigerare velit, aut frigida lotionem, aut alio quopiam modo, quanto id amplius fecerit, si modo non omnino corpus congeletur, ubi vestimenta acceperit, & sub tegmen venerit, magis & amplius corpore calescit. Rursus si quis fortiter cal fieri velit, aut calido lauacro, aut multo igne, inde verò eandem vestem habens in eodem loco conuersari, in quo perfrigeratus, multo apparebit frigidior, & longe horridior, quàm aliquis qui præ estu ventilationem admisit, & sibi ipsi frigus præparauit, atque sic ex hoc modo recreatus est. Nam qui hoc facit, decuplo maiorem æstum ac ardorem percipit, quàm is qui nihil tale facit. Verum sunt adhuc testimo-

Qui calor,
& frigus
cōcipiatur.

C iter facientes, excellenter frigescent aut pedibus aut manibus aut capite, ubi se continuerint in noctem, quum cooperiti fuerint & in tepore extiterint, ab æstu & pruritu vexantur, quibusdam etiam bullæ velut ambustis ab igne exurgunt, neque prius hoc patiuntur quàm calfiant: adeò promptè vtrunque ipsorum ad alterum accedit. possem & alia innumera recensere. Cæterum circa ægrotos, nōne quibus rigor contingit, his acutissima febris relucet? sed non adeò fortiter, verum pauco tempore quiescens, & aliàs ferè innoxia, & quo tempore affuerit, percalida, & per totum corpus penetrans, desinens maximè in pedes, ubi sanè rigor & frigus validissimum diutissimè duravit. Rursus quum sudor prodierit & febris decesserit, multò magis frigescit æger, quàm si ne apprehendisset quidem ab

Quid per
niues ge-
lūque cun-
tibus eue-
niat.

b s initio.

Quorum
morbū ca-
lor nō sta-
tim cessat.

I. Destillatio
n. um signa.

Destillatio
nes oculo-
rum.

initio. Cui igitur breui adeo contrarium accedit, cuique vis D
adimitur sua sponte, quidnam ab hoc malum aut graue
fiat? aut quid opus est multo ad hoc auxilio? Verum dixe-
rit aliquis, Qui ardenti febre febricitant, itemque peri-
pneumoniis, & aliis fortibus morbis, non cito ex calore li-
berantur, neque adest hic frigidum aduersus calidum. Atqui
ego hoc maximum signum esse puto, quod non propter ca-
lidum simpliciter homines febricitent, neque hoc sit sim-
pliciter afflictionis causa: sed est & amarum ac calidum
idem, & calidum ac acidum, & salum ac calidum, & alia
infinita, & rursus frigidum cum aliis facultatibus coniu-
ctum. hæc itaque sunt quæ lædunt, simul adest autem & ca-
lidum robore participans, nimirum ducens & exacerbans E
& augens simul cum illis, verum nullam potentiam, maio-
rem quam conuenit videlicet, habens. Atque hæc quidem
sic se habent. Signa porro primum quidem manifestissima
producemus, quorum omnes iam sæpe experientiam sum-
psimus. Itaque quibuscunque nostrum grauedo innascitur,
& fluxus per nares mouetur, hic ut plurimum acrior est eo
qui prius erat, & quotidie ex naribus prodibat, & tumesce-
re facit nasum, & exurit calentem & extremè ignitum. si ve-
rò manum admou eas, & diutius perseuerauerit, etiam exul-
ceratur locus minimè carnosus & durus existens. Sedatur
autem aliquo modo ardor in naribus, non quum fluxus
prodit, & inflammatio consistit: sed postquam fluxus cras-
sior & minus acris, concoctusque & magis permixtus prio- F
re fuerit, tunc sanè iam etiam ardor cessat. Rursus autem
aliis ex frigidity ipsa sola manifestè grauedo fit, nullo
alio accedente. Omnibus autem liberatio hæc est, ut ex fri-
giditate quidem affecti percalfiant, ex ardore verò perfri-
gerentur, atque hæc breui accedunt, & concoctione nulla
opus habent. Reliquæ autem omnes fluxiones quas pro-
pter humorum acrimonias & intemperantias ego fieri sen-
tio, restituntur & curantur, ubi temperatæ fuerint & con-
coctæ. Rursus quæcunque fluxiones ad oculos vertuntur ut
fortes & omnigenas acrimonias habentes, exulcerant qui-
dem palpebras, erodunt autem aliquorum genas, & sub
oculis partes ad quasque tandem influxerint, rumpunt
etiam & peredunt eam quæ oculum ambit tunicam. dolores
autem

- A** autem & ardor, & inflammatio extrema adsunt aliquandiu, donec fluxiones fuerint concoctæ, & crassiores redditæ, & leuæ ab ipsis extiterint. Fit autem concoctio, ex permixtione, temperaturæque mutua, & quasi coctura. Quinetiam fluxiones in fauces delabentes, ex quibus raucedines fiunt, angina, erysipelata, peripneumoniæ: Omnes hæc primùm quidem falsæ & humidæ acrisque descendunt, & in talibus morbi firmanantur. Vbi verò crassiores & maturiores factæ fuerint, & ab omni acrimonia liberatæ, tunciam & febres, & alia hominem lædētia soluantur. Oportet autem utique causas vniuscuiusque ea putare, quæ quum adsunt, talem modum fieri necesse est, quum permutantur in aliud temperamentum, cessare. Quando igitur ab ipsa caliditate sincera, aut frigiditate fluxiones contigerint, & nulla alia facultate participauerint, sic sanè sedabuntur, vbi ex frigido in calidum permutatæ fuerint, & ex calido in frigidum. Permutantur autem eo quem dixi modo. Amplius porrò etiam alia quæcunque mala homo patitur, omnia à facultatum potentiis proficiuntur. Itaque quum amaritudo quædam diffusa fuerit, quam bilem flauam appellare solemus, quales statim anxietates & astus & impotentia occupant? Verum vbi liberati fuerimus ab illa & purgati, aut sponte, aut per medicamentum, si modò tempestiue quid ipsorum fiat, manifestè & à doloribus & à calore liberamur. Quanto autem tempore eadem eleuata fuerit, & cruda & meraca ac intemperata, nulla arte neque dolores, neque febres sedare possis. Et quos quidem acuta acrisque ac æruginosa bilis affligit, quales mox rabies, & morsus viscerum ac pectoris, & desperatio? Non sedantur autem hæc priusquam eadem expurgetur & prosternatur, & aliis permisceatur. Concoqui autem & permutari, attenuarique ac crassescere in humorum speciem, per multas & omnigenas species contingit. Quapropter & iudicationes, & numeri temporum, in talibus multum possunt. Hæc verò omnia minimè contingit calidum aut frigidum perpeti. neque enim hoc putrescere neque crassescere poterit. Quid autem ipsum esse diceremus? & temperamentum ipsorum est, veruntamen inter ipsa mutuo vim habens, quoniam nulli alij permixtum calidum, desinit esse calidum, quàm

Causa
Rheuma.

Causa ho-
rum malo-
rum.

Mala ho-
mini vnde
accidant.

ἀπορία.

Calor &
frigus non
putrescit.

Quæ in ho-
mine mi-
stio bona.

Hominis
bona dispo-
sicio.

Quid opor-
teat medi-
cos scire.

Quid sit
homo, &
quomodo
gignatur,
sciat medi-
cus.

Casus esu
malus.

Temeton
bonum nō
est.

Casus ma-
lus est.

quàm frigidus: sic rursus nō permutatur alio frigidum quàm D
calido. Reliqua omnia in homine, quantò pluribus miscen-
tur, tantò mitiora ac meliora fiunt. At verò homo omnium
optimè dispositus est, ubi concoquit & in quiete est, nullā pe-
culiarem vim præ se ferens. De his igitur videor mihi abun-
dè demonstrationem fecisse. Porro Medici quidam itémque
Sophistæ dicunt, quòd impossibile est medicinam cognosce-
re, eum qui non nouit quid sit homo, & quomodo primùm
factus & compactus sit. Ego verò ea quæ alicui Sophistæ aut
Medico, de natura dicta sunt aut scripta, minùs censeo medi-
cæ arti conuenire quàm pictoriæ. Iudico autem de natura
aliquid manifestum ac euident cognoscere, ex nulla parte E
aliunde contingere quàm ex Medicina, atque hoc tunc con-
discere possibile est, ubi quis ipsam medicinam totam rectè
comprehenderit. Verùm quatenus illi prodiderunt, multi
mihi cognouisse videntur, cognouisse autem dico, narratio-
nem scilicet hanc, Quid est homo, & ob quas causas nasci-
tur, & reliqua diligenter. Atqui mihi necessarium esse vide-
tur, ut omnis Medicus de natura sciat, & omni studio anni-
tatur ut cognoscat, si modo aliquid eorum quæ fieri debent
rectè præstare velit, Quid est homo ad ea quæ comeduntur
ac bibuntur cōparatus, & quid cuique ab vnoquoque contin-
get & accidet, & non simpliciter sic existimare, quòd malum
edulium est caseus. Dolorem enim affert repleto ex ipso. Sed
quem dolorem, & propter quid, & cui parti intra hominem
existenti incommodum existit. Nam & alia multa edulia ac F
pocula natura mala sunt, & afficiunt hominem non eodem
modo. Proferatur autē mihi verbi causa aliquid, velut Vi-
num meracum multum potum hominem aliquo modo de-
bilem reddit, & omnes, qui viderint hoc fatentur & cognos-
cūt, quod hæc est vis vini, & quod ipsum est causa, & in quas
in homine partes maximè possit, nouimus. Talem itaq; ve-
ritatem etiam de aliis ostendere volo. Etenim caseus (quan-
doquidem hunc in exemplū adsumpsi) non omnes homines
ledit, sed sunt qui ex ipso repleti, ne tantillum quidem offen-
duntur, imo gracilibus mirabiliter etiam cōferre proditur.
Sunt autem qui difficulter summoventes ipsum ab eo libe-
rantur. Horum verò naturæ differunt, differuntq; etiā iuxta
hoc quod est in corpore caseo cōtrarium. Nam à caseo exci-
tatur

A tatur & cōmouetur, in his quibus eiusmodi humor multus in corpore existit, & quo magis hic potens est, eo magis verisimile est ipsos malè affligi. Si verò toti humanæ naturæ malus esset, omnes vtique laderet. Hæc autem si quis nouisset, non incurreret ea neq; sanè pateretur. In refectionibus conualescentium ex morbis, insupérq; in longis ægritudinibus, multæ conturbationes & præuaricationes fiunt, partim sua sponte, partim à quibuslibet temere admissis. Noui autem medicos multos velut idiotas, qui vbi illi die aliqua noui quippiam fecissent, velut si lauissent, aut deambulassent, aut quid alienum comedissent, atq; hæc omnia melius esset adhibuisse quàm non, nihilominus tamen causam alicui ex his contributebant, verà quidem causam ignorantes, & fortassis

B id quod commodissimū erat damnantes. Quod ipsum certe facere non oportet, sed scire quid balneū intempestiue adhibitum operetur, quid item fatigatio & lassitudo. Nunquam enim eadem afflictio ab his prouenit, neque etiam ex repletione, neque ex cibo tali vel tali. Quisquis igitur hæc non cognoscet quomodo singula se habeāt ad hominem comparata, is neque cognoscere quæ ab ipsis fiunt potest, neque rectè vti. Caterū & hæc cognoscere oportere mihi videntur, nimirum quæ affectiones homini ex facultatibus ac potētis, quæ item ex figuris adueniūt. Quod autem dico tale est, Nempe facultatem quidem esse, humorum summas vires ac robur nosse. Figuras autem dico quæ in ipso homine insunt.

C enim cauæ sunt, & ex amplitudine in arctū coactæ, aliæ expansæ, aliæ solidæ & rotundæ, aliæ latæ & peniles, aliæ extensæ, aliæ longæ, aliæ densæ, aliæ raræ & hiantes, aliæ spongiformes ac molles. Quæ igitur ex his trahere ad sese allicerèq; humiditatē ex reliquo corpore maximè possunt? Num cauæ & expansæ, an solidæ & rotundæ, aut cauæ & in arctum ex amplitudine coactæ? Equidem puto tales esse, quæ ex cavitatē & amplitudine in arctum sunt coactæ, Id quod ex manifestis forinsecus condiscere oportet, partim quidem quod ore hians nihil sanè humoris attraxeris, vbi verò labra foras produxeris, contraxerisque ac compresseris, insupérque fistulam admoueris, facile sanè attraxeris quicquid volueris. partim verò quod cucurbitæ quæ corpori adponi solent, ex amplitudine in angustiam arctatæ ad hoc factæ sunt, ad trahendum

Medico
quid pro-
spiciendū.

παθήμα-
τα.
διὰ μέν
σχέματα.
χυμός.

Figura
schematicā
ve.

Patentia
non sorbēt.

Cucurbi-
tulæ forma
cur talis.

Hippocratis Liber

dum videlicet & alliciendum ex carne. Sunt autem & alia **D**
Caput, vesica & vterus. multa eiuscemodi. Verum intra hominem natura & figura
 talia, sunt vesica, & caput, & vterus in mulieribus: atque hæc
 manifestè maximè trahunt, & semper plena sunt attractæ
 humiditatis. At verò cavæ & expansæ figuræ, influentem qui-
 dem humorem maximè omnium susceperint, non autem si-
 militer attraxerint. Solidæ autem & rotundæ, neque attra-
 xerint, neq; susceperint: dilabitur enim & non habet sedem,
Lien, pulmo, & mamma. in qua maneat. Spongiformes verò & molles, velut lien, pul-
 mo, & mamma, ubi ad motum maximè fuerint & adhæserint,
 ebibunt, duræque fiunt ac augescunt humore accedente, ma-
 ximè pulmo. Non enim in vetriculo inest, in quo humorem **E**
 extrinsecus contineat ipse ventriculus in quo est humor, ut
 quotidie exhauriatur, sed quum biberit & susceperit ipse in
 seipsum humorem, & vacua & rara ac parua penitus explen-
 tur, & pro raro ac molli, durus ac densus euadit, & neq; con-
 coquit, neque dimittit. Atque hæc patitur propter figuræ na-
 turam. Quæcunque autem flatum & reuolutiones operatur
 in corpore, ea in cauis ac amplis, veluti vêtre ac pectore, stre-
 pitum ac sonitum facere solent. Etenim quod non sic repleant
 ut stent, sed habent transmutationes & motus, necesse est ut
 ab ipsis & strepitus & manifestæ commotiones fiant. Quæ-
 cunq; verò carnosæ sunt & mollia, in talibus torpores & ex-
 crescentia, velut in trucidatis fiunt. Cæterum quum incide-
 rit flatus in latum ac renitens, & aliquid ipsi resisterit, idque **F**
 natura fuerit neque forte, ut aduersus violentiam durare
 possit, & nihil mali pati: neque molle & rarum, ut excipere
 ac cedere queat: verum tenerum & floridum & sanguineum
Hepar. Flatus quid agat. ac densum, velut hepar, quod propter densitatem quidem ac
 latitudinem resistit ac non cedit, flatus verò subiens augescit
 ac fortior euadit, & aduersum reluctans maximè impetum
 facit. propter teneritudinem autem & sanguineitatem, absque
 doloribus esse non potest, & propter has causas, dolores acu-
 tissimi ac frequentissimi circa eum locum contingunt, sup-
 purationesq; ac tubercula plurima. Fiunt etiam circa septum
Dolor vnde. transversum fortiter, sed multominus. Distentio enim septi
 transversi lata est & renitens, natura autem nervosior & robu-
 stior, quapropter minus dolore affligitur: fiunt tamen & do-
 lores & tubercula circa ipsum. Multæ verò etiam aliæ & ex-
 tra &

A tra & intra corpus figurarum species sunt, quæ magnopere inter se differunt: quod ad affectiones pertinet, tum aegroto, tum sano: velut capita parua aut magna, colla tenuia aut crassa, longa aut breuia, ventres longi aut rotundi, pectoris & costarum latitudines aut angustia, & alia infinita, quæ omnia nosse oportet quatenus differant, quo causas singulorum cognitas probè obserues. De potètiis autem humorum perspectum habere oportet, quid singuli ipsorum in homine facere possint quemadmodum etiam prius dictum est, quomodo cognationes inter se habeant. Quod dico tale est, An videlicet dulcis humor in aliam speciem mutetur, non à contemperamento, sed ipse desciscens & immutatus ab eo, qualis primum fuerat, amarus aut salus, aut acerbus, aut acidus. Sit sanè acidus. Ergo acidus humor reliquos præcellens, maximè in commodus fuerit: si utique dulcis, omnium commodissimus existit. Id quod si quis forinsecus quærens consequi possit, is semper quod melius est ex omnibus eligere queat. Optimū autem est, quod longissimè ab incommodo abest.

Capitis & colli differentia.

Succorum saporūve consideratio.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE MEDICO,

IANO CORNARIO MEDICO PHYSICO

INTERPRETE.

C



IC LIBER Medici gubernatio est, & præceptum quomodo officinam medicam instruere oportet. Medici equidem gubernationem esse putamus, ut videat quo bono colore, & bona, ac carnosa corporis habitudine præditus sit, iuxta existentem in ipso naturā. Vulgus enim existimat eos, qui nō sic bene dispositum corpus habent, neque aliis bene prospicere posse. Deinde ut opinionem capter apud ipsum vulgus vestitu decoro, & vnguentis odoratis, non suspectum odorem ad omnia habentibus. Inde enim aegrotos iucunde affici contingit. Postea animaduertere

Medicus: qualis esse debeat.

Quo gestu
adeundus
est æger.

Qualis de-
beat esse
medicus.

Quid pri-
mum obser-
uet medi-
cus.

Luminis
ratio.

Luxum
domesticū
prohibet.

Linteola.

uertere ipsum oportet ut animum habeat modestum, non D
solum quod ad taciturnitatem attinet, sed etiam circa reli-
quam vitam probe compositum. Maximè enim ad opinio-
nem ac auctoritatem comparandam conducit, bonis ac hone-
stis moribus præditum esse. Nam quum talis fuerit, omni-
bus venerandus ac humanus iudicabitur. Promptitudo enim
temeraria, & facilitas contemnentur, etiam si valde com-
moda existant. Scopum autem præfigere oportet potesta-
tem facultatum suarum. Nam eadem ab iisdem non abun-
dantibus boni consuluntur. Figuram faciei habeat medita-
bundam ac subtristem, non tamen amarulentè. Contumax
enim esse videbitur & homines odio habens. Qui verò in-
risum exolutus est, ac nimium hilaris, onerofus iudicatur. E
Hoc itaque vitandum est, vel maximè. Iustum autem ad om-
nem conuersationem esse conuenit. Iustitia enim mul-
tum auxiliatur. Non exigua autem commercia ægris cum
medico sunt. Nam seipsum medicis subditos faciunt, & omni
hora vxoribus, virginibus, & opibus maximi pretij, illi oc-
currunt. continenter igitur ad omnia hæc se habere oportet
animo itaque ac corpore sic dispositum esse conuenit. Porro
præcepta ad artem medicam, per quæ artificiosus esse vide-
bitur, ab initio considerabimus, ex quo primum homo di-
scere incipit. Quæ igitur in officina medica curantur, ferè
ad discentes pertinent. Primum quidem locum domus ha-
bere oportet, qui sanè talis sit, ut neque ventus ad ipsum ac-
cedens molestus sit, neque Sol, neque splendor infestet. Lux F
enim splendida medentibus quidem non est molesta, non si-
militer autem ægrotantibus. Itaque talem splendorem pe-
nitius fugere oportet, per quem oculos ægrotare contingit.
Tale igitur præceptum de luce obseruetur. Deinde ut nequa-
quam faciem aduersam splendori habeat. Infestat enim vi-
sum debilem, omnis autem occasio sufficiens est ad debiles
oculos conturbandos. Luce itaque hoc modo utendum est. Sel-
læ autem æquales altitudine sint quatum eius fieri potest, ut
in ipsis ægri collocentur. Aeramento exceptis instrumentis,
nullo utatur. Ornatus enim onerosus mihi esse videtur, tali-
bus vasis uti, Aqua exhibenda est ægris potabilis & pura. Ex-
terforiis utendum est puris ac mollibus, ad oculos quidem,
linteis, ad vulnera verò, spongiis. hæc enim per se probè au-
xiliari

A xiliari videntur. Omnia autem ritè fabrefacta ad vsum esse
 oportet, magnitudine, grauitate, ac tenuitate. Quæ verò of-
 feruntur omnia confiderare oportet vt conferat, maximè si
 ægrotæ parti adhibebuntur. Talia autem sunt, ligamenta &
 medicamenta, & lintea circa vulnus, & cataplasinata. hæc
 enim lōgiffimo tempore circa ægrotantes locos sunt. At ve-
 rò ablatio horum, refrigeratiōque ac mundificatiō & aqua-
 rum affusio, pauco tempore absoluuntur. Diligenter autem
 confiderare quid horum faciendum fit oportet, & vbi magis
 aut minus ea adhibere conuenit. Vtrorūque enim vſus op-
 portunis, itēque negligentia, magnam differētiam habet.
 Est autē propria & genuina medicinæ deligatio, ex qua æ-
 ger opē ſentit. Maximè autem profunt duo hæc, quibus vtē-
 dum eſt, cōprimere videlicet vbi oportet, & remiſſè deliga-
 re. Iuxta horæ verò tempus, quando integrè oporteat & nō,
 videndum eſt, vt neque debili, neque fortiore alterum horū
 vtaris. Concinnas autem deligationes ad ſpectaculum com-
 paratas, & nihil iuuantes, reprobare oportet. Onerosæ enim
 ſunt, & omnino petulantes, ſæpe verò etiam damnum dede-
 runt. Quærit autem æger non ornatum, ſed auxilium. Cate-
 rū in chirurgis quæ per ſectionem aut vſtionem fiunt, ve-
 locitas ac tarditas æqualem laudem merētur. Eſt enim vtri-
 uſque vſus. Nam in quibus per vnicam ſectionem chirurgi-
 a abſoluitur, velocem diſſectionem facere oportet. cū enim
 contingat eos qui ſecantur dolere, id quod dolorem affert,
 quā minimo tempore aſſe conuenit, quod ipſum contin-
 get veloci ſectione facta. Vbi verò multas ſectiones fieri ne-
 ceſſe eſt, tarda chirurgia vtendum eſt. Velox enim continuū
 & multum dolorem inducit. Tardus verò & intermittēs, re-
 quietem aliquam his qui curantur exhibet. Idem de inſtrumē-
 tis quoque dici poteſt, Gladiolis enim acutis ac latis vti, non
 in omnibus ſimiliter præcipimus. Nam partes quædam ſunt
 corporis, quæ celerem ſanguinis fluxum habent, & non faci-
 le eum ſiſtere. Tales autem ſunt varices, & quædam aliæ
 venæ. Itaque in talibus anguſtas ſectiones facere oportet, ne
 que enim poſſibile eſt, vt fluxus in his ſiſtatur. Conducit au-
 tem aliquando à talibus ſanguinis detractiōem facere. At
 verò ad locos non periculofos, & circa quos non tenuis eſt
 ſanguis, latioribus gladiolis vtendum eſt: ſic enim ſanguis
 prodie

Inſtrumēta

Quæ vul-
nera po-
ſcant.Deligatio.
Duo quæ
his proſūt.Sectio, v-
ſtiōque.Celeritas
& tarditas
vbi adhibē-
da eſt.Miſſio ſan-
guinis vbi
& quando
facienda.

c

prodierit, aliter nequaquam. valde autem turpe est non con-
 tingere à chirurgia quod velis. Cucurbitarum porro duo
 modi commodi existunt. Quando enim fluxus procul ab ap-
 parente carne compactus fuerit, circulum ipsius breuem ef-
 fe oportet, ipsamque non ventrosam, sed prolixam parte ad
 manum vergente, non grauem. Quæ enim talis est, in dire-
 ctum trahet, & serolos humores separatos ac distantes pro-
 bè ad carnem attrahet. Maiore autem dolore per carnem
 disperso, in reliquis quidem consimilem cucurbitam esse o-
 portet, sed circulum magnū. Sic enim ex plurimis partibus
 id quod dolorem facit educere comperies, ad locum conue-
 nientem. Neque enim magnum esse circulum putat, si non
 ex pluribus locis caro comprehendatur ac contrahatur. At si
 grauis sit, ad supernos locos repit, infernè autem magis de-
 tractionem facit, vt sæpe morbi relinquuntur. Lati itaq; cir-
 culi, vnà cum incumbētib; fluxionibus, & longè distanti-
 bus à supernis locis, multa simul attrahunt de alia carne. Cō-
 tingit igitur humiditatem inde detractam, apponi collecto
 infernè sub cucurbita seroso humori, & quæ quidē infestāt,
 relinqui: quæ verò nihil molestant, detrahi. Magnitudinem
 porro cucurbitæ quæ cōmoda sit, iuxta corporis partes qui-
 bus adiuuere oportuerit, coniectare oportet. Vbi verò sca-
 rificationem subter cucurbitam adhibere velis, sanguinem
 scarificandorū locorum conspicuum esse oportet, aliàs neq;
 circulum attractum scarificare ac pertūdere oportet. Debi-
 lior enim est caro loci dolore affecti. Scalpris autem incur-
 uis, in summo non valde angustis vtendum est. Aliquando
 enim serosi ac saniosi humores viscosi ac crassi veniunt: pe-
 riculum igitur est, ne in fissuris substent, vbi arctæ fuerint
 incussæ. Porro venas in brachiis, funiculorum apprehensio-
 nibus constringere oportet. Caro enim contegens in multis
 non probè coaptata est venæ, vbi enim lubrica fuerit caro,
 non cōtingit sectiones vtrorumque iuxta seipsas fieri. Nam
 venam contactam insufflari contingit, & sanguinis fluxum
 impediri. multis verò etiam propter hoc pus congregatur.
 Quapropter duo nocumenta talis chirurgia inducit, secto
 quidem dolorem, secanti verò multam ignominiam. Idem
 in omnibus venis fieri præceptum est. Hæc quidē igitur ne-
 cessaria sunt in officina medica instrumēta, & circa quorum
 vsum

Cucurbitu
læ modus.

me Gal.

de cucur

lib. 12

Cum locus
cucurbitu-
læ admotæ
aperit quid
agas.

in fac

captatio ve-
narum bra-
chij.

A vsus artificiosum esse oportet addiscētem. Volsellis autem Volsellis.
 tum dētium, tum vuarum, quilibet vti potest. simplex enim
 vsus ipsorum esse videtur. Caterum de tuberculis & vlceri-
 bus quæ maiorum morborum sunt, amplius videndum est.
 Tubercula equidem deprehendere & dissoluere posse, maxi-
 mē artificiosum habetur, itēq; collectiones ipsorum impe-
 dire. Consequens est, ea in conspicuum & quā breuissimū
 locum contrahere, & compagem ipsam æqualem per totum
 tuberculum facere: vbi enim inæqualiter se habuerit, pericu-
 lum est vt rūpatur, & vlcus agrē curabile reddatur. ex æqua-
 re itaq; oportet similiterq; totū maturū facere & neq; prius
 diducere, neque sinere vt sponte rūpatur. Quæ verò maturū
 B facere æqualiter possunt, in aliis libris relata sunt. At verò vl Vlcerū qua-
 cera quatuor vias habere videtur. Vnā in profundū, hæc au- tuor viz.
 tem sunt fistulosa, & quæ sanie plena sunt, ac intus excauata.
 Alteram in altum, quæ videlicet carne superexcrescunt. Ter-
 tia via est in latitudinē, atq; hæc sunt quæ appellātur serpi-
 ginosa. Quarta via est quæ sola secundum naturam motus
 esse videtur. Carnis itaque calamitates hæc sunt, omnes autē
 communem rationem habent ad hoc quod ipsis conducit: &
 signa quidem horum in aliis relata sunt, itēq; qua vtendū
 sit curatione, per quæ autem concretum dissoluatur, simili-
 tēq; id quod carne excrescente repletum, aut cauum factum
 est, aut quod in latitudinē iter fecit, de his omnibus in aliis
 scriptis nostris abundē dictū est. Amplius verò de Cataplas-
 C matis sic res habet. Linteorum quæ imponuntur ac indūtur
 alicubi in morbo, vsus exactus esse videtur, & est sanē vlceri
 conueniēs linteolorum impositio. Verū cataplasmate per Vlcerū vul-
 ambitum vlceris vtaris. Nam hīc vsus cataplasomatis & ar- nerūve mu-
 tificiosus est, & multum prodesse potest. Videtur enim vlceri tilacuratio.
 opitulari vis eorum quæ circumponātur Linteum autē con-
 terendum est ac emolliendum. Verū partibus extra vul-
 nus circūsitis cataplasma prodest. Talem igitur ipsorū vsus
 esse oportet. Porro de temporum occasionibus, quando sin-
 gulis horum vtendum est, & quomodo præscriptorum vires
 Qux præ-
 termittat,
 perpende.
 condiscere oporteat, in præsens relictum est. Talia enim lon-
 gē præstātissima in studio Medicinæ sunt, & procul in arte Militarium
 iam progressi existunt. His consequens est chirurgia vulne- vulnerū cu-
 rum in militia acceptorū, circa extractionē telorum. Nam ratio.

Hippocratis Liber

Signa inhe-
rentium te-
lorum.

in vrbaniſ conuerſationibus modicus horũ vſus exiſtit. Ra-
ro enim per omne tempus ciuiles ac hoſtiles expeditiones
fiunt. huiusmodi autem ſæpe ac frequentiffimè circa exter-
nas milicias fieri ſolent. Qui igitur hac chirurgia vti volet,
eum militare oportet, & externos exercitus ſequi. Sic enim
exercitatus fieri poterit ad eiufmodi vſum ac neceſſitatem.
Quòd verò circa hæc artiſcioſiſſimum eſſe mihi videtur, re-
feretur. Etenim ſigna exquirere ac inuenire telorum in cor-
pore exiſtentium, maxima artis & chirurgiæ huc pertinen-
tis pars exiſtit. Vbi enim hoc cognitum fuerit, non relinqui
poſteſt vulneratus ex ignorantia neglectus, quum non conue-
nienter tractetur. Solus autem iſ qui ſignorum expertus eſt
hanc chirurgiam ritè aggredietur. Verùm de hiſ omnibus E
in aliis ſcriptum habetur.

H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE DECEN-

TI ORNATV, IANO COR-

NARIO MEDICO PHY-

S I C O I N T E R-

P R E T E.

*

Disciplina
nulla pro-
batur, niſi
quæ ad vi-
tam huma-
nam facit.



ON ſine ratione faciunt, qui ſapiẽ-
tiam ad multa vtilem eſſe præten-
dunt, eam videlicet quæ inter homi-
nes exiſtit. Multę enim ad ſuperfluã
curioſitatem factę apparent, dico
autem eas quæ de nulla re vtili diſ-
ſerunt. Aſſumi autem vtique poſ-
ſunt etiam harũ partes ad illas, vel
propterea quòd neque ocioſitas eſt,
neque malitia. Ocium enim & ignauiã malitiã quærunt, &
ad eam diſtrahuntur, vigilantia verò & mens ad aliquid in-
tentata, trahunt ad ſe quid eorũ quæ ad vitæ honeſtatẽ perti-
nent, etiam ex diſputationibus ni hil vtile tractantibus. Gra-
tior

A tiosior est enim sapientia, & ab aliis quibusdā in artem constituta, artem videlicet ad parandū honestum ornatū ac opinionem. Omnes enim non cū turpi lucro & turpitudine consistunt. Et illis methodus quadā est artificialis quæ operatur: quod si non innocēter fiat, raptores sunt. adolescentes enim in ipsos incidunt, verū in vigore constituti, propter verecundiam, videntes ipsos idiotas ducunt. Senes verò propter amarulentiā, legislationē in ipsos cōstituunt, ex ciuitatibus videlicet expulsionem. Hi enim sunt qui fora frequentant, ruditate ac inscitia sua imponentes, & in circulis ciuitatum versantes. Cognouerit autē quis ex vestitu & aliis lineamentis. Quamuis enim fuerint splendide ornati, multò magis fugiendi sunt, & à cōspicientibus odio habendi. Qui verò cōtrario modo se gerunt, frugi homines iudicādi sunt, quibus nō est excogitatus apparatus, neque superflua curiositas. Ex vestitu enim cognosces, & decenti in ipso ornatu ac frugalitate, non ad superfluitatem parato, sed magis ad bonam opinionem, & meditationem, animūmq; intra se compositum, & ad profectiōē. Imò quocunque vestitu ac ornatu, tales sunt minimè diffuentes, non curiosi, amarulenti ad occursum & obuiam itiones, appositi ad responsiones, graues aduersus resistentes, ad sui similes solertes, & familiares, ac affabiles, temperati ad omnes, ad seditiōes taciturni, ad tacendum animo obfirmato & continētes, ad tempus appositi, & ad occasionem arripiendā accommodati, ad victū frugales & cōtenti, patientes ad temporis expectationem, ad sermones expediti, omne demonstratum proferentes, suauiloquentia vtentes, gratiis affecti, & gloria horum omniū corroborati ac fortificati, ad veritatem ac demonstrationē audentes ac confisi. Principalissimum quidem igitur horum omnium prædictorū est. Natura. Nā si hæc affuerit his qui artibus animū applicant, per omnia prædicta penetrare poterunt. Incognita enim vtilitas, tum in sapiētia, tum in arte adhibita, ad principium capiendum edoceri potest. Natura autem defluit & confunditur cū sapientia, ad cognoscendum ea quæ ab ipsa natura facta sunt. Etenim in vtrisque sermonibus multi conuicti, nullatenus vtrisque rebus vti sunt ad demonstrationem. postquam igitur quispiam ipsoꝝ expenderit ad veritatem ea quæ rerulimus, nullatenus naturæ

Artes quæ
probandæ.

Dux natura
in cunctis
est.

bona ipsi procedent. Comperiuntur itaque hi non consimili cum illis via progressi, quapropter denudati, omnem induunt maliciam ac ignominiam. honestus est enim ex opere

Quid ars. quod quis edoctus est sermo. Quicquid enim artificiosè factum est, ex ratione prolatum est ac productum. Quicquid autè artificiosè dictum est, non autem factum, methodi inartificialis demonstratiuum existit. Nam putare quidem non autem facere, ignoratiæ & inartificialitatis signum est. Opinio enim maxime in medicina in crimen vertitur eam adhibentibus: his verò qui ea in se vti sunt, perniciem affert. Etenim si sibi-
persuasio in his periculosa. ipsis in sermonibus persuaferint, & opus ex disciplina se scire putauerint, quemadmodum aurum adulterinum in igne iudicatum, tales seipsos esse demonstrant. quanquam talis prædictio nihil commouet ad prudentiam eos qui sunt eiusdem generis quod autè rectus sit finis, cognitio manifestum facit. Tempus porro etiam artem facilem ac peruiam facit, aut in consimilem viam incidentibus processus manifestos facit. Quapropter singula prædicta suscipere oportet, & sapientiam transferre ad medicinam, & medicinam ad sapientiã.

Cognitio vera quid faciat. Medicus enim philosophus, est deo æqualis. Neque enim multa est inter ipsas differentia. Nam omnia quæ ad sapientiam requiruntur, insunt in medicina: argenti contemptus, reuerentia, verecundia, habitus submissus, auctoritas, iudicium, quies, obuiam itio, modestia, doctrina, cognitio ad vitam utilem ac necessariorum purificationum, alienitas à mercimoniis, alienitas à superstitione, præ eminentia diuina. Habet enim quæcunq; habent ad coercendam intemperatiam, inscitiam, auaritiam, concupiscentiam, rapinamq; ac impudentiam. Hac enim est cognitio accedentium, & usus eorum quæ ad amicitiam pertinent, & quomodo ad liberos, ac quasque res se gerere oporteat: quatenus igitur cum hac societate habet, sapientia quædam est. Nam & plurima ex his etiam medicus habet. Etenim sciëntia de diis vel maxime animo ipsius implexa est. Etenim in aliis affectionibus, & in symptomatis accidentibus, medicina erga deos valde reuertenter se habere comperitur. Medici verò deis concedunt. Non enim est potentia in ipsa redundans. Nam & hi multa quidem aggrediuntur, multa verò etiam per seipsa ipsis superantur. Quæ verò nunc possidet Medicina, hinc exhibebit. Quæ enim via ipsius sit in sapientia, habet

Medicus philosophus est deo æqualis. Sapiëntia qualis.

Medicus deos potissimum colit. tenus

A stenus dictum est. Nam & illis ipsis hoc modo se res habet.

Quæ verò putat, & cōfidentur ac profitentur, sic habet. Quæ Medicine
vix partef-
ve.

circa corpora adfunt & adueniunt, quæ sanè per omnē ipsam
artem procedunt, dum illa transformatur aut transmutan-
tur. Quæ itē per chirurgiā sanant. Et quæ auxiliis & mede-
lis aut victu curantur. Summa verò horum omnium tendat ad
horum cognitionē. Quum igitur relata omnia tali modo se
habeant, cōuenit vt Medicus comitatē quandā sibi adiunctā
habeat. Austeritas enim & sanis, & aegris, difficilē accessum
præbet. Maxime verò adseruare ipsum seipsum conuenit, vt
ne multas corporis partes ostēdat, neq; cum imperitis mul-
ta fabuletur, sed necessaria. Hoc enim violentia esse consue-
uit, ad curationis prouocationē. Facere autem nihil horum

Medico
quid obser-
uandum.

B debet valde curiose, neq; ex imaginatione. Hæc verò omnia
considerato, quo tibi præparata sint ad abundantiam, prout
opus fuerit. Sin minus, instante necessitate semper penuria
fuerit. Procurare autē oportet hæc in medicina, cum omni
submissiōe: de frictione, & illitione, & perfusione. ad manuum
concinnitatē: de linamētis vulsis, de spleniis, de ligamētis, de
his quæ pro temporis cōstitutione requiruntur, de medica-
mentis ad vulnera, & ocularia, & ex his ea quæ ad singula
genera pertinent: quo tibi præparata sint & instrumenta, &
machinæ, & cōsequenter ferrum. Nam in his penuria detri-
mentosa est, & artem mancā facit. Sit autem tibi alter appa-
ratus simpliciter ad peregrinationes instructus, ad manus

Quæ potis-
simum cu-
ret.
Instrumen-
ta medico
in promptu
esse debet.

C promptus. Expeditissimus autē per methodi rationē. Neque
enim fieri potest vt medicus omnia percurrat. Firma item
memoria teneto medicamēta, & simplices facultates, & de-
scriptas, si modo tales extant. Sint & in memoria tibi mor-
borum curationes, & harū modi, quorupliciter & quomodo
in singulis se habent. Hoc enim principiū est in Medicina, &
medium, & finis. Præparata quoque tibi sint malagmatū ge-
nera ad singulos vsus. Potiones quæ incidere possunt, ex de-
scriptione præparatæ iuxta genera. In prōptu sint & quæ ad
medicationem pertinet ad purgationes, sumpta de locis con-
gruis, & parata eo quo cōuenit modo, iuxta genera, & magni-
tudines, ad vetustatem ferendā curata. Recentia verò iuxta
temporis occasionē: & alia iuxta rationē. His autē tibi præ-
paratis hoc commodi erit, vt vbi ad ægrotum introieris, ani-

poriones in
prōptu ha-
bendæ.

Quid præ-
cogitandū.

Quæ præ-
stare de-
beat medi-
cus.

Medicus
ægros cre-
bro inuise-
re debeat.

ut oue

Culpa ægro-
tantū me-
dicis sæpe
adscribi so-
let.

Habitatio-
nes languē-
tiū pro va-
rietate mor-
borum eli-
gēda sunt.

mo incertus nō sis, quum appositè habeas singula ad id quod D
faciendum est. Antea verò hoc cognitū habeas quod facere
oportet, quàm ad ægrum ingrediaris. Pleraque enim neque
rationatione, sed auxilio rerū opus habent. Itaq; euentum
ex experientia prius discernere oportet. Est enim hoc glo-
riosum, & facile cognosci potest. In ingressu verò meminisse
cōuenit & sessionis, & habitus submissi, amictus compo-
siti, autoritatis, breuiloquentiæ, vt nihil cū perturbatione fa-
cias, assensus, diligentia, responsionis ad ea quæ occurrunt, &
ad tumultus fientes cōpescendos, cōstantiæ apud te ipsum, in-
crepationis ad turbas castigandas, promptitudinis ad mini-
steria. Et ad hæc memor sis primi apparatus. Sin minus, reli-
qua citra errorē fiant, quæ ad promptitudinē parandā præ- E
cipiuntur. Ingressu vtere frequenter, visita diligentius, his
quæ à deceptis per errorem fiunt occurrēs, vt mutentur. Fa-
cilis enim cognosces, simulque expeditior eris. Instabilia
enim sunt quæ in humidis cōsistunt. Quapropter etiā facile
& à natura, & à fortuna transmutantur. Neglecta enim ea
quæ circa temporis occasionē administrare oportebat, im-
petu suo progrella occupāt ac perimunt. Nō enim est quod
opem ferat. Multa enim sunt quæ simul mali aliquid fa-
ciunt. Nā quod singulatim iuxta consequentiā fit, magis op-
portunum & frequētius est. Obseruare autē oportet ægroto-
rum quoq; peccata, per quæ multi sæpe mentiti sunt in assu-
mendis his quæ ingerēda exhibētur, postquam exosas potio-
nes non accipientes, aut pharmacis datis, aut alia curatione P
adhibita, perempti sunt. Et factū quidē hoc non ad ipsorum
confessionem vertitur, verū Medico culpa imputatur. Cō-
siderare verò oportet etiā decubitus, quosdam ex ipsis iuxta
anni tēpus, quosdam iuxta genera. Quidā enim in altis sedi-
bus, quidam in subterraneis ac tenebrosis decumbunt. Stre-
pitus quoque & odores, maximè vini, deterior enim hic est:
fugere ac transmutare oportet. Et omnia hæc facere placi-
dē, expeditē, cum ministerio, ita vt pleraq; ægroto occultes,
& hilari ac sereno vultu ipsum consoleris: quo à suis illū cu-
piditatibus auertas, simul cū amarulentia & cōtraria instan-
tia increpando, simulque cum cōmonefactione ac dexterita-
te suscipiendo ac cōsolando, nō tamen vt quicquam futuro-
rum aut præsentium ipsis indices. Plerique enim ob hanc
causam,

A causam, in vtranlibet partem compulsi sunt, propter rel-
tam videlicet prædictionem præsentium aut futurorum. Sit
autem ex discipulis aliquis præsens, qui instet vt præceptis *Quales mi-
nistri ægro-
tis dandi
sint.*
non amarulentè vtatur, & quod mandatū est, faciat. Deligi-
to autē ex ipsis eos qui iam in arte progressum fecerūt, quò
ea quæ vtilia sunt addant, aut securè offerant, vt & in inter-
uallis nihil te lateat. At verò imperitis nunquam quicquam
procurandum cōmittes. Sin minus, eius quod malè factum
est, vituperium in te recidet, si non ambiguè res habeat, ex
quibus id quod recta methodo tractatum est, procedet, & vi-
tuperationem tibi nō afferet. Sed & quod factū fuerit, ad ge-
nus referetur. Proinde omnia hæc prædicito in his quæ fiūt,
his quibus ea cognouisse propositum est. His igitur ita ha-
bentibus, ad bonā existimationem ac decentem ornatum, &
in sapientia, & in medicina, & in aliis artibus: oportet medi-
cum distinctis partibus, de quibus diximus, semper vtrisque
amictum, ea conseruare ac custodire, & tradere ac facere.
Quum enim apud omnes homines inclyta sint, conseruan-
tur. Et qui per ipsa procedunt, celebres sunt à parentibus &
liberis. Et si quidam ipsorum non multa cognitione præditi
sint, ab ipsis tamen rebus ad intelligentiam deueniunt.

HIPPOCRATIS

C COI PRAECEPTIONES, IANO CORNARIO ME- DICO PHYSICO

INTERPRETE.

*



Tempus est in quo occasio est, Occasio verò *Tempus*
in qua tempus non multum. Medela tem- *quid.*
pore, aliquādo etiam occasione contingit. *Occasio.*
Hæc sanè nosse oportet, & non ratiocina-
tioni prius probabili intētum curā aggre-
di, sed exercitationi cum ratione. Ratioci-
natio enim memoria quædam est, quæ componit ea quæ per *Ratiocina-*
sensum sunt percepta. Imaginatione enim concepta est cui- *tio.*
denter.

c 5

denter. Sensus autem perpeſſus iam delegator eſt eorū quæ D
ſubiacent ac obueniunt, ad ipſam cogitationē. Qui verò ſen-
ſus ſæpe mala perpeſſus eſt, & ſuſcepit, quibus, quando, qua-
liter, laſus ſit obſeruans, & in ſeipſum reponens recordatur.
Collaudo quidē igitur etiā ratiocinationem, ſi quidē ex for-
tuita occaſione initium faciat, & delationem in morbum ex
apparentibus perſequatur. Si enim ex his quæ palām perſi-
ciuntur, ratiocinatio initium fecerit, in mentis potentia eſſe
comperitur, ita vt ipſa ab aliis ſingula aſſumat. Proinde ſta-
tuendum eſt naturā à multis ac omnigenis rebus moueri ac
doceri, ita vt violētia quadā ſubſit. Mens autem vbi ab ipſa
accepit, velut dixi, poſtea ad veritatem perducit. Si verò non
ex euidentī aggreſſione, verū ex probabili rationis ſigmen- E
to, ſæpe grauē & moleſtā inuehit affectionē. Tales autem
inuiā viā arripiūt. Quid enim tandē erat mali, ſi mercedē au-
ferrent hi qui medicinæ opera malè adminiſtrant? Nūc ve-
rò ægrotis qui extra culpam ſunt, non ſufficiens eſſe apparet
violētia morbi, niſi Medici quoq; imperitia accedat. Et de
his quidē hæc dicta ſatis ſint. At his quæ ex ſola ratione perſi-
ciuntur, frui nō datur: verū his quæ ex operis indicatione.
Fallax enim eſt & ad errorem procliuiſ affirmatio, quæ ſit
cum garrulitate. Quapropter in vniuerſum his quæ ſunt,
inhærerē oportet, & circa hæc vel maximè verſari, ſi quis fa-
cilè ac minimè delinquentē habitū, quem ſanè Medicinam
appellamus, ſibi comparare volet. Valde enim magnā vtili-
tatem afferet, tum egrotantibus, tum horū artiſtibus. Non F
tamen cunctādum eſt & ab idiotis inquirere, ſi quid cōferre
viſum fuerit ad curationis occaſionē. Sic enim arbitror vni-
uerſam artē cōmonſtratam eſſe, eo quod ex vnoquoque ſine
obſeruatio facta eſt, & cōſonantia in idē cōcurrerit. Attende
re igitur oportet fortuitæ occaſioni, quæ plerunque ſe offert,
atque hoc cū vtilitate ac leni progreſſione potius, quàm cū
promiſſione, & excuſatione ea quæ ſit cum actione. Vtilis eſt
autem & varia prædeſtinatio eorū quæ ægroto offeruntur.
Non enim aſſeuerare oportet, quod aliquid ſolū exhibitum
proderit. Omnes enim affectiones, propter multas caſuū cir-
cuſtantias ac mutationes, mora quadā diutiori adharēt. Et
hoc ſanè admonitione opus habuerit, ad diligentē cōſidera-
tionem faciendā. Si enim à mercede inceperis: cōducit enim
hoc

Qua via
medico pro-
cedendum
ſit.

Medicus
rudes etiā
ſciſcitari de-
bet.
Quid po-
tiſſimū ob-
ſeruādum.

Merces cō

A hoc vniuerso negotio: agroto quidem huiusmodi cogitationem inducis, quod videlicet non ipso relicto abibis. Si vero non pacisceris, quod ipsum negliges, & de quibuldā in rem præsentē nō admonebis. Curare igitur oportet de cōstituenda mercede. Inutilem enim esse putamus eiusmodi agroti ipsius cogitationē, multo autē magis in morbo acuto. Morbi autē celeritas temporis occasionē non præbens ad reuersionem, nō impellit bonum Medicū ad quarendū suā commoditatem, sed vt magis existimationis suæ rationē habeat. Itaque tūc melius est vt seruatis exprobetur, quā vt letaliter affectos præconturbet. Quāquam aliqui agroti id expectant, hospitij ius, & facilem mali depulsionē producētes, digni quidē qui negligātur, nō tamen qui affligātur. Quapropter his te merito oppones, cum bolidis iactu in maris turbati fluctibus iter facientibus. Qui enim bonus Medicus est, is per Iouē fide magis quā duricia medetur. Quare in principio totā affectionē indagare oportet, & quādā suggere cōducentia ad curationē, curarēq; agrotum, & non negligere. At verò remunerationis exigēdæ acerbitatē, absque præparante ad disciplinam cupiditate, hortor vt ne valde inducas, sed & ad opulentiam & facultates respicias. Quādoque verò etiam gratis cures, ita vt gratitudinis memoriā potiore nūquam cū quā præsentē existimationē auferas. Si verò occasio ferendæ opis se obtulerit, & peregrino, & egeno, maximē talibus opituleris. Si enim affuerit erga homines amor, adest etiam anior erga artem. Quidā enim agrotantes vbi percepērunt affectionē circa se nō esse in tuto, per Medici probitatem ac mansuetudinē gloriantur sanitati restitutos se esse. Laudabile est autē, agrotum quidē curam gerere, gratia sanitatis; sanorum verò curam suscipere, ea gratia vt sine morbis degant. Sed & sanorum cura habenda est gratia boni ac decori ornatus. Qui igitur in profundo ignoratiæ artis versantur, prædicta minimē percepērunt. Nā hi quum sint non initiati, miserabilēsque ac subito exaltati: fortunæ tamē indigi, à diuitibus quibusdam, ex angustiis remissionē acquirunt, semperque ob opera gloriantes, & in deterius dilabentes deliciantur, artis sinceritatē negligentes, ob quam bonus Medicus, qui ab artis cōiunctione socius artis appellatur, in vigore esse possit. Hic autē medelas citra delictū facile perficiēs, nihil

stituenda
medico.

Gratis non
nūquam cu
randum.

Quid ma-
lus medi-
cus agat.

Languētis
cupiditas.

Medici plu
res cur con-
uocandi.

Vt bene
speret hor-
tandus æ-
grotus.

nihil horum transilierit, non præ facultatis inopia. Non enim infidus est velut in iniustitia. Nam ad curationem hi non accedunt, vbi affectionem perniciosam esse vident, visitantes aliorum medicorum superinductionem, laudantes ægrotos propter prauī auxiliij odium. At ægrotantes afflictī nātant in vtraq; improbitate, eo quod potiori in arte curationi seipsos non commiserunt ad finem vsque. Remissio enim morbi alicuius magnum ægroto refugium præbet. Quapropter sanam affectionem cupiētes, eundem vsum semper admittere non volunt, medici varietati se assimilantes. Sumptuum equidem opulentia ægroti carent, morum improbitate adorantes, & ingrati fientes. Quum autem consequi possunt vt ditentur, de mercede asseueranter affirmant, sani esse volentes, quæstum nimirum ex vsura, aut agricultura affore producentes, & postea de ipsis quæstum facere negligentes. Et de huiusmodi quidem declaratione hæc sufficiāt. Remissio enim & intensio ægrotantis, medicam administrationem requirunt. Nec verò indecore se ille geret medicus, qui in rei præsentis angustia circa agrum aliquem, & imperitia tenebras offundēte, alios quoque accersere iusserit, quo ex communi cōsideratione, res circa agrum inquirantur ac cognoscantur, & illi cooperatores fiant ad auxiliij ferendi facultatem. Nam in afflictionis assiduitate, augescente affectione, ob consilij inopiam, plurima ad rem præsentem effugiunt. In eiusmodi igitur temporis occasione confidendum est. Nunquā enim ego tale quid decerno, quod ars ipsa iudicat. Et de hoc nunquam contendere oportet affirmando, ac mutuis inter se cōuiciis decertando. Hoc enim iureiurando affirmare possim, quod Medici ratiocinatio nunquam alteri inuidere poterit. Imbecillis enim hoc modo apparuerit. Sed hæc magis expeditè faciunt hi, qui circa forensia negotia ac quæstus versantur. Quanquam neque falsò hoc cognitum fertur, quod in omni copia, inopia inest. At verò cū his omnibus magnum signum substantiæ artis apparuerit, si quis rectè medicans, ab eiusmodi compellatione non destiterit, iubēs ægrotos mente non turbari, in eo quod ad salutis tempus peruenire gestiunt. Hoc enim non inutile esse ducimus, & hoc sanè præcipiēs non peccabit. Ipsi enim ægroti propter dolorificam affectionem desperantes, seipsos vita exuunt. Qui

- A** Qui verò ægrum sibi cōmissum habet, si artis inuēta demon-
strauerit, conseruans non mutans naturam, præsentē auferet
remunerationē, aut contrā, fidem suam statim amittet. Ho-
minis enim bonus habitus natura quædam est, quæ motum
non alienū ex natura acquisiuit, sed valde congrua est, & spi-
ritu, & calore, & humorū concoctione vndiquaq; & vniuersa
victus ratione, & aliis omnibus cōposita ac constructa: si non
aliquis ex natiuitate, aut ab initio defectus fuerit. Si verò e-
tiam quis fuerit, is si exilis est, conandū est vt subiectę nature
assimiletur. præter naturam enim est id quod imminutū est,
etiam per tempus. Porro fugienda est & frictio per lintea su-
daria, propter parādā medendi auctoritatem. Itémq; odor
curiosè ascitus. Propter multā enim peregrinitatē, in calum-
niam incidēs: propter modicam verò, decentem ornatū con-
sequeris. In parte enim dolor modicus: in toto, multus. Gra-
titudinem autem qua hominibus cōplaceas, nō tollo. Digna
enim est medico præsidio. At verò appositionis per instrumē-
ta, & indicationis eorū quæ significant, & eiusmodi rerū me-
moriā adesse oportet. Si verò etiā vulgi gratia velis disser-
tationem ad audiendū te facere, nō valde gloriosè id captes:
non tamen cum testimonio ac ostētatione poetica. Impoten-
tiam enim industrij laboris ostēdit. Auerfor enim ad alium
vsum trāfferri industriā cum labore partam, quæ propterea
in seipsa sola gratiosæ sectæ electionem habet. Consequeris
enim instar fuci promptā cum comitatus deductione elatio-
nem. Optanda est & eiusmodi dispositio quæ aliena sit ab eo
quod quis grandis iam natu discat. Hoc enim præsentiiū qui-
dē nihil perficit, absentiiū verò tolerabilis memoria existit.
Fit itaq; omnia tentans infortuniū, cum recēti perniciē, quæ
negligit decorū, & in præfinitis terminis, & in professione, &
in maximis iuramentis deorum gratia factis: dum Medicus
præest morbo, cum assidua lectione, instructionēque imperi-
torum fugitiuorū, ita vt sermones translatiuos imitetur, qui
etiā antea quā in morbo incertus animo esset, collecti fue-
runt. Taliū igitur vbi etiā præfectus essem, non sanè in colle-
ctitia curatione id facerē. Verū cōfidenter auxiliū peterē.
Cognitionis enim decoræ scientia in his dispersa est. Quum
igitur hi necessariò sint inscij ac imprudentes, hortor eos vt
commodā habeāt exercitationem, post dogmatum cōgni-
tionis

inveſta na-
tura quæ-
dam est.

Frictio.

Hippocratis Liber

tionis penuriam. Quis enim multifidam dogmatum sectio-
 ne se verè cognoscere posse sperarit, citra exercitationis con-
 stantiam? Quapropter hoc admoneo, vt dicentibus quidem
 attendant, facientibus autem incumbant, & contracta victus
 rationem non diu præscribant. Aegrotatis enim diuturnam
 concupiscentiam erigit indulgentia quoque, in morbo diu-
 turno. Si quis cæco animū aduertat, velut res magni timoris
 cauendus est, & gratia desperanda, per quam vnitas constat.
 Aëris repentina turbatio vitanda est. Vigor ætatis omnia ha-
 bet gratiosa, Decrepita verò ætas, vice versa. Obscuritas lin-
 guæ non satis claræ fit, aut propter affectionem, aut propter
 aures, ita vt priusquam priora enunciarit, alia adiiciat: aut
 priusquàm id quod mente concepit dicat, alia insuper cogitet.
 & quæ quidem citra affectionem visibilem appellatam, con-
 tingit linguæ obscuritas, his maximè qui artium studio te-
 nentur, accidit. Aetati etiam quum paruum est aliquando sub-
 iectum, valde magna vis inest. In morbo tranquillitas, longi-
 tudinem significat. Iudicatio verò est morbi exolutio. Parua
 causa medelis exoluitur, nisi quid circa locum principalem
 affectum fuerit. Quandoquidè affectio per consensum à tri-
 stitia inducta vexat, quidam sanè ex alterius consensu vexan-
 tur. Vociferatio affligit. Fortis laboris studium subterfugien-
 dum est. Maritimus locus ad sanitatem commodus est.

Vigor æta-
 tis.

Linguae
 obscuritas
 vnde.

ætiæ quid

Quæ vexat
 ægrotum.

H I P P O C R A T I S F

COI LIBER DE NATVRA HOMINIS, IANO CORNA- RIO MEDICO PHYSICO

I N T E R P R E T E.



VICVNQVE de natura humana amplius
 differentes audire consuevit, quàm eius ad
 medicinam pertinet, huic non est commo-
 dum hunc meum sermonem audire. Ne-
 que enim omnino ex toto aerem dico ho-
 minem esse, neque ignem, neque aquam,
 neque terram, neque quicquam aliud, quia non manifestum
 est

A est vnum in homine esse: sed volentibus tamen hæc dicere permitto. At verò talia dicentes, mihi non recte rem cognoscere videntur. Sententiam enim eandem omnes ineunt, verum non eadem dicunt, sententiæ tamen epilogum eundem faciunt. Aiunt tamen vnum quid esse, quodcunq; tãdem est, & id ipsum esse vnum ac totum, iuxta nomina autẽ non consentiunt. Etenim alius ex ipsis aerem esse, hoc vnũ ac totum dicit, alius ignẽ, alius aquam, alius terrã, & addit vnusquisq; ad sermonẽ suum testimonia ac signa quæ nullius momenti existunt. Quia enim eadem sententia omnes vtuntur, dicunt autem non eadem, manifestum facit quòd neque cognoscũt ipsa: quod ex eo vel maximẽ quis cognouerit, qui ipsorum disceptationibus interfuerit. Nam cùm iidẽ viri inter se disceptant, iisdem auditoribus præsentibus, nunquam ter consequenter idem homo vincit in eodem sermone, sed modò hic, modò alius superat, cuiusque fuerit lingua maximẽ fluida ac populo grata. Atqui iustum erat, vt is qui de rebus se recte cognoscere pronũtiaret, semper sermonem suum victorem statueret, si quidem vera cognosceret, ac recte sentiret ac iudicaret. Verum huiusmodi homines vidẽtur mihi seipsos oppugnare in verbis sermonum suorum, præ stultitia, & Melissus. *Melissus.*
 At verò ex medicis quidã dicunt, quòd homo sanguis solũ Medicorũ *Medicorũ opinio.*
 est, alij ex ipsis bilem aiunt hominẽ esse, aliqui pituitã, epilogum autem & ipsi omnes eundẽ faciunt. Vnum enim quid esse dicunt, quodcunq; cuiq; ipsorum nominare visum est, & id ipsum vnum existens, speciẽ ac vim transmutare, coactum à calido ac frigido, fieriq; & dulce, & amarum & album, & nigrum, & omnigenũ quid aliud. Mihi verò neq; hæc sic se habere videntur. Plurimi quidem igitur talia quædam, & amplius his proxima pronuntiant. Ego autem dico, si vnũ esset Si re vna
 homo, nunquam sanẽ doleret. Neq; enim esset vnde doleret homo constaret, non
 vnum existens. Si verò etiã doleret, necesse esset & quòd morderetur ac sanaret vnum esse. Nunc verò plura sunt. Multa langueret.
 enim sunt in corpore existentia, quæ quum mutuò præter naturam calfiunt & frigesunt, siccanturque & humectantur, Morborũ
 morbos pariunt. Quare multæ quidem species morborum causa.
 sunt, multaque etiam medela ipsorum existit. Atque ego sanẽ cenſeo eum qui hominem sanguinem solũ esse dicit, &
 nihil

Hippocratis Liber

nihil aliud, demonstrare debere, ipsum non trāsmutare spe-
 ciem, neq; omnigenum fieri, vel saltem horam aliquam an-
 ni, aut hominis aetatem, in qua sanguis solus in homine in-
 esse appareat. Verisimile est enim vnum aliquod esse tem-
 pus, in quo appareat ipsum in seipso vnum existens. Eadem
 censeo etiam de eo, qui pituitam solam esse dicit, & qui bi-
 lem. Ego enim demonstrabo ea quæ hominem esse dixerō,
 & iuxta receptum morem, & iuxta naturā, quod semper ea
 ipsa similia sint, & in iuvene, & in sene, & tempore frigidus
 æquè ac calido. Exhibebo insuper signa, & necessitates osten-
 dam, per quas vnumquodque augetur ac minuitur in cor-
 pore. Primum quidem igitur, necesse est generationem fieri
 non ab vno, Quomodo enim vnum existens, aliud quid ge-
 gignatur. nerarit, si non alicui misceatur? Deinde neque generarint, si
 non eiusdem generis existentia misceantur, & quæ eandem
 vim habeant, neque sanè nobis similia perficerentur. Et rur-
 sus, Si non calidum ac frigidum, & siccum ac humidum, mo-
 deratè ac æqualiter inter se haberent, sed alterum alterum
 multum præcelleret, & fortius debiliore præstaret, genera-
 tio fieri non posset. Proinde quomodo verisimile est, ab vno
 quid generari, quum neque à pluribus generetur, nisi habue-
 rint temperamentum inter se probè conueniens? Necesse
 itaque est tali existente natura, cum aliorum omnium, tum
 humana, non vnum esse hominem, sed singula quæ ad gene-
 rationem eius conferunt, vim quandam in corpore habere, &
 eam videlicet, quam contribuerunt. Et rursus necesse est se-
 cedere singula in suam ipsorum naturam, homine moriente
 humidum nimirum ad humidum, siccum ad siccū, calidum
 ad calidum, frigidum ad frigidum. Talis autē & animalium
 est natura, & aliorum omnium, generanturque similiter om-
 nia, & occidunt similiter omnia. Cōstat enim natura ipso-
 rum ex his prædictis omnibus, & definit iuxta prædicta, in
 id vnumquodque vnde est compactum secedēs. At verò cor-
 pus hominis habet in seipso sanguinem, & pituitā, & bilem
 duplicem, flauam videlicet & nigram. atq; hæc sunt ipsi cor-
 poris natura, & per hæc & ægrotat, & sanus est. Sanus equidē
 maximè est, vbi temperamentū hæc inter se habuerint mo-
 deratum, tum facultate, tum copia, & vbi maximè fuerint
 permixta. Aegrotat autem cum horum quid minus aut am-
 plius

Qui omnia
gignantur.

Quæ in cor-
pore sunt.

Languoris
causæ.

Sanus quis.

Aegrotus

A plius fuerit, aut separatur in corpore, & non fuerit reliquis
omnibus contemperatum. Necesse est enim quum quid ho-
 rum secretum fuerit, & per se steterit, nō solum eum locum
 vnde secessit, morbidum fieri, sed etiam eum in quo stat, &
 in quem propter nimiam copiam diffusum est, dolore ac mor-
 bo vexari. Etenim quum quid horum extra corpus effluxe-
 rit amplius quam redundat, euacuatio ipsa dolorē exhibet.
 Rursus itaq; si idem intus fecerit euacuationem, & transitio-
 nem, & ab aliis secretionem, geminatum dolorem exhibere
 necesse est, velut dictum est, nempe & vnde secessit, & vbi re-
 ceptum redundat. Dixi porro, quaecunq; hominem esse dixe-
 ro, semper demonstraturum me esse, quod talia sint & iuxta
 B receptum morem ac opinionem, & iuxta naturā. Et dico sa-
 nē esse sanguinem, & pituitam, & bilem flauam ac nigram:
 & horum primum quidem iuxta receptā opinionem nomi-
 na distincta esse dico, & nulli ipsorū idem nomen esse. dein-
 de species iuxta natura separatas esse, & neq; pituitam simi-
 lem esse sanguini, neq; sanguinem bili, neq; bilem pituitae.
 Quo enim modo haec inter se similia sint, quorum neq; colo-
 res similes videntibus apparent, neq; ad manuum tactum si-
 militudo aliqua esse deprehēditur? Neque enim similiter ca-
lida sunt, neque frigida, neq; sicca, neq; humida. Quum itaq;
 intantum inter se discrepent, tum specie, tum facultate, ne-
 cesse est ipsa non vnum esse, quandoquidem neque ignis &
 aqua idem sunt. Quod autem haec omnia non vnum sunt, sed
 C vnumquodq; ipsorum vim & naturam suam habet, vel hinc
 cognoscere licebit. Si enim homini alicui medicamentum
 dederis, quod pituitam ducit, pituitam tibi vomet, & si phar-
 macum dederis, bilem ducens, bilem tibi vomet. Eadem ra-
 tione & bilem atram purgabit, si medicamentum exhibue-
 ris quod bilem atram ducit. Quod si ipsi partem aliquā sa-
 ciaris, vt vulnus fiat, effluet ipsi sanguis, atque haec omnia fa-
 ciet tibi totam diem ac noctem, & hyeme & aestate, donec
 spiritum in sese trahere potens fuerit, potens autem erit do-
 nec aliquo horum congenitorum fuerit priuatus. Congeni-
 ta autem sunt praedicta. Quomodo enim non congenita ef-
 fect? Primum etenim manifestum est hominem in seipso
 haec omnia semper habere, donec vixerit. Deinde nata sunt
 ex homine haec omnia habente. Postea nutrita sunt in ho-
 mine

Hippocratis Liber

mine hæc omnia habente, quæ videlicet ego nunc dico ac **D**
demonstro. Qui verò dicunt, quòd vnum est homo, videntur
mihi hoc consilio vti esse. Nimirum quum viderint eos qui
medicamenta hauserunt in superpurgationibus interiisse,
alios quidem bilem vomentes, alios pituitam, vnumquodq;
horum hominem esse putauerunt, quod vidissent his purga-
tum interiisse. Et qui sanguinem dicunt hominem esse, eodẽ
consilio vtuntur. Nam quum vident iugulatos homines, &
sanguinem ex corpore ipsorum effluentem, hunc ipsum ani-
mam in homine esse putant. atque his testimoniis sanè om-
nes vtuntur in sermonibus suis. Atqui primum quidẽ in su-
perpurgationibus, nemo vnquam mortuus est bile sola pur- **E**
gatus. Verum quum quis pharmacum biberit, quod bile de-
ducit, primum bilem vomet, deinde pituita, postea per vim
etiam atram bilem, postremum moribundus etiam sangui-
nem purum vomet. Eadem perpetiuntur à medicamentis
pituitam ducentibus. Primum enim pituitam vomet, dein-
de bilem flauam, postea atram, morietes autem sanguinem
purum, & in hoc mox vitam finiunt. Etenim pharmacum
Pharmacũ vbi corpus intrauerit, primum quidẽ ducit id quod ex om-
quid agat. nibus in corpore existentibus, sibi maxime secundum natu-
ram familiare fuerit, deinde verò etiã alia trahit ac purgat.
Quemadmodum ex terra nascentia & in ipsam plantata ac
seminata, vbi in terram peruenerint, vnumquodque trahit
id quod naturæ suæ familiare in terra existit. Inest autem in
terra & acidum, & amarum, & dulce, & salsum, & omnige- **F**
num. Primum itaq; plurimum eius trahit in seipsum, quod
sibi ipsi iuxta naturam maxime familiare fuerit, deinde tra-
hit etiam reliqua. Huiusmodi sanè quiddam etiam pharma-
ca in corpore faciunt. Quæcunque enim bilem ducunt, pri-
mum meracissimam bilem purgant, postea verò mixtã. Et
rursus pituitæ pharmaca, primum meracissimam pituitam
ducunt, postea mixtam. Et iugulatis primum quidem san-
guis calidissimus & ruberrimus profluit, deinde pituitosior
ac biliosior. Porro pituita in homine hyeme augetur. Hæc
enim hyemi maxime secundum naturam conuenit ex om-
nibus in corpore existentibus. Frigidissima enim existit. Si-
gna autem quòd pituita frigidissima est, hæc sunt. Si enim
pituitam & bilem & sanguinem contingere libuerit, pitui-
tam

Pituita cur
hyeme vi-
geat.

A tam sanè frigidissimam esse comperies, quāvis viscosissima sit, & per vim maximè post bilem atram trahatur. quæ verò per vim trahuntur, calidiora fiunt, à violentia coacta. sed tamen suprà hæc omnia, frigidissima esse apparet pituita ex sua ipsius natura. Quòd autè hyems corpus pituita repleat, inde cognoscere datur, quòd homines pituitosissima & *Qui humores per singula tempora vigeant.* spuunt & emungunt hyeme, & tumores laxi albissimi fiunt maximè hoc tempore, itémque reliqui morbi pituitosi. Cæterùm vere pituita quidem adhuc fortis in corpore manet, sed sanguis augetur. Nam & frigora remittunt, & imbres superueniunt. Sanguis autem iuxta hæc augetur, ab imbris videlicet & calidiorum dierum tempore. Hæc enim anni pars maximè iuxta naturam ipsi conuenit, vt quæ calida & humida existat. Signa autem hinc colligere licet. Quòd homines Vere & æstate maximè dysenterijs corripiuntur, & sanguis ex naribus ipsis fluit, & calidissimi ac ruberrimi. At verò æstate sanguis adhuc viget, & bilis in corpore eleuatur, & vsque in autumnum porrigitur. In autumno verò sanguis modicus fit, cōtrarium enim eius naturæ id tempus existit. *Bilis corpori dominatur.* Bilis autem per æstatem ac autumnum corpus possidet, id quod inde cognoscere potes: quòd homines sua sponte hoc tempore bilem vomunt, & in medicamentorum potionibus biliosiora purgantur. Manifestum fit & febribus, & hominum caloribus. Pituita autem æstate debilior seipsa est. Contrarium est enim naturæ eius id tempus, calidum enim est & siccum. Sanguis verò autumno paucissimus fit in homine, Siccus enim est autumnus, & hominem iam frigefacere incipit. Atra porrò bilis autumno & plurima & fortissima est. Postquàm autem hyems apprehenderit, bilis flaua perfrigerata modica fit, & pituita rursus augetur, tum ob pluiarum copiam, tum propter longitudinem noctium. Corpus quidem igitur humanum hæc omnia semper habet, verum pro temporis circūstantia, aliquādo plura seipsis fiunt, aliquando pauciora, singula tum iuxta partem ac copiam, tum iuxta naturam. Quemadmodum enim annus omnis omnium particeps est, & caliditatum & frigiditatum, & siccitatum ac humiditatum. Neque enim quicquam horum nequē minimo quidem tempore cōsisteret ac duraret, citra omnia ea quæ in hoc mūdo insunt, verum si vnū aliquid deficeret,

Hippocratis Liber

omnia sanè abolerentur: ex eadem enim necessitate omnia **D**
 consistunt & mutuò alūtur: Sic etiam si quid ex homine de-
 hiceret ex his quæ ipsi congenita sunt, non sanè viuere posset
 homo. in anno autem aliquando quidem hyems maximè vi-
 get, & aliquando ver, modò æstas, modo autūnus, Sic etiam
 in homine, aliquando pituita præualet, aliquando sanguis,
 aliquando bilis primum quidem flaua, deinde etiam nigra
 appellata, quorum omnium euidentissimum testimonium
 hinc habes. Si enim eidem homini idem pharmacū quater
 in anno dare velis, vomet tibi hyeme quidē pituitosissima,
 Vere autem humidissima, æstate biliosissima, autumno ni-
 gerrima. Itaque quum hæc sic se habeant, quicumque morbi
 hyeme augescunt, æstate desinere solent, quicumq; verò æsta **E**
 te augescunt, hyeme finire conlueuerunt, nisi certo dierum
 circuitu discedant. de circuitu autem rursus dicam. Quicun-
 que autem morbi Vere fiunt, ad autumnum eorū discessum
 fore expectare oportet, Quicumq; postremū autūnales mor-
 bi sunt, eorū discessum necesse est Vere fieri. Quicumq; verò
 morbus hæc tempora transgressus fuerit, eum annuum fore
 scire oportet. Porro Medicum sic aduersus morbos instare
 oportet, prout vnumquodque horum in corpore præualet,
 iuxta tempus sibi ipsi maximè natura conueniens existens.

Medicus
 hæc omnia
 considera-
 to.

*Addititia sunt hæc, non genuina Hippocratis,
 ut ait Galenus.*

Quin & hæc insuper ad illa nosse oportet, quòd quoscunque **P**
 morbos repletio parat, euacuatio sanat: & quicumq; ex eua-
 cuatione fiunt morbi, repletio sanat. quicūque verò à labore
 fiunt, quies sanat. qui autē ob ocio gignūtur, labor sanat. In-
 summa, Medicum scire oportet, opponere se contrarium in-
 stantibus & morbis, & naturis, & tēporibus, & ætatibus, &
 distendētia soluere, & soluta distendere. Sic enim vel maxi-
 mē morbū sedauerit, & mihi sanè hoc ipsum sanatio esse vi-
 detur. Morbi partim ex diætis, partim ex spiritu, quem ad-
 trahentes viuimus, fiunt. Vtrorunq; cognitionem sic face-
 re oportet. Quando ab vno morbo multi homines corripitū-
 rur eodem tēpore, causam ad id quod communissimum est,
 & quo maximè omnes vtimur, referre oportet. Est autē hoc
 spiritus & aër quem inspirando trahimus. Manifestum est
 enim

Obserua-
 tiones mor-
 borum.
 Morbi vn-
 de oriātur.

Aenim iam, quòd diata vniuscuiusque nostrum, causa nō est,
 quum morbus omnes consequenter contingat, & iuniores,
 & seniores, mulierēsque ac viros, & tam vinolētos quàm aque
 potores, & tam mazam edentes, quàm pane vescētes, & tam
 multum laborātes, quàm parū. nequaquā igitur diata cau-
 sa fuerit, quum homines diuersa victus ratione vtētes ab eo-
 dem morbo corripuntur. Quum verò omnis generis morbi
 fiunt eodem tēpore, palām est victus singulos singulis cau-
 sas esse, & curam sanē facere oportet ex contrario instando
aduersus morbi causam, quemadmodum & alibi à me rela-
 tum est, & victus rationem permutare. Cōspicuum est enim
 diatam qua homo vti consuevit, non esse ipsi cōmodam, aut
 B in totum, aut magna ex parte, aut vnū saltem quoddam ex
 ipsa: quod vbi cognoueris transmutare oportet, hībitaque
 consideratione naturæ hominis, & ætatis, & speciei, horæque
 anni & modi ipsius morbi, curationem facere, aliquando
detrahendo, aliquando apponendo, & quemadmodum iam-
 dudum à me dictum est, ad singulas ætates, & horas, & spe-
 cies, ac morbos respiciendo, tum in exhibendis pharmacis,
 tum in constituenda diata. At verò quum vnius morbi popu-
 laris grassatio consistit, manifestum est diatam non esse cul-
 pabilem, sed quem trahimus spiritum in causa esse: palām-
 que est insuper eum ipsum spiritum siue aërem morbosam
 aliquam exhalationem habere. Eo itaque tempore homines
 C in hunc modum cōmonstrare oportet, Nimirum vt dia-
 tas non permutent, quia morbi causa non existunt, verum
 vt videant quo corpus habeant quàm minimæ molis ac de-
bilissimū: detrahendi insuper sunt cibi ac potus quibus vti
 consueuerunt, idque paulatim facere oportet: Nā si quis ci-
 tō diatā permutet, periculum est etiam à permutatione ali-
 quid in corpore nouatum iri. Quapropter victu solito qui-
 dem vtendum est, vbi hominem nihil lædere videtur, proui-
 dendum verò vt quàm paucissimus aëris influxus in corpus
 ingrediatur, & vt ille ipse quàm peregrinissimus existat. Re-
 gionum etiam locos in quibus morbus consistit, quantūm
 eius fieri potest, permutare oportet, & corpora attenuare:
 sic enim minimè multo ac denso spiritu homines opus ha-
 buerint. Porro quicunq; morbi à fortissima corporis parte
 fiunt, grauissimi existunt. Etenim si isthic vbi initium sum-
 pserint

Medela
 morbi pas-
 sim vigen-
 tis.

fugit ut

Hippocratis Liber

De venarū
natura.

Quatuor
paria vena-
rum.
Missio san-
guinis.

Venarū di-
gestio.

perferint, permanferint, necesse est fortissima parte laboran- D
te, torum corpus laborare. Et si à validissima ad quandā de-
biliores tranfierint, difficulter solvuntur. Quicumque à de-
biliores partibus ad fortiores tranfierint, commodius sol-
ui possunt. Nam influentia à vi ipsarum facile consumun-
tur. Venæ crassissimæ sic se habent. Quatuor paria ipsarum
sunt in corpore, & vnum quidem à capite retrò per cerui-
cem forinsecus ab vtraque spinæ parte ad coxendices & in
crura progreditur, deinde per suras & malleolos forinsecus
ad pedes peruenit. Oportet igitur venæ sectiones, in dolo-
ribus dorli ac coxendicum, de poplitibus facere & de mal-
leolis forinsecus. Alterum par principium ex capite iuxta E
aures habet per ceruicem, & sphagitides appellantur, hoc
est iugulares. deferunturque vtrinque iuxta spinam intrin-
secus ad lumbos, in testes ac femora, & per poplites ex in-
terna parte, deinde per suras ad malleolos intrinsecus & in
pedes. Quapropter in doloribus lumborum ac testium, ve-
næ sectionem de poplitibus ac malleolis facere intrinsecus.
Tertium par venarum ex temporibus per ceruicem sub sca-
pulas tendit, & ad pulmonem defertur, altera quidem à
dextris ad sinistram partem, altera verò à sinistris ad dex-
tram, & dextra quidem sub mammam abit & in splenem, &
in rhenem, sinistra verò in dextram partem tendit à pulmo-
ne sub mammam & in hepar, & in rhenem. Vtraque au-
tem in rectum intestinum ac podicem desinit. Quartū par à F
priori capitis parte & oculis, sub ceruicem ad clauiculas
deuenit, deinde super brachia supernè in flexuras, postea
per cubitos in manuum iuncturas ac digitos. deinde à digi-
tis rursus, per cubitos ac manus supernè in flexuras, & per
brachiorum infernam partem ad alas, vnde supernè à late-
ribus altera in lienem peruenit, altera in iecur, postea supra
ventrem vtraque in pudendum desinit. Et crassissimæ qui-
dem venæ sic se habent. Sunt autem & ex ventriculo venæ
per corpus multæ & omnigenæ, per quas corpori alimētum
accedit. ferunt autem à crassis venis, in ventriculum ac re-
liquum corpus, & ab externis & ab internis, & inter se mu-
tuò distribuunt internæ extrinsecis, ac vicissim extrinse-
cæ internis. Venæ igitur sectiones iuxta prædictum ser-
monem facere oportet. Enitendum est autem vt sectiones
quàm

A quàm longissimè à locis faciamus, vbi dolores fieri, & sanguis colligi solet. Sic enim mutatio minimè magna de repente fiet, & consuetudinè remouebit, vt nō amplius in eundem locum colligatur. Quicumque pus multum spuunt, citra febrem, & quibuscunque in vrina pus multum subsidit, citra dolorē, & quibuscunque alui recrementa cruenta, velut in disenteriiis, & tardè ac diutinè prodeuntia, velut in iuuenibus quinque & triginta annorum, atque etiā senioribus, his omnibus ex eadem causā morbi fiunt. Necesse est enim hos labori deditos, ac exercitationis studiosos, & corpore operarios in iuuentute fuisse, postea verò relictis laboribus, molli carne & multum à priore differente carnosos redditos esse, & corpus multum discrepās habere, vt id quod prius exitit cum eo quod nunc adepti sunt, nulla parte cōsentiat. Quum igitur morbus aliquis corripuerit sic dispositos, euestigio quidem effugiunt, postea autem à morbo progressu temporis corpus colliquescit, & serosi ac saniosi humoris species per venas, qua parte maximè amplæ fuerint, fuit. Siquidem igitur in inferiorem ventriculum processerit, ferè qualis in corpore inest, tale etiam recrementum prodit. Quum enim decliuis sit via, non multo tempore hæret in intestino. Quibuscunque autem in pectus influxerit, suppurati fiunt. Nimirum purgatione acclui existente, & multo tempore in pectore immorans putrescit, & purulenta redditur. quibuscunque verò eadem serosi humoris species in vesicam proruperit, à loci caliditate, calida & alba fit, & segregatur, & quod quidem rarissimum est, superstat, crassissimum verò infra mergitur, quod sanè pus appellatur. Fiunt autem & calculi pueris, propter huius loci caliditatem itémque totius corporis. Viris autem calculi non generantur, propter corporis frigiditatem. Nam id probè nosse oportet, quòd homo primis diebus calidissimus est sui respectu, vltimis frigidissimus. Necesse est enim augescens, & ad vim procedens corpus calidum esse. Vbi autem inceperit marcescere corpus, delabens in ocium, frigidissimum euadit. Et iuxta hanc rationem, quanto amplius primis diebus homo augefcit, tantò calidior existit, & quātò plus vltimis diebus marcescit, tantò frigidiorē esse necesse est. Sani autem fiunt sua sponte illi prædicto modo dispositi ac affecti, plurimi quidem

Calculi car
pueris fiāt.

Hippocratis Liber

Lotij di-
uerfitas.

Quatuor
febrü spe-
cies.

Qualisatra
bilis.

dem ab hora qua liquefcere incipiunt, quinto & quadragesi-
mo die. Qui verò hoc tempus transgrefsi fuerint, anno fi-
nito fua fpon te conualefcunt, nifi quid aliud mali grauioris
hominem infeftet. Quicunq; morbi fenfim ex modici tem-
poris cauffa fiunt, & quorum cauffa cognitu faciles funt, fe-
curiffimi appellari poffunt. Curationem itaque ipforum in-
ftituere oportet, vt cauffa morbi nos opponamus. Sic enim
foluitur vtique id quod morbum in corpore fecit. Quibuf-
cunq; arenofa aut tofi in vrinis fubfident, his initio tuber-
cula circa craffam venam enata funt, & fuppurata. Poftea
verò tuberculis nō citò effractis, tofi ex pure coaliti funt, qui
per venā foras exprimuntur vnā cum vrina. Quibufcunq;
verò cruenta vrinae funt, his venae laborant. Quibufcunq;
autem in vrina craffa exiftēte, carunculae paruae capillifor-
mes fimul prodeunt, eas à rhenibus prodire noffe oportet,
& ab artriticiis. Quibus verò pura vrina eft, & aliās atque
aliās velut furfures in vrina innatant, horum vefica fcabio-
fa exiftit. Febres plurimae à bile fiunt. Species ipfarum qua-
tuor funt, præter eas quæ ab occultis doloribus generantur.
Nomina ipfarum funt: Continens, Quotidiana. Tertia, na,
Quartana. Continens itaque appellata, à plurima ac mera-
ciffima bile prouenit, & iudicationes quàm breuiffimo tem-
pore facit. Corpus enim nullo tempore perfrigeratum citò
colliquefcit, nimirum à multa caliditate calfactum. Quoti-
diana verò poft continentem à plurima bile generatur, &
præ reliquis celerrimè difcedit, verum longior eft continen-
te, quanto à pauciore bile prouenit, & propterea quòd re-
quiem habet in ipfa corpus, In continente verò non quiefcit
vllò tempore. Tertia autem longior eft quàm quotidiana
& à pauciore bile gignitur. Quanto verò longiori tempore
in tertia corpus quiefcit quàm in quotidiana, tanto diu-
turnior hæc febris eft quàm quotidiana. At verò quartanae
reliquæ iuxta eandem rationem habent, fed tertianis diu-
turniores funt, quāto pauciore bilis parte participant, vnde
caliditas augetur, & propterea quod corpus in ipsis plus per-
frige fcit, id quod ab atra bile ipsis contingit fupfluè adeò
vt rē frigus depelli poffit. Atra enim bilis inter omnes
corporis humores vifcofiffima eft, & fedes diuturniffimas
facit. Quòd autem quartanae febres atra bilis participes
fint,

A sint, vel hinc condiscere licet. Autumno enim maximè ho-
mines à quartanis corripuntur, & in ætate à quinque & vi-
ginti annis, vsque ad quadragesimum quintum. Hæc autem
ætas præ omnibus aliis maxime a bile atra infestatur & au-
tumni tempus omnium anni temporum ad eandem aptif-
simum est. Quicumque autem extra hoc tempus & ætatem à
quartana corripuntur, pro certo scire oportet eam febrem
non fore diuturnam, nisi quid aliud grauioris mali homi-
nem infestauerit.

Quo tēpo-
re & qua
ætate, quar-
tana in-
gruit.

B D E S A L V B R I

DIAETA LIBER, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER-

PRÆTE.

Additius est ad librum De natura hominis,

Polibi, Hippocratis discipuli,
ait Galenus.



DIOTAS & priuatos homines hac
diæta uti oportet. Hyeme quidē co-
medere quàm plurima, bibere autē
quàm parcissimè. Sit potus vinum
quàm meracissimum: cibi, panis, &
obsonia assata omnia. Oleribus
quàm paucissimis hoc tēpore uten-
dum est, Sic enim corpus maximè
ficcum ac calidum reddetur. Vbi In Vere.
verò ver apprehenderit, tunc sanè potum ampliorem assu-
mere oportet, vinum dilutius & paulatim: cibis quoque
mollioribus ac paucioribus tum utendum est: & ablato pa-
ne, mazam exhibere, & iuxta eandem rationem obsonia de-
trahere, & ex assatis omnia cocta facere. Oleribus verò
paucis tunc uti oportet, donec ad æstatem perueniat ho-
mo,

Priuatorū
hominū vi-
tus in hyc
me.

Hippocratis Liber

mo, cibis mollioribus vtendo, & obsoniis coctis, & oleribus D
 tam crudis quàm coctis, similiterque potibus quàm dilu-
 tissimis ac plurimis, ita tamen vt paulatim non de repen-
 te his vtatur, ne videlicet magna mutatio fiat. At verò æsta-
 te maza molli nutriatur, & potu aquoso ac multo, obsoniis
 omnibus coctis. Sic autem his vbi æstas fuerit, vti oportet,
 vt frigidum sit corpus & molle. Tempus enim calidum est
 & siccum, & facit corpora æstuosa & squallida. Quapro-
 pter tali studio auxiliari oportet. Iuxta eandem verò ra-
 tionem, quemadmodum ex hyeme ad ver, sic ex vere ad æsta-
 tem deducendus est, cibo quidem detracto, potu verò aucto.
 Sic quoque contraria faciendo ex æstate ad hyemem per-
 ducatur. In autumno verò rursus cibi plures exhibendi sunt E
 & sicciores, & obsonia iuxta eandem rationem, potus ve-
 rò pauciores & meraciores, quo etiam hyems bona fiat, &
 In hyeme. homo in ipsa vtatur potibus meracioribus ac paucis, cibis
 verò quàm plurimis ac siccissimis. Sic enim & maximè sa-
 nus fuerit, & minimè frigore impetetur. Nam tempus hoc
 Carnosorum valde frigidum ac humidum existit. Porro habitibus cor-
 natura. porum carnosus & mollibus ac rubris, plurimo anni tempo-
 re siccioribus diætiis vti conducit. Humida enim est ipsorum
 natura. Verum duros & graciles, fuluosque ac nigros humi-
 diore diæta maiore temporis parte victitare oportet. Cor-
 In iuuenū vi- pora enim talia sicca existunt. Sed & iuuenibus corporibus,
 æus. mollioribus & humidioribus diætiis vti confert. Nam ætas
 ipsorum sicca est, & corpora compacta sunt. Seniores au- F
 tem siccioris victus modo, maiori tēporis parte degere oportet.
 Senum vi- Corpora enim in hac ætate humida sunt, & mollia ac fri-
 æus. gida. Oportet igitur & ad ætatem, & ad tempus anni, &
 ad corporum species ac habitus, diætas constituere, ita vt
 consistentibus & caloribus, & frigoribus nos opponamus,
 Sic enim maximè sani fuerint. Quin & ambulandum hye-
 me quidem velociter est, æstate autem leniter, nisi per solis
 æstum iter faciendum sit. Oportet autem & carnosos ci-
 Balnear. tius ambulare, graciles verò tardius. Balneis quoque multis
 æstate vtendum est, hyeme paucioribus, Gracilibus autem
 magis expedit lauari, quàm carnosus. Vestes autem puras
 Obesorum induere hyeme oportet: oleo imbutas ac sordidas, æstate.
 victus. Caterum pingues, & qui graciles fieri volunt, omnes la-
 bores

A bores ieiuni facere debent, & cibos assumere anhelantes adhuc ex fatigatione, & non refrigerati, præpoto vino diluto, & non valde frigido, & obsonia præparata assumere ex sesamis, aut condimentis hortensibus, & aliis huiusce-modi. Sint autem obsonia pingua quæ offeruntur, sic enim à quàm paucissimis impleri poterint. Sed & semel in die cibum sumere, & illotum manere, & stratum durum habere, & nudum deambulare oportet, quantum eius maximè fieri potest. Quicunque verò graciles sunt, & pingues fieri volunt, tum alia his quæ dixi contraria facere, tum ieiunos nullum laborem subire oportet. At verò vomitibus, & alui per infusa elotionibus hoc modo vtendum est. Sex menses hybernos vomendum est, Hoc enim tempus pituitosius est æstiuo, & morbi circa caput fiunt, & regionem eam, quæ est suprà septum transuersum. Quum verò æstas accalor fuerit, infusis vtendum est. Hora enim hæc æstuosa est, & corpus biliosius, & lumbi ac genua grauantur, & calores oboriuntur, & in ventre tormina fiunt. Quapropter corpus refrigerare oportet, & quæ in sublime eleuantur, inferne subducere ex istis locis. Sint autem infusa pro crassioribus ac humidioribus salsiora & tenuiora, pro siccis verò & gracilibus ac debilioribus, pinguiora ac crassiora. Crassa autem & pingua infusa sunt, quæ ex lacte fiunt, & cicerum decoctum, & alia huiusmodi. Tenuia verò & salsa, sunt muria & aqua marina, & eiusmodi. At verò vomitus sic facere oportet. Quicunque homines crassi ac pingues sunt, & non graciles, ieiuni vomant à cursu aut ambulatione cita, iuxta meridiem. Sit autem dimidia hemina hyssopi in aquæ congio contriti, atque hoc ebibat affuso aceto & adiecto sale, quo iucundius euadat. Bibat autem primùm sensim ac lentius, postea amplius & citius. Qui verò graciliores sunt ac debiliores, à cibis vomitum faciant hoc modo. Lotus calida præbibat meri heminam, deinde cibos omnigenos edat, & neque dum cibum sumit, neque à cibo bibat, sed contineat se donec quatuor stadia quis percurrat, deinde vina tria permixta ipsi in potu offerantur, austerum, dulce, ac acidum, primùm quidem meracius, & paulatim, & per multum temporis spatium. deinde verò dilutius, & citius, & multum. Quicunque autem

Gracilium
& macilentorum
victus.

Vomitibus
quæ cietur.

Hippocratis Liber

autem bis in mense vomere cōsuevit, huic melius est vt con
sequēter in duobus diebus vomat, quā per quintum & de- D
cimum. Verū aliqui penitus contrarium faciunt. Quibus-
cunq; verò commodum est reuomere cibos, aut quibus alui
non probum transitum habent, his omnibus conducit sēpē
in die comedere, & omnigenis eduliis vti, & obsoniis variis
modis pręparatis, vinūque bibere duplex aut triplex. Qui
verò reuomunt cibos aut aluos habent humectas, his omni-
bus contrarium huiusmodi facere conducit. Ceterū pue-
rulos infantes per multū tempus in aqua calida madefa-
cere oportet, & vinum bibendum dare aquosum, & non peni-
tus frigidum. Dandum est & id vinū quod minimē ventrem
eleuet ac inflat. Hęc autem facere oportet, vt & conuulsiōni- E
bus minūs corripiantur, & maiores fiant, ac meliorem calo-
rem adipiscantur. Mulieres porrò siccioris modi diætā vti
oportet. Nam & cibi sicciores ad muliebrium carniū mol-
liciem cōmodiores sunt, & meraciores potus pręstabiliores
sunt ad vteros ac fœtū nutritimenta. Qui exercitiis vtuntur,
hyeme currere ac luctari debēt. Aestate verò luctari quidem
parum, currere autem minimē, sed multū deambulare se-
cundū ventum ac frigus. Quicunque ex cursibus fatigati
fuerint, eos luctari oportet. Qui verò ex lucta fatigantur, eos
currere expedit. Sic enim laborans, fatigata corporis parte,
vel maximē calferi componiq; ac recreari queat. Quoscu-
que exercitiis vtentes alui profluuiā corripiunt, & recremen- F
ta ciborum speciem referencia ac cruda habent, his exerci-
tiorum non minūs quā tertiam partem detrahere opor-
tet, & ciborum dimidium saltem exhibere. Palam est enim
quod ventriculus confouere non potest, quo ciborum multi-
tudo concoquatur. Sint autem his cibi, panis quā maximē
assatus in vino intritus, & potus quā parcissimī ac mera-
cissimī, & deambulationibus à cibo ne vtantur. Oportet au-
tem sub hoc tempus semel duntaxat in die cibū sumere. Sic
enim quā maximē concalescit ventriculus, & ea quę inge-
sta sunt exsuperauerit. Fit hic profluuij alui modus maximē
his corporibus quę densam carnē habent, quum ad carniū
esum homo cogitur, natura eiusmodi existente. Venę enim
densatę cibos ingestos non suscipiunt. Est autem hęc natura
acuta, & in vtranque partē vertitur, & ad modicum tempus
viget

Muliebris
victus.

Exercitia.

acutus
astutus
et fat

A viget bona habitudo in talibus corporibus. At verò rariores ac hirsutiores corporum species ac habitus, tum carniū esum suscipiunt, tum labores magis tolerant, & bonæ habitudines ipsis fiunt diuturniores. Quicumque postridie cibos eructant, & præcordia ipsis eleuantur, vt pote cibis crudis & incoctis existentibus, his longiori quidem tempore dormire conducit, verum & aliis laboribus corpora ipsorum cogere oportet, Vinum autem meracius & amplius bibant, & cibis paucioribus sub id tēpus vtantur. Palam est enim quod ventriculus præ imbecillitate ac frigiditate, ciborum multitudinem concoquere non potest. Quosunque verò sitis corripuerit, his & cibi & labores detrahendi sunt, & vinum bibant aquosum & quàm frigidissimum. Quibusunque autem dolores fiunt ex visceribus, siue ex exercitiis, siue ex aliquo alio labore, his quiescere conducit cibis abstinentes, potionem autem vtantur, quæ quàm parcissimè in corpus assumpta, plurimam vrinam ducat, quo venæ visceribus insitæ non distendantur repleta. Ex talibus enim tubercula oboriuntur, ac febres. Quibusunque verò morbi à cerebro fiunt, torpor primum caput occupat, & frequenter mingit æger, & reliqua velut in vrinæ stillicidio perpetitur, atque hæc sanè ad dies nouem patitur. Et si quidem erumpat per nares aut aures aqua siue mucus, à morbo liberatur, & vrinæ stillicidium sedatur.

Mingit autem multum, & citra dolorem, idque album,

C donec viginti præterierint dies, & capitis dolor hominem relinquit. Intendenti autem oculos splendor occultatur. Porro virum prudentem id secum reputare oportet, quod res pretiosissima est sanitas, & proinde scire vt ex suo ipsius consilio in morbis vtilitatem percipiat.

HIPP

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE GENITV-

RA, IANO CORNARIO

MEDICO PHYSICO

INTERPRETE.

ut Polybius in 6.

*

Hic à Galeno Polybi esse perhibetur.

Prouidens
natura quā
cum possit
hinc perspi
cito.



EX QUIDEM omnia corroborat. Verū genitura viri prouenit ab omni humido, quod in corpore existit, ita ut id quod robustissimū est, secernatur. Argumentum autē eius, quod robustissimū secernitur, hoc est: quod à Veneris usu paucula ad eò re emissa, imbecilles reddimur. Habet autem res hoc modo. Venæ

24 m

Cur semen
spumescat.

Pars valen
tissima cur
in coitu ex
cernatur.

Nō eadem
via seminis
& lotij.
Sōnia Ve-

& nerui ab omni corpore in pudendū vergunt, quibus dum aliquantulum teruntur, & calefcunt ac implentur, velut pruritus incidit, & ex hoc toto corpori voluptas ac caliditas accedit. Quum verò pudendum teritur, & homo mouetur, humidum in corpore calefcit, ac diffunditur, & à motu conquassatur, ac spumescit: quemadmodū etiam alij humores omnes conquassati spumescunt. Sic autē in homine ab humido spumefcente, id quod robustissimum est ac pinguisimum secer nitur, & ad medullam spinalem venit. Tendunt enim in hāc ex omni corpore viæ, & diffundunt ex cerebro in lumbos, ac in totū corpus, & in medullam: & ex ipsa medulla procedunt viæ, ut & ad ipsam humidum perferatur, & ex ipsa secedat. Postquam autem ad hanc medullam genitura peruenerit, procedit ad rhenes, hac enim via tēdit per venas: & si rhenes fuerint exulcerati, aliquando etiam sanguis simul defertur: à rhenibus autem transit per medios testes in pudendū. Proce dit autem non quā vrina, verum alia ipsi via est illi cōtigua. Et sanē qui somnia venerea habent, propterea per somnū ge nituram effundunt, quum humidum in corpore diffusum & calfact

- A** calfactum fuerit, & siue ex labore, siue alia quapiam re spueris cur muerit, dum ab ipso secernitur, coitus imaginem repræsentant. *fiant.*
- Sed non est mihi de his qui per somnum semen emittunt, & de toto morbo quid est, & quæ operatur, & quare coitus locum expleat, sermo: atque hæc quidem de hoc dicta sufficiunt. Cæterum eunuchi propterea non coeunt, quia genituræ transitus ipsis sublatus est. Est enim per ipsos testes via eius, & nerui tenues ac crebri ex testibus in pudendum tendunt, quibus & eleuatur, & demittitur: atque hi nerui in excisione dum castrantur, rescinduntur, quapropter non sunt utiles eunuchi. Nam neruis ipsorum extritis, genituræ via *Castrati cur nō coeant.*
- B** obturata est. Callus enim obducitur testibus, & nerui duri ac torpentes à callo facti, pudendum neque tendere, neque laxare possunt. Quibuscunque verò iuxta aures venæ sectæ sunt, hi coeunt quidem & genituram emittunt, verum modicam & debilem ac infœcundam. Nam plurima genituræ pars à capite iuxta aures in spinalem medullam procedit. *Secundum aures venæ incisæ, procreationem tollunt.*
- Ipsæ autem transitus, cicatrice sectioni inducta, consolidatus est. At verò pueris venulæ tenues & repletæ existentes, genituræ transitum impediunt, & pruritus ipsas non similiter accedit, & propterea neque conquassatur in corpore humido, ad genituræ secretionem. *unde semini*
- Quin & virginibus quousque iuuentulæ fuerint, menses non procedunt, propter eandem causam. Postquam autem adoleuerint & virgo & puer, venæ in pudendum pueri tendentes, itémque virginis in uterum, amplæ fiunt pre augmento, & oscula ipsarum aperiuntur, & via ac transitus per angustias contingit, & humidum tunc etiam agitationem habet. Nam spatiositas ipsi tunc ab agitatione ac conquassatione contingit: & puero sanè procedit genitura ubi plenè puber fuerit ob hanc causam, itémque virgini menses. Atque hæc mihi sic demonstrata sunt. Porro genituram dico à toto corpore secerni, & à solidis, & à mollibus partibus, & ab humido omni in toto corpore. *Cur pueri & puellæ nihil demittunt.*
- Sunt autem humidi species quatuor, Sanguis, Bilis, Aqua, & Pituita. Tot enim species congenitas homo in seipso habet, & ab his morbi fiunt, aut etiam ex morbis discretionem. Et hæc quidem dicta sunt à me, de genitura, unde fiat, & quomodo, & quare, & quibus genitura non est, &
- Quatuor corporis humores.*

Hippocratis Liber

Qui fœmi- est, & quare non est, & de mensibus virginum, & quod mulie D
nis in coitu ribus in coitu, dum confricatur ac teritur pudendum, & vte-
fiat. ri mouentur, velut pruritus in ipsos incidat, & quod reliquo

corpore voluptas ac caliditas accedat. Emittere autem & mu-
lier à corpore genitura, aliquando in ipsum vterum, qui sanè
inde humidus euadit: aliquando foras, si vterus magis quàm

Coitus vo- opportunum est hiarit. Et delectatur mulier vbi coire ince-
luptas vtro perit per omne tempus, donec vir semen emiserit. Et si qui-
runque est dem appetit viro commisceri, prius quàm vir emittit, & de

cetero non similiter delectatur. Si verò non appetit, simul
cum viro delectari definit: & habet res hoc modo, quemad-

modum si quis in feruentem aquam, alterà frigidam infun-
dat, illa feruere cessat. Sic genitura viri in vterum illapsa, ca E

lidityatem & voluptatē mulieris extinguit. Exilit autem vo-
luptas & caliditas simul cum genitura in vteros illabēte, de-

inde definit: quemadmodum si quis in flammam vinum in-
fundat, primum quidem contingit flammam exilire, & per

modicum tempus augeri, ad vini infusionē, deinde desinere.
Ita etiam mulieri caliditas exilit ad genituram viri: deinde

definit. Ceterum multò minus delectatur fœmina quàm vir
in coitu, & vir etiam tempore longiore. Propterea autē quod

vir magis delectatur, secernitur ipsi de repente ab humido,
fortiori turbatione ac agitatione quàm mulieri. Habet autē

Cur fœmi- & hæc res hoc modo. Mulieres si cum viris coeant, magis sa-
na si cre- nae sunt: si non, minus. Nam & vteri simul humidi sunt in
bro coeat, commixtione: qui enim sicci sunt magis, quàm cōuenit, for- F

magis va- riter contrahuntur: vbi verò fortiter contrahuntur, dolorem
leat. corpori afferunt: & simul coitus sanguinem calfaciens ac hu-

mectans, viam faciliorem in mensibus facit. Mensibus autē non
procedentibus, corpora fœminarum morbosa fiunt. Quapro-

pter autem morbosa fiāt, in muliebribus morbis referetur. }
Et de his quidem hætenus. Postquam autem coiuit mulier,

Conceptus si quidem conceptura non est intra se ipsam, pro more foras
signum. procedet genitura ab vtrisque, vbi fœmina volet. Si verò con-

ceptura est, non procedit foras, sed manet in vtero genitura.
Nam vteri susceptam & conclusam in sese continent, osculo

nimirum ipsorum præ humiditate contracto ac concluso si-
mulque permiscetur, tum quæ à viro venit, tum quæ à mu-

liere emissæ est. Quod si fœmina partus perita sit, & cogno-
uerit

33

A uerit quando genitura non exciderit, sed intus manserit, sciet qua die intra seipsam concepit. Habes autem & hoc sic. Quandoque quidem fortius est semen à muliere emissum, aliquando verò debilius. Similiter etiam quod vir emisit. Et est tum in viro fœmineum itēque masculum semen, tum itidem in muliere. Fortior autem masculus fœmina est. necesse est igitur ipsum à fortiore semine generari, habetque res hoc modo. Si ab utrisque semen fortius prodierit, masculus erit partus: si verò debile, fœmina nascetur. Vtrum autem multitudine ac copia præualuerit, iuxta illud ipsum partus nascetur. Si enim multò plus fuerit debilis feminis quàm fortioris, superatur forte, & debili permixtum, in fœminam transit. Si verò plus fuerit fortis feminis quàm debilis, superatur debile, & in marem transit. Quemadmodum si quis ceram & adipem misceat, & de adipe tamen plus coniiciat, eaque ad ignem liquefaciat, Quandiu quidem liquida fuerint, non apparet vtrum tandem horum superet, vbi verò congelata fuerint, tunc iam conspicuum est, quòd adeps ceram copia exuperat. Sic habet etiam masculi & fœminæ genitura. Quòd verò & in fœmina, & in viro, genitura fœminea sit ac mascula, ex manifestis factis coniectare licet. Multæ enim mulieres iam fœminas pepererunt ex propriis viris, verum ad alios viros transgressæ masculos genuerunt. Et viri illi ipsi apud quos mulieres fœminas pepererunt, ad aliarum mulierum mixturam progressi, masculos genuerunt: & quibus masculus sexus gignebatur, aliis fœminis permixti fœmineam sobolem genuerunt. Atque hæc sanè ratio declarat tum virum, tum fœminam, & fœmineam, & masculam genituram habere. Nam apud quos viros, fœminas pariebant, superabatur fortius semen à copia debilioris, & gignebantur fœmelæ. Apud quos verò masculos pariebant, superabatur debilius, & gignebantur mares. procedit autem non semper ab eodem viro genitura fortis, sed neque semper debilis, sed aliàs alia, atque sic etiam in muliere res habet, vt minimè mirandum sit, easdem fœminas, eosdēque viros, sobolem masculam & fœmineam producere. Habet autem & in brutis genituræ fœmineæ ac masculæ ratio eodē modo. Et in ipsa genitura egreditur & fœmineum, & masculinum

Semen masculū & fœmineum in utroque inesse.

Cur mares modò, fœminæ modò gignantur.

Cur permixtato coniugio permittetur & soboles.

e

ab

Partus simi ab omni corpore, & à debilibus debilis, & à fortibus fortis: D
 litudinis va & necesse est sic in partum distribui. Et ex quacunque corpo
 rietas. ris viri parte plus prodierit in genituram, quàm mulieris,

partus ille magis similis erit patri. Vndeunque verò à cor-
pore mulieris plus venerit, magis assimilabitur matri. Est
 autem impossibile, partū per omnia matri similem esse, &
 patri nihil: aut vice versa, neque alteri quicquam similem
 esse: sed vtrisque necesse est in aliquo similem esse, siquidem
 ab vtrisque corporibus semen in partum procedit. Vter au-
 tem tandem plus contulerit ad similitudinem, & à pluribus
 corporis regionibus, illi magis similis est. Contingitque
 aliquando ut filia nata maiori ex parte, magis similis sit pa-
 tri quàm matri, & filius natus aliquando magis similis est E
 matri quàm patri. Atque hæc tam multa à me relata decla-
 rant superiorem sermonem, Quòd & in muliere, & in viro
 tum mascula, tum foeminea genitura existat. Contingit au-

tem & hoc. Quandoque partus tenues & debiles generantur,
 ex patre & matre crassis ac robustis: & si quidē multis iam
 generatis pueris tale quid contingat, manifestum est quòd
 foetus in utero agrotavit, & ab utero quid de suo ipsius in-
 cremento foras prodiit, utero nimirum amplius hiantē:

& propterea debilis factus est. Vnumquodque autem ani-
 mal iuxta proprium robur agrotat. Si verò omnes pueri
 nati debiles fuerint, uteri ipsi in causa sunt, angustiores
 quàm oportet existentes. Si enim non habuerint spaciosi-
 tatem, in qua foetus nutrirī possit, necesse est ipsum tenuem

fieri, utpote qui non habeat satis amplum locum ad incre-
 mentum capiendum. Si verò habeat satis amplum locum, &
 non agrotet, verisimile est ex magnis parentibus magnam

παρὰ φύσιν
ματὶ cucu-
mere. sobolem generari. Habet autem hoc modo, Quemadmo-
 dum si quis cucumerem qui iam defloruit, sit autem adhuc
 tenellus, & in cucumerario adhuc adhæreat, ponat ac im-
 mittat in vas angustum, æqualis ac similis euadet cavitati
 ipsius vasis. Si verò quis eundem in vas amplum indet, quòd
 verisimile sit cucumeris capax esse, sed non valde multo

maius quàm pro cucumeris natura, æqualis itidem ac si-
 milis erit cucumis vasis amplæ cavitati. Nam in augeſcen-
 dō cum vasis cavitare contendit. & ferme omnia nascentia
 nascantur. sic habent, quomodo quis ipsa cogat. Sic sanè & in puero

ſe res

- A se res habet. Si enim spatiositas ipsi contigerit in augeſcendo, maior euadet: ſi verò anguſtia, minor. At verò mutilum in vtero puerum, ſentio aut contulū ex matris vterum geſtantis plaga, aut eiuſdem lapſu, aut alio quopiam violento aſſeſſu matri accidente, mutilatum eſſe. Qua verò parte mater plagas acceperit, ea puer mutilatur. Si verò amplius contundatur fœtus, ita vt pellicula ipſum continens rumpatur, perditur fœtus. Quin & alia huiuſcemodi cauſſa pueri mutilantur. Quum in vtero iuxta locum in quo mutilatus eſt fœtus, anguſtia fuerit, neceſſe eſt corpus quod in anguſtia mouetur mutilari, iuxta illum locum. Quemadmodum etiam arbores quæcunque in terra ſunt, & non habent ſatis amplum locum, verum à lapide, aut aliqua alia re impediuntur, quum emergūt, obliquæ ac tortuoſæ ſunt, aut hac parte craſſæ, altera tenues. Sic accidit etiam circa puerum, ſi in vtero iuxta aliquam corporis partem, anguſtior altera vteri pars altera fuerit. Caterum quòd ex mutilatis hominibus ſæper ferme ſani & integri gignantur pueri, vt plurimum contingere ſolet. Habet enim mutilatū, numero omnia quæ ſanum. Vbi verò morbus aliquis ipſis, & humido ipſorum acciderit, à quo ſemen prouenit (quatuor ſanè quum ſpecies ſint humidi, quæ naturaliter in corpore exiſtunt) geniturā non totam exhibent, debiliorem autem, iuxta mutilatam partem.
- Quare nihil miri mihi videtur, ſi etiam mutilentur, quemadmodum parens. Et hæc mihi de hoc dicta ſufficiant. Redibo autem ruruſus retro ad ſermonem quem dicere reliqui.
- C

HIPPOCRATIS^D

COILIBER DE NATURA

PVERI SIVE FOETVS.

IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSICO

INTERPRETE.

*

*Et de hoc Galenus dubitat Hippocra-
tisne an Polybi sit.*

E

in lib
Quid agat
semē in vul-
ua cū re-
manſit.



*Cur omnia
ardētia spi-
ritum emit-
tant.*

*Ligna viri-
dia cum ar-
dēt cur fla-
tū spiritū
ve emittāt.*

I genitura ab utrisque permanſerit
in utero mulieris, primum quidem
ſimul miſcetur, utpote muliere non
quieſcente, coaceruatūque ac craſ-
ſa per calorem euadit. Deinde ſpiri-
tum concipit, nempe in calido exi-
ſtens, & poſtea matre ſpirāte. Dein-
de ubi ſpiritu repleta fuerit, viā hic
ipſe ſibiipſi foras facit, & per mediā
genituram ſpiritus erumpit. Quum autem ſpiritu calido
via foras facta eſt, rursus alius frigidus à matre inſpirat, at-
que hoc facit per omne tempus. Caleſcit enim utpote in cali F
do exiſtens, & frigidum ſpiritus concipit à matre ſpirante.
Cur omnia Omnia autem quæ caleſcunt ſpiritus habent. Spiritus au-
ardētia spi- rem erumpit & ſibiipſi viam facit, ac foras procedit. Id autē
ritum emit- quod caleſcit rursus in ſeipſum alium ſpiritus frigidū tra-
tant. hit per fiſſuram vnde nutritur. Atque hoc cōtingit etiam in
lignis, & in foliis, cibisq; ac potibus, ſi fortiter caleſcant. Eius
Ligna viri- rei notionē ligna ardentia exhibent: omnia enim ligna hoc
dia cum ar- faciunt, maximè verò ſubuiridia. Emittunt enim ſpiritus
dēt cur fla- iuxta ſectionem. Spiritus autem quum foras procedit, circū
tū ſpiritū cæſuram volutatur, id quod ſemper fieri videmus. Mani-
ve emittāt. feſta igitur eſt ratiocinatio de ſpiritu, quod calidus exiſtens in
ligno, attrahit alterum frigidum à quo nutritur, & à ſeip-
ſo dimittit. Nam ſi non alterum pro eo quem à ſe dimittit
attrah

A attraheret, non volutaretur spiritus foras prodiens. Omne enim calidū frigidū moderato nutritur. Et vbi percalfactū fuerit humidum quod est in ligno, in spiritum mutatum foras procedit, & qua parte foras exit, ea ipsa calidus qui inest adhuc in ligno, alterum frigidum spiritum eius loco attrahit, à quo nutritur. Idem faciunt & folia viridia. Quum enim incenduntur spiritum concipiunt, deinde erumpit spiritus & viam facit, forasque prodit & circumuolutatur, procedens autem strepitum facit, qua parte inspirationem præbet. Quin & legumina & frumenta, & arborei fructus nunc generis calfacta spiritum habent, qui fissura facta foras prodit, & si humida fuerint, ampliores spiritum emittunt, & rimam maiorem faciunt. Et quid multis verbis opus est? Omnia quæcunque calefiunt, spiritum emittunt, & alium frigidum vicissim eius loco attrahunt, à quo nutrimentum sumunt. Atque hæc necessitates ea gratia à me productæ sunt, ut cognoscatur quod genitura in utero calfacta spiritum habet, & emittit. Simul autem & à matre spirante, genitura spiritum habet. Quum enim mater frigidū attraxerit ex aëre in seipsam, fruitur eo etiam genitura. Calida autem est, utpote in calido existens, & tunc sanè spiritum habet, ac emittit, atque ipsa genitura inflata pelliculam acquirit. Circumtenditur enim quod forinsecus circumipsam est, cōtinuumque euadit, utpote viscosum existens, Quemadmodum in pane dum torretur, tenue quiddam pelliculæ specie in superficiem abscedit ac extat. Calefcens enim panis & inflatus eleuatur, qua parte verò inflatur, isthic pelliculæ species excitatur & cōsistit. Genituræ autem calfactæ ac inflatæ ex toto, pellicula forinsecus circundatur. Verum iuxta medium genituræ, spiritui transitus extrà ac intro fit per pelliculam, & hac parte tenuitas pelliculæ à genitura distat, & paucissimum quid de genitura inest. Ipsa autem reliqua genitura rotunda est in pellicula. Atqui genituram quæ sex diebus in utero inest, & foras prolapsa est, ipse vidi, & qualis tum animo meo obseruabatur, ex illis ipsis reliquorum cōiecturam facio. Ut verò ego viderim genituram sex dierum existentem enarrabo. Mulieris nobis familiaris famula cantrix magne existimationis ex virorum consuetudine erat, quam in ventre concipere non conueniebat, ut ne minoris existimatio

Folia viridia cū comburuntur spirant.

Legumina & poma si miliaq; calefacta spiritū concipiunt.

Quid agat semen cū in vulua remansit.

Quali specie fuerit semen quod sex dies in

vulua man
ferat.

Semen in
membrana
molli tan-
quam ouū
conunetur.

Fœtus in v
tero quo-
modo cre-
scat.

in mens.

in mul.

p. 6. p.

Quomodo
sensim cre-
scit fœtus.

mationis redderetur. Audierat autem cantrix ipsa qualia D
mulieres inter se dicunt, quòd quando mulier conceptura
est in ventre, genitura non egreditur, sed intus manet.
Auditis autem his atque intellectis, hoc semper obserua-
uit, & quum quandoque sentiret genituram non exeun-
tem, dominæ exposuit, & sermo statim ad me peruenit.
Ego verò quum audissem, iussi ipsam ad terram saltare,
& postquàm septies iam exiliisset, genitura in terram pro-
fluxit, & strepitus factus est, atque illa conspecta ipsa ad-
mirata est. Qualis autem erat ego referam: velut si quis
ouo crudo externam testam circum circa adimat, in in-
terna verò pellicula inclusus liquor pellucescat. Modus qui-
dem talis erat, & vt abundè dicam, ruber erat liquor & E
rotundus. In pellicula vero fibræ quædam albæ ac crassæ
inesse videbantur, cum cruore crasso & rubro obuolutæ:
circum autem pelliculam foris cruenta vestigia instar su-
gillatorum, iuxta medium verò tenue quid eminebat,
quod mihi umbilicus esse videbatur, & per illum sanè spi-
rationem extra & intro primum facere apparebat: quin &
pellicula genituram ambiens ac complectens, tota ex illo
tendebatur. Talem sanè ego genituram sex dierum exi-
stentem vidi. Referam autem & aliam dinotionem, omni
cupienti de hoc scire, qui mihi paulo post hanc manifestè
apparuit, & testimonio esse potest omni meo sermoni, quod
verus est, quantum homini de huiusmodi re dicere da-
tur. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Quòd genitura in F
pellicula est, & spiritum habet intro & foras, & augetur à
matre sanguine in vterum descendente. Menses enim non
prodeunt, vbi mulier conceperit intra seipsam, si puer sa-
nus fuerit, & permanere debet, nisi in quibusdam primo
mense modicam sui indicationem faciant. Verum san-
guis à toto corpore mulieris descendens, in orbem forin-
secus pelliculam circumstat, Simulque cum spiritu sanguis
intra per pelliculam trahitur, qua parte perforata est, &
à genitura distat, congelaturque & futuro animali augmen-
tum præbet. Quum autem tempus accesserit, rursus a-
liæ pelliculæ intra primam pelliculam tenues & multæ
circuntenduntur, eo modo quo prima pellicula facta
fuit. Sunt autem & hæc ab umbilico extentæ, & inter se
mutua

A mutua ligamenta habent. Quum verò iam hoc factum est, ex descendente à matre sanguine & congelato, caro fit. Iuxta mediam autem carnem umbilicus distat, per quem spirat, & alimentum ac incrementum capit. At verò mulier quum vterum gerit, à menibus non prodeuntibus propterea non dolet. quod sanguis non conturbatur, aceruatim abire solitus singulis mensibus, sed procedit sensim & modicè citra dolorem, quotidie in vterum ipsum, & quod inest intus in vtero augetur. Singulis autem diebus ea gratia procedit, & non semel per mensem, quòd genitura in vtero existens semper à corpore trahit, prout vires, tum ipsa, tum spiratio habet. Et primùm quidem modica spiratio fit, & sanguis modicus à matre procedit. Quum verò spiratio amplior redditur, magis sanguinem trahit, & vberior is in vterum descendit. Atqui vterum non gestantibus, vbi menses non prodierint, propterea dolor oboritur. Primùm quidem sanguis in corpore singulis mensibus turbatur ab huiusmodi necessitate, quòd mensis à mense multum differt, & secundum frigiditatem, & caliditatem. atque hoc percipit mulieris corpus, humidius enim est quàm virile. Vbi autem turbatus est sanguis, & venas impleuit, ab ipso descendit, qualis ab initio naturæ fuit. Quare si quidem euacuatur à sanguine mulier, in ventre concipit: si verò repleta fuerit, non. Nam vacuis vteris, & venis à sanguine factis, mulieres in se fœtus concipiunt. Etenim post menstrui sanguinis purgationem mulieres, in ventre concipiunt. Causa iam dicta est. Quando autem conturbatus & secretus sanguis foras non procedit, sed in vteros, vteri autem non hauerint, tunc sanè à sanguine diutius immorante vteri calefcentes, reliquo corpori calorem transmittunt, quandoque etiam sanguinem in venas corporis distribuunt, ut & venæ repletæ doleant, & tumores laxos producant. Quandoque etiam periculum est ne claudicatio ex hoc indicatur. Aliquando & vesicam obident, premuntque ac claudunt vesicam, & urinæ stillicidium inducunt. Aliquando pleni quoque sanguinis existentes vteri prociidunt, aut ad coxendices, aut lumbos, & dolorem exhibent. Aliquando vbi sanguis quinque aut sex menses in vteris moram traxit, putrefactus pus fit, & quibusdam pus per pudendum exit. Sunt etiam quibus circa inguem velut tuberculum

Fœmina cū
vterum ge-
stat men-
struis cur
nō languet?

Mulieres
quæ gra-
uidæ non
sunt, & mē-
struis ca-
rēt, cur ma-
le habent?

Fœminæ
menstruis
carentes nō
cōcipiunt.

Sanguis in
vuluis re-
tentus totū
corpus affi-
cit.

Male
St. vti

Mēstruum
diutius re-
tinentibus,

quæ ægri-
tudinibus cō-
tingant.

Caro cū gi-
gnitur quid
fiat.

χρησιμ.

Conforma-
tio partus.

Arb.

Similitudi-
nem hanc cō-
sidera.

culum fit, illique suppuratum exit. Sed & alia multa huius-
modi mala mulieribus fiunt, vbi lunares purgationes non
procedunt. Sed quid opus est ea hic recensere? Referentur
enim in muliebribus morbis. Verum iam repetito eo quod
reliqui, sermonem absoluam. Quum autem generatur ca-
ro, tunc pelliculæ augescens in vtero sanguine, etiam ipsæ
augentur ac sinuantur, & præsertim externa. Et sanguis à
matre descendens, quem sanè caro spirans attraxerit, in in-
crementum cedit, & si utilis non sit, in sinus pellicularum se-
cernitur: & vbi sinuata factæ fuerint, ac sanguinem suscepe-
rint, tunc iam secunda appellatur. Et tantum de hoc mihi di-
ctum sit. Cæterum caro augescens à spiritu articulatur, &
abit in hac vnumquodque simile ad simile, densum ad den-
sum, rarum ad rarum, humidum ad humidum. & vnumquod-
que in propriam regionem abit, iuxta cognationem, ad id à
quo genitum est: & quæcunque à densis genita sunt, densa
sunt: & quæcunque ab humidis, humida: & reliqua iuxta ean-
dem rationem fiunt in incremento. Et ossa durescunt à ca-
lore conglutinata. Et sanè ramificantur velut arbor, & tum
interna, tum externa corporis, adhuc melius articulantur:
Ipsūque caput distantiam acquirit ab humeris, & brachia
ac cubiti à lateribus: & crura inter se disparantur: & nervi
exiliunt circum naturas articulorum: & os per se diducitur,
& nasus, & aures eminent in carne, ac perforantur: & oculi
implentur humore puro, & pudendum cōspicuum fit vtrum
tandem sit: & viscera coarticulantur: & iam etiam supernis
partibus spirationem facit, tum ore tum naribus: & venter
inflatur, & intestina inflata supernè, per umbilicum spiritū
assumunt, ac disperdunt: & in podicem via fit à ventre ac in-
testinis foras, & in vesicam via foras. Atq; hæc omnia à spi-
ritu coarticulantur, Nam inflata disparantur omnia, iuxta
cognationem. Etenim si velis fistulam vesicæ alligare, & per
fistulam immittere in vesicam, terram & harenam, & plum-
bi tenuia ramenta, insuperque infusa aqua in fistulam infla-
re, primum quidē illa aquæ permiscetur, deinde verò tem-
poris progressu inflata secedent, & abibit plumbū ad plum-
bum, harena ad harenam, terra ad terram. Et si quis ipsa
arescieri permittat, & distracta vesica cōtempletur, inueniet
simile ad simile progressum esse. Sic sanè etiam genitura &
caro

A caro coarticulatur, & vnumquodque in ipsa simile ad simile
abit. Atque hæc mihi de hoc dicta sunt, & factus iam est
puer, & ad hoc peruenit fœmella quidem in quadraginta &
duobus diebus vt longissimè, primam coagmentationem
ac coarticulationem accipiēs. Masculus verò vt longissimè,
in triginta diebus. Vt plurimum enim hoc tēpore, aut pau-
lò breuiore, aut paulò longiore, articulatio ipsis contingit.
Nam & purgatio fit à partu vt plurimum, in fœmellis qui-
dem, diebus quadraginta & duobus: atq; hæc tardissima est,
& perfecta. Vacauerit autem periculo, etiā si in viginti quin-
que diebus purgetur. In masculo verò purgatio fit diebus
triginta: atque hæc tardissima est, & perfecta. Citra tamen
B periculum fuerit, etiā si in viginti diebus mulier purgetur.
Postremo autē tempore purgatio quā paucissima proce-
dit, & in iunioribus paucioribus diebus purgantur, in senio-
ribus verò pluribus. Caterū maximè laborāt ac dolent in
partu, & partus purgationibus mulieres primiparæ, & qua-
rarius pariunt, magis dolent, quā quæ sæpius. Atqui pur-
gationes à partu mulieribus ea gratia fiunt, quòd primo
tempore vsque ad dies quadraginta duos in fœmella, in ma-
sculo verò, ad dies triginta, paucissimus sanguis in augmen-
tum pueri descendit. Ab hoc autem tempore copiosior, do-
nec pariat. Oportet itaque purgationem reddi in toto puer-
perij tempore, & foras exire ac respondere pro dierum ra-
C tione ac proportionē. Principium autem huiusmodi purga-
tionis tale mulieri fit: Dum ex partu laborat, conturbatur
sanguis mulieri, & à forti pueri motu vehementer calefcit.
Conturbatus autem, primus quidem foras prodit. Deinde
puer, post puerum verò, mucus crassus sanguinolentus, &
deductio contingit huic, quemadmodū aquæ estulæ in men-
sa. Postea post illum per omnes dies purgatio procedit, vsque
ad prædictum tempus, copia Atticæ hemina vnius & dimi-
diæ primū, aut paulò plus minūsvē, pro eius temporis ra-
tione, donec desinat. Procedit autem sanguis velut à victi-
ma, si sana est, & sana futura est mulier, & statim congela-
tur. Si verò mulier sana nō est, neque sana futura est, purga-
tio paucior procedit, & specie deterior, & non citò congela-
tur. Id verò hoc modo habet. Si mulier vterum gestans mor-
bum habuerit nō cognatum, in puerperij purgatione perit.

Tempus
cōformatio-
nis in vte-
ro. *f. 42*

Al. 30

qu. m. d.

10. 46

46

Quæ fœ-
minæ plus
minūsvē in
partu, puer-
perio quela-
borent.

Quo pacto
factus erū-
pat.

10. 46

Si

Puerpera
cum nō ple-
nē purgan-
tur, perici-
tantur.
Purgatio-
nes quot
diebus fūt.

Si verò non purgetur in prioribus diebus vterum gerens, ita d-
tim sana existens, aut etiam non, commoueat autem ipsa
purgatio siue à pharmacis, siue sua sponte de repente, iuxta
dierum rationem procedet, quibus non vna vice procedit.
Si enim non purgetur mulier à purgationibus partus, mor-
bus magnus ipsam corripit, & periculum vite incurret, nisi
citò curetur, & quis conuenientem ipsi purgationē inducat.
Hæc propterea produxi, vt ostenderē quod in pueris mem-
brorum discretio longissima contingit, in fœmella in qua-
draginta duobus diebus, in masculo in triginta. Argumen-
to est purgatio à partu, quæ in fœmella fit in quadraginta
duobus diebus, in masculo in triginta, vt tardissimè contin-
gat. Repetam autem iterum eandē rem iisdem verbis, ma-
ioris lucis ac declarationis gratia. Dico enim talionem re-
pendi, quod genitura in vtero existenti paucissimus sanguis
à matre in vterum venit, si fœmineam genituram habeat, in
quadraginta duobus diebus, in his enim coarticulatur pue-
rorum membra: ab hoc verò tempore copiosior sanguis ve-
nit. Et in masculo rursus iuxta rationem dierum triginta.
Quod verò hæc vera sint, etiam alterum testimonium adest,
hoc modo habens, Primis diebus vbi genitura in vteros illa-
psa est, paucissimus sanguis à muliere in vteros venit, dein-
de copiosior. Si enim aceruatim & multus semel veniret, ge-
nitura spirationem habere non posset, sed sanguine multo
accedente suffocaretur: Rependitur autem in purgatione
vice versa, purgatio enim puerperij in primis diebus pluri-
ma procedit, deinde paucior, donec desinat. Multæ autem
mulieres puerum masculum iam perdiderunt paulò antè
trigesimum diem, & inarticulatus apparuit. Qui verò po-
sterius perdit sunt, aut simul cum trigesimo die, omnes ar-
ticulati apparuerunt. In fœmella itidem iuxta rationē qua-
draginta duorum dierum habet. Nam vbi his absolutis per-
ditur, articulatio membrorum apparet. Siue autem prius,
siue posterius perdetur puer, iuxta hanc rationem apparet.
Nam & secundum rationem, & necessitatē, articulatio con-
tingit in fœmella, in diebus quadraginta duobus, in mascu-
lo in triginta. Testimonium enim præbent abortus puero-
rum, & à partu purgationes. Quod autem fœmella poste-
rius conformatur ac coarticulatur, causâ hæc est: quod ge-
nitura

Quando
abortus in-
formes.

Puella chr-
tardius cō-
formeretur.

A nitura foeminea debiliior est ac humidior quam mascula, & iuxta hanc rationē necesse est posterius conformari foemel-
lam quam masculū, atq; ea gratia etiā purgatio diuturnior
est in foemella quam masculo. Redibo autem rursus retrō
vnde digressus sum. Postquam iam articulatus fuerit puer,
speciebus membrorū ipsius augescantibus, tūc & ossa durio-
ra fiunt, & cauantur, atq; hæc à spiritu fiunt. Caua autē exi-
stentia trahunt ad sese à carnibus quod in sanguine est pin-
guissimum: & progressu tēporis ramificantur rursus extre-
mitates ossium, quemadmodū arboris extremitates postre-
mum ramos spargunt, sic & in puero digiti manuum ac pe-
dum inter se disparantur. In ipsis autem extremitatibus vn-
Bgues enascuntur. Desinunt autē venæ hominis omnes in di-
gitos manuum ac pedum. Et crassissimæ quidē sunt venæ to-
tius corporis, venæ capitis, deinde crurū, & brachiorū ac cu-
bitorum. In pedibus autē & manibus, tenuissimæ ac densissi-
mæ & plurimæ venæ sunt. Nervi itē tenuissimi ac densissi-
mi & plurimi, & ossa magnitudine minima, atq; hæc maxi-
mè in digitis manuum ac pedum existunt. Verū ex digitis, vt-
pote ossa densa ac parua habetibus, venas itidem ac nervos,
sic etiā vngues tenues ac densi nascuntur, & intercipiunt ac
concludunt venarū extremitates, vt ne ampliū augescāt, ne-
que altera alteri præmineat: vt nihil miri sit vngues in extre-
ma corporis parte densissimos esse, ex densissimis enim con-
stant. Simul autē cū vnguibus etiā capilli in capite radican-
Ctur. Caterū pilorum natura hoc modo se habet, Oriuntur
quidē maximi ac plurimi, qua corporis parte cuticula rarif-
sima est, & vbi pilus moderatū humorē in alimētum habet:
& vbi cuticula posterius rara fit, ibi etiam pili posterius na-
scuntur, velut in mēto, & pube, & sicubi aliās pili nascuntur.
Simul enim vt genitura prodit, etiā caro rarefcit, & cuticula
& venæ aperiuntur magis quam priori tēpore. Nā dum ad-
huc puer est, & venæ tenues existunt, non procedit per ipsas
genitura, eadē ratio de mensibus virginū est: Simul autē vt
via fit & genitura, & mensuris virginibus, etiā pilos emittit
pubes, tum pueri, tum virginis, rara nimirū cuticula reddi-
ta, simulq; pilus moderatā humiditatem in alimentum ha-
bet, & non pauciorē. Si verò & in mento viri contingit. Rara
enim fit cuticula, procedente in ipsam de capite humiditate,
Simul

Caua ossa
quid agāt.

Digitum tan-
quam ra-
musculi po-
stremo dis-
cernuntur.
Quæ in pe-
dibus & ma-
nibus in-
sunt.

Cur densi
vngues.

Capillus
pilūsq; quo
loco fructi-
cet.

Seminis
per venas
via quādo
fiat.
Virguncu-
lis cur in-
terdū men-
ses non sint.
Pubertatis
caussa.

Hippocratis Liber

Simul enim & in coitu, simulq; interiecto tempore, pilus mo-
deratam humiditatem in alimentū habet, & tunc maximè,
quum tempus contingit humiditati de capite descēdenti in
coitu, ad mentum à pectore distās. Signum autem eius quod
in rarissimis cuticulæ partibus pili enascuntur: si quis velit
inurere cutem, & pustulam tantum facere, eamq; sanare, cu-
tis densa reddita per cicatricē pilos non producet. Quicunq;
Eunuchi verò Eunuchi dum pueri sunt, fiunt, propterea neq; in pube,
pubescant. neque in mento pilos producant, leuēsq; toti existunt, quòd

via genitura non facta, cuticulam non rarefacit per totā su-
perficiē. Intercepta est enim ac conclusa genituræ via, quem-
admodum paulo ante à me relatum est. At verò mulieres le-
ues fiunt, & mento, & corpore, quòd in coitu ipsarum humi-
ditas non similiter agitata velut viri, cuticulam raram non

mul.

*Caluitij
caussa.*

+

facit. Quicunque autem calui fiunt, hi sanè pituitosi sunt. &
pituita in capite ipsorū simul cum coitu agitata & calfacta,
ad cuticulam allabens pilorū radices exurit, & defluunt pili.

Eunuchi Verū eunuchi propterea calui non fiunt, quòd vehementē
non calue- motum non faciant, neque pituita in coitu calfacta pilorum
scunt. radices exurit. Cæterum cani ob id fiunt quòd lōgo tempore
Canicies pertranseunte in homine humiditate, albissimum eius secer-
cur. nitur, & ad cuticulam allabitur, & pilus albidiorē humi-
ditatem trahens albidior fit quā priori tempore, itēque
ipsa cuticula, præsertim vbi cani sunt, albidior alia euadit.

Cani cur Et quicunq; ex natiuitate canū quid in capite habent, etiam
in ortu. illis cuticula summa vbi cani sunt, reliqua albidior existit. F
Illic enim albissima est humiditas. Habet autē res hoc mo-
do, Qualemunque humiditatem caro attraxerit, siue albā,
siue rufam, seu nigram, tali colore etiam pilus inficitur. Atq;

Quotus in hæc de hoc dicta sunt, Redibo autem rursus ad sermonem
vtero fœtus relictum. Quum itaque extremitates corporis pueri foras
monetur. ramos sparserint, & ungues ac pili radices egerint, tunc iam

Primum fit

utro m

maç. m

si fœt. lac in mam. app.

etiam mouetur, & tempus ad hoc fit, masculo quidem men-
ses tres, fœmelle verò quatuor. Sic enim vt plurimū contin-
git. Sunt autem aliqui pueri, qui ante hoc tempus mouetur.
Mouetur autē primū masculus, quia fortior est quā fœ-
mella: & primū quoque conformatur masculus. nam à for-
tiore & crassiore genitura fit. Quum autem mouetur fœtus,
tunc sanè lac indicationem sui, matri præbet. Mamme enim
attoll

A attolluntur, & papillæ gliscunt ac turgēt: Lac verò non pro-
dit: & in mulieribus densam carnē habentibus, lac posterius
significationem de se præbet ac prodit. in rarū verò carnem
habētibus, prius. Lac autem ob huiusmodi necessitatem fit. *Lac cur
fiat.*

Quum vteri tumidi præ puero sunt, ventrem mulieris com-
primunt: eius autē pleni vbi cōpressio contigerit, pinguis-
simum de cibis ac potibus foras profilit, in omentum ac car-
nem. Quemadmodū si quis coriū illinat multo oleo, & imbi-
bere permittat, & vbi imbibit, coriū ipsum premat, oleum
vtrique exilierit foras ex corio compresso. Sic etiam si venter
pinguitudinē in se habeat à cibis ac potibus, comprimaturq;
ab vteris, pinguitudo profilit in omētum ac carnem. Et si ra-
ra carnis mulier fuerit, citius percipit eius persultationem:

B si non, posterius. Quin & pecora pragnātia si non ægrotent,
ab eodem potu ac cibo pinguiora propterea fiunt. Similiter
autē & mulier. Et à pinguitudine calfacta ac alba existente,
quod edulcatū est à caliditate, quæ ab vteris accessit, expres-
sum venit in māmās, & in vteros quoq; parum venit, per eas-
dem venas. Tendunt enim & in māmās & in vteros venulæ
hæ, & consimiles aliæ. Et vbi peruenerit in vteros *de lacte*,
puer ipso paululum truitur, Mammæ verò suscepto lacte im-
pletæ attolluntur. Et vbi peperit mulier principio motus fa-
cto, lac in māmās ipsas procedit, si lactauerit. Sic enim res ha-
bet. Dum mamme lactāt ac exuguntur, venulæ in mammas
ampliores fiunt, ampliores autē factæ, à ventre pinguitudinē
trahentes, in māmās distribuunt. Nam & vir si multū coeat,
venæ ampliores redditæ, Venerē magis inducunt. Habet au-
tem & hoc eo modo: Alimentum & augmentum puerorū fit,
vbi ea quæ à matre veniunt, in vteros processerint, & prout
mater habet iuxta sanitatem aut debilitatem, sic & puer ha-
bet. Quemadmodum etiam quæ in terra crescunt, à terra nu-
truntur, & prout terra habuerit, sic etiam nascentia in terra
habent. Etenim semen vbi deiectum fuerit in terram, humi-
ditate quadā ab ipsa impletur. Habet enim in se terra omni-
genum humorē, vt nascētia nutrire possit: impletum autem
humore semen, inflatur & intumescit, & vis quæ in semine
leuissima est, ab humore condensari cogitur, condensata au-
tem à spiritu vis, & humore folia producēte, semen rumpit,
& primum folia foras emergūt. Vbi verò emerferint, quum
non

*Quomodo
mā
trā oporiet
probar.*

*Pecora gra-
uida potu
& cibo ma-
gis pingue
scunt.*

*Lactis co-
pia quādo.*

*Salacitas
viris vnde.*

*Quomodo
sata nascun-
tur.*

non amplius ab humore in semine existēte folia nutriri pos-
sint, rumpitur infernè semen, itēque folia, & semen à foliis
coactū, vim suam ad inferna demittit, quæ videlicet in ipso
restat propter gravitatem, & fiunt radices ex foliis distentæ.
Postquā autem plāta iam firmiter radices infernè egerit,
& alimentum à terra sumit, tunc sanè tōtum evanescit, & in
plantam consumitur, præter corticē, qui solidissimus existit.
Rursus autem cortex in terra putrefactus progressu tempo-

Quæ terra ris evanidus fit, & quædam folia ramos producūt. Ex semine
gignuntur, itaq; tanquam ex humido nata planta, donec quidem tenera
quomodo & aquosa fuerit, in augmentū supernè ac infernè procedens,
procedant. fructum excludere non potest. Non enim vim habet fortem

ac pingue, ex qua semen condensari queat. Vbi verò solidior
facta est, & progressu temporis radices egerit, tūc iam & ve-
nas habet amplas, tum ad supernam, tum ad infernam par-
tem: & tunc sanè non amplius aquosum ex terra trahit ali-
mentum, sed crassius & pinguius ac copiosius quod calfactū
à Sole efferuescit in extremitates, & fit fructus iuxta cogna-

Cur multa tionem, ex quali etiam generatus est. Multus autē ex modi-
ex vno gi- co propterea fit, quod singula ex terra nascentia maiorē vim
gnantur. ex terra, quā ex eo vnde generata sunt, trahunt, & efferue-
scunt non secundum vnum, sed secundum multa. Quum au-

tem fructus prodierit, à planta sua nutritur. Planta enim à
terra trahens, fructui trāsmittit. Sol autem fructum coquit,
& solidū facit, quod aquosius in ipso est, ad sese trahens. Atq;
hæc mihi dicta sunt de his quæ ex semine nascūtur à terra & F

Arbor quæ aqua. Cæterum ex plantariis ab arboribus arbores fiunt, hoc
plantetur, modo. Ramus vulnus habet, qua parte ab arbore defractus
crescatve. est, in infima ad terrā parte, vnde radices prodeunt. Pangitur
autem, & in terram demittitur, hoc modo: Quum plāta quæ
in terra existit, humorem acceperit à terra, tumescit & spi-
ritum habet, quæ verò pars supra terram eminet, nondum.
Spiritus autem & humor condensans in inferna plātæ parte
vim, quantū eius gravissimum est, in infernam partē erum-
pit, & ex ipso radices teneræ fiunt. Postquam autem in infer-
nam partem receptus fuerit, tunc iam ex radice humorē tra-
hit, & parti supra terram eminenti transmittit: & tunc sanè
rursus superna pars intumescit, ac spiritū habet, & quantum
ex vi in planta leue inest, id ipsum cōgregatum germinat, ac
folia

A folia producit, & iam in supernā partem augmentum facit, itémq; in infernam. Sic itaq; contrarium contingit circa germinationem, in his quæ ex semine, & in his quæ ex plantariis proueniunt. Ex semine enim prius folium emergit, deinde radices in infernam partem demittuntur. Verum arbor primum radices agit, deinde folia acquirit, propterea quod in semine ipso humoris copia inest, & in terra quū totum inest, alimentum inest primum folio sufficiens, vnde folium nutritur, donec radiceatur. Verum in ramo non sic fit. Non enim gignitur ex altero, vnde folium primum alimentū habeat, sed ipse ramus est, & velut arbor habet, & multa eius pars supra terram eminet. Quare quum supra terram existat, humore impleri non potest, nisi ex inferna parte magna quadam vis procedens in supernam humorem distribuatur. Et plantarium primo necesse est sibi ipsi alimentum sufficere à terra in radices, deinde vbi sic à terra attraxit, sursum distribuere, & folia ad germen & augmentum concitare. Quum autē augmentum cepit planta, à tali necessitate ramos spargit, quam referam. Quū plus humoris ipsi accesserit ex terra attracti erum pit præ multitudine, quā parte quā plurimus fuerit, & hac parte planta ramos emittit: augetur autem & in amplitudinem, & in supernā, & infernam partem, propterea quod inferna terræ pars hyeme quidem calida est, æstate autem frigida. Atque hoc propterea contingit, quod terra humida est in hyeme, præ aqua de cælo delabere, & comprimitur in se ipsam, utpote humore grauiore existente: densior autem ab hoc ipso est, & nullam transpirationem habet. Non enim amplius magna raritas ipsi inest: & propter hoc inferna terræ pars hyeme calida est. Nam & fimum densius accumulatum, intus calidius est, quā quod raru existit & aliās, humecta ac compressa, à seipsis concalescunt, & breui a calore valde exulta putrescunt. neque enim permeat spiritus per ipsa, nimirum quum densa existunt. Si verò sicca fuerint, ac rare posita, multo minus calescunt ac putrescunt. Atque sic sanè frumentum ac hordeum humidum, ac madefactum, intus calidius est, quā si siccum sit, & rare positum. Et vestes pelliceæ colligatæ ac fortiter compactæ, à seipsis comburuntur, velut ego vidi, quemadmodum ab igne exultæ. Sed & alia si quis velit considerare, Omnia quæ comprimuntur à seipsis, calidiora

Cur herba
& arbores
contrario
modo coa-
lescant.

Cur terra
inferiora
hyeme ca-
lida, æsta-
te frigida
sint.

Cur humi-
da cum co-
aceruantur
calescant.

* diora reperiet, quàm quæ rarè posita sunt. Non enim habent
 unde frigiditatem inspirent à ventis. Sic etiam inferna terre
 pars cùm plena sit, & ipsa à seipsa comprimatur, nimirum
 grauis ac densa existens, ab humiditate in hyeme calefcit, nul-
 lam enim caliditatis perspirationem habet. Sed vbi de cœlo
 aqua cadit in ipsam, quū spiritus prodierit ab ipsa in terra,
 non vltius penetrat, vtpote terra densa existente, sed spiri-
 tus retrò ad aquā abit: & propterea fontes ac marinæ aquæ,
 hyeme calidiores sunt, & austiores quàm æstate, quia spiri-
 tus dum exhalat, retrò abit ad aquā, quum terra densior exi-
 stat, & per se spiritum non transmittat. Et aqua multa exi-
 stens quæ contigerit, ea perrūpens procedit, & viam sibi ipsi
 ampliorem facit, quàm si modica existat. Aqua enim in ter-
 ra non consistit, sed semper in decliue procedit. Si autem spi-
 ritum ab aqua prodeuntem terra per se hyeme transmittat,
 paucior aqua ex ipsa procederet, & fontes hyeme magni nō
 essent. Atque hæc omnia in hoc dicta à me sunt, quòd terræ
 inferna pars calidior esse apparet hyeme, quàm æstate. Nūc
 autē dicere volo, quòd æstate frigidior quàm hyeme, inferna
 terræ pars esse videtur. Terra æstate rara est & leuis, nimirū
 Sole vehemētius irruente, & ab ipsa humiditates ad sese at-
 trahente. Habet autē terra in se semper aquam plus aut mi-
 nus. Spiritus autem omnes nobis sunt ab aqua. Id quod sic se
 habet, unde coniectare polsis, demonstrabo. Etenim ab omni-
 bus fluminibus ac nebulis spiritus semper procedunt. Est au-
 tem nebula aqua in aere cohærens & continua. Et tunc sanè
 terra rara est ac leuis æstate, & aquam in se habet, & aqua in
 decliue fluit, procedente autem aqua semper inde alius ex a-
 lio spiritus exhalat. Qui verò exhalat, per terrā abit leuem
 ac raram existētem, & frigiditatē terræ inducit, & ipsa aqua
 simul perfrigeratur. Habet autē sic, Quemadmodum si quis
 aquam in vtre existentē fortiter comprimat, & per punctu-
 ram acus, vel paulò maiorem, perspirationē aquæ faciat, &
 ipsum vtrē in sublimi suspēdat, nullus spiritus per foramen
 procedat, sed aqua, non enim habet spatiositatem, per quam
 aqua spiritum emittat. Sic sanè se habet etiam hyeme aqua
 in terra. Si autem aquæ in vtre locum satis amplum feceris,
 & vtrē in sublimi suspenderis, spiritus per foramen proce-
 det. Locū enim spiritus habet ab aqua mota, procedendi per
 vtrē,

Mare &
 fontes cur
 hyeme ca-
 lefcant, &
 turgeant.

Nebula
 quid.

τῆ ὁμοιωσὶς
 confirmat.

- A vtrem, & propterea per foramen spiritus transit. Sic sanè se habet etiam æstate aqua in terra. Satis amplu enim locū habet, nimirum terra rara existente, & sole ab ipsa humorē ad se trahente, & pertransit spiritus, utpote qui frigidus existit, ab aqua per ipsam raram existētem ac leuem. Ob hoc itaq; *Cur aqua hyeme calida, æstate friget.* inferna ipsius pars æstate frigida existit, & aqua ipsa adhuc magis quā spiritus, qui in terra frigidus existit, & ipsa in seipsam, & in terra, spiritum emittit. Sed & aqua quæ hauritur in puteo, spiritum semper mouet, velut flabellum, atque hoc ipsum aquæ frigiditatē inducit. Quæ verò nō hauritur æstate, sed stans densa existit, nō similiter spiritū in se à terra suscipit, neq; in terram à seipsa distribuit: & simul à sole & aëre in puteo non disperso, sed stante ac firmato, primū superfacies ipsius calefit, deinde alia eius pars ad aliam deorsum caliditatem distribuit, & propterea aqua quæ æstate nō hauritur, calidior est ea quæ hauritur. *Fontis alti qualis aqua* Quin & fontes valde profundi æstate semper frigidi existunt: & aqua hausta hyeme terra calida existente, ex tali fonte, statim quidem calida est, vbi verò tēpus progressum fuerit, frigida est ab aëre videlicet frigido existēte talis facta. Perflatur enim à vento, & spiritus per ipsam pertransit. Quēadmodum etiam aqua quæ æstate hauritur, vbi hausta fuerit, statim frigida est, calida autē fit postea, propterea quod terra rara existēte, & spiritu in ipsa existēte, perfrigeratur: Vbi autem haustæ tempus accesserit, stabilis fit, & calida cōspicitur, Calefit enim ab aëre calido existente, quēadmodum & aqua quæ non hauritur in puteo æstate, ob hoc ipsum calida redditur. Atq; hæc à me de hoc dicta sunt. Repetam autem rursus quod æstate inferna terræ pars frigida est, hyeme verò calida. Superna autem vice versa. Et oportet arbori non duo calida simul accedere, neque duo frigida simul, si sana esse debet. Verū si quidem ex superna caliditas accesserit, ex inferna frigiditatē ipsi accedere oportet, & vice versa, si ex superna parte accedat frigiditas, ex inferna caliditatem ipsi contingere oportet. Et radices vbi attraxerint, arbori transmittunt, & arbor vicissim radicibus: atq; sic & frigidi & calidi conseruatio contingit. Quēadmodum homini ingestis cibis in vētrem, qui dum concoquuntur calefaciunt, perfrigationem à potu facere oportet. Sic & arbori contrarium rependi oportet, ex inferna par

na parte ad supernam, & vicissim, & augetur arbor, & in su D
pernam, & in infernam partem, propterea quod alimentum
ex inferna & superna ipsi accedit. Et quandiu quidem vehe-
menter tenera fuerit arbor, fructum non producit. Non enim
est in ipsa pinguis vis, neque crassa, quæ ad fructum cōferre
possit. Progressu autem temporis venæ in ipsa dilatata, pin-
guem ac crassam influxionem ex terra in ipsam faciunt, sol
autem ipsam diffundens, ebullire facit utpote leuem existē-
tem, in extremitates, & fructum producere, & tenuem qui-
dem humiditatem à fructu sol aufert, crassam autem conco-
quens & calefaciens edulcat. At verò arbores nō fructiferae,
in se pinguitudinem tantam non habent, quantum eius in
fructum est expēdendum. Omnis arbor autem quum per tē E

Cur insita
suū fructū
ferant.

iam penitus cōstanter augetur desinit. Quicumque verò in
arbores, ab aliis arboribus oculos indiderūt, & arbores in ar-
boribus enatae viuunt, & fructificant non similem fructum ar-
boribus, quibus insite sunt, id ipsum tali modo cōtingit. Ocu-
lus primum quidem germinat. Alimētum enim habet pri-
mum ab arbore, ex qua ablatus est, deinde ab ea, in quā in-
situs est. Vbi autem germinauerit, sic in arborem radices te-
nues à se demittit, & primum humore fruitur in arbore, in
quam insitus est, existente, deinde tēpore accedēte, demittit
radices in terrā, per eā in quā insitus est, & fruitur humore
quem à terra trahit, & alimentum inde ipsi contingit, ut non
mirū sit, insitas arbores, alios fructus producere, à terra enim F

Partus ter-
renis com-
paratur.

viuūt. Hæc mihi de arboribus & fructibus dicta sunt ea gra-
tia, quod indignum mihi factum videbatur, & ne poteram
quidem, hæc tractationē semiperfectam relinquere. Redibo
nunc rursus retrò ad illum sermonē, cuius gratia à me hæc
de istis relata sunt. Censeo enim terræ nascentia omnia viue-
re ex terræ humore, & qualē terra humorē in seipsa habet,
talem etiam nascētia ex ipsa habere. Sic etiam puer viuit de
matre in vtero. & quali mater sanitate prædita est, talē etiā
puer habet. Quod si quis cōsiderare velit ea quæ de his dicta
sunt, ab initio vsque in finem, inueniet naturam omnem cō-
similem esse, & ex terra nascētium & hominū. Et hæc mihi
de hac dicta sunt. Cæterum puer in vteris existens manus a-
pud genas habet, caput autē prope pedes: & non datur probè

Pueri situs
in vtero.

genæ

ac cer

A ac certo cognoscere, etiam si puerum in vtero videas, vtrum ca-
put sursum habeat, an deorsum. Verum ex vmbilico pelliculae
tentae sunt ipsum continentes. Nunc autem referam dinotionem,
quam paulo ante me demonstraturum dixi, quantum huma-
nae menti possibile est manifestam existentem, omni qui de
hoc cognoscere velit, quod genitura in pellicula est, & quod iux-
ta medium ipsius vmbilicus est, & per illum sanè, primò spi-
ritum in seipsam trahit, & foras emittit. & quod ex vmbili-
co pelliculae tentae sunt. Sed & alia pueri naturam, quam dixi,
sic totam habere usque in finem reperiet, quomodo videlicet à
me in his sermonibus declaratum est, si quis testimoniis, & o-
cularibus inspectionibus à me producendis uti velit. Etenim si
B quis ova viginti aut plura, quo pulli ex ipsis excludantur gal-
linis duabus aut pluribus subiicere velit, & singulis diebus
à secunda exordièdo, usque ad ultimam qua excludetur pullus ex
ouo, subtrahere, confringere, ac videre, inueniet omnia se ha-
bere iuxta meum sermonem, quomodo volucris naturam,
ad humanam conferre oportet. Quod enim pelliculae ex vmbi-
lico tentae sunt, & reliqua quae de puero dicta sunt, sic se ha-
bere in ovo volucris reperies, ab initio in finem. Atqui si quis
nondum vidit, mirabitur in volucris ovo vmbilicum inesse.
Atque haec sic habet, & sic à me relata sunt. Quando verò mu-
lieri partus appropinquat, tunc puero se mouente, & manibus
ac pedibus calcitrante, pelliculam quandam internam rupi-
C contingit, rupta autem una, etiam aliae debiliorem vim ha-
bent, & rumpuntur primum quidem illi contiguae & cohaeren-
tes, postea extrema. Quum autem ruptae fuerint pelliculae, tunc
foetus à vinculo exoluitur, & agitatus foras procedit, Neque
enim amplius robur habet pelliculis amissis, neque vteri am-
plius puerum continere possunt, pelliculis velut dixi amissis, &
ab ipsis abruptis. Cohæret enim pelliculae etiam vteris, ubi cir-
cum puerum obuoluuntur, non adeo vi valida ac multa. Quā-
do autem procedit puer, violat & dilatat vteros in exitu, ut
pote teneros existentes. Procedit autem in caput, si secundum
naturam prodierit. Grauiissimae enim sunt ipsi superne partes,
si ex vmbilico perpédantur. Quum autem in vteris est, ma-
gis continens existit usque ad pellicularum rupturam simul cum
decimo mense, quando partus matri propinquat, & adest. Si
verò violentam affectionem perpetiatur puer, etiam ante ear.
f 2 prae

+ lū
sub

Per ouum
hoc confir-
mat.

Quo pacto
puer erum-
par.

+ Parhus. Sm

Caput pri-
us si natu-
raliter ex-

præfinitū tempus ruptis pelliculis prodit. Quin & si alimen-
tū à matre prius puero defecerit, etiā sic partus matri prius
aduenit, & ante decimū mensem puer prodit. Carterum quæ
longius quā decem mēsiū tempus vterum gestare sibi vi-
se sunt: nam hoc iam sepe audiui, illæ ipsæ hoc modo quem
di sturus sum deceptæ sunt. Quum vteri spiritū acceperint in
seipso, à ventre flatum exhibente, eleuantur ac intumescūt,
contingit enim hoc, Videntur sanè sibi mulieres tunc conce-
pisse. Præterea si menses non procedentes, cōgregati fuerint
in vtero, & diutius manserint, semper perfluūt in vteros, ali-
quando vnā cum flatu à ventre, aliquando etiam calefcētes,
& sanè tunc quoq; in vtero habere mulieres sibi vidētur, ni-
mirum mēsiū non prodeuntibus, & vteris eleuatis. Dein
de aliquando menses sua sponte erumpunt, aut aliis superue-
nientibus à corpore in vteros, & priores protrudentibus, &
flatus egreditur, & multis iam statim post mēsiū purgatio-
nem vteri hiant, & ad pudendū vertuntur, & tunc viris per-
mixte, ad se genituram concipiunt, eadem die aut omni-
no in paucis. Existimant autem inexpertæ harum rerum ac ra-
tionum, etiam illo tēpore se in vtero habuisse, quando men-
ses non prodibant ipsis, & vteri erant eleuati ac tumentes.
Quod autem non diutius quā decem mēsiū contingat
vterum gestare, ego demonstrabo. Alimentum & augmen-
tum quod à matre descendit, non amplius sufficiens est pue-
ro, vbi decē menses præterierint, & fœtus auctus fuerit. Tra-
hit enim quod dulcissimum est in sanguine ad sese, simulq; F
etiam lacte modice fruitur. Quum autem hæc ipsi rariora
ac pauciora sint, & puer plenus ac maturus existat, copiosius
alimentum desiderans calcitrat, ac pelliculas rumpens, ini-
tium partus matri inducit, & hoc perpetiuntur magis mu-
lieres primiparæ: deficit enim pueris alimentum, vt ad de-
cimū vsque mensem sufficere non possit. deficit autē per
hunc modum. Sunt quædā mulieres quibus sufficientes mē-
ses purgantur, quædam quibus pauciores: hoc ipsum si sem-
per fiat, in natura, & genere, maternum ipsis existit. Quæ ve-
rò menses paucos demittunt, hæ etiam pueris postremò tem-
pore, vbi iam maturi fuerint, alimentum rarius exhibentes,
ipso calcitrare faciunt, vt & ante decimū prodire festi-
nent. Modicus enim sanguis à iuueniculis ac nouellis matri-
bus

*in illis
S. menses
Quæ plus
quam decē
menses ge-
stasse vidē-
tur, cur fal-
lantur.*

*Cur plus-
quam decē
menses par-
tus in vtero
esse nō pos-
sit.*

*Cur nutri-
mentum an-
te decimū
mensem pue-
ro in vtero
deficiat.*

A bus procedit: vt plurimum verò cōtingit tales mulieres etiā *Quæ parū sine lacte esse, quæ paucos menses demittunt. Sicciores enim lactis habent.* sunt, & denliorem carnē habent. Huic autem rationi, quòd videlicet deficiente alimento prodit puer, etiā si nō aliqua violenta affectio ipsi accidat, etiā hoc testimonio esse potest. Volucris ex oui luteo nascitur, hoc modo. Incubante matre ouum calefcit, & quod in ouo inest à matre mouetur, calefcens autem id quod in ouo inest, spiritum habet, & alterum frigidum ab aëre per ouum attrahit, Ouum enim adeò rarum est, vt spiritum qui attrahitur sufficientem ei quod intus est transmittat: & augetur volucris in ouo, & coarticulatur modo eodem ac consimili velut puer, quemadmodum

B iam antea à me relatum est. Nascitur autem ex luteo oui volucris, alimentum verò & augmentum habet ex albo, quod in ouo est. atque hoc iam omnibus manifestum factum est, qui animum aduerterunt. Vbi autem deficit alimentum pullo ex ouo, non habens id sufficiens vnde viuat, fortiter mouetur in ouo vberius alimentum quarens, & pelliculæ circumdirumpuntur, & vbi mater sentit pullum vehementer motum, putamen exalpens ipsum excludit. atque hæc fieri solent in viginti diebus, & manifestū est quod ita se habent. Vbi enim exclusa est volucris, nullus humor in oui testis inest, qui sanè memorabilis existat, expensus est enim in pullum. Sic etiā vbi auctus fuerit puer, mater non amplius sufficiens alimentum ipsi exhibere potest. Vberius itaque præfente alimentum puer quarens, calcitrando pelliculas dirumpit, & à vinculo exolutus simul foras prodit. atq; hæc vt longissimè in decem mensibus fiunt, & secundum hanc rationem etiam pecoribus ac feris partus aduenit, in tēpore quo singula pariunt, non tardius. Etenim vnicuique animali necesse est tempus esse, in quo alimentum fœtui rarius erit, & deficiet, & partus adest, Et quæ quidem paucius alimentum pueris præbent, citiùs pariunt. Quæ verò vberius, posterius, Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Porro diruptis pelliculis, si pueri momentum in caput inclinatum prædominabitur, mulier facilè parit. Si autē obliquus, aut in pedes procedet, contingit enim hoc sæpe si momentum huc inclinarit, siue præ vterorum spaciositate, siue si mater in labore ex partu primū non quieuit: & si sic procedet, mulier difficulter pariet,

Hoc cōtra Plinium & Aristotelem esse videt.

Partusquādo accelerat.

Pecora similiter eniuntur.

Cur quædā tardius quædā celerius pariunt. Partus qualis.

Hippocratis Liber

Quando in riet. Multæ autē vel ipsæ perierunt, vel puer, aut simul ma-
 enixa ma- tres vnâ cum fœtibus. Caterum ex parientibus ac puerperis
 tres partû- maximè laborant primiparæ, propter inexperientiâ dolorû,
 ve pereunt. & dolent quidē totū corpus, maximè verò lumbos ac coxen-
 Cur primi dices. Nā coxendices ipsarū disparantur. Verū expertæ iam
 paræ ma- partus, minus primiparis dolent. Quæ verò multoties perpe-
 ris in eni- rerūt, multominus dolēt. Si porro in caput processerit puer,
 xu laborāt. caput primū foras prodit, deinde alia mēbra consequuntur,
 Caput prius exit, postremus autē vmbilicus. Ex vmbilico autē secunda tenta
 deinde ca- est. Post hæc aquositas & mucus sanguinolētus tum à capite,
 tera. tum à reliquo corpore secretus, præ violētia & dolore ac ca-
 Vmbilicus. lore, atq; hic viam struit purgationi à partu cōsequenti. Post
 exitū autē eius mucī cruēti, purgatio fit per tēpus antea re-
 latum. Et tū mām v. tū reliqua mēbra quæ humidiora sunt,
 mulieribus rumpūtur, minimè quidē in primo partu, postea
 verò prout plures pariunt, ita ampliùs rumpūtur, euacuatis
 Quī gignā venis præ partus purgatione. Atque hæc à me de hoc dicta
 tur gemel- sunt. Gemelli autē fiunt ab vno coitu, hoc modo. Vteri sinus
 li. frequentes & curuos habent, alios remotiores, alios propin-
 quiores pudēdo. Et animalia quæ multa gignūt, plures sinus
 habent, quā ea quæ pauca. Similiter autē habēt & pecora &
 fēra, & volucres. Vbi itaq; cōtigerit geniturā findi, & in duos
 sinus peruenire, & vteri, geniturā susceperint, & sinus alter
 ad alterum nō hiauerit, nec dimiserit, segregata genitura in
 vtroque sinu pelliculas induit, & viuificatur eodē modo quo
 Canes & vnus fœtus, quapropter verò id fiat diximus. Quòd verò ab F
 fues hoc cō vno coitu gemelli gignātur, hoc testimonio cōstat. Est canis,
 firmant. vno coitu gemelli gignātur, hoc testimonio cōstat. Est canis,
 & sus, & alia animalia, quæ ab vno coitu pariunt & duo, &
 plura, & vnūquodq; animal in vtero, in sinu ac pellicula exi-
 stit: atq; hæc ipsi fieri videmus, & hæc omnia eadē die vt plu-
 rimum pariunt. Sic autē & mulieri ab vno coitu gemelli fa-
 cti, vterq; in sinu & pellicula est, & eadē die vtrunq; parit. &
 alter prius foras procedit, & pellicula ipsius siue secunda.
 Quòd autem gemelli, fœmella & masculus generantur, hoc
 causæ esse sentio. In muliere & in viro, & in omni animali,
 in singulis & debilior, & fortior genitura inest, & non semel
 ac simul genitura procedit. sed & bis & ter ebullit ac eiacu-
 latur: & nō est possibile omnē esse fortē, tum quæ prius exi-
 uit, tum quæ posterius. In vtrū autē sinum, crassiorē ac for-
 tiorem

Atiorem geniturā ingredi contigerit, illic masculus gignitur. In utrū verò rursus humidiorē ac debiliore, illic fœmella generatur. Si vero in utrunque fortis ingredietur, ambo masculi fient. Sin debilis, ambo fœmellæ. Atque hic sermo sic relatus totus finem habet.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE CARNI-

BVS, IANO CORNARIO

MEDICO PHYSI-

B

CO INTER-

PRETE.



Ego ad hunc usque sermonem communibus sententiis utrorum, tum aliorum qui me præcesserunt, tum etiam meis. Necesse enim est commune principium sententiis supponere eum qui velit hanc de arte medica tractationem componere. Verum de rebus sublimibus in aere ac cœlo, neque opus habeo dicere, nisi quod quantum ad hominem & reliqua animantia, quæ sunt, & nata sunt, pertinet, demonstrabo, & quod anima sunt, & quod sanitas, & quod morbus, & quod in homine malum ac bonum, & unde moritur. Nunc autem ipse meas sententias profero. Et videtur sanè mihi id quod calidum vocamus, immortale esse, & cuncta intelligere, & videre, & audire, & scire omnia tum præsentia, tum futura. Huius igitur plurima pars, quum turbata essent omnia, in supernam circumferentiam secessit. Et videntur mihi ipsum veteres Aethera nominasse. Altera pars inferna, appellatur Terra. frigidum quid & ficcum, & multis motionibus obnoxium, & in hac sanè multum calidi inest. Tertia pars aeris, medium locum occupauit, calidum quid ac humidum existēs. Quarta verò pars terræ proximum locum coepit, humidissimum quid ac crassissimum. Hæc itaque quum turbata essent, & in orbem circumuoluerentur, multa calidi pars in terra conclusa est, alibi maior, alibi minor, alibi valde pauca, alibi copia multa: & temporis

Calidū cæ-
lorve sol &
æther quid
possit.

Terra.

Aer.

Aqua.

Hippocratis Liber

ris progressu terra à calido arefacta, hæc cōclusa in ipsa pu- D
tredines faciunt veluti tuniculas, & quātum quidem ex pu-
tredine terræ pingue fuit, & minimum humoris habuit, id
ipsum per multum tempus calescēs, celerrimè exustum est,
Ossa vnde. & in ossa mutatum. Quæ verò glutinosiora fuerunt, & frigi-
ditate participarunt, ea calefacta exuri nō potuerunt, neque
Nerui quo verò liquida fieri, propterea speciem alieniorem ab aliis ac-
modofacti. ceperunt, & nerui solidi facti sunt. Neque enim multum fri-
giditatis ipsis inerat. Verū venæ frigiditatis multum ha-
Mēbrana. bebant, atque eius frigidi quantum circumcirca glutinosif-
simum erat, à calido exassatum, membrana euasit. frigidum
verò quod erat, à calido superatum, dissolutum est, & ob id
Fauces. liquidum factum. Iuxta eandem autem rationē etiam fau- E
Stomachus ces, & stomachus siue gula & venter, & intestina in podicem
intestina, vē ces, & stomachus siue gula & venter, & intestina in podicem
ter vsq; ad vsque, caua facta sunt. Quum enim frigidum semper cale-
anum caua scat, quantum eius circumcirca glutinosum erat, exassatum
cur. est, & membrana tunica facta est. Quod verò intra frigi-
Vesica. dum erat, colliquatum est, & factum est liquidum. Nō enim
erat in ipso, neque pingue, neque glutinosum multum. Iuxta
eandem rationem etiam vesica. Multum frigidum quod
ipsum circumcirca conclusit, à calido calfactum, dissolutum
est, & euasit liquidum, quum neque pingue, neque glutino-
sum in ipso esset: quòd verò supererat, tunica euasit. Sed &
de aliis quæ caua sunt eodem modo res se habet. Vbi enim
plus glutinosi quàm pinguis erat, membrana tunica facta F
est. Vbi verò pinguis plus quàm glutinosi, ossa facta sunt. Ea-
dem ratio & ossium est. Vbi quidem non inerat glutinosi,
verū pinguis & frigidi, citius exusta sunt propter pin-
guitudinem, atque hæc ossa durissima & rigidissima exi-
stunt. Vbi verò pingue & glutinosum similia sunt, hæc ossa
antrosa sunt. Et de his quidem sic habet. Frigidum quidem
congelat, Calidum autem diffundit, in multo verò tempo-
re etiam exliccat. Vbi autem pinguitudinis aliquid affue-
rit, citius exurit & ficit. Vbi verò glutinosum affuerit frigi-
do, citra pinguitudinem exuri non vult, sed tempore cale-
scens congelatur. Caterū cerebrum sedes & metropolis est
Cerebrum frigidi ac glutinosi. Calidum verò pinguis sedes & metro-
quale. polis est. Quod enim calefcit primum omnium quum dif-
funditur pingue fit. Et propterea cerebrum, quia minimum
ping

A pinguitudinis habet, plurimum verò glutinositatis, à calido exuri non potest, sed tempore tunicam, membranam crassam accepit, circum membranam verò ossa, quantum Medulla calidum superavit, & in quibus pinguitudo erat. Sed & medulla spinalis appellata, à cerebro descendit, & non est in spinæ cur proprio medulla non sit. ipso, neque pinguis, neque glutinosi multum, quemadmodum & cerebro. & propterea neque nomen medullæ iuste possidet. Non enim est alij medullæ similis, quæ in aliis ossibus inest. Sola enim membranas habet, quas alia medulla non habet. Signa porro horum manifesta sunt. Si quis enim nervosa & glutinosa, itémque alia assare velit, alia quidem cito assantur. Verum nervosa & glutinosa assari non volunt, minimum enim pinguitudinis habent. Pinguis-
 B simum autem & vnguinofum celerrimè assatur. At vero viscera sic mihi constituta esse videntur: nam de venis prius à me dictum est. Cor multum glutinosi ac frigidi habet, & à calido calfactum, caro euasit dura & viscosa, & membrana circum ipsum, & cauum factum est, non quemadmodum venæ: & situm est in capite venæ cauiissimæ. Duæ enim sunt cauæ venæ à corde, alteri nomen est arteria, alteri vena caua, iuxta quam cor situm habet. Et plus habet calidi arteria, quàm vena caua, & spiritum condit ac conseruat. Verum præter has duas venas, etiam aliæ in corpore sunt. Cauissima autem vena, ad quam cor situm est, per ventrem omnem trāsīt, & per septum transuersum, & in vtrunque rhenem finditur, & in lumbis finditur, & exilit tum in alias partes, tum in crus vtrunque. Sed & supra cor ad ceruicem, partim in dextram, partim in sinistram, & tunc in caput ascendit, & in temporibus finditur vtrinque. Possunt autem & numero maximæ venæ dici. Verum in summa, à vena caua, & ab arteria, aliæ venæ per totum corpus fissæ sunt, cauiissimæ autem sunt prope cor, & ceruicem ac caput, & infra cor vsque ad coxendices. Et calidum plurimum in venis ac corde inest. & propterea spiritum cor habet, vtpote quod omnium intra hominem membrorum calidissimum existat. Proclive est autem condiscere, quòd spiritus calidus est. Cor & venæ cauæ semper mouentur, & plurimum calidi in venis inest, & propterea spiritum cor trahit, ex omnibus in homine maximè calidum existens.

Cordis natura.
Arteria venæque altera magna vnde.

Venulæ corporis vnde veniant.

Cor calidū est.
Cor & venæ semper agitantur.

Potest

Hippocratis Liber

Ἡ ὁμοιωσις Potest etiam aliter cognosci. Si quis ignem in domo accen- **D**
εὐπρόβατο dere velit, quum ventus non inspirat, flamma mouetur ali-
quando magis, aliquando minus. Sed & lucerna accensa &
ardens, eodem modo mouetur, modò magis, modò minus,
vento nullo mouente, quem sane nos spirantem cognosce-
re possumus, & alimentum calido frigidum existit. Cete-
rum puer in vtero comprimens labra ex vtero matris su-
git, & tum alimentum, tum spiritum, cordi intro trahit, vbi
sane mater respirauit. Est enim hoc calidissimum in pue-
ro, & hoc calidum etiam reliquo corpori, & aliis omnibus
partibus motum præbet. Si verò quis interroget quomodo
hoc quis sciat, quòd puer in vtero trahit & fugit: illi sic re-
spondendum est. Pueri nascuntur stercus in intestinis ha-
bentes, & vbi nati fuerint celerrimè ventrem, tum homi- **E**
nes, tum pecora exonerant. Atqui non haberent stercus,
nisi in vtero suxissent, Imò neque mammam statim vt na-
tum est sugere nosset, si non in vtero suxisset. Et de motu
cordis ac venarum sic habet. Porro pulmo iuxta cor ita na-
tus est. Cor ex humido quod glutinosissimum erat calfa-
ciens cito exsiccauit, veluti spumam, fecitque antrosus, &
venulas multas in ipso. Venulas autem ideo fecit. Quantum
enim in glutinoso inerat frigidi, id ipsum quidem à calido
colliquatum est, & liquidum euasit. Ab ipso verò glutino-
so, tunica facta est. At verò Iecur sic compactum est. Quum
vnà cum calido multum humidi conclusum esset, citra glut-
inosum ac pingue, frigidum superauit calidum, & conge- **F**
latum est. Huius signum hoc est: Quando quis victimam
mactat, donec calidus fuerit, liquidus est sanguis, postquam
autem perfrigeratus est, congelatur. Si verò quis ipsum con-
quasset, & fibras eximat, non congelatur, fibræ enim fri-
gidæ sunt & glutinosæ. Splen autem hoc modo constitutus
est. Cum calido & glutinoso conclusum fuit, calidum qui-
dem plurimum, frigidi autem minimum, tantum solum-
modo quantum ad glutinosi compactionem satis erat: sunt
autem id fibræ in splene existentes, & propter has fibras,
mollis est splen, & fibrosus. Rhenes porro sic producti sunt,
Parum glutinosi, parum calidi, multum frigidi conclusum
fuit, & ab hoc congelatum est, & durissimum viscus eua-
sit, & minimè rubrum, quia non multum calidi simul con-
stitit.

Astitit. Eadem de carnibus ratio est. Frigidum quidem con-

Caro.

stituit & compegit ac fecit carnem, glutinosum autem in foramina transit, in foraminibus autem his humidum est, velut in venis magnis. Calidum autem in toto corpore est, plurimum verò & humidi in corpore est, & frigidi multum in humido: tantum autem est frigidi, quantum congelare humidum ac liquidum potest, sed superatur à calido, quare etiam ab ipso diffunditur: Quod verò humidum calidum

Humidum liquidum-ve caloris quid habet.

est, hac demonstratione confirmatur. Si quis corpus hominis feret, ubicunque velit, sanguis calidus fuet, & quandiu sanè calidus fuerit, liquidus erit, postquam verò refrigeratus est, tum ab intrinseco frigido, tum extrinseco, pellicula

Tuniculæ spiritus-æeræ & frigus semper superinducit.

B fit & membrana, & si quis hac pellicula detracta, modico tempore sinat, aliam pelliculam factam videbit, si verò quis hanc semper adimat, alia rursus pellicula è frigido generatur. Caterum ea gratia plura dixi, ut ostenderem, quod extremum corporis ad aerem conuersum, necessario pelliculam induit, præ frigido & ventis impetentibus. At verò ar-

Articuli iuncturæ.

ticuli sic generati sunt. Quum ossa facta essent, quæcunque quidem ex ipsis pingua erant, celerrimè exusta sunt, quemadmodum etiam prius dictum superiore sermone. Quantum autem ex ipsis glutinosum erat, id ipsum exuri non poterat, sed medio inter vstum & siccatum loco contentum, à calido in neruos, & saliuam ac mucum transiuit. quantum

Nerui.

C autem ex glutinoso liquidissimum erat, hoc cal factum crassius redditum est, utpote liquidum existens, & ex hoc saliuam facta est. verum ex illo glutinoso vngues producti sunt.

Vngues.

Etenim ab ossibus & articulis semper liquidissimum ipsorum discedens, glutinosum redditur, & à calido siccatum ac arefactum, foras in vngues delegatur. Dentes autem poste-

Dentes.

rius generantur ex hac causa. Ex ossibus capitis ac maxillarum incrementum fit glutinosi, & quod ex pingui, inest à calido siccatum exurit, & fiunt dentes reliquis ossibus

Dentati cur nascantur.

duriores, quia nihil frigidi inest. Et primi quidem dentes nascuntur à victu in utero, & postquam natus fuerit puero

lactenti à lacte. Vbi verò hi exciderint à cibis & potibus, excidunt autem, vbi ad annos primi alimenti peruenerint, quibusdam etiam prius, si à morbido alimento nati fuerint.

Plurimis verò quum septem annos impleuerunt. Qui verò postea

Hippocratis Liber

Maxillæ so-
x ossium
venulas ha-
bent ventri-
culisq̃ue.

Stercus quĩ
fiat.
Cibus &
potus om-
nia irrigat,
conseruant,
& augent.

Capilli.

postea enascuntur simul cōsenescunt, nisi præ morbo perfo- D
rentur. Ceterum dentes propterea posterius alius nascuntur.

In maxilla venæ sunt, & hæ huic ossi soli inter omnia ossa,
ex inferno ventre alimentū præbent. Ossa verò tale augmen-
tum dant, qualia existunt, sed & alia omnia tale augmen-
tum reddunt, qualia ipsa existunt. Etenim venæ ex vêtre ac
intestinis, in quæ cibi ac potus colliguntur, postquam hi fue-
rint calfacti, tenuissimū ac liquidissimum trahunt, crassissi-
mum autē & fæx isthic relinquitur, computrescitque & fit
stercus in inferioribus intestinis. Tenuissimū verò trahunt
venæ ex ventre ac intestinis, quæ suprà ieunum intestinum
existunt, atque hoc calfactis iam cibis. Vbi autem ieunum
intestinum transierint, & in inferiora intestina collecti fue- E

rint, stercus fiunt. At verò alimentum vbi accesserit, vnum-
quodque talem speciem vnicuiq; reddit, qualia sanè erant.
Singula enim ab alimēto irrigata augmentum capiunt, cali-
dum, & frigidum, & glutinosum & pingue, & dulce, & ama-
rum, & ossa & alia vniuersa quæ in homine insunt. Et ob id
dentes posterius nascuntur. Dictum autem à me prius est,
quòd solæ ex ossibus maxillæ, ipsæ in seipsis venas habent:
& ob id alimentum amplius in ipsas quàm in alia ossa tra-
hitur, & quia vberius alimētum, & densiorem influxum ha-
bent, augmentum ipsæ à seipsis tale pariunt, quales sanè ipsæ
existunt, atque hoc donec homo integer augeat: augeat
autem vbi conspicuus euadit, conspicuus verò fit maximè à
septennio, vsque ad decimum quartū annum. & in hoc tem- F
pore, tum maximi ex dentibus, tum alij omnes nascuntur,
postquam exciderint hi qui ab alimento in vtero nati sunt.
Augeat autem & in tertiū annorum septenarium, in quo
adolescens fit, vsque ad quartum & quintum septenarium.

Dentes Quin & in quarto septenario dentes enascuntur, plerisq; ho-
minibus duo, qui sapientiæ dentes appellātur. Porro capilli
sic nascuntur. Ossa sunt & cerebrum à quibus tale augmen-
tum venit, vtpote glutinoso circumcirca existente, quemad-
modum & neruis, & pinguitudinis nihil inest. Si enim pin-
guitudo affuisset, ex calido sanè exusta esset. Fortassis autem
mirabitur quis quòd etiam sub alis & in pube pili multi, &
quibusdam in toto corpore existunt. Verum hic sermo de eo
est, quòd ubicunque in corpore glutinosum est, ibi pili à ca-
lore

A lore fiunt. Auditus autem inde contingit, foramina aurium ad os durum & ficcum lapidi simile pertingunt. Iam verò ad ipsum os est cavitas antrofa. Strepitus autem ad durum firmantur, os autem cauum resonat per durum. Pellicula verò in aure iuxta os durum tenuis est, velut aranei tela, & omnium pellicularum ficcissima. Quòd autem id quod ficcissimum est maxime resonat, multa signa sunt. Quum igitur plurimum resonuit, maxime audimus. Et sunt quidam qui de natura scribētes prodiderūt, quòd cerebrum est quod sonum edit. hoc autē fieri non potest. Ipsum enim cerebrum humidum est, & membrana siue tunica circum ipsum humida est & crassa, itēq; circum tunicam ossa. Nullum igitur B humidum resonat, sed sicca, resonantia autem auditum faciunt. Olfacit porrò cerebrum humidum existens, aridorum odorem vnā cum aere, per corpuscula cartilaginosa ipsum trahens. Cerebrum enim in cavitatem nasi pertingit, atque hac parte non est ante ipsum os aliquod, sed cartilago mollis velut spongia, neque caro, neq; ossiculum: & vbi quidem cavitas nasi sicca fuerit, ipsum seipso exactius arida olfacit. Aquā enim non olfacit, humidior est enim quā cerebrum, nisi sit putrefacta. Putrefacta enim aqua crassior fit, & alia omnia. Quum verò nares humectæ fuerint, olfacere nō possunt. Non enim aerem attrahit cerebrū ipsum ad seipsum. Similiter etiam vbi cerebrum ipsum de seipso plurimum liquefecerit, in palatum, & fauces, & pulmonem, ac reliquum C ventrem: cognoscunt autem hoc homines, & ex capite destillare dicunt, destillat autem & in reliquum corpus. Et est modus eius calidus. At verò visus propterea contingit: à cerebri membrana vena in vtrunq; oculum per os descendit: per has duas venulas, quòd est glutinosissimi tenuissimū de cerebro percolatur, & propterea ipsam circum ipsum oculum tunicam talem facit, quale est ipsum oculi pellucidum, quod ad aerem vergit, ad quod venti ac flatus irruunt, eadē planē ratione quemadmodum de aliis mēbranis ac tunicis dixi. Sunt autē multæ hæ tunicæ præ oculis pellucidæ, quales ipsi existunt. Huic enim pellucido lumen & omnia splendida relucet, per hoc igitur relucens videt: quòd verò non splēdidum est, neque relucet, per hoc non videt. Verum reliquum quod circum oculos est album, caro est. Quæ verò pupilla oculi Pupilla qualis. appella

Auditus
quī fiat.



Odoratus
caussa.

Visus quī
fiat.
Visus quæ
causæ sint.

Pupilla
qualis.

Hippocratis Liber

Oculi hu-
mor qualis.

Sermo vn-
de.

A mutis
hoc confir-
mat.
Cantorum
exemplum.

Vitruvius
hinc sum-
psit.

Spiritus lo-
cationem
& vocem
præbet.

Conceptus
in vtero
quotus.

appellatur, nigra apparet, ob id quod in profundo est, & tu-
nica circum ipsam nigra sunt: tunicam autem appellamus
id quod velut pellicula inest. Est autem non nigra si quis in-
spiciat, sed alba ac pellucida, humidum verò oculi, glutino-
sum existit. Sæpe enim vidimus, in oculo rupto exire humo-
rem glutinosum, & si quidem adhuc calidus fuerit, liquidus
est, Postquam verò perfrigeratus est, siccus euadit, velut thus
transparens. Atq; hoc & in hominibus & in brutis similiter
habet. Cæterum oculum molestia afficit omne quod incide-
rit, & venti irruentes, & alia quæ splendidiora sunt, quàm ipse
est. Et si quis interroget, respondere licet, propterea quod
confimilis coloris existunt. Quemadmodum os, & lingua, &
reliquus venter, humida sunt. Sermonis porrò facultas in-
de est. Totum corpus spiritum intro trahit, plurimum verò
in cavitates sibi ipsi accumulatur. Is autem qui per inane foras
currit, strepitum facit. caput enim resonat, lingua verò arti-
culat, occurrens in faucibus, obturansque ac pellens ad pala-
tum & dentes, claritatem eius facit. Si autem lingua semper
occurrere non articulet, non posset homo clare disserere,
sed singula à natura vnā vocem haberent. Huius signum
est. Muti ex natiuitate disserere non possunt, sed vnā tan-
tū vocem sonant, etiam si quis spiritum efflans sermonem
proferre conetur. Manifestum autem hoc est, Homines vbi
voluerint magnam vocem edere, attrahentes spiritum fo-
rinsecum, eum foras propellunt, & magnam vocem edunt,
prout spiritus durat, postea verò vox contabescit. Sed & ci-
tharædi, quum ipsos vocem intendere oportuerit, spiritum
quàm plurimum intrò trahentes pronuntiationem exten-
dunt, & vociferantur ac vocem magnam edunt, prout spi-
ritus durat. Vbi verò spiritus defecerit, desinunt. Ex quibus
manifestum est quod spiritus est, qui vocem edit. Vidi au-
tem iam quosdam, qui sibi ipsis manu illata guttur penitus
præsecuerant, atque hi viuunt quidem, verum nullam vo-
cem edunt, nisi quis guttur constringat, hi autem sermonem
proferunt, Manifestum verò, & hoc est, quod præfecto gut-
ture spiritum attrahere intrò in cavitates non possunt, sed
per præfectam partem exhalat. Sic sanè res de voce ac ser-
mone se habet. Porrò vita hominis septem dierum est. Pri-
mum etenim postquam genitura in vteros peruenit, in septē
diebus

A diebus habet quæcunque corpus habere debet. Mirari autem quis possit, quomodo ego id sciam. Verum multa ego vidi hoc modo. Meretrices publicæ quæ sæpius de seipis periculum fecerunt, ubi cum viris rem habuerint, sciunt quando in ventre concipiant, & postea conceptum intra se perdunt. Postquam autem iam perditus est, elabitur velut caruncula. Hanc carunculam in aquam coniectam si conspicias consideraueris, omnia membra habere reperies, & oculorum regiones, & aures, & manus & manuum digitos, & crura, & pedes & pedum digitos, & pudendum, & reliquum totum corpus manifestum. Satis etiam manifestum est harum rerum peritis, quod mulier quum in ventre concepit, statim horret, & calor, & dentium stridor consequitur, & conuulsio occupat tum articulos, tum totum corpus, & utrumque segnities ac torpor. Et quæ puræ sunt, hoc perpetiuntur. Quæ verò crassæ & mucosæ hoc perpetiuntur, pleraque ex his mulieribus non percipiunt, nec cognoscunt. Certè quatenus mihi ostenderunt, hoc ipsum se cognouisse, eatenus scio ac prodo. Quod verò vita hominis septem dierum sit, etiam ex hoc manifestum redditur. Si quis in septem diebus nihil edere aut bibere velit, plerique quidem in ipsis moriuntur. Sunt autem qui ipsos transmittunt, & tamen moriuntur. Sunt etiam quidam, qui persuasi sunt, ut ne desperarent seipsos fame conficientes, sed comederent ac biberent: verum venter non amplius suscipit. Ieiunum enim intestinum in his diebus concreuit, moriunturque etiam illi. Sed & ex hoc coniectare licet, hominis vitam septem dierum esse. Puer septimestri partu, natus, proportionem natus est, & viuit, & rationem talis habet, ac numerum ad hebdomadas ac septenarium exactum. Octimestris autem natus nullus vnquam vixit. Nouem verò mensium & decem dierum partus sit, & viuit, & habet ad hebdomadas numerum exactum. Quatuor enim denarii hebdomadam, dies sunt ducenti & octoginta, In denarium autem hebdomadam septuaginta dies incurrunt. Habet autem & septimestris partus tres denarios siue decadas hebdomadam, & in vnaquaque decade septuaginta dies. Tres verò hebdomadam decades, ex toto sunt dies ducenti ac decem. Quin & morbi acutissimi sic hominibus fiunt, præteritis diebus hebdomada

Meretrices
quæ docue
runt.

Conceptus
signa.

Quota in
dia.

Septime
stris par
tus.

nullus

trid

Prænotio
morborū.

Hippocratis Liber

domadis dimidiæ, aut vnius, in quibus iudicantur, & moriuntur aut sani euadunt: & tertij generis in vndecim diebus, hoc est vna & dimidia hebdomade: & quarti in duabus hebdomadis. & quinti in duodeuiginti diebus, hoc est duabus & dimidia hebdomadis. At verò alij morbi non habent, vt certa sententia pronuntiari possit, quanto tempore homines ab ipsis sani euadant. ad eundem modum etiam **Capitis vlcera.** vlcera magna in capite ac reliquo corpore, quarto die inflammari incipiunt, in septem autem inflammatio sedatur, aut etiam quatuor & decem, aut duodeuiginti. Si quis autem diligenter medeatur, & vulnera in capite magna in hoc tempore non sedentur, homines moriuntur. Caterum inexpertus quispiam mirari queat, quòd septimestris puer nascatur. Ego quidem igitur hoc ipsum vidi, & quidem frequenter. Si autem hoc deprehendere vult, facile est obstetrices adire, quæ parientibus adsunt, & ex ipsis percuntari. Est autem & aliud signum. Pueri septem annis præteritis dentes explent. Et in septem annis sunt & ratione & numero exactè hebdomades trecentæ ac sexaginta. Necessestatem autem naturæ, quapropter in septem hæc singula dispensentur, ego aliis locis declarabo.

Dētes pueris quando renascūtur.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE SEPTIMESTRI PARTV, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTERPRETE.

Macrobius & Galenus in Epidemiarū commentariis hoc differit.



SEPTIMESTRES autē nascuntur diebus cētum & octuaginta duobus ac dimidio, & insuper accedente diei particula. Si enim primi mēsis dies quindecim supputaueris, deinde quinque mensium, dies cētum quadraginta septem ac dimidium. In vndesexaginta enim diebus quàm proximi duo menses perficiuntur.

- A** tur his igitur sic habentibus, ad septimum mensem super-
sunt dies non plures quam viginti. Et est tota summa dimi-
dij anni, vnà cum aliquantula diei parte. Quum itaque ad
hoc perfectionis principium partus peruenerit, maturescēte
fœtu, & robore multum augeſcente, in perfectione magis
quàm aliis temporibus pelliculæ in quibus ab initio nutri-
tus fuit, quemadmodum spicarum membranæ laxantur, ad Cur septi-
mestres e-
dantur.
id coactæ anteaquàm fructus perfectè matureſcat: & fortissi-
mi ac plenissimi fœtus violantes ac dirumpentes pelliculas,
partum fieri cogūt, & plurimi ex his pereunt. Quum enim
parui sint, transmutatione maiore quàm alij vtūtur, & qua-
draginta dierum afflictionem perferre coguntur, ex vtero
- B** egressi, id quod etiam in decimestris multos peremit. Sunt Cur pauci
septime-
stres viuūt.
autem ex his septimestribus qui etiam superstitēs manent,
ex multis pauci. Propterea quòd ratio & tempus in quod e-
nutriti sunt in vtero, cōstitit, vt omnium participes sint, quò-
sum etiam perfectissimi participes existunt, maximè qui su-
perstitēs manent, & processerunt de matre prius pariente,
vt pote in octauo mense ægrotaturi. Si enim in his laboribus
succedant, vt in conspicuum prodeat puer, impossibile est su-
perstitē esse, ob prædictas affectiones, quas ego octimestres
perimere dico, Imò etiam multos decimestres. Cæterū mul-
ti fœtus septimestris ætatis quum pelliculæ laxantur, sece-
dunt in id quod cedit, & hic alimentum sumunt, primos qui Cur plus
minùs ve
quidam
septime-
stres par-
tus affici-
tur.
dem quadraginta dies laborantes, alij plus, alij minus: pro-
pter permutationem autem ex locis & pelliculis quæ ipsos
aluerunt, transmutantur, & pro vmbilico, trahunt & transu-
munt etiam per matrem labores. Pelliculæ enim dum ten-
duntur, & vmbilicus conuulsus, dolores matri inducunt. Et
fœtus ex antiquo vinculo exsolutus, grauior redditur. Multæ
verò mulieres etiam febricitant his cōtingentibus, quædam
etiam pereūt vnà cum fœtibus, verū omnes in breui ex hoc
contaminantur ac inquinantur. Aiunt autem & octonos mē-
ses difficilimè vteros ferre, rectè id dicētes. Est autē octauus
mensis non solum hoc tempus, sed & dies accedūt à septimo Cur octa-
uus mensis
grauis sit.
Cur fœmi-
næ in cōce-
ptu errent.
mense, & à nono, & ab ipso anno. Verū dies non similiter,
neque dicunt, neque cognoscunt mulieres. Decipiūtur enim
ex eo quòd non eodem modo fiunt, sed aliquando à septi-
mo mense plures dies accedunt ad quadraginta, aliquando prius
ad nono

à nono Tunc enim fieri necesse est, prout contigerit mulie- D
 rem in ventre concipere, tum mense, tum tempore. Mensis
 autem octauus minimè dubius est, secundum hunc enim cōtin-
 git, ut iudicatio difficilis existat. Et mea sententia pars etiā
 in vndecimo mense, mensis est, ut hic satis memorabilis exi-
 stat. Porro mulieribus de partibus fidem derogare nō opor-
 tet, dicunt enim omnia, & semper dicunt, & semper profe-
 runt. Neq; enim aut opere, aut sermone persuasæ sunt, sed ex
 eo quod cognouerunt in corporibus suis cōtigisse. Licet au-
 tem & volentibus aliud dicere, Quæ verò iudicio prædita
 sunt, & victoriā de hac sententia pronunciant, semper dicunt
 ac testantur, nasci septimestres, & octimestres, & nouimestres E
 & decimestres, & vndecimestres: & ex his octimestres nō su-
 perstitēs manere. Dicunt autem & abortus plurimos in pri-
 mis quadraginta diebus fieri, sed & reliqua conscripta his
 accidere, in quadragenariis, ac in singulis mensibus fieri di-
 cunt. Quum autem septimo mense pelliculæ dirumpatur, &
 fœtus secesserit, labores qui circa octauum mensem, & sextū
 quadragenarium, in partu fieri traduntur, corripunt. hoc au-
 tem tēpore præterito, quibus bene futurū est, inflānationes
 tum fœtus, tum matris exoluuntur, ut venter molliatur, & tu-
 mor à præcordiis & laterū mollitudine descendat ad locos
 inferiores, ad facilem partus tempore progressionem. & se-
 ptimo sanè quadragenario plurimo tēpore fœtus isthic exi-
 stunt. Nam loci ipsis molles sunt, & transmotiones ipsis faci-
 liores ac frequentiores sunt, & propterea ad partum magis F
 solubiles consistunt, & mulieres per hos vltimos dies ex to-
 to quadragenario facilius vteros ferunt, donec cōtigerit fœ-
 tum verti. Postea verò dolores partus ac labores incumbūt,
 donec a puero & à secūda mulier liberetur. Quæcūq; verò
 Quare clau- di, cæcivæ mulieres multos pueros pepererunt, & quidam ex ipsis clau-
 partus edā dus natus est, aut cæcus, aut aliud quoddā malū habens, aiunt
 tur. in hoc puero octauum mensem ipsas difficilius transgisse,
 quā in his quos pepererūt nihil mali habētes. Fœtus enim
 mancus in octauo mense fortiter ægrotavit, ut etiā morbus
 abscessum ac ablationē siue mutilationē alicuius partis fe-
 cerit, quemadmodum etiā viris fortes morbi faciūt. Qui ve-
 rò fœtus in alio tēpore fortiter ægrotāt, pereunt prius quā
 ipsis abscessus eiusmodi fiat. Quicūque autem octimestres
 fœtus

A foetus non valde agrotant, sed iuxta vnam aliquam partem, ex secessu afflictionem pertulerunt, quadraginta quidē dies in imbecillitate tranſigūt, & plurimū in vtero, propter praedictas neceſſitates, ſani autem ſunt. Quicumq; autem natus fuerit in his quadraginta diebus, eum impoſſibile eſt ſuperſtitem manere, agrotanti enim adhuc ipſi in vtero tranſmutationes & afflictiones poſt partum accedunt. Quicumq; vero agrotans in vtero ad nonū meſem peruenit, & in hoc meſe natus fuerit, ſuperſtes erit. Et ſuperuiuit quidem nō minūſ hi quā ſeptimeſtres, verū pauci etiam ex his educantur. Neq; enim craſſitudinem habent, quā perfectiſſimi habent, & labores in vtero non diu ante tolerauerunt, vt tenues euaserint. Seruabitur autem vel maximē talis puer, ſi nouem meſium fuerit in exitu, fortior autem euadet etiā is, qui plurimū abeſt à morbis, qui octimeſtribus accidere ſolent. Qui enim in ſeptem quadragenariis naſcuntur, decimeſtres appellati, ob id maximē educantur, quōd fortiſſimi ſunt, & plurimū à vulgariū puerorū tempore abſunt. in quo affliguntur quadraginta agrotantes diebus, circa octauum meſem. Declarant autem de morbis & afflictionibus octimeſtrium, etiā nouimeſtres tenues naſcentes. Iuxta multitudinem enim temporis, etiam magnitudo corporis cōtingit, ex morborū afflictione progreſſus, & non velut ſeptimeſtres carnoſi gignuntur, & craſſitudinem probē coactam habentes, vt qui tempus quo in vtero geſtabantur ſine morbis tranſegerunt. Verū enim uerō cōceptus, & abortus, & partus mulieribus in eo tempore, in quo etiam morbi, & ſanitas, & mors omnibus hominibus ſunt, hae verō omnia partim ſecundum dies, partim ſecundum meſes, partim ſecundum dierum quadragenarios, partim ſecundum annum, ſignificationem ſui praebent. In omnibus enim his temporibus inſunt ad vnumquenq; & vtilia multa, & hoſtilia multa. Ex vtilibus igitur, ſanitas & augmentū contingit, ex contrariis, morbi & mors. Dies quidem igitur maximē inſignes in plurimis ſunt, primi & ſeptimi, multū potentes in morbis, & multū in foetibus. Nam plurimi abortus in his diebus ſunt, nominantur autem tales effluxus, non abortus. Verū alij dies intra quadageſimū inſignes quidem minūſ ſunt, multi verō iudicant. Ceterum in meſibus, eadem quae ſes poſſint, in die

Qui poſt
enixum vi-
uant.

Cur maci-
lenti ſiant.

Decime-
ſtres cur e-
ducentur.

Conceptus
& cetero-
rum decre-
torium.

Quae faciās
haec.

Dierū ob-
ſeruatio.

Quantum
dies & me-
ſes poſſint.

in diebus fiunt, iuxta rationem insunt. Menses enim mulie-
 ribus sanis singulis mensibus apparent, tanquam peculiare
 in corporibus vim mensis habeat. Vnde sane septimi men-
 ses his quæ uterum gestant, foetus in principium perfectio-
 nis constituunt. Pueris verò ubi septem menses à natiuitate
 impleuerunt, tum alia vtilia in corporibus fiunt, tum dentes
 in eo tempore apparere incipiunt. Eadem ratio est etiam in
 decretoriis diebus, si quidē fortassis vnà cū his quos recensui
 coniungere, quis velit historię ac cognitionis gratia referen-
 tur. Etenim medicum qui agrotorum salutem rectē conie-
 ctare volet, animaduertere quidem oportet, & contemplari
 omnes dies, ex paribus verò decimum quartū, & vigesimū
 octauum, & quadragesimum secundum. Hic enim terminus
 ponitur à quibusdā pro harmonię ratione, & integer ac per-
 fectus numerus, verū ob quam causam, longius fuerit in
 præsentī exequi. cōtemplari autem sic oportet per ternarios
 ac quaternarios, ternariis quidē omnibus copulatis, quater-
 narios autem, duobus ad duos connexis. At verò quadrage-
 narij primū in foetibus iudicāt. Quisquis enim primos qua-
 draginta dies trāsmiserit, abortus effugit ex omni causa cō-
 tingentes, plures autem fiunt in primō quadragenario abor-
 tus, quā in aliis omnibus. Hoc autem tempore præterito,
 foetus fortiores sunt, & ipsorum corporis per singula mem-
 bra discretio fit: & masculorum quidem partes omnes valde
 conspicuæ fiunt fœmellæ verò in hoc tempus, carnes appa-
 rent exortus ac processus solū habentes. Similia enim lon-
 gius tempus in simili sunt, & tardius discernuntur, propter
 consuetudinem & amicitiam: quanquā aliās quā à matre
 segregatæ fuerint, filia citius quā filij pubescant, & sapiant,
 ac senescant, propter corporum imbecillitatem, & victus ra-
 tionem. Alter quadragenarius est, in quo circa octauū men-
 sem foetus in vtero ægrotant, de quibus hic totus sermo in-
 stitutus est. Tertius est, in quo ubi nascantur pueri etiā ma-
 le afflictī, si effugerint quadraginta dies, apparent magis ro-
 buli ac sapientes. Nam & splendores clarius vident, & stre-
 pitum audiunt, quod prius non potuerunt, tanquam incre-
 mentum habeat hoc tempus, cū iuxta alia, tum iuxta sa-
 pientiam ex corpore elucescentem. Peculiarem quidem sa-
 pientiam in corpore inelle manifestū est, in prima sanē die.
 Nam

Dierum pa-
 rium obser-
 uatio.

Conforma-
 tionis tem-
 pus in vte-
 ro.

Quæ puel-
 læ à pueris
 differant.

non
 autem

Quid sua-
 pte natura
 pueri sa-
 pientiam.

A Nam in somnis, statim ubi nati sunt pueri, ridere & plorare videntur. Vigilantes quoque sua sponte statim rident ac plorant, prius quam quadraginta dies transeant. Non rident autem, etiam si titillentur ac irritentur, priusquam hoc ipsum tempus transeat. habentur enim vires in muccis: quāquā ^{Mors & ca-} mors etiam per fatum sit sorte designata. ut hoc exēplo omni- ^{tera cur fi-} bus sit, quod omnia existentia quæ naturā ex iisdem habent, ^{ant.} transmutationes per tempora venientia habeāt. Declaratur autem in singulis, quum alia nascantur, alia corrumpantur. Porro anno finiente multi quidem morbi fiūt. multæ etiam sanitates, iuxta temporis rationem, ad mentes, & ad singulos ^{Septimana} dies. Septenariis autem annorum, cum alia multa insignia ^{in corpori-} corporibus fiunt, tum dentes pueris excidunt, & alij nascun- ^{bus præua-} ^{lent.} tur. Quæ enim in corporibus fiunt, ea scribam.

*Principium autem huius septimestris
in alijs codicibus sic ha-
beatur.*

D E septimestribus autem quidam sic dicit, quod nego-
tium oculis nondum vidi, sed tantum audiui. Quo au-
tem modo mihi fieri posse videatur, declarabo. Multæ natu-
ræ mutationes, conuersiones, & excessus in animalibus & ar-
bustis, cæterisque; satis, sponteue nascentibus auo perpetuo, lō ^{de mēbris} gōq; fiūt: nam alicubi iam fœmina & mas multis ^{agnascenti-} manibus, ^{bus.} oculis auribusq; cōformati, natiq; sunt, variisque; aliis formis.
C concreta ora, & ossa alij habentes mirandam naturæ præua-
ricationem, mutationem, & excessum. cuncta enim tempo-
ribus labentibus & discreta, & cōfusa & peculiaria perficiun-
tur. Nam secundum priscam generationem, cum omnia ani-
mantia condita & creata sunt, sic conformata fuerunt. Scitō-
que etiam nunc eodem modo & per eadem secundum leges
& ritē cuncta conformari nasciq; posse, Mihi verò (quemad-
modum homini circa septimestria definienti datur) hæc sta-
ta specie, pro cœli, terræq; benignitate, quemadmodum fru ^{Terræ Ae-}
ctus oriri videntur. Quod videre est in Aegypto, ubi omnia ^{gyptiæ fa-}
perfecta nascuntur, & perficiuntur, multa etiā & per annum ^{cunditas.}
totum omniq; tempore terræ benignitate, calorisque; circum
aggeratione, Nilive inundatione scaturiunt. Simili modo &
circa animantia septimestriaq; perfecta vitaliaq; illic omnia
nascun-

Quid ad si
militudine
facta.

Cur octime
stres & tri-
mestres nō
viuant.

Temporis
autores sol
& lunasūt.

Quæ prius
conformen-
tur.

nascuntur. Quamobrem si quæ conceptura est, vti sibi suc-
cessionem pariat, bene habeat, virque ad eam rem demit-
tendam promptus, præstoque sit, corpus siue corporis alucus
creatur & perficitur. Collatio enim & concordia, validaque
necessitas & vis cogit, vti perficiatur & adolescat suo satori
non dissimile. Nam si maior minorve, & dissimilis forma &
figura sit, illi vnde orta est perfecta non haberetur. Quare
dicito, statuitove, medium quid esse in magno negotio, con-
formationem rylmōne. Si ergo conformatio aliqua ad ho-
mines peruentura est, leni & miti modo perueniat necesse
est, pèrque hominum commoda. si minùs, quidam præpu-
bescunt & præsenescunt, quemadmodum qui præsenescunt,
& si ritè & secundum legem fiat. Conformatioque conta-
bescit, & ad ofsium cōmoda, fibrarum venarum, neruorum,
viscerum, intestinorum, vteri, cæterorumque perfectionem
cōuertitur. Sed forsitan aliqui petent, cur octimestria, & tri-
mestria non viuant? quoniam fluxi parvulique sunt, quædā
enim sic auum, & ætatem nacta sunt & per similia cōforma-
ri & discerni consueuerunt, quemadmodum quæ in terra se-
runtur & plantantur. quædam enim pluribus, quædam pau-
cioribus diebus nascuntur secundum tempus. Tempus au-
tem solis & lunæ circuitu perficitur, & sequitur, nec etiam
vndecimestres, nec duodecimestres secūdem eandem ratio-
nem horum viuent, donec pueruli sunt: nihil enim præter
sua vestigia & naturā fit, aut adolescit, nec etiam si quid fa-
bulentur. Sed cuiusque conformatio, forma figurave, & si-
militudo, siue rylmos, secundum naturalem legem perfici-
tur, & ritè finitur. Nam naturalis machinatio cun-
cta in oculos, vel aures, vel nares, vel os trans-
fert: quæ conformationibus his contine-
tur, vel per alias concreciones, syn-
crisēve absumit. Quare nunc
periti cū sint, conceptus
omnes noscent quæ
prius excogi-
taui.

AHIPPOCRATIS


COI LIBER DE OCTI-

MESTRI PARTV, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER-

PRETE.



DE octimestri partu sic sentio. Impossibile
esse vt duas consequenter succedentes affli-
ctiones pueri ferre possint, & propterea
octimestres non superstites manere. Con-
tingit enim ipsos consequenter affligi, tum
ea quæ in vtero sit afflictione, tum ea quæ
in partu accedit, & ob id nullus octimestris vitalis est. Insu-
per & decimestres appellatos, in septem quadragenariis die-
rum magis in lucē edi sentio, & maximē cōtingere vt edu-
centur. Nam perfectissimus est fœtus in primis quadragin-
ta diebus, vbi verò plures accesserint, perit. Coguntur enim
multa in pauco tēpore assumentes ac perferentes, multum
agrotare, ex quibus mors cōsequitur, incipit autē laborare
C puer ante partum, & interitus periculū subit, quum in vtero
vertitur. Producentur enim omnes sursum habentes caput,
pariuntur autē multi in caput, & securius discedunt ac liber-
rantur his qui in pedes pariuntur. Flexibiles enim corporis
partes nō impedimēto sunt, puero in caput exeunte. Verūm
quum in pedes prodierit, obturamenta cōtingunt. Versiones
scilicet in vtero, & alia pericula, & vmbilici puerorum iam
sæpe circa colla apparuerunt. Si enim iuxta partem quam-
cunque vmbilicus fuerit in vtero porrectus, magis hac parte
puer vmbilici circumactionē, dum vertitur, faciet, quàm cir-
ca ceruicem. Si verò iuxta humerū, vmbilici circumactionē
retrahit, hoc autē vbi sit etiā matrem magis laborare neces-
se est, & puerum aut perire, aut difficilius exire. Quare mul-
ti iam pueri principiū morbi intus nacti prodire, & conse-
quenter alij perierūt, alij morbidi superuixerunt. Quicumq;

Cur oſi-
mestria nō
viuant.

Quando
partus peri-
clitatur.

Melius in
caput exe-
unt.

Mulſi de
vẽtre mor-
bos trahūt.

Qui probe
coalescat.

verò probè ac tuto prodierint, & in conspicuum exierint, de D
repente ex necessitate in ventre liberati, & crassiores ac ma-
iores, quàm pro ratione statim existūt, his nō ex augmento,
sed laxo tumore id contingit, & multi sani ex his pereunt. Si
enim tumor nō residat citius quàm tertio die, aut paulo se-
rius, morbi ex ipso fiunt. Quare etiā alimenta ac respiratio-
nes periculose mutantur. Si quid enim morbidum inducunt
per os & per nares inducunt: & pro eo quòd tanta ingeratur
edulia quāta sufficiunt, & ea etiā nō superentur, multo plura
ingeruntur: vt necesse sit & cogantur prae ingestorum copia,
& prae ipsa adeò affectione, qua pueri corpus affictum est,
alia quidē per os & nares rursus exire, alia verò per intesti- E
num ac velicā inferne transire, antea nullo horum ita cōtin-
gente. Sed & pro flatibus ac spiritibus, & humoribus ita co-
gnatis, cum quibus necesse est in vtero consuetudinē ac be-
neuolentiā habuisse omnibus peregrinis vtitur, crudioribus
ac siccioribus, & minus mansuetis, vt necesse sit dolores obo-
riri multos, plerisque etiā mortes: quandoquidē etiam viris
transmutationes locorū ac victus, morbos faciunt. Eadē ra-
tio est & de vestibus. Pro eo enim quòd carne & humoribus
induti fuerunt, iisq; tepidis ac liquidis & cognatis, tales ve-
stes pueri induunt quales ipsi viri. At verò vmbilicus per
quem alimēti ac spiritus ingressus pueris contingunt, solus
ex omni corpore vtero adharet, & per hunc introitus ac in-
gressus ingredientium particeps fit, reliquæ partes conniunt,
& nō prius apertæ sunt, quā vbi in exitu fuerit puer ex ven- F
tre. Quum autē in exitu fuerit, reliquæ omnes aperiuntur,
verum vmbilicus attenuatur, & cōniuet ac resiccatur. Quem
admodum autē in his quæ ex terra nascuntur, fructus pleni
ac maturi secernuntur, ac decidunt, iuxta discriminationem
qua parte inhaerent: Sic etiā pueris maturis ac perfectis, vm-
bilicus quidē conniuet ac clauditur, reliqua verò aperiun-
tur, vt & ingredientia suscipiāt, & exitus habeant secundum
naturam, quibus necesse est viuentes vti. Singula enim sepa-
rantur, iuxta modū quo agmina cōgregantur repentia: opti-
ma autē sunt, quæ maximè soli cōnutrita sunt. Cæterum de-
Decime-
stres & vn-
decime-
stres & se-
cimestres & vndecimestres partus, ex septē quadragenariis
eodem modo fiunt, velut ex dimidio anno septimestres. Plu-
rimis enim mulieribus necessarium est in ventre cōcipere,
post

- A post menstrua purgamenta, ubi ab his exoluta fuerint. Oportet igitur mulieri tempus dare mensis, in quo ipsa purgatio continget: & hoc tempus quibus breuissimum fit, tres sunt dies, Plerisque autem multo plures. Sunt autem & alia multa impedimenta etiam in viris, ex quibus conceptus retardatur. Oportet autem vel maximè hoc considerare. Quod nouilunium quod dies vnus existit, exactissimè trigesima mensis pars est. duo autem dies, ferè quindecima mensis pars sunt. Tres verò dies, pars mensis decima sunt, & reliqua iuxta horum rationem. & non est possibile in paucioribus partibus fieri, neque menstruorum solutione, neque foetuum conceptionem. Ex his igitur omnibus necessariū est plerisque mulieres circa plenilunium, & ultra in ventre concipere, ut ducenti & octoginta dies, sæpe vndecimum mensem apprehendere videantur, tot enim dies septem quadragenarios constituunt. Nam quum ultra plenilunium mulier concipit, necesse est eum conceptum vndecimum mensem attingere ac apprehendere, quo ad vltimum circuitum perueniat.
- ptin effres
quando pa
riantur.
Conceptus
varietas.
- B

HIPPOCRATIS

COI LIBER, DE SVPER-

FOETATIONE, IANO COR-

NARIO MEDICO

PHYSICO INTER-

PRETE.



Quum superfoetarit mulier, si primum puerum in medio vteri habuerit, superfoetatio elabitur, à primo ac veteri expulsa. Si verò in altero cornu superfoetationem habuerit, posterius ipsam insuper parit non vitalem, nimirum vitalitate ubi vterus laxatus & humectus fuerit exsoluta. Si verò nō statim secedat superfoetatio, dolores exhibet, & fluxum foetidum, ac febrē: & facies intumescit, tibiaeque ac pedes, & si pereat, cibū auersatur

Qua super
conciant.

fatur donec exciderit. Superfœtat autem mulieres, quarum D
stomachus id est vteri os, post primum cōceptum non clau-
ditur ita valde, idque apparentibus signis constat, clauditur
autem post superfœtationes quæ posterius insuper pariun-
tur. Si superfœtatio nondum partium discriminationē ha-
beat, sed caro sit, non quidem intumescit, sed putrescit do-
nec ex vtero exeat. Si cui exeat secunda pueri in vtero, prius-
quam puer foras procedere incipit, ægrè parit; & magis ad-
huc periculose, si caput non præcedat. Si verò alicui vna cum
secunda puer foras exierit, & ad stomachum, id est os vte-
ri progressus, rupta secunda emerferit, magis facillè parit.
Itémque si puer quidē foras prodit, secūda verò adhærescit,
& seipsam retrahit, atque isthic manet. Quum puer non vi- E
talis futurus nascitur, caro ipsius vngues supereminet, vn-
gues verò tum in manibus, tum in pedibus deficiūt. Quum
vitali puero nascente manus præminuerit, primum retro
retrudenda est, donec retruseris: & si ambæ præminuerint,
ambas retrudes, Et si crus præminuerit, etiam hoc repelles.
Vbi verò ambo crura in propatulo manserint, neque aliò
processerint, fomento vti opus est, à quo humectissimus vte-
rus reddatur. habeat autem odorem ipsum fomentum. Et
quum caput in propatulo fuerit, reliquum verò corpus in-
tus erit, etiam sic fomento vteris. Et quum pars corporis in
vtero, pars in pudendis, pars extra pudenda intumescit ac
manet, etiam sic fomentum adhibebis. Et si quidem à fo- F
mento processerit, satis est: sin minus, os vteri elaterio cras-
so aqua diluto oblines, quo partum producat. Sed & à poti-
bus ac cibis partus promouendus est, & pudenda ipsa cera-
to illinenda, si sicciora quàm ex re est, esse tibi videbuntur.
Quomodo
partus mor-
uus educe-
tur.
Quum pueri capite ex stomacho apparēte, reliquum corpus
procedere non vult. puer autem mortuus est, digitos aqua
madefactos inter stomachum ac caput immittito, & in or-
bem circunducito, deinde subditum sub mentum digitum
in os intrudito, ac foras trahito. Quum verò reliquum cor-
pus extra pudenda fuerit, caput autem intus, in pedes videli-
cet prodeunte fœtu, postquam digitos in orbem circundu-
xeris, ambas manus inter stomachum ac caput aqua præma-
defactas immittito ac extrahito. Si verò extra stomachum
fuerit, verum intra pudenda, immisis manibus apprehen-
sum

Quæ nō fa-
cile & con-
tra pariant.
Stomachus
vulvæ.

Quādo vn-
gues de-
sunt puc-
ro.

Quo pacto
partus edu-
catur.

Quo pacto
partus edu-
catur.

Quomodo
partus mor-
uus educe-
tur.

A sum capite educito. Si porro foetus intus maneat mortuus, & non possit neque sponte, neque per medicamenta iuxta naturam excidere, manu cerato maximè lubricante vncta, deinde in vterum intrusa, humeros à collo magni digiti conamine deducito. Oportet autem ad huiusmodi etiam vnguem instrumentum in magno digito habere, & distractione facta manus educere, deinde rursus immissa manu, ventrem diffindere, & ex diffissio intestina sensim eximere: deinde his exemptis latera confringere, quo confidens corpusculum leuius ac expeditius fiat, & facilius exeat non tumidum existens. Caterum si secunda non facilè excidat, ma- Secunda quā
ximè quidem ad foetum appendere sinenda est, & puerpera extrahatur.

B velut super sella ventri exonerando destinata, lasanum Græci vocant, locanda. Sit autem in altum extructa sella, vel simile quiddam, quo foetus dependēs gravitate sua secundam simul extrahat. Sensim autem hoc faciendum est, nō violenter, ne præter naturam diuulsa, inflammationem inducat. Substernere igitur lanas molles quàm maximè recens carminatas foetui oportet, quo paulatim remittant ac confidat, Aut vtres duos copulatos aqua plenos supponere, & suprà vtres lanas insternere, & suprà has puerum. deinde vtrunque vterum stilo perforare, quo paulatim aqua effluat, effluente autem aqua, vtres remittunt ac confidunt, confidentibus autem vtribus, foetus vmbilicum attrahit, vmbilicus verò attrahit secundam. Si verò suprà lasanum, vel simile quiddam puerpera sedere nequeat, super reclinatam sellam perforatam collocetur. Si verò adeò debilis est, vt omnino se- Quid fa-
dere non possit, lectum, quàm erectissimum à capitis parti- ciat vmbi-
bus struemus, vt deorsum declinet ac repat, & sic foetus gra- licus ru-
uitas quàm maximè simul secundam trahat. Verum puerpe- ptus, vel
ram sub alis, foris ad lectum fascia, aut loro lato ac molli, al- ante tem-
ligare oportet, vt ne quū erectus sit lectus, corpus ipsius de- pus absci-
orsum feratur. Iuxta eundem autem modum etiam si vmbi- lus.
licus abruptus sit, aut etiam ante tempus recisus, moderatè grauibus ponderibus appensis, secundæ eductionem facere oportet, Optima enim hac curatio in talibus existit, & minimè lædit. Si cui puer in vtero immoriatur, & non egredia-
tur humido vtero existēte, & quum iā nō habeat amplius hu-
miditatē, sed siccatu fuerit vterus, primū quidē intumescit
puer,

Partus im-
mortui si-
gna.

puer, deinde colliqueſcunt ac putreſcunt carnes, forasque ef-
fluunt, poſtremum autem oſſa procedunt: & fluxus aliquan-
do corripit, ſi non prius moriatur. Quū puer immortalis fue-
rit, tum aliis ſignis cōiectare id licet, tum iubere, vt aliquan-
do in dextro latere iaceat, aliquando in ſiniſtrum tranſmu-
tet. Trāslabitur enim in vtero puer eo quò mulier ſe vertit,
velut lapis aut aliud quiddam, ſi mortuus fuerit, & pectinem
frigidum mulier habet. Si verò viuatur, & pecten calidus eſt, &
venter totus tranſlabitur vnà cum reliquo corpore extētus,

Cum fluo-
ruētus par-
tum præce-
dit, pericu-
lum eſt.

& in ipſo nihil tranſlabitur abſque reliquo corpore. Si cui
ex partu laboranti fluxus multus ſanguinolentus citra dolo-
rem, ante puerum prodeat, periculum eſt puerum mortuum
exoluendum eſſe, & non vitalem proceſſurum. Prægnanti-
bus mulieribus plerisque ſtomachus vteri propè extat ante

Quæ facile
pariant.

partum. Mulier prægnans ſi non coitu vtatur, facilius à
partu liberabitur. Quæ gemellos geſtat, eadem die parit
velut concepit, habet autem vtroſque pueros in vna ſecun-
da. Muliere ægrè pariente, ſi puer in genitalibus locis hæ-
reat, & non facile exeat, ſed cum labore ac medici machina-

Quādo um-
bilicus non
ſtatim ſe-
candus eſt.

mentis, tales pueri modicæ vitæ ſunt. horum vmbilicum ſe-
care non oportet, priuſquā mingant, aut ſternutent, aut vo-
ciferentur, ſed ſinendi ſunt, & mulier proximè apud puerum
permaneatur, & ſi ſitierit, aquam mullam bibat, & ſi vmbili-
cus inſletur velut ſtomachus, & moueatur, aut puer ſternu-
tet, aut vocem rumpat, tunc ſanè ſecetur dum puer reſpirat, **F**
ſi verò non inſletur vmbilicus, neque moueatur, tempore ac-
cedente viuet. Prægnantem mulierem ſi aliter non cogno-

Signa gra-
uidæ.

ſcas, oculi tracti & cauioreſ fiunt, & candidum oculorum al-
bedinis naturam non habet, ſed liuidius exiſtit. Si qua par-
turi vicina ſit, & oculos cauos habeat, & facies intumeſcat, &
ipſa tota itémq; pedes tument, vt velut à pituita alba appre-
henſa appareat, & habeat aures albas, & ſummum naſum al-

Quæ par-
tum mor-
tuum geſtat.

bum, & labia liuida, ea ipſa mortuos geſtat quos pariet, aut
viuos prauæ, & non vitales, & exanguis, vtpote morboſos, aut
priuſ peperit non vitales. Huic ſanguis in aquoſitatem con-
uerſus eſt. Oportet igitur tali poſt partū odorata in vuluam
apponere, & comedere ipſam ac bibere odorata. & primū

Quum gra-
uidæ terrā

in facie naſus ſummus inſignis euadit, ac colorem recipit. Si
qua prægnans terram edere concupiſcat, aut carbones, eāq;
edit,

A edit, in capite pueri ubi natus fuerit, signum à talibus apparet. Mulierem id nosse expedit, vtra mamma ipsi maior est, illic enim fœtus existit. Similiter autem & oculum confiderabit. Maior enim & splendidior omnino erit intra palpebram, etiam eius partis, cuius mamma maior existit. Si cui ab apposis in vuluam non valde fortibus, dolores in articulos perueniant, & stridor dentium corripiat, & membris tenatur, ac oscitat, hanc magis concepisse spes est, quàm eam, quæ nihil tale patiat. Mulier quæ præter naturam crassa est, ac pinguis, & pituita repleta, non concipit hoc tempore. Quæ verò ex natura talis est, horum gratia concipit, si non aliud quiddam ipsam impediat. Mulieribus plerisque, quum menses apparituri sunt, stomachus vteri in seipsum contrahitur, magis quàm aliàs. Mulier quæ facile concipiebat, si prægnans esse desiit, bis per annū à manibus ac cruribus venam secari sinat. Si cui dolores in coxendice, aut in capite, aut manibus, aut aliqua alia corporis parte fuerint: quū verò prægnans est, desinunt, conceptu autem ab vtero exoluto rursus insunt, odorata & bibere, & ad vteri os apponere conducit. Quum mulieri alicui conceptus gratia medeberis, ubi purgata esse videbitur, & os vteri rectè habuerit, lauetur, & caput confricetur, nullo autem vnguine illinatur, deinde linteum in odorum lotum circum capillos ipsos circumdatum, reticulo loto aut nihil olenti obliget, ita ut primum linteū ipsum capiti imponatur, postea quiescat galbano ad vteri stomachum appposito, quod coctum ac molitum sit ad ignem, & nō ad Solem. Deinde manè deposito reticulo cum linteo, verticem suum alicui olfaciendum exhibeat, & si quidem oluerit, probè purgata est, sin minus, malè. Hæc autē ieiuna faciat, & si non fœcunda fuerit, nunquam olebit, neque purgata, neque aliàs, & si prægnanti idem medicamentum apponatur, neq; sic probè olebit. Quæ verò prægnans futura est frequenter, & facile concipit, ac sana existit, etiam si non apposueris neque purgaueris, vertex ipsius olebit, aliud verò nihil. Vbi autem omnia probè videbuntur, & ad virum accedere oportuerit, mulier ipsa ieiuna sit, Vir autem non ebrius, frigida lotus, & commodo alimento nutritus. Et si cognouerit mulier genituram se cōcepisse eo tempore virum non accedat, sed quiescat. Cognoscet autem si quidem vir se emisisse

vel carbon-
es edunt,
quid eue-
niat.
Qua parte
sit partus.

Crassæ præ-
ter naturā
cur nō con-
cipiant.

Conceptus
quī pare-
tur.

Cur quidā partus bimestres, vel maiores perdāt. emisisse dixerit, ipsa verò præ siccitate ignorauerit. Si verò D vterus rursus in pudenda genituram reddat, ipsaq; humecta fiant, rursus cum viro coeat, donec concipiat. Mulier quæ concipit quidem, perdit autē fœtus bimestres, exactè in eodem tempore, & neque prius, neque posterius, atque hoc iterum atq; iterum perpeffa fuerit, imò si etiam trimestres aut quadrimestres, siue verustiores perdiderit, iuxta eūdem modum. Talibus vteri puero augescēte, & bimestre aut trimestre, aut quantumcunque tempus transgrediente, si quando etiam aliās augescit, in maiorem amplitudinē non porriguntur, ita vt non ampliùs sufficiāt capiēdo fœtui, sed propterea perditur eodem tempore. Huic cucumerarium medicamentum in vterum dare oportet, ipsūque distendere E

Medela.

★ ac inflare pharmacis apposititiis hisce. Cucumeris sylvestris medulla contundatur ac cribretur, deinde modicum de ipsa melle cocto copiosiori misceatur, addito silphio modico: sit autem velut dixi, mel coctum, hoc circum specillum oblinatur, crassitudine formata quātam vteri stomachus suscipere potest: apponatur autem ad os vteri, & impellatur quo in internam vteri partem penetret. Quum verò colliquerit medicamentum, specillum extrahatur. Sed & elateriū hoc modo præparatum apponere potes, Similitérque colocynthidem sylvestrem. Per hoc autē tempus edat allia quā plurima, & silphij caulem, & quicquid flatum in ventre inducit. Hoc ★ apposititium pharmacum per tertiam diem apponatur, donec, probè habere visa fuerit, copia quātam vterus admittit. F

Purulenta vuluæ causa & medela.

Interiectis diebus, molliētibus vtendū est: postquā autem ex mollientibus præparatum fuerit os vteri, post mentium apparitionem vbi sicca fuerit, cū viro cōmisceatur. Si cui vterus suppuratus fiat, aut post partū, aut ex abortu, aut quomodocunque aliās, & non in vase alio ac tunica, velut in tuberculo solet, pus fuerit: huic conducit specillum vnctorium in vteri os demittere. Minus enim opus fuerit vsura, si ad specillum processerit, deinde erucas à tithymalide colliges: habēt autem velut aculeos quosdam, quos leniter rescindes, ne pabulum internum ex ipsis elabatur, deinde siccabis ipsas in Sole, ac teres. Vermes quoque stercorarios similiter in Sole siccabis ac teres, & erucæ quidem pondus duorum obolorum Aeginetorum, vermium verò duplum miscebis, modico aniso

Eruca tithymalidis.

Scarabæi.

Aniso addito, aut aliquo eius generis. Nam mali odoris medicamentum euadit. Hæc autem leuia facta ac contrita vino albo odorato diluito, Et postquã biberit, grauitas accedit, & torpor in ventrem irruit. Si itaq; accedit, aquã mulsam modicam insuper bibat. Si qua liberis carēs, imprægnatione ac Conceptus puerorum generatione indigeat, atque ea iam prægnas fuit reparatio, ac peperit, & hoc ipsi contingat, aut quum stomachus vteri ficcus, aut summa parte affectus, aut cõclusus fuerit, aut non rectè habuerit, sed ad coxendicem alterum distortus, aut ad rectum intestinum occultatus, aut in seipsum contractus fuerit, aut labium stomachi sibi ipsi vtcunq; incubuerit, aut stomachus vteri asper & callosus fuerit: durus autè sit, & à con-

Bclusionione, & à callositate: his menses non apparèt, aut pauciores quàm oportet, & per longius tempus apparent. Sunt autem in quibus etiam menses iuxta corporis sanitatè, & vterorum exitum reperiuntur, imò consueto & iusto modo, & stomacho vteri præ caliditate ac humiditate mensium non valde læso. Verum genituram non suscipit propter hanc læsionem, quæ impedit susceptionem, stomacho non rectè habente. Huic per totum corpus fomentũ adhibere oportet, & Quæ conceptum impediant. Medela. pharmacum bibendum dare, ac corpore primũ purgatam ac mundã reddere, siue supernè & infernè opus habuerit, siue supernè solũ. Et si quidem supernè purgãs medicamentum dederis, fomentum ante purgationem non præmittes. Verum fomentum adhibebis infernè purgaturus. Si verò supernè purgante medicamẽto non egere videbitur, præmisso fomento, infernè purgans bibendum dato. Cũ autè probè purgatum esse corpus videbitur postea vtero fomentũ adhibeto, frequentes infusus ipsis adornans, si ita conferre videbitur. Immittes autem in fomẽtum, cupressi ramenta, & lauri folia contusa, lauabisq; multa & calida aqua. Vbi verò recēs lauta fuerit, & fomentum admiserit, vteri os dilatabis specillo stanneo, corrigesque vbi opus fuerit: potes & plumbeo vtri, initio per paruum factò, deinde crassiore adhibito si suscipere potest, donec rectè habere videbitur. Inringes autem specilla in mollitorio quopiam diluto, aut etiam liquido red Specillum quale in his velit esse, videto. dito, si conferre videbitur. Specilla ipsa retrò caua faciendã sunt, deinde circum ligna longiora adaptandã, sicque ipsis vtendum. Cæterum hoc tempore bibat, in vino albo odorato dulci,

dulci, & quàm suauissimo decoctam tadam, quàm pinguis-
 simâ, in tenuia segmenta concisam, & apij semen contulum,
 & cumini Aethiopici semen, & thus quàm optimû. ex hoc bi-
 bat ieiuna copia quanta moderata esse videbitur, tot diebus
 quot satis habere videbitur. Et edat catulos coctos, & poly-
 pum in vino dulci coctum, iusculumq; ipsum bibat, & bras-
 sicam coctam, Vinum autem albû insuper bibat, & ne sitiat,
 & calida bis per diem lauet. A cibis autem hoc tempore ab-
 stineat, ab eo verò tempore si quidem processerit per stoma-
 chû, & quid purgationis foris apparuerit adhuc de potione
 bibendum est vnum atq; alterum diem, & à specillorum vsu
 desistendum, ac conandû vt vteri apposititiis medicamentis

**Stomachus
locellorû.**

purgentur. Cuicumq; autem stomacho recto, ac magno & sa-
 no existente, ac probè habente, & in loco vbi cõuenit & opor-
 tet sito, menses non apparuerint extoto, aut pauciores, & per
 longius tempus, & non sani, morbum ipsum inuestigabis
 quemcunq; tandem vteri habet, & si corpus quoque aliquid
 conferat, causam perscrutaberis ob quam non concipit: &
 hæc sic habeant, & curationem facies si medelam suscipere
 volet, initio à fortibus factò, prout opportunum visum fue-
 rit, ita vt desinas in molliorum vsu, donec vterus visus tibi
 fuerit probè esse purgatus, & stomachus recto statu esse con-
 stitutus, & ritè situs. Si verò à potu ac medicamento menses
 non processerint, etiam si moderato tempore id biberit, ne-
 quaquam à potu cessandû est: vbi verò probè habuerit, spe-
 cillorum vsu os stomachi molliendum est, & faciendum vt
 hiet, ac viam præbeat appposito medicamento, idq; pharma-
 cis suffitui aptis ac molliëtibus perficies. Quum autem satis
 suffitum ac mollitum esse videbitur, appposito medicamento
 subdititio vteri purgationem facies, donec ritè habere vide-
 bitur, à mollibus ad fortiora progressu factò, ita vt rursus in
 mollibus ac odoratis desinas. Nam pleraque ex fortibus me-
 dicamentis stomachum exulcerât ac corrodunt. Deinde ve-
 rò tum stomachum ad rectum statum ac sanitatem redigi-
 to, quo aptus sit ad suscipiendam genituram, tum vterum sic-
 cum reddito, & statû immittito. Si mulier præ pinguitudine
 vterum ad cõcipiendum læsum habere videatur, attenuatio
 quàm maximè, & gracilitas inducatur, suprâ reliquam cu-
 ram. Tempus porro vernum aptissimum est ad concipien-
 dum

**Cum pin-
guedo con-
ceptum im-
pedir, quid
agendû sit.**

A dum. Vir autem non sit ebrius, neque vinum album bibat, sed quod fortissimum est ac meracissimum, itemque edulia fortissima, & calida nō lauet: robustus autem sit, & sanus, & à cibis abstineat ad rem non conferentibus. Et vbi marem generare voluerit, mentibus desinentibus aut defectis misceatur, & quā penitissimè intrudat, donec defœuiat. Vbi verò fœmellam generare volet, quum plurimi menses prodierint mulieri, & dum adhuc eunt, coeat, ac dextrum testē obliget, quantum id tolerare poterit: sed si marem generare expetat, sinister testis obligandus erit. Stomachus vteri à suffimentis quidē, vbi conclusus fuerit, hians redditur, ab emollientibus verò mollescit. Suffire autem oportet, loti corticē, lauri semen siue baccas, & folia eiusdē viridia contusa, thus myrrham, artemisiæ semen aut folia: item anisum & adipē aut ceram simul contusa, sulphur, cupressi semen, peucedani radicem, myrti folia viridia contusa, fibri testē, asini masculi sterqus, allia, styracem, adipem suillum. sed & si distortum os vteri fuerit, his suffiendum est. Sic quidē igitur hians redditur ac conuertitur. Mollire autem per hæc vteri os oportet, sandaracham videlicet, adipem caprinum, fici succū, silphij succum, cyclamini succum, Thapsiam, succum tithymalli, cardamomi semen, herbam quæ peplos appellatur, fibri testem, lini semen, nitrum, ari radicem, staphidem syluestrem, calamithæ folia viridia, herbæ lanariæ sine struthij semen scillæ internam partem.

Quo modo mas fœminæ generandus. Similequid præcipit Columella in ouibus.

Quæ leniant, asperant, claudant aperiantq; vuluam, locellosve.

Medicamina purgantia locellos.

Medicamenta emollientia, & ad ciendum idonea, quo fortis purgatio fiat.

T Hapsiæ radicem, medullam bouis, adipem anserinum, rosaceum, hæc trita ac feruesfacta per quatrimum apponat, & bibat porri succum, ac vinum dulce albū. Item resinam, & oleum tepidum, cumini, nitrum, mel, sordida lana excipiat, & per quatrimum vtatur, bibatq; apij semen, & thuris nucleos quinque, & cumini Aethiopicū in vino albo meraco dulci, lauetq; bis per diem. Item myrrham, thus, fel bouis resinā terebinthinā, aut netopon siue metopium vnguentum, horum singulorū æqualem mensurā misceat, & in lana pura, aut linteo tenui apponat. Intingat autē linteū in vnguento albo Aegyptio odorato, & filo obligatū, à balneo subdet,

Diuerfa locellorū purgantia.

h

& po

& polypum plagis molitum edat, & apij ac asparagi semen **D**
ac vinum album bibat, ter in die ieiuna existens. Aut myr-
rham, cassiam, thus, cinamomum, netopū, singulorum aquas
portiones lana exceptas, aut in glandes redactas apponat.

Aut cucurbitæ sylvestris interiora, cuminum tostum, ane-
thi semen, cupressi radicem, trita ac melle cocto subacta in
glandes cogito, easque subdendas exhibeto, & bibat Præoniæ
radicem, apij semen, ac silphij succum, cum vino. Sed & Bul-
bium ipsum subditum purgat. Item myrrham primariam,
& florem æris modicum in vino albo odorato subdat.

*Medicamenta subdititia ad vterum pur-
gandum conuenientissima.*

Accipe æris florem ac niri tertiam partem, melléque
cocto subacta in glandulas iustæ magnitudinis ac cras-
situdinis redige, atque sic ad vteri osculum appone. si verò
fortius facere velis, elaterium ammisce, ad florem solum, &
hoc modo coactas glandulas subdendas præbe. Potes & ra-
mulorum fici corticem derasum ac tenuiter tritum ammi-
scere, quum os vteri siccius esse videbitur, dimidia portione
eodem modo. Aliud. Elaterium & æris florem trita,
duabus floris partibus, vna elaterij acceptis, dilue, & cycla-
minum tritum prout oportunum videbitur ammisce, & in
lana simul coacta subde.

Glandule album fluxum purgantes.

Artemisiam herbam, nitrum, cyclaminum semiaridū
acuminum, subde. Alia. Artemisiam herbam viri-
dem tritam, & myrrhæ tertiam partem, ammixto vino odo-
rato, in lana alba obuolue, eamque vino tinctam apponendā
præbe. Vbi verò hiauerit vterus nitrum, cucumeris sylue-
stris medullam, cyclaminum semiaridum, in lana appone.

Subdititia omnis generis purgare potentia.

Staphidem sylvestrem viridem tritam, artemisiæ her-
bæ folia trita, melle cocto excipe, & in vmbra ficcata in
glandulas coge, ac subdendas exhibe. Aliud. Florem æris,
& alumen Aegyptium cum cyclamino dilue, & velut prio-
ra melle cocto excipe aut in caricā inde, cum modica myr-
rha. Aliud. Cyclaminum tritam vino albo odorato am-
mixto, in linteo tenuissimo puro obliga, & subdendā præbe.

Aliud

A Aliud. Cyclaminum semiaridum, nitrum, cantharidas, adipem, sandarachen, subde.

De virgine.

Si virgini menses maturi non prodeant, multum & febricitat, & dolet, & sitit, & esurit, & vomit, & furit, & rursus resipiscit: uterus mouetur, & quum ad viscera vertitur, vomitus, ac febris, & delirium accedit, vbi verò sedatur uterus & hæc quiescunt, esurit, ac sitit, & febris lenis, hepialon Græci dicunt, tenet. Huic pelles agninas calidas ad ventrem apponere oportet, & suffitum facere in ipsa pudenda quàm penitissimè, ita vt super amphoræ collo desideat, & fumū admittat. Fiat autem suffitus ex myrrha magnitudine fabæ, & **B** thuris dupla portione, ammixta etiam zea fresa, hæc simul suffire debet, & in ignem immittere maximè dum ieiuna est, & multa calida lauare.

Medicamentum subdititium.

A Lumen Aegyptium emollitum lana inuolutum subdat. Aliud. Artemisiam tritam, & vino albo subactā, apponendam præbe.

Puerpera recens enixa.

Rosaceum, myrrham, ceram, mixta in lana apponenda præbe. Vbi autē uterus ipsi prociderit, acida & acerbiora offerenda sunt, tum potanda, tum foris adhibenda. Item sicū **Cum vterus procidit.** nigram, allium, nitrum, cuminum, hæc omnia tenuiter trita in lana apponenda dato. Aliud. Sepiæ testam tusam & vino imbutam, cum leporinis pilis, lana excipe, & apponendam præbe. Si verò post partum uterus doleat, pristanā & porrum, ac adipem caprinum coquat, indèque modicum forbeat. Subdititium medicamentum. Nitrum, cuminum, ficum, omnium aquas portiones subde.

Subdititium purgans & molliens.

Netopum, rosaceum vnguentum, adipem anserinum, linteis tenuibus excipe. Si menses multi prodeunt, **P**eonix grana nigra bis septem numero, in vini cyathis duobus bibenda præbe. Si verò vteri frequenter prolabantur, vteros aqua tepida madefacies, ipsam verò mulierem supinam reclinabis, miscebisque malicorium, gallam, & rhoem **Fabius Caluus legit, Si menses multino prodeunt.**
h 2 rubram

rubram, hisq; in viuo albo tritis vteros illines, ac immittes. D
 Postea lauri folia in vino austero bibenda dabis. Quam autem
 mulier pragnas menses profluos habet, stercus alini siccum, &
 rubricam, ac sepiæ testam, trita simulq; linteo illigata apponat, si
 verò secunda non purgetur, elaterij oboli Attici pondus in vini
 albi Cyathi mensura tritum bibendum præbe, & purgabitur.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE EXECTIONE

FOETVS, IANO COR-

NARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRITE.

in eade
 6 partus fru-
 stulatum ex-
 tractio.
git



E his qui non iuxta naturalem modum pa-
 riuntur, sed excinduntur, hoc modo se res ha-
 bet. Primum quidem Sindone supra mulierem
 iniecta, eam supra mammam circumdato, &
 caput obuelato, ne videns quod facturus es ti-
 meat ac exhorrescat. Si itaq; foetus oblique
 prolapsus manum protensam habuerit, manu apprehensa fo-
 ras producere quam maximè conare, & brachium ipsum exco-
 riato. atq; ubi os brachij denudaueris, squatinæ pellem circum
 duos manus digitos obligato, ne caro lubricitate sua elaba-
 tur. Deinde verò carnem circa humerum rescinde, ipsumq;
 iuxta iuncturam exime, post ea caput iuxta naturam protrusum
 foras producere tenta, foetum verò ipsum intro protrudito, fer-
 ramento per latus & costas, siue claviculam adacto, quo fla-
 tum emittat foetus, & confidat ac contrahatur, atq; ipsi faci-
 lior exitus pateat. Caterum caput si fieri potest iuxta natu-
 ram extrahe, sin minus, confringe: atque sic foetum unam sub-
 extrahe. Postea calida largè perfusam, & oleo illitam decum-
 bere iubeto, pedum situ alternatim variato. bibat autem vi-
 num dulce, album, meracius temperatum. Sed & resina mel-
 le trita ac vino ammixta, in potu præbeat. De cetero verò
 curanda est, velut dixi, iuxta ea quæ relata sunt. Quum verò
 parien

A parienti mulieri fœtus obliquè prolapsus fuerit: id quod cō-
tingit dum vertitur puer, & vmbilicus circum collum ob-
uoluitur, & exitum fœtus impedit, & caput in coxendicem **Partus di-**
incumbit, & manus vt plurimum foras prominet, quod ip- **rectio.**
sum mortui fœtus signum est. Quibus autem manus non
exerta est, vt plurimum viuunt fœtus, periculum autem
etiam hoc modo est. Aliquæ enim purgamenta ante partum
mittunt, & necesse est cognoscere ex eo partum siccum, &
cū dolore laboriosum esse. Quibus autem purgamenta
ante partum non prodeunt, hæ in pariendo facilius liberan-
tur. Concutere porrò oportet hoc modo. Sindone substrata
mulierem reclinabis, & aliam superiniicies, quo pudendum
B ipsius sit obuelatum, obuoluésque sindonem circum vtrun-
que crus & circum vtranque manum. Mulieres autem duæ
vtrunque crus apprehendant, & aliæ duæ vtrâque manum,
deinde concutiant validè ipsam tenentes non minus quàm
decies. Postea in lectū reclinetur mulier in caput, ita vt cru-
ra sursum vergant, & mulieres omnes ipsum pedibus corri-
pian, manibus dimissis, sapèque cōcutiant, ac reiectionem
in humeros faciant in lecto, quo fœtus in spaciosiorem locū
retrusus vertatur, & naturaliter prodire possit. Et si dictam-
num creticum habueris, ipsum bibendum dabis: sin minus,
fibri tellem in vinū chium derades. Si verò vteri foras pro-
dierint, siue ex dolore, siue ex partu, si quidem iuenculæ fue-
rint, aggressiōem facito: sin minus, finito. Aggressio autem
C hoc modo fiat. Pelliculam vteri iuxta naturalem modum
& obliquè incisam, linteo confricato donec inflammetur, &
illinito phocæ oleo siue adipe, aut pice, aut mali punici
flore integito, & molles spongas vino respersas
apponito, & ex humeris ipsas alligato. Mu-
lier verò decumbat cruribus quàm ma-
ximè sursum versus porrectis.
Moderatis autem edu-
liis vescatur.

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE DEN- TITIONE, IANO COR- NARIO MEDICOPHY.

SICO INTER-

P R E T E.

*

Carnosi, mi-
nùs lactis
hauriunt.



Dēitionis
varietas.

VERI natura habitiores, non pro carno-
sitatis ratione etiam lac sugunt. Voraces
verò & multum lactis trahentes, non pro ra-
tione carnosi sunt. Pueri sugentes si multū
mingant, minime anniculi fiunt. Quibus
aluus multum profuit, & bene concoquūt,
hi saniores sunt. Quibus modice profuit, & voraces sunt,
& non pro ratione similiter nutriuntur, morbofi. Quibus
multum lactosum reuomitur, his aluus supprimitur. Qui-
bus in dentitione aluus amplius subducit, minùs conuellun-
tur, quàm quibus parum. Quibus in dentitione febris acuta
accedit, parum conuelluntur. Quicunque dentientes habi-
tiores manent, & altiore somno vtuntur, periculum est ne
conuulsione corripiantur. Qui hyeme dentiunt, reliquis si-
milibus existentibus, melius liberantur. Non omnes in den-
titione conuulsi moriuntur, sed multi etiam seruātur. Qui
cū tussicula dentiunt, tardius dentes producunt, in per-
punctione autem magis gracilescunt. Quicunque in den-
tiendo hvenem habent, si attente tractentur, dentitionem
facilius ferunt. Qui plus mingunt quàm egerunt, pro ra-
tione habitiores sunt. Qui non pro ratione mingunt, ve-
rum aluus frequenter cruda à pueris egefit, morbofi sunt.

Tonsillarū
vlcera.

Qui bene dormiunt, & habitiores sunt, multum alimen-
tum adsumunt, idq; adiacet, nō sufficienter distributū. Qui
dum sugunt interim cibum adsumunt, facilius ablactationē
ferunt. Qui sepe cruenta ac cruda per aluum egerunt, plu-
rimi in febre somniculosi sunt. Vlcerā in tonsillis citra fe-
brem facta, securiora sunt. Quibus infantibus in sugendo
tussis instat, vñā maiore habere solēt. Quibus citò in tōsillis
vlcera

A vlcera serpentia confidunt, febribus ac tussi permanentibus, periculum est rursus generanda esse vlcera recurrētia.

Vlcera tonsillarum in infantibus periculosa. Pueris memorabilis magnitudinis, si vlcera in tonsillis sint, & deglutire possint, salutis signum est. Quum verò maiores prioribus, deglutire in tonsillarum vlceribus nō possunt, his multam bilem reuomi, aut per aluum prodire, periculosum est. In vlceribus tonsillarum si quid arenosum inest, nō bonum. In tonsillarum vlceribus post prima tempora, pituitam per os effluere, si prius non fuit, commodum est, & tamen reducenda est. Si verò incipiat, & omnino remittat, gaudendum est. Si autem non sic effluat, vereri oportet. Qui tonsillas destillatione vexatas habent, his aluus amplius subducta, siccas russes soluit. Verum pueris si quid concocti supernè prodierit, amplius soluit. Vlcera multo tempore in tonsillis citra augmentum manentia, ante quintum aut sextum diem periculosa non sunt. Sugentes qui multum lactis adsumunt, vt

B plurimum somniculosi sunt. Sugentes qui non probè aluntur, macilentissimi sunt, & aegrè vires colligunt.

Vlcera in tonsillis æstate facta, peiora sunt quàm aliis temporibus, citius enim proserpunt.

Vlcera in tonsillis circa vnam proserpentia, in his qui seruantur vocem alterant. Vlcera proserpentia cir-

ca fauces, grauiora & magis acuta, vt plurimum

spirandi difficultatem indu-

cunt.

h 4

HIP

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER, DE CORPO-

RVM RESECTIONE, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER

PRETE.

Arteria.

Pulmo.

Cor.

Magna ve-
na.

Hepar.

Rhenes.

Vesica.

Gula.

Stomachus

Septum.

Lien.

Venter.

Colon.



ARTERIA exvtraque fauciu parte
exortum faciens, in summitatē pul-
monis definit, circulis cōposita con-
similibus rotundis, in superficie se
mutuo contingentibus. Ipse autem
pulmo testitudinem coadimplet, in
sinistram conuersus, quinque api-
ces habēs, quos lobos & summitates
vocant, cinereo colore præditus, no-
tis cauernosis cōpunctus, naturæque antrosus existēs. Ad me-
dium verò ipsius cor situm est, rotundius ac oblongius quàm
in omnibus animalibus. A corde verò ad hepar multa char-
tilaginosa arteria procedit, & cum ipsa vena magna appel-
lata, per quam totū corpus nutritur. Hepar autē similitudi-
nem quidē cum omnibus aliis habet, verū sanguinolentius
quam alia existit, apices habens duos, quos portas appellāt,
in dextris locis sitas. Ab hoc verò obliqua vena infernē ad
rhenes tendit. Rhenes autē consimiles colore malorum spe-
ciem præ se ferunt. Ab his canales obliqui ac fermē triangu-
lares in summū vesicæ apicem tendunt. Vesica autem tota
neruosa est, magnâq; ac latē se extēdens capacitas intra eam
a natura disposita est. Et has sex partes intus per mediū cor-
pus natura disposuit. Gula autē à lingua principium faciēs,
in ventrē definit, quam sanē Græci etiā œsophagum, & sto-
machum, id est os ventris, significanter appellant. Caterū
à spina retro hepar, septū transversum productum est. Ex la-
tere verò notho, sinistro videlicet, lien initio sumpto exten-
tus est ad humani vestigij similitudinē. Venter autē hepatis
adiacens iuxta sinistram partem, totus quidē est nervosus. A
ventre verò extat intestinum ventri cōsimile, longū cubito-
rum non minus duodecim, pampinoformiter in sinibus in-
uolutum,

A uolutum, quod aliqui colum vocât, per quod alimēti delatio
contingit. A colo autē situm est rectum ac princeps intesti-
num postremū, carnem copiosam habēs, & in summū anum
desinens. Reliqua porrò natura ipsa ordinauit ac disposuit.

H I P P O C R A T I S


COI LIBER, DE CORDE,

IANO CORNARLO MEDICUS
PHYSICO IN-

TERPRETE.

B



 O R figura velut pyramis est, colore autē Cor quale. abunde puniceum, & tunicam leuem circumdantam habet, & est in ipsa humor modicus velut vrina, vt putare possis in vena cor diuersari. Facta est autem ea gratia, vt sanum in custodia florescat. Habet autem humiditatem tantā quanta satis est astanti in medellā. Cæterum hunc humorē cor emingit, bibendo ipsum assumens ac cōsumens, pulmonis nimirū potum lambēs. Etenim homo multo maximā partem in ventre bibit. Gula enim siue stomachus velut infundibulum, potus copiam & quācūq; volumus excipit. Bibit autem & in guttur ac arteriam, minus verō & quantū latere possit per rimam illapsū. Operculum enim exactum epiglossis, lingula siue minor lingua appellata, ne permiserit quidem aliquid amplioris potus penetrare. Signum autem huius rei, hoc est: Si quis enim aquam cæruleo colore, aut rubrica temperatā, sitienti valde bibendam dederit, maximē sui, hoc enim pecus non est curiosum, neque mundiciei deditum. Deinde dum adhuc bibit ipsius guttur resacet, hoc colore ipsum tinctum reperiet: sed non est cuiusvis hæc chirurgiæ aggressio. Nequaquam igitur fides nostra suspecta esse debet de potu, quod homini in guttur vergat. Sed quomodo aqua acruatim irruens, turbationem ac tussim multā exhibet? propterea inquam, quod contra respirationem fertur. Quod enim per rimam illabitur, tanquam iuxta parietem delabens, aeris elationi

Cor quale. Cordis tunica.
Paulo cor humectat.
Stomachi effigies.
Epiglossis
Alg. P.
et f. g.
B. B. A. W. R. S.
ab exēplo.
Da b. a.
videt.
sentia
t. a. d. n.

Paulò cor
humc&at.

Stomachi
effigies.

Epiglossis

Alg. P. 24

cc. f. 50v

3. Βαίντις,

exēplo.

u u a n

midle

entoid

Amel

ere

...

1792

John

non instat, sed leuem ac lubricā quandā viā humectatio ipsi D
præbet. Hunc itaq; humorem cor de pulmone vnā cum aere
abducit. Aerem quidē igitur vbi in medelā celsit, necessario
oportet retrò per eandē viam qua adduxit reicere. Verum
humorem partim in culeum ac vaginam suā expuit, partim
rursus vnā cum aere foras propellit. Quapropter etiā pala-
tum eleuat, quū spiritus recurrit. Merito autē recurrit. Non
enim humanæ naturæ alimenta hæc sunt. Quomodo enim
hominis alimentū sunt ventus & aqua cruda? sed sunt magis
cognatæ affectionis castigatio & medela. Porro vt ad institu-
tum sermonē reuertamur, Cor musculus est valde fortis nō

Cor quid.
Cordis vē-
triculi, siue
sinus.

neruo, sed densitate ac cōstrictione carnis, & duos ventricu-
los habet discretos in vno amiculo, ab vtraq; parte vnū. Ni- E
hil autē inter se similes sunt, Alter enim in dextris ad osculū
situs est, cōtingens alterā venā. Alter in sinistris. Totū enim
cor in his sedem suā firmavit. Sed ille etiā omnino amplio-
ris ventris, & magis inanis quā alter est, neq; extremitatē
cordis attingit, sed caudā eius ambit, solidus item est, veluti
extrinsecus assutus. Alter autē subter sinistrā mammā maxi-
mē in directum situs est, vbi etiā saltus ipsius significationē

✱

sui præbet. Amiculum autē habet crassum itémq; foueā. Fou-
eæ enim speciem præ se fert similē mortario. Sed enim hic
etiam pulmonē subit cū māsuetudine, & circuniectu ipsius,
caloris intemperantiā castigat. Etenim pulmo natura frigi-
dus est, sed & inspiratione perfrigeratur. Ambo autē densi ac
asperius sunt interna sui parte, & velut subcorrosi, magisque F
sinister quā dexter. Nā insitus natura ignis non est in dex-
tro. Quare mirū est sinistrū asperiorē fieri, vbi intemperatū
aerem inspirauerit. Quapropter etiā roboris caloris custo-
diendi gratia crassius intus cōstrictus est. Oscula autē ipsis
non sunt aperta, nisi si quis cordis auriculas præsecet, aut ca-
put cordis præcidat. Si autē quis præsecet, apparebunt dupli-
cia oscula in duobus ventriculis. Crassa enim vena ex altero

Pulmo cor
dis calorē
moderatur
Cordis si-
nus quales.

σηματα.

Fons vite
hominis.

Cordis au-
riculæ.

excurrrens visum decipit, si fuerit resecta. Hi fontes sunt hu-
manæ naturæ, & hic flumina sunt quibus totū corpus irriga-
tur: atq; hi etiā vitam homini cōferunt, & vbi resiccati fue-
rint, homo moritur. At verò prope exortū venarū corpuscu-
la circū vētriculos cōsurgunt, mollia cauernosa, quæ auricu-
læ appellātur. Nō sunt autē foramina aurium, nō enim cla-
morem

A morem exaudiunt. Verū sunt organa quibus natura aerem rapit. Et sanè videtur mihi boni ac præstantis artificis opificium esse. Quum enim cōsiderasset figurā solidam futuram ipsius visceris, propter sanguinis ex venis effuli collectionē ac concretionē, deinde attractorium ipsum esse totū vidisset, folles ipsi opposuit, quemadmodū fabri ferrarij fornacibus solent, quo per ipsos spiritū apprehenderet. Signū autem sermonis hoc est. Etenim cor videas ex toto ventilari, aures verò priuatim tum inflari, tum confidere ac cōtrahi. Et propter hoc etiā dico, quod venæ quidem operātur respirationē in sinistrum ventriculū, arteria autē in alterū. Molle enim magis attrahit, & incrementū capit. Oportebat autem nobis magis incumbētia cordis tegmina perfrigerari. Est enim calor non in dextris: quare propter hāc affectionē, non acceperunt amplum organum, vt ne in totū ab ingrediente aere superarentur. Restāt dicendæ cordis pelliculæ latentes, opus dignissimum cognitione. Sunt enim & aliæ quædā in ventriculis pelliculæ, velut araneorum telæ extensæ, quæ vndiquaque oscula cingunt, & strias ac segmēta in solidum cor inferunt. Hæ mihi nerui ipsius visceris & vasorū principia aortis esse vidētur, est autem ipsarum par vnum. Cate-rum osculis singulis tres pelliculæ subornatæ sunt, rotundæ in summo, velut circulus semisectus. Et qui rei intelligētes sunt, admirantur, quomodo oscula & aortarum fines claudunt. Et si quis veteris, eximendi cor mortui, moris gnarus, aliam auferat, aliam reclinet, neque aqua, neque flatus immissus in cor penetrarit: atque hæ magis in sinistri ventriculi osculis exactius, & meritò sanè subornatæ sunt. Mens enim hominis in sinistro ventriculo insita est, & reliquæ animæ imperat. Nutritur autē neque cibis neque potibus à ventre, sed pura & illustri substantia ex sanguinis discretionē nata. Adsumit autē alimentum ex proxima sanguinis cisterna, radios suos eò immittēs, & depascens, velut ex ventre intestinorum alimentum non naturale existat. Quo verò non in mora sit, qui in arteria est in fluctuatione cōstitutus cibus, viam in ipsam occludit. Magna enim arteria ventrem depascitur ac intestina, plenāque est alimento non principali. Quod autem nō nutritur sanguine apparēte, & quem videmus, arteria ipsa magna, ex hoc manifestū existit.

Macta

Creatoris
optimi sum-
mum opifi-
cium cor.

Venæ si-
num fini-
strum per-
flant.

Arteria ma-
gna dex-
trum.

Cordis re-
liqua.

Vena aor-
ta.

Cor nihil
afficitur.
Mentis si-
tus.

Arteria ma-
gna ven-
trē depasci-
tur.

Hippocratis Liber

Arteria
parua.

Sanguis ca-
lidus natu-
raliter non
est.

Maſtato enim animali, & ſiniſtro ventriculo diſſecto, tota D
deſolata apparet, modico ſeroſo humore excepto, flauaque
bile, ac pelliculis, de quibus iam mihi dictum eſt. Arteria au-
tem altera ſanguine non eſt deſtituta neque ventriculus dex-
ter. Hoc quidem igitur vas cauſſa fuit, mea ſanè ſententia, vt
pelliculæ producerentur. Id verò quòd ex dextro fertur ven-
triculo etiam ipſum quidem commiſſura pellicularum clau-
ditur, verum non valde ſalutis præ imbecillitate. Sed aperitur
quidem in pulmonis vaſa, ſanguinem exhibens ipſis in ali-
mentum, clauditur autem in cor, non tamen conſeſtim, quo
ingrediatur quidem aer, non autem multus. Debilis enim
eſt hic calor, frigiditatis facultate ſuperatus. Sanguis enim
non eſt natura calidus, neque enim alia aliqua aqua, ſed ca- E
leſcit. Multis autem videtur natura calidus eſſe. Et de corde
ſanè talia dicta ſint.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE GLAN-

DVLIS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*

Glandulæ
uales.

Sanguis al-
bus de glân-
dulis ma-
nat.



E GLANDVLARVM tota natura
ſic habet. Natura ipſis eſt ſpongioſa,
Sunt enim raræ & pingues, & neque
carnes ſunt reliquo corpori ſimiles,
neque aliud quid ſimile corpori, Sed
friabiles ſunt, & venas multas ha-
bent. Si verò diſſeces, ſanguis largus
erūpit, ſpecie albus & velut pituita.
Tangenti autē velut lanē apparent.
Et ſi multa vi ipſas digitis cōpreſſeris, glādula humorē oleo-
ſum remittit qui & ipſe conteritur vt plurimum, ac diſperit.
Aegrotant autem non valde, ſed vnā cum reliquo corpore.
Quum

A Quum verò proprio morbo agrotant (nam parum etiā cum reliquo corpore agrotant) morbi tubercula fiunt, & strumæ resultant, & febris corpus occupat. Perpetiuntur autem hæc, ^{φύματα} vbi humiditate repletæ fuerint, ex reliquo corpore in ipsas influente. Influit autem ex reliquo corpore per venas, quæ per ipsas extentæ sunt multæ & caux, vt humor quæcunque tandem traxerint, facile in ipsas sequatur. Et si multa ac morbosa fuerit fluxio, glandulæ reliquū corpus in se distendunt, atque sic febris incenditur, & eleuantur ac inflammantur glandulæ. Caterū glādulæ in corpore sunt plures siue maiores, in cauis ipsius partibus, quā in articulis, & quæcunque in aliis humectis ac sanguinolentis locis consistunt: atq;

B illæ quidē, vt quod supernè in cauas partes influit, suscipientes in se trahant, hæ verò vt rursus nascentem præ laboribus humiditatē in articulis, si quam articuli remittant, eius multitudinē susceperint: & sic nimia humectatio in corpore non inest. Nam si etiam quid gignatur humiditatis, non statim nimia humectatio inde successerit. Reflectitur enim & consumitur tum multa, tum modica, in ipsas glandulas, atq; sic reliqui corporis redundantiam glandulæ sibi lucrifaciunt, & alimentum hoc est ipsis coalescens. Quare vbi cœnose partes sunt & humectæ, ibi etiam glandulæ. Cuius signum est. ^{Qua parte sint glandulæ.} Quod vbi est glandula, ibi etiā pili. Natura enim facit glandulas & pilos, vtrique eadē vtilitate participantes, illas quidem vt quod influit, velut antea dictum est, suscipiant. Pili

C verò ex glandulis opportunitatem habētes nascuntur & augescunt, colligentes id quod in extremitates redundat ac effervescent. Vbi autem corpus siccum est, neq; glandula, neque pilus inest. At verò teneræ & exercitiis deditæ & humectæ partes, glandulosæ sunt ac pilosæ. Glandulæ porro sunt ab vtraq; anriū parte iuxta iugulares colli venas, & pili etiam ibidem. Item sub alis vtrinq; & glandulæ & pili sunt. Inguina & pubes similiter vt alæ, & glandulas & pilos habent. Et hæ quidem caux corporis partes sunt, & ad humoris redundantiā expositæ. Nam & laborant hæ, & ex omnibus corporis partibus maximè mouentur. Reliquæ verò glandulas tantum habent, velut intestina. Habent enim & hæ glandulas in omentum maiores: pilos autem non habēt. Nam & in ^{Sata vbi nā nascuntur.} cœnosis ac humectis terræ locis, semen non nascitur, neque ^{supra}

Hippocratis Liber

**Viscerum
glandulæ
magne
sunt.**

**Rhenum
glandulæ.**

**Tonsillæ.
Caput
quale.**

**Quando
glandulæ
vexant.**

¶

supra terram ascendere conatur, sed per redundantiam pu-
D
trescit ac suffocatur. Violat enim semen, violat autem & in
intestinis copia ac multitudo humoris, & pilos enasci non si-
nit. Glandulæ autem in intestinis maiores sunt, quàm alibi
in corpore, & pascuntur humectatione nimiam ex intestinis
exprimentes. Intestina verò ex valis in omentum suscipiunt
ac remittunt humiditatem. Omentum autem in glandulas
distribuit. Habent præterea etiam rhenes gládulas, Nam &
hi multa humiditate exsatiantur. Maiores verò etiam hac
parte quàm aliæ glandulæ existunt. Influens enim humor in
rhenes non imbibitur, sed perfluit infrà in vesicam. Quare
quicquid eius lucrifaciunt de canalibus, hoc ad se trahunt.
Sed & aliæ in corpore glandulæ sunt parvæ valde. Verùm E
non volo hunc sermonem longiùs euagari permittere, Nam
earũ quæ alicuius momenti sunt gratia, hoc scriptum insti-
tutum est. Nunc itaq; sermone progressum faciam, & dicam
de tota natura glandularũ colli. Collum ab utraq; sui parte
hinc & hinc glandulas habet, & vocantur hæ gládulæ tonsil-
le, in hunc vsũ atq; vtilitatem. Caput suprà situm est, sur-
sum cauum ac rotundum existens, & humiditatẽ ex reliquò
corpore complectẽs, & corpus simul vapores omnis genẽris
sursum in caput demittit, quos caput rursus retro dimittit.
Non enim immorari ac manere potest id quod influit, non
habens vbi sedẽ firmet. Nisi sanè caput ægrotet. Tunc enim
non remittit, sed isthic retinet. Postquàm verò attractionem
remiserit in glandulas fluxio vergit, & nihil molestat, donec F
pauca & moderata fluxio fuerit, & ipsæ glandulæ validæ ac
potentes extiterint. Si enim multa & acris influxerit, manse-
ritque acris & glutinosa, inflammatur ac intumescit & col-
lum distẽditur, atque sic ad aurem progreditur, & si quidem
in utranq; partem processerit, utraque auris: sin ad alteram,
altera tantum ægrotat. Si autem pituitosa, & multa ac lenta
fuerit fluxio, etiam sic inflammatur, & inflammatio quum
stabilis humor existat, strumas pessimum colli morbum ge-
nerat. In alas autem etiam tunc quid cõfluit. Sed vbi copiosi
fuerint acres & serosi humores, etiam sic in ipsis tubercula
producuntur. Sed & in inguinibus gládula à partibus suprà
sitis humiditatẽ trahet, Sed vbi multitudo eius occupauerit
inguina intumescit, & suppuratur, ac inflãmatur, similiter
ut alæ,

A ut alæ ac collum. Atque hæc sanè tum bona, tum mala glandulæ exhibere videntur. & de his quidem hæc suffecerint.

Porro intestina multam satietatē ex cibis ac potibus habent, & præterea humiditatem sub cuticula habent. Sed & ~~hæc~~ per tota reflectitur ac consumitur in glandulas, similiter velut superior. Morbos autem non facit ferè, quemadmodū in articulis contingit. Frequentes enim glandulæ & expansæ, ac non cauæ sunt, & altera alterius multitudine nō multum fruitur, & aliàs si qua etiam plus habere velit, copiam eius habere non potest, Sed quod in paucas ac singulas confluit in articulis, id in multas hic diuiditur, & æqualitas ipsis existit.

B Caput etiam ipsum glandulas habet, cerebrum nimirum simile glandulæ. Est enim cerebrum album ac friabile, quemadmodum etiam glandulæ. Et ob id in commoditatem capitis glandulas facit, & per relatas à me cerebrum auxilium ferens humiditatem aufert, & in extremitates foras ablegat per fluxiones ex magna parte. Maius autem est cerebrum quàm aliæ glandulæ, & capilli etiam maiores quàm alij pili. Maius enim est cerebrum, & in amplo spatio in capite situm est. Facit autem morbos, & minores, & maiores, quàm aliæ glandulæ. facit autem quum in internas corporis partes redundantiam ac superfluitatem suam ablegarit. Fluxiones porro de capite vsque ad secretionem contingunt, per aures secundum naturam, per oculos, per nares, atq; hæc tres sunt, & aliæ per palatum in guttur, & in gulam, & alia per venas in medullam spinalem, & in sanguinem. Quæ omnes septem numero existunt, hæc fluxiones cerebri sordes ac purgamenta discedentes existunt, & si non discesserint, morbus ipsi inde oboritur. Sic autem & reliquo corpori aliqui morbi accedunt, si intrò abierint ac discesserint hæc fluxiones, & non foras. Et rursus turbatio multa oboritur, si hianter ac affatim attrahat, & acrem quidem fluxionem cerebrum demittat, quæ influxiones corrodit & exulcerat. Et si id quod cerebro influit copiosum fuerit, fluxio descendens non desinet, donec multitudinem influentis exhauserit, atque sic id quod influit foras demittens, & aliud suscipiens, ac semper in consimili statu consistens, & humores trahit, & morbos facit. Ambo autem magno tædio ac molestia naturam frangunt quæ si fuerit affecta, dolorosa afflictio existit. Affectiones enim

Viscerum
mala vnde

Glandulæ
intestina
quales.

Cerebrum,
glandulæ
simile.

Septem ex
pitis mea-
tus fluores-
que.

enim naturæ sunt prædictæ fluxiones, & multitudinem moleste ferunt, & morsum ac rofionem perceptant, ex eo quo præter rationem & non cōsuetum existit. Cerebrum autem cladem perfert, etiam ipsum non sanum existens, sed si quidem rodatur, turbationem multam sustinet, & mēs delipit, & cerebrum conuellit ac distrahit totum hominem, qui in seipso vocem non edit, ac suffocatur, & hæc affectio sideratio ac Græcè apoplexia appellatur. Aliquādo verò acris quidem non est fluxio, sed copiosa in cerebrū irruens, ipsum affligit, & mens perturbatur, & homo circum ambulat, aliena cogitans, & aliena videns, perferens morbi mores, visis, risu, & peregrinis imaginationibus. Alia fluxio ad oculos ophthalmia Græcis, Latine lippitudo appellatur, & oculi in ipsa intumescunt. Si verò ad nares defluxio fiat, arrodūtur nares, & nihil aliud graue accedit: nam viæ ipsarū amplæ sunt, & sibi auxiliari possunt, insupérq; non compactū est quod ab ipsis discedit. At verò aures intortus quidē meatus & angustus, cerebrum autem prope ipsum ipsis auribus apprimitur. Agrotās verò hoc morbo, plurima excernit, & auris à frequenti fluxione per tempus vexatur, & pus graueolens effluit. Sic etiam fluxiones ad oculos foris conspicuæ sunt, & non lethales in totum. Si verò fluxio retrò processerit per palatum, & in ventrem pituita peruenerit, fluunt quidem horum ventres, non autem ægrotant. Si verò infernè maneat pituita, affectiones voluulosa sunt diuturnæ. Aliis autem si per palatum in guttur multa fluxio cōtingat, vt plurimum morbi tabis oriuntur, replētur enim pulmones pituita, atq; ea ipsa pus fit, id quod pulmones exedit, & ægroti non facile superstitēs manent, & mens medici si bonus & prudens est, vt plurimum causam intelligit. Alius morbus oritur ex defluxione capitis per venas in spinalem medullam. Inde autem in sacrum os impetum facit, quo medulla ipsa fluxionem perducit, & in coxendicum acerabula siue iuncturas deponit: & si tabem fecerit, homo marcescit, atque hoc modo cōtabescit, & viuere non expetit. Statim enim scapulæ dolent, ambōque pedes ac crura consequuntur, & semper tandem percūt multo tempore curati: atq; sic deflorescit homo ac moritur.

Hæc mihi de fluxionibus capitis dicta sunt. Sunt autem affectiones cerebri, etiam alij morbi, deliria, infantia, omnia pericu-

Sideratio,

Χαπληξία.

Morbus

imaginationis.

fus.

ὀφθαλμία.

E

Purulentæ

aures.

Palati de-

quillatio.

F

Tabes.

Pulmo qui

consuma-

tur.

Phthisis.

Cerebri a-

lia mala.

A periculosa, & agrotat cerebrum, & alia glandula. Habet enim & dolorem, & alius congressus corporis hic contingit. Quin & glandulae in pectoribus mammae appellantur, & attolluntur ac lac faciunt, aliquibus verò lac non faciunt. Et faciunt quidem lac mulieres, viri verò non faciunt. Mulieribus enim rara est glandularum natura, quemadmodum etiam reliquum corpus rarum habent, & alimentum quod in se trahunt, in lac permutant. Et ab utero accedit ad mammas, quod post partum puero cessurum est in alimentum, quod ipsum sanè exprimit ac sursum mittit omentum, ad supernas partes ab ipso foetu coarctatum. Verum maribus locorum angustia, & corporis insuper densitas conducit ad hoc,

B ut glandulae non sint magnae, Mas enim plenus est, & velut pallium densus, tum ad visum, tum ad tactum: femina verò rara & laxa, & velut fluida, tum ad visum, tum ad tactum. Quare humiditatem non remittit id quod est rarum & molle. Mas autem non amplius quid eius susceperit, quam densus existat ac cohaerens & compactus, sed & labor corpus ipsius corroborat, ut non sit locus ubi redundantia ac superfluitates recipiat. Atque hoc modo cogit ac concludit haec ratio, & pectora, & mammas, & reliquum corpus mulieribus laxa ac mollia esse tum ob otium ac segnitiam, tum ob alia praedicta, Viris autem vice versa. Porro faciunt etiam mammae tubercula ac inflammationes, lac ipsum putrefacientes. Commoda autem habent superioribus similia, & reliqui corporis redundantiam auferunt, testimonium abundè praebent mulieres, quibus morbus, aut alia quaedam calamitas mammas adimit. Nam & vox ipsarum aspera redditur & humores in gulam feruntur, & multo sputo vexantur, & caput dolent, & ab his agrotant. Lac enim proficiens ac influens ab utero, quemadmodum etiam antea in superna vasa transibat, quam propria vasa non habeat, nec reperiat utpote ipsis per mammarum ademptionem priuatum, in principales corporis partes incurrit, cor videlicet ac pulmonem, atque sic suffocantur.

Mamma.

Quoniam.

pug. a.

Marii corpus quale.

Feminae corpus.

Cur cap.

Vir. cor.

moll.

ma.

ma.

ma.

ma.

HIPP

HIPPOCRATIS^D
 COI LIBER DE OSSIVM NA-
 TVRA MOCHLICVS, ID EST
 VECTIARIVS. IANO COR-
 NARIO MEDICO PHY-
 SICO INTER-
 PRETE.

Manus pe-
 disque ossa
 articuli.



Patella.

Coxa.
 Os sacrum
 Spina.

SSIVM natura hæc est. Digitorum
 quide ossa ac articuli simplicia sunt.
 Manus autem & pedis multa alia, a- E
 lio modo coarticulata. Maxima ve-
 ro suprema parte. Calcanei vero v-
 num, velut extra apparet. Ad ipsum
 autem posteriores tendines tendūt.
 Tibiæ verò duo sunt, quæ supernè ac
 infernè coherent. Iuxta medium ve-
 rò distant. Paruum est quod extrinsecus est, iuxta paruum
 digitum paulò tenuius. Plurimum autem hac parte distant,
 & minore momento iuxta genu: & tendo ex ipso enascitur,
 qui circa poplitem foris est. Habent autem infernè commu-
 nem appendicem, ad quam pes mouetur. Aliam verò super-
 nè habent appendicem, in qua femoris articulus mouetur F
 simpliciter, & expeditè in longitudinem, specie nodosa, pa-
 tellam habens. Ipsum autè femur foras, & in anteriore par-
 te incuruum est. Caput autem eius appendix est rotunda, ex
 qua nervus, qui in coxæ acetabulo est, nascitur. Subobliquus
 autem etiam hic annexus est, minus verò quàm brachium.
 Coxa verò magno verticulo, quod iuxta os sacrum est, ex li-
 gamento chartilagineo ac nervoso adhæret. Spina verò à sa-
 cro osse, vsque ad magnum verticulum gibbosa est, & vesi-
 ca, & genitura, & recti intestini pars inclinata, in hac parte
 est. Inde verò vsq; ad septum transuersum pervenit, in dire-
 ctum repanda est, & muscoli lumbares hac parte existunt.
 Hinc verò vsq; ad magnum verticulu, quod supra supernas
 humeri partes est, è directo gibbosa est. Imò magis esse vi-
 detur quàm est. Nam posteriores ossiū propagines hac par-
 te alt

A te altissimæ sunt. Cervicis autem articulus repāduſ est. Ver **Cervix.**
 tricula verò intrinsecus inter se æqualia sunt: ab externis au-
 tem chartilaginibus ac nervis continentur. Coarticulatio
 verò ipsorum in posteriore medullæ spinalis parte est. A po-
 steriore autem parte exortū acutum habent, qui appendicē
 habet chartilaginofam, vnde nervorū propago prona fertur
 quemadmodum etiam muscoli à ceruice ad lumbos adna-
 ſcuntur, costarum ac spinæ medium explentes. Costæ verò
 iuxta discriminationes verticulorū **neruo** annexæ sunt à **Costæ.**
 ceruice vsque ad lumbos intrinsecus. Ab anteriore autē par-
 te, iuxta pectus, laxam ac mollem summā partem habentes,
 specie præ cunctis animalibus maximè obtorta. Hac enim
B parte angustissimā molem homo habet. Qua verò parte co-
 stæ non sunt, exortus obliquus, brevis & latus, ad singula ver-
 tricula nervo annexus est. At verò pectus coharens ipsum si- **Pectus.**
 biipsi, discriminationes habet obliquas, qua parte costæ an-
 nexæ sunt. Laxū autem est & chartilagineū: claviculæ verò **Claues pe-**
 rotundæ sunt ad anteriore partem, ad pectus quidem breues **toris.**
 motus habentes, ad summum verò humerum frequētioreſ.
 Summus autē humerus ex scapulis nascitur, in plerisq; dissi-
 militer. Scapula ad spinā chartilaginea est, reliqua parte la- **Scapula.**
 xa, inæ qualem partem foras habens ceruicem verò & aceta-
 bulum habet chartilagineum, ex quo costæ motum habent.
 Facile autem vt inter ossa exoluitur, brachio excepto. Huius
C autem caput ex nervo & acetabulo dependet, chartilaginis **Caput hu-**
 laxæ rotūdā appendicem habens. Ipsum verò brachiū in- **meri.**
 curuum foras, & anteriore parte obliquum, non rectum est
 ad acetabulum. Pars verò ad cubiti gibbum lata est, & nodo
 fa, & repagulo similis, & solida, posteriore parte caua, in qua
 cornix inest ex cubito, quum manus fuerit extenta. Ad hanc **Nervus tor-**
 etiā torpidus nervus, qui ex cubiti ofsium discrimine media **pidus.**
 enascitur, perficitur ac terminatur. Ossa manus viginti se- **Manus, pe-**
 ptem sunt, pedis viginti quatuor. Colli vsq; ad magnum ver- **dis, cætero-**
 ticulum septē, lumbi quinq; spinæ viginti, capitis vnā cum **rūmque of-**
 oculorum ofsibus octo. in vniuersum nonaginta vnum, cū **sa.**
 vnguibus verò centum ac vndecim, Cæterum vt nos ipsi
 ex hominis ofsibus didicimus, verticula supra claviculam **Vertebra**
 vnā cum magno septem sunt. Iuxta costas autem tot quot **Costæ.**
 costæ sunt, duodecim videlicet. Iuxta laterū mollitudinem
 i 2 verò

Hippocratis Liber

emen ge- verò forinsecus vbi coxendices, in lumbo quinque. Semen D
 tale fauo- porrò velut fauus ab vtraque vesicæ parte est. Ex ipsis au-
 mile. rem rhenibus venæ ab vtraq; meatus vrinæ parte, in puden-
 otus quò- dum tendunt. Potus per fauces ac gulam; larynx enim qui
 ndat. caput arteriæ est, in pulmonem ac arteriam tēdit: ab his in
 arynx. summam vesicam. Hepatis extremitates quinque sunt, su-
 lepar. per quarta autem extremitate for incumbit, quòd osculum
 el. ad septum transuersum & cor, ac pulmonem profert. Cir-
 or. cum cor pellicula est. Intestina crassa homo maiora quàm
 canis habet, dependent autem ex Mesenterij membrana,
 Mesocolo- quæ Mesocolon hac parte vocatur, Mesocolon autem ex ner-
 uis de spina sub v̄trem. Rhenes ex neruis de spina. Arteriæ E
 rhenes. fons cognatus cor est. Vena tendit per septum transuersum,
 arteriæ. hepar, splenem, rhenes, ad coxendicem, circa suram ad sum-
 mum pedem. Altera autem ex corde sub alas, clauiculas, iu-
 gula, caput, nasum, frontem, iuxta aures, humeros, dorsum,
 pectus, ventrem per cubitum. Aliæ verò per alias ad cubi-
 tum ad summam manum. Neruorum exortus ab occipitio
 Nerui. vsque ad spinam, ad coxendicem, in pudenda, in femora, pe-
 des, tibias, in manus. Alij in brachia, partim in carnes, par-
 tim ad fibulam, in magnum digitum, partim ex carnibus in
 alios digitos. Alij ad scapulas, pectus, ventrem, ossa, ligamen-
 ta. A pudendo verò ad princeps intestinum ac podicem, ace-
 tabula coxarū, partim suprā femur, partim infrā ad genua.
 Inde alius ad genu extentus ad tendinem, pernam, pedes, F
 alius ad fibulam, alius in rhenes. Ipsæ porrò venæ in vtran-
 que partē bifariam maximè finduntur, partim ab vna vtri-
 usq; rhenis parte, partim ab altera: & perforatæ sunt in rhe-
 nes. Habent autem cordis formam ipsi rhenes. Nam etiam
 ipsi ventriculos habent. At verò Rhen cauiam sui partem ad
 venas magnas habens situs est. Vnde enascuntur ex ipso ve-
 næ in vesicam, qua parte potus trahitur per venas in rhenes,
 & per ipsa intestina per quæ procedit. Deinde verò velut per
 qualum, per rhenes aqua percolatur. Spongiforme enim est
 ipsorum corpus ad vesicam, & hic percolatur ac secernitur
 à sanguine vrina, quapropter etiā rubra existit. Neq; enim
 Vrina qua- in rhenes aliæ procedunt venæ quàm quæ dictæ sunt, neque
 re rubeat. est alius locus vbi potus colliquefcet, quantum ego noui.
 Venæ co- Venæ circa costas tendentes, subter vnāquāq; costam
 sunt,

A sunt, non à capite, inferius etiam ab arteria. Arteria quidem Starum.
 igitur subtermeans in costas distribuit. A crassa verò vena à Vena co-
 corde recurrit vna in sinistram partem inclusa. Deinde hæc dis.
 quidem per medias vertebrae vsq; ad summas costas meat,
 non ex æquo distribuens costis à dextris ac sinistris ramos ac
 segmenta sua. Alia verò æquos quidem, verum supernè in Venarū d-
 dextris finditur. Cæterum iuxta vtranque claviculam duæ gestio.
 venæ sursum, duæ sub pectus, partim ad dextras, partim ad
 sinistras, ramos siue segmenta, spargunt, illæ quidem magis
 ad ceruicē, duæ verò alteræ magis ad cor, partim ad dextras,
 partim ad sinistras, ab vtraque parte iuxta costas, & sub ipsis
 velut inferiores scinduntur, donec recurrenti infernè à cor- Arteria.
 de commiscuntur. At verò sanguiflua vena ab arteria hac,
 propterea finditur, quòd sublimis hic est per cor means. In-
 frà verò costas vena sanguiflua crassa appellata, verticulis
 rursus seipsam ingerit, & hic adhæret, & non ampliùs pen-
 det, velut supernè per hepar means. Est autè iuxta lumbum
 quidem supernè arteria, infrà autem sanguiflua, ab hepate
 per septum transuersum sublimis veniens, & ad dextrā cor-
 dis fertur vsque ad claviculas simplex, præter quàm quan-
 tum cum corde communicat, iuxta vasa quidè in ipso ma-
 gis in superficie fissa, verum iuxta vasa in ventriculo cordis
 penetrans, postea à corde ad sinistram se demittit, & simplex
 ad spinam rursus currit, ad superna quidem corporis vsque
 ad supremas costas, & ramos à seipsa habet iuxta vnam-
C quamque costam extentos iuxta naturam vsque ad pectoris
 commissuram, & in sinistrā, & in dextrā, & rectitudo ipsius
 magis ad verticulum est, quàm arteriæ extensio, itémque
 venæ ab hepate venientis. Ad inferiorem verò cordis par- Tenor arte-
 tem, recta extensio ab ipsa magis ad verticulum est, quàm ar- riæ & cor-
 teriæ extensio altera, quæ iuxta cor & in infernas partes se- dis.
 pti transuersi ad spinam appensas conuersa est. Inde verò ra-
 mi in vnamquamque rectitudinē inferuntur, per ossa & car-
 nes mutuò transeunt. At verò venæ crassæ sic habent. Ex
 oculo iuxta supercilium per dorsum iuxta pulmonē sub pe-
 ctore, altera ex dextra in sinistrā, altera ex sinistra in dextrā
 transit, & quæ quidè ex sinistra venit, per hepar in rhenem
 ac testiculum descendit. Quæ verò ex dextra, in splenem &
 rhenem ac testem, his autem osculum est ipsum pudendum.

Hippocratis Liber

A dextra verò mamma in sinistram coxendicem, & in crus D
descendit, & rursus à sinistra in dextrā. Oculus verò dexter,
ex sinistro venam fuscipit, itémque testiculus. Iuxta eūdem

Venarum modum rursus sinister ex dextro. Crassissimæ porrò venæ
quatuor pa in hunc modum se habent. Quatuor paria sunt in corpore.

Venarum & aliqua quidem ex ipsis, à capite retrò per ceruicem foris
descensus. iuxta spinam ab vtraque parte ad coxendices perueniunt, &
ad crura, deinde per tibiae ad malleolorum partes externas,

Secundæ. ac in pedes procedunt. Oportet igitur venæ sectiones in
doloribus in dorso, ac in coxëdicibus, à poplitibus facere &
à malleolis forinsecus. Alteræ verò venæ ex capite iuxta au-
res per ceruicem, sphagitides, id est iugulares appellatæ, in-
trinfecus iuxta spinam, ab vtraque parte iuxta lumbos pro-
cedunt in testes, & in femora, & per poplites ab interna par-
te, Deinde per tibiae ad malleolos intrinfecus, & ad pedes.

Oportet igitur venæ sectiones facere ad dolores lumbo-
Tertiæ. rum ac testium, à poplitibus ac malleolis intrinfecus. Ter-
tiæ venæ ex temporibus per ceruicem in scapulas procedūt.
deinde in pulmonem deferuntur. & perueniunt altera qui-
dem à dextris in sinistras sub mammam, in splenē & in rhe-
nem. Altera verò à sinistris in dextras ex pulmone sub mam-

Quartæ. mam in hepar & in rhenem, desinunt autē ambæ hæ in inte-
stinum rectum ac podicem. Quartæ autē venæ ab anteriore
capitis parte ac oculis, sub ceruicem & sub clauiculas proce-
dunt. Deinde à brachiis supernè sub curuaturas, postea per
cubitos, ad manuum iuncturas ac digitos. Postea rursus à di-
gitis, per manuū pectora, hoc est volas, & per cubitos in cur-
uaturas, & per brachiorum infernam partē ad alas, & ex co-
stis supernè, altera quidem in splenē procedit, altera in he-
par, deinde suprā ventrem ambæ in pudendum desinunt. Et

Venæ aliæ crassæ quidem venæ hoc modo se habent. Sunt autem & à
ex his ma- ventre venæ per corpus multæ & omnigenæ, per quas ali-
nantes. mentum corpori venit, procedunt autem & à crassis venis

in ventrem ac reliquū corpus, & ab extremis, & ab intimis,
& inter se mutuò distribuunt, internæ foras, externæ intro.
Venæ igitur sectiones facere oportet iuxta hos modos. Ope-
sanguinis ramque dare oportet, vt quàm longissimè à locis, vbi dolo-
mittendi ra res fieri solent ac sanguis colligi, secemus. Sic enim minimè
tio. mutatio magna de repente fiet, & consuetudinem transtul-
leris,

- A** leris, vt ne amplius in eundem locum colligatur. Cæterùm Hepatitis vena in lumbo vique ad magnum verticulum, in-
 ferne etiam verticulis se ingerit, inde sublimis eleuata per
 hepar, & per septum transuersum in cor: & hæc quidẽ recta
 ad clauiculas procedit. Inde verò aliæ quidẽ ad collum, aliæ
 ad scapulas, aliæ deorsum reflexæ iuxta verticula ac costas
 declinant, à sinistris quidem vna prope clauiculas, ex dextris
 autem in quendã ipsarum locum. Alia verò vtrinque defle-
 xa. Alia paulò inferius deflexa, vbi illa quidem deficit, costis
 se ingerit, donec ad venam in ipsum cor accesserit ad fini-
 stras deflexa. Infra autem decurruata ad vertebrae descendit
 donec perueniat, & inde incipit eleuari, ingerens se costis re-
 liquis omnibus, & hinc atq; hinc ramos iuxta singulas spar-
 gens quum vna existat, à corde quidem in locum quendã in
 sinistris magis existens, deinde infra arteriam, donec consu-
 matur & perueniat eò, vbi hepatitis eleuata est, priusquam
 autem eo venit, iuxta extremas duas costas bifida fit & alte-
 ra pars hinc, altera inde ad vertebrae progressa consumitur.
 Altera verò recta à corde ad clauiculas tendens, supra arte-
 riam est, & ab hac (quemadmodũ & ea quæ iuxta lumbum
 infra arteriam est) in hepar exilit, partim in portas, & extre-
 mitatem, partim in reliquum consequenter procedit paulò
 infra septum transuersum. Septum autem transuersum he-
 pati adnatũ est, vt nõ facile separari possit. Duplices autem
 venæ à clauiculis, alteræ hinc, alteræ inde, sub pectus ad pu-
 bem ac pectinem tendunt, quò verò inde, nondum noui. Se-
 ptum verò transuersum iuxta verticulum infra costas, ea
 parte qua rhen ex arteria confurgit. Arteriæ verò ex rhene
 oriuntur, hinc & hinc ab arteria neruum habentes. Et hac
 parte in recurrẽte à corde hepatitis desinit. Ab hepatide ve-
 rò per septum transuersum maximæ duæ, altera hinc, alte-
 ra inde sublimes feruntur. Multifidæ autem per septum
 sunt, & circum ipsum innascuntur. Verũ supra septum hæ
 magis conspicuæ sunt. Duo autẽ crassi nerui, à cerebro sub
 os magni verticuli supernè, & magis ad gulam, ab vtraque
 arteriæ parte vterque progrediens, inter se committuntur,
 vt vni similes existant, Deinde verticula ad septum trans-
 uersum hic sunt vbi desinunt. Et quidam dubij, ad hepar &
 splenem ab hac societate tendere ipsos putauerunt. Alius

Hepatis ve
na.Venarũ di-
stributio va-
ria.

Arteria.

Nerui à ce-
rebro.

neruus vtrinque ex verticulis iuxta claviculā ad spinam tendit, ex obliquo verticulorum, & se in costas ingerit: atque hi quemadmodum venæ per septum transversum ad mesenterium mihi tendere videntur. vbi autem hæc deficiunt, rursus hinc vbi septum exoritur, ab eo continui ac coherentes existentes, iuxta medium infra arteriā, de cætero ad verticula se ingerunt quemadmodū venæ, donec totū sacrum os pergressi consumuntur. Ossa corpori stabilitatem, & rectitudinem, ac speciem exhibent. Nerui flexionem & contractionem ac distentionem. Carnes & cutis omnium colligationem ac constructionem. Venæ per corpus diffusæ spiritum & fluxum ac motum exhibent, ab vna multæ germinantes. E

Quid ossa, nerui, caro, cutis, venæ corpori præstent.

Vena capitis.

Capitis venæ quadripartitæ.

Vena sub lingua.

Pellicula spumosa.

Mammarū vena.

atque hæc vna vnde oriatur, & vbi desinat, non scio, Circulo enim factō principium nō inuenitur. Cæterum rami ac germina ipsius vnde pendeant, & qua parte corporis desinant, & quod vna his consentit, & in quibus locis corporis extentæ sunt, ego declarabo. Circa caput iuxta medium ex obliquo circumscripta est vena lata & tenuis, non multi sanguinis, In cerebrum enim iuxta commissuras multæ tenues venulæ radices egerunt, & circum totum caput extentæ sunt, vsq; ad frontem ac tempora. Ipsa autē in rectum extenditur retro caput forinsecus iuxta spinæ cutem, inde verò circa externam ac internam venam ex his quæ in iugulis sunt, demittitur. Ultra aures autem subsissa à gena forinsecus tendit crassa. Ab hac in linguam multæ & tenues procedunt, F excepta ea quæ sub linguam & sub maxillares dentes fertur. Ipsa autem crassa per claviculam descendit sub scapulas: & hac parte ab ipsa germinat per neruum subter summā humeri partē siue cuticulam, Vena humeralis appellata. Ipsa autem sanguiflua est & sanguine plena, & agrè curatur, si rumpatur aut cōuellatur. Ab altera enim parte neruus latus ipsam ambit, ab altera chartilago, medium verò locum ipsa tenet, & pellicula spumosa. Quum igitur locus nō sit carnosus, facile rumpitur, & carnem circum nasci nō contingit. & si sanguis in hanc partem subtercurrat, nactus spaciosum locum non discedit, sed induratur. Induratus autem morbum & dolorem exhibet. Atque hæc quidem finit vbi prius dixi. Illa verò sub scapulas germina emittit sub mammæ densarum & tenuium ac variè implicatarum inter se venularum, & per

A & per humeralem venam, prætergrediens chartilaginem, ipsam subter subattingens ad brachium tendit, musculū in sinistra habēs. Dextra autem ipsa finditur circa humerum, & cubiti supernā partem. Inde verò cubitum vtrunque penetrans, postea manus iuncturā, inde autem defluens per totam manum variè vagans radices agit. Cæterum principalis vena iuxta spinā sparsa, per dorsum, & iugulum, ac guttur, in cor inferitur, & de se ipsa venam magnam multorum osculorum in corde producit, inde verò in os procedens fistulam facit, quæ sanè arteria appellatur, per pulmonem transiens, pauci sanguinis ac multi spiritus existens. Propter spaciositatem enim ac raritatē visceris, multis locis per pulmonē deriuatur, cætera verò chartilaginosa facta est. Quapropter sanè etiā si quid in has vias pulmonis delatum fuerit ex insuetis, vel in potu, vel in spiritus ac sanguinis trāsitu, vtpote venis talibus existentibus, & viscere spongiformi, ac multum humorem suscipere potente, & fursum procedente: tum humorum ingressorum lex constituta est, tum sanguis amplius per has venas nō multus cōtinetur, neque multum constringitur, & non cito procedens, illabentia non educit. Ipsi autem nō subductis, sed intus manentibus, callosa con- crescit duricies. Sic autē destruitur alimenti accessio ac ingestio, quum hac parte arteriæ capitis accessus ad externas partes existat. Interceptis verò transitibus per callosam duriciem, velocitas ac difficultas spirādi oboritur, quum neq; emittere neque attrahere spiritum facilè possint. Ex huius- modi autem tales morbi fiunt, velut sunt anhelationes, & tabes sicca. Si verò humor amplior in ipsis cōsistens prævaluerit, vt crassefactus spissari non possit, & pulmonem putrem facit, & vicinas ipsi partes, fiuntq; suppurati ac tabidi. Fiunt autem hi morbi etiam ob alias causas. Inde porrò hæc vena que pulmonem occupat, & per extremitates duas magnas intro conuersas, sub septum transuersum extenta est ad spinā, alba ac nervosa, venulas per reliquum condensatum corpus spargens. hinc autem per verticula densis venulis in spinalem medullam inferitur, ac instar hederæ implicatur. Et aliæ quidē venæ in corpus distributæ ex omnibus partibus ad spinam tendentes, vnaquæque quod tenuissimum ac fin- cerissimum est colligens hic eructat. Hæc verò velut præ-

Vena prin-
cipalis.Arteria
magna.ταχυπνοια
δυσπνοια.
Tabes sic-
ca.Vena que
pulmonem
petit.

Hippocratis Liber

ses imposita per demissas plicationes in idem cogit. Inde D
verò etiam in rhenes radices agit, tenuibus ac fibrosis venu-
lis iuxta spuriam costam: hinc autem tendens condensatur,
posteaque etiam nervosa fit ad princeps intestinum ac podi-
cem, cōprimensque musculos adstrictorios ipsi inseritur. In
vesicam etiam, & testes, ac adstites radices agit, multiplici-
bus implicatis tenuibusque ac solidis & fibrosis venis. Inde
verò crassissima ac rectilissima ipsius pars rursus conuersa in
caulem transit, hoc est pudendum. In reflexu autem in illa
ipsa adaptatur. Et per pectinem supra subter cutem ventris
& ipsius venæ, procedunt venæ ad eas quæ deorsum tendunt,
quæ in seipsas mutuo deriuantur. Penetrant autem & per
pudendum venæ crassæ, & tenues, & densæ, & curvæ. At ve- E
rò in fœminis illa ipsa in vteros tendit, & in vesicam ac vri-
næ meatum. hinc autē recta procedit, & mulieribus quidem
circa vteros pendet, masculis verò circa testes disseminatur.
Ob hanc autem naturam ipsa vena etiam plurima fœcunda
ac genitalia concipit. A plurimis enim ac sincerissimis par-
tibus cōnutrita, paucique sanguinis existens ac caua, & den-
sa instar nerui, ac spiritu referta, intentaque à pudendo, de-
missas ad spinā venulas cogit: hæ verò velut cucurbita me-
dicinali in seipsas coactæ, omnia in supernam venam emit-
tunt. Confluit autem & ex aliis corporis partibus in hanc,
Verum multo maxima pars velut dictum est, de medulla
hac colligitur. Voluptas verò accedit, vena hac genitura
quæ fiat. expleta, Quum igitur soleat reliquo tempore modici san- F
guinis ac multi spiritus esse, repleta & calfacta & semine
deorsum confluyente, ea quæ in seipsa habet constringit. Spi-
ritus autem in ipsa existens, & præsens violentia, & calidi-
tas, & venarum vndiquaque concitatio, titillationem indu-
cit. Illa autē quæ à seipsa germinauit, per dorsum & iugu-
lum iuxta spinam sparsa, multis venulis costas intertexit, &
verticula per carnes alternatim condensat, vt & probe nutri-
ta & sanguine plena existat. Ipsa autē iuxta coxendicem ac
nates meat, per musculum sub fœmore submersa, à natibus
verò iuxta acetabulū femoris iuxta caput in venam perfo-
rata est, quæ femori respirationē exhibet, trans femur autē
iuxta flexurā ad genu. Alteram verò iuxta inguina demit-
tit frequentibus radicibus, & ægrè transcuntem. Hæc ve-
rò per

Vena ner-
uus fit.

Caulis pu-
dendorum.
Pecten.

Fœminis
quæ distri-
buantur ve-
næ hæ.

Voluptas
coeuntibus
quæ fiat.

Venarū di-
uersa distri-
butio.

A rò per musculum tendens, & circa genu dissenninatur, & per ossis tibialis summitatem venam de se in fistulã cauat, quæ medullam nutrit, & deriuatur per infimam tibiã, iuxta pedis illigationem ac cõnexionem. Ipsa autem per patellam genu ad interna per tibiæ musculum submersa extenditur, & per malleolum implicatur, intus crassã & sanguine plena, atque hic circa malleolum, & tendinem, venas agrè cognobiles producit ac inuoluit. Ipsa verò infrà ad pedẽ, sub summum pedem decurrit, & hic se implectens, & in magnum digitum innitens, duplam sanguine refertam venam supernè sub cutem ex summo pede reflectit, & apparet sanè crassefacta iuxta externam malleoli partẽ, ac sursum spargitur iuxta oppositum tibiæ radium. Iuxta suram autem velut fundam facit. Inde extenditur iuxta internam genu partem. Immittit etiam patellæ venas, & iuxta internam patellæ partem quæ caua est, venam implicat, quam si quis doleat, celerrimè biliosum seorsum ac saniosum humorem colligit. procedit autem ipsa iuxta internam genu cavitatem. Distribuit etiam de se in poplites multas implicatas venas, Quæ inde tendentes iuxta neruos sub femore, radices agunt in testes, & in rectum intestinum ac podicem, & circa os sacrum attenuatæ vnitæ circuntenduntur. Illa verò procedens iuxta internam genu cavitatem, sursum iuxta internam femoris partem, in inguen transit, & per coxendicem vltra ad spinam & lumbum foras veniens, crassã & lata ac sanguine plena sursum porrigitur ad hepar, & vbi bifidam produxit sanguine refertam venam, dextram hepatis extremitatem, ad rhenem occupat, Rursus verò subter hepar dispersa in venam crassam finditur. Fissa verò in crassitudinem hepatis inseritur, & altera quidem ipsius pars in superficie visceris extat, in qua etiam est fel, habetque multas radices instar cirrorum ac plicationũ per hepar dispersas. altera verò pars per internas ipsius partes deriuatur.

Dux autem venæ inter duas latas extremitates explicantur, & vna quidem per vertices ac cutem penetrãs ex vmbilico effertur. Altera verò premens spinam, in rhenem, ac vesicam, & pudendum, velut ancoris iactis inseritur. Verum ex coxendice incipiens ascendere ad pubem. multas vagabundas producit venas, & costas ac verticula ad spinam illigat, & propa

Vena quæ
de sinistris
dextra ten-
dit.

Lien.

Sensus cor-
poris to-
tius cur in
pectore.

& propagines suas multipliciter per venas transmittit, & in-
testina ac ventrem inuoluit. Et aliæ quidem à pube ad mam-
mas, & suprâ mentum, & summos humeros exporrecte diu-
gantur. Alia verò procedēs iuxta crassitudinem hepatis, vbi
fel in fistulam coegit, sursum sub spinam dispergitur, per se-
ptum transuersum itinere facto. Ceterum vena ex sinistris
partibus, in reliquis quidem iuxta eandem naturam, velut
ea quæ in dextris, radices agit. Verum ex sinistris emergens
in hepar non se ingerit, sed in splenem inseritur, iuxta caput
quod in crassitudine ipsius consistit. Inde verò internas sple-
nis partes subit, ipsasque venulis sanguinolentis instar ara-
nearum telæ intertextit. Hic verò totus ex omento eleuatur,
venulis ex seipso sanguine plenum ipsum reddens. Quæ ve-
rò à capite splenis ad spinam accedunt, per septum transuer-
sum penetrât. Inde verò sursum & dextra & sinistra sub pul-
monem extenduntur. Quæ autem sanguine plenæ sunt, sub
ipsum & in ipsum corriuantur. Quæ verò pauci sanguinis
& tenues à pulmone intrinsecus procedentes, qui natura ra-
rus existit, utpote ab ipso emulctæ, in cor frenantur circa au-
riculas ipsius, & in cavitates internas diffuunt. Ingerunt au-
tem & priores in ipsum. Etenim in angustia transitus situm
est, velut ex omni corpore habenas habens. Quapropter ex
omni corpore maximè circa thoracem sensus existit.

Colorum quoque mutationes corde adstringente
venas ac laxante fiunt. Laxante quidem igitur
rubicundi colores fiunt, & bene colorati
ac pellucidi, constringente verò, vi-
rides cum pallore & liuidi. Ve-
rùm tales euariant iuxta
presentes in vno-
quoque co-
lores.

H I P

71 A H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE LOCIS

IN HOMINE, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER-

PRETE.

*



M I H I quidem videtur principium corporis nullū esse, sed omnia similiter principium, & omnia finis. Circulo enim scripto principium non reperitur. Similiter etiam morborū in toto corpore. Quod enim siccus est, morbos magis recipere, ac magis dolere, à natura solet. Humidum verò minus. Morbus enim, qui in

Membra
hominis
qualia.

Corpus sic-
cum magis
morbo ob-
noxium,
quàm hu-
midum.

siccus est, stabilitur & non cessat. Qui verò in humido, diffuit, & aliàs aliam corporis partē occupat, & semper transfugiens requiem facit, & citius quoque sedatur, utpote non stabilitus. Corporis autem singulæ partes altera alteri, ubi hinc aut illinc processerit, morbū statim facit, venter capiti, caput carnibus ac ventri, & reliquæ omnes iuxta eandem rationem, quemadmodum venter capiti, & caput carnibus ac ventri. Etenim quum venter egestionem moderatam non fecerit, & in ipsum cibus ingeratur, humiditate ciborum ingestorum corpus irrigat. Ipsa autē humiditas à ventre obstructa, acervatim ad caput viā facit, & ubi ad caput peruenerit, à vasis in capite non recepta, fluit quocunque contigerit, & circum circa caput, & in cerebrum per os tenue, & partim quidem os ipsum subit, partim verò circū cerebrum per os tenue. Et si quidem in ventrē rursus peruenerit, ventri morbum inducit. Si verò ad aliam aliquam partē incubuerit, illi ipsi morbum facit. Ita etiā reliquæ partes altera alteri morbum inducit, & optimum fuerit sic curare ægrotas per has quæ morbos faciūt. Sic enim quàm optimè principiū ægro-
tantis

Corpus quale. tantis quis sanauerit. Corpus porro ipsum sibiipſi idem ac D simile est, & ex iisdem compositum est. Similiter autem ha-

bet & paruas & magnas partes, itémq; infernas ac supernas. Et si quis minimam corporis partem acceptam male affice-
ven. re velit, totum corpus affectionem sentiet, qualiscunque tan-
ven. dem ea fuerit: propterea quod minima corporis pars omnia
 habet quaecunque & maxima. Insuper quicquid tandem mi-
 nima pars pertulerit, ad gentilitatem refert ac tráſfert, vna-
 queque ad sua, siue bonum siue malum id fuerit. & propter-
 ea corpus & dolet, & lætatur, cum minima gente, quia in mi-
 nima omnes insunt partes, & hæ ad gentiles sibiipſis singula

Corpus ha- tráſſerunt, & omnia denuntiant. Caterum natura corpo-
manu me- ris, principium sermonis in arte medica, primùm perforata E
dicimur est qua parte audimus. Etenim vacua circum circa aures,
mat- non aliud inaudiunt quàm strepitum & clamorẽ, Quicquid
ria est. autem per membranam in cerebrũ peruenerit, id liquido &
Auditus. clare auditur. Ob id etiam foramen solùm per membranam

Narium circum cerebrum extentam est, In nares autem non inest fo-
qualitas. ramen, verùm mollis laxitas velut spongia, & propterea per
Odoratus. longiorem distantiam audit quàm olfacit, odor enim ab ol-
 factu longè dispergitur. Et in oculos venulæ tenues ad vi-
 sum ex cerebro per ambientem membranam feruntur. Hæ

Visus quo autem venulæ visum alunt humore de cerebro purissimo,
pascatur. qui etiam in oculis apparet. Eadem venæ etiam visum ex-

Tres ocu- tinguunt, vbi fuerint reficcatae. Membranæ autem tres sunt
lorum tu- quæ oculos custodiunt. Superna quidem crassior, media te- F
niculæ. nuior, tertia tenuis, quæ humorem conseruat. Ex his super-
 na & crassissima si lædatur ac mutiletur morbos facit. Me-
 dia verò etiam ipsa periculosa est, & vbi rupta fuerit promi-
 net foras, velut vesica. Tertia autem tenuissima omnino pe-

Cerebri riculosa est, quæ humorem conseruat. Membranæ cerebri
duæ mem- duæ sunt, altera superna crassior, altera tenuis cerebrum at-
branæ. tingens, non ampliùs eadem permanens, postquàm fuerit

Venulæ ca- vulnerata. Venæ autem transeunt ad verticem per carnem
pitis. venientes ad ossiculum, feruntur & per carnem duæ ex ver-
 tice rectæ, qua parte supercilia clauduntur, & desinunt ad
 angulos oculorum. Vna autem à vertice ad nasum fertur, &
 in vtranque nasi cartilaginem finditur. Aliæ verò duæ ve-
 næ iuxta tempora feruntur, in medio temporum & aurium,
 quæ

A quæ premunt oculos, & semper pulsant. Solæ enim hæ ex venis sanguine non rigantur, sed auertitur ex ipsis sanguis. Qui autem auertitur influenti occurrit, & qui quidem auertitur volens discedere, qui verò supernè influit volens infrà procedere, hic impelluntur ac diffunduntur ac mutuò circūagitantur, & pulsus venis exhibent. Visus humore de cerebro nutritur, quum autem quid eius de venis acceperit, fluxione turbatur, & humor ipse nō apparet, & ob oculos moueri ipsi videntur aliquando velut auicularum imagines, aliquando velut lentes nigræ, & nihil exactè iuxta rei veritatem videre potest. Aliæ duæ venæ in medio aurium & aliarum venarum, quæ feruntur ad aures, & premunt aures. Aliæ duæ venæ ex ossis conuersione in aures feruntur. Quædam verò infrà ad corpus conuertuntur: duæ quidem venæ iuxta tendines colli feruntur & iuxta verticula, & desinunt in rhenes, hæ autem etiam in testes penetrant, & quum hæ affectæ fuerint homo sanguinem mingit. Aliæ duæ venæ à vertice ad humeros feruntur, & sanè humerales vocantur. Aliæ duæ venæ à vertice iuxta aures, ab anteriore colli parte vtrique ad cauam appellatam venam feruntur. Caua autem vena finitur quidem velut gula, consistit autem inter gulam & guttur siue arteriam, ferturque per septum transuersum & per cor, & inter septum, & finditur ad inguina, & ad femora intro, & disparationes in femoribus facit, & ad tibiae intus fertur ad malleolos. Hæ & infœcundum faciunt hominem, quum fuerint sectæ, & in magnos digitos desinunt. Ex caua autem vena producit quædam in sinistram manum, fertur autem subter splenem ad sinistri lateris mollitudinem, vnde splen propagatur, per omentum, & finem sortitur ad thoracem. Producit autem iuxta septum, & cum humerali committitur subter cubiti articulum: atque hæc splenis gratia secatur. Alia etiam ad dextram manum eodem modo à caua producit. Communicant autem omnes venæ, & confluunt inter se mutuò, & aliæ quidem sibi ipsis per se committuntur ac coincidunt, aliæ verò per venulas à venis extentas. Quæ autem carnes nutriunt, ea parte inter se confluunt. Et quicūq; morbus à venis oritur leuior est quàm qui à neruis: diffluit enim vnà cū humore qui in venis inest, & non quiescit. Et natura venis in humore est, in carnibus. Nerui autem sicci

Quæ imagunculas præ oculis cursitantes creant.

Venarum digestio.

Neruorum qualitas.

ficci sunt, & ventriculos siue cavitates non habent, & ad ossa consistunt, & maxima ex parte ab ossibus nutriuntur. Nutriuntur & à carnibus, & valorem ac robur inter ossa ac carnem medium habent: & humidiores quidem sunt ac carniores quàm ossa, sicciores autem ac magis ossei quàm carnes. Quicumque autem morbus in ipsos peruenerit, roboratur & quiescit in eodem loco, & difficile est ipsum educere. Maxime verò impetunt ipsos distentiones, & alij morbi, à quibus tremor corpus occupat, & qui temerè ipsum faciunt. Nerui autem premunt articulos, extentique sunt per totum corpus. Robusti autem maxime & semper crassissimi sunt in illis corporis partibus, in quibus paucissimæ carnes sunt.

Nerui ubi
non sunt.
Capitis suturæ.

Et corpus quidem omne neruis plenum est. Verùm circa faciem & caput non sunt nerui, sed fibræ consimiles neruis, inter ossa & carnes, tenuiores & solidiores. Capita suturas habent, alia tres, alia quatuor, & quæ quidem quatuor habent, his sunt vtrunque iuxta aures, & tertia ab anteriore, quarta à posteriore capitis parte. Sic quidem in capite quòd quatuor habet, in eo verò quòd tres, iuxta aures vtrunque sunt, & ab anteriore parte tertia. Posteriore verò parte sutura nulla est, velut in eo quòd quatuor habet. Saniores autem capite

Supercilia.
Mandibulæ.

sunt, qui plures suturas habent. Inter supercilia os descendit ac tranlit, & mandibularum clausura in medio mento, & supernè ad caput est. Verticula alij plura, alij pauciora habent. Qui pauciora habent, his duodeuiginti sunt. horum

Costæ.

alia sursum ad caput, alia deorsum ad sedem tendunt. Costæ septem à posteriore corporis parte, ad verticula connectuntur, anteriore parte in pectore inter se committuntur. Clauiculæ articulos habent, alios in medio pectoris iuxta guttur, atque hic coarticulatæ sunt, alios verò ad humeros, reclinatos ad scapulas, qui humeris semper adhærent. Scapulæ verò ad membra brachij siue totius manus coarticulantur, incumbentes in ipsum os quòd in membro est. Iuxta os autem appendices duæ prodeunt, altera intrinsecus, altera forinsecus, quæ ad scapulas ossi adnascens, infra coarticulatæ sunt. Quæ verò in cubiti flexura sunt, infra quidem radio coarticulatæ sunt, iuxta os natura cauum existens, supra autem radium paululum, in cubiti gibbum, & tunc tum os, tum radius in idem commissæ, articulum in cubiti gibbo faciunt.

Clauiculæ
pectoris.

scapulæ.

Appendices.

Iuxta

A Iuxta vlnam verò appendices prodeunt tenues valde quatuor, duæ sursum, duæ deorsum, & ad cubiti gibbum quidē duæ appendices consistentes, suprà ex osse hærent, hæc cum osse cohærentes, iuxta ossis articulum in cubiti gibbum coarticulatur. Quæ verò infrà sitæ sunt, & intus reclinatæ, hæc utraq; committuntur ad radius ex supernis à mēbro procedentem, & intus ad membrum coarticulantur, & radius appellatum faciunt hæc sibiipsis intus in cubito commissæ. Infra autem ad manum os articulum habet. Appendices verò hac parte teneræ existentes, duæ quidē non exeunt in articulum. Superna autem & inferna, cum osse coarticulantur ad manū. Cæterum manus articulos multos habent. Quæ
B cunque enim ossa inter se committuntur, omnia articulos faciunt. Digiti articulos habent multos, unusquisq; tres. Vnū ad vnguē, in medio vnguis & nodosa prominentiæ, alterum in ipsa nodosa prominentia, qua parte etiam digitos conflectunt. Tertium qua parte digitus à manu exoritur. At verò in coxendicibus articuli duo sunt, quæ acetabula appellatur, & femora in hos inarticulata sunt. Iuxta femora autem appendices duæ protenduntur, altera intus, altera foris, & in articulum neutra procedit, neq; ab altera parte, sed ad os ad femur inseruntur. Femur autem supernè ubi in acetabulum ingruit, bifidum est huiusmodi bicipitate. In ea quidem parte quæ intrò inclinata est, in summitate rotundum est ac leue, quæ etiam in acetabulum ingreditur. Altera autem bicipitatis pars exterior, magis foras prominet, & inferius apparet ad nares, & coxendix appellatur. Ad genu verò os femoris taliter biceps est. Bicipitio autem huic os tibia appellata, velut in cardine adaptatum est, suprà adaptatum autem Mola siue patella incumbit, quæ humiditatem à carne in articulum expassum descēdere prohibet. Iuxta tibiam autem appendices duæ procedunt, quæ infernè ad malleolos pedis finiunt, supernè ad genu, non autem perueniunt ad articulū.
C Ad pedē verò tibia iuxta malleolos articulū habet, & aliū pedum ar-
 infra malleolos. Et in pedibus articuli multi quemadmodū
 & in manibus sunt. Quot enim ossa, tot sunt articuli, & in digitis pedum eodem numero sunt, ac pari modo habent. Articuli insuper multi in corpore parui sunt, nō similiter omnibus, sed alij aliis. Hi autē qui scripti hic sunt, omnibus simili-
 k liter

Appēdices
quatuor.

Manus ar-
ticuli.
Digiti,

Coxēdices.

Femur.

Genu.
Tibia.

pedum ar-
ticuli.

liter habent. Aliæ etiam venæ aliis sunt, sed non memora- **D**
Mucus. biles. Mucus omnibus à natura est, & cum hic purus fuerit .
 articuli sani sunt, & bene moueri possunt, utpote lubrici in-
 ter seipsos. Labor autem & dolor fit, ubi à carne humiditas
 fluxerit vitiosa, Primum enim articulus stabilitur, Nō enim
 lubrica est humiditas quæ de carne influxit. Deinde ut mul-
 ta, & valde sparsa, & ex carne nō irrigata, semper resiccatur.
 & ut multa existens, & articulo ipsam non capiente, effluit:
 & malè stabilita eleuat neruos, quibus articulus colligatur,
 ipsosque inconnexos ac dissolutos facit. & propterea claudi
 fiunt, quum hoc magis sit, magis: quum minus, minus. in ven
 trem porrò ea quæ comeduntur ac bibuntur procedunt. Ex **E**
 ventre autem. fibræ in vesicam, qua parte humorem percol-
 lat, extentæ sunt. Fluxiones autem, & perfrigerata valde
 carne, & percalfacta fiunt, ac superinflammata. Fluxiones
 propter frigus fiunt, quum caro in capite, & venæ tensæ fue-
 rint, Hæ enim horrente carne, & ad angustias perueniente,
 adstrictæq; ac excludēte, humiditatem exprimunt. Et simul
 carnes ipsæ contra exprimunt, ad angustias peruenientes: &
 capilli sursum erecti fiunt, utpote simul vndiquaque fortiter
 compressi. Quicquid igitur inde expressum fuerit, id ipsum
 quocunque contigerit fluit. Fluit autem etiam propter ca-
 liditatem, quum carnes rarefactæ transitus præbuerint, &
 humor calefactus tenuior redditus fuerit. Omnis enim hu-
 mor calefactus tenuior fit, & omne cedens fluit, Maximè ve-
 rò ubi valde fuerit inflammatum propter hanc fluit causam. **F**
 Carnes valde plenæ factæ quum capere non possint, fluit
 humor qui capi non potuit, fluit autem quocunque contige-
 rit. Vbi verò semel fluidæ factæ fuerint fluxiones, diffuunt
 ad locum quò tandem contigerit, donec transitus fluxionis
 compressi fuerint propter gracilitatem. Quum autem cor-
 pus fuerit resiccatum, & alioqui corpus ipsum sibi ipsi com-
 municans sit, etiam quum siccum est, diducit, & concipit ac
 ducit, vbicunque humor tandem obtigerit: ducere autem
 ipsum non difficile est, utpote corpore vacuo, & non intu-
 mescente, præ gracilitate. Aliquando autem infernæ par-
 tes siccae fiunt, supernæ verò humidæ. Magis autem su-
 perna vasa humida sunt. Venæ enim plures supra sunt quā
 infra, & carnes in capite minori humiditate opus habent.
 Ducit

**Claudica-
tio vnde.
Ventriculi
venulæ
quæ vesicā
petunt.
Fluxiones
frigore ma-
gis fiunt.**

Calore etiā

**Cur supe-
riora hūme-
scant magis.**

- A** Ducit itaque sicca corporis pars humiditatem ex capite, & simul transitus magis ducenti patent, quàm ei quæ ducitur. Nam ipsi transitus, utpote sicci existentes, eam sibi lucrificiunt, & simul humores à natura deorsum procedere solent, si vel modica quædam necessitas contingat. Fluxiones de capite septem sunt, in nares, in aures, in oculos, atque hæc ex capite fluxiones ob oculos conspicuæ existunt. Postquàm autem in thoracem fluxerit præ frigore, bilis fit. Magis autem in thoracem præ frigore fluit, propterea quòd facilis est fluxio ad guttur, utpote non contestum, præ frigore verò à bile infestati propterea lassitudine affliguntur, quia carnes quum bilem habuerint, non quiescunt, sed concutiuntur, & concussæ laborant ac delassantur, utpote velut in itinere faciendi concussæ, & suppurati fiunt quum in thoracem fluxerit, itémque tabidi. Quum verò in medullam fluxio contigerit, tabes occulta ac inconspicua oboritur. Quum autem retrò ad vertebrae, & in carnes defluerit, hydrops fit. Id quod ex hoc cognoscere datur. Sicca enim anteriores partes sunt, caput videlicet, & nares, ac oculi: & oculis amplius hebetudo accedit, fiuntque cum virore pallidi, itémque reliquum corpus, & nihil exurit homo, etiam si multum fluat. Fluxus enim per medià carnem retrò fluens, & ab anteriore auersus, anteriores partes siccās facit, posteriorum verò carnem irrigat, & magis eam quæ intus est ad ventrem, quàm quæ foris est ad nasum. Et propterea corpus foris magis solidum est, quàm intus, & angustiores meatus ac foramina habet. Quare sanè quum tenuia sint foramina, constringuntur, ipsaque sibi ipsis medentur, & fluxus nullus hac transire potest. Intus verò foramina ampliora sunt, & intermedia tenuiora habent, fluxus verò utpote ab altioribus procedens, & tenuia impedimenta contra se habens, influit & carnes humiditate replet. Sed & humiditas à cibis in idem procedens corrumpitur, corrupta autem ipsa præ ammissione, & simul cum ipsa ea quæ à capite defluit, corpus nutriunt. Carnes verò multo humore nutritæ, & morbofo augescētes, hydrope plene sunt. Si autem modicus fluxus fuerit, coxendicum & articularum diuturnam affectionē facit, ubi fluere cessauerit. Nam ut modicus, & undique ab omnibus fortioribus depulsus, ad articulos refugium facit. Fiunt præ-

Septē fluo-
ris descen-
sus.

Biliofi ma-
gis lassitu-
dine affli-
guntur.
Purulenti.
Tabidi.

Hydrops.

Hippocratis Liber

tereà articulorum ac coxëdicum affectiones, à talibus mor- **D**
bis sanatis, quum morbum quidem efficiens sanatur, in car-
ne verò quid relictum fuerit, cui non sit exitus, neque rursus
intrò, neque foras, sed ad cutem egressum tuberculum uti-
que fecerit, fugit autem in id quod cedit, articulos videli-
cet, & aut articulorum, aut coxendicum affectiones inducit.

**Cum nares
tument.**

Si porrò intumuerint nares, & pituita plenæ fuerint, at-
que ea compacta, oportet pituitam compactam ac congela-
tam attenuare aut fomentis, aut medicamento, & non auer-
tere. Si enim fluxus auersus aliò procedet, omnino maiore

**Cum aures
fluxio pe-
tit.**

morbum faciet. Quum verò in aures fluxerit, primùm do-
lorem exhibet, violenter enim procedit: dolorem autem ex-
hibet, donec in fistulam redactus fuerit. Vbi autē fluere con- **E**
fueuerit, non ampliùs dolorem facit. Ei verò quem dolor af-
fligit medicamentū natura calidum, tepidum factum & ne-

**Cucurbitu
la quo loco
in hoc dan-
da.**

topo dilutum, infundendum est, & retrò cucurbita medica
affigenda, si sinistra auris doluerit, ad dextram, sin dextra, ad
sinistram, non autem scarificando pertundere oportet, sed
ut trahat solum sinenda est. Si verò per hæc dolor non sede-

Quæ potio

tur, frigefacientia à natura frigida infundantur, & medica-
mentum potandum præbeatur, quòd secessum deorsum fa-
ciat, sursum autem non, quandoquidem vomitus non auxi-
liatur: & de cætero frigidis vtendum est, & semper non sa-
nāntem variare oportet modum, & si quidem peius reddi-
derit malum, ad contrarium te conuerte, si verò ad sanita-
tem tendat, omnino nihil ab his quæ adhibentur auferre **F**
oportet, neque quicquam aliud addere aut apponere. Si ve-
rò iam in fistulam redactus fuerit, & multa purulēta fanies
fluxerit, quæ graueolens sit, sic facere oportet. Spongiam
ficcante quopiam sicco medicamento imbue, & in aurem
quā penitissimè inde, & in nares purgatoriū medicamen-
tum mitte, quo ea quæ prius in aures fluebant, in nares ferā-
tur, & non id quod morbosum est in caput rursus recedat.

**Cum oculi
fluore ve-
gantur.**

Cæterum vbi in oculos fluxio processerit, oculi inflam-
mantur & tument, Sic autem affectum hominem medica-
mento liquido, sicco inspersili curare oportet. Si verò sta-
tim inflammati fuerint, nihil omnino illine, sed aut fortissi-
mo quā infimè vrito, aut alio quopiam aluum subducēte
medicamento attenuato, vitando ne vomitum facias. Si ve-
rò

A rò velut lapilli subtercurrerint, medicamentũ illines quod plurimam lachrymam ducere potest, & reliquũ corpus humectabis ac tumidum facies, quo oculi humidiores fiant ac colluantur, vt lachrymam adstrictam ac compactam decurrere facias. Quum autẽ in oculos paulatim fluxerit, & pruritum fecerit, sic affectum molli medicamento illines, quod siccare potest. simulq; modicã lachrymam ducere, & ad nares medicamentum adhibebis, aut singulis diebus, aut alternis eodem vtens. Sit autem tale medicamentum, quod non plus quàm acetabulum per nares deducat, idque paulatim: quod verò oculis adhibetur relicet, vt quod oculorum phar-

Profluuiũ
oculorum.

B cum reliccarit ac obstruxerit, id ipsum ad nares feratur.

Medicamenta caput purgantia, quæ quidem fortia sunt, à toto capite ducunt, quæ verò debilia, ab oculis & hinc à vicinis naso partibus. Si autem à carne & osse, mucos inter os & carnem subsistente, fluxus ad oculos fiat, ex hoc manifestum fit quòd inde profluit. Cutis in capite compressa cedit, & vlcera in capite enascuntur, & oculi lachrymantur, & palpebræ nõ exulcerantur, nec mordax est fluxus, nec visum hebetat, sed homo ipse acutius videt. Fluxus enim non est salsus, vtpote non de cerebro, sed magis mucosus. Hunc sic sanare oportet. Medicamento caput purgandum

Medela.

C ueatur. Verum ad ipsos oculos nullum pharmacum adhibendum est. Si verò neque sic sanus fiat, caput secare donec ad os perueneris oportet, nõ superficialibus neque transuersis aut obliquis fissuris inculsis vsquequo ad os ipsum pertigeris, frequenter autẽ secare oportet, vt compactus humor citius prodeat per vlcera effluens, & simul vt frequentes sectiones, extensionem carnis ad os faciant. Sic mederi oportet, si huic hoc modo res succedat. Si verò hæc non com-

Cum ful-
gens oculi

moda fuerint, & fluxus non eluitur, vt elutus acutè cerne-
re faciat, semper ab incumbente oculi magis splendescen-
tes fiunt, & acutus visus hominis extinguatur. Si in visum,
in humorẽ purũ cruentus aliquis humor ingrediatur, huic
visus intra oculum non rotundus esse apparet, propterea
quòd in quocunque inest cruentus humor, id ipsum non ap-

k 3 paret

Hippocratis Liber

Medela.

Tumor oculorum.

Peripneumonia, pleuritidisque, qui differant.

Suppurati.

paret. huic itaque deficit ut visus rotundus appareat, & ante oculos aliqua moveri ipsi videtur, & nihil reuera videt. Huius venas visum prementes exurere oportet, quæ videlicet semper pullant, & inter aurem ac tempora consistunt: & ubi has obturaueris, oculis pharmaca quæ humectant adhibe, & lachrymam quàm plurimam prolecta, quo id quod in oculis compactum est, & morbum facit, eluatur. Si verò oculus rumpatur, mollibus medicamentis & acerbis utendum est, ut vlcus adstrictum in angustum coeat, & cicatrix tenuis fiat. Si autem adhuc humoribus plenus fuerit, lachrymare oculo conducit. At verò quum in thoracem fluxerit, & bilis fuerit, ex hoc manifestum fit. dolor lateris mollitudinem occupat, & claviculam eiusdem partis, & febris adest, & lingua supernè pallida ac viridis fit, & excreat compacta. huius morbi periculum septima aut nona die instat.

Alia bilis. Quum ambo latera doluerint, reliqua autem similia velut in priore fuerint. Hæc quidem peripneumonia est. Illa verò pleuritis. Hæ autem propterea fiunt.

Quum in pulmonem fluxerit ex capite, per guttur, & aortas appellatas appendentes partes pulmonis, pulmo tantum natura rarus & siccus, trahit in se humorem quantum eius capere potest, & ubi influxerit maior fit: & ubi quidem in totum fluxerit, extremitas eius maior reddita utrunque latus contingit, & peripneumoniæ pulmonis appellatum morbum, facit. quum verò alterum tantum, pleuritis id est costalis morbus fit. Peripneumonia multò periculosior est, & dolores multò fortiores sunt, qui ad laterum mollitudinem & ad claviculas tendunt, & lingua multò viridior ac pallidior, & fauces præ fluxione dolent, & lassitudo fortis occupat, & spiritus sexta aut septima die corripit. hunc si non septima die febris dimiserit, moritur aut suffocatur, aut utrunque. Si verò nona die, duabus diebus interpositis, corripiat, ut plurimum etiam hic aut moritur, aut suppuratus euadit. Si verò duodecima die, suppuratus fit. Si quarta & decima, sanus fit. Et quicumque præ peripneumonia aut pleuritide suppurati fiunt, non moriuntur, sed sani fiunt. Suppurati ut plurimum fiunt, quum fluxus in idem velut in bile contingit, sed in bile quidem multum defluit, & ubi defluxit sedatur. Suppuratis verò minus defluit, & non sedatur. Fiunt

- A** Fiunt etiam suppurati, quum minus excreant quàm influit in pulmonem. Hoc enim quod in pulmone cōsistit, & quod influit, pus fit. Pus autē in pulmone & in thorace consistens ac congregatū, vlcerat & putrefacit, & postquam exulcerata fuerint, ab vlcerato influit, & quum excreat caput simul cōcūssum magis fluit, simulq; ex vlcerato in thorace ac pulmone magis fluit, & vlcera agitata refringuntur, vt etiam si fluxus à capite cesset, is qui ab ipsīs vlceribus venit sufficiens sit morbum facere. Fit præterea etiā ab vlcere suppuratus, & leuior hic morbus existit. Fit etiā extra pulmonem, maxime quidem à ruptura, & vbi caro cōtusa fuerit. Iuxta hāc enim pus congregatur, & congregatū fluctuat, si quis corpus concutiat, & strepitum facit, & hæc vruntur. **Tabes.**
- B** fit quum in idem, velut in suppurato, fluxio fit per guttur, & appendentes pulmonis partes, appellatas aortas, quæ pulmonem & guttur cōtinent ac coniungunt. Fluit autē in pulmonem frequenter & paulatim, & humiditatē in pulmone non multā facit. Resiccātū enim id quod influit, & in gutture compactum, vtpote quod nō eluitur, sed paulatim influit ac detinetur, tussim excitat, & in aortis id quod influit detentum, vtpote quum angusta foramina aortæ habeāt, angustum spiritui locū exhibet, & talem spiritū habere facit, qui velut defectus semper respirare concupiscit. Et in pulmone velut nō vehementer humido existente, pruritus contingit. Quum verò multū de capite fluxerit, pruritus in pulmone non fit. Multum enim est quod in ipsum influit, & suppurati ex his tabidis siue plithicis Græcè appellatis fiunt, vbi corpus humectius factum fuerit, & contrā vbi siccus fuerit factum, ex suppuratis tabidi. Suppurati hoc modo cognoscuntur. Lateris mollitudinē à principio dolor occupat. Quum verò iam pus collectum est, & dolor similiter habet, & tussis fit, & pus excreat, & spiritus corripit, Si verò nondum erupit pus, in lateris mollitudine concutitur, & velut in vtriculo strepitum facit. Si verò horū nihil adsit, suppuratus autē sit, ex his cōiectare oportet. Spiritum multum habet, subraucosusque loquitur, & pedes ad gēua intumescunt, magis autē ab ea lateris mollitudinis parte, in quā pus est, & thorax concuruatus est, & membrorū dissolutio fit, & sudor per totum corpus diffluit, & aliquando sibi ipsi videtur calidus esse, aliquando
- Pus intus quid faciat.**

Hippocratis Liber

Tabes spi-
nea.

Pleuritidis
curatio.

Acetū mul-
sum qui-
bus detur.

Purulento
rum mede-
la.

quando frigidus, & vngues circumtensi sunt, & aluus calida **D**
fit. Ex his suppuratos cognoscere oportet. Porro quum re-
tro in spinā fluxio processerit, huic tabes fit eiusmodi. Lum-
bos dolet, & anteriores capitis partes vacuæ videntur ipsi
esse. Bilis autem periculosa est, si icterus siue regius morbus
in oculis accedat, & in vnguibus liuiditas si fiat. & si corpus
vlcera habeat, & partes circa vlcera liuidæ sint, & quum su-
dor nō toto corpore erumpit, sed vna aliqua corporis parte,
& quum febre adhuc existente excreat ager pallidū viride,
aut si dum adhuc in pulmone inest pallidum viride, excrea-
tio cesset. Sic autē quum inest, & non inest, cognoscere oportet. **E**
Quum inest, in faucibus respirantis strepit, & spiritus
periculosus est, & singultus adest, & febris discedit, excrea-
tione adhuc in pulmone hærente, & aluus debili iam existen-
ti secessum facit. Hæc pleuritidis & peripneumoniæ pericu-
losa indicia existunt. Cæterum pleuritidem hoc modo cura-
re oportet. Febris sedanda nō est per septem dies. Potu vten-
dum aut aceto mulso, aut aceto & aqua: hæc autē quā plu-
rima offerre oportet, quo humectatio fiat, eaque facta ex-
creationem faciat: & dolor sedandus est calfactoriis medi-
camentis, & absorbendum dandum est quicquid excreatio-
nem facit, & balneis vtendum quarta die, quinta autem &
sexta oleum illinendum est. Septima lauandum est, si febris
dimittere non velit, quo præ balneo sudor contingat. Insu-
perque & quinta & sexta fortissimis vtendū est excreato-
riis medicamentis, quo septimam diem quā facilimè tran- **F**
sigat. Si verò neque septima die febris cesset, nona cessabit,
si nō aliud quid periculosum accedat. Postquam autem fe-
bris dimiserit, sorbitiones quā debilissimæ offerantur. Si
verò euacuatio oboriatur, si quidem iuuenile adhuc est cor-
pus, potus auferendi sunt. Si verò febris dimisit, triticeis sor-
bitionibus vtaris, Et eodem modo peripneumoniā curato.
At verò suppuratis, caput purgare oportet non fortibus me-
dicamentis, sed paulatim auertere in nares, & simul eduliiis
ventrem subducentibus vti. Et quum principium morbi
nondum est, sed eò fluxus vertitur ac vergit, excreationem
facere, & tussim excitare, & medicamentis infusilibus in na-
res vti, & cibis simul ingestis. Quum autem excreationem
facere oportet, pluribus cibis & salis ac pinguibus vtendum
est, &

- A** est, & vino austero, & quum sic habet tussis inducenda. Tabidos item eodē modo quod ad reliqua attinet curabis, præterquam quòd cibi nō multi simul ingerēdi sunt, & obsonia non plura quā cibaria frumētacea, & vino inter edendum vtendum est aquoso, vt ne calfaciat, & corpori debili existenti caliditatem exhibeat, & simul ambo calfaciant in eodem tempore, & caliditate multū fluxum inducāt. Quum porrò per gulam fluxus in ventrē processerit, morbus infra sit, aliquando etiam supernè. Huic si quidem in ventre dolor inerit, subducendus est primū medicamento aut succo, deinde pharmaco fortiore vtendū est, cibus verò aluum subducentibus, donec dolor perseueret. Vbi verò dolor sedetur, cibus validioribus vtatur. Eodem modo vbi morbus multos dies hæserit curabis. Si verò debilis fuerit, & præ imbecillitate hæc offerri non possint: primū quidē ptisanæ succo per clysterem infuso, aliud eluenda est, post vbi per hunc purgaris, aliquo ex adstringentium numero. Quum autem retrò in carnē iuxta vertebra fluxus illapsus hydropē fecerit, sic mederi oportet. Caro in collo inter venas cruribus vratur, & vbi vlsio, cōstringatur, & cicatrices quā tenuissimæ inducantur, & vbi fluxum obturaris, medicamentum in nares adhibe, vt eò vertatur, & aliud rursus donec auertatur. & anteriores quidē capitis partes calfacito, posteriores verò perfrigerato. Et postquam anterioribus capitis partibus excalfactus fuerit, cibos edat quā pituitosissimos, ac minimè ventrem subducentes, quo fluxionum meatus in anteriore capitis parte quā maximè dilatētur. Postea vbi obturaris & auerteris influxionem, si quid prius quā curaris fluxum, in corpus peruenerit, sic mederi oportet. Si quidem magis ad cutem secesserit, externis partibus fomētum adhibebis. Si verò intrò ad ventrē, foris autē non cōspicuum sit, medicamentū bibendum dabis. Si verò in vtranque partem, ab vtraque detrahes. Verū hoc studio habere oportet, vt proximū exitum facias, siue infernè siue supernè, aut etiam alia aliqua corporis parte, vbi exitus sunt. Quum coxendicum morbus à fluxione fiat, cucurbitā medicam affigere oportet, & foras trahere, & nō scarificando pertundere. & calfactoriis medicamētis in potu exhiberis intus calfacere, quo exitus fiat tum foras ad cutem per cucurbitæ tractionem.

Hydrops
qui cure-
tur.

Ischiados
medela.

Hippocratis Liber

Tabes spi-
nae & eius
medela.

Lien turgi-
dus.

Medela.

Hydropis
curatio an-
ceps.
Pueri hy-
dropici qui
curentur.

Pleuritis
sicca.

nem tum intus ad ventrē per caliditatem. Nā quum obtura- D
tus fuerit fluxus, & non habeat quò iter faciat, viam ad arti-
culos facit, & in id quod cedit influit, & sic coxēdicum mor-
bum inducit. Tabes ex fluxione retrorsum. Qui hac affe-
ctus est, ei caput est purgandum debili medicamento, donec
fluxus auertatur, diata autem vtēre velut in tabe superiore.
Medicamētum potandū præbe Elateriū deorsum purgans,
& infernē aluum lacte infuso elue, de cætero fomentis vtēre.
Quum splen præ febre magnus factus fuerit, sit autem
quum corpus attenuatur. Ex iisdem enim & splen florescit,
& corpus cōtabescit. Quum autem corpus tenuē fuerit, &
splen floruerit, & omentum simul cū corpore attenuatū fue- E
rit pinguitudo in omento colliquescit. Vbi verò vasa pin-
gitudine vacua facta fuerint, & à splene florente ac auge-
cente in omentum defluerit, vtpote vicinū valde existens,
& vt vasa habens eāque vacua, excipit, & vbi morbus semel
in corpore factus fuerit, ad id quod est morbosum vertitur,
nisi quis probē disponat ac curet. Nā etiam si quis bene tra-
ctet, periculo non vacat. Hunc sic sanare oportet. Medicamē-
ta in potu exhibenda sunt quæ aquam purgent, & edulia
quàm pituitosissima offerenda. Si verò neque sic leuior fiat
inurenda sunt crustæ quàm tenuissimæ, & quàm maximè in
superficie quo aquam cōtinere possis, circum circa vmbili-
cum, & vnā in vmbilicū, & emittere singulis diebus. Quum
enim morbus periculosissimus sit, in his periclitari oportet.
Si enim successerit, sanum facies: sin minus, quod etiam aliās F
futurum erat, id ipsum perpetitur. Caterum in puero hydro-
pem sic curare oportet. Partes tumidæ & aqua plenæ ape-
riendæ sunt scalpello, & frequenter ac parū educendum est.
Educendum autē est à singulis corporis partibus, & fomētis
vtendum, & semper locum apertum vnde eduxeris calfacto-
rio medicamento illines. Pleuritis sicca citra fluxum fit,
quum pulmo valde exsiccatus fuerit præ siti necessaria. Pul-
mo enim natura siccus existens, vbi amplius quid quàm pro
natura siccatus fuerit, gracilis fit, & impotens redditus, & ad
latus præ impotentia reclinatus, latus cōtingit, & postquam
contigerit ipsum humidū existens, & cohæret & adglutina-
tur, & pleuritidem hoc est lateris morbum facit. Tūc verò &
dolor fit in latere, & clauicula, & febris, & album exsereat.
hunc

A hunc multis potibus curare oportet, & lauare, & doloris medicamentum præbere, & alia quæ excreationem faciunt. hic in septē diebus sanus sit, & morbus minimè periculosus est, & cibos præbere nō oportet. Febres porro propterea fiunt, quum corpore superinflammato carnes intumuerint, & pituita ac bilis cōclusa quieuerint, & neque refrigeretur quicquàm, neque exeat, neque moueatur, neq; aliud quid subeat. Quum itaq; lassitudo occuparit & febris ac repletio, lauare multa aqua oportet, & oleo illinere, & quàm maximè calfacere, quo caliditas aperto corpore, præ sudore egrediatur. cōsequenter autem hæc faciēda sunt per tres, aut quatuor dies: & si non sedetur ac cesset, pharmacum in potu exhibendum.

B est quod bilem educat, & febris perfrigeranda est, præterquā si quartana existat. Medicamentū tamen donec corpus floridum est ne propinato, non enim vacuantur, nisi parum, utpote corpore turgente. Quum autem gracilis ac macilentus fuerit, tunc bibendum exhibe, & euacuabitur. Febrienti cibum ne offeras, neque sorbitionibus subtilis aluum ducas. In potu dabis aquam calidam, & aquā mulsam, & acetum cum aqua. hæc autem quàm plurima bibat. Si enim non frigidus ingressus fuerit potus calidus existens ac manens, ex corpore ægroto detrahet, & vel per vrinam eiiciet, vel exsudabit. Vndiquaque autem apertum, & respirans, ac motum corpus, id quod conducibile est, faciet. Quum verò gracilem existentem febris vrat, manifestum est quòd non propter corporis tumorem febris occupet, & si non cesset, nutrire oportet ac tumidum facere, & si neque sic conducatur, palàm est quòd nō oportuerit febrem inducere. Hunc itaque medicamentum potare oportet quod educat, qua parte febris magis hæret, siue supernè siue infernè, & si quidem supernè hæreat, supernè, si infernè, infernè. Nihil autē minus oportet etiam debiles fortia medicamenta potare, sed similiter: aut solū sic, fortibus quidem forte, debilibus verò debile exhibeas. Ardore verò potionibus & sorbitionibus, quemadmodum febrem frige factorio medicamēto exoluere oportet, cammaro videlicet, aut alio quopiam huiuscemodi: & si nauseā contrahat à frige factorio, calfactoriis vttere consequenter. Vbi verò non cesset, frige factoriis rursum vttere. Iterum siue regium morbū sic curare oportet. Quum susceperis nutrito, &

Cum febris
vexat quid
agas.

Quæ medi-
camēta sin-
gulis dāda.

Morbus
regius quī
curetur.

balneis,

Hippocratis Liber

balneis, & pinguefacientibus, potibusque ac cibis humectato, per tres aut quatuor dies. Postquam autem humectatum fuerit corpus, purgato & reficcato ipsum, pinguitudinemque; derepente exhausto, & vndiquaque si possibile sit medicamentum adhibens, humiditatem educito, ad caput verò purgatorio debili vitior: & vrinam cientia bibenda dato, eaque ante cibos hoc tempore quo turbatam humiditatem purgaueris in potu præbe, ne ab eo tempore corpus nutriatur. Quum verò attenuatū fuerit, etiam balneis purgato, & confusa cucumeris sylvestris radice, eaque in aquam coniecta, inde lauato. Cæterum medicamenta bilem ducētia ne propinato, ne corpus magis conturbes. Vbi verò siccū fuerit id quod conturbatum fuit, nutrito, nullo aluum subducente medicamēto, neque vrinam cientē vtens, sed vino vinoso, & his quæ rubicundiores hominē faciunt. Si verò viridis ac luteus sit, rursus exhausto, nequaquam verò siccato, vt ne is color stabilis reddatur. Vlcus ferinum in corpus propterea venit. Postquam caro tumida & inflammata circum circa fuerit, & margines vlcis magni extiterint, & vlcus ipsum humidū, & in vlcere sanies reficcata inerit, aut vlcus constrictum fuerit. Sanies computrefaciens ab vlcere defluens, foras prodire à constricto ad carnem vlcere prohibetur. Caro autem suscipit, vtpote eleuata existens ab inflammatione, & quum in ipsam peruenerit sanies subterfluens, putrefacit & attollit. Hunc medicamentis humectantibus ipsum vlcus illinere oportet, vt ex humectato vlcere fluxus foras effluat, & non subter carnem. Influentia etiam in vlcus frigefacientibus pharmacis illinēda sunt, quo perfrigerata caro existat, & non dirupta rursus fluxionem immittat. Sed & alia vlcera frigefacientibus oblinenda sunt, & super ipsa humectantia imponenda. Angina quam cynanchen Græci vocant à sanguine fit, quum sanguis in venis quæ in collo sunt cōpactus fuerit. Sic affectis à venis quæ in brachiis sunt, sanguinem detrahes, & simul aluum infernē subduces, quò id quod morbum exhibet, detrahatur. Lingua quoque quum magna vlcera habuerit, similiter curanda est. Morbos à principio curare oportet, & si quidem à fluxionibus sunt, primū fluxiones sedare. si verò ab alia causa, principium morbi sedare ac curare: deinde id quod influxit, si quidem multum fuerit, educere,

Cucumeris sylvestris radix.

Ferinum vlcus.

Angina.

A educere, sin modicum, per diætā moderari ac componere.

Capitis fracturæ. Si quidem os fractum fuerit ac contritum, periculo vacat, & curare oportet hunc humectantibus medicamentis. Si verò rumpatur, & fissura fiat, periculosum est. Huic ferram adhibere oportet, ne in ossis scissuram sanies influens membranam cerebri putrefaciat, Nam vt per angustum intrans, non autem exiens affligit, & furere hominem facit. Huic itaque ferram adhibere oportet, vt sanies exitum habeat, non solum ingressum, ampla ferratura facta. Medicamentis autem vtendum quæ humorem in sese trahunt, & lauandum. Febricitanti caput ne purgato, vt ne furiosus fiat. Calfaciunt enim caput phar maca purgatiua, & sanè ad caliditatem febrilem accedens ea quæ in medicamento est, insaniam facit. Ex quacunque causa malè affligente quis atram bilem reuomuerit, moritur qui vulnus habet. Et qui ab euacuatione detinetur, & debilis est, & tenuis existens derepente siccus sublidit, moritur. Quum à caliditate detento, vlcuscula eruperint debili existenti circum circa liuida, moritur. Quum à morbo quopiam detento, debili iam existenti, liuida vlcuscula enata fuerint, mortale. Quum quis à medicamento potu superagrotarit, & infernè ac supernè ab ipso secesserit, vinū sorbeat primum quidem dilutum, deinde meracum frequenter, & sanabitur. Medicamentum autem neque euacuatium, neque vomitorium sumat. Bilis vbi sua sponte eruperit, aut infernè, aut

B supernè, difficilius sedatur. Quæ enim sponte procedit, præ violentia corpori facta impellitur. Si verò à medicamento fluat, non à gentilitatis cognatione violatur. Quum susceperis vinosum & vomentem, vomitum ne sedato. Vomitus enim euacuationem sedat, facilius autem vomitus postea sedabitur. Si verò debilis fuerit qui hæc patitur, somnificum medicamentum à vomitu præbebis. Sanguis quum morbum facit, dolorem exhibet, Pituita autem grauitatē vt plurimum. Morbum si quis non cognoscat, medicamentum bibendum præbeat non forte. Si itaque leuior inde fiat, demonstrata via est, quòd gracilitatem inducēdo curandus est. Si verò non leuior reddatur, sed peius habeat, contraria facienda sunt. Si nō profuerit gracilem facere, tumidum facere conducet, & frequenter permutare, ita vt hoc consilio utaris.

Quæ vulnera mala.

Quod medicamentum non dandum.

Quæ medicamenta danda.

Hippocratis Liber

Medica ars
& exercita-
toria gy-
mnica ve-
cur con-
traria.

Capitis flu-
xio.
Morbi ve-
rusti & re-
centes qui
curentur.

Mori sta-
tuētes qui
cures.
Conuulsio
nismedela.

Ruptura.

Manus pe-
dēque si
torquean-
tur, quid
portēdant.

ris. Si quis in morbis quid permutaturus est, forti quidem D
agrote, debili autem morbo, tunc quidem confidenter for-
tiore quā morbus est, medicamento vtendum est. Nam
etiam si quid de sano abducatur vna cū debili ac agrote, nul-
lum detrimentum est. Si verō morbum fortiozem, agrotum
autem debilem acceperis, debilibus pharmacis curabis, quæ
ipsum morbum superent & abducant, verū agrotū nihilo
debiliorem reddant. Ars exercitandi corpora, & Medicina
contrarię sunt. Ars enim exercēdi corpora (gymnastice Græ-
cis appellata) non opus habet permutatione, sed Medicina.
Sano enim non auxiliatur transmutatio ex præsenti statu,
verū agrote. Morbi quicumque vlcera sunt, & super reli-
quum corpus eminent, eos simul cū medicamentis etiam E
fame curare oportet. Fluxione ex capite fluente vomitus con-
ducit. Antiqui morbi difficilius curantur quā recentes,
verū morbos antiquos primū recentes facere oportet.
Vlcus callosum factum, eiecta primū duritia per putrefa-
ctorium medicamentū, constringere deinde oportet. Phar-
maca quę tumefacere maximē solent, ea pura vlcera adstrin-
gunt. Quę verō attenuant, ea purgant. Si verō quis constri-
gat vlcera nondum matura, corpus agrotum nutrit quod vl-
cus habuerit. Et si quidem adstringere oporteat vlcus ac
implere, tumefacere prodest, etiam si in capite carnem velis.
Renutrita enim à cibis caro, propulsat eam quę à medica-
mento putrefacta est, & simul cū natura debellat. Verū
eleuatam aut leuem carnē, cibis gracilem reddere oportet. F
Tristes anxios & agrotos, ac se strangulare volentes, man-
dragorę radice manē in potu data minore pondere quā
quod insanire facit, curabis. Conuulsioni sic mederi opor-
tet. Ignis ab vtraque lecti parte succendatur, & mandragorę
radix in potu præbeatur minore pondere quā quod insa-
niam facit. Et ad tendines posteriores sacculi calidi impo-
nantur. A conuulsione si febris inuaserit, sedatur eadem die,
aut sequenti, aut omnino tertia. A ruptura febris non corri-
pit ampliū quā tres aut quatuor dies. Si verō corripiat, &
quis putat se à ruptura habere, ab alia sanē quapiā causa cor-
ripitur, & non oportet ipsam velut à ruptura curare. Quum
homo manibus ac pedibus distentus ac tortus fuerit, insaniā
sibi ipsi facit. Venam porrō sic vrere conuenit commodam
ad

A ad morbum, ex quocunque tandem quis agrotarit. Si vltus fuerit homo, & fluxerit sanguis, ita vt hoc non periculosum sit ipsi, ambo hac facere licet. Si verò percusseris ipsam in dolore, cuius gratia vrebatur, non coalescit, verum fluxui prodest. Si enim perusta fuerit, non fluit. Nam postquā perusta est, extremitas vtraque venæ recurrit, qua parte perusta est, & exarescit. Si verò quid relictum fuerit, præ relicto perfluente fluxum humectatur. At si sanguis ex vena fluit, pertransuersum perurito. Si verò non cesset, ad hæc supra ac infra vtrinque dissecato, quo sanguinis fluxus auertatur. Diductum enim facilius est medicamēto sedare, quàm coaceruatum. Doloris in capite gratia, sanguinē de venis detrahito.

Capitis doloris medicina.

B Si verò nō sedetur, & diurnus sit, perure venas, & sanus euadit. Si verò caput purgaueris, magis affliges. Medicinam citò discere non est possibile, propterea quod impossibile est statam ac certam doctrinā in ipsa fieri, velut (verbi gratia)

Qui scribere didicit, iuxta vnum modum, quem omnes docent, nouit, & scientes omnes similiter nouerunt, propterea quod idem & similiter factum, & nunc, & non nunc, non potest fieri contrariū, sed semper exactè simile est, & non opus habet occasione. Medicina verò & nunc, & statim, non idem facit, & ad eundem contraria facit, & hæc etiam contraria similibus. Primum aluū subducentia non semper hoc faciunt, & aluum subducentia vtrunque faciunt. Fortassis autem neque sic se habent aluum subducentia, velut aluum sistentibus contraria. Restitante enim aluo, propter vehementem stabilitatem corpus intumescit, pituita in ventrem perueniente, sic stabilitas secessum facit. Vbi enim pituita in ventrem ingressa fuerit, euacuatio cōtingit. Insuper verò aluum subducentia ex natura, stabilitatem faciunt in ventre, si quidem non subducentia feceris, Si autem exoluatur & humectetur id quod morbum facit, postquam exolutum fuerit, sanus euadit. Et sic ventrem sistentia, subducentibus stabilitatem ventris faciunt, & vicissim subducentia ventrem, sistentibus.

Medicina cur penitus non sciatur.

C Eodem modo res se habet circa rubicundos & pallidos. Nam & pituitosa ac tumefacientia & pallidos faciunt, & boni coloris, Itēque attenuantia. vtriusque autem medicamentum sunt contraria contrario. Verbi causa, Quum intumuerit pallidus existens, exoluitur sanè si quod medicamentum

Pallor.

mentum attenuans adhibitum fuerit. atque hic tumentis at- **D**
 tenuans opitulatur. Rursus autem quod aliquādo vtilitatem
 cœpit, nunc hic opitulanti opitulatur, quum sanè præ graci-
 litate decolor & pallidus factus fuerit. Si quis enim pituito-
 sum ac tumefaciens medicamentum exhibuerit, pallor seda-
 tur. Insuper verò etiam dolor, & propter frigiditatem fit,
 & propter caliditatem, & propter valde exuperans, & pro-
 pter imminutum. Et in perfrigeratis quidem natura extra
 corpus ad cutem, propter calfaciens valde, dolor fit. In cali-
 dis verò natura, propter frigidum. Et in siccis natura, si hu-
 meſcentur. & in humidis natura, si resiccentur. In singulis e-
 nim quorum natura permutatur ac corrūpitur dolores fiūt. **E**
 Sananturq; dolores contrariis, idq; etiam vnicuique morbo
 proprium est. Nam in calidis natura propter frigiditatem
 ægrotantibus, dolores caleſcunt, & reliqua iuxta hanc ratio-
 nem fiunt. Alius porrò modus hic est, per similia morbus
 fit, & per similia adhibita ex morbo sanantur. Velut, vrinæ
 stillicidium idem facit, si nō sit, & si sit idem sedat. Et tussis
 eodem modo, velut vrinæ stillicidiū, ab iisdem fit & sedatur.
 Alius rursus modus hic est. Febris quæ propter tumefactio-
 nem ex pituita fit, aliquando quidem ab iisdem fit, & seda-
 tur, aliquando autem à contrariis. Aliquando enim si quis
 vult aqua calida lauare, & multum potum exhibere, sanus
 æger fit, & febris quæ propter tumefactionem facta est, pitui-
 tolis ac tumefactionem facientibus oblatis, & adhibitis sa- **F**
 nescit. Et si quis vult medicamentū bibendum dare, aluum
 subducens & vomitorium eodem modo & à facientibus se-
 datur, & sedantibus fit. Nam si quis homini vomenti, aquā
 multam bibendam dare velit, eluentur ea propter quæ vo-
 mit, vnā cum vomitu. Et sic quidem per vomitum vomitus
 sedatur. Rursus autem propterea quod sedatur, quia infernè
 procedere ipsi fecit, ex illo id quod intus est vomitum facit,
 & ambobus cōtrariis modis homo sanus fit. Et si quidem sic
 in omnibus haberet, stata sanè ac certa medicina esset. Ita
 alia quidem contrariis curare oportet, qualia tandem sint, &
 à qua causa fiant: alia verò similibus, qualia tandem sint, &
 à qua causa fiant. Huius autem rei causa corporis debilitas
 existit. Corpus enim à cibus æqualibus æqualiter nutritur, à
 corpore verò cibi superatur. Postquam verò plus aut minus
 in ipsum

Febris &
 vomitus
 medicamē
 ta non cer-
 ta.

Causa.

A in ipsum ingestum est, aut alia quæpiam transmutatio facta est, superatur, superant autem cibi. Et quum sanè superatur corpus ab his quæ ipsi offeruntur, florere hæc ipsa facit, & superant hæc simul corpus, & contraria ipsi faciunt. Et calida lauari, donec quidem corpus superat eius exhibitionem, florere corpus facit. Quum verò superatū fuerit, gracile corpus facit. Et conuiuari similiter vt lauari facit. Hæc enim donec superantur florere corpus faciunt. Vbi verò superauerint, & alui secessus & varia vitia inducunt. Quum autem id quod offertur, transmutatur, necesse est & id cui offertur, transmutare. Etenim corpus transmutatum parum efficax ac potens est, & ab omnibus offensiones percipit. Hoc autem faciunt,

Quæ cor-
pus iuuent
& contra.

B & aluum subducentia: & florere ipsum facientia, gracile corpus faciunt, & reliqua omnia contraria his facientia. At verò Medicina breuem occasionem habet: & qui hoc nouit, illa statim ac certa habet: & scit quæ consueta sint, & quæ non consueta, ad quæ cognoscenda non est occasio in medicina, & quod aluum subducentia, non subducentia sunt, & reliqua quod contraria sunt, & contrariissima non contrariissima. Occasio autem hæc est, vt cibos offeramus ea copia,

Qualis me-
dica ars.

quantam corpus cui offeruntur superare valeat. Nam si quis sic fecerit, omnino necesse cibum est aluum subducentem oblatum, subducentē esse, & pituitosum, pituitosum. Si igitur superauerit corpus ipsos cibos, neque morbus, neque contrarietas fit ex his quæ offeruntur, & hæc est occasio quam medicum nosse oportet. Quum verò occasionem supergressus fuerit, contrarium fit, & antequam ei excessum factum esse putant, consequens est vt cale scat. Donec enim corpus id quod oblatum est superauerit, corpus nutritur. Vbi verò hanc occasionem transmiserit, contrarium fit, nam attenuatur & gracilescit. Sed & alia omnia, & quæ tumefaciunt, donec quidem superauerit corpus, ampliùsque pro occasione offeruntur, etiam iuxta naturam suam singula faciunt, & pituitosa siue tumefacientia tumefaciunt. vbi verò occasionem transmiserint, contraria sunt. Medicamenta sunt omnia quæ præ sente n statum transmouent. Omnia autem fortiora transmouent. Licet autem si velis, medicamento transmouere, & rursus si velis, alimento ac cibo. Omnia verò ex præsentis statu transmouere, ægrotanti opitulatur. Si enim id quod morbum

Quando a-
omnia suam
naturā con-
seruant.
Medicamē-
ta quid fa-
ciunt.

1

facit

facit, non transmuteris, augetur. Medicamenta fortia à natura, in debilibus morbis dare non oportet, neque paucitate medicamenti, debilitas ipsius facienda est. Sed fortibus natura, fortibus pharmacis utendum est, debilibus verò, pharmacis non fortibus. Neque partiendum est medicamentum, sed singulis secundum naturam, debilibus quidem debilia à natura, fortibus verò morbis, fortis naturæ pharmaca exhibenda sunt. Ceterum morbi ea parte qua proximi sunt, educendi sunt, & qua parte singulis exitus quam proximus est extrahendi. Aluum autem subducentia talia sunt, quæcunque lubrica & incisiua sunt, & quæcunque in calidis attenuantur. Vetus enim calidus est: & reliqua quæ salsuginosa sunt, & quæcunque ex talibus plurimum participant. Contra aluum non subducentia, sed sistentia sunt, quæ flatum exhibent, humida enim resiccata flatum faciunt: & quæ adstringunt, & quæ à calore compacta sunt, & friabilia, & sicca.

Acida pituitosa.

Medicina quæ.

Fortuna in his parum facit.

Omnia autem quæ foris extenuant, intra corpus assumpta tumefactionem inducunt, eadem autem & ventrem sistentia, & pituitosa, ac tumefaciencia existunt. Et quæ aluum subducunt ac extenuant, cum calefacientibus eadem sunt. Insuper autem etiam acida pituitosa sunt. Omnia verò quæ frigefaciunt ea quæ in ventre sunt, talia aluum subducunt, Item quæ frigida sunt, & quæ humida. Quum autem non aluum subducentia fuerint, calefaciunt. Frigefaciunt autem & calida in ventrem assumpta, & citò secessum faciunt. Si verò secessum non faciant, calida in ventre existunt. Ex his quæcunque repletionem faciunt, maximè pituitosa sunt. Quæ verò plurima assumpta repletionem non faciunt aluum subducunt. Medicina itaque mihi iam tota inuenta esse videtur, quæ sic habet & quæ docet singulas & consuetudines, & occasiones. Qui enim sic medicinam nouit, minimè fortunam respicit, aut expectat, sed & citra fortunam, & cum fortuna, rectè faciet. Constans enim ac firma est tota medicina, & doctrine optimæ in ipsa compositæ, minimè fortuna egere apparent. Nam fortuna sui iuris est, & nullius imperio subest, neque optantis est ad ipsam peruenire. Scientia verò imperata facere cogitur, & facile est ipsam feliciter assequi, si quis sciens uti velit. Deinde verò quid opus est Medicinæ fortuna? Si enim morborum medicamenta clara sunt & manifesta, velut equid

Aequidem arbitror, nō expectant sanē fortunam: ad sanandos morbos siquidem sunt medicamenta. Si verò cū fortuna exhibere ipsa prodest, non magis medicamenta quā ea quæ non sunt medicamenta, vnā cū fortuna adhibita sanos faciunt. Quicunque verò fortunam ex Medicina, aut alia quampiam arte expellit, dicitque eos qui probè rem aliquā sciūt fortuna non vtiis contrarium mihi iudicare videtur. Mihi enim soli hi fortunatè assequi, itēque infortunatè non assequi videntur, qui rectè quid, & malè facere sciunt. Fortunatè enim assequi, est rectè facere, hoc autem hi qui sciunt faciunt. Non assequi autem hoc est, si quis non sciat, hoc non

Medicamē
ta sine for-
tuna sanāt.

Quæ ad-
uersa vel se-
cunda for-
tuna huic
videatur.

B rectè faciat. Indoctus autem qui est quomodo fortunate assequi possit? Si quid enim etiam assequatur, non memorabilem sanē successum habebit. Qui enim non rectè quid facit, non fortunatè assequi poterit, quum reliqua quæ æquum est facere non faciat. Morbi muliebres. Vteri omnium morborum causæ sunt: hi enim vbi ex natura transmoti fuerint, morbos exhibent, siue ascenderint, siue descenderint. Et quū quidem vteri osculum suum non demittentes, & pudendi eminentias non contingentes, transmoti fuerint foras, leuissimus morbus est. Quum verò in anteriorem partē promoti fuerint, & osculum in pudendi eminentias ac labra immiserint, primū quidem ipso contactu dolorem vterus percipit ac exhibet: deinde obturatus, & velut operculo cōtectus, ex eo quòd pudendi eminentiis incumbit, fluxus non contingit, qui mensium nomine venit. Hic verò fluxus congregatus, tumorem ac dolorem exhibet. Et si quidem infrā descendens & auersus, in inguen se immiserit, dolorem exhibebit. Si verò sursum ascendens auersus & obturatus fuerit, etiam sic propter raritatem ac coarctationem dolorem exhibet. Quum verò propter hoc agrotarit, coxendicum ac capitis dolorem facit. Vbi verò vteri impleti intumuerint, nihil fluit, & pleni fiunt: quum autem pleni facti fuerint, coxendicæque contingunt, dolores exhibent, & in coxendices, & in inguen, & velut pilæ in ventre discurrunt, & caput dolore affligunt, modo altera ipsius parte, modo totum, prout contingit ipsi morbus. Hæc itaque sic curanda sunt.

Vteri om-
niū morbo-
rum causæ
fœminis.
Vteri mo-
lestiæ.

Si quidem descenderit solū, & illini possit, vtere quocūque libet ex graueolentium genere, aut cedro, aut alijs intri-

Medela.

Hippocratis Liber

to, myttoto Græcis appellato, aut aliquo alio ex grauitate & male olentium numero, eoque suffitum facito, & fomenta ne adhibeto, neque cibo neque potu vrinam ciente hoc tempore vritor, neque calida lauato. Si autem sursum ascenderit, & non auersa fuerit, medicamentis apposititiis bene olentibus, & quæ simul calfaciunt vtere. Velut sunt myrrha, aut vnguentum, aut aliud quoddam odoratum simulque calfactorium. Et his quidem subdititiis vteris, fomentum autem ex infernis ex vino adhibebis, & calida aqua lauabis, & vrinam cientibus vteris. Ex hoc autem manifestum fit auersa sit necne. Si enim sursum progressa auersa non fuerit, fluxus procedit. Si verò auersa sit, fluxus, menstrua appellata, non contingit. Hunc morbum fomento primum tali curare oportet. In vinum grossos immittito, ipsumque vinum calfacito, & cucurbitam circum osculum vasis in quo calefit addito, hoc modo: Cucurbitam per medium dissectam euacuato, & summitate ipsius modice rescissa, velut in vtriculis fieri solet, hanc ipsam vasi velut operculum circumdato, quo odor per angustiam means ad vterum perferatur. Insuper autem & calida aqua fouere, & calfacientibus medicamentis subdititiis vti oportet. Calfacientia autem sunt ea quæ ducunt ex superius relatis, itemque hæc. Stercus bubulum, fel bubulum, myrrha, alumen, galbanum, & si quod aliud eiusmodi est. Plurimis etiam ipsarum per purgantia infernè medicamenta alius subducenda est, & per debilia quæ vomitum faciunt, ne euacuatio ex supereuacuatione fiat. Caterum subdititias glandulas sic facere oportet, si fortes facere velis. Mel semicoctum facito, & ex præscriptis subdititiis pharmacis ea quæ valde efficacia sunt immittito, & ubi immiseris, glandulas formato instar earum quæ in sedem induntur, verum longas facito has ac tenues. Mulierem verò supinam reclinato, locis à pedibus lecti altius instratis, deinde apponito, & panniculo intecto, aut alia quadam re consimili calfacito, donec colliquecat. Si verò debiliorem glandulam subdere velis, in linteolum illigato. Sed & si humore pleni vteri osculum tumidum habuerint, & non fluxerint, fluxionem facere oportet, & subdititiis pharmacis sanare, itemque fomentis velut scriptum est, ita faciendo velut in priore fluxione suppressa. Quin & si in anteriorem partem proced

Calida appo-
posita.

A procedens vterus auersus fuerit, fluxionem facere oportet, velut in superiore fluxione suppressa. Quum verò fluxus nimius fuerit, neque calida aqua, neque alio quopiam calfacere oportet, neque vrinam cientibus vti, neque cibis aluum subducentibus. Lecti autem partes à pedibus altiores esse oportet, vt ne declinatio fluxui facilitatem præbeat. Vtere autē simul etiam subdititiis adstringentibus. Fluxiones porò quum confestim venerit purgatio statim subcruentæ fiunt, quum verò tardius prodierit, purulente. Et iunioribus subcruenta magis prodeunt. Seniores verò magis mucosa menstrua habent.

B H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE AERE, A-

QVIS ET LOCIS, IANO

CORNARIO MEDICO

PHYSICO INTER-

P R E T E.



C

VI CVMQVE artem medicam integrè adsequi velit, primùm quidem temporum anni rationem habere debet, quantum potentia quodlibet eorum valeat: nō enim simile quicquam in illis existit, verum differunt inuicem propter varias quæ in eis sūt mutationes. Deinde ventorum calidorumq; & frigidorum, maximè qui ex his omnibus hominibus sunt cōmunes, & mox qui in vnaquaque regione sunt indigenæ & proprii. Neque verò negligentiorē se circa aquarum facultates cognoscendas exhibere conuenit. Quemadmodum enim gustu differunt, & pondere ac statione, sic quoque virtute aliæ aliis longè præstant. Quare si quis ad urbem sibi incognitā perueniat, circumspicere oportet eius situm, quomodo scilicet ad ventos, & solis exortus iaceat: non enim æquales vires sunt, ad Septentrionem sitæ, & vergentis ad Austrum: neque eius quæ solem exorientem, & que eundem occidentem

Quæ prospicienda sunt medico.

Venti.

Situs vrbiū

Hippocratis Liber

Aquarum qualitas. spectat. Hæc itaque diligenter oportet perscrutari, ac simul D
quo modo habeant circa eam aquæ: nū ne palustribus utan-
tur & mollibus, aut duris & ex sublimi loco prolabantibus,
& scaturientibus ex petris, siue salis, & crudis. Terra etiam
**Terræ qua-
litas,** ipsa consideranda, nudane sit & aquis carens, aut densa &
aquosa & an concaua sit & æstuosa, vel alta & frigida, ho-
minum insuper dicta perquirenda, qua maximè capiatur.
An bibuli sint & lircones & ocio dediti, aut exercitiis variis
**Hominum
victus præ-
noscendus.** vtentes, & tolerantes laborum, ciborumque plus adpeten-
tes quàm poculorum. Ex his enim singula sunt inuestigan-
da. Nam qui hæc omnia probè, quantum fieri potest, cognou-
erit, aut horum plurima, eum non latere possunt quum in
**Prænotio
futurorū
quomodo
paretur.** urbem etiam ignotam sibi peruenerit, neque morbi regioni E
peculiares & patrij, neque communis regionis natura, quæ-
cunque tandem ea fuerit, vt non possit in cognoscendis mor-
bis dubius hære, aut errare sicubi ad morborum medica-
tionem adhibeatur. Quæ ambo illis euenire solent, qui non
prius prouidi hæc diligenter cognouerunt. Quare qui ea
studiosè rimatus fuerit, vniuscuiusque temporis, ac anni
futuri constitutionem prædicere poterit, qui videlicet mor-
bi communi adfectione ciuitatem sint inuasuri tum æstate,
tum hyeme, & quæcunque pericula vnique sint timenda
ex dictæ ac victus immutatione: quum enim tēporum mu-
tationes, & astrorum ortus ac occasus obseruauerit, quem-
admodum singula horum eueniant, prænosceat vtique & de F
**Astrorum
cognitio ad
artem me-
dicam fa-
cit.** anno, qualis hic sit futurus: hoc nanque modo si quis rima-
tus fuerit ac præcognouerit temporum occasiones, maximè
de singulis sciet, vt plurimūque sanitatem adsequetur, &
recta via procedet, non minima artis suæ gloria. Quod si cui
hæc sublimiora videantur, is si ab hac sententia discedat, di-
scet sanè non minimam partem conferre ad rem medicam
**Situs urbis
calida.** ipsam Astronomiam, sed omnino plurimam, quū vnā cum
temporibus & ventriculi in hominibus mutantur. Quomo-
do autem singula quæ diximus scrutari ac explorare oport-
eat, deinceps dicam manifestè. Quæcunque quidem ciuitas
ad ventos sita est calidos, puto autem eos qui inter bruma-
lem solis exortum itidēque occasum perflant, huic hi
venti sunt peculiares. A Septentrionalibus autem ventis
rura ac protecta ea ciuitas existit. Aquæ verò eius mul-
tæ &

Ata & subsalsa sunt, & necessario non sublimes, æstate quidem calida, hyeme frigida. Et quæ quidem vrbes bene sitæ sunt Quæ vr-
ad solem, & ad vêtos, & aquis bonis vtuntur, hæ minus à ta- bes falsas
libus mutationibus afficiuntur. Quæ verò aquis palustribus aquas ha-
ac lacustribus vtuntur, & non bene sitæ sunt ad ventos, & ad bent.
solem, hæ magis. Et si quidem æstas sicca fuerit, citius sedan-
tur morbi. Si verò pluuiosa, diurni sunt: & phagedænas
ad edentes ex omni occasione oboriri verisimile est, si vlcus Hy- fri-
fiat. Si verò hyems frigida sit, homines capita humida ac pi- gida quæ
tuitosa habere par est: & ventres ipsorum frequenter extur- mala inue-
bari, pituita à capite influente: & formas ipsorum vt pluri- hat.
mum debiliores esse: ipsosque ad edendum ac bibendū non
B appositos esse. Nā qui capita debilia habent, non fuerint bo-
ni potores. Crapula enim magis grauat. Morbi verò hi ipsis
vernaculi sunt. Primum quidem mulieres morbosæ, ac flu-
xionibus obnoxie sunt, deinde multæ steriles sunt ex mor-
bo, non à natura, & frequenter abortiunt. Pueris verò inci-
dunt conuulsionēs ac anhelationes, quæ morbus puerorum,
& sacer esse putatur. Viris autem dysenteria, & alui proflu-
uia, & febres lenes, diurnæ, hybernæ, & pustulæ nocturnæ
multæ, & hæmorrhoides in re. Pleuritides autem, & peri-
pneumonix, & febres ardentes, & quicunque acuti morbi pu-
tantur, non multum proueniunt. Non enim fieri potest vt isti
morbi vigeant, vbi alui liquidæ existunt. Lippitudines verò
oboriuntur humidæ, non graves, nec diurnæ: si non ex mu-
C tatione temporum in morbus aliquis omnibus communis oc-
cupet. Et vbi quinquagesimum annum transgressi fue-
rint, defluxiones ex cerebro accedentes, homines semisylde-
ratos faciunt, vbi caput derepente insolatum, aut frigore cor-
reptum fuerit. Atque hi quidem morbi ipsis vernaculi sunt:
præterquam si morbus aliquis omnibus communis ex tem-
porum mutatione oboriatur, nam & huius participes sunt.
Quæcunque verò ciuitates his ex opposito sitæ sunt, ad
ventos frigidos, inter occasum solis æstiuum, & orientem
æstiuum: etiam ipsis hi venti vernaculi ac indigenæ sunt, ab
austro verò & calidis ventis protectæ sunt. Et de his vrbi-
bus sic se res habet. Primum quidem aquæ & duræ & frigi-
dæ vt plurimum dulcescunt. Homines autem vegetos & siccos
esse necesse est: & plures ventres infernos crudeos ac duros
habere.

Hippocratis Liber

habere, supernos vero fluidiores: biliososque magis quam D
pituitosos esse. Capita vero sana ac dura habent, & plerunq;
vasa ipsis rumpuntur. Morbi autem populares ipsis hi sunt,
pleuritides & quos acutos esse receptum est. Neesse est au-
tem ita habere, quum alui dura existant, & suppurati multi
ex omni occasione fiunt. Huius autem causa est, corporis ex-
tensio, ac ventris duritia. Siccitas enim & aqua frigiditas fa-
cit ut vasa rumpantur. Edaces autem tales naturas esse neces-
se est, & non multum bibaces. Non enim fieri potest ut simul
multum edant ac bibant. Lippitudinesque his fieri ex temp-
oris interuallo neesse est, duras autem ac vehemetes, & statim
oculos rumpi. Sanguinis item ex naribus fluxiones vehemen- E
tes aestate fieri iunioribus triginta annis. Morbos etiam sa-
cros appellatos, paucos quidem, verum vehemetes. Longae ve-
ro vitae magis quam alios, hos homines esse par est: & ulcera
non pituitosa oboriri, neque efferari. Mores vero magis feros
quam mansuetos. Ac viris quidem hi morbi vernaculi sunt:
praeterquam si quis omnibus communis ex temporum muta-
tione ingruat. Ex mulieribus vero, primum quidem multae ste-
riles fiunt, propter aquas quae dura sunt ac crudae, & frigidae:
Purgationes enim mensium non contingunt commodae, sed pau-
cae ac pravae. Deinde pariunt difficulter, & non valde abor-
tiunt. Vbi vero pepererint, pueros nutrire non possunt. Lac
enim ab aquarum duricia ac cruditate extinguitur, & tabes
frequentes a partu fiunt. Prae violentia enim ruptiones ac F
vulsuras habent, pueris autem hydropes in testibus fiunt, quan-
diu parui fuerint, deinde aetatis progressu evanescent. Pu-
bescent autem sero in hac ciuitate. Et de calidis quidem ventis
ac frigidis, & urbibus ad hos sitis, hoc modo velut dictum est,
res se habet. Quaecunque vero ciuitates sitae sunt inter aesti-
uos ac hybernos solis ortus: & quaecunque ex opposito harum,
de his ita habet. Quae quidem ad orientem solem sitae sunt,
eas par est esse salubriores his quae ad septentrionem con-
uerse sunt, & his quae ad calidos ventos sitae sunt, etiam si sta-
dium solum intersit. Primum enim moderatior est calidi-
tas ac frigiditas. deinde aquas quae ad solis ortus sunt, omnes
splendidas esse neesse est, & odoratas, & molles, & amabi-
les oriri in hac ciuitate. Sol enim emergens ac illustrans
ipsas castigat. Matutinum enim tempus ipse aer ut plurimum
semper

A semper occupat. Et hominum formæ boni caloris sunt, & magis floridæ, si non quis alius morbus prohibeat. Et clara voce præditi sunt homines, & ad iram ac intelligentiâ præstantiores septentrionalibus, si quidē & alia quæ in ipsa nascuntur meliora existunt. Et ciuitas quæ hoc modo sita est veri maximè similis est, iuxta caliditatis ac frigiditatis moderationem. Et morbi pauciores fiunt ac debiliores, similisque sunt morbis, qui in ciuitatibus ad ventos calidos conuersis oriuntur. Et fœminæ isthic valde fœcundæ sunt, ac facile pariunt. Et de his quidem ita habet. Quæ verò ad occasus sitæ sunt, & ipsæ à ventis ab oriente spirantibus protectæ sunt, & tum calidi venti leuiter afflant, tum frigidi ab Vrsis præterflant: eas vrbes necesse est situ morbosissimo positas esse. Primum enim aquæ non sunt splendidæ. Causa verò est quòd aer matutinum tempus ut plurimum occupat, qui aquæ immixtus claritatem eius disperdit. Sol enim priusquam eleuetur, non illustrat. Aestate verò, mane quidem auræ frigidæ spirant, & ros decidit. de cætero verò sol ad ipsas occidens, quàm maximè homines percoquit. Quapropter etiam decolores ac infirmos ipsos esse par est, & ex omnibus prædictis morbis participare. Nulla enim re ab ipsis separantur. Verisimilisque est ipsos graui voce præditos ac raucos esse, propter aerem, eo quòd impurus plerunque isthic est, & morbosus. Neque enim ab aquilonaribus valde expurgatur. Non enim perseverant venti. Qui verò perseverant ac ipsi incumbunt, aquosissimi existunt. Nam venti occidentales, similes sunt autumno. Et huiusmodi ciuitatis situs est ad diei mutationes, eo quòd multum temporis inter matutinum ac vespertinum intercedit. Et de ventis quidem qui commodi sunt ac incommodi ita se res habet. Cæterum de aquis deinceps narrare volo, quæ morbosæ sint, & quæ saluberrimæ: & quæ mala ab aqua fieri verisimile est, itémque quæ bona. Plurimam enim partem conferunt ad sanitatem. Quæcunque igitur palustres sunt, & stabiles ac lacustres, eas necesse est æstate esse calidas, ac crassas & olentes. Quum enim non defluant, sed aqua pluuia semper noua inferatur, & sol urat necesse est ipsas decolores esse, & prauas ac biliosas. Hyeme verò glaciatas & frigidas ac turbatas præ niue ac glacie, ut pituitosissimæ ac raucosissimæ existant:

Hippocratis Liber

Bibentibus autē splenes semper sint magni ac pleni: & ventres duri, tenues ac calidi. Humeri vero & clauiculæ & facies attenuata. In splenem enim carnes colliquantur, quapropter graciles existunt. Edaces autem esse tales ac siticulosos par est, ventresque tum supernos, tum infernos, calidissimos habere, ut etiam fortioribus medicamentis opus habeant. Atque hic morbus ipsis & æstate & hyeme familiaris est. Ad hæc etiam hydropes plurimi ac letalissimi fiunt. Aestate enim dysenteria multæ ac alui profluvia incidunt, & febres quartanæ diuturnæ. Hi autem morbi prolongati, tales naturas ad hydropas deducunt ac occidunt. Et hi quidem morbi ipsis æstate fiunt. Hyemē verò iunioribus quidem peripneumoniæ, & insaniam morbi, Senioribus verò, febres ardentes, propter ventris duriciem. Mulieribus autem, tumores oboriuntur, & pituita alba, & vix in ventre concipiunt, ac difficulter pariunt, & fœtus magnos ac tumidos, deinde ex alimentis tabescentes ac deprauati fiunt. Et purgatio commoda post partum mulieribus non contingit. Pueris verò herniæ accedunt, & viris varices, & vlcera in tibia. Quare fieri non potest ut tales naturæ longæuæ sint, sed ante temporis aduentum senescunt. Præterea fœminæ se in vtero habere putant, & ubi partus tempus adest, ventris moles illa ac plenitudo euanescit. Hoc autem contingit ex aqua quum vteri ex aqua concepta laborant. Atque has quidem aquas ad omnē rem improbas esse censeo. Secundo verò loco eas quarum fontes ē petris scaturiunt. Duras enim esse necesse est: aut isthic ubi calidæ aquæ existunt: aut ferrum nascitur, aut æs, aut argentum, aut aurum, aut sulphur, aut alumen, aut bitumen, aut nitrum. Hæc enim omnia præ violentia caloris nascuntur. Non itaque ex huiusmodi terra aquæ bonæ prodeunt, sed duræ & æstuosæ, quæ & difficulter minguntur, & ad alui egestionem contrariæ sunt. Optimæ verò sunt quæ ex sublimibus locis, ac terreis collibus fluunt. Hæ enim & dulces sunt, & albæ, & vinum modicum ferre possunt. & hyeme calidæ fiunt, æstate verò frigidæ. Tales enim fuerint ex profundissimis fontibus. Maximè verò laudare eas oportet, quarum fluxiones ad solis exortus erumpunt, & præsertim ad æstiuos. Necesse est enim odoras esse ac leues. Quæcunque verò falsæ, & crudæ ac duræ sunt,

Aquæ quæ optimæ.

Aquæ falsæ.

Aquæ sunt, ad hoc quidem ut eas omnes bibant, non bonæ sunt. Sunt tamen aliquæ naturæ & morbi, quibus tales aquæ in potu commodæ sunt, de quibus statim dicam. Habet autem & de his hoc modo. Quæ quidem aquæ fontes suos ad orientes habent, hæ præ omnibus optimæ sunt. Secundum ab his locum habent, quæ inter æstivos solis exortus ac occasus emergunt, & magis hæ quæ ad orientes. Tertio loco sunt, quæ inter occasus æstivos ac hybernos scaturiunt. Pessimæ verò quæ ad austrum, & quæ inter æstivum ortum & occasum. Et hæ quidem ad australes partes valde prævæ sunt, ad boreales verò meliores. His autem hoc modo uti convenit. Quisquis sanus est ac valet, is nullum discrimen faciat, sed semper eam quæ præsens est bibat. Quicunque vero morbi gratia, eam quæ commodissima est bibere volet, is si ita fecerit, maximè sanitatem assequi poterit. Quorum quidem ventres duri sunt, & idonei ad hoc ut ambularentur, his dulcissimæ & leuissimæ ac splendidissimæ cōducunt. Quorum verò molles ventres, & humidi ac prætonsi sunt, his durissimæ & crudissimæ, ac subsalsæ aquæ conferunt. Sic enim maxime relinccari poterint. Quæcunq; enim aquæ optimæ cōctu sunt, ac facillimè liquefcunt, eas par est & ventrem maxime exolvere ac eliquare. Quæ vero crudæ sunt, & minimè cōctu bonæ, hæ magis constringunt ventres ac relinccant. At enim mentiuntur homines de salis aquis, propter imperitiā, in eo quod per aluum secedere eāmq; solvere

C. putantur. Maximè enim contrariæ sunt ad alui egestionem ac secessum. Sunt enim crudæ, & coqui non possunt. Quare venter magis ab ipsis adstringitur quàm eliquatur. Et de fontanis quidem aquis hoc modo res se habet. De pluviailibus autem, & quæ à niue fiunt, ut habeat, deinceps dicam. Aquæ igitur pluviales leuissimæ & dulcissimæ, & tenuissimæ ac splendidissimæ sunt. Primum enim sol quod tenuissimum ac leuissimum est in aqua educit ac sursum rapit. Clarū autem hoc, ipsum mare facit. Quod enim falsum est isthic relinquitur, præ crassitudine ac gravitate, & fit mare. Quod verò tenuissimum est sol sursum rapit, præ leuitate. Rapit autem tale non solum ab aquis stagnantibus, sed etiam ex ipso mari, & ex omnibus in quibus aliquid humoris inest. Inest autem in omnibus rebus. Et ex ipsis hominibus tenuissimum ac leuissimum.

Hippocratis Liber

ac leuissimum humorem ducit. Eius rei maximum signum D
inde sumere licet, vbi homo vestibus indutus in Sole iter fe-
cerit, aut federit. Quascūq; enim corporis partes Sol aspicit,
hæ non exudant. Sol enim quicquid cōparet sudoris sursum
rapit. Quæ verò sub veste contextæ sunt, aut sub aliqua alia
re, hæ exudant. Educitur enim ac domatur à Sole sudor. Ser-
uatur autem ex tegmentis, vt ne disperdatur à Sole. Quū ve-
rò in vmbra deuenerit, totū corpus similiter sudore per-
fluit. Non enim amplius Sol attinget. Quapropter etiam ex
omnibus aquis hæ citissimè putrescunt: & odorem malum
pluuiæ aqua habet, eo quòd ex plurimis congregata est ac
permixta, vt citissimè putrescat. Ad hæc verò, vbi rapta est &
in sublime eleuata, dum circūfertur & ad aerē permiscetur, E
quod turbidum est in ipsa, ac noctem refert, id excernitur, ac
decedit, & fit aer, & nebula. Quod verò tenuissimum est ac
leuissimum in ipsa, hoc relinquitur ac dulcescit, dum à Sole
urit ac coquitur. Fiunt autē & alia omnia quæ coquuntur
semper dulcia. Quandiu igitur dispersa fuerit, & nondū con-
gregata, fertur sublimis. Vbi verò coaceruata fuerit, ac si-
mul congregata derepente à ventis inter se aduersariis: tunc
deorsum prorumpit, quæ parte plurima collecta fuerit, Tūc
enim hoc magis fieri verisimile est, quū nebulas à vento sta-
bilitatem non habente concitatas ac procedentes, derepente
ventus cōtrarius ac aliæ nebulæ reliserint: atq; tunc quidem
prima ipsius pars congregatur, quæ verò à posteriore parte
sunt, insuper accedunt, & sic crassescunt, & nigrescunt, ac si- F
mul congregantur, & præ grauitate deorsum prorumpūt, &
pluuiæ fiunt. Atq; hæ quidem aquæ optimæ sunt secundum
hanc rationem. Verū opus habent vt decoquantur, ac exco-
lentur. Sin minùs, odorem prauum habent, & rauedines &
vocis grauitatem bibentibus inde accedere par est. At verò
aquæ ex niue ac glacie fientes, omnes malæ sunt. Quū enim
semel concretæ fuerint, non amplius in pristinam naturam
restituuntur. Sed quod quidem in ipsa clarū ac leue, & dulce
est, excernitur ac disperditur. Quòd verò turbidissimum est
ac ponderosissimum, relinquitur. Hoc verò cognoueris hoc
modo. Si enim volueris hyemis tempore, vasculū certa aquę
mensura infusa, sub dio exponere, quo maximè congeletur:
deinde postridie in locum calidum deportatum sinere, quo
maximè

- A maximè glacies liqueſcat, & vbi exoluta fuerit, aquam metiri: reperiēs aquam multo pauciorē. Atq; hoc ſignum eſt, quòd à cōgelatione id quod leuiſſimum ac tenuiſſimum eſt diſperditur, & non quod grauiſſimum ac craſſiſſimum exiſtit. Non enim hoc diſperdi poterit. Hac igitur de cauſa has aquas, quæ à niue ac glacie eliquantur, peſſimas eſſe puto ad omnes res: Itēque eas quæ ad has ſequuntur. Atque ſic quidē de pluuialibus, & nivalibus, ac glacialibus aquis res ſe habet. Calculo verò maximè laborāt homines, & ex rheum affectionibus, & vrinæ ſtillicidio, & coxendicu morbo corripuntur, & herniæ fiunt, vbi aquas omnigenas bibunt, & de magnis fluminibus in quæ alia deferuntur: & de ſtagno, in
- B quod fluxiones multæ ac omnis generis deueniunt. Et qui aquis inuectitiis vtuntur, quæ ex longo, & non breui locorum interuallo afferuntur. Non enim fieri poteſt, vt alia aqua ſimilis ſit alijs. Sed aliæ dulces ſunt, aliæ ſalſæ, & aluminosæ, aliæ de calidis fluunt. Vbi verò hæ ſimul inter ſe miſcentur, diſſident: & quæ fortiſſima eſt, ſemper ſuperat. Præualet autem non ſemper eadem, ſed aliàs alia. Sed & ex vêtis, alijs quidē Boreas robur exhibet, alijs verò Auſter, & de reliquis eadē ratio exiſtit. Talibus igitur neceſſe eſt limum & arenā in vaſis ſublidere, & ab his ſi potentur, morbi prædicti fiunt. Quòd autem non omnibus, cōſequenter declarabo. Quorum quidē alius ſatis fluida eſt ac ſana, & veſica non ardens, neq; ſtomachus veſicæ valde coardecit, hi facile vrinam eiiciunt, & in veſica nihil ipsis congregatur. Quorum verò alius ardēs ac feruida fuerit, in his neceſſe eſt etiam veſicam idem perpeti. Quū enim magis quàm pro natura fuerit calefacta, ſtomachus ipſius inflamatur. Vbi verò hæc perpetitur, vrinam non dimittit, ſed in ſeipſa concoquit & adurit: & quod quidē tenuiſſimum in ipſa eſt, excernitur: & quod puriſſimum eſt, tranſit & emingitur. Quod verò craſſiſſimum ac turbidiſſimum eſt, coaceruatur, & cōcreſcit primū quidē parum, deinde maius fit. Dū enim voluitur ab vrina, quicquid craſſum compactum fuerit, ad ſeipſum adaptrat, atque ſic augeſcit, & in roſum concreſcit. Et quum vrinā emittit, ad veſicæ ſtomachum allabitur ab vrina impulſum, & vrinæ emiſſionem impedit, & dolorē vehemētem exhibet. Quare pueri calculoſi fricant ac trahūt pudēda. Videtur enim ipsis cauſa
- miſc

Hippocratis Liber

mictionis eo loco esse. Signum autē eius quod hęc ita se ha-
 bent, hoc est: Vrinam splendidissimam calculosi mingūt ad
 similitudinem feri, eo quod id quod crassissimū est ac bilio-
 fissimum isthic manet, & coaceruatur ac cōcrescit. Et pleri-
 que sanē hoc modo lapidem & calculū contrahūt, sit autem
 pueris etiā ex lacte, si nō salubre id fuerit, sed valde calidum
 ac biliosum. Ventrem enim percalefacit, & vesicam. Quare
 vrina dū aduritur, hęc patitur, & sanē sentio melius esse pue-
 ris vinū quā aquosissimū dare. Minus enim venas adurit
 ac resiccat. Mulieribus autem pudendis non similiter con-
 tingit. Meatus enim vrinæ in vesica breuis est & amplus, vt
 facilē vrina impellatur. Neq; enim manu pudendum fricat,
 veluti masculus, neq; vrinē in vesica meatū contingit. Ad pu-
 enda enim perforatus est. Et quia meatus sunt ampli, etiam
 plus bibūt quā pueri. Et de his quidem sic res se habet, aut
 his quā proximē. Ceterū de annis hoc modo considera-
 tione facta quis cognoscere possit, qualisnam annus sit futu-
 rus, salubrisne an morbosus. Si enim secundum rationē fiant
 signa in astris occidentibus ac orientibus: & in autūno aquæ
 fiant: & hyems sit moderata, & neq; valde clemens, neq; mo-
 dum excedēs frigiditate: & in verē ac æstate tēpestiuē plu-
 uat: sic sanē saluberrimū esse annum par est. Si verō hyems qui-
 dem sicca sit, & borealis, ver autē pluuiosum & australe, ne-
 cesse est æstatē febriculosam fieri, & lippitudines inducere.
 Quum enim æstus derēpente accedat, terra humida existēte
 à vernis imbribus, & ab austro: necesse est æstū duplicatum
 esse, & à terra irrigua ac calida, & à Sole vrente: quū ventres
 in hominibus nondum cōstricti sint, neq; cerebrum resicca-
 tum. Non enim fieri potest, quū ver tale existat, vt corpus &
 caro non humore fluida fiant, adeò vt febres acutissimæ in
 omnes irruant, maximē autem in pituitosos. At dysenterias
 par est fieri & mulieribus, & viris humidioribus. Et si quidē
 circa canis exortum accedat aqua ac tempestas, & Etesia spi-
 rauerint, spes est cessationis, & vt autumnus salubris fiat. Sin-
 minūs periculum est ne & pueri, & mulierēs moriantur: Mi-
 nime verō senes: & ne qui superstites euadunt, in quartanas
 desināt, & ex quartanis in hydropas. Si verō hyems australis
 fiat, & pluuiosa, & clemens, ver autem boreale & siccum &
 tempestuosum, primū quidem mulieres quæ uterum gestāt,
 & par

Prognosti-
 ca ex tem-
 porū qua-
 litate. —

- A** & partus ipsis ad ver instat, abortum facturam esse verisimile est. Quæ vero etiã pepererint, impotentes ac morbosos pueros parere, ita vt aut statim pereant, aut tenues & debiles, ac morboſi viuant. Atq; hæc quidem mulieribus, reliquis verò dysenterias & lippitudines siccas: & aliquibus defluxiones à capite in pulmonem. Pituitosis igitur dysenterias fieri verisimile est, & mulieribus, pituita de cerebro defluente, propter naturæ humiditatē. Biliosis verò lippitudines siccas, propter carnis caliditatem ac siccitatem. Valde autem senibus defluxiones, propter raritatem ac eliquationem venarū, adeo vt aliqui quidē derepente pereant, aliqui verò semisiderati, aut dextra aut sinistra parte fiant. Quum enim hyems sit australis, & pluuiosa, ac calida, & corpus non adstringatur neq; venæ, vere accedente boreali & sicco ac frigido, cerebrū postquam ipsum dissolui ac purgari contigit, à grauedine ac raucedine, tunc simul cum vere stabilitur ac cōstringitur. Quare derepente æstate accedēte, & ardore ac mutatione contingente, hi morbi incidunt. Et intestinorum leuitates & aqua intercus ferè reliquis morbis desinentibus superueniūt, quū non queant facili ventriculi à cōcepta humiditate exsiccari. Si autem æstas pluuiosa sit & austro multū perfletur, similisque sequatur autumnus, necesse est hyemem morbidam esse, & his qui pituita abundant, & qui quadragesimum annum exceſſerunt febres ardentes fieri verisimile est, qui verò bile abundant, costarū inflammationes & pulmonis, pleuritis ac peripneumonias dictas. Si verò æstas sicca existat, & borealis, sequens verò autumnus pluuiosus & australis, capitis dolores ad hyemē expectare conuenit, & cerebri corruptiones, ampliūque raucedines, grauedines, & tusses, aliquibus etiam tabes. Quod si borealis sit autumnus ac siccus, ac neque sub caniculam, neque sub Arcturi occasum pluuiosus, cōfert pituitosis natura, & maximè qui natura sunt humida, & mulieribus. Biliosis autem infestissimum hoc tēpus existit. Valde enim exsiccantur, acciduntq; eis lippitudines aridæ, & febres acutæ, ac diurnæ, & aliquibus bilis atra, liquidum quod liquidissimum & aquosissimum in bile est consumitur: densissimum verò & acerrimū relinquitur, quod idem accidit secundum eandem rationem & circa sanguinem, unde hi morbi his accidunt, pituitosis autem hæc omnia commoda

moda sunt. Exsiccantur enim & in hyemem perducuntur, mi-
 nime humecti, sed resiccati. Hac igitur si quis mente concipi-
 et & considerabit, is præcognoscet plurima omnino quæ
 Mutationes ex huiusmodi mutationibus sint futura. Maximè autem ob-
 temporum seruare oportet magnas temporum mutationes, ut neq; me-
 obseruandæ. dicinas in illis libentes exhibeamus, neq; vramus quæ circa
 ventrem, neque secemus, priusquam prætereant dies decem
 aut plures, & non pauciores. Periculossima sunt etiã ambo
 solstitia, maximè verò æstiuum. Periculosum etiam æquino-
 ctium vtrunque, magis verò autumnale. Oportet autem &
 Canicula. astrorum exortus considerare, præcipue canis, deinde arctu-
 Arcturus. ri, & Pleiadum occasum. Morbi enim in his maximè diebus
 Pleiades. iudicantur, aliique perimunt, alij verò desinunt, aut in aliam E
 speciem, aliūque statum transmutantur. Et circa hæc qui-
 dem, sicut dixi, habet. Volo autem & de Asia & Europa de-
 Differentia monstrare, quantum differant inter se per omnia, & de gen-
 inter Asia tium formis quid distent, & nihil inuicem simile habeant.
 & Europã. Verum de omnibus si quis dicere velit in immensum excre-
 sceret sermo, quare de maximis, & plurimum differentibus
 diuersitatibus dicam, quantum saltem mihi in ea re est com-
 pertum. Ac dico quidem plurimū differre Asiam ab Europa
 secundum naturas omnium ex terra nascentium, itēq; ho-
 Pulchriora minum. Longè enim pulchriora & maiora omnia nascuntur
 maioræque in Asia. Estque regio ipsa, hac nostra multo mansuetior, sunt
 sunt Asia- etiam hominū mores benigniores & cultiores. Causa verò
 na, & cur. horum est temporum anni temperata mixtura. Siquidem in F
 medio solis exortu sita est ad aurorã, à frigiditate ac calidi-
 tate omni remotior. Incrementum autem & benignitatē in-
 de proficisci omnibus in confesso est, quū nihil sit præcellens
 & cogens violenter, sed per omnia æqualitas vigeat, quan-
 Varietas quam non habeant vbiq; per omnē Asiam omnia secundum
 rerum in eundem modū. Quæcunq; enim in ea regio in medio sita est
 Asia. calidique & frigidi, ea omnium fertilissima existit, & arbo-
 ribus refertissima & maximè serena, aquisque vtitur & cœ-
 Cæli ele- lestibus & ex terra promanantibus. Neq; enim à calore com-
 mētia & so busta est valde, neq; à squalore & aquarū inopia exsiccatur,
 li vbertas neq; à frigore oblæditur. Verum austris perflatur & irrigua
 in Asia. est, tum propter imbres multos, tum propter niues. Fructus
 autē suo tempore maturos multos in ea nasci par est, siue ex
 sparsis

- A sparsis seminibus hi proueniant, siue terra ipsa per se sponte producat eorum plantas, quarum fructibus utuntur homines, eas ex agrestibus cicures & domesticas facientes, & pro commoditate sua transplantantes. Pecora etiam ipsa pleniora proueniunt, quae & pariunt saepius & pulcherrime educantur. Quin & homines habitiores esse ac specie pulcherrimos, & magnitudinis eximiae, minimeque differentes, quantum ad formam ac corporum proceritatem attinet, constat. Certumque est hanc regionem proximè accedere ad naturam ac temperaturam optimae constitutionis, verum virilitatem, laboris Asiaticorum
poris robo-
re non pra-
stant. tolerantiam, ac audaciam non verisimile est huic naturae in-
nasci, Sicut neque eiusdem neque diuersi generis constantes
- B ac perpetui sunt amatores. Vincit enim in ipsis voluptas, quae ratio est multiformes generari partus, praecipue in feris. Atque sic quidem de Aegyptiis ac Libycis mihi habere videtur. Qui verò ad dexteram hyberni ortus solis usque ad Maotidem paludem habitant (hic est enim Europae & Asiae terminus) Europae &
Asiae termi-
nus.
Gentes cur
inter se dif-
ferant. sic habent. Multo maior diuersitas est inter illas ipsas gentes quam de quibus iam dixi, quum propter varias temporum mutationes, tum ob regionis naturam. Habet autem eodem plane modo, quemadmodum & circa aliorum hominum terras accidit. Vbi enim tempora magnas mutationes faciunt & frequentissimas, illic & regio agrestis & maxime inaequalis existit, inueniuntque & montes plurimos & densos, itemque campos & prata. Vbi autem non valde variant tempora, illic aequalissima regio est, quod idem & de hominibus ipsis est intelligendum. Si quis enim rectè consideret, videbit quorundam naturam, montanis, syluosis ac asperis locis similem esse, aliorum verò aquosa ac exilia loca referre: sicut quidam pratorum ac paludum naturam praeseferunt, atque alij sunt à quorum planitiebus nudisque ac siccis terris constitutio similis existit. Tempora enim quae formarum naturam variant, sunt diuersa: quum ergo inter sese fuerint maxime diuersa, varias & multiplices formas producant. Porro quae parum inter se differunt gentes relinquam, Quae autem plurimum non natura solum, sed & legibus & consuetudinibus discrepant, de illis referam quomodo habeant. Ac primum omnium de Macrocephalis, quum nulla omnino alia gens sit, quae similia capit a habeat. A principio quidem consuetudo in causa fuit, ut
- m tam

Hippocratis Liber

tam longis capitibus essent. Nunc autem natura ipsa cum **D**
 consuetudine conspirauit, Siquidem generosissimum apud
 eos putatur, caput habere quàm maximè longum: consuetu-
 dinis autem hoc initium fuit. Quum recēs infans natus est,
 caput eius adhuc tenerum ac molle existēs, quàm celerrimè
 constringunt manibus, coaptantēsq; cogunt in longitudinē
 augeri, quin & vinculis connectunt, ac aptis instrumētis col-
 ligant, quo rotunditas capitis prohibeatur, ac longitudo au-
 geatur. Ea cōsuetudo tantum effecit vt eiusmodi natura ca-
 pitum existeret. Temporis verò progressus natura quoq; ta-
 les produxit, vt non esset necesse consuetudine priore coge-
 re. Quum enim femen genitale ab omnibus corporis mem-
 bris procedat, à sanis quidem sanum, à morbidis morbosum **E**
 fiatque vt ex caluis calui gignantur, ex cæsiis cæsi, & vt plu-
 rimum distortus distortum generet, eadēmq; ratio sit circa
 reliquas formas, quid prohiberet vt non ex Macrocephalis
 Macrocephali gignerentur? Nunc autem non nascuntur ita
 magnis capitibus quemadmodum prius, quum consuetudo
 nō amplius daret, per incuriam hominum intercepta. Et de
 his quidem hæc sufficiant. De illis autem qui Phasim acco-
 lunt adiciam. Regio eorum palustris est, calida, aquosa &
 densa, imbrēsque in eam decidunt omnibus temporibus &
 magni & impetuosī, homines verò ipsi vitam agunt in palu-
 dibus, domōsq; ligneas, & ex arundinibus in ipsis aquis ha-
 bent extructas, neq; multum inde prodeūt, vt adeant vel em-
 poria vel vrbes. Verū nauiculis ex vno ligno fabrefactis per-
 meant sursum ac deorsum, habent enim fossas ac ductus a-
 quarum plurimos. Bibunt autem aquas calidas & stagnan-
 tes, quæ & à sole sunt putrefactæ, & ab imbrium casu auctæ.
 Ipsēq; fluuius Phasis omniū fluuiorū stagnantissimus est, &
 qui lentissimo cursu profluat: fructus autē qui illic nascūtur
 omnes insalubres sunt, euirati imperfectiq; præ multitudine
 aquarum, neque vnquam maturescunt. Atq; quum multus
 aer ab aquis regionē occupet, ob hanc ipsam causam, quòd
 ad formā ac corporū speciē attinet, Phasiani sunt à reliquis
 hominibus longè diuersi. Sunt enim magnitudine ingenti,
 ac corpulentia valde excellēti, neq; iuncturæ eorū vllæ neq;
 venæ comparent, pallidūmq; præ se ferunt semper colorem,
 quemadmodum qui regio sunt obnoxij morbo; loquuntur
 autem

Phasis ac-
cola.

Phasis qua-
liter fluat.

Phasiani
quales.

A autem ut si qui alij omnium hominum gravissimè, nimirum aere videntes non sereno, sed obscuro, & maximè humectato. Sunt insuper ad laborem à natura ipsa segniores, anniq; tempora non varias habent, neque ad æstum, neq; ad frigus permutationes. Ventis autem eis sunt plurimi austrini omnes, præter unum eius regionis proprium, & indigenam, qui aliquando violentior ac molestior calidus existens spirat, quæ Cenchrona patrio vocabulo appellant. Verum Boreas non valde ad eos pertransit, quod si aliquando spiret, debilis tamè existit ac valde lenis. De natura ergo ac diuersitate & forma eorum qui Asiam & Europam incolunt, ita habet. Quod autem timidiore, effeminatione, ac imbelles præ Europæis

Cur Asiani imbelles.

B Asiani existant, moribusq; mansuetiores, tempora ipsa anni in causa sunt, quæ non magnas permutationes faciunt, neque caloris, neque frigoris, sed semper æqualia permanent: unde neq; mentes stupore percelluntur, neque corpora fortè transformationem incurrunt. A quibus verisimile est iram exasperari, cognitionemq; & calorem amplius excitari, quàm si semper in eodem statu quis persistat. Mutationes enim sunt quæ hominis mentem semper excitant, neque sinunt quiescere.

Mentēque excitent.

Asiani cur non bellicæ.

Propter quas sanè causas imbelles vniuersum Asianorum genus existit, atque adhuc amplius propter leges. Multò maxima enim Asiæ pars sub regibus est. Vbi autem non in sua potestate viuunt homines, neq; sui iuris sunt, sed dominis subiecti, ibi non multum curiosi sunt quo modo se ad bellum adparent, imò magis hoc curant, ut ne bellicosi videantur. Pericula enim eis non æqualia instant. Nam hi in militiâ proficisci, laboresque perferre, ac mortem oppetere pro dominis suis coguntur, relictis interim domi liberis, vxoribus ac reliquis amicis: atq; siquidem viriliter & feliciter bellum gesserint, dominis inde comoda accedunt, eorumq; facultates inde augentur. Verum ipsis præter pericula & cædes nihil demetitur. Proinde neque his hominibus regionem frequenter habitatam esse necesse est, Imò eam propter inertiam bellicam ac otium à plerisque relinquunt. Ut enim quisq; maximè à natura virilis & magnanimus est, ita plurimum eius animus leges auersatur: cuius rei magnum indicium vel inde habere licet, Quod quicumq; in Asia Græci itemq; Barbari dominis non subsunt, sed iure suo degunt, sibiipsisque omnes labores

Fortes, leges auersantur.

Hippocratis Liber

lucrificiunt, illi bellicosissimi omnium existunt. Periclitantur enim ipsi sibi, virilitatisque premia ipsi reportant, sicut timiditatis ac ignaviae poenam luunt pariter. Inuenias autem & Asia nos ipsos inter se plurimum differentes, generosiores alios, alios degeneres, quorum omnium causa ad temporum mutationes est referenda, quemadmodum & in precedentibus dixi.

Quare non
nulli ab aliis
differant.
Scythica
gens.
Maotis pa-
lus.
Sauromatae.

Atque sic quidem habet in Asia. In Europa vero genus hominum est Scythicum, circa paludem habitans Maotim, quod a reliquis gentibus maxime differt, Sauromatae appellantur, Horum feminae equites sunt, arcubus utuntur, ac sagittas iaculantur ex equis, cum hostibus congregantes, dum virgines existunt, neque deuirginantur prius, quam hostium tres confecerint, neque prius maritis cohabitant, quam sacra deo patrio more fecerint. Quod si qua sibi virum acceperit, ab equitatu libera est, nisi necessitas cogat communi expeditione omnes exarmari. Dexteram autem mammam non habent, Nam puellis adhuc infantibus matres aereo instrumento in hunc usum parato, igneque candefacto eam auferunt, ac exurunt, ne iterum succrescere contingat, atque ut omnis vis ac robur in dextrum humerum & brachium deferatur. Caterum reliqui Scythae quod ad formam adtinet, ipsi sibi similes sunt, aliis dissimiles. Sicut quoque Aegyptij ipsi inter se, praeterquam quod hi a vehementi calore, illi ab intenso frigore sunt compressi. Verum solitudo quae Scythica dicitur, in planitie sita est, pratis abundans, sublimis & mediocriter aquosa. Sunt enim flumines in ea magni, in quos aqua ex capis per riuos deducitur. In hac itaque Scythae degunt, qui Nomades vocantur, propterea quod nullas habeant domos, sed in curribus habitant. Sunt autem currus ex quibus minimi quatuor rotis, reliqui sex circumaguntur. Sunt etiam luto obturati ac instar domorum fabrefacti, aliqui simplici, aliqui etiam triplici tabulato, Unde robur illis inest aduersus omnes iniurias aquarum, niuis ac ventorum propellendas. Trahunt currus aliquos quidem bouum paria duo, aliquos tria, atque hi cornibus carent, quum praefrigore regionis cornua eis non enascantur. In his itaque curribus degunt mulieres. In equis autem vehuntur viri. Sequuntur autem simul oves, boues & equi. Tandiu deinde in vno subsistunt loco, dum sufficit ipsis pecoribus pabulum, quo deficiente in aliam regionem commigrant.

Aegyptij
cur inter
se similes.
Scythae.
Nomades
quomodo
viuant.

A grant. Vescuntur autem ipsi carnibus coctis, bibuntque lac equinum, comedunt etiam Hippacen, id autem est caseus Hippace equinus. Haecenus ergo de victu & moribus diximus, tempo quid. ribusque anni ac formis, quae à reliquis hominibus longissime sunt Scythiae genti diuersae. Ipsa enim sibi inter se gens similis existit quemadmodum & gens Aegyptiorum. Minime autem foecunda ea gens est, regioque ipsa minimas feras nutrit, neque numero, neque specie insignes. Sub ipsis enim Vrsis Riphæisque montibus sita est, vnde Boreas spirat, Solque ipse supremo aestiuo solstitio deficiens proxime accedit, ac tum quidem exiguu tempore calefacit. Neque vero venti à calidis locis spirantes valde ad eam regionem penetrant, nisi parumper & debiles. Verum ab Vrsis venti procedentes sunt illic perpetui frigidi à niuib, glacie imbribusque condensati. Qui nunquam à montibus decedunt, ut propterea etiam inhabitabiles fiant. Aerque ipse totum ferè diem nubilus campos occupat. Ipsi verò in humidis locis degunt. Et ferè perpetua est ipsis hyems, aestas autem paucissimis diebus atque illis non valde multa, Sunt enim planities eminentiores, & nuda, neque vllis montibus circumseptae, sed ferè sub ipsis Vrsis accliuës. Neque fera nascuntur illic magnae, sed quales possibile est sub ipsa terra cõtegi. Prohibet enim hyems & nuditas terre, quae & diuerticulis & umbraculis caret, propter temporum anni mutationes, neque multas neque fortes, sed similes semper, vel parum admodum diuariantes, vnde & formas corporum inter se similes habent, quum eodem vtantur victu & amictu, estatis & hyemis tempore, attrahuntque aerem aquosum cõdensatum, aquam insuper bibentes à niuib & glacie resolutam, nullo etiam corporis exercitio accedente, quum non verisimile sit corpus aut animum vllis exercitationibus apta fieri, vbi non mutationes temporum sunt fortes. Propter quas causas formae eorum sunt crassae & carnosae, Iuncturae verò humectae & inefficaces, ventriculi que humidi omnes, maxime omnium tamen inferior aluus, Nequit enim ipsa exsiccari in eiusmodi quum regionis, tum naturae & temporis constitutione. Sed pinguedine & nuditate carnis formae inuicem sunt similes, masculorum masculis, & foeminarum foemellis. Tempora enim quum sint inter se similia, nullas corruptiones, neque malignitates inferunt.

Riphæimō
tes.Qui venti
hic spirent.Cur nō ma
gna anima
lia illic gi
gnantur.Cur omnes
hi carnos
pingues
que.Cur inter
se dissimi
les.

Hippocratis Liber

in feminis genitalis mixturam ac compactionem, nisi quid-
dam aliud fortuito vel casu contingat, aut à morbo. Magnum
autem argumentum humiditatis corporum Sytharum hoc
exhibebo. Multos enim ipsorum, præcipue qui Nomades sunt,
reperias exustos humeros ac brachia habentes manuumque
iuncturas, pectora, coxas, & lumbos, nullam sanè aliam ob cau-
sam, nisi ob humoris & molliciei naturæ detractiōem. Nam
neque arcus intendere, neque telum torquere possunt præ im-
potentia humiditatis humerorum. quum autem vruntur, hu-
mor ipse à iuncturis exoluitur, fiuntque corpora ipsorum va-
lidiora, melius nutriuntur, & magis redduntur articulorum
vsu potètia. Fluida verò fiunt ac lata primùm propterea quòd
fasciis non colligantur, quemadmodum fieri solet in Aegy-
pto. Deinde quòd non animaduertunt quomodocunque in-
ter equitandum equis insideant. Postremum etiam propter
desidiā perpetuā. Masculi enim eorum antequam potentes
fiant equos cōscendere, atque in illis vehi, plurimū temporis
desident in curribus, raroque prodeunt vt inambulent, pro-
pter exilia ac perpetuas circulationes. Muliebrium autem
corporum formæ ad miraculum vsque fluxæ existunt. Porro
Scytharum gēs fului valde coloris existit propter frigus in-
gens. Non enim vehemens accedit ad eos sol, à frigore verò
albedo, exurit & fit fulua. Neque verò possibile est fœcun-
dam esse eorum naturā, quum viri minimè cupidi sint cum
fœminis cōmisceri, ob nimiam corporis liquiditatem, ven-
trisque molliā ac frigiditatē, quæ causæ adparent minimè
viros ad coitum incitari. Accedit his lassitudo ex continua
equitatione cōtracta, quæ eos ad cōmistiōem reddit impo-
tentiores, atque hæ sunt causæ cur viri infœcundiores puten-
tur. Mulieres pinguedo carnis & humiditas steriles facit,
præ quibus vteri earum genitale semen nequeunt cōtinere.
Lunares namque purgationes eis non eueniunt quemadmo-
dum est necesse, sed minus & intempestiue per longius tem-
pus. Ipsūque ampliùs vteri os præ pinguedine concludi-
tur, vt nequeat semē suscipere. Sunt enim otiosæ & pingues,
ventrēsque earum frigidi & molles, vnde necessariò sequi-
tur non multum fœcundā Scytharum gentem esse, cuius rei
famulæ earū indicium exhibent. Nā hæ viris misceri pluri-
mum gaudent, in vteroque cōceptum cōtinent, propter corpo-
ris

Mulieres
scythæ mol-
lissimæ.

Quid con-
tinua equi-
tatio fa-
ciat.

In Scythia
cur mulie-
res steriles.

Sterilitatis
altera caus-
sa.

Aris exercitium frequens carnisque gracilitatem. Amplius autem plurimi Scythæ Eunuchi fiunt, & muliebria officia obeunt, instarque fœminarum omnia faciunt, & loquuntur, vocanturque hi effœminati. Et regionis quidē incolæ causam ad Deum referunt, coluntq; hos ipsos homines & adorant, sibi ipsis timentes ne quid tale accidat. Mihi verò affectus diuini quidem esse videntur, sicut & reliqui omnes, neque vllum aliquem alio esse diuiniorē aut humaniorē, sed diuinos omnes, verum vnusquisque eorum suam propriam habet naturam, neque aliquis citra naturam accidit. Quare quomodo hic affectus contingat, vt mihi videre videor, narrabo. Ab equitatione ipsa diuturni eos corripunt

Barticularum dolores. Nimirum propendentibus semper ex equis eorum cruribus, deinde claudi fiunt, contrahunturque coxendices quum inualuerit morbus. Medicantur autem sibi ipsis hoc modo, A principio morbi vtranque venam retro aures incidunt, quo facto sanguine multo promanante, somnus eos corripit præ imbecillitate, sicque obdormiscunt: quorum quidem aliqui depulso somno sani exurgunt, aliqui verò minimè. Atque mihi sanè videntur ea medicatione seipsos perdere. Venæ enim retro aures sunt, quas si quis secet sterilitatem inferat his quibus secantur, quare id etiam ipsis ex earum incisione accidere certum est. Quando igitur postea vxores adeunt impotentēque se factos vident cum illis coire, primū quidem nihil molestius cogitant

Ctes quiescunt, quum autem bis aut ter, aut amplius frustra opus tentarunt, neque quicquam proficiunt, mox putant se Deum offendisse, in quem culpam reiiciunt, Induuntque se veste muliebri, palam se euiratos esse confitentes, ad mulierūque contubernia transeunt, earum opera tractantes. Hoc itaque maloditissimi Scytharum afficiuntur, minimè verò infimi. Imò qui maximè & genere & potentia præualent ex nulla alia, quàm continuæ equitationis causa hoc perpetiuntur. Pauperes verò minus, quum non multum equitent. Vnde si hac affectio aliis diuinior censenda esset, non nobilissimis, non ditissimis Scytharum ferè solis accideret. Sed esset omnibus, æqualiter peculiaris. Imò magis inuaderet pauperes circa cultum deorum negligētiore, si saltem gaudent dii in hominum admiratione

Quæ venæ
secæ steri-
lem red-
dunt.

Cur ditio-
res potius
quàm pau-
peres hoc
patiuntur.

Hippocratis Liber

ne constitui, & pro hoc beneficia hominibus retribuunt. Di-
uites enim sæpius diis sacra faciunt, victimas offerunt, sta-
tuas erigunt, coluntque, quum pecuniis abundant, pauperes
autem minus id faciunt, quum non habeant. Quin etiam
aliquando deos detestantur, qui eis opes non suppeditent, vt
verisimilius esset, pauperes ac parum abundantes hoc ma-
lo propter crimina sua puniri, quàm diuites & qui opibus
abundant. Verùm sicut & prius dixi, diuinus quidem hic
affectus est, secundùmque naturam accidit similiter vt alij
omnes, neque alia eius causa quàm ea quam dixi, Scythis
existit. Simili autem modo & reliquis hominibus euenit.

Continua
equitatio
vbique no-
cet.

Vbi enim frequenter & continuè homines equitant; ibi plu-
rimi à diuturnis doloribus articulorum, coxendicùmque; ma-
ximè & pedum corripiuntur, ad coitumque fiunt impoten-
tes, quæ omnia mala Scytharum genti adsunt. Atque pro-
pterea Scythæ omnium hominum minimè sunt ad coitum
valentes. Et quòd Anaxyridas (braccharū siue fœminalium
id genus est) semper habent, & plurimum temporis in equis
delides degunt, vt neque manu tractare pudenda liceat, atq;
præ frigore & lassitudine voluptatis ac iucunditatis coeun-
di obliuiscantur, neque prius aliud sibi faciendum putent,
quàm vt euirati fiant. Hactenus ergo de Scytharum gen-
te recensui. Reliquum autem in Europa hominum genus

Cur in Eu-
ropa homi-
nes inter se
dissimiles
sint.

valde inter se dissimile est & diuersum, tum quod ad ma-
gnitudinem adtinet, tum quod ad formam, atque id propter
temporum mutationes contingit apud eos magnas & fre-
quentes. Sunt enim eis calores vehementes, & hyemes for-
tes, pluuia multæ, rursùmque siccitas diutina, & venti plu-
rimi, ex quibus multæ & omnimodæ fiunt transmutationes.

Seminis ge-
nitalis va-
rietas va-
rias formas
reddit.

Neque à vero discrepat circa generationem has ipsas
mutationes sentiri, inque seminis genitalis coactione aliam,
neque ex eodem etiam eandem, æstatis pariter vt hyemis,
pluuioso vt sicco tempore, progigni. Eaque causa est, cur
putem Europæos magis quàm Asiaticos secundum corpo-
rum formas inter se discrepare, & magnitudines diuersissi-
mas in singulis adeo vrbibus prouenire. Plures enim corrup-
tiones contingunt in seminis coactione, quum tempora
frequenter variant, quàm si eadem sunt & similia. Eadè au-
tem morum ratio in vtrisque existit. Feritas, integritas, &

Cur (æui-
res in Euro-
pa.

audacia

A audacia à natura Europæis innascitur. Frequentes enim mentis percussiones feritatem inducunt, mansuetudinē contra & benignitatem extirpant. Quare etiam magnanimos magis eos qui Europam incolunt Asiā iudico. Siquidem similitudo & æqualitas segnitiam parit. Mutatio autem & animum & corpus ad exercitationē excitat. Augetur itaque à desidia & ocio timiditas, ab exercitio verò & laboribus crescit virilitas. Vnde bellicosiores quoque Europæi extant, non ob hanc solum causam, sed & propter leges. Non enim regibus obediunt quemadmodū Asiāni. Vbi enim sub regibus viuitur, ibi necesse est homines timidissimos esse, quem admodum & suprà ostendi. Seruitute nanque animi eorum pressi non libenter, neque volentes temere pro aliis se periculis exponunt. Europæi autem suo iure viuētes, quum pro seipsis pericula belli subeant, magna cupiditate feruntur, volentēque ac alacres difficultates omnes adgrediuntur, ipsique sibi ex re bene gesta præmia reportant, vt certum sit leges plurimum ad magnanimitatem conferre. Tota itaque & vniuersa res de Europa & Asia sic vt retuli habet. Ceterum Europa ipsa adhuc habet gentes inuicem differentes, non magnitudine & forma solum, sed & magnitudine ac fortitudine. Quæ verò in eis hanc diuersitatem faciant, in præcedentibus dixi dicāmq; amplius magis manifestè. Quicunque regionem montanam, asperam, nudam & nō aquosam incolunt, his mutationes temporum cōtingunt magnæ & diuersæ, vnde & hominum formas magnas progigni conuenit, qui & ad laborem & ad viriliter agendum à natura præstent, quibūque feritas & immanitas non mediocriter à natura sint congenita. Qui verò loca concaua, pratensia & æstuosa habitant, ventōque calidos plus sentiunt quàm frigidos, & aquis vtuntur calidis, hi magni quidem esse non possunt, neque bene cōpositi & longi ac erecti, sed in amplitudinem à natura producti carnosī sunt, & capillis nigris. Imò & ipsi toti nigri magis quam albi, & qui minus depiuita habeant quàm de bile. Virilitas autem & tolerātia laboris non æquē ipsis à natura inest, nisi consuetudo accedat, & hæc in eis efficiat. Quòd si flumina extent in ea regione, quæ stagnantes & pluuias aquas euehant, homines ipsi incolũes ac splendidi viuent. Si verò flumina desint, aquasque

Segnities
vbi magis
vigeat.

Europæi
cur bellico
siores quā
Asiāni.

Locorum
uarietas
varios homi-
nes creat.

Quæ flu-
mina salu-
bria.

m s

puteorum

Hippocratis Liber

puteorum stagnantes & olentes bibant, necesse est ab ipsis D
 Quales gi. illis aquis & ventrem lædi & splenem. Quicunque autem
 gnat. alta altam habitant regionem, planam, ventis expositā & aquo-
 regio. sam, eorū formæ magnæ ac inuicem similes & erectæ. Ani-
 Sterilis mi quoque eorum existunt mansuetiores, Qui verò macra,
 quales. aquis carentia, & nuda loca tenent, & quæ temporum mu-
 tationibus non sunt permixta, horum formas necesse est esse
 asperas & vegetas, flauas magis quàm nigras, mores etiam
 eorum rigidi sunt, pertinaces & contumaces. Vbi enim mu-
 tationes temporum cōtingunt frequentes, & plurimum in-
 ter se diuersæ, ibi & formas, & mores, & naturas reperias
 plurimum differentes. Temporū itaque varietates potif-
 Quales vbi limæ sunt, quæ naturam ipsam permutant. Deinde etiam E
 tempesta- regio in qua multæ variationes fiunt, postremum autem
 res variant. aquæ. Inuenias enim ferè semper & formas hominū & mo-
 Pinguis re res regionis naturæ compares. Nam vbi terra pinguis est &
 gio quos gi mollis, & aquosa, aquæ autem valde sublimes, ita vt æstate
 gnat. calidæ sint, & hyeme frigidæ, & temporum ratio aliàs pro-
 bè conueniat, ibi & homines carnosī, articulis non adparen-
 tibus, humidi, laboris intolerantes, & vt plurimum maligni
 nascuntur. Segnitiēsque & somnolentia eis inest multa.
 Sūntque ad artes tractandas crassi, non acres aut subtiles.
 Montosa Vbi autem regio est nuda, natura munita & aspera, quæque
 quales. & à frigore hyberno prematur, & à sole æstiuo exuratur, ibi
 duos & robustos, & articulis probè disiunctos, vegetosque
 & hirsutos reperias homines, & in quibus à natura laboris F
 tolerantia, & vigilantia inest. Quique mores habeant perti-
 naces, ad iram prōclines & contumaces, magisque feritate
 participantes quàm mansuetudine. Insuper ad artes etiam
 acutiores & plus solertes, & ad res bellicas gerendas aptio-
 res. Quin & omnia quæ à terra proueniunt, terræ ipsius na-
 turam resipiunt & sequuntur. Atque hætenus quidem maxi-
 mē contrarias corporum naturas & formas diximus, è quib-
 bus coniectura facta, si quoque reliqua consideraueris, nun-
 quam à vero aberrabis.

HIPP

40. y. Method. Cap. 12. lib. 94
HIPPOCRATIS

40. Hippoc
COILIBER DE FLATI-

BVS, IANO CORNARIO

MEDICO PHYSI-

CO INTER-

PRETE.

prob. aut
nel morbo.



VNT quædā artes, quæ illis quibus earum ^{Medicinæ} ^{qualitas.} cognitio contingit, multum laboris ac molestiarum exhibet: illis verò qui earum ^{usu} indigent, iucundæ ac vtilis existunt. Imò ignaris etiam ac plebeis hominibus commune quoddam sunt bonum. His verò qui eas exercet planè molestæ. Ex harum artium numero est & ea quæ medicina appellatur. Medicus enim oculis perlustrat singula pericula, contrectat etiam nulla voluptate, & ex alio malo proprias sibi demetit molestias. Aegrotantes autem artis beneficio, à maximis malis liberantur, à morbis, à doloribus, à tristitia, à morte. Omnibus enim his evidens medicina auxiliatrix reperitur. Huius autē artis quæ vilia vulgo putantur, cognoscere difficile est. Quæ verò alicuius preterij existunt, facile: atque vilia quidem soli medici norunt, vulgus ignorat. Non enim corporis, sed animi opera existunt.

C Quæcunque quidem manuum operam exigunt, ad ea consuetudine perueniendū est. Est enim ^{usus} ipse egregius manuum exercitator & magister. Verum de non adparentibus & difficillimis ægitudinibus planè opinio magis quam ars ipsa iudicat. In his ergo plurimum refert expertusne sit quis, an omni experientia carens. Vnum autem est horū omnium iudicium, hoc scilicet, Quæ tandem causa sit morborum, & quod principium ac quasi fons sit, ex quo corpori mala omnia scaturiant. Si quis enim causas corporis affecti probe cognouit, potens est valde ea adferre, quæ corpori commo-
dent, nimirum cōtraria corporibus morborum natura perspecta. Est enim maximè secundum naturā ipsa medicina. Quare statim ubi fames molestat, morbus fit. Quicquid enim

Leg. P. of

Vsus peritiave doctor & magister summus.

Morbi latentes grauesque opinionone non arte censentur.

Quid primum in morbis, & quæ medela.

Contraria tollunt contraria.

Hippocratis Liber

enim homini molestiā ac tristitiam infert, hoc morbus vo- D
 catur. Quod ergo est famis remedium? hoc scilicet quod fa-
 mem sedat, id autem facit cibus, eo ergo malum illud medi-
 candum. Amplius autem ubi sitis vrgeat, bibere compescit:
 & rursus, repletioni euacuatio, euacuationi repletio, labori
 quies succurrit, & quietis medelā ex labore reperias: atq; vt
 breuiter dicā, contraria cōtrariorum sunt medicamina. Me-
 dicina enim nihil aliud est nisi adpositio & ablatio. Ablatio
 quidem eorum quæ excedunt, adpositio verò eorum quæ de-
 ficiunt: qui autē istud optimè facere potest, is optimus medi-
 cus censetur, quantumque quis ab hoc præstando deficit,
 tantum deficit quoq; ab ipsa arte. Atque hæc quidem præter
 institutum futuri sermonis à me dicta sunt. Morborū autem E
 omnium vnus & idem modus est. Locus verò ipse eorū dif-
 ferentiam facit. Quare videntur quidē morbi inter se nihil
 simile habere, propter diuersitatem scilicet locorum, quum
 sit tamen vna morborum omniū & species & causa quoque
 eadem. Quæ autem hæc ipsa sit, in sermonis huius progressu
 manifestum facere conabor. Corpora enim omnia tum ho-
 minum, tum reliquorum quoq; animantium à triplici nu-
 trimento sustentantur. Horum autē nutrimentorum nomi-
 na hæc sunt, cibus, potus, spiritus. Ac spiritus quidem qui in
 corporibus sunt, flatus vocantur: qui verò extra corpora exi-
 stunt, aer. Qui sanè maximus est in omnibus quæ corpori
 accidunt & autor & dominus. Quare operæ precium est eius
 potentiam diligentius perspicere. Ventus enim ipsius aeris F
 fluctus & vnda existit. Quando igitur multus aer fortes flu-
 ctus facit, tum & arbores radicitus euelluntur, & mare vndis
 exæstuat, spirituum potentia ita cogente, & naues onerarias
 etiam & ingentes in altum disiciens. Talem itaque vim in
 ista exercet, etiam si oculis minimè sit conspicuus, & tantum
 consideratione cognoscatur, & effectū suo fiat manifestus.
 Quid autem sine hoc sit tandem? aut cui rei non adest?
 Omne enim quod inter cælum & terram est, spiritu reple-
 tum est. Hic & hyemis & æstatis causa est. In hyeme quidem
 frigidus & condensatus. In æstate autē mitis & tranquillus.
 Quin & solis & lunæ, & astrorū omniū cursus per spiritum
 procedunt. Etenim igni spiritus nutrimentum præbet. quo si
 ignis priuetur, viuere nō possit. Et solis perpetuum cursum,
 aer

Medicina
quid

602
ut

Loci mor-
bos disimi-
les faciunt.

Tria sunt
quæ corpo-
ra hominū
& anima-
lium cun-
ctorum su-
stant.

Vetus quid
& quid pos-
sit.

Spiritu ae-
rē cūcta
vigent.

A aer perpetuus & tenuis cōseruat. Verūm neque mare ipsum spiritus exors esse omnibus manifestū esse puto. Non enim viuere natantia animantia possent, si non spiritu participarent: quomodo autem participarent, si non per aquam & ex aqua spiritum adtraherent? Et Lunæ hic fundamentum est, & terræ vehiculum, neque quicquam vsquā est spiritu vacuum. Atque hactenus quidem quantum aer aliis commodet diximus. Mortalibus autem vitæ, & morborum ægrotis, solus is est autor. Tantæque omnibus corporibus spiritus necessitas extat, vt siquidē omnibus aliis abstineat homo, neq; cibum sumat, neque potum, possit tamen dies duos vel tres & plures ducere, Si cui verò spiritus in corpus viæ intercipiantur, in breui parte vnius diei intereat, vt vel hinc quāto vsui spiritus corpori sit liceat æstimare. Amplius autem ab omnibus operibus aliquando immunes quiescunt homines: multæ enim sunt mutationes in vita, verūm ab hoc opere nulla omnibus mortalibus animantibus requies cōtingit, vt cessent spiritū adducere, ac rursus exhalare. Vides ergo ex his quæ dixi quanta cōmunio omnibus animātibus in fruendo aere existat. Subiiciam igitur mox & illud, quod nō aliunde vnquā verisimile sit morbos euenire quā inde, si is aut plus, aut minus, aut cumulatior, aut morbidis sordibus inquinatior in corpus se ingerat. Sed hæc de vniuersa hac re dicta sufficiant. Ad ipsa nunc opera sermonem conuertens demonstrabo, omnes morbos ex hoc oriundos corporibus innas-

Spiritus
vsus quam
necessarius
sit.

B sci, ac generari. Primū autem à communissimo morbo febrili exordium sumam, & qui omnium morborū comes est: præcipuè tamen ex inflammatione & tensione abscessuū. Quod satis indicant sequētiæ offendicula, statim enim cum inflammatione inguinū abscessus & febris cōsequitur. Sunt autem febrium genera duo, vt hoc quoq; nunc attingā, quorum alterū cōmune omnibus pestis adpellatur, alterū propter malam dīxtam priuatim his contingit qui ea vtuntur, vtriusq; autem generis aer autor & causa existit. Communis ergo febris propterea omnibus accidit, quod eūdem spiritū omnes adtrahunt, fitque vt simili corpori similes spiritus similiter permixti, similes gignāt febres. Sed est fortasse qui dicat, Vt quid ergo non omnibus animantibus, sed alicui eorum generi incidunt hi morbi? Cui ego sic responderim, Differt corpus

Spiritus
semper trahitur vel
emittitur.

Morbi vnde.

Febrium
duo genera.

Communis
peculiarisque
febris causa.

pus

Hippocratis Liber

pus à corpore, natura à natura, & nutrimentū à nutrimento. D
 Non enim omni animantium generi eadem aut non confe-
 runt, aut commoda sunt, sed sunt alia aliis magis conuenien-
 tia. Quando igitur aer eiusmodi inquinamenti plenus est,
 quibus humana natura offenditur, homines agrotāt. Quan-
 do verò alteri cuiuspiam animantiū generi aer inconueniens
 est, tum morbus illud genus corripit. Qui ergo populares
 sint morbi haftenus dictum sit, & quare, & quomodo, & qui-
 bus, & vnde gignantur. Quomodo autē propter malam dia-
 tam febris accidat deinceps exponam. Est autem mala diēta
 haec. Primum quidem quum quis plures cibos, liquidos aut
 siccos ingerit in corpus, quā ipsum corpus ferre queat, neq;
 laborem aliquem ciborū saltem multitudini parē adiungit. E
 Deinde quum varios & dissimiles inter se cibos adsumit, se-
 ditionem enim mouent quæ sunt inæqualia, aliquāq; citius,
 alia difficilius cōcoquuntur. Cū multorum autē ciborum
 ingestione necesse est & multū spiritū ingredi. Omnia enim
 quæ eduntur & bibuntur, spiritus in corpus inferūt, aliquan-
 do plures, aliquādo etiā pauciores. Id autē inde manifestum
 fit, quòd plurimis eructationes post cibos & potus euenire so-
 lent, discurrete nimirū aere incluso, vbi per ruperit bullas
 quibus fuerat inclusus. Quādo igitur corpus cibis expletum
 est, ac spiritus quoque multitudo vehementer excellit, cibiq;
 ventri diu immorantur, quum præ multitudine exire ne-
 queant, & inferior venter vel alius ipsa sit obturata, per vni-
 uersum corpus permeant flatus, sanguinéque plenas corpo- F
 ris partes maximè petentes eas infrigidant: infrigidatis au-
 tem his locis vnde fontes & radices sanguinis prodeunt, per
 vniuersum corpus horror cōsequitur: vniuerso autē sangui-
 ne frigefacto, totū corpus horret. Quæ ratio est cur primum
 horrores ante febres corpus concutiant, quantoque maiore
 impetu multitudinis & frigiditatis ipsi flatus præcelluerint,
 tantò maior fit & horror, à pluribus videlicet & frigidiori-
 bus fortior, à paucioribus ac minus frigidis, minùs etiā for-
 tis. Cum horroribus autem & tremores corporis accidunt,
 secundum eundem planè modum. Sanguis enim præsentis
 horroris timore percussus concurrit, ac penetrat per omne
 corpus ad locos maximè calidos. Hi enim sunt eius saltus.
 Decedente itaque ab extremis corporis partibus sanguine,
viscera

Febris ma-
li nutrica-
tus.

Horroris
tremorisq;
caussa.

A viscera contremiscunt & carnes. Sunt autem quædam corporis partes sanguine plenæ, quædam verò exangues. Exangues itaq; propter frigus non tremunt, sed parumper commouentur quum calor ex eis defecerit. Sanguine autem abundantes propter sanguinis multitudinem & tremunt, & inflammationes suscitant. Nequit enim fieri ut sanguinis multitudo conquiescat. Hiatus etiam præcedere solet febres, siquidem

Hiatus.

multus aer coaceruatus, cumulatim supernè petens commouet ac diducit os, quum per hoc facillimus ei exitus pateat. Quemadmodum enim ab aquis in lebetes feruentibus vapor multus eleuatur: Sic & corpore calefacto penetrat per os aer conuolutus, & quadam vi erumpens. Amplius autem & articuli exoluuntur ante febres, calefacti enim nerui diducuntur.

B Quando autem cōgregatus fuerit cumulatim plurimus sanguis, calefit rursus ipse aer, qui antea sanguinè infrigidauit. Nimirum à calore multo victus, accensusq; ac velut igneus factus per omne corpus calorem spargit, cooperatè ei in hoc etiam ipso sanguine. Liquefit ergo quicquid ignea vis illa attigerit, fitque inde spiritus. Qui cum ad meatus corporis iruerit, sudores fiunt. Siquidem spiritus compactus in aquam transmutatur, & per meatus penetrans extra prorumpit, eodem plane modo, quo à feruentibus aquis vapor eleuatus, si obstaculum habeat, ad quod impingere oportet, pinguescit ac condensatur, guttæque destillant ab his corporibus quibus vapor ipse fuit impactus. Insuper autem & dolores ca-

Sudores
quæ creantur.

C pitis simul cum febre accidunt, cuius rei hæc causa est. Sanguinis transitus in capite magna angustia coarctantur. Repleti enim sunt multo aere. Cuius abundantia ac conclusio dolorem excitant in capite. Sanguis enim ipse natura calidus existens, vi coactus per angustam viam transire celerimè non potest, quum multa impedimento sunt obstacula, & oppilationes, quapropter etiam pulsus fiunt circa tempora, Hoc ergo modo, ut dixi, febres fiunt, & cum febribus dolores, ac aliæ quædam ægitudines. Porro sunt aliquæ aliæ infirmitates utpote voluuli, agitationes intestinorum, tormina atq; opilationes: quòd autem hæ ipsæ omnes à flatibus causentur, nemini puto non manifestum esse. Omnium enim horum causa est spiritus transitus. Nam is quum contingit locos teneros, inconsuetos, ac prius intactos, quemadmodum

Capitis dolor cum febre cur fiat.

Pulsus temporū cur.

spiculum

Hippocratis Liber

**Calor fo-
menti foris
appositi
quid fa-
ciat.**

**Distillatio-
nis causa.**

**Fauces quæ
exasperan-
tur, tussis
que fiat.**

**Sanguis cū
puerit pus
efficitur.**

spiculum infixum penetrās per carnem perrumpit, aliquan- **D**
do præcordia petens, aliquando ilia. Imò quandoq; vtraque
simul adstringens. Quare solent quidam calida fomenta extra
adhibentes dolorem mitigare. Rarefacto enim corpore à ca-
lore fomentum spiritus inde exhalat, vt quies inde aliqua &
mitigatio cōtingat dolorum. Sed dixerit fortassis quispiam,
Quomodo ergo fluxus generantur per ipsos flatus? Et quo-
nam modo sanguinis rupturarum circa pectus flatus autor
& causa existit? Opinor autem ego me ista per hæc manife-
stè declaraturum. Quum igitur venæ circa caput aere reple-
tæ sunt, primū quidem caput ipsum propter flatus inclusos
aggrauatur, deinde conuoluitur spiritus cum sanguine pro-
pter angustiam viarum, tenuissimum autem ipsius sangui- **E**
nis per venas excluditur, atque id ipsum tenuissimum liqui-
dum quum coaceruatur, per alios meatus fluit, & vbi tādē
cumulatim progrediens constitit, ibi constituitur & mor-
bus. Si itaque ad oculos peruenerit, sequitur eorum dolor. Si
ad aures, morbus & illas occupat. Si ad nares, grauedinē ge-
nerat. Si ad pectus, raucedinē. Pituita enim ipsa acribus hu-
moribus permixta, quocunque proruperit, maximè in non
consuetos locos, eos exulcerat. Quòd si fauces teneras aliàs
fluxus petiuerit, eas exasperat: spiritus enim qui fauces ingre-
ditur, ad pectus vsq; procedit, ac rursus effertur per eandem
viam. Quum autem spiritus ingrediens in fluxum qui intus
est inciderit, tussis gignitur, & repellitur sursum pituita.
Quæ quum sic habeant, fauces exulcerantur, exasperantur **F**
& inflammantur, adtrahuntque calefactæ humorem de ca-
pite, caput autem rursus ab aliis corporis partibus adtrahēs
his transmittit. Quum igitur hic fluxus consuevit sic mana-
re, implentur meatus, & transmittūt in pectus. Acris autem
quum sit pituita carnem penetrans, exulcerat ac perfringit
venas. Ex quibus sanguis effusus in alienos sibi locos vbi mo-
ram traxerit putrescit, ac in pus conuertitur, & neq; sursum
potest conscendere, neque infra exire. Sursum non, nam non
facilis est via humori ad ardua prodire, sicut neque aliis re-
bus, quæ aliquam admixtam secum habent grauitatem. In-
fra autem procedere prohibet septum transfuersum. Quare
sanè contingit fluxum aliquem citra spiritum rumpi, & ali-
quando quidem sua sponte, quandoque etiam propter dolo-
res,

A res, Ac sponte quidem quum aer in venas vltro receptus sanguinis meatus coarctat. Multitudine nanq; sua compressus sanguis meatus perfringit, qua eius copia maximè prorūpit. Effusione autem eius facta, venæ rursus spiritu complentur, & ex eo dolor sequitur. Necesse est enim affectum locum spiritu occupari, aliâque dictis similia fieri. Rupturæ autem omnes fiunt hoc modo, Quum violentia quadam inuicè discedunt & finduntur carnes, fissurâ subtercurrit spiritus, ac dolore adfligit: quum autem ipsi flatus carnes pergressi, meatus corporis rarefecerint, sequitur post flatus humiditas, cui viam iam antea aer præstrauit. Irriguo itaq; corpore ab humiditate facta, liquefiunt carnes, tumoresq; in suras descendunt, atq; morbus fit, qui aqua intercus adpellatur. Maximū autem signum est, morbum hunc à flatibus generatum esse, quòd iam sæpe aliqui hoc malo affecti exoluti sunt, & ab aqua euacuati. Atq; his quidē subitò aqua ex ventre prorumpens multa adparet, post morā autem paucior fit. Cur verò hoc fiat satis manifestum est. Nam primū subitò prorumpens aqua aere plena est, is tumorem ac aceruum præ se fert ingentem, cū autem aeris spiritus euauerit, remanet planè eadē aqua, & adparet quidem paucior, verū penitus eadem existit. Adiciam autem aliud adhuc signū. Si quis vniuersum ventrē penitus euacuet, non tres procedunt dies rursus plenus fit. Quid ergo aliud quod impleat, putandum est quā spiritus? Quid enim aliud tam repētè impleisset? Nā neq; tantum potuum in corpus ingestum est, neque carnes

Locus affectus spiritu vexatur.

Scissuræ carnis fragmentave quæ fiant & hydrops.

B
C
in causa esse possunt, utpote antea liquefactæ. Super sunt autem ossa, nerui, chordæ, fibræ, à quorū nullo vllum aliquod aquæ augmentū potest prouenire. Ergo quomodo aqua intercus fiat iam sit dictū, quod verò stupor attonitus vel sideratio à flatibus fiat, deinceps demonstrabo. Cū ergo flatus frigidi multi penetrent ac inflēt carnes, partes corporis stupidae fiūt, & siquidē plurimi flatus per vniuersum corpus discurrat, totus homo syderatur. Si per partē, pars illa percutitur, atq; vbi abierint flatus, cessat & morbus, quādiu autem permāserint, cōsistit & morbus, idq; sic habere indicat perpetuus syderatorū hiatus. Videtur autē mihi amplius & sacrū adpellatu morbu ab ipsis flatibus gigni: à quibus autē rationalibus ego persuasus sum, illis ipsis & auscultaturos persuadere fiat.

Syderatio nis apoplexiæve causa quæ.

Sacer morbus comitialisq; qui fiat.

n re

Sanguis
quid possit

Somnus
qualis,

Insomnia,
Temulētia
quoque sen-
sus variat.

Sacer mor-
bus quā fiat
Sanguis
quid possit
& faciat.

Comitiales
cur nihil
sentiant.
Comitialiū
eur os spu-
mescat.

re conabor. Opinor autem inter omnia quę in corpore sunt, D
nihil magis ad prudentiā conferre, quā sanguinē. Hic ergo
quū in cōtanti habitu persistit, cōsistit & prudentia: sanguine
verò permutato, cōcidit simul & prudentia. Quod autē hęc
ita habeant. multa sunt testimonia. Ac primum quidem, qui
omnibus animantibus communis est, hęc cōfirmat somnus,
Quū enim corpus inuaserit somnus, sanguis frigescit. A natu-
ra enim somno frigefaciendi vis est. Infrigidato autē sangui-
ne, lāguidiores sūt eius meatus: quod hinc palā fit, quod cor-
pora adgrauata reclinantur. Omnia enim grauiā natura ad
fundum deferuntur: & oculi ardent, & prudentia permuta-
tur, opinionēsque peregrinę mentē occupāt & exercent, quę
sanē insomnia adpellantur. Quin & temuletis per ebrieta- E
tem aucto repēte sanguine percellitur animus, & in animo
prudentia, sūtque presentium malorum obliuiosi, ac futuro-
rum bonorum fecūda spe beantur. Possem autem plurima
eiusmodi cōgerere, in quibus sanguinis permutationes, ani-
mi quoque prudentiam permutāt. Siquidē igitur penitus totus
conturbatus est sanguis, penitus & prudentia prosternitur.
Affectus enim & cognitiones à consuetudine contingunt:
quū autem à cōsuetudine solita recedimus, aufertur nobis
prudentia. Dico itaque & sacrum morbum tum fieri, quū plu-
rimus spiritus per omne corpus vniuerso sanguini fuerit
permixtus: tum enim multę oppilationes fiunt multifaria
per omnes venas, quūque in crassiores & pleniores sanguine
venas aer prodierit, progressusque diutius maneat, prohibet
sanguinis cursum, atque alio quidem loco consistit, alio lētius
penetrat, alicubi adhuc tardius. Qua sanē inæqualitate tran-
situs sanguinis per corpus facta, omnigenę inæqualitates
per omne corpus contingunt. Omne enim corpus vndiqua-
que contrahitur ac turbatur, nimirum corpore partes suas
ad tumultum ac conturbationem sanguinis subministrante,
cōtinguntque ex sanguinis peruerfione, totius omnino cor-
poris subuerfiones. Eo enim quo corripiuntur à morbo, tem-
pore, neque sentiunt quicquā, neque audiunt quę dicuntur, neque
vident quę fiunt, neque vllōs aliquos dolores percipiunt. Sic
nanque aer conturbatus sanguinem turbauit, ac cōspurcavit.
Spumāque etiam per os illis excurrit, neque id ab re est. Nam
per iugulares venas aer transiens, penetrat quidem ipse, ad-
ducit

A ducit autem simul secum quod tenuissimū est in sanguine, idipsum quum humidū sit, multa permixtione albescit. Tenuēs enim mēbranas purus permeans aer pellucet, quapropter & albæ spumæ omnes adparent. Porro liberantur aliquādo huic morbo obnoxij, maximè accedēte hyeme. Quomodo autem id fiat, dicam. Quando variis laboribus exercitatum corpus calefactū est, calescit & sanguis, qui calefactus, rursus calefacit & flatus, hi verò calefacti, dissoluuntur & ipsi, & compactum sanguinem dissoluunt simul, proceduntq; ē corpore partim cū spiritu, partim cū pituita eiectioni. Deferuente itaque spuma, & consistente sanguine, tranquillitateque per omne corpus facta, quiescit etiam morbus.

B Quare, ut dixi, flatus ipsi verè omnium istorum morborum omnimodæ existunt causæ. Cæteraque omnia quæ causæ videriqueant, vel hos adiuuant, vel consequenter post hos in corporibus morbos generāt. Haftenus ergo morborum omnium causas flatus esse demonstraui. Id enim à principio receperam me facturum. Recensui autem spiritum ipsum, quum in aliis omnibus rebus potentem, tum maximè in animantium corporibus plurimū posse. Deduxi autem sermonē usque ad morborum cognitionem, atque adeò ægritudinū singularum, in quibus verū argumentum huius sermonis est à me manifestatum. Quod si pergerem singula ægritudinum genera recensendo ampliū corroborare, longius quidem sermo ipse extenderetur. Verus autem nihilominus futurus esset, & qui fidem suam omnibus probaret.

Flatus
quid fa-
ciant.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE MEDICA-

MENTIS PURGANTIBVS,

IANO CORNARIO ME-


DICO PHYSICO IN-

TERPRETE.

*

n 2

MED



EDICAMENTORVM purgantiũ res non D
ita se habet, quẽadmodum vulgò putatur.
Eodem enim medicamento purgantur &
non purgantur. Quandoque verò alia pur-
gat quàm quæ purgare solet. Aliquando ni-
mium purgat. Aliquando ea quæ debet, fa-
cit. Quare fieri non potest vt quis medicamentis confusus, ea
Cibi quare temerè exhibeat. Nam & cibos nos alentes, medicamẽta ef-
min⁹ nobis se putadum est, verũ minũ quàm illa. Homines enim qui
medentur. his rectè in cibo vtuntur, sani sunt: qui non rectè, agrotant:
qui verò modum excedunt, purgantur quidem velut à sin-
ceris medicamẽtis, verũ minũ & tardius quàm à sinceris
medicamentis. Clarum igitur est, quòd & hi medicamenta E
existunt. At verò hi tardiores, qui & familiares nobis sunt, &
quotidie in corpus ingrediuntur, si temerè & negligẽter ex-
hibeantur, temerè homines turbant, & quodammodo mor-
bos inducunt. Quin & sinceros & acidos cibos si quis citra
delectum ac inconsideratè exhibeat, nihil cõmodi perficiet.
Oportet igitur primũ biliosis dare quod bilem purgat. Pi-
tuitosis quod pituitam, hydropicis quod aquam, atrabilia-
riis quod bilem atram. Si verò extra hæc purgaueris, quæ
quidem purgari debent, nõ purgabis: quæ verò nõ debent, ea
euacuabis. Quare in vtranq; partem peccabis. Quum itaq;
pharmacũ alicui dare voles, siue deorsum siue sursum pur-
gũs, interrogare ipsum oportet, an prius biberit medicamen-
tum, & an alius ex deorsum purgãtibz cita sit, & celeriter F
obediat, aut dura. Et si citam ac facilem solutu esse dixerit,
mollioribus & paucioribus medicamentis opus habet. Si ve-
rò dura fuerit, fortioribus indiget. Idem modus in sursum
purgantibus requiritur. At si nõquam neque sursum, neque
deorsum, se purgatum esse dixerit, neque medicamentum
bibisse: cognoscere oportet an ad ea quæ sanus in corpus in-
geffit, alius deorsum solutu facilis fuerit, aut sursum versus
apposita ad vomitionem, & an ad repletionem aliquam al-
ui profluuium ipsi successerit. Hæc omnia interrogare opor-
tet, quo rectè consulere possis. Turpis enim est calamitas,
medicamento purgante dato hominem occidere. Quicun-
que igitur à febribz fortibus corripiuntur, his medicamen-
ta purgatoria dare non oportet, donec remiserit febris. Sin-
minus,

Medicamẽ-
ta pro natu-
ra cuiusq;
danda.
Pharmacũ
daturus
quid prius
agat.

Febricitan-
ti qualia
medicamẽ-
ta danda.

leguando

A minus, saltem non intra quatuordecim dies. Carnes enim ipforum & ventres, quum calidi sint, medicamentum assument, & nihil depurgantur, & febris maior fit, & color eueritur, & morbi regij speciem præ se ferunt. Commota enim bile, & non purgata, non sorbere vult eger, neque bibere, sed omnia abominatur, & plerumque perit, Si vero detinet medicamentum, ante meridiem nihil purgatur: à meridie vero nimium purgatur, & perit. At si hac die superstes maneat, & vnà cum purgatione remittat febris sanus fit. Quapropter in febribus vehementibus medicamenta purgatoria exhibere non oportet. Verum si alicui opus fuerit, infusum per **B** clysterem adhibere potes, quotiescunq; volueris. Hoc enim minoris periculi est. Iuxta eandem rationem etiam tempore æstatis, à canis ortu, per dies quinquaginta vitare oportet & non dare medicamentum, sed infusis per clysterem uti. Idem enim periculum imminet.

HIPPOCRATIS

COI DE DIAETA SIVE VI-

CTVS RATIONE, LIBER

PRIMVS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-
SICO INTER-
PRETE.

*



S I quis mihi ex prioribus, qui de diæta humana ad sanitatem conferente scripserunt, rectè cognouisse ac omnia per totum, quantum humana menti possibile est, conscripisse videretur: latis esset mihi aliorum laboribus, quos nossem rectè habere, uti, prout singula utilia esse viderentur. Nunc verò multi quidem iam scripserunt, nullus autem rectè nouit, quidnam

n 3 fuerit

Hippocratis Liber I.

potius lau-
dādi, quam
vituperan-
di qui ali-
quatenus vi-
tam adiu-
uant.

fuerit ipsis scribendum. Et alij quidem aliud assequuti sunt, D
Verū totum nullus adhuc ex prioribus. Immeritō autem
vllus aliquis ipsoꝝ reprehendatur, propterea quōd inueni-
re non potuerunt. Imo laudandi potius omnes quōd inuesti-
gare conati sunt. Itaque redarguere ea quæ non recte dicta
sunt, minime institui, Verū his quæ sufficienter cognita
sunt, testimonium præbere animus est. Quæcunque qui-
dem igitur recte à prioribus dicta sunt, vt non sit possibile
me aliter conscribere, recte cōscribam. Quæcunque verò nō
recte dixerunt, si quidem redarguam hæc quōd nō sic se ha-
bent, nihil perfecero. verū exponendo qua de causa singu-
la ipsoꝝ recte mihi habere videntur, declarare volo.

Propterea verò hunc sermonem præpono, Quod multi E
homines vbi audierint aliquem prius de re aliqua exposuif-
se, cum qui de his posterius disserit non recipiunt, non co-
gnoscentes quōd eiusdem intelligentiæ est, ea quæ recte di-
cta sunt posse iudicare. Ego igitur velut dixi, recte qui-
dem dictis testimonium præbebo, quæ vero non recte dicta
sunt ac cognita, qualia sint declarabo. Quæ autem nullus
ex prioribus explanare tentauit, ea etiā ipsa qualia sint de-
monstrabo. Porro cum qui de victu humano scripturus

Quæ scire
oporteat
qui de hu-
mano vi-
ctu scribit.

est, cenſeo primū quidem totius hominis naturam nosſe
ac diiudicare oportere. Nosſe quidem ex quibus ab initio
cōſtitutus est, diiudicare verò quæ in ipſo partes dominium
obtaineant. Si enim constitutionem ab initio non cognoscet,
& id quōd in corpore dominatur, non poterit ea quæ homi-

edens
in eo
est

ni conducunt offerre. hæc igitur ſcriptore cognoscere oportet. Deinde verò ciborum ac potuum omnium, ex quibus vi-
ctum habemus, facultatem, quam tandem ſingula habent &
ſecundum naturā, & ſecundum neceſſitatem ac artem hu-
manam. Oportet enim ſcire quomodo fortium natura vim
detrahere oporteat, & quomodo debilibus robur per artem
addere oporteat, prout ſingulorum occaſio ſe obtulerit. Et ſi
relata iam etiam cognouerit nondum ſufficiens eſt hominis
curatio, propterea quōd homo edens ſanus eſſe non poteſt,
niſi etiam laboret. Contrarias enim inter ſe vires habent ci-
bi & labores. Verum inter ſe mixti conferunt ad ſanitatē.

Quæ obſer-
uanda.

Labores enim ea quæ inſunt conſumere ſolent, cibi autē
& potus ea quæ euacuata ſunt, explent. Oportet autem
velut

A velut par est laborū vim pernoscere, tum naturalium, tum eorum qui per vim sunt, & qui ex ipsis carnes in augmentū preparant, & qui in defectū. & non solum hæc, sed etiā mensuram ac proportionē laborum ad multitudinem ciborū, & hominis naturā, & corporum staturas ac ætates, & ad tempora anni, & ad mutationes ventorum, & ad situs regionum in quibus degunt, & ad anni constitutionē ac statum. Sed & Astrorum ortus & occasus cognoscere oportet, quo mutationes & excelsus ciborū ac potuum, & ventorū, & totius mundi, ex quibus sanè morbi hominibus oriuntur, obseruare sciat. Quum autē hæc omnia cognouerit, nondum sufficiens inuentum est. Siquidē enim supra hæc inuenta fuerit ciborum mēsurā, & laborum ad vnāquamque naturam numerus, ita vt excelsus neque supra, neque infra modum fiat, inuenta sanè exactē fuerit hominibus sanitas. Nunc verò prædicta quidē omnia inuenta sunt, qualia sunt, hoc verò inuenire impossibile est. Si quidē igitur præsens quis sit, & inspicat, cognouerit vtique hominē exeuntem & in gymnasiis exercitantem, vt custodire sanum possit, alia detrahēdo, alia apponendo. Verūm non præsentī impossibile est cibos ac labores exactē præscribere. Nam quantum possibile est inuenire à me iam relatum est. At enim etiā si valde parum defectuosiora quàm alia fiant, in multo tēpore necesse est corpus ab excelsu superari, & ad morbum peruenire. Alij itaq; huiusmodi inquirere conati sunt, & neq; hæc dixerunt ac prodiderunt. A me verò hæc inuenta sunt priusquam homo ægrotet, vt ab excelsu in vtrā tandē partē factus fuerit, prænotio contingat. Nō enim derepēte morbi hominibus accedunt, sed paulatim collecti, acruatim apparent. Priusquam igitur in homine sanitas à morbo superatur, quæ perpetiuntur homines à me inuentū est, & quomodo hæc in sanitatem restituere oportet. Hoc autem vbi accesserit ad ea quæ scripta sunt, ratiocinationum huius doctrinæ conatus perficitur. Cōstituuntur quidem igitur tum animātia alia omnia, tum homo ipse ex duobus differentibus quidem facultate, cōcordibus verò & cōmodis ysu, igne inquam, & aqua. Hæc autem ambo simul sufficientia sunt, tum aliis omnibus, tum mutuo sibi ipsis. Vtrumuis verò seorsum, neq; sibi ipsi, neque ulli alteri sufficiens est. Vim igitur ac facultatem vtrunque ipsorum

Astrorum
ratio cogno-
scenda me-
dico.

ij

Gul. Soc.

L. alon

Morbi sen-
sim pullu-
lant

app.

Ignis & a-
qua cuncta
gignunt.

ipforum talem habet. Ignis enim omnia per omnia mouere D
 potest, Aqua vero omnia per omnia nutrire, Particulatim
 verò vtrunq; superat & superatur, ad summū ac minimum,
 quantum eius fieri potest. Neutrum enim superare penitus
 potest, ob hanc sane causam. Igni quidē vbi ad extrema-
 tem aqua peruenit, deficit al. mentum: auertitur igitur eò
 vnde nutriri potest, Aqua vero vbi ad extremitatem ignis
 peruenit, deficit motus. Siftitur itaq; in hac, quum vero ste-
 terit, nō amplius potens est, sed ab illabente igne in alimen-
 tum cōsumitur. & propterea neutrum penitus superare po-
 test. Si vero etiā alterutrum superetur, nihil sanè ex his quæ
 nunc sunt fuerit velut nunc habet. Quum autem sic semper
 se habeant, erunt & eadem & neutra, & neq; simul deficient. E
 Ignis igitur & aqua velut à me dictum est, sufficientia sūt
 omnibus per omnia ad summum ac minimū similiter. Cæ-
 terū vtrique horum hæc adsunt, Igni quidem caliditas &
siccitas, aqua verò frigiditas & humiditas. Habent autē in-
 ter se mutuo, ignis ab aqua humiditatē. Inest enim ab aqua
 humiditas. Aqua verò ab igne siccitatē, Inest enim in aqua
 ab igne siccitas. Quum autem hæc sic habeant, multas &
 omnigenas formas ac species, tum seminum, tum animalū,
 à se inuicem secernunt, quæ nihil inter se simile habēt, neque
 visu, neque facultate. Etenim quum nunquam simul in co-
 dem cōsistant, sed semper alterentur, necessarium est etiā
 ea quæ ab ipsis secernuntur ac producuntur dissimilia fieri.
 Equidem nullum omnino corpus perit, neque fit quod prius F
 non erat, Verū permixta & discretā alterantur. Homines
 autem putant hoc quidem ex orco in lucem audum gene-
 rari, illud verò ex luce in orcum imminutum perire ac cor-
 rumpi. Oculis autē magis credere oportet quā opinionī-
 bus. Ego verò hæc ex sententia exponā. Animalia enim sunt
 & illa & hæc, & neque animal mori possibile est non cum
 omnibus (Vnde enim moriatur?) neque quod non est gene-
 rari, quum non sit vnde generetur. Sed augentur omnia ac
 minuuntur, ad summum & ad minimum, quātum eius fieri
 potest. Quid verò dicam generari & perire, vulgi gratia in-
 terpretabor. hæc autem commisceri & discerni significare
 declaro. Habet autem res hoc modo. Generari & perire siue
 corrumpi, idem est. Idem est commisceri & secerni. Genera-
 ri idem

Potestas
 ignis & a-
 quæ.

Quæ ignis
 & aqua in-
 ter se per
 mutant.

Quid igni
 & perire.

A ri idem est quod cōmisceri. Perire corrumpique ac minui idem est quod secerni. vnumquodque ad omnia, & omnia ad vnumquodque idē sunt. Cōsuetudo enim in his naturæ cōtraria est. Seorsim autē omnia & diuina & humana sursum ac deorsum vicissitudinē habent ac transeunt, dies & nox ad summum ac minimū, Sic & Luna ad summum ac minimū. Ignis accessus est & aqua, Sol ad longissimū ac breuissimū. Rursus hæc, & non hæc. Lux Ioui, tenebræ orco. Lux orco tenebræ Ioui. Accedunt & transmutātur illa huc, hæc illuc, Omni tēpore transigunt illa res horum, hæc autē illorum, & quæ quidē faciunt, non sciunt, quæ verò faciunt, scire sibi videntur. & quæ quidem vident, non cognoscunt, attamen

B omnia ipsi fiunt per diuinā necessitatem, & quæ volunt, & quæ nō volunt. Accedentibus autem illis huc, his verò illuc, & inter se permixtis, vnumquodque destinātū fatum explet, & ad maius, & ad minus. Corruptio autem omnibus mutuo inter se est, maiori à minore, & minori à maiore. Et augetur maius à minore. Reliqua autē omnia, & hominis anima, & corpus velut anima, ornantur ac gubernantur. Irrepunt autē in hominem partes partium, tota totorū temperaturam habentia, ignis videlicet & aquæ, partim acceptura, partim datura, & quæ quidē accipiunt, plus faciunt, quæ verò dant, minus. Secant homines lignum per ferrā, alter trahit, alter protrudit, Idē autem hoc faciunt, & minus facientes, plus laborant ac faciunt. Sic & hominis natura, aliud protrudit, aliud trahit, aliud dat, aliud accipit, & alij dat, ab alio accipit, & alij quidem tanto plus dat, ab alio verò nihil minus accipit. Locum autē vnumquodque suum seruat, & quæ quidē ad minus eunt, ad minorem locum secernuntur, quæ verò ad maius vadunt, permixta in maiorem ordinem mutantur. Peregrina verò non eosdē mores habētia, ex aliena regione protruduntur. Semper autē anima & maiora, & minora habens, suas ipsius partes circumambulat, nō appositione, neq; detractione partium indigens, verū augmento & decremento earum quæ iam sunt opus habens. Locum verò vnicuique perficit, ad quem perueniant. & allabentia suscipiant. Non enim potest id quod non similes mores habet, in discordibus locis permanere. Oberrant enim velut ignota, permixta verò inter se cognoscuntur. Concors enim

Hippocratis Liber I.

Qualis ho-
minis ani-
ma perspi-
cito.

..aii

concordi adhæret ac assidet, discordia autem rebellât, & pu-
guant, atque inter se dissident. Quapropter anima hominis,
in homine augetur, in alio verò nullo, & aliorum magnorum
animalium similiter. Quæcunque verò aliter ab aliis per vim
secernuntur, de aliis quidē animalibus prætermittā, de ho-
mine verò declarabo. Irrepat in hominem anima, ignis &
aqua temperamentum habens, partem corporis humani. Fœ-
mellæ autem & masculi, & multi & omnigeni nutriuntur,
Nutriuntur autē & augescunt per diætā qua homo vitur.
Necesse est autem omnia quæ ingrediuntur partes habere,
Cuiuscunque enim pars non inerit à principio, augeri nō po-
terit, neq; multo, neque modico alimento ingrediente. Non
enim habet quod augescere faciat. Id verò quod omnia ha-
bet, augescit, vnumquodq; in suo loco. Alimento autē ingre-
diente ab aqua & igne, sicco & humido, alia quidem intra
coguntur, alia verò foras protruduntur. Quemadmodum fa-
bri lignarii lignum serra dissecāt, & alter quidē trahit, alter
protrudit, idē sanē facientes: & qui deorsum premit, superio-
rem trahit, neq; enim aliās admitteret deorsum ire. Si verò
violenter cogāt, toto opere aberrabunt. Similiter & circa ho-
minis alimentum se res habet. aliud trahit, aliud protrudit. in-
tro autē coactum, foras repit. Si verò importunē & violēter
cogatur, omni successu priuabitur. Singula autē tanto tem-
pore eundem ordinem habēt, donec locus nō amplius susci-
piat, neq; alimentum aquarum ac ignis sufficiens ad summum
habeat. Postea ad extremā regionē transeunt & fœmellæ &
masculi, eodem modo præ violentia & necessitate impulsī.
Quæcunque autē destinatum fatum expleuerint, ea primū secer-
nuntur, ac simul commiscuntur. Singula enim secernuntur,
omnia autē hæc cōmiscuntur. Postquam verò regionē per-
mutauerint, & nacti fuerint harmoniā rectē habentē sym-
phonias tres comprehensim penetrantes per omnia, viuunt
& augescunt iisdem quibus etiā antea, Si verò harmoniam
non assequuti fuerint, neq; grauiā acutis consona fiant, pri-
ma symphonia perit. Et si etiā secūda generetur, propterea
quod vnus per omnia corruptus est, omnis tonus vanus est.
Non enim cōcentum habuerit, sed transitio fit ex maiore ad
minus, ante destinatum fatum quod qui faciunt, non sciunt
quid faciāt. Cur autem vtrique tum masculus, tum fœmina
fiant,

A fiant, in sermonis progressu declarabo. Vter autem ipsorum ^{parrus cō-} harmoniam allequetur humidus existens mouetur ab igne, ^{positio.} motus autem viuificatur, & alimentū attrahet ab ingredien-
 tibus in mulierem cibis ac spiritu, primū quidē vndiquaq;
similiter, donec recenter rarus est. à motu autē & ignis sicca-
 tur ac consolidatur, consolidatus autē & firmatus circum cir-
 ca densatur. Et ignis inclusus non amplius sufficiens alimen-
 tum attrahere potest, neque spiritū expellit, propter ambien-
 tis corporis densitatē. Consumit enim humorem intus exi-
 stētem. Quæ igitur solida natura sunt in cōpacto ac sicco, ea
 non consumuntur ab igne in alimentū: sed valida ac robusta
 fiunt, & consistunt humore deficiente, atque hæc sanē ossa ac
 nerui nominantur. Ignis autem ex cōmixto ac moto humore
 B corpus secūdam naturam ordinat ac disponit propter talem
 necessitatem. Nam per solidum & siccū non potest diutinos
 transitus facere, quia alimentū non habet, per humidā verò
 & mollia potest, hæc enim ipsius sunt alimentū, Inest autem
 & in his siccitas, quæ ab igne nōn cōsumitur, Hæc autē inter
 se congregantur mutuo. Ignis igitur penitissimē ad intima
 obturatus, & plurimus est, & maximū exitū facit. Plurimus
 enim humor in ea parte inest, quæ venter appellatur, & exci-
 dit inde vbi alimentū non habet foras, & exitum facit. Pluri-
 mus autē humor in ventre inest, tum propter alimenti in ge-
 stionem, tum propter concoctionem. Qui verò in reliquum
 corpus conclusus est ignis, triplices circuitus facit. Etenim
 C quod humidissimū est in igne, in his locis quæ venæ cauæ ap-
 pellantur, existit. In media autem horū id quod reliquum est
 aquæ congregatū stabilitur, atq; ea vocantur carnes. In sum-
 ma, ignis omnia quæ in corpore sunt, secundum suū ipsius
 modum exornauit, ad vniuersi imitationē: parua ad magna, ^{Vena.}
 & magna ad parua, Ventre quidem maximū, sicco & humi-
 do promptuarium, vt det omnibus, & accipiat ab omnibus, ^{Caro.}
 iuxta maris facultatē quod est animalium in ipso nutritorum,
 ac nutriri solitorū alimentū, discordium verò perniciēs. Cir-
 cum hunc autē aquæ frigida & humida cōgregatio: transi-
 rus spiritus frigidi & calidi, ad terræ imitationē, omnia quæ ^{Mundi imi-}
 in ipsum incidunt alterantis, Et alia quidem consumens, alia ^{tatio.}
 verò augens, atq; tenuis ac ignis dispersionē fecit, insuperq;
 non obscuri & apparētis à cōpacto secretionē, in quo delata
 omnia

Partes
ignis.

Leges qui
sibi fecerunt
nesciunt.

omnia in apertum perueniunt, singula iuxta destinatum fa- D
tum. In hoc verò triplices circuitus ignis fecit, inter se mu-
tuo intro ac foras terminantes, alios quidem ad cavitates hu-
morum Lunæ facultate, alios verò ad externam circunferen-
tiam, ad ambientem soliditatem astrorum facultate. Medij
verò & intro & foras terminantes, calidissimum ac fortissi-
mum ignem habent, qui sanè omnibus dominatur, omnia
secundum naturam gubernans, sine strepitu, tum ad visum,
tum ad tactum. In hoc Anima, Mens, Prudentia, Augmentū,
Motus, Imminutio, Permutatio, Sonus, Vigilia. Hic omnia
per omnia gubernat, & hæc, & illa, nunquam quiescens. At
verò homines ex manifestis obscura considerare non noue-
runt. Quū enim artibus vtantur similibus humanæ naturæ, E
id ipsum ignorāt. Diuina enim Mens edocuit ipsos sua ipso-
rum imitari, ita vt cognoscant quæ faciunt, & non cognoscāt
quæ imitentur. Omnia enim similia sunt, dissimilia existen-
tia, & omnia concordia, discordia existentia, quæ comproba-
mus, non comprobamus, æquitatē habentia, iniqua sunt. con-
trarius est modus singulorum ei quem cōfitentur. Lex enim
& natura, quibus omnia transigimus, non confitentur quæ
confitentur. Legem enim posuerunt ac tulerunt homines
ipsi sibi ipsis, non cognoscentes de quibus tulerunt. Naturam
verò omnes dij exornauerunt. Quæ igitur homines sancieue-
runt, nunquam eodem modo habent, neq; rectè, neque non
rectè. Quæ verò dij sancieuerunt, semper rectè habet. Et recta
ac non recta intantū differunt. Ego verò Artes hominis ma- F
nifestas, affectionibus & manifestis, & obscuris, similes esse
declarabo. Vaticinatio tale quid est. Ex manifestis quidem
cognoscere obscura, ex obscuris verò manifesta, & ex præsen-
tibus futura, & ex mortuis viuentia. Et ea quæ intelligi non
possunt, vates intelligunt, qui quidem doctus est, semper re-
ctè, qui verò non doctus est, aliàs aliter. Naturam hominis
etiam hæc quātum possibile est, imitantur. Vir mulieri con-
cumbens puerum facit, Hoc manifesto obscurū cognoscere
datur, quòd sic futurum est. Mens hominis obscura, cognos-
cens manifesta, ex puero in virum transit, hoc præsentī fu-
turum cognoscit. Non simile à morte vllum aliquod animal
existit, neque mortuo animal viuum. Venter quod intel-
ligi non potest, nouit. per hunc enim intelligimus quod sitit
aut

A aut esurit. Hæ artis vaticinandi & humanæ naturæ affectiones, cognoscētibz quidem semper recte habent, verum non cognoscentibus alijs aliter. Artis fabrilis ferrariæ instrumenta ferrum circumliquant, statu ignem fabri cogunt, & alimentum iam præsens auferunt, vbi verò rarefecerint, feriunt ac tundunt. Aquæ autem alimento ferrum rursus roboratur. Eadem patitur homo à pædotribz, præsens enim alimentum igne detrahitur, quum præ spiritu homo cogatur, rarefactus autem tunditur, atteritur, subuenitur. Aquæ autem aliunde accessione corroboratur ac fortis euadit. Et fullones idem transigunt, calcitrant, feriunt, destruētes, tunc trahunt destruētes, robustiora faciunt, deradentes supereminētia, & attexentes pulchriora reddunt. Eadē etiam homo perpetitur. Sutores coriarij tota in partes dissecantes, scindentes & pungentes, marcida ac lacera, sana & integra, faciunt, Et homo idem patitur. Ex totis partes secantur, & ex partibus compolitis tota fiunt. Punguntur & secantur à medicis marcida, sananturque, ac viuit homo. Medicina id quod molestat, tollit, & id à quo homo agrotat auferens, sanum facit. Natura eadem sua sponte nouit. Desidens conatur resurgere, currens conatur requiescere, & alia eiusmodi natura habet quæ medicinæ sunt. Fabri lignarij ferra secantes, alter trahit, alter protrudit, Idem autem uterque facit, & in vtranque partem tendit. Iidem terebrant, alter trahit, alter protrudit, & qui premit, superiorē deorsum trahit, & minus facientes plus faciunt, naturæque hominis imitantur. Spiritus alter trahit, alter protrudit, Idem autem uterque facit, & in vtranque partem tendit. Cibi partim deorsum premuntur, partim sursum vergunt. Ab vna anima diuisa, plures & maiores, & minores & pauciores fiunt. Aedificatores ex diuersis rebus vnā concordem facientes, sicca quidem humectantes, humida verò siccantes, & tota diuidentes, diuisa verò componentes, Si enim non sic contingeret, nihil priuatim ac proprium constitui posset: diatam humanam in hoc imitantur. Nam & in hac sicca humectantes, & humida resiccantes, tota quidem diuidunt, diuisa verò componunt. Hæc omnia diuersa ac discordia existentia cum natura concordant. Musices autem organum primum producere oportet, in quo harmonia quæ vult declarabit. Con-

Vaticinatio
& medici-
na fere si-
miles sunt.

Cibariorū
potestas
multis cō-
paratur.
Domorum
structura.

Musica.

struct

structiones ex iisdem non eadem sunt, ex acuto, ex graui, no- D
mine quidem similibus, sono autem non similibus. Quæ plu-
rimum diuersa sunt, maximè concordant, & quæ minimum
diuersa sunt, minimè concordant. Si verò quis similia omnia
faciat, non inest delectatio. Plurimæ ac multiformes trans-

Coci.

mutationes, maximè delectant. Coci obsonia hominibus
parant, omnis generis diuersa commiscentes, ex iisdem non
eadem, ad hominum cibum ac potum. Quod si omnia simi-

Lingua
vis.

lia facerent, non haberent delectationē, & si in eodem etiam
omnia construerent, non utique recte haberent. Pulsantur to-
ni in musica partim supernè, partim infernè. Lingua musi-
cam imitatur, cognoscens quidem dulcedinē & acorem eo-
rum quæ allabuntur itémque dissonantia, pulsat autem so- E

Coriarij.

nos supernè ac infernè, & neque ea quæ supernè pulsantur, si
infernè pulsantur recte habent, neque quæ infernè, si supernè.
Quum autem lingua probè fuerit attemperata, symphonix
delectatio contingit. Si verò discors fuerit ac incongrua, mo-
lestia. Pellium tinctores tendunt, terunt, pectinant, lauant.

Aurifices.

Eadem est puerorum curatio. Plicatores ac textores du-
centes in orbem fila plicant, à principio in principium desi-
nunt. Idem circuitus in corpore est, unde incipit, in hoc desi-
nit. Aurum operantes, tundunt, lauant, molli igne liquant,

Panificiū.

forti autem non conflatur, Vbi verò elaborarunt, ad omnia
utuntur. Homo frumentum tundit, lauat, molit, & ubi igne
coxit, utitur, & forti quidem igne in corpore non conflatur,

Statuaria.

verum molli ac lento. Statuarij imitationem corporis fa- F
ciunt, anima excepta, mentem autem habentia non faciunt,
ex aqua & terra humida siccantes, & sicca humectantes, ab
his quæ superabundant detrahunt, & ad ea quæ deficiunt ap-
ponunt, ex minimo ad maximum augentes. Eadem patitur
homo, augefcit à minimo ad maximum, ex superabundan-

Figlina.

tibus detrahens, & deficientibus apponens, sicca humectans
& humida siccans. Figuli rotam versant, & neque retror-
sum, neque antrorsum procedit, sed simul in vtranque par-
tem, Vniuersi hæc imitatrix circularis existit. In eadem au-
tem quum iam circumfertur, omnis generis opera efficiunt,
ut alterum altero in nulla re simile existat. Ex iisdem homi-
nes eadem patiuntur, itémque reliqua animalia in eadem
circunferentia omnia operantur, & ex iisdem nihil simile,
iisdem

A iisdem instrumentis ex humidis sicca faciētes, & ex siccis humida. Grammatica tale quid est, figurarū compositio, quæ signa ac notæ sunt humanæ vocis, facultas reuocandi in memoriam præterita, & quæ faciēda sunt declarandi. Per septem figuras notitia contingit, Eadē omnia homo transigit, siue sciens literas, siue literarum rudis. Per septem figuras etiam sensus hominibus contingit. Auditus sonorum, Visus manifestorū, Nasus odoris, Lingua voluptatis & iniucunditatis, Os sermonis, Corpus tactus calidi aut frigidi, Spiritus transitus intro ac foras. Per hæc cognitio hominibus contingit. Palæstra & pædotribæ tale quiddā docent, præuaricari

Literaria.

Sensus humani.

B pere: violare honestissima ac turpissima. Qui hæc non facit, malus, qui hæc facit, bonus est. Ostentatio multorum ac vulgi est, desipientiæ hæc esse vident, & vnū ex vniuersis bonum iudicant, reliquos vero malos. Multi mirantur, pauci cognoscunt. Homines in forum progressi eadem perpetrant, defraudant vendentes & ementes, Qui plurimū defraudauit in admiratione est. Bibentes & insanientes eadem perpetrant, currunt, luctantur, pugnant, furātur, defraudant. Vnus ex omnibus præfertur. Simulatores & deceptores alia ad scientes dicunt, & alia sentiunt, Idem ereptant, & irrepunt non iidem. Inest autē homini, alia dicere, alia facere, & eundem non esse eundem, & nunc aliam habere mentem, nunc rursus aliam. Sic quidem artes omnes cum humana natura communicant. Cæterū anima hominis, quemadmodum etiam antea à me dictum est, ignis & aquæ temperamentum habens, partes autem hominis, irrepit in omne animal quod sanè spirat, itēque in omnem hominem, & iuniorem, & seniore. Non autem similiter in omnibus augefcit, sed in iuuenibus corporibus, vtpote celeri circunvolutione existēte, & corpore auctili, expassæ & attenuatæ partes illæ animæ: in corporis augmentum cōsumuntur. In senioribus autem, vtpote tardo existente motu, & corpore frigido in decrementum hominis consumuntur. Quæcunque autem corpora in vigore sunt, & in ætate fœcunda, eas nutrire & augere possunt. Potentes autem homines, vt quisque plurimos homines alere potest, ita fortis iudicatur ac potēs, vbi verò defecerint quos alat, imbecilior censetur. Sic etiā circa singula cor-

Palæstra
& puerorū
institutio.
Hypocrita.
Procreatio.

pora

pora res se habet. Quæcunq; plurimas animas nutrire possunt, ea fortiora sunt, ubi verò hæc discesserint, imbecilliora.

Quicquid igitur in aliud corpus ingressum fuerit, non au-
gescit. Quicquid verò in fœminam, augetur, si ea quæ ipsi
congrua sunt, contingant. Discriminantur autem partēs &
augescunt simul omnes, & neque prius alteræ alteris, neque
posterius. Verum maiores natura priores apparent minori-
bus, quum non priores existant. Non autem in æquali tem-
poris spatio omnes fœtus exornantur, sed alij citius, alij tar-
dius, prout singuli & ignem & alimentum fuerint nacti. ali-
qui itaque in quadraginta ac tribus diebus scaturiunt ac for-
mantur, aliqui in quatuor mensibus. Similiter etiam vitales
fiunt ac gignuntur, aliqui citius, septimo mense perfectè: ali-
qui tardius, perfectè nono mense in lucem prodeunt, & osten-
dunt se temperamentū habere, quod semper habebunt. Ma-
sculi igitur & fœmellæ hoc modo gignuntur, quantum eius
fieri potest. Cæterum fœmellæ ab aqua magis, & à frigidis
ac humidis & mollibus augescunt tum cibus, tum potibus,
itemque studiis ac exercitiis. Masculi verò magis ab igne, à
siccis videlicet ac calidis cibus & reliqua dicta. Si igitur fœ-
mellam parere velit, diata ad aquam vergente utendum est.
Si verò masculum, exercitiis ac victu ad ignem tendente uten-
tur. Et non solum virum hoc facere oportet, sed etiam mu-
lierem. Non enim solum quod à viro secernitur auctile est,
sed etiam quod à muliere, ob hanc sanè causam. Vtraq; qui-
dem pars sufficientem motum non habet ad humoris mul-
titudinem, ut quod influit consumat, & propter ignis debili-
tatem coagmentantur. Quum verò ambæ coinciderint, mu-
tuo inter se incurrunt & obuoluuntur, ignis ad ignem, & aqua
similiter. Siquidem igitur in sicco loco circumuoluitur
ignis, coillapsam aquam superat, & ab hoc ignis augetur, ne
ab illabente vnda extinguatur, aliūque accedentem susci-
piat ac sibi consociet. Si verò in humorem inciderit, statim
ab initio extinguatur ab illabente vnda, & in minorem or-
dinem dissoluitur. In vna autem die vniuscuiusque mensis,
consociare ac superare ea quæ accedunt potest, & hoc si coin-
ciderint ab utrisque in vnum locum. Consistere autem pos-
sunt inter se & fœmella & masculus, propterea quod anima
quidem idem est in omnibus animatis. Corpus autē vniuf-
cuiusque

Conforma-
tio mem-
brorum.

4. infra
3 dies

Qui mas-
& fœmella
gignantur.

Quid in
conceptus
cupidine
agendum.

Procreatio
diuersa.

A cuiusque differt. Anima quidem igitur semper similis, & in maiore, & in minore. Non enim alteratur neq; per naturā, neque per necessitatem. Corpus autem nunquā idem in vllō aliquo est, neque secundum naturam, neque ex necessitate, propterea quod partim secernatur in omnia, partim permisceatur ad omnia. Si quidē igitur mascula corpora ab vtrisque secreta fuerint, augescunt pro re præsenti, & fiunt hi viri Clarus vir anintis splendidi, & corpore fortes, si non à diata postea quando gi- gnatur. trimentum sentiant. Si verò à viro quidem masculum seceratur, à muliere verò fœmineum, & superauerit si ita cōtingat masculum. (Genitura enim ammiscetur ad fortiorē aut debiliore, Non enim habet ex præsentibus aliquid ad quod

B familiarius secedere possit. Suscipit enim parua maiorem, & maior minorem. In commune autem super hęc quæ ad sunt dominium exercent) corpus sanē masculum augescit, fœmineum vero minuitur, & in aliam sortem secernitur. Et hi quidem minus prioribus splendidi fiunt, tamen quia masculum à viro superauit, viriles euadunt, & hoc nomē meritō habent. Si verò à muliere quidem masculum secretū fuerit, à viro autem muliebri, superauerit autem masculū, augescit eodem modo sicut prius, fœmineū verò minuitur. Et Semimares fiunt hi Androgyni, id est viri effœminati, atque sic rectē appellantur. Tres quidē igitur hęc sunt generationes hominū, differentes in eo quòd magis aut minus tales sint, propter partium aquæ temperamentū, & alimenta, & institutiones, ac consuetudines-declarabo autē in progressu sermonis etiā de his. Caterum fœmella eodem modo gignitur. Si enim ab vtrisque fœmineū secretum fuerit, fœminosissimæ ac ingeniosissimæ fient, Si verò à muliere quidem fœmineum, à viro autem masculum, superauerit autem fœmineum, audaciores quidem prioribus fient, veruntamen ornatae ac mode Fœmellæ ratae etiam ipsæ. Si verò à viro quidem fœmineum, à muliere verò masculum secretum fuerit, & fœmineū superauerit, augescit eodem modo, & fiunt hęc audacioces adhuc prioribus, & viriles ac viragines nominantur. Si autem quis non credat animam animæ admisceri, demens est. Si quis enim carbones ardentes ad ardentes adiiciat, fortes ad debiles, & alimentum ipsis præbuerit, simile corpus omnes exhibebūt, Similitudo & alter præ altero non cognoscitur, sed in qualicunque cor- pore

**Gemello-
rū procrea-
tio.**

pore ignem susceperint, tale in omnibus erit. Vbi verò præ- **D**
sens alimentum consumpserint, secernuntur ac obscurantur.

Idem hoc anima hominis patitur. At verò quomodo gemini
nascantur, hoc sermone declarabo. Equidem natura vtero-
rum in fœminis vt plurimum in causâ est. Si enim similiter
in vtranq; partem iuxta osculum dispositi à natura fuerint,
& similiter hauerint, & à purgatione siccantur, alere possunt,
si semē viri conceperint ita vt statim discindatur. Sic enim
necessē est dispergi in vtrunq; vterū similiter. Siquidem igitur
multū semē ab vtrisq; & fortē secretū fuerit, in vtrisque
locis augeri potest, dominiū enim habet in alimentū quod
accedit. Si verò aliter contingat, gemini nō fiunt. Quū itaq;
masculum ab vtrisq; secretū fuerit, necessariū est in vtrisque **E**
masculos gigni, quum verò fœmineum ab vtrisq;, fœmellæ
fiunt, quum autem alterum fœmineum, alterū masculū fue-
rit, vtrū altero præualefcet, id ipsum augetur pro ea ratione.

**Cur simi-
les.**

**Superfœta-
tiones quo-
modo fiāt.**

Similes porrò inter se fiunt gemelli, ob hanc causam. Pri-
mū quidem quod æquales sunt loci in quibus augetur.
Deinde quod simul secreti sunt. Postea quod iisdē alimentis
augetur, vitalēsq; in lucem prodeunt. Cæterum superfœ-
tationes hoc modo fiunt. Quum vteri calidi & sicci natura
fuerint, ipsaq; mulier eiusmodi, & semen calidum ac siccū
illapsū fuerit, nō sit amplius vlla aliqua humiditas in vte-
ris, quæ semen superillabens contineat. Quapropter cōsistit
ab initio ac viuit, perseverare autē non potest, sed etiam id
quod iam adest insuper corrumpit, quia non eadem vtrisque **F**
conferunt. Etenim quod tenuissimū est in aqua, & quod ra-
rissimū in igne, si in hominis corpore temperamentū ac-
ceperint, sanissimum habitum constituunt. Propterea quod
neq; in temporū anni maximis mutationibus, neq; in regio-
num permutationibus, neq; in ciborū ac potuum alteratio-
nibus, aqua dēfissima euadit in aquæ impetuosius incurfibus,
neq; ignis in ignis impetu. Possunt enim ambo & generatio-
nem & satietatē plurimā suscipere. Aes mollissimum ac ra-
rissimum, plurimū temperamentū suscipit, ac optimū eua-
dit. Eodem modo etiā quod tenuissimū est in aqua, ac rarif-
simū in igne, vbi temperamentū acceperint. Qui igitur hāc
naturā habēt, sani perseverant omni tempore vsq; ad qua-
dragesimū annū, aliqui vero etiam vsq; ad extremā fene-
tutem

**Qui sani
diutius
perseue-
rent.**

Actutem. Qui verò à quadragesimo anno, à morbo aliquo cor-
repti fuerint, nunquam ferme euadunt. Quæcunq; autē cor-
pora ignis fortissimi, & aquæ densissimæ temperamentum
acceperint, fortia & robusta fiunt, verū multa custodia opus
habent. Magnas enim transmutationes in vtranq; partē ha-
bent, & in aquæ incurlibus in morbos incidunt, & in ignis
cōsimiliter. Qui igitur eiusmodi naturā habet, eū victu vti
conducibile est tēporibus anni contrario. Et aquæ quidē in-
cursu cōtingente, vti oportebit eū ab his quæ ab aqua sunt,
paulatim pro tēporum ratione discedendo. Porro vbi aquæ
crassissimæ & ignis tenuissimi in corpore mixtura facta est,
talια cōtingunt, ex quibus frigidam & humidam naturā co-

Bgnoscere oportet. Talia enim corpora in hyeme morboſio-
ra sunt, quā in æstate, & in vere quā in autūno. Cæterū
quod ad ætates attinet, Sanissimi ex talibus pueri sunt. De-
inde adoleſcētes. Morboſissimi autem senes, & his vicini, &
hæ naturæ cito senescunt. Talibus in victu cōferunt quæ cal-
faciunt ac siccant, tum in cibis, tum in exercitiis, & externas
corporis partes magis quā internas exercere conducit. Si
verò humidissimū in igne, & densissimum in aqua, in corpo-
re mixturā acceperint, ex his humidā ac calidam naturam
cognoscere oportet. Laborant quidem ex morbis huiusmodi
maximè in vere, minimè in autumnno, quia in vere excessus
est humiditatis, in autumnno vero symmetria & moderatio
siccitatis. Ex ætatibus verò morboſissimæ sunt iuniores. Cor-

Cpora autem citò augescunt, & tales distillationibus obnoxij
sunt. His cōducit exhibere quæcūq; siccant ac frigefaciūt, &
in cibo, & in potu ac laboribus. Verū labores intra corpus
his facere maximè cōfer. Si verò mixturā acceperint fortis-
simum in igne, & tenuissimū in aqua, sicca & calida est natu-
ra, & talibus morbus in ignis accessionibus contingit, sani-
tas verò in aquæ. Et in ætatibus vigētibus ad carnis bonam
habitudinē, morboſissimi sunt, sanissimi autē senes. Ita etiā
vtrisq; proximi. Diætæ quæ frigefaciunt ac humectant, & ex
laboribus qui minimè excalfaciunt ac colliquant, plurimā
frigiditytē exhibebunt. Huiusmodi naturæ viuacissimæ ac
sanissimæ existunt. Si autem mixturam acceperint corpora
ignis rarissimi, & aquæ siccissimæ, sicca & frigida talis natu-
ra est, morboſa quidē in autūno, sana verò in vere, & vicinis

Quæ ætas
sana vel cō-
trā.

Quæ cuiq;
ætati cōue-
niant.

Naturarū
cognitio.

Hippocratis Liber I.

temporibus. Similiter ætates ad annos quadraginta morbo-
se, pueri sanissimi, Ita & vtrisque proximè. Diætæ his cōferūt
quæ calidæ existentes humectāt, & labores sensim adhibiti
leuiter calfacientes, & non multū ab his quæ sunt auferētes.
De naturæ igitur cognitione sic à prima constitutione co-
gnoscere oportet. Caterū ætates ipsæ ad seipsas hoc modo

Cognitio
ætatū.

habent. Puer itaque ex calidis & humidis tēperatus est, quia
ex his constitutus est, & in his augmētum accepit. Humidif-
sima igitur & calidissima sunt corpora proxima generatio-
ni, & augescunt quā plurimū, & quæ his proxima sunt
eodem modo. Adolescēs autē calidus quidem est, quia ignis
impetus aquæ dominatur. Siccus autē, quia humidū ex pue-
ro consumptum est, partim in augmētū corporis, partim in
motum ignis, partim præ laboribus ac exercitijs. Vir quum
steterit iam corpus, siccus est, & frigidus, quia caliditatis im-
petus non ampliùs dominatur, sed stat corpus ab augmento
quiescens, ac perfrigeratū. Verūm ex adolescenti ætate sicci-
tas inest. Ab insequenti autē ætate & aquæ accessu, humidi-
tatē nō habet, quapropter ex siccis & frigidis exuperatus est.

Quomodo
inter sese
ætates dif-
ferant.

Cur mares
fæminis ca-
lidiores
sint.

Senes autem frigidi sunt & humidī, Quia ignis quidē re-
cessus cōtigit, aquæ autem accessus, & siccorū quidem subla-
tio, humidorum autem status. Ex omnibus autem masculī
calidiores sunt & sicciores, fæminæ verò humidiores ac fri-
gidiores. Propterea quod ab initio vtrique in talibus geniti
sunt, & à talibus augescūt. Vbi verò in lucē editi sunt mascu-
li, victu ac diætā laboriosiore vtuntur, vt excalescant ac resic-
centur. Fæminæ verò humidioribus ac pigrioribus diætis
vtuntur, & caliditatis purgationē ex corpore singulis men-
sibus faciunt. Porro de animæ sapientia ac desipientia, hoc
modo se res habet. Quod humidissimum est in igne, & sic-
cissimum in aqua, si in corpore tēperamentū acceperint, sa-
pientissima sunt. Quia ignis quidem habet humiditatē ab
aqua, aqua autem siccitatē ab igne, vterq; autem sic sufficiē-
tissimus est. Neq; ignis alimēti indigentior multū procedit,
neque aqua motus indiga multū leuis redditur. Sic itaque
vtraque & per se sufficientissima sunt, & inter se permixta.
Quod enim minimè vicinis indiget, hoc maximè præsentibus
obtēperat, velut ignis qui minimè mouetur, nō præ ne-
cessitate, & aqua quæ maximè, nō præ violētia. Ex his autē

Prudentia
qui præ-
stent.

Qui pru-

anima

A anima temperata, sapientissima est, & memoria valentissi-
ma prædita. Si verò aliquo ascitamento vtens, alterutrū ho-
rum augetur aut contabescat, desipientissima redditur, pro
pterea quòd quā sic habeant sufficientissima existunt. Si au-
tem ignis sincerissimi, itémq; aquæ temperamētum anima
fortiatur, sit autē ignis paulo inferior ac defectuosior quā
aqua, sapientes quidē sunt etiā hi, verū defectuosiores quā
in priore temperamento: propterea quòd ignis ab aqua su-
peratus: & tardiores motum faciēs, segnius sensibus allabi-
tur. constantes autem cum mansuetudine sunt eiusmodi ani-
mæ, ad quācūq; tandem rem animum applicuerint. Si ve-
rò recto victu vtantur, & sapientiores & acutiores præter na-
turam fieri queant. Talibus confert victu vt ad ignem ma-
gis tendente, & non repletionibus, neque ciborum, neque po-
tuum. Cursibus itaque vtendum est velocibus, quo & corpus
humore euacuetur, & humor amplius citius sistatur. Lucis
autem & fricationibus & eiusmodi exercitiis vti non condu-
cit, vt ne meatus cauiore redditi repleantur. A talibus enim
animæ motum grauari necesse est. Confert & deambulatio
nibus vt, tum à cœna, tum mane, itémque à cursibus. A cœ-
na quidem, quo alimentum siccius anima suscipiat ab ingre-
dientibus ac ingestis. Manē verò, quo transitus humoris eu-
cuentur, & meatus animæ non obturentur. Ab exercitiis ve-
rò, vt ne in corpore relinquatur quod secretū est à cursu, ne-
que animæ commisceatur, neque transitus obturet, neque a-
limentum conturbet. Confert & vomitibus vt, quo corpus
depurgetur, si quid defectuosius labores transegerunt. à vō-
mitu autem paulatim adiiciendo cibus offerendus est, mini-
mum ad quatuor dies. At vero vngi conducibilius est quā la-
uari. Coitu vtendum est, aquæ accessibus cōtingentibus, fre-
quentiore, in ignis autē impressiōibus, pauciore. Porro si
in aliqua anima defectuosiores vim ignis accipiat quā
aqua, eam tardiores esse necesse est. & appellantur tales sto-
lidi. Nam vt tardiores existente circuitu, sensus paulatim al-
labuntur, & qui acuti existunt parum cōmisercentur, propter
circuitus tarditatē. Sensus enim animæ qui per visum ac au-
ditum contingunt acuti sunt, qui verò per tactum, tardiores
& facilius percipiuntur. hos quidem igitur percipiunt etiā
tales nihilominus, velut sunt frigida & calida ac consimilia.

dētissimus
memoriāq;
tenacissima
præditus.

Cōstantes.

Horum vi-
tus & exer-
citatio.

Cur his plu-
rimum la-
borandum
sit.

Diuersæ
naturæ.
Ignis & a-
quæ tempe-
ratura di-
uersa sūt.

Hippocratis Liber I.

Quæ verò per visum aut auditum percipere oportet, quæ nō prius sciunt, percipere non possunt. Si enim non commota fuerit anima ab igne allabente, non percipere poterit quale quid tandem sit. Tales igitur animæ non perpetiuntur hoc ob celeritatem. Si autem recta diætā vtatur, etiam talis homo melior fieri possit. Conferunt itaque huic eadē quæ priori, Verūm ficcioribus ac paucioribus cibis vtetur, laboribus autem pluribus & acutioribus ac velocioribus. Cōfert & fomentis vti, & vomitibus à fomentis, & exhibitionibus ciborum à vomitibus ex longiori tempore, si defectuosius contigerint vomitus. Et sane hæc faciens, sanior ac sapientior fuerit. Si verò ampliùs adhuc superetur ignis à præsentī aqua, hos iam alij delipientes, alij attonitos huc stupidos appellāt. Et hæc insanix quædam species tardior existit. hi plorant ne mine molestante aut verberante, formidantque non formidanda, & tristantur in rebus nihil ad se pertinentibus, & sentiunt ea quæ nō conueniunt sapientibus. Confert itaque his, fomentis vti, & à fomentis veratrīs expurgari, ac diætā vti quam prius dixi, indigētque talis homo attenuatōe pulmonis ac siccitate. Si autem aqua defectuosiorē vim accipiat quā ignis, quum alias sincerum temperamentum habeant, sani sūt homines corporibus, & sapientes. Talis autem anima citò percipit allabentia, & non sæpe ab vna re ad aliam transit. Natura quidē igitur, talis animæ bonæ est. Melior autem reddetur rectæ diætæ vsu, & peior prauæ. Cōfert huic, diætæ vsus ad aquam magis vergentis, ita vt excessus vitet & ciborum, & potuum, & laborum. Vtetur & cursibus curuis & rectis reuertentibus, luctis ac reliquis exercitiis, ita vt in nullo excessum faciat. Si enim sanum fuerit corpus, & non a aliquo alio perturbetur, animi temperamentum sapiens existit. Si verò ampliùs aquæ vis ab igne superetur, tali homini necesse est tantò acutiorem animam esse, quanto citius mouetur, & ad sensus citius allabi, verūm minùs constantem priore, propterea quòd iudicat ea quæ obueniunt, & in pulmonem procedit ob celeritatem.

Confert tali homini diætā vti magis ad aquam vergentem, quā priori, & maza magis quā pane, & piscibus magis quā carnibus, & potu aquosiore, & Venere rariùs vtetur, & laboribus qui sūt maximè secundum naturam quā

Nutricatus
multum fa-
cit.

Attoniti si-
ue stupidi.
Tardus fu-
ror.

Cum ignis
aquam su-
perat qua-
les fiant.

Nature hu-
ius nutrica-
tus.

Diuersæ na-
turæ & nu-
tricio.

- A** quàm plurimis, violentis autem uti non est necesse. Utetur & vomitibus paucioribus ex repletionibus, quo corpus quidem euacuetur, quàm minimè vero cale scat, Cōducit etiam talibus ad sapientiã, ut minimè carnosì sint. Nam ad carnis bonam habitudinem, ardoris inflammationē fieri necesse est. Quum autem tale quid huiusmodi anima perpetitur, ad insaniam adigitur, ex superata aqua adacta. Talibus confert actiones obire ac transigere à cibo accepto magis quàm ieiunís. Stabilior enim redditur anima alimento commo-
do ammixto, quàm alimenti indiga. Si verò adhuc amplius superetur aqua ab igne, talis anima valde acuta est, & tales necesse est somnia videre, vocant autem ipsos subfuriosos.
- B** Nam res valdè propinqua insanix est. Etenim à breui & incommoda inflammatione insaniunt, & in ebrietatibus, & carnis bona habitudine, & prae carniū esu. Verùm talē oportet ab his omnibus abstinere, itémq; à reliqua repletionē, ac exercitiis violentis. In victu utendum est Maza vino dulci non subacta, & oleribus coctis, sed non purgantibus, & pisciculis ex muria, & aquam bibere præstantissimum est, si fieri possit, sin minus, vinum molle & album quod aquæ sit proximum. Deambulationibus quoq; multis mane utendum, à cœna verò satis est exsurgere, quo cibi quidem nō resiccentur à deambulationibus post cœnã, corpus autem euacuetur à matutinis. Lauare autem magis cōducit aqua tepida circumaffusa, quàm vngi. Confert & in æstate interdium somno uti breui nō multo, ut ne corpus ab anni tempore resicceat. Conueniens est etiam vere veratris purgare, fomentis antea præparatos, deinde sensim ad diætã inducere, & neque hunc ieiunum actiones obire oportet. Et ex hac sanè cura, huiusmodi anima sapientissima fuerit. Sapientis quidem igitur ac desipientis animæ hoc temperamētum causa est, quemadmodum à me scriptum est, potestque ex diætã & melior, & deterior fieri. Cæterum cursus impetu igne præualecente, impossibile forte fuerit aquæ aliquid apponere, Similitérq; aqua præualente in temperamento, ignem augere. Ex his verò & sapientiores & desipientiores animæ fiunt. At verò talium non amplius temperamētum est, quā-
lis est, Iracundus, Segnis, Dolosus, Simplex, Infestus, Beneuo-
lus. Talium omnium natura meatuum per quos anima

Quàm va-
ria hæc na-
tura à cæte-
ris.

Qui nutri-
catus.

Quæ nulla
cura mutetur.

Hippocratis Liber I I.

meat caussa est, per qualia enim vasa secedit, & ad qualia D
allabitur, & qualibus ammiscetur, talia sapiunt. Ob id itaq;
impossibile est talia ex diætâ transmutare. Naturam enim
obscuram transformare non est possibile. Similiter autem
& vocis qualiscunque tandem fuerit meatus spiritus caussa
sunt, per qualescunque enim aer mouetur, & ad qualescunq;
allabitur, talem necesse est esse vocem: & hanc quidem tum
deteriorem, tum meliorem facere possibile est, quia leuior-
es ac breuiiores meatus spiritus facere possibile est. Verùm
illa ex diætâ alterare impossibile existit.

H I P P O C R A T I S ^E

COI DE DIAETA SIVE VI-
CTVS RATIONE, LIBER II.

IANO CORNARIO ME-


DICO P H Y S I -

C O I N T E R -

P R E T E .

*

Regionum
qualitas.



Loca alta.

REGIONVM singularum situm & natu-
ram hoc modo cognoscere oportet. Et in
summa res hoc modo se habet. Regio F
ad meridiem sita calidior est, & siccior,
quàm ea quæ ad septentriones iacet, pro-
pterea quòd soli propinquior est. Et in his
regionibus necesse est & hominum genera, & nascentia ex
terra, sicciora ac calidiora & fortiora esse, quàm in contra-
riis, velut Libyca gens ad Ponticam, & vtrisque vicinæ. Ipsa
autem loca iuxta seipsa hoc modo habent. Alta & squallida
& ad meridiem sita, sicciora sunt quàm campestria & æqua-
liter sita, propterea quòd pauciores humores habent, Illa
enim stationem pro aqua pluuiâ non habent, hæc habent.
At verò lacustria ac palustria humectant & calfaciunt. Et
calfaciunt quidem quia caua sunt & circumdata, & non per-
stantur: humectant autem, quia nascentia ex terra quibus
homines

A homines aluntur, humidiora sunt, & spiritus quem attrahimus crassior est, propter aquæ stationem ac immobilitatem. Verùm caua loca & non aquosa, siccant, & calfaciunt.

Et calfaciunt quidem quia caua sunt & circundantur. Siccant autem, tum propter alimenti siccitatem, tum quòd spiritus quem inspiramus siccus existens, humorem ex corporibus trahit in alimentum sibi ipsi, quum non habeat alium humorem ad quem allapsus nutriatur. Vbi autem regionibus montes adiacent ad austrum, in his squallidi austri & morbosì afflant. Vbi autem ab Aquilone montes adiacent, in his aquilones perturbant ac morbos faciunt. Vbi verò ab Aquilone caua loca vrbibus adiacent, ab æstiuis ventis calida & morbosa hæc regio existit, propterea quòd neque Aquilo perflans puram spiritus inductionem exhibet, neque ab æstiuis ventis perfrigeratur. Caterùm insulæ

Qualitas
insularum.

B propinquæ continenti tempestuosiores sunt & agrè in ipsis hybernamus. Marinæ verò hyeme repidiores sunt, propterea quòd niues & glacies incontinenti stationes habent, & ventos frigidos in vicinas insulas mittunt. Verùm insulæ intra pelagus positæ non habent in hyeme niuium stationem. Porro de ventis quam naturam ac facultatem singuli habent, hoc modo cognoscere oportet. Naturam quidem habent omnes venti humectandi ac frigefaciendi, tum animalium corpora, tum nascentia ex terra, ob hanc causam, Necesse est omnes ventos spirare à niue, à glacie, & ge-

Ventorum
natura.

C lu vehementi, & fluminibus, & stagnis, terræque humecta ac perfrigerata. Et fortiores quidem ventos, à maioribus & fortioribus, debiliores verò à minoribus & debilioribus. Quemadmodum enim animalibus spiritus inest, Sic etiam aliis omnibus, aliis quidem minor, aliis verò iuxta magnitudinem. Naturam quidem igitur habent humectandi ac frigefaciendi omnes venti, Verùm propter situm regionum ac locorum, per quæ venti ad singulas regiones accedunt, diuersi inter se fiunt, frigidiores, calidiores, humidiores, sicciores, morbosiores, salubriores, Singulorū autem causam sic cognoscere oportet. Boreas siue aquilo frigidus spirat ac humidus, quia progreditur à talibus regionibus, meátque per tales locos, ad quos non accedit sol ipse, neque aerem resiccans, humorem ebibit ac exhaurit, Quare

Septentrio.

Auster.

Qualis sit
auster.Qui venti
boni sint.Loca non
sana.Cur medi-
terranei vē
ti sicci.Montani
venti.

ad terram habitabilem accedit suam ipsius vim habens, vbi D
non per regionis situm corrumpitur. & his quidem qui pro-
ximè habitant frigidissimus est, qui verò remotissime, mi-
nimè. Auster autem à similibus aquiloni natura regioni-
bus spirat. Ab Australi enim polo spirans, & à niue multa
glacièque ac gelu fortibus procedens, necessariò his qui pro-
pe ipsum illic habitant talis spirat, qualis nobis est Aquilo.
Verùm omnem non item similis accedit regionem. Nam
quum per solis iter & in meridiem spiret, humiditas ipsius à
sole ebibitur, & resiccatus rarefcit, quapropter necesse est
ipsum calidū ac siccum huc accedere. In proximis igitur
regionibus necesse est ipsum talem vim calidam ac siccam
exercere. & hoc sanè in Libya facit, Nam & terræ nascentia E
exarescunt, & homines latenter resiccat, Quum enim non
habeat nec mare, nec fluuium vnde humiditatem accipiat,
ex animantibus ac plantis humorem exhaurit. Vbi vero pe-
lagus transit, tanquam calidus & rarus existens, multa hu-
miditate regionem in quam illabitur implet, & necesse est
ipsum calidum ac humidum esse, vbi non regionum situs
alterius qualitatis causa existat. Eodem modo etiam alio-
rum ventorum facultates se habent. Caterum iuxta sin-
gulas regiones venti hoc modo se habent. Venti ex mari
in regiones illabentes, sicciore quodāmodo sunt. Qui ve-
rò à niue aut glacie, aut stagnis aut fluminibus procedunt,
omnes humectāt ac frigefaciunt, tum plantas, tum animan-
tia, & sanitatem corporibus exhibent qui nō frigiditate su- F
perexcellunt. Hi enim lædūt, propterea quòd magnas muta-
tiones calidi ac frigidi in corporibus inducunt. Hæc autem
perpetiuntur hi qui in regionibus habitant palustribus ac
calidis, prope flumina magna. Reliqui verò venti qui à
prædictis spirāt viles sunt, tum aerem purū ac sincerum ex-
hibentes, tum animæ calori humiditatem præbentes. Qui-
cunq; verò venti ex terra accedunt, eos necesse est sicciore
esse, tum à sole, tum à terra resiccatos, Quum autē non ha-
beant venti vnde alimentum trahant, à viuētibus humorem
trahentes, & plantas & animalia omnia lædunt. Et qui-
cunque venti relictis montibus ad vrbes accedunt, non so-
lūm siccant, sed etiam turbāt spiritum quem inspiramus, &
corpora hominum morbosa faciunt. Naturā quidem igitur
& vim

A & vim singulorum sic cognoscere oportet. Quomodo autem ad singulos se præparare oporteat, in sermonis progressu declarabo. At verò ciborū ac potuum singulorum vim, tum eam quæ secundum naturam est, tum eam quæ per artem accessit, hoc modo cognoscere oportet. Quicunque igitur *Quæ non rite priores digessere.* in summa dicere aggressi sunt, aut de dulciū, aut pinguium, aut salforum, aut alterius cuiusdā consimilis facultate, non rectè iudicant. Non enim eandem vim habent, neque dulcia inter se, neque amara, neque vlla aliqua eiusmodi. Multa enim ex talibus sunt quæ & aluum emolliunt, & sistunt, siccantque & humectant. Similiter autem etiā in reliquis omnibus. Sunt & quæ adstringunt, itēque aluum mouēt, & vri

B nam cient. Sunt quæ neutrum horum faciunt. Similiter & ex calfacientibus ac reliquis omnibus, alia aliā facultatem habent. De omnibus quidem igitur impossibile est qualiānam sint declarare, Verūm quam singulatim vim habeāt, docebo. Ordeum natura quidem frigidum est & siccum. *Ordeum.* Inest & purgatoriū quiddā à succo pælearum. Eius signum habebis si voles ordeum non purgatū coquere, Purgat enim is succus fortiter, Si verò decorticatum coxeris, perfrigerabit magis ac aluum sistet. Quum autem tostum fuerit, humor quidem purgatorius præ igne perit. Frigiditas autem & siccitas relinquitur. Quæcunque verò perfrigerare ac siccare oportet, id ipsum polentæ transigunt. *Maza-* Maza omnis generis sic vtimur, facultatem autē habet maza hæc talem, farina ex toto collatæ alimentum quidem minus habent, verū magis per aluum secedunt. Puræ autē magis nutriunt, minus verò per aluum secedunt. Maza prius subacta, respersa, vino dulci non emollita, leuem facit, & per aluum secedit, ac frigefacit. Et frigefacit quidem, quia frigida aqua madafacta est, per aluum autem secedit, quia cito concoquitur. leuem verò facit, quia multum alimentum cum flatu foras excernitur. Quum enim transitus alimenti angustiores sint, aliud insuper accedens non suscipiunt, & quod quidem cum flatu attenuatum est, foras excernitur, quod vero intus manet, flatum inducit, & partim supernè eructatur, partim infernè secedit. Multum itaque alimenti à corpore diffiatur. Si verò velis mazam statim vt subacta est exhibere, talis resiccatoria est. Quum enim polenta sicca existat, & aqua sit madefacta

madefacta, atque sic preparata in ventrem illabatur, humo- D
rem ex ipso trahit calidum existentem. Solet enim calidum
attrahere frigidum, & rursus frigidum calidum. Cōsumpto
autem humore ex ventre necesse est siccari. Aqua verò quæ
vnà cum maza ingressa est, frigefacit. Quęcunque igitur sic-
care oportet aut frigefacere, aut ventris profluuium diffusum,
aut alia quapiā eiusmodi caliditate, maza efficax existit. At
vero siccam, vino dulci emollita ac trita maza, siccatur quidem
non similiter, propterea quòd vehementer est adstricta, ali-
mentum verò plurimū corpori prębet. Nam vt leniter lique-
scantis alimentū transitus suscipiunt. Per aluum quidem igi-
tur tardè secedit, flatum autem non inducit, neq; eructatur.
Quæ verò & aqua, & vino dulci emollita ac prius subacta E
est, nutrit quidem minus, per aluum autem secedit, & flatum
magis inducit. Cyceon autem solum in aqua quidem frige-
facit ac nutrit, in vino verò calfacit ac nutrit, & aluū sistit. In
melle autē calfacit quidem minus ac nutrit, per aluum verò
magis secedit, si non meracū mel fuerit: sin minus, non sece-
dit, sed aluum sistit. In lacte verò bene alunt omnes Cyceo-
nes, hoc est farina. Veruntamē ouillum aluū sistit, caprinum
verò magis per aluū secedit. Bubulum verò minus. Equi-
num autem & asininum magis secedunt. Triticum fortius
est ordeo & magis nutrit, minus autē per aluum secedit, tum
ipsum, tum succus. Panis autem ex tota farina collata, siccatur
& per aluum secedit. Purus autem magis nutrit, minus verò
secedit. Ex ipsis porrò panibus, fermentatus quidem levis F
est & secedit. Et levis quidem est, quia à fermenti acore hu-
miditas consumpta est, quæ sanè alimentum existit, secedit
autem, quia cito concoquitur. Non fermentatus secedit qui-
dem minus, nutrit autem magis. Qui succo subactus est, le-
uior est, & multum nutrit, ac per aluum secedit. Nutrit, quia
purus est, levis est, quia leuissimo subactus est, & fermentatus
ac tostus ab eodem est: per aluū secedit, quia passus, & aluum
mouente tritici parte, permixtus est. Ex ipsis autem pani-
bus maximi maximè alūt, propterea quod minimè exuritur
humiditas ab igne. Et furnacei panes magis alunt quàm fo-
carij & veruarij, propterea quod minus exuruntur ab igne.
Clibano autem cocti & subcinericij siccissimi sunt, hi qui-
dem propter cinerem, illi verò per testam humore priuati.
Simil

Cyceon.

Lac.

Triticum.

Panis va-
rietas.

A Similaginei omnium horum fortissimi sunt, Et adhuc magis qui ex alica fiunt, valdeque nutriunt, verum non similiter secedunt. Farina pura in aqua pota frigefacit, & lotura polli-
nis tritici. Furfurum succus coctus, levis, per aluum secedit. **Farina.**

Verum farinæ in lacte datæ magis per aluum secedunt, quam in aqua, propter serum, & maximè inter aluum mouentia numerantur. Quæcunque verò farinæ cum melle & oleo coquuntur, aut assantur, omnes æstuosæ sunt, & ructum ciunt. Et ructum quidem ciunt, quia probè alentes non secedunt. Æstuosæ autem sunt, quia pinguia, & dulcia, & inter se concordia, non eadem coctura indigentia, in eodem sunt. Simila-
go & alica cocta, fortia sunt & alunt, non tamen per aluum se-
B cedunt. Trygis, id est, Tragus siue olyra, leuior est tritico, **Trygis.** & quæ ex ipsa fiunt similiter ut ea quæ ex tritico parantur, & magis per aluum secedunt. Avena comesta humectat ac per-
frigerat, itemque in sorbitione accepta. Polentæ ac farinæ **Avena.** recentes sicciores sunt vetustis, quia igni & præparationi pro-
pinquiores existunt. Vbi verò vetustæ fiunt, calor exhalat, & **Polentæ** frigiditas inducitur. Panes calidi siccant, frigidi minùs, gra- **recentes.** cilitatem autem quandam inducunt. Fabæ alunt, aluum si-
stunt, & inflant. Inflant, quia meatus aliud insuper accedens **Panes ca-** alimentum non suscipiunt. Aluum sistunt, quia totam ali- **lidi.** menti fecem habent. Pise inflant quidem minùs, per aluum **Faba.** autem magis secedunt. Ochri siue eruiliæ, & dolichi siue pha-
sioli ac siliquæ, hi magis per aluum secedunt, minùs inflant, **Pisum.** & probè alunt. Cicer album per aluum secedit, & per vri- **Ochri.** nam eiicitur, & alit. Et alit quidem, carnosum in ipso. Per **Cicer.** urinam verò eiicitur, dulce, per aluum autem secedit, salsuginosum. Milij grana ac paleæ siccant, & ventrem sistunt, & **Milium.** cum ficubus, fortibus doloribus conferunt. Ipsum autem Mi-
lium coctum alit, non tamen aluo secedit. Lentæ æstuosæ **Lens.** sunt & turbatiuæ, & neque per aluum secedunt, neque ipsam
sistunt. Eruum aluum sistit, & robustum est, & crasse facit, **Eruum.** & explet, & boni coloris hominem facit. Lini semen come- **Linum.** stum aluum sistit, habet & quiddam frigefactorium. Hor-
mini semen consimilia lini semini facit. Lupini natura ro- **Horminū.** busti sunt & calidi, verum per præparationem leuiiores ac fri-
gidiores fiunt, & aluo secedunt. Irio humectat & aluo sece- **Lupinum.** dit. Cucumeris semen per lotium magis abit quam secessum. **Irio.** **Cucumis.**

Explet

Cnicus.
Papauer.

Caro cuius-
que anima-
lis.

Caro auiū.

Explet autem & crassescit. Et secedit quidem per aluū, pro- **D**
pter paleam externā, explet autem & crassēfacit, propter car-
nem. Lotum verò secedit quidem verū minū, crassēfacit
autem & explet magis, humectat autem & vrit, propter pin-
gue & oleosum. Cnicus aluum mouet. Papauer aluū sistit,
magis autem nigrum hoc facit, sed & album idem agit, alit
autem & robustum est. Horum porrò omnium succi carnis
aluū mouēt, oportet itaq; in pręparatione id obseruare, vt
quę siccare velis, ab his succos detrahas, & carne vtaris. Quę
verò aluū mouere velis, vt succo copiosiore, carne verò pau-
ciore & succulentiore vtaris. Cęterū de animalibus quę
in ciborum vsum veniunt, sic cognoscere oportet. Carnes **E**
Bubulę robuste sunt, & aluum sistunt, & ægre in ventre con-
coquuntur, propterea quòd crassi ac multi sanguinis est hoc
animal, & carnes graues, itēq; sanguis, ac lac. Quorum au-
tem animalium lac tenue est, & sanguis similiter, eorū etiam
carnes confimiles sunt. Caprinę carnes his leuiores sunt, &
magis aluo secedunt. Suillę robur quidem magis quā hę
corpori inducunt, multū autem aluo secedunt, propterea
quòd tenues & modici sanguinis venas suę habent, carnem
verò multam. Agninę leuiores sunt ouillis, & hedinę capri-
nis, quia exanguiores sunt & humidiores. Quum enim sic-
ca & robusta natura sint animalia, dum quidem tenere sunt,
aluo secedunt, vbi verò augmentū sumpserint, nō similiter.
Et vitulinę carnes eodem modo se ad bubulas habent. Ve- **F**
rūm porcine suillis grauiores sunt. Quum enim animal sit
natura carnosum & exangue, humiditatis excessum in tenel-
la ætate habet. Quum igitur meatus superaccedens alimen-
tum non suscipiant, intus manens calfacit ac perturbat ven-
trem. Asininę carnes aluo secedunt, & pullorū adhuc magis.
Equinę leuiores sunt. Caninę calfaciunt ac siccant & robur
inducūt, non tamen aluo secedunt, catulinę verò humectant
& secedunt. Suis syluestris caro siccatur & robur exhibet, ac se-
cedit. Cerui siccatur, minū autem secedit, magisque vrinam
prolicit. Leporinę siccę sunt & aluum sistunt, vrinę autem
citamentum quoddam faciunt. Vulpinę humidiores sunt
& vrinam cient. Et erinaceorū terrestrium carnes humidio-
res sunt ac vrinam cient. Porrò de volucrum generibus sic
res se habet. Omnia ferme volucrum genera sicciora sunt
quā

- A** quàm quadrupedia. Quæcunque enim vesicam non habent, neque mingunt, neq; sputum aut saliuam fundunt, omnino sicca sunt. Propter caliditatem enim ventris, humiditas ex corpore consumitur in alimentum caliditatis, quare neque mingunt, neque sputum aut saliuam fundunt. Cui autē tales humiditates nō insunt, id ipsum necessariò siccatur, Siccissima igitur caro est palumbis, deinde columbæ, tertio loco perdicis, ac galli, & turturis, Humidissima verò anseris. Semini-
leges autem volucres prædictis sicciore sunt. Verum anatis carnes, & reliquarum auicularum quæ in paludibus degunt, aut in aquis, omnes humidæ sunt. At verò ex piscibus sicci- **Pisces.**
fimi sunt hi, scorpius, draco, callionymus, cuculus, glaucus,
B perca, thrissa. Leues autē sunt petrosi fermè omnes, velut tur-
dus, phuca, elephetis, gobio. Tales autem & prædicti itidem, **Pisces er-**
leuiore sunt erronibus, Nam hi vt quiescentes raram ac le- **rones.**
uem carnem habent, Errones autem & vndas verberantes la-
boribus fracti, solidiorem carnē habent. Torpedines autem
& squatinæ ac Rhombi, & huiusmodi, sunt leuiore. Qui-
cunq; verò pisces in lutosi & aquosi locis alimenta habent, **Pisces gra-**
velut capitones, mugiles, anguillæ, & reliqui eiusmodi, gra- **uiore, &**
uiore sunt, propterea quòd ab aqua & luto, & in his nascenti- **contra.**
bus, alimenta habent, à quibus etiam spiritus in hominem
ingrediens ipsum lædit ac grauat. Fluuiatiles autē & palu-
stres his adhuc grauiore sunt. Polypi verò & sepiæ, & eius-
modi pisces, neq; pisces velut videntur sunt, neq; per aluum
C secedunt, quapropter etiam oculos comesti grauant. Iuscula
tamen horum aluum mouent. Cæterum conchyliæ velut **Conchyliæ,**
sunt pinæ, purpuræ, patellæ, buccinæ, ostrea, ipsa quidem sic-
ca sunt, succi autem ipsorum aluum mouent. Mituli verò &
pectines actellinæ magis aluo secedunt. Vrticæ autem &
chartilagini generis pisces, maxime humectant ac aluum
mouent. Cæterum Erinaceorum oua, & locustarū humor,
& musculi & vrsæ, accancri, magis quidem fluuiatiles, sed &
marini, aluum mouent & vrinam cient. Salsamenta siccant **Saliti pi-**
& attenuant, pleraque etiam aluum leniter mouēt. Ex salsamen- **scæ.**
tis siccissima sunt marina, deinde fluuiatilia, Humidissi-
ma autem sunt palustria. Ex ipsis autem salsamentis pisces **Animaliū**
percæ appellati valde sicci sunt. Animalium porrò cicurum **& carniū**
ea quæ in syluis & agris pascuntur, sicciore sunt his quæ intra **diuersitas.**
ædes

xdes nutriuntur, quia labore reficcantur, itémq; præ Sole ac D
 frigore, & spiritu sicciore nutriuntur. Verū syluestria siccio-
 ra sunt mansuetis, & crudiura ac sylvarum materie pasta,
 itémque parum edacia, sicciora sunt edacibus. Et frugiuora
 herbiuoris sicciora sunt, Et frugiuora non frugiuoris, & pau-
 cibibis multibibis, & sanguine referta exanguibus ac paucū
 sanguinem habentibus, & quæ in vigore sunt vetustis valde
 ac iuuenulis, & mascula fœmineis, & castrata non castratis,
 & nigra albis, & hirta nudis. Contraria verò his humidiora
 sunt. Ex ipsis autem animalibus carnes hæ fortiores sunt,
 quæ optimè exercētur ac sanguinolentissimæ sunt, & in qui-
 bus recumbunt, Leuissimæ autem carnes sunt, quæ minimè
 exercētur, & in vmbra degunt, & in intimis animalis parti- E
 bus sitæ sunt. Exanguium autē partium robustissimæ sunt,
 cerebrum & medulla. Leuissimæ verò carniū partes sunt ca-
 pitales, & sub ventre, muscoli, pectines, pedes, Ex piscibus sic-
 cissimæ sunt supernæ partes, leuissimæ sub ventre, Et capita
 ipsorum humidiora sunt, propter pinguedinē ac cerebrum.
 Oua qua- Oua volucrum robustum quid habent, & alunt, & infant.
 lia. Robustum quid habent, quia generatio est animalis. Alunt,
 quia hoc est pulli lac. Infant, quia ex parua mole in multam
 diffunduntur. Caseus. Caseus robustus est & æstuosus & alit, Robu-
 stus quidem, quia proximus est generationi. Alit autē, quia
 carnosæ reliquæ sunt lactis. Aestuosus est, quia pinguis. Al-
 uum autem sistit, quia succo & coagulo compactus est. Aqua
 Aqua. frigefacit. Vinum calidum est & siccum, Habet & purgato- F
 Vinum ni- rium quiddā à materia. Vina nigra & austera sicciora sunt,
 grum. & aluum non mouent, neque vrinam cient, neq; saluam fa-
 ciunt. Siccant autem & calefaciūt, humiditatem ex corpore
 consumentes. Molliora verò nigra humidiora sunt, & infant
 atq; aluum magis mouēt, Dulcia nigra humidiora sunt, cal-
 faciunt autem & infant humiditatem inducentia. At verò
 alba & austera calfaciunt, magisque vrinam cient, quàm al-
 uum mouent. Noua vina aluum magis mouent, quia pro-
 piora musto sunt, itémq; alunt, & odorata magis quàm ino-
 dorata eiusdē ætatis, quia magis concocta sunt: & crassa ma-
 gis quàm tenuia. Verum tenuia dulcia magis vrinam cient,
 & aluum mouent, & humectant corpus & sanguinem debi-
 lem faciunt, & aduersarium corporis sanguinem in corpo-
 re au

A re augent. Mustum inflat, & subducit, ac conturbat feruens Mustum.
 in ventre, & aluo secedit. Inflat quidem, quia calfacit, subdu-
 cit autem ex corpore, quia purgat, cōturbat autem, quia fer- Vinum a-
 uet in ventre, atq; ita aluo secedit. Vina acida frigefaciūt, at cidum.
 tenuant & humectant. Frigefaciūt quidem & attenuant hu-
 miditatis euacuationē à corpore facientes, humectant autē
 per aquam vnā cum vino ingredientem. Acetum frigefacit, Acetum.
 quia colliquans humiditatem in corpore consumit. Sistit au-
 tem magis quā mouet aluum, quia nō alit & acre est. Sapa Sapa.
 calfacit & humectat ac subducit. Calfacit, quia vinosa est hu-
 mectat, quia alit, subducit quia dulcis est. Vinum recens sub
B torculari expressum & nondū excolatum, humectat, subdu- Mel.
 cit, & inflat, quia etiam mustum idem facit. Mel calidum est
 & siccum, si meracum sit, cū aqua autem humectat & aluū
 mouet biliosis, pituitosis verò sistit. Dulce verò vinum pitui-
 tosis magis aluo secedit. De oleribus porro hoc modo res se
 habet. Allium calidum est, & aluum mouet & vrinam ciet Allium.
 corpori, oculis verò non est commodum. Multam enim cor-
 poris purgationem faciens, visum hebetat, aluum autem &
 vrinam mouet, propter vim purgatoriam: coctum debilius
 est quā crudum, flatum autem inducit, propter spiritus in- Cepa.
 rentionem. Cepa visui cōmoda est, corpori verò mala, quia
 calida & æstuosa est, & aluo secedit, & alimentū quidem nul-
 lum corpori præbet neq; vtilitatem, calfaciens autem siccatur
 propter succum. Porrum calfacit quidem minus, vrinam ve Porrum.
 rò ciet, & aluū mouet, habet & quid purgatoriū, humectat
 autem & ructū acidum sedat, Præstat à reliquis cibus postre-
 mum ipsum edere. Raphanus siue radícula, humectat pitui- Raphanus
 ram diffundens sua acrimonia, folia minus prosunt, præter-
 quam ad articulare morbum. Radix vitiosa est, innatās ac
 ægrè concoctilis. Nasturcium calidum est, & carnē liquat. Nasturciū.
 sistit autem pituitam albam, quare vrinæ stillicidiū inducit.
 Sinapi calidum est & aluum mouet, sed & hoc vrinæ diffi Sinapi.
 cultatem facit. Quin & Eruca idem facit. Coriandrum cali- Coriandrū
 dum est, & aluum sistit, & ructum acidum sedat, & somnum
 conciliat, si postremum edatur. Lactuca frigidissima est, Lactuca.
 prius quā succum habeat, debilitatem autem quandam
 corpori inducit. Anethum calidum est, & aluum sistit, & Anethum.
 sternutamenta sedat olfactatum. Apium magis vrinam ciet Apium.
 p quā

quàm aluum mouet, & radices magis quàm ipsum, aluum **D**
Ocymum. mouent. Ocymum siccum est & calidum: & aluum sistit.
Ruta. Ruta urinam magis quàm aluum mouet, Habet & vim
quandam condensandi, & ad medicamenta noxia commoda
est præparata. **Asparagus** siccus est & aluum sistit. **Salvia**
Salua. sicca est & aluum sistit. **Solanum** frigefacit, & semen in
Solanum. somnis effundere nō permittit. **Portulaca** fluuiatilis frige-
Portulaca. facit, sale verò condita ac seruata, calfacit & purgat. **Calamin-**
tha. mintha calfacit & purgat. **Mintha** calfacit & urinā ciet, &
Mintha. vomitus sistit. Et si quis semen eius saepe comedat, collique-
facit vt quis diffluat, & arrigere prohibet, & corpus desile
facit. **Rumex** calfacit ac aluum mouet. **Atriplex** humida
Atriplex. est, non tamen aluum mouet. **Blitum** calidum est, non mo-
Bralsica. uens aluum. **Bralsica** calfacit ac aluum mouet, & biliosa **E**
ducit. **Beta** succus quidem aluum mouet, ipsum autem
olus comestum sistit. Radices verò magis aluum mouent.
Cucurbita. Cucurbita frigefacit & humectat, & aluum mouet.
Rapum. Rapum æstuosum est, humectat autem & conturbat cor-
pus, non tamen aluum secedit, & urinæ difficultatem indu-
cit. **Pulegium.** Pulegium calfacit & aluum mouet. **Origanum** cal-
Origanum facit, & biliosa subducit. **Thymbra** similia origano effi-
cit. **Thymum** calidum est, per aluum secedit & mingi-
Thymum. tur, ducit & pituitosa. **Hysopum** calidum est & pituita du-
Hysopum cit. Porro syluestria olera, quæ os calfaciunt, & odorata
Herbarum sunt, ea calfaciunt & minguntur magis quàm per aluum se-
vires. cedunt. Quæ verò humidam habent naturam frigidamque
ac fatuam, & odores graues, magis per aluum secedunt, quàm **F**
per urinam. Quæ autem acerbæ & austerae sunt, aluum si-
stunt. Quæ acridæ & odoratae sunt, urinam ciet. Quæ acridæ
& sicca in ore sunt, ea omnia siccant. Quæ acida sunt, frige-
faciunt. Cæterum succi urinam cientes sunt, crethmi, a-
pij, alij cremor, cytisi, fœniculi, porri, adianti, solani, qui &
frigefacit. Item scolopendrium, mintha, seseli, caucalides,
hypericū, vrticæ. Aluum autem mouent & purgant, cicer,
lenticula, ordeum, beta, bralsica, mercurialis, sambucus, cni-
cus. Hæc omnia aluum magis mouent quàm urinam. At ve
Poma. rò de pomis hoc modo se res habet. Quæ quidem seminibus
referta sunt, ea magis aluum mouent, Item viridia magis
Mora. quàm sicca. Verum vis & facultas ipsorum referatur. Mora
calfac

A calfaciunt & humectant ac aluo secedunt. Pira matura cal-
faciunt & humectant ac aluum mouent. Dura verò sistunt. Pira.
Pira syluestria, hyberna, matura, aluum mouent ac purgāt.
Cruda verò sistunt. Mala dulcia agre concoquuntur. Acida Mala dul-
verò & matura, minùs. Cydonia adstringunt, & non mouēt cia
aluum. Succi autem malorum, vomitus sistunt & urinā ciēt. Coronea.
& ante vomitum odores ipsorum idem præstant. Mala syl-
uestria aluum sistunt. Cocta comesta magis aluum mouent.
Verùm ad respirationē quæ erecta ceruice fit, & succi ipso-
rum, & ipsa quoque, hausta profunt. Sorba, Mespila & Cor- Sorba.
na, & quæcunque alia huius generis poma, aluum sistunt & Mesp. Cor-
acerba sunt. Mali punici dulcis succus aluum mouet, haber na.
B autem quid æstuosum. Mala punica vinosa, minùs æstuosa Mala puni
sunt. Acida verò magis frigefactoria. Nuclei autem omniū ca.
sistunt. Cucumeres crudi, frigidi sunt & agre concoctiles. Cucumis.
Maturi autem & pepones, mingūtur & per aluum secedunt. Pepones.
verùm flatuosi sunt. Botri vuarum calidi sunt & humida, ac Vua.
aluum mouent, maximè albi. Dulces quidē igitur calfaciūt
fortiter, propterea quod multum iam caliditatis habent. Im-
maturæ verò minùs calfaciunt, magis autē purgant potati.
Ficus & vux passæ æstuosæ sunt, sed aluum mouent. Ficus Ficus.
viridis humectat & aluum mouet, ac calfacit, humectat,
quia succo plena est. Calfacit, propter succum itidem, aluum
mouet, propter succi dulcorem. Primæ ficus pessimæ sunt,
quia succulentissimæ, optimæ autē sunt postremæ. Ficus ari-
C dæ æstuosæ sunt, sed aluo secedunt. Amygdalæ æstuosæ sunt, Amygdala
verum probè nutriunt. Aestuosa quidem sunt propter pin-
gitudinem, nutriunt autem propter carnositatem. Nuces Nuces.
rotundæ similes his sunt. Latæ verò maturæ probè alunt, &
aluum mouent. Depuratæ verò etiam flatum inducunt. Tu-
nicæ verò ipsarum aluum sistunt. Acyli ilicis glandes, & quer- Castaneæ.
cinæ fagineæ glandes, aluum sistunt crudæ & assatæ, coctæ
verò minùs. Pingues carnes æstuosæ sunt, sed aluum mouēt,
Carne conditæ ac asseruatæ in vino quidem siccant & alūt, Caro variè
& siccant quidem propter vinum, alunt autem propter car- condita
nem. In aceto autem asseruatæ calfaciunt quidem, verùm quid possit
minùs propter acetum, multum autem nutriunt. At verò
sale seruata minùs quidem alunt, humiditate per salem pri-
uatæ, attenuant autem & siccant, ac sufficienter aluum mo-
uent,

Quæ vires uent. Cæterum vires singulorum detrahere, & addere ac au- D
dematur & gere, hoc modo oportet. Ex igne & aqua omnia constituun-
aumentur. tur, & animalia, & terra nascentia, & ex his augescunt, & in

hæc secernuntur ac resoluuntur. Fortiū quidem igitur edu-
liorum vim sæpe coquendo ac frigefaciendo detrahere oportet, & vice versa augere. Humidorum autem torrendo ac as-
sando humiditatem eximere. Siccorum verò rigando ac ma-
defaciendo. Salforum rigando & coquendo. Amarorum &
acrium dulcium mixtura. Acerborum pinguium tempera-
mento, & de reliquis omnibus ex prædictis iudicium facere

Tosta.

oportet. Quæcunque tosta aut affata sunt, aluum magis si-
stunt quàm cruda, propterea quòd humiditas itémque pin-
guitudo per ignem ablata sunt. Quum itaque in ventrem E
inciderint, humiditatem ex ventre trahunt, & oscula vena-
rum cōcludūt siccantq; ac calefaciunt, quare transitus hūmi-
ditatis sistunt. Quæ verò ex inaquosis ac siccis & æstuosis lo-
cis veniunt, ea omnia sicciora ac calidiora sunt, & robur am-
plius corpore exhibent, propterea quòd pari mole ac copia

In siccis lo-
cis nata.

graviora sunt & densiora, & maiorem redditū tribuūt, quàm
quæ ex humidis & riguis ac frigidis. Hæc enim humidiora
sunt & leuiora ac frigidiora. Non igitur ipsius cibi & potus,
& animalium ipsorum vim nosse oportet, sed etiā patriæ unde
sunt. Quum igitur forte alimentum corpori offerre voles, &
ex iisdem cibis, his quæ ex inaquosis locis veniunt utendum
est, & cibis, & potibus, & animalibus. Vbi verò leuiore & hu- F
midior, his quæ ex riguis veniunt vteris. Dulcia & acria, &
falsa, & amara, & austera, & carnosæ calfacere solent. Item
quæ sicca sunt, & quæ humida. Quæcunque igitur de sicca
parte plus in se habent, ea siccant & calfaciūt. Quæ verò hu-
midæ partis plus habent, ea omnia calfacientia humectāt, &
aluum magis mouent quàm sicca. Nam ubi alimentum am-
plius corpori præbuerunt, reuulsionem in ventre faciunt, &
humectantia aluo secedunt. Quæ autem excalfacientia sic-
cant, tum edulia, tum pocula, neque saluam, neque vrinam,
neq; secessum facientia, corpus siccant, idque ob hanc cau-
sam. Corpus calfactū humore vacuatur, & pars eius ab ipsis
cibis, pars in alimentū caloris ipsius animæ cōsumitur. Pars
etiā calfacta & attenuata per ipsum corpus expellitur. Dul-
cia & pingua ac oleosa replent, quia ex modica mole mul-
tū

A tùm diffunduntur. Calfacta autem & diffusa, caliditatem in corpore replent ac tranquillam esse faciunt. At verò acida, & acria, & austerà, & acerba, & ex toto collata, & sicca, nō replent: propterea quòd oscula venarum aperiunt & expurgant, & partim siccantia, partim mordentia ac adstringētia, humiditatem carnis horrere ac confidere & in modicā molem contrahi faciunt, atque ita vacuum multum in corpore fit. Quum igitur voles à modicis implere, aut à pluribus euacuare, talibus vtaris. Recentia omnia maiorē quàm alia fortitudinē habēt, propterea quòd propinquiora viuo sunt. Verùm antiqua & marcida, magis quàm recētia aluum mouent, quia propiora putredini sunt. At verò cruda alunt &

Quā pauca
satiēt.

B ructus cient, propterea quòd quæ ignem coquere oportebat, ea venter transigit, debilior quàm ingesta sunt existens. Cæ. Obsonia ex intritis variis condita. Balnea. les inter se vires habentia, in eodem cohærent. Verùm quæ in muria præparantur, meliora sunt, & non æstuosa. Porro de balneis hoc modo habet. Aqua potabilis humectat & frigefacit, exhibet enim corpori humiditatē. Salsum autē balneum calfacit ac siccit. Quum enim natura calidū sit, trahit à corpore humiditatem. Calida autem balnea ieiunum attenuant ac frigefaciunt: per caliditatem enim humiditatē de corpore auferunt, euacuata autem de carne humiditate, corpus perfrigeratur. à cibo accepto eadē calfaciunt, ac humectant, ea quæ supereminet in corpore diffundentia in maiorem molem. Balnea autem frigida vice versa, vacuum quidem corpore præbent quandam caliditatē. Vbi autem cibus ingestus est, ab humido existente detrahunt, & frigidum existens siccitate replent. Non lauari siccit quum humiditas consumatur. Similiter etiam vnctionis neglectus.

Balnea calida.

Frigida.

Vnctio verò calfacit, humectat, ac mollit. Sol & ignis siccant, propterea quòd quum calida sint & sicca, humiditatem ex corpore trahunt. Umbra & frigus moderatē humectāt, dant enim magis quàm accipiunt. Sudores omnes abeunt: siccant & attenuant, humore ex corpore deficientē. Coitus attenuat, humectat & calfacit, Calfacit quidem propter laborem & excretionem frigiditatis. Attenuat autem propter euacuationem: humectat, propter colliuationis reli-

Vnctio.

Sol, ignis.

Umbra.

Sudores.

Coitus.

- Vomit.** quias in corpora præ labore. Vomitus attenuant propter cibi euacuationem, non tamen siccant, si quis postridie rectè curet, sed humectant, propter repletionem & colliquationem carnis præ labore. Si verò quis sinat hæc postridie cõsumi in alimentum caliditati, & diatam sentim adhibeat, siccant. Ventrem autem compactum vomitus soluit, & egerentem magis quàm oportet, sistit, illum quidem humectans, hunc verò siccans. Quum igitur aluum quis sistere volet, auidè deuoratum cibũ euomere oportet, priusquam humescat & infrà detrahatur: & magis acerbis & austeris edulius vti. Vbi verò soluere aluum quis velit, plurimo tempore cibis immorari confert, & acribus, ac salis, & pingui-
bus ac dulcibus, tum cibis, tum potionibus vti. Somni ieiun-
num attenuant & frigefaciunt, si non longi fuerint, præsentem humiditatem euacuantes, Qui verò magis calefaciunt, colliquant carnem, & corpus diffundentes exoluunt, ac debiles faciunt. à cibo verò sumpto calefacientes humectant, alimen-
tum in corpus diffundentes. à matutinis autem deambulationibus somnus maximè siccatur. Vigilia in exsatiatis cibo
noxia est, non permittens cibum liquari ac concoqui. Ieiunos autem attenuat quidem, verum minus lædit. Segnicies ac ociũ humectat, & corpus debile facit. Anima enim quies-
cens humiditatem ex corpore non consumit. Labor siccat, & corpus robustum facit. Semel in die cibum capere attenuat, & siccatur, & aluum sistit, propterea quòd per animæ caliditatem humiditas ex ventre & carne consumitur.
Prandium. Prandium contraria facit, Aquæ potus calidus attenuat, similiter & frigidus. At verò & spiritus, & cibus, & potus, humiditatem in corpore congelant, si excellenter frigida fuerint, & per cõgelationem ac frigiditatem aluos sistunt. Nam animæ humiditatem superant. Rursus autem etiam caliditatis excessus eandem congelant, in tantũ vt diffundi nequeat. Quæcunque verò calefacientia corpus, & alimentum non præbentia, carnem humiditate euacuant etiam excessum non facientia, ea frigiditatem homini exhibent. Nam præsentem humiditatem mota, flatu ab ipsa repletur ac perfri-
geratur. Caterum quam vim labores habeant nunc exponam. Sunt enim alij naturales, alij violẽti. Naturales igitur sunt. Visus, labor, auditus, vocis, curarum. Visus quidẽ igitur talis

A talis vis est. Anima in id quod videtur intenta, mouetur & calefcit. Calfacta verò, euacuata humiditate siccatur. Per auditum verò allabente sono, anima cōcutitur & laborat, laborans autem calefcit & siccatur. Quæcunque fiunt hominibus in cura, anima etiā ab his calefcit ac siccatur, & humiditatem cōsumens laborat, & carnes attenuat, & hominē euacuat. Quicunq; labores vocis sunt, velut sermo, aut lectio, aut cantus, omnes hi animam mouent, Mota autem siccatur & calefcit, & humiditatem in corpore consumit. At verò **Deambulationes.** deambulationes etiam ipsæ maximè præ reliquis naturales sunt, Habent autē quid violentum. Vis ipsarum talis est.

B Deambulatio à cœna & aluum, & corpus, & ventrem siccatur, ipsūque amarum fieri nō finit, ob hāc causam. Quum mouetur homo, calefcit corpus, itēq; cibi. Attrahit igitur humiditatem caro, & aluum amarū fieri non finit. Corpus quidem igitur repletur, aluus verò attenuatur. Siccatur autem eadem, ob hāc causam. Quum corpus mouetur & calefcit, quod tenuissimum estimenti cōsumitur, partim per insitum calorem, partim verò vnā cū flatu foras excernitur, partim etiā per lotium eiicitur. Quod verò siccissimum est de cibis relinquitur, Quare vnā cum aluo etiā caro resiccatur.

Matutinæ deambulationes attenuant, & partes circa caput **Matutinæ deambulationes.** leues, & agiles, ac promptas reddunt, & aluum solunt. Attenuant quidē, quia motum corpus calefcit, & humiditas attenuatur ac purgatur, partim per spiritum ac flatum, partim vero emungitur & excreatur: sed & aliqua pars in alimentum caliditatis animæ cōsumitur. Aluum autē solunt quia quum calida sit, frigido spiritu supernè allabente, caliditas frigiditati cedit. Leues autem partes circa caput faciunt, ob hanc causam. Quum euacuata est aluus, ex reliquo corpore & capite humiditatē in seipsam attrahit, nimirū calida existens. Euacuato autem capite, & visus & auditus depurgantur, & homines agiles fiunt. Deambulationes autē post **Deambulationes post exercitia.** exercitia, corpora pura reddunt, & attenuant, non permit- tentes carnis colliquationem fieri præ labore, sed ipsam depurgant. Ceterum cursus longi ac curui sensim facti, calfacientes carnem, concoquere ac diffundere possunt, & vim ciborum in carne concoquunt: verum corpora tardiora ac crassiora reddūt quàm cursus circulares. Et multa comedē- **Cursus.** tibus

tibus commodiores sunt, & hyeme magis quàm æstate. D

*Cursus ve-
luti.*

Qui verò in veste fiunt, eandem vim habēt, magis autem excalfaciunt, & corpora humidiora faciunt, & decoloratio-
ra: quia sincerus spiritus allabens ipsa non depurgat, sed in
eodem spiritu exercentur. Conferunt itaque & siccis, & car-

*Cursus re-
cti.*

nosus qui carnem demoliri & abolere volunt, itēmque senio-
ribus, propter corporis frigiditatem. Cursus autem recti
reuertentes, & equestres indefiniti, carnem minus diffun-
dunt, attenuant autem magis, propterea quod externis ani-

*Cursus cir-
culares.*

mæ partibus hi labores sunt, & humiditatem ex carne re-
uellunt, & corpus attenuāt ac siccant. Circulares verò cur-
sus carnem minimè diffundunt, attenuant autem & disten-
dunt carnem & ventrem maximè, propterea quod acutissi-
mo spiritu vtentes, humiditatem in seipsos celerrimè tra-
hunt. At verò concussiones siccant quidem derepente, non
sunt autem idoneæ, neque commodæ: nam conuulsiones in-
ducunt: quia excalfactum corpus, cutem quidē fortiter atte-
nuat, carnem verò minus coagmentat quàm cursus circula-
res, carnem autem humore euacuant. Commotiones &

Lucta.

alleuationes carnem quidem minimè excalfaciunt, corpus
autem & animā irritant, & spiritu euacuant. Lucta & fri-
catio, externis corporis partibus magis laborem exhibent:
calfaciunt autem carnem, & corroborant ac augeri faciunt,
ob hanc causam. Quæ ex natura solida sunt, confricta con-
sidunt ac coagmentantur, quæ verò caua sunt, augefcunt.

ἀλινδυσιν.

Quod itaque densum est in carne, id confrictum coagmen-
tatur, caua verò augefcunt, itēmque venæ. Nam carnes cal-
factæ ac siccatae, alimentum in seipsas per venas trahunt, de-
inde augefcunt. Volutatio in puluere consimilia luctæ
efficit. Magis autem siccatur propter puluerem, & minus in-
carnat. Micatio per summas manus attenuat, & carnes
sursum trahit. Follis, & manuum ad rythmum motus,
cōsimilia faciunt. Spiritus detētio, meatus disparare, & cu-
tem attenuare, & humiditatem sub cutem extrudere potest.

ἡγοχρίν.

Exercitia in puluere & oleo in tantum differunt, quòd
pulis quidem est frigidus, oleum autē calidum. In hyeme
igitur oleum corpus magis auge, propterea quòd frigus
prohibet à corpore quid auferre. In æstate verò calidita-
tis excessum faciens, carnem liquat: quum & à tempore, &
oleo,

*κωρυκομα-
χίη, καὶ χα-
ρυνίη.*

*Pulis &
oleum qua-
le.*

A oleo, ac labore, corpus calefiat. At verò pulvis qui inter exercendum accedit, in æstate quidem magis auget. Nam frigefaciens corpus, in excessum cal fieri non permittit. In hyeme verò frigus & algorem inducit. Morari in pulvere post exercitia in æstate, modico tempore, confert frigefaciendo. Verum longior mora superexiccat, & corpora dura ac lignosa efficit. Frictio ex oleo & aqua mollior, & non vehementer exal fieri finit. Porro de lassitudinibus quæ in corpore fiunt, hoc modo res se habet. Homines in exercitati ab omni labore lassantur. Nulla enim corporis pars exercitata est ad ullum aliquem laborem. Corpora autem exercitata, ab insuetis laboribus delassantur. Aliqua verò

Confrictio olei cū aqua.

B etiam à consuetis exercitiis lassantur, si modum excesserint.

Species quidem igitur lassitudinum eiusmodi sunt. Vis Desidiosi autem ipsarum sic habet. Etenim in exercitati humidā carnem habentes, quum laborauerint corpore calefacto multum colliquationem remittunt. Quicquid igitur exsudaverit, aut cum corpore depurgatum fuerit, non exhibet magis laborem in corporis parte præter consuetudinem euacuata. Quicquid verò ab excretionē intus remanserit, non solum huic laborem exhibet, sed etiam ei parti quæ humiditatem suscepit. Non enim commoda est corpori, sed infesta. Et in carnes quidem corporum non similiter congregatur, Verum in carnosas partes, quare his laborem exhibet, donec exiuerit. Tanquam enim circuitum non habens, quiescens calefit tum ipsa, tum quæ allabuntur. Si igitur multum fuerit quod excretum est, etiam sanum corpus exsuperat, ut totum concalescat, & febrem fortem inducit. Calefacto enim sanguine & attracto, celerem circuitum faciunt ea quæ in corpore sunt, & tum reliquum corpus præ spiritu purgatur, tum quod compactum est calefcens attenuatur, & simul ex carne foras sub cutem extruditur, atque hoc sudor calidus vocatur. Hoc autē excreto, & sanguis in naturalem statum restituitur, & febris remittit, & lassitudo sedatur maximè tertia die. Ceterum eiusmodi lassitudinē sic curare oportet, ut fomentis & balneis calidis id quod compactum est dissoluamus, & deambulationibus vehementibus depurgemus, & modico cibo ac attenuationibus carnis euacuationē cogamus ac coagmentemus, & oleo sensim multo

Desidiosi quid patiuntur.

tempore fricemus, vt ne violēter excalescat. Vnguentis etiā D
 tum exudatoriis, tum mollientibus, vngere ac mollire con-
 ducit. At verò exercitatis, ab insuetis laboribus propterea
 lassitudo cōtingit. Quum corpus non fuerit laboribus exer-
 citatum, necesse est carnē humidam esse ad eum locum, ad
 quem non est aduersus se laboribus exercere, quemadmodū
 etiam ad singula exercitationū genera. Carnem igitur ne-
 cesse est colliquari, & excerni, considerēque ac contrahi, ve-
 lut priori. Confert autem hoc modo curari. Exercitationi-
 bus vtendum est consuetis, quo id quod compactum est cale-
 scens extenuetur ac depurgetur, & reliquum corpus nō hu-
 medetur, neque inexercitatum maneat. Vtile est & hunc E
 balneis calidis vti, itēque frictione similiter vt priorē. Ve-
 rūm fomentis nihil habet opus. Labores enim calfacientes
 sufficientes sunt attenuare & depurgare id quod cōpactum
 est. Lassitudo autem à consuetis exercitiis hoc modo fit. A
 moderato quidem labore lassitudo nō mouetur. Quum ve-
 rō maior quā oportet labor fuerit, carnem superexsiccat,
 euacuata autē humore caro, calefit, & dolet, & horret, & ad
 febrem perducitur longiorem, si non quis rectē curet. Opor-
 tet autem primum quidem ipsum balneo non valde multo,
 neque nimis calido lauari. deinde exhibito à balneo molli
 vino, in cœna offerre plurima & omnigena edulia, & potu
 aquoso, vino verò molli ac multo vti. Postea longo tempore
 his immoretur, donec venæ repletæ attollantur. Deinde ve-
 rō vomat, & post modicam stationem, molliter dormiat. Po F
 stea per dies sex sensim ad cibos & labores consuetos adhi-
 beatur, atque ita ad cōsuetum cibum ac potum perducatur.
 Vim autem habet hæc curatio talem. Resiccatum excellen-
 ter corpus, humectare potest citra excessum. Si quidem igi-
 tur possibile esset, laboris excessum nosse, quantus is esset,
 commodum foret ipsi per moderatum cibum mederi. Nunc
 verò illud impossibile est, hoc verò facile. Corpus enim re-
 siccatum, ab ingestis omnigenis eduliis id quod conducibi-
 le sibi ipsū est, sumit, vnaqueque pars de singulis cibis, reple-
 tum autem & humectatū, aluo per vomitum euacuata, rur-
 sus excessum remittit. Aluus autem vacua existens reuellit.
 Excedentem itaque humiditate caro eructat, moderatam
 verò non remittit, nisi per vim, aut labores, aut medicamen-
 ta, aut

Curatio.

Medela.

Curationis
eius vis.

A ta, aut aliã quandã reuulsionem. Qui autem additione cibi
sensim crescente vitur, is corpori diætã placidè constituit. Qui aptè
nutricabit.

HIPPOCRATIS

COI DE DIAETA SIVE VI-

CTVS RATIONE, LIBER III.

IANO CORNARIO ME-

DICO PHYSI-

CO INTER-

PRETE.

B

*



E diætã humana exactè quid conscribere,
vt ad ciborum copiam, laborum commen-
suratio ac symmetria fiat, non est possibi-
le, quemadmodum etiã antea à me rela-
tum est. Multa enim sunt impedimenta.
Primum quidem hominum naturã, di-
uersã existentes. Nam & sicca ipsa ad seipsas, & ad alia col-
lata magis ac minus sicca sunt & humidã. Similiter etiã
alia omnes. Deinde ætates non iisdem indigentes, Insuper
& regionum situs, & ventorum mutationes, & temporum
C alterationes, & anni constitutiones. Est & inter ipsos ci-
bos multa differentia, Triticum enim à tritico differt, & vi-
num à vino, & reliqua omnia ex quibus victum facimus di-
uersa existentia, impediunt quo minùs possibile sit exactè
de diætã conscribere. At enim prænotiones inuentæ sanè à
me sunt eorum quæ in corpore dominantur, siue labores
cibos, siue cibi labores superent, & quomodo singulis me-
deri oporteat, prædiscerè que sanas naturas, & vt non acce-
dant morbi, nisi quis valde multum delinquat ac sæpè. hæc
autem medicamentis iam opus habent. Sunt autem quæ ne-
que per medicaméta sanari possunt. Quantum quidem igi-
tur inueniri possibile est quæ maximè ad rem faciunt, à me
inuentum est. Verùm exactè à nullo. Primum igitur mul-
tis ac vulgò hominibus cõscribam, ex quibus maximè utili-
tatem

Quid ve-
ter perfectã
victus ra-
tionem.

Qui mo-
dus vitæ.

Anni qua-
tuor partes.

Vi&us hy-
bernus.

Vomitionis
modus.

tatem capere possint, qui sanè cibis vulgaribus vtuntur, ac laboribus necessariis, profectionibúsq; necessariis, ac operis marinis ad vitam degendam repertis, quique calescunt plus quàm expedit, perfrigerantúrque præter commoditatem, & reliqua diætá inconstanti vtuntur. His itaq; ex præsentibus sic victum facere conducit. Annum equidè in quatuor partes diuidunt, quas pleriq; omnes nouerunt, hyemem, ver, æstatem, autumnum. Et hyemem quidem à pleiadum occasu, vsq; ad æquinoctium vernum. Ver autem ab æquinoctio vsque ad pleiadum exortum. Æstatem verò à pleiadum ortu vsque ad arcturi exortum. Autumnum ab arcturi ortu, vsq; ad pleiadum occasum. In hyeme quidem igitur tempore frigido & compacto se opponendo, hoc victu uti conducit. Primum quidem semel tantum in die cibum capere conuenit, nisi quis valde siccum vètre habeat. Id verò si fieri non possit, modicum prandere. Victu autem vtendum est sicco & austero, & calfactorio, & ex toto collato, ac meraco. Pane autè magis uti expedit, & obsoniis assatis potius quàm coctis. Et potionibus nigris meracioribus ac paucioribus. Oleribus minimum, præterquàm calefacientibus & siccis. Succis item ac sorbitionibus minimè vtendum est. Laboribus autè multis omnibus, cursibúsq; curuis sensim crescente accessione, & lucta in oleo longa, à leuibus ordiendo ac sensim addendo. Et deambulationibus ab exercitiis, acutis ac celeribus, à cœna verò, tardis in tepore. Matutinis autem multis, leni initio facto, ac sensim crescēte accessione, ita ut placide rursus definas. Vtendum est & strato duriore, & nocturnis itineribus, & funambulationibus, ac cursibus per funem uti cōfert. Omnia enim hæc attenuant ac calfaciunt. Vtendum etiam nauigatione. Vbi autem quis lauari velit, si quidem in palæstra se exercuerit, frigida lauetur. Si vero alio quopiam exercitio vsus fuerit, calida commodior existit. Vtendum & vomitibus, si humidiores sint ter in mense, sin sicciore, bis à cibis omnis generis. à vomitibus sensim perueniendum est ad consuetum cibum per dies tres, eoque tempore laboribus leuioribus ac paucioribus vtendum. à bubulis autem & porcinis carnibus, aut aliis, quicquid tandem modum excesserit, repletus vomat: & à caseosis & dulcibus ac pinguibus, eum qui non est adsuetus repleti, vomere conducit: & ab ebrietate,

A tate, ac ciborū mutatione, & regionum alteratione vomen-
dum est. Oportet autem frigori seipsum purum exhibere,
præterquàm à cibis ac exercitiis. Sed & in matutinis deam-
bulationibus vbi corpus calefieri cœperit, itémq; in cursibus
etiam in alio tempore, excessum vitare oportet. Melius est
enim corpori hyemem ferre, quàm exerceri hoc tempore.
Nam neque arbores quæ hyemem non pertulerunt hoc tem-
pore, fructum ferre possunt, neq; ipsæ sanæ esse. Utendum est
& laboribus hoc tempore multis vsque ad excessum, nisi las-
situdines succedant. Signum autem docebo idiotas, osten-
dámque quapropter hæc ita se habent. Tempore existente
frigido ac compacto, consimilia patiuntur etiam animalia
B ipsa. Necesse igitur est corpora tardè calefieri à labore, &
modicam quandam humiditatis præsentis partem excerne-
re. Deinde modicum tempus concessum est quo laborent, Plus otij
multum autem quo quiescant. Dies enim brevis est, nox ve- quam labo-
rò longa, propterea igitur neque tempus, neque labor exce- tis hyeme
sum habet. Ob hanc itaque causam hoc tempore sic diætā darur.
instituere oportet, à pleiadum occasu, vsq; ad solstitium hy- Vergilia-
bernum diebus quadraginta quatuor. Circa solstitium hy- rû occasus
tem maximè in custodia ac tutela esse, & à solstitio alios to- solstitium.
ridem dies eadem diætā vti. Postquàm autem tempus ad-
duxerit faunium, & mollius factum fuerit, oportet etiam Fauonius.
cùm tempore diætā sequi, diebus quindecim, quum arcu- Arcturi or-
rus oritur & hirundo volat. Sequens verò tempus magis va- tus.
C rie transigere oportet vsque ad æquinoctium diebus trigin- Hirundo.
ta duobus. Oportet igitur etiam diætā vti hoc tempore va-
riegatiore, mollioréque ac leuiore, & cibo, & potu, & labore,
atq; ita sensim ad ver perducere. Quum autè æquinoctium Aequino-
iam factum fuerit mollius, & dies longiores, ac noctes bre- ctium.
uiiores, & tempus calidum ac siccum constiterit, etiam præ-
sens victus probè nutriens ac meracius sit. Quemadmodum
igitur arbores rationem non habentes, hoc tempore præpa- Homines
rant sibi ad æstatis commoditatem, tum incrementum, tum arbores
vmbra: Sic oportet hominem, quum sanè mente ac ratio- imitentur.
ne præditus sit, carnis incrementum salubre sibi præparare.
Oportet igitur vt ne derepente diætā transmutetur, tempus Diuisio tē-
in sex partes diuidere, per octo dies. In prima itaque parte, poris in sex
& labores detrachere oportet, & reliquis quoq; velocioribus partes.
vti.

vti. Cibis autem mollioribus, & potibus aquosioribus ac al-
bioribus, & lucta cum oleo in Sole vtendū est. In singulis au-
tem temporibus singulas dietas paulatim trāsmutare oportet,
& deambulationes detrahēre à cœna plures, matutinas
pauciores: & mazam pro pane offerre, & olera cocta exhibe-
re, & obsonia cocta allatis adquare, & balneis vti, & parum
prandere, & re venerea pauca vti, & vomitibus primū quid-
em quarto quoque die, deinde per longius tempus, quo &
corpus pura carne incarnatum constituas, & dietam in hoc
tempore mollem, vsque ad pleiadum exortum. Et in hoc
iam æstas adest, & ad hanc nunc dietam instituere oportet.

Vi&us æ-
statis.

Quum itaq; pleias exorta fuerit, cibis mollioribus ac pau-
cioribus vti oportet. Deinde maza magis quā pane, atq; ea
prius subacta, & vino dulci non emollita, potibus autem mol-
libus albis aquosis, prandio modico, & somnis à prandio bre-
uibus, & repletionibus ex cibis ac potibus quā minimis.

Potu inter edendum vtendū est sufficiente, per diem ve-
rò minimè bibendum, nisi necessaria aliqua siccitate corpus
vtatur. Vtendū est & oleribus coctis, exceptis æstuosis ac
siccis. Vtendū etiam crudis, exceptis calfacientibus ac sic-
cis. Vomitibus nisi si qua repletio contingat, vtendū non
est. Re autem venerea minimè. Balneis autem tepidis vti
licet. At verò poma fortiora sunt quā pro humana natura.

Poma.

Meliùs est igitur à pomis abstinere. Si verò quis cum cibis

Per æstatē
exercitatio.

vtatur, minimè deliquerit. Laboribus quoque ac cursibus
circularibus exerceri oportet, & cursibus rectis reuertētibus
modicis multo tempore, & deambulationibus in vmbra, lu-
cta autem in puluere, quo quā minimè excalescat. Verū
volutationes in puluere meliores sunt quā cursus circula-
res. Frigefaciunt enim corpus humore euacuantes, à cœna
deambulandum non est, sed saltem surgendū. Manè verò de-
ambulationibus vtendū. Soles vitādi sunt, itēq; frigora,
tum manè, tum vespere, quæ flumina, aut stagna, aut nubes
exhalant. Hanc autem dietam tolerare oportet vsq; ad sol-
stitium æstiuū, quo in hoc tempore adimas omnia quæ sicca
sunt & calida & nigra ac meraca, itēq; panes, præterquam
si parum quid voluptatis gratia concedere velis. Sequēti ve-
rò tempore vtetur mollibus & humidis & perfrigerantibus
ac albis, vsque ad arcturi exortum ac æquinoctium per dies
nonag

A nonaginta tres. Caterum ab æquinoctio sic dietā instituere **Vitus au-**
oportet, per autumnum ad hyemem adducendo, ita ut muta-
tiones frigorū ac teporis vites vestitu crasso. Utendum au-
tem hoc tempore motu in veste, frictionēq; ac lucia in olco,
ita ut sensim accessio crescat. Deambulationes quoque in te-
pore faciendæ sunt, & calidis lauacris utendū, & somni diur-
ni detrahendi. Cibis autem utendum est calidioribus, ac mi-
nus humidis, & puris, & potibus nigrioribus, verum molli-
bus & non aquosis. Oleribus verò minus. Reliquam itē dia-
tam omnem sic cōsonam adhibere oportet, ut ab æstiuis de-
trahas, hybernis autem utaris non ad summum, quo hyber-
num vitum quā proximē cōstituas, in diebus duodequin-
quaginta, vsque ad pleiadum occasum, ab æquinoctio. Hæc
B porro multitudinis commōdæ gratia ac vulgi hominum
causa prodo, qui ex necessitate vitam temerē transigunt, ne-
que licet ipsis aliorum negligentes esse, ac suam ipsorum sa-
nitatē curare. Quibus verò iam hoc certum ac percognitum
est, quod neque diuitiarum, neque corporis, neque vllius al-
terius rei vlla utilitas est, citra sanitatem, ad hos inuenta est **Sine sanita-**
à me dicta, quantum possibile est, ad veritatem ac certitudi-
nem possibilium rerum adducta. Hanc itaque in sermonis **te nihil iu-**
progressu declarabo. Inuentum autem hoc honestū quidem **uat.**
mihi repertori, utile verò discantibus, nullus adhuc priorum
ne attentauit quidem cōponere, quod ad omnia alia magni
æstimandum duco. Est autem præcognitio antequam ægro- **Quæ inue-**
tent cognitio, quid corpora perpetiantur, utrum cibus supe- **nerit Hipp.**
rat labores, aut labores cibos, aut moderatē inter se habeat. **Quid præ-**
Ut enim tandem superetur, morbi fiunt, ab æqualitate **cognitio &**
autem inter ipsa mutua, sanitas adest. Ad hæc sanè comme- **cognitio.**
moranda accingor, & demonstrabo qualia fiunt hominibus
qui sani sibi esse videntur, & iucundē comedunt, laborarēq;
possunt, & corporis ac caloris satis habent. Nares citra cau-
sam apertam à cœna implentur, & repletæ esse videntur, e-
munt autem nihil. Vbi autem deambulare mane inci-
piunt ac exerceri, tunc emunt ac spuūt, & progressu tem-
poris etiam palpebras graues habent, & pruritus frontem
occupat, & à cibis abstinent, & bibere minus possunt, & co-
lor fit decolor, & aut destillationes mouentur aut febres hor-
ridæ, iuxta quodcunque tempus repletio fuerit mota. Quic-
quid

plenitudi-
nis signa.

Medela.

quid autem eo tempore fecerit, in idipsum culpā ac causam D
reiiicit, quum id ipsum causa non sit. Huic enim cibi superāt
labores, & repletio paulatim collecta in morbum ipsum ad-
duxit. Sed non huc vsque differre oportet, verūm ubi prima
signa cognouerit, scire quod cibi labores superant, & paula-
tim collecta repletio existit. Mucus enim & saliuā repletio-
nis indices sunt ac signa. & quiescēte quidem corpore, mea-
tus spiritus obturant, multa repletionē existente, ubi verò ca-
lesfactum est prae labore, attenuata excernuntur. Talem au-
tem sic curare oportet. Exercitatum in consuetis exercitiis
citra lassitudinem, calidāque lotum, cibis omnigenis exple-
to, ac vomere facito, à vomitu verò os & fauces colluat vino
austero, quo oscula venarum constringantur, & nihil attra- E
hant, velut à vomitu fieri solet. deinde surgens modicē de-
ambulet in tepore. Postridie verò deambulationibus qui-
dem vtēdum est, exercitiis autem paucioribus & leuioribus
quā prius, & si æstas fuerit, impransus degat, sin minus, pa-
rum comedat, & de cœna quam sumere solebat, dimidium
detrahat. Tertia autem die labores quidem obeat omnes
consuetos ac deambulationes, verūm cibos sensim ingerat,
quo quinta die à vomitu consuetum cibum assumat. Et si
quidem ab hoc satis bene habuerit, de cætero cibis quidem
paucioribus, laboribus autē pluribus curetur. Si verò signa
repletionis non quieuerint, interpositis duobus diebus ab ea
qua consuetos cibos assumpsit, rursus vomat, & eodem mo-
do sensim ad consuetos cibos redeat. Quod si non successerit, F
etiam tertium eadem repetere, donec à repletionē libere-
tur. Sunt autem homines qui ubi labores superantur à ci-
bis, talia patiuntur. Incipiente quidem repletionē somni lon-
gi & dulces ipsis contingunt, & interdiu etiam dormiunt.

Diurna do-
mitio bona
non est.
Morborū
alia causa.

Somnus autē contingit carni, & sanguis funditur, & spiritus
diffusus trāquillus est. Quū verò non suscipiat amplius cor-
pus repletionem, secretionem iam remittit intro, prae circui-
tus violentia, quæ sanè secretio contraria alimento à cibis,
animam perturbat. Quo tempore non amplius iucundi ipsis
sunt somni, sed necesse est hominē perturbari, & videtur sibi
cum aliquo pugnam committere. Quāliacunque enim pa-
titur corpus, talia videt anima, visu iam concluso. Quum igi-
tur ad hoc peruenerit homō, prope iam est vt egrotet. Quod
autem

A autem veniet morbus. valde manifestū est, Qualis enim secretio venerit, & quancunq; partem superauerit, eam ipsam morbo affligit. Verū non oportet ita delipientem esse & hucusque diutius, sed statim vbi prima signa cognouit. curā contingere, & huic velut priorem curare, longiori autem tempore, ac fame opus habet. Sunt præterea etiam talia repletionis signa. Dolet corpus aliquibus totum, aliquibus pars quædam, quæcunq; tādē. Dolor autem est velut lassitudo, & delassati esse sibi videntur, segniciūque ac repletionē curantur donec ad febrem perueniant, & adhuc nondum hoc cognoscunt, sed balneis ac cibis vtentes, ad pulmonis inflammationem, peripneumoniam Græcis dictā. morbum deducunt, & ad extremum periculum deueniunt. Verū oportet providere antequā ad morbos perueniant, & hoc modo curare, vt maxime mollibus fomētis hominē foueamus, aut si id fieri nequeat, multa calida lauemus, ac corpus dissoluamus, & a multis ingestis cibis, primū quidē acribus ac plurimis, deinde salis. probē vomere faciamus, quo facto exurgat ac modico tempore deambulet in tepore, deinde dormiat. Mane verò deambulationibus sensim crescētibus vtendū est, & exercitiis leuibus, & ciborū exhibitionibus sensim crescētibus, velut prius. Attenuatione autem plurima opus habet, itēq; deambulationibus. Si verò prouidētia nō adhibita ad febrem peruenerit, nihil aliud offerre oportet prætēr aquā per dies tres. Siquidem igitur ex hac sedetur, bene est: sin minus, ptisanæ succo curandus est, & aut quarta aut septima die decedet febris, si exsudabit. Bonū autem est & vnguentis exsudatoriis vti, sub iudicationes, exsudare enim cogunt. Quidam verò etiā talia a repletionē perpetiuntur. Caput ipsis dollet ac grauatur, & palpebræ ipsis a cœna cōcidunt, & in somnis turbantur, & calor inesse ipsis videtur, & alius aliquādo sistitur. Et talis vbi venere vtitur, leuior statim esse sibi videtur: postea verò magis grauatur. His caput repletionē reuellens, & alium sistit, & ipsum grauatur. Periculum autem subest, vt quò erumpat ipsa repletio id ipsum corrumpat. Verū providere hoc modo oportet. Si curam celerem facere velit, veratro purgandus est, deinde exhibendi cibi leues ac molles ad dies decem, atque hi alium mouentes, quo venter inferior superet, & de capite reuellere valeat.

Repletio-
nis signa.*Sp. m.*

Curatio.

Morbus a-
lius pleni-
tatis.

Curatio.

Cum portio
nes non ad
mittit.

Plenitatis
varia mala

Dysente-
ria.

Curatio.

Plenitas a-
lia.

Vtendum & cursib. tardis ac matutinis, & deambulationib. D multis. Item lucta in oleo, & prandio, & somno à prandio nō longo: à cœna verò exurgere satis est, & partim balneis, partim vnctione vtendum, balneis verò tepidis, à venere autem abstinendum. Hac quidem velocior cura est. Si verò medicamentum bibere nolit, multa calida lotus, à cibis dulcib. ac salis vomat, à vomitu verò satis est vt exurgat: mane autem deambulationib. adhibendus est, & exercitiis præscriptis ad dies sex, die septima repletionem corporis facta à similibus cibis vomitum faciat, & eodem modo cibi rursus sensim adiciendo exhibeantur, atq; his hoc modo ad quatuor hebdomadas vtatur. In tanto enim tempore maximè sedatur. Deinde cibi exhibendi quo corpus reficiatur, & diætā paulatim E ad consuetum morem redigenda est. Fiunt etiam talia à repletionem. Quibusdam venter quidem concoquit cibum, carnes autem non suscipiunt. Alimentum autem intus manens flatum inducit. Vbi verò pransi fuerint, sedatur. Nam à fortiore id quod leuius est expellitur, & videntur sibi libera ri esse. Verum malū multo maius postridie accedit. Quum autem quotidie augescens fortius inualuerit, id quod prius inest superingesta superat, & calfacit ac perturbat corpus, & profluuiū ventris facit. Sic enim nominatur quandiu ipsum solum alimentū putrefactū secedit. Vbi autē corpore calefacto purgatio aeris fiat, tunc & intestinū raditur ac exulceratur, & sanguinolēta egeruntur, hoc autem dysenteria, à ma- F la intestinorum affectione appellatur, morbus grauis & periculosus. Sed providere oportet, & prandium detrahre, & cœnæ tertiā partem. Cursibus autē pluribus, & luctis ac deambulationibus uti, tum ab exercitiis, tum mane. Quū verò dies decem præterierint, dimidiū cibi detracti apponere, ac vomitu uti, atq; sic ad dies quatuor cibū exhibere: vbi autē alij decem dies præterierint, etiā reliquum cibū apponere, ac vomitum facere, atq; sic ad consuetum cibū reducēs, & talem laborib. cōfidenter præmens ac vrgēs, in hoc tēpore salum facies. Fit etiam talis repletio. Postridie cibum eructant crudum, citra ructum acidum. Alius autem egerit, pauciora quidem quàm pro ratione ciborū: attamē multū. Dolor verò nullus intus est. His ventriculus frigidus existens, cibos in nocte concoquere non potest. Quum igitur motus

A motus fuerit, cibum crudum eructat. Oportet itaque huic
 preparare ventriculi caliditatem, tum ex victu, tum ex labo- Medela
 ribus. Primum quidem igitur vtendum est pane ex tota fari per nutrica
 na collata, fermentato, diffracto in vinum nigrum, aut in iuscu- tum.
 lum suillæ carnis piscibus verò coctis in muria acri. Vtendū
 etiam carnosīs, velut extremitatibus percoctis, & suillis car-
 nibus coctis pluribus, & porcinis non multis, & catulorū, ac
 hœdorum. Exoleribus verò porro & allio cocto ac crudo,
 blitōque cocto & cucurbita. Potionibus verò meracioribus,
 somnisq; longis citra prandiū prima die, itēmq; somnis ab
 exercitiis, curibus autē curuis sensim accessione augescēte,
 luctūq; molli in oleo, balneisq; modicis. Est & ficus cum ci- Quibus fi-
 bis bona, & meracū vinum ab ipsa. Ex hac autem curatione cus post ci-
 aliis citius, aliis tardius repletio sedatur. Alij porrò quidam bum pro-
 talia patiuntur. Faciem decolorem habent, & vbi comede- fit.
 rint, paulò post eructant acida, & acor in nares proserpit. Plenitatis
 His corpora pura non sunt, & plus est quod de carne col- alius mor-
 liquatur præ labore, quàm quod depurgatur præ circuitu. Et bus.
 hoc sanè intus manens alimento contrarium est, ipsumque
 violat ac acidum facit. Alimētum quidem igitur eructatur,
 illud ipsum verò sub cutem expellitur, & hominem decolo-
 rem facit, & morbos similes aque inter cutem parit. Verū
 providere oportet hoc modo. Velocior quidem curatio est Medela
 potio veratro, exhibere cibos quemadmodum à me scriptum quæ.
 est. Verū tutior à dirta, hoc modo. Primum quidem cali-
 da lotus vomitum faciat, deinde septem à vomitu diebus ci-
 bum consuetum capiat, decima autem à vomitu die rursus
 vomat, & similiter cibum assumat, & tertiū similiter faciat.
 Et cursibus quidem circularibus paucis ac velocibus vtatur
 & motibus, ac frictione, & mora longa in gymnasio ac exer-
 citio. Vtatur & volutatione in puluere, & deambulationi-
 bus multis ab exercitiis, sed & à cœna. Plurimis autē matuti-
 nis in puluere vtatur. Quū autē lauari vult, calida lauetur,
 & eo tempore impransus degat. Et si quidē vno mense resti-
 tuitur, de cætero conuenientibus curetur. Si verò quid re-
 liquum fuerit, medela vtatur. Sunt autem quidam quibus
 postridie ructus acidi fiunt. His in noctem secretio præ re-
 pletionē fit. Quum igitur motum fuerit corpus ex somno
 densiore spiritu vsum, calidum ac acidum vnà cū spiritu

Hippocratis Liber I I I.

Carnosa
corpora
quæ patian-
tur.

Desidiofo-
rum mor-
bus.

Curatio.
Quæ exer-
citationes.

Vocis exer-
citatio.

Morbus
alius.

foras expellit, & ex hoc morbi fiunt, nisi quis prouidentia D
utatur. Conducit autem etiam his facere velut priori. Verū
laboribus pluribus hos uti oportet. Quibusdam etiam talia
fiunt. In corporibus densa carne præditis, quum cibi conca-
lescunt ac diffunduntur, & à primo somno, & præ cibis car-
ne calefcente, secretio per somnum fit à carne multæ humi-
ditatis. Deinde caro densa existens alimentum non suscipit,
Id verò quod à carne secretum est alimento contrarium ac
foras protrusum hominem suffocat ac calfacit, donec cuo-
muerit. Postquàm autem leuior factus est, dolor nullus
in corpore manifestus inest, sed decoloratur. Progressu ve-
rò temporis, & dolores, & morbi fiunt. His cōmilia patiun-
tur etiam qui in exercitati derepente laborauerunt, & colli- E
quationem carnis violentam ac multam fecerunt. Hos au-
tem sic curare oportet. De cibo detrahenda est tertia pars.
Utendum autem cibis acribus, & siccis, & austeris, ac odo-
ratis, & urinam cientibus. Cursibus vero plurimis curuis in
vestitu, rectis autem reuertentibus & circularibus, exutis ve-
stibus, frictione & lucta modica. Micatio per summas ma-
nus commodior est quàm follis. Utendum & deambulationi-
bus ab exercitiis multis, itémque matutinis. A cœna verò
etiam vocis exercitatio valde commoda est, humiditatis
enim euacuationem faciens rarefacit carnem. Conducit &
impransum degere. His autem cibis utendum est per dies
decem, deinde dimidium ablati apponendum est ad dies sex,
& vomitus faciendus, ab vnoquoque verò vomitu, ad dies F
quatuor sensim adiiciendo exhibendus est cibus. Quum au-
tem dies decem à vomitu transierint, omnem detractum ci-
bum assumat, laboribusque ac deambulationibus deditus
sit, & sanus euadet. Talis autem natura copiosiore labore
quàm cibo opus habet. Quidam etiam talia perpetiuntur.
Secedit ipsis cibis per aluum liquidus inconcoctus, velut ex
intestinatorum lenitate, & dolorem nullum exhibet, patiuntur
autem hoc ventres maximè qui humidi ac frigidi sunt: &
propter frigiditatem quidem non concoquunt, propter hu-
miditatem verò secessus fit. Corpus igitur cōtabescit, alimē-
tum conueniens ac debitum non accipiens, Ventresque cor-
rumpuntur, & in morbos incidunt, verum prouidere opor-
Curatio. tet. Confert huic de cibis tertiam partē auferre. Sint autem
cibi;

A cibi, panes non fermentati ex tota farina collata, clibano co-
cti, aut subcinericij calidi, in vinū austerum tincti, & pisciū
partes ex dorso ac cauda. Verū capitales & sub ventre si
nende sunt velut humidiores. & coctos quidē pisces in mu-
ria edere oportet, assatos autem in aceto. Utendū etiā car-
nibus sale & aceto inueteratis, & caninis assatis, & de pa-
lumbe ac reliquis eiusmodi volucris, assatis ac coctis. Ole-
ribus verò minimē. Vino utendum est nigro, & deambula-
tionibus à cœna ac matutinis, à deambulatione autem dor-
miat. Curibus verò curuis, sensim accessione augescere utar-
tur. Sit & frictio multa, & lucta tarda, & in oleo, & in pulue-
re, quo caro concalescens resiccet, & humiditatem ex ven-
tre reuellat. Vngi autem magis conducit quàm lauari, im-
pransus verò degat. **Quum** autem dies septem transierint, di-
midium cibi apponatur, & ad quatuor dies exhibeatur, & vo-
mat. Post alios vero septem dies, omnem cibum assumat, &
vomitu rursus, facto, cibis eodem modo exhibeatur. **Qui-** Morbus
busdam verò aliis talia fiunt. Secessus non putrefactus per alius.
alium abit, & corpus contabescit cibis non fruens, hi verò
progressu temporis in morbos incidunt. His ventres frigidi
ac sicci sunt. **Quum** itaque neque conuenientibus cibis, ne-
que exercitiis utuntur, talia perpetiuntur. Conducit autē sic
affecto, panibus puris furnaceis uti, & piscibus coctis cū in-
tritris, & carnibus coctis suillis, & extremitatibus percoctis,
& plurimis assatis, & ex acris ac salis his quæ humectāt,
& saluginolis. Vinis autem nigris mollioribus, & inter cibos
uis ac ficibus impleri cōfert. Oportet & modicum prandere, **Qui** cibus
& exercitationibus pluribus uti, curibusq; curuis sensim cre-
tatio.
scentibus, postremū autē curibus circularibus, & post cur-
sum lucta cū oleo: deambulationibus verò nō multis ab ex-
ercitiis, à cœna verò satis est exurgere. Matutinis autē pluri-
bus deambulationibus utatur. Lauetur calida, & utatur la-
boribus, ac vnctionibus somnūq; longiori indulgeat. & molli-
ter cubet. Oportet & venere aliquo modo uti. Verū de cibis
quarta pars detrahenda est, & post dies decem rursus ad con-
suetos cibos reducendus est. Sunt etiā quibus secessus liquidus
ac putrefactus per alium abit, & qui aliās sani sunt ac exer-
centur, nullum dolorē res exhibet. **Quibusdā** verò excludun-
tur ea quæ cōueniebant, progressūq; temporis venter per ca-
alios.
lidita

Hippocratis Liber III.

Medela.

Cibus qui.

**Beta refri-
gerat.
Quæ exer-
citatio.**

**Vomit. Semel co-
medere his
confert.**

**Morbus
alius qui
stercoris
vomitū fa-
cit.**

liditatem carnes attrahit, & dōlorem exhibet, & cibi exclu-
duntur, & venter exulceratur, & ipsum sistere iam operosum
ac difficile est. Verū prius providere oportet, ac nosse ven-
trem calidum ac humidum magis quā debet esse, labo-
rūmq; incōmodum excessum factum esse. Per diætā igitur
frigefacere ac siccare oportet, & primū quidem exer-
citia ex dimidia parte detrahē, & de cibis tertiam partem.
Utatur autē Maza antea subacta, ac vino dulci emollita,
& piscibus siccissimis coctis, & neque pinguibus neq; salis.
Utatur & carnibus allatis volucrum, coctis quidē, palum-
bis ac columbæ, allatis autem perdicum & gallorum citra
condimenta. Leporinis vero coctis in aqua, itēque ferinis
omnibus. Ex oleribus autē quæ frigefactoria sunt, velut beta
cocta acida. Vino verò nigro austero. Gymnasti autem, cur-
sibus circularibus velocibus, verū frictio non multa adhi-
beatur, sed modica, neque lucta. Micatio per summas ma-
nus, & manuum ad rythmum motus, & follis, & Volutatio
in pulvere, commoda sunt, sed non multa. Deambulationi-
bus ab exercitiis utatur sufficientibus iuxta laborē, & à coe-
na pluribus, iuxta cibum, & mane moderatē, iuxta habitum.
Lauet autē tepida, ac quiescat. Sic ubi in hac diætā transe-
git dies decem, apponatur cibi dimidium, & laborum ter-
tia pars, & vomitum faciat à cibis siccis & acris, & in ci-
bo ne moretur, sed quā celerrimē vomat: à vomitu ad dies
quatuor & cibus, & labor partitus exhibeatur. Vbi autē dies
decem præterierint, reliquum cibi apponatur, & vinum po-
tabile, verū labores pauciores, & ubi vomitum fecit, cibus
velut scriptum est exhibeatur. Hoc verò tempore semel
tantū in die cibum capere cōducit, donec malum sedetur.
Aliis porrò quibūdam siccus & perustus secessus fit, & os
siccum, & progressu temporis etiā amarum fit, & alius sisti-
tur, itēque vrina. Quum enim non habeat intestinum hu-
miditatem circa excrementum, intumescens transitus obtu-
rat, & dolorē exhibet, & calor occupat, & quicquid biberit,
aut edirit homo, id ipsum reuomit. Postremum verò etiam
stercus vomit, atque hic nō superuiuet, quum ad hoc perue-
nerit. Verū providere oportet ac nosse, quod caliditas &
siccitas in homine prædominantur. Victum igitur ipsi con-
stituere oportet ex maza prius subacta respersa, & pane
ex

A ex tritico trimestri, succo furfurum fermentato. Oleribusque
 vtendum, exceptis acribus & siccis, atque illis coctis, & pisci-
 bus leuissimis coctis, & partibus capitalibus tum piscium,
 tum locustarum, & mitilis, & herinaceis, & cancris, & cōchy-
 liorum succis, ipsiq; liquidissimis. Carnibus autē suillis & **Qui nutri-**
 extremitatibus anterioribus coctis, & hœdorum & agnorū **catus.**
 ac catulorum coctis. Piscium verò fluuiatilium ac in stagnis
 degentium coctis. Vino molli aquoso. Laboribus autē vten-
 dum est non multis, neque velocibus, sed omnibus quietis,
 Deambulationibus verò mane vtatur, iuxta habitum suffi-
 cientibus, & ab exercitij laboribus, moderatis. à cœna verò
 ne deambulet. Balneis vtatur & somnis mollibus, & pran-
 dio, & somno à prandio non longo. Pomis etiā humectanti-
 bus vnà cū cibis vtatur, & cicere viridi, ac sicco in aqua ma-
 cerato. De laboribus verò prioribus dimidium detrahat
 etiam hic à principio, & vomitū faciat à dulcibus & pingui-
 bus ac falsis, hisque plurimis: moretur autē plurimum tem-
 pus in cibis vsq; ad vomitum. Deinde cibum exhibeat ad
 triduum, & nō maneat impransus. Quum verò dies decem
 praterierint labores sensim adiiciendo augeat. & si quidem **Morbus a-**
 repletio inerit à cibo, aut ventris vitio, vomat: sin minus, sic **lius.**
 reliquo tempore curetur. Fiunt insuper etiā talia. Horro-
 res à deambulationibus matutinis accedunt, & caput graua-
 tur. Huic plures fiunt deambulationes quàm modus requi-
 rit. Corpus enim & caput humore euacuatū horret ac gra-
 uatur. Progressu verò temporis ad febrē perueniūt horro-
 res. Sed non hucusque differre oportet, verum prius curare **Medela**
 hoc modo. Quamprimū aliqua signa apparuerint, vnctus **quæ.**
 ac frictus modicè prandium amplius solito faciat, & vinum
 multum bibat molle, deinde somno vtatur à prandio suffi-
 cienter. ad vespērā verò vbi exercitiis lenibus vsus est, cali-
 dāque lotus, cōsuetō more cœnet. Deambulationibus autē à
 cœna ne vtatur. verum ad tempus differat. Postridie in aqua
 lauetur, & somnis mollibus tempus tranfigat. Et per dies
 quinque paulatim ad consuetos cibos ac labores procedat. **Morbus a-**
 Sunt autem quidā qui horrent ex gymnasiis, & quum se **lius.**
 exuunt donec decertent, vbi verò perfrigerati sunt, rursus
 horrent, & stridor dentiū tremulus corpus occupat, somnūq;
 talis grauatur. Vbi autem expergiscitur, sæpe oscitat, & à

Hippocratis Liber

Curatio.

cœna palpebræ ipsi graues sunt. progressu verò tēporis etiā D
febres malignæ accedunt. Verum cauere oportet, & nō huc-
usque differre, sed prius curare hoc modo. Primum quidem
ab omnibus exercitiis dimidiū auferatur. Cibis verò omni-
bus humidioribus ac frigidioribus vtatur, & potibus mollio-
ribus ac dilutioribus. Vbi verò præterierint dies quinque,
tertia pars laborum ablatorū apponatur. Cibis verò iisdem
vtatur. Post alios autē quinque dies, dimidium reliquorū la-
borum apponatur. Et rursus post alios quinq; , omnes labo-
res & leuiiores & pauciores reddito, vt ne rursus excessus fiat.

Cur hæc
fiant.

Nam his qui hæc signa perpetiuntur, labores maiores sunt
quàm cibi. Adæquare igitur hæc oportet. Quidā verò non
hæc patiuntur, sed aliqua ex his, aliqua verò non. In omni- E
bus autem his signis, labores superant cibos, & curatio ea-
dem est. Et cōfert his calida lauare, ac molliter cubare, & se-
mel atque iterum inebriari, verum non vsque ad excessum,
& venere vti, vbi excessus contigerit, & segnem esse ad la-
bores. Deambulationes autem in totum non sunt faciendæ.

H I P P O C R A T I S

C O I L I B E R, D E I N -

S O M N I I S, I A N O C O R N A -

R I O M E D I C O P H Y -

S I C O I N T E R -

P R E T E.

Quæ per
somnum fi-
unt.



V I S Q V I S de his, quæ in somnis obue-
niunt rectè coniectat, is magnam habere
vim ad omnia, ipsa reperiet. Anima enim
vigilat, & quum, quidē corpori inseruit, in
multas partes distributa, non sui iuris est,
sed partem aliquam singulis corporis par-
tibus siue sensibus distribuit, auditui, visui, tactui, gressui,
a tioni, ac omni corporis facultati. Ipsa autē animæ cogita-
tio sui iuris nō est. Quum autem corpus quiescit, anima in
motu est, & corporis partes perreptans, domum suam gu-
bernat

A bernat & omnes corporis actiones ipsa perficit. Nam corpus dormiens non sentit, ipsa vero vigilans cognoscit, ac visibilia videt, & audibilia audit, vadit, tangit, tristatur, animaduvertit. In summa, quaecunque corporis aut animae munia, ea omnia anima ipsa in somno obit. Quicumque igitur haec recte iudicare nouit, magnam sapientiae partem nouit. Quaecunque quidem igitur somnia diuina sunt, & quaedam euentura significant, aut urbibus, aut populo priuato, siue bona, siue mala, non ipsorum delictum, de huiusmodi sunt qui iudicant certam artem habentes. Quaecunque autem corporis affectiones sunt, & anima per ipsas repletionis aut euacuationis rerum a natura insularum excessum, aut consuetorum mutationem permonstrat, de his quidem itidem iudicant, & partim assequuntur, partim aberrant, & de neutris recte sentiunt, curam fiat: neque sciunt quando assequuntur, neque quando aberrant, cauere admonentes ne quid mali accidat. Atque hi non docent quomodo cauere oporteat, verum diis supplicare iubent. Et supplicare quidem decorum ac valde bonum est. Oportet autem etiam ipsum opitulari, & deos inuocare. De his igitur res hoc modo se habet. Quaecunque insomnia mens homini, in noctem per somnum offert de diurnis actionibus, & reddit quo modo facta sunt, ea quae seria ac iusta in re per diem facta sunt, aut de quibus consilium initum est: haec homini bona sunt, sanitatem enim significant propterea quod anima in diurnis consiliis perseverat, neque repletionem, neque euacuationem, neque aliqua alia forinsecus allapsa re, victa. Quum autem insomnia diurnis actionibus aduersantur, & de ipsis pugna oboritur, quum sane hoc contigerit, turbationem in corpore significat. Et si quidem fortis fuerit, forte est malum: si vero leuis, debilius. De actione quidem igitur, auertenda sit, siue non, nihil decerno. Verum corpus hominis curari consulo. Repletionem enim aliqua intus facta, secretio quaedam contigit quae animam perturbauit. Si igitur fortis fuerit contrarietas, vomitum facere conducit, & cibos leues exhibere sensim adiiciendo aliquid ad dies quinque, & deambulationibus multis ac velocibus sensim augescentibus uti, & exercitiis exerceri moderatis, pro ciborum assumptorum ratione. Si vero debiliior fuerit contrarietas, detractio vomitum, tertiam sibi partem adime, atque hanc sensim rursus ad

Quantum sit somnia nouisse.

Quae coniectores non assequantur.

Somnia perspicito.

Quae bona & contra.

Curatio.

Hippocratis Liber

Sol, Luna,
stellæ quid
portendant
in somno vi-
sz.

Quæ nutri-
catio.

Luna per
somnū pa-
ti visa quid
portendat.

Quid sol.

dies quinque adiace, & deambulationibus preme. Sed & vo-
cis exercitiis vtatur, & diis supplicet, & turbatio ipsi sedabi-
tur. At verò solē & lunā, & cælum ac stellas, pura atque agi-
lia solito more videre, singula bona sunt. Sanitatē enim cor-
pori significant ab omnibus præsentibus. Verum talem ha-
bitum præsentī diætā cōseruare oportet. Si verò quid cōtra-
rium his fiat, morbum quendā corpori significat: à fortibus
quidem, fortiorē. à debilioribus verò, leuiorem. Et astrorum
quidem exterior est in corpore circuitus, solis vero medius,
lunæ autē ad cavitates, Quodcunque igitur horū astrorum
extingui, aut lædi, aut disparere, aut sisti à circuitu suo vide-
tur, iuxta illam ipsam partē morbum redundare significat:
& si quidem ab aere, aut nebula, aliquod ex ipsis astris pati
quid horum videt, debiliorem: si verò ab aqua, aut grandine
fortiorem. Significat autē secretionem in corpore humi-
dam ac pituitosam factā esse, & in externam circumferentiā
illapsam esse. Cōducit itaque huic & cursibus in omni vesti-
tu vt multis, sensim augescētibz, vt quā maximē exu-
det. Itē deambulationibus ab exercitio multis citra pran-
dium vti, & detracta ciborum tertia parte, ad dies quinque
sensim adiiciendo rursus exhibere. Si verò fortius videatur
malum esse, etiā fomentis vti. nā per corporis cuticulā pur-
gationem facere expedit, propterea quòd in externa circun-
ferentia offensa ac læsio existit. Cibis verò vtendū est siccis,
acribus, austeris, meracis, & laboribus maximē siccantibz.
Si verò quid horum luna patiat, reuulsionem intro facere
conducit, vtique vomitu ab acribus, & salisuginosiis, ac molli-
bus cibis, cursibus autem circularibus celeribus, & deambu-
lationibus velocibus. Vtendū & vocis exercitiis, & prædium
auferendum, cibiq; detractiōe, ac rursus appositione, eodē
modo vtendum est. Ob id autē intro reuellendum est, quia
ad cavitates corporis offensa apparet. Si autem sol tale quid
pati videatur, fortius iam malum est, & difficilius exigi po-
test. Oportet autem in vtranque partem reuulsionem facere,
& rectis cursibus, & curuis, & circularibus vti, & deambu-
lationibus, & aliis laboribus omnibus. Ciborum autē detrac-
tione, ac rursus appositione, eodem modo. deinde vomere,
& rursus sensim cibos augere, ad dies quinque. Si verò se-
renitate existente premantur hæc, & debilia esse videantur,
& præ

A & præ siccitate à circuitu suo impediri, periculum significat delabendi in morbum. Verum oportet labores detrahere, & diata humectiore ac molli uti, & balneis ac otio ampliori, & somno longo ac multo, donec malum sedetur. Si autem igneum ac calidum esse videatur quod se illis opponat, bilis secretionem significat. Si verò superata hæc dispareant ac evanescant, periculum est ad mortem perueniendi ex morbo. Si verò versa ac mutata hæc esse videantur, præsentem statum in fugam verti significant. Fugere autem ipsa celeriter, esseque qui ea persequantur, periculum denuntiant future infaniam hominis, si non curatus fuerit. Omnibus autem his conducit, ut veratro purgati, optimam victus rationem instituât. Sin minus, ut victu ad aquam tendente utantur. Vinum verò non bibant, aut omnino album, tenue, molle & aquosum. Abstineant autem ab acribus, resiccatibus, calfacientibus, ac falsuginosis. Laboribus secundum naturam plurimis utantur, & cursibus in vestitu plurimis. Frictio verò ne fiat, neque lucta, neque volutatio in pulvere. Somnis utatur mollibus, & in otio degat, exceptis laboribus naturalibus, à cæna deambulet. Bonum est & fomentis uti, à fomentis verò vomere, per triginta verò dies non repleatur. Quum autem repletus fuerit, bis in mense vomat à dulcibus & aquosis ac leuibus. Quæcunque autem ex his aliàs aliò præ nulla necessitate errant, animæ turbationem quandam præ cura significant. Confert autem huic otium, & animum conuerti ad spectacula, maxime risum mouentia: quod si fieri non possit, **C** ad id ex quo ad biduum aut triduum maxime voluptatem capiat, & sedabitur. Sin minus, periculum est delabendi in morbum. Quæcunque astra ex circumferentia excidere videntur, suntque pura & splendida, & ultra ac prorsum ferri videntur, sanitatem significant. Quicquid enim in corpore parum ex circuitu excernitur secundum naturam, à vespera in auroram: id ipsum recte habet. Nam & quæ in ventre secernuntur, & quæ in carnem eructantur, omnia ex circuitu ac circumferentia excidunt. Quæcunque verò nigra & obscura sunt, & ad vespeream ac occasum ferri videtur, aut in mare, aut in terram, aut sursum, ea magis morbos significant. Et quæ quidem sursum feruntur, fluxum capitis significant. Quæ verò in mare, ventris morbos. Quæ in terram, tubercula maxime significant ex carne enascētia. His conducit tertiam cibi partem detrahere, & à vomitu, ad dies quinque.

Diuerfitū somniorum observatio.

Pura videre astra quid portendat.

Hippocratis Liber

Quid puritas aeris.

Cum deus qui dat.

Quid pluvia serena.

Quibus diis supplicandum. Diueria visa.

quinque eandem rursus, senum adiciendo exhibere, in aliis autem quinq; diebus cibos omnes allumere, & vomitu facto, rursus eodem modo cibis senum autus exhibeatur. Quaecunque verò ex his pura & candida in cælo hæere videbuntur, sanum esse significant, quia quod in hominem descendit ex æthere est. Tale autem videt anima, quale sane descenderit. Quæ autem nigra fuerint, & non pura, neq; conspicua, morbum significant, non propter repletionem, neq; euacuationem: sed forissecus inductum. Huic confert curibus circularibus velocibus uti, quo quàm minima corporis colliquatio fiat, & spiritu quàm denussimo vtens, id quod inductum est excernat, à cursibus autem deambulationibus celeribus vtendum est. Victus autem mollis & levis ad dies quatuor ostendatur.

Quicquid porrò à deo accipere quis sibi videtur purum, bonum est ad sanitatem. Significat enim ea quæ in corpus ingesta sunt pura esse. Quicquid verò huic contrarium videre quis putat, non est bonum. Morbum enim in corpus venisse significat. Oportet igitur velut priorem etiam hunc curari. Si quis se complui putet clementi cælo, aqua molli, & non valde madefieri, neq; vehementem tempestatem ingruere, bonum est. significat enim moderatum ac purum spiritum ex aere ingressum esse. Si verò vice versa, valde complui quis sibi videatur, & tempestatem ac turbinem esse, idque aqua non pura, morbum designat à spiritu qui in ipso est.

Verum oportet etiam hunc simili diata uti, & omnes hos pauco cibo ali. De significationibus quidem igitur astrorum sic iudicare oportet, prouideréque ac diatam statuere, & diis supplicare, in secundis quidem rebus Soli, Ioui cælesti, Ioui possessori, Mineræ opulentæ, Mercurio, Apollini. In contrariis verò, diis malorum auersoribus, & terræ, & heroibus, quo mala ac graua omnia auertat. Cæterum & hæc sanitatem præsignant. Nimirum ea quæ in terra fiunt, acutè videre, & audire, & securè iter facere, & secure ac citra timorem currere, & videre terram leuem ac probè cultam, & arbores florentes, fructuosasq; ac satiuas, & flumina solito more fluentia, & aqua pura, neque copiosiore, neque pauciore quàm conueniens est. Item fontes & puteos eodem modo.

Hæc omnia sic visa, sanitatem homini designant, & corpus rectè habere, omnesque circuitus, & exhibitiones ciborum, ac secre

A ac secretiones, integras esse. Si verò quid his contrariū videatur, detrimentum aliquod in corpore significat. Et visus quidem ac auditus latus, morbum circa caput significat. Itaque matutinis deambulationibus, itémque à cœna pluribus utendum est, ad superiorem dietam. Cruribus verò latis, vomitibus reuellendum est, & lucta ampliore utendū, ultra superiorem dietam. Terra autem aspera, carnem non puram significat, quare deambulationibus ab exercitiis pluribus utendum est. Arborū vero sterilitas, seminis humani corruptionem indicat. Si igitur folia arboribus decidant, ab humidis ac frigidis corpus læditur. Si verò floride sint arbores, verum infructuosæ, à calidis & siccis, hæc igitur per dietam frigefacere ac humectare oportet, illa vero siccare ac calfacere. Flumina autem non solito more fluentia, sanguinis circuitum significant, & auctiora quidem fluentia, excessum: imminuta verò, defectum. Oportet itaque per dietam hunc quidem augere, illum verò imminuere. Non pura autem fluentia, turbationem significant, quæ à curribus circularibus & deambulationibus, corpore per densum spiritum moto, purgatur. Fontes verò & putei commoti cōspecti, flatus circa vesicam significant, quos medicamentis urinam cientibus expurgare oportet. Mare perturbatum, ventris morbum significat, sed oportet aluum mouentibus, leuibusque ac mollibus expurgare. Terram aut domum moueri videre, sano quidem viro debilitatem significat, agrotanti verò sanitatem, & ex præcænti statu transmotionem. Sano itaque transmutare dietam conducit, Itaque primum vomat, & rursus, ubi paulatim cibum assumpit, à præcænti enim dieta totum corpus mouetur, debili verò eadem dieta uti conducit. Nam corpus ex præcænti statu transit. Terram ab aqua aliqua aut mari inundatam videre, morbum significat, humiditate multa in corpore existente. Verum oportet vomitibus, & prandij detractione, & laboribus & sicco victu uti, deinde sensim adiiciedo, ac modico cibo renutrire. Sed neque nigram, neque combustam terram videre bonum est, sed periculum est de labendi in fortem ac lethalem morbum. Siccitatis enim excessum in carne esse significat. Verum oportet & labores detrahere, & cibos qui sicci & calidi, & acres ac urinam cientes sunt: nutrireque; ptisanæ succo decocto, & omnibus mollibus ac leuibus.

Medela.

Cursus fluminis per somnū visus quid velit.

Fontes, putei.

Motus terræ vel domus.

Terræ inundatio.

Terræ nigrae perustaque somnium bonum non est.

Hippocratis Liber

bus modicis : & potu vti aquoso, albo, copiosiore : & balneis **D**
 multis calidis, sed ieiunus ne lauet, molliter cubet ac dor-
 miat, & in otio degat, frigus & Solem vitet. Supplicet autem
 terræ, & Mercurio, & Heroibus. Si verò in stagno, aut in ma-
 ri, aut in fluminibus natare quis sibi videatur, nō est bonum,
 humiditatis enim excessum significat. Confert autem huic
 & dicta sicca, & laboribus vti, febricitati verò id bonum est,
 extinguitur enim caliditas ab humoribus. Quicquid porro
 quis circa seipsum videt solito more fieri, ad naturam sui-
 ipsius, neq; maius, neq; minus, bonum est ad sanitatē. Et ve-
 stis cal- stitum album indutū esse, & calciamentum pulcherrimum,
 ciamentiq; bonum est. Quicquid verò membris maius fuerit, bonū non
 somnia. est, sed neque quodcunque tandem fuerit minus : & oportet **E**
 Nigra. hoc quidem per dietam augere, illud verò minuere. Nigra
 autem morbosiora sunt, & periculosa. Mollire itaq; oportet
 & humectare. Noua quoque transmutationem significant.
 Noua. Mortuos videre puros in vestibus albis, bonum est, & accipe-
 Mortui. re aliquid ab ipsis purum, bonum est. Sanitatem enim signifi-
 cat corporum, & salubritatem ingestorū, à mortuis enim nu-
 trimenta, & incrementa, ac semina fiunt. Hæc autem pura in
 corpus irrepere, sanitatem significat. Si verò contra quis vi-
 deat ipsos nudos, aut nigris vestibus indutos, aut non puros,
 aut aliquid accipientes, aut ex domo portantes, non est com-
 modum. Morbum enim significat, quæ enim in corpus inge-
 runtur, nociua sunt. Verū oportet cursibus circularibus &
 deambulationibus depurgari, & alimento molli ac leui à vo **F**
 Corpora mitu sensum nutriri. Quæcunq; verò formæ peregrinæ cor-
 formæ pe- pora in somnis apparent, & hominē perterrent, ciborum in-
 regrinæ. consuëtorum repletionē, & secretionem, & bilis supernè ac
 infernè eruptionem, & morbum periculosum significāt. Ve-
 rū oportet vomitum facere, & ad dies quinque cibos quam-
 leuissimos non multos, neque acres, neque siccos, neque cali-
 dos sensim adiiciendo accipere, & laboribus naturalibus ma-
 ximè vti, exceptis deambulationibus à cœna. Vtendum e-
 Comestio, vitet. Si verò quis per somnum edere aut bibere consuetos
 potatioq; cibos ac potus sibi videatur, inopiam alimenti significat, &
 Carnis co- animæ tristitiam. Et si carnes robustissimas quis edere se pu-
 mestio. tet, maximum alimenti excessum designat. Si verò debilis-
 simas,

A limas, minorem. Quemadmodum enim id quod editur bonum est. Sic etiam id quod videtur. Cibos igitur detrahare conducit. Nam alimenti excessum hoc significat. Sed & panes ex caseo ac melle facti per somnum comesti, similiter significant. Aquam autem puram bibere bonum est, reliqua omnia nociua sunt. Quaecunque homo ex consuetis ac familiaribus se videre putat, ea animæ concupiscentiam significant. Quaecunque verò fugit perterrefactus, sanguinem sihi ac præ siccitate coerceri significant. Confert itaque frigefacere ac humectare. Quum verò quis pugnat, aut pungitur, aut ab alio ligatur, secretionem circuitui contrariam corpori contigisse significat. Conducit igitur vomere, & attenuare ac deambulare, & cibis leuibus uti, & à vomitu ad dies quinq; sensim renutrire. Quin & oberrationes & ascensus in somnis visi, grauius significant. Fluminum transitiones, & hostes armati, monstra formæ peregrinæ, morbum aut insaniam significant. Confert itaque his qui talibus in somnis vexantur, cibis modicis uti leuibusque ac mollibus, itémque vomitibus, atque sic sensim rursus ad dies quinque cibum exhibere. Utendum & laboribus naturalibus multis, præterquam à cœna, Calida lauacra, & otium, frigusque ac Solem vitent. Qui igitur his quemadmodum conscripta sunt utetur, vitam sanus deget, & inuenta est sanè à me hæc ipsa diata, quantum possibile est humano ingenio excogitare, diis auxiliantibus.


Aqua potio.

Diuerſa
ſomnia aſpicio.Inuentum
Hippocratis.

CHIPPOCRATIS
COI LIBER DE ALI-
MENTO, IANO COR-
NARIO MEDICO
PHYSICO IN-
TERPRETE.

Hunc Librum Galenus Hippocratis esse negat. Sed tamen non alicuius plebei ac vulgaris hominis esse dicit, & fortassis ipsius Theſſali. Quidam Herophilum autorem putant:

ALIM



LIMENTVM & alimenti species, D
vnum & multę: vnum quidem, qua-
tenus vnum genus est. Species verò
humiditate ac siccitate finitur, & in
his formę, ac quãtitas est, & ad quę-
dam, & ad tot. Auget autem, & cor-
roborat, & incarnat, & assimilat, &
dissimilia facit quę in singulis sunt,
iuxta vniuscuiusque naturam ac fa-
cultatem quę ab initio adest.

Assimilat autem pro viribus,
quum id quod superingeritur superatur, id verò quod prius
inest superat. Exile autem fit aliquando quidem prius, in
tempore dissolutum aut insuper appositum, aliquando verò ^E
posterius, in tempore dissolutum aut appositum. Destruit
autem vtrunque in tempore & post tempus, id quod extrin-
secus assiduo superingestum est, & per multum tempus o-
mnibus membris solidè implicatum est, & propriam qui-
dem formam producit, priorem verò aliquando autem &
priorēs, destruit. Facultas porrò alimenti peruenit & ad
ossa, & ad omnes partes, & in neruum, & in venam, & in ar-
teriam, & in musculus, & in pelliculam, & carnem, & pin-
guedinem, & sanguinem, & pituitam, & medullam, & cere-
brum, & medullam spinalem, & interanea, omnesque ipso-
rum partes, & sanè etiam in caliditatem, & spiritum, & hu-
miditatem. Alimenti verò & id quod hoc nutrit, alimen- ^F
tum est, & quod velut nutrimentum est, & quod nutrimen-
tum futurum est: Principium autem omnium vnum est, &
finis omnium vnus, & idem finis est atque principium: &
quę particulatim in alimento probè & malè distribuuntur.

Ciborum
vis.

Succorum
vis.

Probè quidem, quę prædicta sunt. Malè verò, quę con-
trarium his ordinem habent. Succī varij, & coloribus, &
viribus, & in detrimentum, & in vtilitatem, & neque læden-
tes, neque commodantes, & multitudine, & excessu, & defe-
ctu, & implicatione, aliquorum quidem, aliquorū verò non.

Et omnium caliditatem lædunt ac iuuant, & frigiditatem
lædunt ac iuuant, & facultatem lædunt ac iuuant. Faculta-
tis autem varię naturę sunt. Succī corrumpentes & totum,
& partem, & forinsecus ac intrinsecus, spontanei & non spon-
tanei, Nobis quidem spontanei, causę verò non spontanei.

Rursus

A Rursus autē causā, aliā manifestā, aliā obscurā, & aliā
possibiles, aliā impossibiles. Natura omnibus subuenit. Ad
hanc verò forinsecus quidem cataplasma, Illitio, Vnguentū,
Nuditas & totius & partis. Caliditas & frigiditas, iuxta ean-
dem rationem & adstrictio, & ulceratio, & morsus, & corro-
sio. Intrinsecus verò & quādam ex prædictis, & suprà hæc
causā obscura, & parti & toti, & alicui & non alicui, excre-
tiones ventris secundum naturam, item vrinam, sudoris, sa-
liuæ, muci, vteri, iuxta hæmorrhoidas, verrucam, lepram, tu-
berculum, carcinoma, ex naribus, ex pulmone, ex ventre, ex
fede, ex cole, secundum naturam, & præter naturam, disci-
mina horum aliis iuxta aliam rationem, aliquando etiā ali-
ter. Vna natura sunt hæc omnia, & non vna. Multæ naturæ
sunt hæc omnia, & non vna. Medicina sursum & deorsum, &
neque sursum, neque deorsum. In alimento medicina, opti-
mum. In alimento medicina malum. Malum & optimū ad
aliquid. Vlcus, crusta, sanguis, pus, sanies, lepra, furfur, vlcera
capitis manantia, impetigo, vitiligo, lētigo, aliquando lēdit,
aliquando prodest, aliquando neque lēdit, neque prodest.
Alimentum, non alimentū. Si nutrire non potest, nomen est
alimentum, non opus. Opus & res est alimentum, nō nomē.
In pilos alimentum, & in vngues, & in extremā superficiem
intrinsecus peruenit. Forinsecus alimentum ex extrema su-
perficie, ad intima peruenit. Confluxio vna, conspiratio vna,
Consentientia omnia. Iuxta totius quidē corporis naturam
omnia, iuxta partem verò, partes in vnaquaq; parte ad opus.
Principium magnum ad extremam partē peruenit. Ex ex-
trema parte ad magnum principium peruenit. Vna natura,
esse, & non esse. Morborum differentia, in alimēto, in spi-
ritu, in calore, in sanguine, in pituita, in bile, in humoribus,
in carne, in pinguedine, in vena, in arteria, in neruo, muscu-
lo, pellicula, osse cerebro, medulla spinali, ore, lingua, stoma-
cho, siue gula, ventre, intestinis, septo transverso, peritonæo
membrana aluum ac intestina amplectente, hepate, splene,
renibus, vesica, vtero, cute. Hæc omnia & singulatim & par-
ticularim. Magnitudo ipsorum magna, & non magna. Si-
gna, titillatio, dolor, ruptura, mens, sudor, vrinarum subsidē-
tia, quies, iactatio, visus, imaginationes, morbus arquatus, sin-
gultus, morbus comitialis, sanguis integer, somnus. & ex his

Causa
riz.Causa non
semper pa-
tet.Medicina
varia.

Alimētum.

Mira & bre-
uis discus-
sio mēbro-
rum.Signa lan-
guentis.

r

&

Hippocratis Liber

**Signa ob-
seruanda.**

**Varietas
consideran-
da.**

Pulmo.

**Alimenti
principiū.
Venarū se-
des & arte
riarum.**

Lac.

Vinum.

**Sanguis va-
riat.**

& ex aliis naturalibus, & quæcunque alia huiusmodi ad de-
trimentum & vtilitatem procedunt. Labores totius & par-
tis. Et magnitudinis signa, alterius ad maius, alterius ad mi-
nus, & ab vtrisque ad maius, & ab vtrisque ad minus. Dulce
non dulce, dulce ad potetiam, velut aqua. Dulce ad gustum,
velut mel. Signa vtrorunque, vlcera, oculi, & gustus, & in his
magis & minus. Dulce ad visum, & in coloribus, & in aliis
mixturis. Dulce magis & minus. Raritas corporis ad perspi-
rationem, quibus amplius aufertur, saniores sunt. Densitas
corporis ad perspirationem, quibus minus aufertur, morbi-
diores. Qui probè perspirant, debiliores & saniores sunt, &
à morbis facillè reconualescunt. Qui malè perspirant prius-
quam ægrotent, fortiores sunt. Vbi autem ægrotarunt, diffi-
cilis à morbis recoualescunt. Hæc autē & toti & parti. Pul-
mo contrarium corpori alimentum trahit, reliqua verò om-
nia idem. Principium alimenti spiritus, nares, os, guttur,
pulmo, & reliqua respiratio. Principium alimenti & humi-
di & sicci, os, gula, venter. Verum antiquius & primordiale
alimentum, per abdomen umbilicus. Radicatio venarū he-
par. Radicatio arteriarum cor, ex his aberrat in omnia fan-
guis & spiritus, & color per hæc meat. Vis vna & non vna,
qua omnia hæc & alia gubernantur, alia quidem ad vitam
totius & partis, alia ad sensum totius & partis. Lac nutrimē-
tum, quibus videlicet secundum naturam alimentum est, a-
liis verò non. Aliis autem vinum alimētum est, & quibusdā
non alimentum. Et carnes, & aliæ multæ alimēti species, &
iuxta regionē & iuxta consuetudinem alunt, partim ad aug-
mentum, & ad esse, partim ad esse solum, velut in senibus.
Quædam verò suprâ hæc, etiam ad robur. Dispositio Athle-
tica non est à natura. Habitus sanus melior in omnibus. Ma-
gna est res quantitas ad vires solerti ratiocinatione adopta-
ta. Lac & sanguis alimenti sunt redundantia. Circuitus ad
multa consoni sunt, ad fortum eiusque alimentum. Rursus
autem sursum repit in lac, & in alimentum, & ad infan-
tem, Viuificantur non animalia, viuificantur animalia. Vi-
uificantur partes animalium. Naturæ omnium nullo docto-
re vsæ sunt. Sanguis alienus vtilis. Sanguis proprius vtilis. Sā-
guis alienus nocius. Sanguis proprius nocius. Humores
proprij nociui. Humores alieni nociui. Humores alieni con-
ducibiles

A ducibiles. Humores proprii conducibiles. Consonans dissonans est. Dissonans consonans est. Lac alienum bonum. *Lac variat.*
 Lac proprium nocium. Lac alienum nocium. Lac *Digestio*
 proprium commodum. Cibus iuuenibus facile ac leuiter per *per aetates.*
 trefactus. Senibus verò ad summum transmutatus. His qui *Partus con-*
 in vigore ætatis consistunt impermutabilis, Ad figuratio- *formatio.*
 nem, soles triginta quinque. Ad Motum, septuaginta. Ad
 perfectionem, ducenti & decem. Alij tradunt. Ad formam,
 quadraginta quinque, ad motum, septuaginta sex, ad exitum,
 ducenti & decem. Alij sic. Ad formam, quinquaginta,
 ad primum saltum, centum, ad perfectionem, trecenti.
 Alij sic. Ad discriminationem, quadraginta, ad transitum,
B octoginta, ad elapsum, ducenti quadraginta. Non est, &
 est. Gignuntur autem in his & plures & pauciores, secun-
 dum totum, & secundum partes. Non multo autem plures aut
 pauciores, pauciores verò tot, & quæcunque alia his similia.
 Ossium alimentum ex confractione. Nasus quinque. *Quota of-*
 Maxilla & clauicula, & costis duplicia, cubito triplicia. *sum costæ.*
 brachio quadruplicia, femori quintuplicia. Et si quod *scientia.*
 in his plus aut minus potest. Sanguis humidus & sanguis *Sanguinis*
 solidus. Sanguis humidus bonus. Sanguis solidus malus. *alia varia-*
 Ad aliquid omnia mala & bona sunt. Via sursum deor- *tio.*
 sum vna. Potentia alimenti melior quam moles. Moles ali- *Cibariorū*
 menti melior quam potentia. Et in humidis & in ficcis de- *variatio.*
 trahit & apponit idem, & alteri quidem aufert, alteri verò
C apponit idem. Venarum pulsationes, & respiratio spiritus, *Pulsus spi-*
 iuxta etatem, & consonantia & dissonantia sunt, & morbi *ratio, signa*
 & sanitatis signa, & sanitatis magis quam morbi, & morbi *sanitatis &*
 magis quam sanitatis. Alimentum enim etiam spiritus est. *morbi.*
 Humidum alimentum magis facile transmutatur quam
 siccum. Siccum alimentum facilius transmutatur quam hu-
 midum. Alimentum quod ægrè alteratur, ægrè consumi-
 tur. Quod facile apponitur, facile consumitur. Et quicunque
 veloci appositione opus habent, his humidum ad reficiendas
 vires medicamen optimum. Quicunque verò adhuc velo-
 ciori indigent, per olfactum. Qui autem tardiore appositio-
 ne opus habent, solido alimento vtantur. Musculi solidiores
 ægrè magis quam alia colliquescent, excepto osse & neruo.
 Quæ denudata sunt, ægrè transmutantur, & secundum ge-
 nus

Hippocratis Liber

nus ipsa seipsis fortiora sunt quàm pro re ipsa: propterea ip- D
sa seipsis ægrius colliquescent. Pus ex carne, purulentum ex
sanguine, & ex alia humiditate. Pus vlceris alimentum. Pus
alimētum venæ, arteriæ. Medulla alimentū ossis, propterea
callo obducuntur. Facultas & potentia omnia auget & nu-
trit, & germinare facit. Humiditas alimenti vehiculum est.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE HUMIDO-

RVM SIVE LIQVIDO-

RVM VSV, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*

Aqua.



QVA potabilis, salsuginosa, mare. Potabi-
lis quidē in officina medica optima. Nam
& ferramentis & aramentis optima, & me-
dicamētis plurimis inueteratis cōmunissi-
ma. Verūm ad corpus nosse oportet, quòd
hæc aut madefacit, aut frigefacit, aut calfa F
cit. Aliter verò nulli commodat, aut detrimento est potata.

Oculorum
medela.

Vbi modica potabili in spongia vteris, optimum oculis est.
Cutis ipsa supernè exulceratur calidæ aspersione. Fomētum
corporis totius aut partis, Cutis duræ mollitio, distentē laxa-
tio, nervorum carniū, humorum sub cutem effusio, sudo-
ris secretio. Humectare proolutione, velut nares, vesicam, fla-
tus. Incarnare attenuare, liquefacere, minuere, colorem re-
uocare, colorem dispergere. Somniferum & in caput, & in
alia, conuulsionum, tensionum, mitigatiuum dolores stupe-
facit auris, oculorum, & quæcunq; talia, frigida calfacere, ve-
lut pix vlceribus, præterquā à quibus sanguis erumpit, aut
erupturus est, tractis, luxatis, reliquis quibus linteola sunt
medicus, Capitis grauitati. Moderatio in vno quoq; ne ultra
torq

A torqueamus, velut calida corpori, ex excessu in vtranq; partem, vt ab vtraque non aberrer, coniectatione ex detrimento, aut inutili facta, velut in tepida. Oportet enim detrimentis aut vtilitatibus etiam si sint vti, vsquequo iuuent, aut donec lædant. Madefactio itaque & humectatio, debile quid est. Frigefactio verò & calfactio, forte: velut ex sole.

Madefactio.

Frigefactio.

Calfactio.

Verum frigida calida existens, velut potabilis aqua, debile quid est. Calida autem ne vltius pergat, vt vratur. Indicat autem de his ipse ægrotus, exceptis mutis, aut leuiter syderatis, aut stupefactis, aut velut in vulneribus perfrigeratis, aut nimio dolore vexatis. his enim hæc sensu non percipiuntur. Nam non sentiunt hi perusti. Itemq; profundæ ac magnæ luxationes. Iam verò etiam pedes deciderunt perfrigerati, ex calidæ perfusione. Sed his corpus perfusi iudex est, similiter etiam frigidæ. Harum aut vtrarumq; paucitas, debile quid est. Multitudo verò, forte. veruntamen linere oportet, donec fiat id cuius gratia fiunt. antea verò quam postremum fiat, cessandum est. Harum porro vtraque lædit, & calida quidem amplius ea vrentibus has læsiones inducit, carniū effoeminationem, neruorum debilitatem, mentis stuporem, sanguinis eruptiones, animi deliquia hæc ad mortem. Frigida verò conuulsiones, tensiones, nigrores, rigores febriles. Mediocritas quidem extra noxam est. Reliqua verò lædunt ac pro sunt, velut relatū est. Voluptatibus, & iucunditatibus, & doloribus ac molestiis, prout singula ex ipsis conueniunt, ita sani apparent. Corpus tegi ac velari aduetum, quicquid insuetum est, quicquid longissimè à familiari calore abest, & peregrino frigori propinquissimū, id ipsum auersatur: & propterea sanè calida gaudet, & ferre potest. Cerebrum & quæ ab hoc oriuntur, frigida quidem tristantur, calida verò gaudent, si sanè frigidius & solidius à natura fuerit. Propterea ossibus, dentibus, neruis frigida inimica, calida verò amica, quia ab illa conuulsiones, tensiones, rigores febriles, quæ sanè frigida facit, calida verò sedat. Ob id etiam à calida voluptates, & illecebræ, à frigida verò dolores & auersationes. Ideoque spina, pectus, dorsum, præcordia, magis frigida aggrauantur calida verò gaudent, & ferre ipsam possunt. propterea sanè spina, pectus, dorsum, præcordia, contraria perpeffa sunt, quia sunt cōtraria. propterea sanè in hoc loco anxietas

Calida copiosius vrentes quid patiuntur.

Ossibus dentibus neruis frigida inimica.

Hippocratis Liber

xietatem ex calida obortam, frigida sedat. propterea sanè D
 frigida potu gaudet. propterea sanè cibus calidis delectatur.
 propterea sanè & in animi deliquiis frigida extremis parti-
 bus affundere prodest. Quòd autem posteriores partes cali-
 dam magis sufferunt quàm anteriores, quæ relata sunt in cau-
 sa sunt. Quòd verò etiam frigida, recte habet. Nam & extre-
 mæ partes anteriores sunt, & tegi non adsueta: velut etiam
 interna pars se habet ad externam. Cogitandum autem quòd
 vtraque in vnoquoque corpore potior est externa cute, quæ
 & sibi ipsi, & neruo sanguineo cõtina ac coharens, eo quod
 extrà proprium calorem, in externo frigore est, ab vtriusque
 frequenter superatur, & vtriusque frequenter opus habet, fre-
 quentius autem calida ad voluptatem. Perpetiuntur autem E
 & extremæ partes tale quid, quare citò multa percipiunt, tar-
 dè autem primùm attolluntur. Et venæ quoque aliæ prius,
 aliæ posterius. Atque sic omnia apparent, & vbi frigesunt
 extremæ partes, & vbi calefiunt, in vasorum euacuationibus,
 in animi deliquiis. Et iuxta rationem meritò etiã venas se-
 quuntur, ea quæ ab his eueniunt. Et calefacit primùm calida
 velut in manibus, internas partes. At vlcerà calida gaudent
 ex confesso, quia tegi adsueta sunt. Meritò itaque altera gra-
 uatur. Meritò igitur & ipsæ venæ, quia sunt in calido. Meritò
 etiã ipse thorax, & ventriculus ipse a frigida superatus, mo-
 lestè fert, & mortem minatur, quia maximè desuetus est. Ve-
 rum plurimum abest ab eo vt patiatur: propinquissima au-
 tem inter se sunt, egere, & pati. Meritò igitur frigida potu F
 delectatur. Et sic cõsentiunt inter se omnia hæc. Quòd verò
 omnia desquamata & ambusta in superficie, non valde tegi
 adsueta, maximè frigidam molestè ferunt, par est. Citissimè
 enim superatur. Et profundissima si superetur, maximè vti-
 que grauentur. deinde etiã natura nervosa participant. Quo-
 niam imus venter calida delectari videtur, considerãdus lo-
 cus est, & postea extremæ partes, & vesica, & genitales par-
 tes, & virilis membri glans natura frigidior est, quàm quis pu-
 tat. Sursum enim non deorsum exilit caliditas: & propterea
 calida delectatur. Considerandum etiam, quòd post calidam
 frigescit corpus magis perfrigeratum, post frigidam verò re-
 calefcit magis cõtariũ: velut etiã aquæ frigefaciendæ & cale-
 faciendæ sunt, propter tenuitatē. Et quod post calidã durefcit
 corpus

Corpus fri-
 gescere ma-
 gis post.

A corpus magis resiccatum, velut oculi post frigidam. Altera enim similis est aeri ambienti, altera nō. Mare pruriginosis, & qui ab acribus humoribus vellicātur prodest, vt & lauent, & foueant ex calido. Qui verò nō adfueti sunt, aliquantum laeduntur. Verum ad vlcera, & ambusta, ac desquamata, & quæcunq; talia, contrariū est. Aptum est autē puris. Bonum est & ad attenuandum, & ad piscatorum vlcera. Hæc enim neq; suppuratur, si nō vellices: & ad vlcera cuniculosa, & depascentia proserpendo sedat ac sistit, velut sal, falsugo, nitrum. Omnia autē hæc si quis parum vtatur, irritat: si exceller, bona sunt. Melius autē est calidum ad plurima. **Acetū quā vim habeat.** Acetū quā vim habeat.

B perfundendum & ad fomentū: & ad vlcera recens vulneratis, & ad sanguinis grumos, vbi nigredines sunt in pudendis, collutio est ad aures, & ad dentes. Calido autem hæc fiunt, & alia, sed & ex tempore coniecturā facere oportet. Eliquat velut sal, & vt alia quæ impetigini, lepris ac vitiliginibus conducunt, affusum ad calidū solem. maximè verò conducit vnguib; leprosis. Superat enim post tempus verrucas formicarias attenuat, & sordes in auribus sanat. Mollit autem & corpus, & multos alios locos, si nō odor offenderet, & maximè mulieres. Valuerit & ad podagram, si non corpus vulneraretur. Eadem etiā fex aceti facit. Vinum dulce ad diuturna vulnera commodum est assidue vtenti. Sed & ad medicamentorum potionem. Austerum autem & album, & nigrum vinum, frigidum ad vlcera commodum est, frigidum propter caliditatem. Lanæ quæ frigiditatis gratia, aut perfunduntur, aut induuntur, aut intinguntur, aquam frigidissimam postulant. Quæ verò adstrictionis gratia, vinum nigrum etiam lanas aspergere potest, velut etiam betarum folia, aut linteola intinguntur, in plurima quibus adstrictio inest, velut sunt hederæ albæ folia, & quæ acerbiora sunt, aut friabiliora, velut hederæ & rubus, rhus coriarius, saluia: & in ea quæ mollire oportet, velut farina cocta. **Aqua frigida.** Aqua frigida prodest papulis rubicundis, quales alia atque alia parate sublatæ erumpunt, quales per splenia attractoria emergunt: In carnosissimis verò & tenera carne præditis subrubicundæ sunt: in nigris autē rotundæ, dothienes hoc est furunculæ appellatæ, & quales in ipsis calidis lauacris oboriuntur, & mulieribus

Tumores
articularū.

mulieribus ex mentium sub cutem recurſu fiunt, & ab irri-
tamentis cutis, aut inſolita veſtimentorū aſperorum geſta-
tione, & ex ſudoris exitu, aut ubi quis ex frigore, derepente
ad ignem, aut calida lauacra acceſſit. Nam ſi hæc poſterius
fecerit, nequaquam amplius erumpunt. Alioqui quæ ex
frigore fiunt, aut quæ exaſperantur inſtar milij, deinde exul-
cerantur, eas frigida lædit. Calida verò prodeſt. Tumo-
res in articulis, & dolores ſine vlcere, ac podagricos, & con-
uulſa, plurima ex his frigida multa affuſa leuat ac extenuat,
& dolorem torpefacit. Topor autē moderatus, dolorem ſol-
uit. Sed & calida aqua attenuat ac mollit. Podagricis, re-
ſolutis, ante ac retro diſtentis, conuulſis, talia accedunt, di-
ſtentiones, tremores, leues ſiderationes: Talibus laxatis, clau-
dicationes, torpores, vocis interceptiones, ad talia, excretio-
nes per infernas partes ſuppreſſæ. Cauendum autē eſt in fri-
gidæ uſu, ne modum excedamus. Articulos induratos, aut
ab inflammatione aliquando oborta, aut à diſtortione, ope-
ræ precium eſt ſanare, aqua calida in vtriculum inſuſa.

Calida.
Frigida.

Manū deligare, & oculos lachrymas lenit, ita ut ad acres,
ſtillamentum lene inſundat quis, ut ne ſalſuginofa contactu
lædat. Et ſollulis vlceribus oculorum elotio prodeſt, & re-
pletio ad naturam reducens. Calida oculis cōuenit, dolo-
ribus, ſuppurationibus, lachrymis mordacibus, ſiccis omni-
bus. Frigida doloris exortibus, valde rubicudis, & qui col-
lectiones tuberculorum iuxta venas habere ſolent, qualia
ſunt vlcuſcula capitis manātia, circa thoracem, & alia dura. F
Verūm podici & vtero non valde commoda eſt, neq; ſangu-
inem in frigore mingentibus. Vlceribus quidē frigida mor-
dax, cutem obdurat, doloroſa non ſuppurari facit, hūefacit,
nigrefacit, rigores febriles facit, conuulſiones, ante ac retro
diſtentiones. Quandoq; verò in hac diſtentione, ſine vlcere iu-
ueni carnoſo, media ætate, multæ frigidæ aquæ effuſio, ca-
loris reuocationē facit. Calor autem hæc ſoluit. Callida
ſuppuratoria eſt, non in omni vlcere, maximum ſignū ad ſe-
curitatem, cutem mollit, attenuat, dolorem eximit, rigores,
conuulſiones, ante ac retro diſtentiones lenit, capitis graui-
tatem ſoluit, plurimū autem conducit oſſium fracturis,
magis autem denudatis, & ex his maximè his qui in capite
vlcera habent, & quæcunque præ frigore, aut moriuntur,
aut

A aut vlcerantur: itēque in vlcerationibus voluntariis ac in-
uoluntariis, qualia sunt desquamata: herpetibus serpendo
ad dentibus, denigratis aut in gingiuis, aut in aure, aut in
sede, aut vtero. His omnibus calida amica est ac iudicatoria.
frigida verò inimica & occidēs, præterquam in quibus san-
guinem fluxurum esse timor est. Atque hoc modo vtendum
est liquidorum perfusionibus, inunctilium illitionibus, fo-
liorum impositionibus, aut linteolorum cataplasmatibus, quæ-
cunque aut frigiditate, aut caliditate profunt, aut nocent.

B **H I P P O C R A T I S**
C O I L I B E R, D E H V M O -
R I B V S I A N O C O R N A -
R I O M E D I C O P H Y -
S I C O I N T E R -
P R E T E.

*Genuinum Hippocratis librum hunc esse Galenus
dicit. Verum quedam insunt ad extremam di-
etionis breuitatem contracta: quedam rursus
C ultra modum extenta.*



M P E T V S & ferocitas humorum, vbi non Difficilis
reciprocatio humorum est, velut florum, humorum
ducendus est quā repit per conuenientes ac dissertatio.
commodas regiones, exceptis his quorum
maturitas tempore contingit. Maturatio-
nes extra aut intro repunt, aut aliò quò
oportet. Cautio, infinita magnitudo, experiendi difficul-
tas, pilorum nuditas, viscerum vacuitas, infernis repletio,
supernis alimentum, mutatio sursum, mutatio deorsum. Considera-
Spontanea sursum & deorsum, quæ profunt & lædunt. da medico.
gnata species, regio, mos, ætas, tempus, constitutio mor-
bi, excessus, defectus. Quibus quantum deficit, aut non, me-
dela,

Hippocratis Liber

de la, declinatio, deriuatio, in caput, in obliqua, quā maximè **D** repit, aut reuullio in supernis deorsum, in infernis sursum, aut siccare, aut aliquibus inferna, aut aliquibus superna, aut eluitur, aut quibusdam mitigabitur. humores effusi ne intro reuellantur, sed secretiones siccantur. Turbatio, infusio per sedem, pelluium, quibus abscedit ad sedem, vnde exoluitur aut medicamētum, aut vlcus, aut humor aliquis cōmixtus, aut eruptio pustulosa, aut flatus, aut cibus, aut animalculum, aut actus, aut alia quādam affectio. Consideranda hæc, spontanea delinencia, aut velut ab exustione excitatæ bullæ, in quibus qualia lædunt aut profunt. Figuræ, motus, eleuatio, & rursus subsidencia, somnus, vigilia.

Quæ facienda, aut impedienda, cito assequi. Castigatio **E** per vomitum, infernè per exitum, aut sputum, mucum, tussim, ructum, singultum, flatum, vrinam, sternutationem, lachrymas, pruritus, euulsiones, contactus, sitim, famem, repletionem, somnos, labores, ocium, corpus, mentem, disciplinam, memoriam, vocem, silentium, vteri purgationem.

Quæ supernè erumpunt ac torquent, pinguis, intemperata ac meraca, spumosa, calida, mordacia, æruginosa, varia, ramentosa, fæculenta, cruenta, flatus expertia, cruda, cocta, sicca. Quæcunque circumfluunt, ferendi facilitatem cōtemplari oportet, itēque difficultatem, priusquam periculum veniat. Item quæ sedare nō oportet, maturatio, descensus eorum quæ infra sunt, redundātia & fluctuatio eorum quæ supra. & quæ ex vteris, & in auribus sordes, concitatio ac permixtio, apertio, euacuatio, calfactio, perfrigeratio, intrinsecus, forinsecus. horum quidem, horum verò non. Quum infra vmbilicum fuerit id quod torquet, tardum & molle est torgen. Vice versa, contra. Quæ per aluum egeruntur quæ repunt, non spumosa, matura, cruda, frigida, fœtida, sicca, humida. Quæ olfactum malè afficiunt. Sitis quæ prius non adfuit, neque actus, neque alia causa. Vrina, nasi humectatio, lactationem. Siccitatem. & non esse contractum ac arefactum, & spiritum turbulentum, præcordia, extremitates, oculos male affectos. coloris transmutatio. Pulsus, frigiditas, palpitationes, cutis duricies, neruorum, articulorum, vocis, mentis, figura voluntaria, pili, vngues. facile ferre, aut non, qualia oportet. Signa hæc. Odores corporis, oris, secessus, auris,

Tormētum
vmbilici.

Quanta sit
hæc obser-
uatio vide
to.

A auris, flatus, vrina, vlceris, sudoris, sputi, nasi. Corpus salu-
 ginum, aut sputum, aut nasus, aut lachryma, aut alij humo-
 res. Penitus similia, iuuantia, ludentia. Insomnia qualia
 videat, & in somnis qualia faciat, an acutè audiat, & obedire
 paratus sit animo, an magis fortia sint ac plura quæ com-
 moda sunt ac seruant, quàm alia, an sentiant omnia omni-
 bus, sensibus, & ferant, veluti odores, sermones, vestitus, figu-
 ras, & huiusmodi patienter, quæ sanè & sua sponte compa-
 rentia profunt, & quando etiam talia iudicationē inducunt.
 Item tot, & talia, veluti sunt flatus, vrina, qualis, & quanta, &
 quando. Quæ verò contraria sunt, auertere, ipsiſque aduer-
 fari. Quæ propinqua & communia sunt affectionibus, pri-
 ma & maximè affliguntur. Cōstitutionem autem ex primis
 incipientibus, quicquid tandem excernatur ex vrinis, qua-
 lēſnam fuerint, & qualis sit corporis collapsio, coloris im-
 mutatio, spiritus imminutio, & reliquæ cū his victus ra-
 tiones. Scire etiam oportet an similia sint quæ decedunt,
 transit, vrina, per vteros, sputa, per nares, oculi, sudor, ex
 tuberculis, ex vulneribus, ex pustulis, quæ sua sponte, quæ
 arte. Quod similia sunt inter se omnia quæ iudicant, & quæ
 profunt, & quæ nocēt, & quæ perimunt, quo hæc quidem fu-
 giens auertat, illa verò accersat, & ducat, ac suscipiat. Sed &
 alia eodem modo, cutis, extremarum partium, præcordio-
 rum, articulorum, oculorum, oris, figurarum, somniorum,
C qualia iudicant, & quando, talia machinari. Insupérque qui
 tales abscessus fiunt. Qualia profunt cibis, potibus, odoribus,
 visu, auditu, cogitatu, secretionibus, humoribus, calefactio-
 ne, frigefactione, siccitatibus, humectando, siccando, vnguen-
 tis, illitionibus, cataplasmatibus, emplastris, insersionibus, de-
 nique & epithematis quæ imponuntur. Figura, defricatio,
 curatio, labor, ocium, somnus, vigilia: spiritus supernè, in-
 fernè, communibus, propriis, arte paratis. In exacerbatio-
 nibus neque præsentibus, neque futuris, neque pedum frigi-
 ditate, sed in declinante deorsum morbo. In exacerbationi-
 bus per circuitus fientibus, ciborum oblationes dandæ non
 sunt, neque cogere oportet, sed auferre de appositionibus an-
 te iudicationes. Quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, in Apho-
 neque mouere oportet, neque nouare, neque medicamentis, rismis di-
 neque aliis irritamentis, sed sinere. Concocta medicamentis ^{xit.}
 aggredi

Quæ per
exordia di
gnoscentia.

Hæc eadē
in Apho-
rismis di-

Concusio-
nes & de-
cretoriaqu
fiant.

Perinthus.

Humorum
obseruatio.

Lienosi
quid pa-
riantur.

aggredi oportet, & mouere non cruda, neque in principiis, D
si non turgent. Multa verò non turgent. Quæ ducere oportet: quo maxime repunt per conuenientes locos, eò ducere oportet. Quæ prodeunt non multitudine æstimare oportet; sed quãdiu prodeant qualia oportet, & facile æger ferat. Vbi verò opus est, debilitare etiam, aut animi deliquitum inducere oportet, donec hoc feceris, cuius gratia hoc fit, interim aliò vertere, aut siccare, aut humectare, aut reuellere, si sufficiat æger, id quod ex his coniectabis. Sicca quidem calida erunt, humida verò frigida. Quæ verò aluum mouent, plerunque

contraria. Hæc imparibus diebus, sursum, si & circuitus, & constitutio talis sit ex exacerbationibus. Fiunt autem plurima paribus diebus, deorsum: sic enim & sua sponte profunt: E
si non circuitus faciant exacerbationes in paribus. In talibus autem, in paribus sursum: in imparibus deorsum. Tales autem pauci sunt. Et tales constitutiones etiam difficiliter iudicantur. Quin & vltius tempore progressa sic fieri necesse est, velut ad decimamtertiam ac decimamquartam diem. Decimatertia quidem deorsum, decimaquarta verò sursum, Ita enim ad iudicationem conducit. Et quæ ad vigesimam.

Cæterum quæ infrà prodeunt, multum purgare oportet, & hæc non propè iudicationem, sed longius ab ea. Raro autem in acutis, multa ducere oportet, in delassatis, totum. In febribus ad articulos, & circa maxillas maxime abscessus fiunt, propè sanè dolores vniuscuiusque ad supernam partem magis & in totum. Si verò lentus fuerit morbus & deorsum tendens, infernè etiam abscessus fiunt. Maxime autem pedes calidi, infernè significant: frigidi supernè. Qui verò ex morbis se erigentibus statim in manibus aut pedibus dolores fiunt, in his abscessus contingunt. Sed & si quid doluerit quis antea quàm ægrotet, ad eas partes firmatur. Quemadmodum

etiam tussientibus & anginosi in Perinthis. Faciunt enim tussiles abscessus, velut etiam febres. Iuxta eandem rationem contingit ab humorum aut corporis colliquatione & frigiditate. Proinde nosse expedit, in quibus temporibus humores florent, & quales in singulis morbos faciunt, & quales in vnoquoque morbo affectiones: & reliquum corpus ad quem morbum maxime natura repit: & quale quid splen intumescens facit. Horum sanè & natura, & ferme colores deteriores

A res sunt, & corpora tument. Et si quid aliud est, in his exercere se prodest, velut est animi intemperantia circa cibos ac potus, somnum, vigilias, aut ob amores quosdam, velut testifarum, aut propter artes, aut propter necessitates: tolerantia laborum, & quorum ordinata est, aut inordinata: Mutationes ex qualibus ad qualia: ex moribus animæ industria, aut quærens, aut meditans, aut videns, aut dicens, aut aliud quid, velut tristitiæ, iracundiæ, cupiditates, quæ ex casu contingunt. Molestiæ animi aut per oculos, aut per auditum, velut etiam corporum, Molis quidem ad seipsas attritis, dentes stupefunt: Ambulanti verò circa cauum locum, crura tremunt: quum autem quis manibus ea quibus opus habet leuat, hæc tremunt: Serpens de repente conspectus pallorem cum virore inducit. Timores, pudor, mæror, voluptas, ira, aliæque huiusmodi quomodo obediunt. Vnicuique autem pars corporis ad actionem pertinens in his obedit. Sudores, cordis palpitatio, & eiusmodi potentia. Quæ extrinsecus profunt aut nocent, vinctio perfusio, illitio cataplasmatum vsus, deligatio lanarum & talium rerum: & internæ partes talibus obediunt, non solum externæ his quæ intro assumuntur: Sed & quæ in lanis ab ouili succidis adhibentur, & quod à rege nomen habet cuminum, videntibus & olfacientibus. Quæ de capite ducunt, turbant, sermones, vox, & huiusmodi, mammæ, genitura, vterus, & quæ signa in ætatibus, & in suffocationibus, & tussi, & quæ ad testiculos. Quemadmodum Terra sata, venterculus animalia nutrit. & calefacit, & frigefacit. Frigefacit, dum euacuatur, calefacit, dum impletur. Quemadmodum terra stercoreta hyeme calida est, ita etiam ventriculus. Arbores corticem tenuem siccum habent, intrinsecus autem carne sicca, sanæ, non putridæ, diuturnæ. Ita & ex animalibus testudines, & quicquid eiusmodi est. Aetatibus, temporibus, annis, similia animalia, non deteruntur si moderatè melioribus vtantur. Quemadmodum hydria quod recens est transmittit, quod inueteratum retinet. Sic & ventriculus transmittit alimentum, & fecem retinet, velut vasculum. Modi morborum hi sunt, partim quidem cognati sunt, de quibus interrogando discere oportet: partim à regione, familiares enim sunt per multas, & multi ipsos noscunt: partim ex corpore, & victus ratione,

Molæ colli
sæ dentes
molestant.
Quæ cru-
ru tremo-
rem, & pal-
lorem fa-
ciunt.
Quæ foris
vel intus of-
ficient.

de h. b.
Terra sata,
venterculus
animalia
nutrit.
Venterculus
qualitas.

Quid ani-
malia tuca-
tur.

Morborum
natura.

Hippocratis Liber

Morborū
quorundā
cauſſa.

tionē, ac temperiei conſtitutione, aut à temporibus. At re-
giones ad tēpora malè diſpoſitæ, tales morbos pariunt, quali
tempori ſimiles fuerint, Verbi gratia. Inæqualis calor aut fri-
gus eadem die quum talia fuerint, morbos autumnales fa-
ciunt. Et in aliis temporibus ſecundum rationem, alij ab
odoribus cœnoſis aut paluſtribus: alij ab aquis, calculoſi, ſple-
nici: alij à ventis bonis & malis incipiunt. Qualia verò ſunt
tempora tales erunt etiam morbi, & conſtitutiones ex iſtis.
Si tempora tempeſtiuè, & ordinatè ſe habuerint, morbos iu-
dicatu faciles faciunt. Vernaculi autem temporū morbi iu-
dicant mutationes, & prout euariauerit tempus, ſimiles aut
diſſimiles erunt morbi, qui in hoc tempore oriuntur. Si verò
ſimiliter procedat, eiufmodi quoque fuerint morbi, & ad ta- E

Bilis per
aſtate quid
faciat.

gora enim ex caloribus, & calor ex frigore. Et ſi æſtas biliſa
fiat, & bilis aucta intus relinquatur, etiam aliquantum ſple-
nici fient. Quum igitur & ver ſic proceſſerit, etiam vere fit
morbis regius. Proximus eſt enim hic motus temporis, iuxta
hanc ſpeciem. Quum verò æſtas fiat verifiſimilis, ſudores in
febris, & febres faciles, & non peracutæ, neque linguis ob-
aridæ fient. Si verò hybernū fiat ver, & poſtremum hyemis
tempus, hyberni etiam morbi, & tuſſes, & peripneumonicæ,
anginæ. Et autumnus ſi non in tempore ac de repente hyber-
narit, non aſſiduè, tales morbos facit, eo quòd non in tempo-
re incept, ſed inæqualiter fit. Quapropter etiam tempora à
iudicatione aliena ac inconstantia ſunt: quemadmodum e- F

Ventorum
qualitas.

tiam morbi, ſi præerumpant, aut præexcernantur, aut intus
relinquātur. Recidivas enim etiam tempora faciunt, quem-
admodum & morbos ita inducunt. Itaque inſuper conſide-
randum eſt, quomodo habentia ſe corpora tempora ſuſci-
pian. Auſtri auditum grauunt, caliginem inducunt, caput
grauant, torpidi ſunt, diſſoluunt. Quum hic præualuerit, ta-
lia in morbis patiuntur, vlcera glabra, maximè os, puden-
dum, & aliæ partes. Si verò aquilo, tuſſes, faucium affectio-
nes, ventres duriores, vrinæ difficultates, horrores, dolores la-
terum ac pectoris. Quum hic dominatur, tales morbos ma-
gis expectare oportet. Si magis redundauerit, ad ſqualores
ſequuntur febres itémque ad pluuias, ex quolibet tandem
redundantiæ tranſmutatæ fuerint, & quomodocunque ha-
bentia

Magna vē-
torum cæ-
terarūmq;
rerum ob-
ſeruatō.

5000.

Bilis per a-
statem, san-
guis per
ver viget.
Temporū
mutationes
quantum
possint.

Posse & ex
morbis &
ex anni te-
poribus &
tempestati-
bus omnia
præuideri.

Hydropû
côictatio.*

Hippocratis Liber

novit, quod tali hyeme prægressa, tale ver aut æstas erit. D

Colores non sunt similes in temporibus, neque in aquilonaribus, neque in austrinis, neque in ætatibus, neque in vnoquoque ad seipsum, neque in alio ad alium. Considerandum autem est ex his quæ præsentia ac quiescentia novimus de coloribus, & quod ætates temporibus similes sunt, & colore, & mutatione.

Qui hæmorrhoidas habent neque pleuritide, neque peripneumonia, neque phagedæna, neque furunculis, neque tuberculis terebinthi figuram habentibus corripuntur. Fortassis autem neque lepris, fortassis neque vitiliginibus. Multi tamen tempestive curati, non tarde correpti sunt, & sic perniciose fuerunt. Et quicumque alij abscessus, velut fistulæ, aliorum medela sunt. Quæ ubi insuper comparent sedare solent, ea prius scientia impedimenta ab his liberant.

Alterius loci morbos loca excipientia, aut dolore, aut gravitate, aut ob aliud quiddam liberant, aut quod aliis sunt communicationes. Propter inclinationem non amplius sanguis prodit, sed iuxta humoris cognationem talia spunt, convenit quibusdam sanguinem detrahare tempestive in talibus, in aliis autem velut in his, non hoc convenit. Impedimentum in spuentibus cruenta, tempus anni pleuritidis, bilis.

Tubercula circa aurem quibus circa iudicationem exorta, non suppurata fuerint, his disparentibus recidiva fit, & pro ratione recidivarum, recidiva fiente, rursus intumescunt, & permanent, quemadmodum febrium recidivæ, in simili circuitu: in his spes est ad articulos abscedere. Vrina crassa, alba, qualis Archigenis familiari erat, in lassitudinis febribus quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si verò ultra hoc, etiam sanguis è naribus large eruperit etiam valde. Cui in testimonium in dextra parte dolebat, & articulari morbo correptus est, quietior erat. Postquam autem hic curatus fuit, magis dolebat.

Vrina crassa alba quod faciat. Archigenes.

HIPP

AHIPPOCRATIS

137

COI LIBER DE MORBO

SACRO, IANO CORNARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

Non genuinum Hippocratis, sed memorabilis tamen viri, hunc librum Galenus esse dicit, tum quod ad dictionem, tum quod ad sententiam attinet. Hippocratis autem neque dicendi modum, neque sententiarum acumen in ipso esse.



DE MORBO sacro appellato sic se res habet. Comitialis morbus. Nulla re videtur mihi aliis diuinior esse morbis, neq; sacratior. Verum naturam habet quam etiam reliqui morbi, unde fit. Homines verò naturā & causam eius diuinā esse putauerunt, præ inexperientia & admiratione, propterea quòd reliquis morbis nulla re similis est, & per inopiam quidē quòd nō cognoscunt, diuinitas ipsi conservatur. Per abundantiam verò & parabilem modū sanationis medentur. Exoluuntur enim aut expiationibus aut incantamentis. Si verò propter admirationē diuinus cēsetur, multi morbi sacri erunt, & nō vnus quemadmodū ego demonstrabo etiā alios nihil minus admirabiles, neq; minus monstruosos, quos nemo sacros esse censet. Primum etenim febres quotidianæ, & tertianæ, & quartanæ, nihil minus mihi sacri esse videntur, nec minus à deo fieri quā hic morbus, etiam si nihil admirabile habeant. Deinde video insanos homines & delirantes à nulla manifesta causā, & multa & simul impotētia facere, vndique multos in somno plorare ac vociferari, alios verò suffocari, alios exilire & foras fugere, atq; ita delirare donec expergiscuntur, postea autē etiā sanos esse ac sapientes velut prius, esq; ipsos pallidos ad debiles, atq; hæc nō semel, sed sæpe, aliq; multi sunt ac omnigeni morbi, in quibus singulis recēsendis in longū sermo extēderetur. Cæterū qui

s

primi

Hippocratis Liber

Magi. primi hunc morbum sacrum esse pronunciauerunt, tales ho-
mines mihi fuisse videntur, quales etiam nunc sunt magi, &

Quæ veta-
rent.

expiatores & circulatores, & quidā arrogantes, qui se vehe-
menter pios esse simulant, & amplius quid scire. Hi itaq; cō-
filiij ac mentis inopiæ obuelantes ac prætexentes diuinitatē,
quum nihil haberent quod exhibitū proderet, vt ne manife-
sta fieret ipsorum ignorantia, sacrā hanc affectionē esse pro-
nunciarunt, & rationibus idoneis collectis, curationem cōsti-
tuerunt sibi ipsis securam, expiamenta offerentes & incanta-
menta, & à balneis abstinere iubētes, & à cibis multis ac ine-
ptis ad hominum ægrotorū esum, velut ex marinis quidē à
mullo, & melanuro, mugiliq; ac anguilla, hi enim pisces op-
portunē haberi possunt. Ex carnibus verò à caprina, ceruina E
suilla, ac carnina. Hæ enim carnes maximè aluum turbāt. Ex
volucris autē, à gallo & turturæ ac otide, insupérq; ab his
quæ robustissimæ esse censentur. Ex oleribus à mētha, allio,
ac cepa. Nihil enim acre infirmo conducit. Pallium prætereā
nigrum habendū nō esse præcepere. Niger enim color mor-
talis est. Neq; in caprina pelle decubēdum esse, neque ean-
dem gestare oportere, neq; pedem supra pedem habendum
esse, neq; manum supra manum. Hæc enim omnia curatio-
nis impedimenta esse, Omnia autē hæc diuinitatis gratia ap-
ponunt, velut amplius quid scientes, & alios prætextus pro-
ferentes, quo si sanus æger euadat, ipsis gloria & dexteritas
adscribatur, sin moriatur, in tuto positæ sint ipsorū excusatio-
nes, habeantq; prætextū quod non ipsi sint in causa sed dei. F
Neque enim medicamentum aliquod edendum aut biben-
dum exhibuerunt, neq; balineis incoxerunt, vt ipsi in causa
esse videri possint. Mihi autē videtur nullū ex his qui medi-
terranea Africa inhabitāt sanum esse posse, propterea quod
caprinis pellibus ac carnibus vtuntur, quum neque stratum,
neque pallium, neq; calceamentum habeant, quod non sit ca-
prinū. Non enim alia vlla ipsis sunt pecora præter capras &
boues. Si autem hæc admota & comesta morbum augent, &
non comesta sanāt, nō est sanè Deus alicuius autor aut caus-
sa, neque profunt expiamenta, sed edulia sunt quæ & sanant
& lædunt. Numinis verò vis dissipatur. Sic igitur mihi vidē-
tur hi qui hoc modo hos morbos curare aggrediuntur, neq;
sacros ipsos putare, neq; diuinos. Vbi enim præ talibus expia-
mentis

Libes cur
non sanarē
tur ab hoc
morbo.

A mentis ac tali curatione transmutantur, quid vetat etiā prae aliis artibus similibus illis, & discedere ab hominibus & accedere? Quare nō Deus autor est, sed aliquid humanū. Quis enim lustrationibus & magicis incantamentis talē affectionē abducere potens est, is etiā aliis artibus abduxerit, & ex hac ratione diuinitatis opinio penitus pessum it. Talia itaq; dicētes ac excogitātes, ampliū quid se scire simulāt, & homines decipiūt, proponētes his lustrationes ac purificationes, quum verba ipsorum magna ex parte se ad Deum ac dæmonium extendant. Atqui mihi sanē nō de pietate verba facere videntur, velut ipsi putant, sed potius de impietate, & quōd Dei nō sunt, pietasq; ac diuinitas ipsorum impia est ac scelestā, velut ego docebo. Si enim & lunā abolere, & solē obscurare, tempestatēque ac serenitatē facere, pluuias item ac siccitates, & mare sterile itēmq; terram, & alia huiusmodi omnia, se scire profitētur, siue ex sacrorum mysteriis, siue ex alia quadam professione aut meditatione, hāc potentiam iactent, qui talia studio habēt, impij sanē mihi esse videntur, & deos nō esse putare, neq; si sint, aliquid posse, neque vllum aliquid etiā extremū malū prohibere. Quod quum faciant, quomodo nō ipsi infesti sint? Si enim homo incantamentis ac sacrificiis vtens, & lunam abolebit, & solem obscurabit, & tempestatem ac serenitatem faciet, non vtique ego horum aliquid diuinum esse putauerim, sed humanum, si sanē diuinitatis potentia ab humana volūtate superatur, & in seruitutē redacta est: fortassis autē hāc non hoc se modo habēt, sed homines victus indigni multa & omnigena moluntur & euariant, tum in alia omnia, tum in hūc morbū, in singulis affectionis speciebus causam deo adscribentes. Non enim semel, sed saepius eorundē mentionem faciunt. Siquidem enim capras imitentur, & si balatum edant, & frendāt, & si dextris partibus cōuellantur, Matrem deorum causam esse aiunt. Si verō acutiorem & concitatiorem sonum emittant, equo assimulant, & Neptunum autorem esse dicunt. Si verō etiā aliquid stercoreis emittāt, quod saepe quibusdam contingit prae morbo coactis, Hecates enodiæ appellatio additur. Si autem tenuiorem & densiorem vocem edant, velut auiculæ, Apollo Nomius, id est pastor, si verō spumā ex ore Apollo remittant, ac pedibus calcitrent, Mars causam habet. Qui-

Quare non diuinū malū hoc sit.

Quales venefici.

Quare hec fingantur.

Quibus diis hāc tribuant.

cunq

Hippocratis Liber

cunque porro pauores noctu ingruunt, timoresque ac deliria. D
& exsultationes e lecto, terrorésq; ac fugæ foras, Hecates infi-
dias esse dicunt, & heroum insultus, expiamentisque vtun-
tur ac incantamenti, & scelestissimum ac impiissimū, meo
sanè iudicio, faciunt numē. Expiant enim morbo correptos
sanguine, itē nq; aliis sceleribus inquinatos, aut iniustos, aut
ab hominibus intoxicatos, aut qui scelestū aliquod facinus
perpetrarunt, quos contraria his facere oportebat, sacrificare
nimirum ac precari, & ad templa progressos diis supplica-
re. Nūc verò horum quidem nihil faciūt, verū expiāt, & alia
expiamenta terra occultant alia in mare proiciunt, alia ad
montes deferunt, vbi nemo attingat, neq; conculcet. Oportē
bat autem ea ad templa deferre ac deo contribuere, si qui- E
dem Deus est author, Non tamē ego puto hominis corpus à
deo inquinari, sordidissimum scilicet à purissimo. Verū
etiam si cōtingat ab alio inquinari, aut quid perperì cupierit
vtique à deo purgari ac purificari magis quā inquinari.
Deus itaq; est qui maxima ac sceleratissima peccata purgat
ac purificat, & liberatio nostra existit, ipsiq; terminos tēplo-
rum ac delubrorū diis designamus, vt nullus qui non purus
sit eos transcendat, & ingressi respergimur, nō velut qui in-
quinemur, sed si quod etiam prius scelus habemus purifice-
mur. Et de expiationibus quidem sic se res habere mihi vi-
detur. Hic verò morbus nulla re diuinior reliquis mihi esse
videtur. Sed naturā habet, quā etiā alij morbi, & causā vn-
de singuli gignuntur. Naturā autē & causā, ab eodē Deū F
fieri, à quo etiā alia omnia. Et sanabilis esse mihi videtur ni-
hilo minùs quā alij, nisi iam prē tēporis lōgitudine inualue-
rit, vt fortior sit medicamenti quæ adhibentur. Incipit autē
velut etiā alij morbi secundum genus. Si enim ex pituitoso
pituitosus, ex bilioso biliosus gignitur, & ex tabido tabidus,
& ex splenico siue lienoso lienosus: quid prohibet vt cuius pa-
ter & mater hoc morbo correpti fuerint, etiam posterorum
ac neporū aliquis eo corripiatur? Semen enim genitale ab o-
mnibus corporis partibus procedit, à sanis sanū, à morbidis
morbosum. Aliud porro signū magnum est, quod nihilo di-
uinior reliquis sit morbis: pituitosis enim natura oboritur,
biliosis verò nō accidit. Atqui si diuinior est reliquis, simili-
ter omnibus morbū hunc fieri oportebat, & non discriminē fa-
cere

Malū hoc
medicabile

Pituitosos
rantiū comi-
tialis mor-
bus vexat.

A cere inter biliosos ac pituitosos. Sed enim ipsis cerebrum auctor est & causa huius affectionis, velut etiam aliorum maximorum morborum. Quo vero modo, & ex qua causa fiat, ego manifeste docebo. Cerebrum hominis duplex est, quemadmodum etiam aliis omnibus animalibus. Medium autem ipsius diuidit membrana tenuis. Quapropter non semper eandem capitis partem dolet, sed particulatim vtriusque, aliquando vero totum. Sed & venae in ipsum tendunt ex vniuerso corpore, multae & tenues, duae vero crassae, altera ab hepate, altera de liene. Et quae quidem ab hepate venit, hoc modo se habet. Altera quidem venae pars deorsum tendit, per partes ad dextram, iuxta ipsum rhenem ac lumbum, ad internam femoris partem, & descendit in pedem, & vocatur vena caua. Altera vero sursum tendit per venas dextras ac pulmonem, Finditur autem & in cor, & in brachium dextrum. Reliquum vero sursum fertur per clauiculam ad dextram ceruicis partem, ad ipsam cutem, ut conspicua fiat. Iuxta aurem vero occultatur. Atque hic finditur, & crassissima quidem ac maxima & caussissima ipsius pars, in cerebrum delinit: alia vero pars in aurem dextram, quae sane venula tenuis est. alia autem in oculum dextrum, alia in ipsum nasum. Atque sic quidem venae ab hepate habent. Tendit autem & a liene vena in sinistra sursum ac deorsum, velut ab hepate, verum tenuior & imbecilior. Cerebrum hominis duplex.

Ceterum in has venas etiam spiritus copiam inducimus, Haec enim corporis nostri respirationes sunt, aerem in ipsas trahentes, & in reliquum corpus ac venulas deriuantes, refrigerantque ac rursus dimittunt. Non enim possibile est spiritum stare, sed procedit sursum ac deorsum. Si enim alicubi constiterit ac interceptus fuerit, impotens redditur illa pars ubi constiterit. Cuius rei signum hoc est. Quum enim desidenti aut decumbenti venulae compressae fuerint, ut spiritus a vena non discurrat, statim torpor occupat. Et de venis quidem reliquis sic habet. At vero morbus ipse fit in pituitosis, in biliosis vero non. Incipit autem fieri in foetu adhuc in utero existente. Purgatur enim & florescit cerebrum, velut etiam aliae partes prius quam gignantur. In hac autem purgatione, si cerebrum in quidem probe ac moderatè purgatum fuerit, & neque plus utero purneque minus quam oportet defluerit hic foetus sanissimum gatur. Vena dux.

caput habebit. Si autem amplior colliquatio a toto cerebro Vena iecoris.

Vena lienis.

X A
L

iude

Cerebrum in

facta

Hippocratis Liber

Tinnitus facta fuerit, morbosum caput augescens fortis habebit, & **D**
aurium vn- sonitu plenum, & neque solē, neque frigus tolerabit. Si verò
de. ab vna aliqua parte colliquatio contigerit, aut ab oculo, aut

Vlcera &
pustulae
profunt
pueris.

Tremuli gi
berosique
vnde.

Diuerfi hu
ius morbi
affectus.

Cor mute-
scant.

ab aure, aut vena aliqua simul gracilis facta fuerit, ille sic afficitur qualiter sanè colliquatio cōtigerit. Si verò purgatio non contingat, sed in cerebro spissetur ac cogatur, sic necesse est fortis pituitosos esse. Et quibuscumq; quidem pueris existentibus erumpunt vlcera in caput, & in aures, ac in reliquum corpus, & qui saliuosi fiunt ac mucosi, hi ipsi progressu ætatis facilius degunt: hic enim abit ac purgatur pituita, quam in vtero purgari oportebat, & qui sic purgati fuerint comitali siue sacro morbo ferè non apprehenduntur. Qui verò mundi sunt, & neq; vlcus vllum, neque mucus, neque saliuua vlla prodit, neque in vteris purgationem fecerunt, talibus periculum imminet, vt ab hoc morbo corripiantur. Si porrò ad cor progressum fecerit defluxus, tremor apprehendit & anhelationes, & pectora corrumpuntur, aliqui verò etiam incurui fiunt. Quum enim descenderit pituita frigida ad pulmonem aut ad cor, perfrigeratur sanguis. Venæ autem violenter perfrigerata, ad pulmonem & cor assiliunt, & cor tremore concutitur, vt præ hac necessitate anhelationes incidant, & spiratio ceruice erecta. Non enim spiritum suscipere potest, donec id quod influxit à sanguine fuerit superatum, & calefactum in venas fuerit diffusum. Deinde & tremor & anhelatio sedatur, sedatur autem prout copia eius fuerit, Si enim amplius influxerit tardius: **F** sin minus, citius. Et si quidem densiores ac crebriores fuerint defluxus, crebrius comitali morbo corripitur: sin minus, rarius. Hæc itaque perpetitur homo si ad pulmonem ac cor fluxus processerit. Si verò in ventrem, profluuium alui apprehendunt. Si verò ab his viis exclusus fuerit, & in venas quas dixi defluxum fecerit, mutus fit & suffocatur, & spuma ex ore effluit, & dentes constringuntur, & manus conuelluntur, & oculi distorquentur, & nihil sapiunt, aliquibus etiam stercus infernè secedit. Atque hæc fiunt aliquando in sinistra, aliquando in dextra, aliquando vtrinque. Quomodo verò singula hæc perpetiatur ego narrabo. Mutus quidem est, quum pituita derrepente in venas delapsa, aerem excluderit, & non admiserit neque in cerebrum, neque in venas ca-
uas neque

Auas neq; in ventriculos, sed occupat respirationem. Quum enim accipit homo per os & nares spiritum, primum quidē ad cerebrū venit, deinde verò in ventriculū magna ex parte, pars etiam ad pulmonem, & pars ad venas. Ex his verò ad reliquas partes in venas dispergitur, & quantū quidem eius ad vētriculum venit, perfrigerat, & nihil aliud cōfert. Idem præstat & quod ad pulmonem venit. Qui verò ad venas peruenit aer, confert ad ventriculos ingressus & ad cerebrum. Atque sic sapientiā & motum membris exhibet. Quare vbi fuerit exclusus à venis aer præ pituita, eūque non susceperint, mutum ac desipientē hominē reddunt. At verò manus impotentes fiunt ac conuelluntur, sanguine quiescente &

Bdum non diffunditur velut solebat. Oculi quoque distorquentur aere à venis excluso, & cōmouentur. Spuma verò ex ore prodit ex pulmone. Quum enim spiritus nō ingredietur in ipsum, spumescit & ebullit velut moriens. Stercus verò subit dum violenter suffocatur. Suffocatur autē, hepate & vētre sursum ad septum trāuersum irruentibus, & stomacho ventris cōcluso. Irruunt autē, quum tantum spiritus in os nō ingreditur quātum solebat. Calcitrant autem pedibus, quum aer in membris conclusus fuerit, & foras penetrare nō poterit præ pituita, verū exiliens per sanguinem sursum ac deorsum, conuulsionem ac dolorē inducit, & propterea sanē calcitrant. Porro omnia hæc perpetitur, quum pituita frigida defluerit in sanguinē calidum existentem.

CPerfrigerat enim & sistit sanguinē. Et si quidem fluxus multus fuerit ac crassus, statim occidit. Dominatur enim sanguini per frigus, ipsūque cōgelat. Si verò paucior fuerit, in præsens quidem dominatur obturās respirationē. Deinde temporis progressu quum dispersus fuerit per venas & amixtus sanguini, multo existenti ac calido, si sic superatus fuerit, venæ aerem suscipiunt, atq; ita ægri resipiscunt. Et quicumque quidem pueri parui hoc morbo corripiuntur, ut plurimum moriuntur, si multus fluxus contingat, isque humida existat. Venæ enim tenues existentes pituitam præ crassitudine ac multitudine suscipere non possunt, sed perfrigeratur ac congelatur sanguis, & sic moriuntur. Si verò modica existens pituita in vtrāque venas defluxum fecerit, aut in alterius partis, superuiuant, nota ex morbo impressa

Cur oculi distorquentur.

Cur os spumescat.

Cur oleet.

Cur præfoetetur.

Cur calcitrent.

Cur infantes hic moribus necant.

relicta. aut enim os conuellitur, aut oculus, aut ceruix, aut manus, ubique sanè vena pituita repleta superata fuerit & gracilis reddita. Hanc itaque venam necesse est debiliorem esse, & hanc corporis partem læsam defectuosiorem. Verum ad longius tempus plerumque prodest. Nō enim amplius morbo apprehenditur, si semel notā impressam susceperit. Quapropter necessario etiam reliquæ venæ affliguntur, ac partim simul gracilescunt, ut aerem quidem suscipiant, pituitæ autem defluxus non amplius similiter illabatur. Debiliora tamen similiter membra esse verisimile est venis afflictis. Quibuscunque autē imperfectis & valde modica pituita defluerit, & ea in dexterarum partes, hi citra notæ impressionem superuiuant, verum periculum est ne morbus cōnutriatur, E ac simul augeatur, si non his quæ commoda sunt curentur. Pueris quidem igitur sic fit hic morbus, aut quā proxime huic modo. Seniores verò non occidit si accedat, neque distorquet. Nam & venæ sunt caux, & sanguine calido repletæ, quapropter neque superare potest pituita, neque perfrigerare sanguinem ut cōgelet ipsum, sed ipsa superatur, ac sanguini cito ammiscetur. atque sic venæ aerem suscipiunt, & sapientia cōtingit, signaque prædicta minus inuadunt propter fortitudinē. At verò antiquissimis si hic morbus accedat, propterea ipsos occidit, aut leuiter sideratos facit, quia venæ ipsis sunt euacuatae, & sanguis modicus est ac tenuis & aquosus. Si igitur multum defluerit, & hyemis tempus fuerit, occidit. Suffocat enim respirationes, & sanguinem congelat, si in vtranque partem defluxus fiat. Si verò in alteram tantum, leuiter sideratum facit. Non enim potest sanguis pituitam superare, quum tenuis sit frigidusque ac modicus, sed ipse superatus congelatur, ut impotentes fiant illæ partes iuxta quas sanguis fuerit corruptus. Ad dexterarum autem magis defluit quā ad sinistras, quia venæ sunt cauiiores & plures quā in sinistris. Ab hepate enim tendunt & liene. Defluit autem & eliquatur pueris maximè, quibus sanè caput fuerit percalefactum, siue à sole, siue ab igne, siue etiā derepente inhorruerit cerebrum, etiam tunc pituita secernetur. Eliquatur etenim per calorem ac cerebri diffusionem, segregatur autem à frigore ac concretionem, & sic defluit. Et quibusdam quidem defluxionis causa hæc est.

Aliis

Cur ad-
tos non tol-
lit.

Cur senes
perimit vel
siderat.

Cur dex-
trā partem
potius ve-
det hic mor-
bus.

A Aliis verò etiā vbi derepente post aquilonares ventos aufer-
 flare cœperit, compactum ac debile cerebrum derepente sol-
 uit ac laxat, vt pituita redundet, & sic defluxum facit. Defluit
 insuper & ex ignoto timore, si quidem timuerint aut aliquo
 vociferante, aut inter plorandum spiritum cito reuocare non
 potuerint, id quod pueris frequenter contingere solet. Quic-
 quid sane horum ipsorum acciderit, statim horret corpus, &
 ager mutus factus spiritum non trahit, sed spiritus quiescit,
 & cerebrum compingitur, & sanguis consistit, & sic secer-
 nitur ac defluit pituita. Et pueris quidem hæ ipsæ causæ sunt,
 vt ab initio à sacro morbo corripiantur. At verò senibus
 hyems infestissima est. Quum enim ad multum ignem se-
 nex caput & cerebrum percalfecerit, deinde in frigore ver-
 satus fuerit ac inhorruerit, & ex frigore ad teporem accesserit,
 & ad ignem defecerit, idem hoc patitur, ac sic à morbo
 sacro apprehenditur iuxta prædictum modum. Periculū ve-
 rò multum est vt & Vere patiantur idem hoc, si caput fuerit
 insolatum. Minimè autem æstate, non enim fiunt repentinæ
 mutationes. Postquam verò viginti anni præterierint, non
 amplius hic morbus corripit, præterquam paucos aut nul-
 lum, nisi ex puero connutritus fuerit. Venæ enim plenæ
 sunt, & cerebrum compactum est, & acerbum ac rigidum,
 quare non defluit in venas: si verò defluerit, sanguinem non
 superat multum ac calidum existētem. In quo vero à pue-
 ro augmentum cepit ac connutritus est, in eo per consuetu-
 dinem facit vt in mutationibus vëtorum patiatur, & vt plu-
 rimū morbo sacro corripitur, præcipuè australi ac hu-
 mida aeris constitutione. Et liberatio difficulter contingit.
 Cerebrum enim humidius quàm ex natura fit, & præ pi-
 tuita inundat, vt defluxiones quidem frequentiores fiant. nō
 autem amplius possibile fit pituitam excerni, neque cere-
 brum resiccare, sed perrigatur & humidum existit. Cogno-
 uerit autem hoc ipsum quis maximè ex ouibus hoc morbo
 correptis, & præsertim capris. Hæ enim frequentissime cor-
 ripiuntur. Si enim caput ipsarum dissecueris, reperiēs cere-
 brum humidum esse, & sudore refertum, ac male olens. Et
 in hoc nimirum cognosces quòd non Deus corpus affligit,
 sed morbus. Sic verò se res habet etiam in homine. Quum
 enim ætatem adeptus fuerit morbus, non amplius curabilis
 est,

Cur ver pe
 riculosum
 sit.

Oues & ca
 præ comi-
 tiales.

Comitialis

Hippocratis Liber

inueteratus non sanatur. est, cerebrum enim eroditur à pituita ac colliquatur. Id vero quod colliquatur, aqua fit, & foris cerebrum ambit ac circumalluit, & propterea frequentius ac facilius à morbo hoc corripuntur. Propterea vero diuturnus est morbus, quia id quod influit venis tenue est præ multitudine, & statim superatur à sanguine ac calefcit.

Quid casuri agant.

Quicumque verò iam assueti sunt morbo, præcognoscunt se corripiendos, & ex hominum frequentia fugiunt, si domus ipsorum in propinquo fuerit, ad domum: si minus, in locum desolatissimum, ubi quàm paucissimi ipsos lapsos sint visuri, statimque se obuelant, idque faciunt præ pudore affectionis, non præ timore, velut multi putant, demonij. At verò pueri primum quidem cadunt vbicunque tandè contigerit præ inassuetudine, Quum autem sæpius à morbo corripiantur, postquam præsenferint cõfugiunt ad matres, aut ad aliũ maximè notum, præ timore ac formidine affectionis. verecundari enim pueri nondum sciunt.

Quid ventorum mutatio possit.

Cæterum in mutationibus ventorũ propterea morbo sacro corripì cenſeo, maximè quidẽ austrinis, postea verò etiam aquilonaribus, deinde etiã reliquis ventis, hi autem sunt qui fortissimi ex ipsis existunt, & inter se tum statione, tum viribus contrariissimi. Etenim aquilo compingit aerem, & turbatũ ac nubilosum excernit, & illustriorem ac pellucidum facit. Eodem modo etiã alij omnes venti ex mari ac aliis aquis proficiscentes. Ex omnibus enim rebus, atque adeò ex ipsis hominibus humiditatẽ ac tenebrositatẽ

Aquilo qualis, & auster.

excernunt. Quapropter saluberrimus omniũ ventorũ aquilo existit. Auster autem contraria huic operatur. primum enim incipit aerem compactum liquare ac diffundere, quapropter etiã non statim magnus spirat, sed primum lentus ac lenis est, quoniam aerem statim superare non potest, qui prius densus est & compactus, sed temporis progressu ipsum dissoluit. Idem porrò hoc etiã in terram operatur & in mare, fluuiosque ac fontes & puteos, & quæ ex terra nascuntur, & in quibus humor inest. Est autem in omni, in alio plus, in alio minus. Omnia autem hæc ventum hunc sentiunt, & ex splendidis tenebrosa fiunt, & ex frigidis calida, & ex siccis humida. Et quæcunq; in domibus vasa iuxta terrã sunt cum vino aut alio quopiã liquore, ea omnia austrum sentiunt, & formam in aliã speciem transmutant. Solem verò & lunam ac syd

A ac sydera multò hebetiora quàm ex natura sunt reddit.

Quum igitur etiam his quæ adeò magna sunt ac fortia in-
 tantum dominetur, & corpus sentire faciat, vt ex horum ven-
 torum alterationibus trāsmutetur, necesse est ab austris qui-
 dem solui, ac humectari cerebrū, & venas laxiores reddi, ab
 aquilonis verò flatibus, quòd sanissimū est in cerebro com-
 pingi, quod verò morbolissimum ac humidissimū est excer-
 ni, & forinsecus circumalluere, atque sic defluxus in horum
 ventorum mutationibus succedere. Hoc modo hic morbus
 fit & floret, tum ab accedentibus, tum à decedentibus, & nul-
 latenus difficilior aut cognitu aut curatu est quàm alij, neq;
 etiam diuinior aliis. Porro expedit homines nosse, quòd ex
 B nulla alia nobis parte voluptates contingunt, & lætitiæ; &
 risus & lusus, quàm ex cerebro. Itémque mœrores & anxie-
 tates tristitiæque ac emulatus & querelæ. Et hoc sapimus ma-
 ximè ac intelligimus, & videmus & audimus, & cognosci-
 mus turpia & honesta, mala & bona, iucunda & iniucunda,
 partim consuetudine discernētes, partim vtilitate percipien-
 tes. Eodem voluptates & iniucunditates pro opportunitate
 dinoscimus, & non eadem nobis placent. Eodem & insani-
 mus & deliramus, & terrores & timores nobis accedunt, par-
 tim noctu, partim interdiu, & insomnia, & errores intem-
 pestiui, & curæ inanes, & vt non noscamus adstantes, & de-
 suetudo, & inesperienza. Atque hæc omnia perpetimur à
 cerebro, quum sanum non fuerit, sed aut calidius quàm ex
 natura fiat, aut frigidius, aut humidius, aut siccus, aut aliud
 C quid perpetiatur præ naturam & consuetudinem. Et in-
 sanimus quidem præ humiditate. Quū enim humidius fue-
 rit quàm pro natura, necesse est moueri. vbi verò mouetur af-
 fectio, necesse est neque visum quiescere, neque auditum, sed
 alias aliud videre & audire, & linguam talia dicere qualia
 semper ac singulis vicibus viderit ac audierit. Quanto verò
 tempore cerebrum quieuerit, tātò etiam homo sapit. Fit au-
 tem corruptio cerebri à pituita & bile. Vtriusq; cognitio sic
 contingit. Qui enim à pituita insaniunt, quieti sunt, & non
 vociferantur neque tumultuantur. Qui verò à bile, vocifera-
 tores sunt & maledici, & non quieti, semper aliquid intempe-
 stium faciētes. Si quidem igitur assiduè insaniunt, hæc ipsis
 sunt causæ. Si verò terrores ac timores accedant, à cerebri
 transmu-

Mutatio
ventorum
quid pos-
sit.

Cerebrum
caussa o-
mnium.

Cerebrum
quando fu-
riat.

Pituitosi bi-
liosq; furo-
res quales.

Pauoris
caussa.

transmu

Hippocratis Liber

transmutatione id contingit, transmutatur autē dum cale-
cit, calefcit autē praeibile, vbi ad cerebrum impetum fecerit
ex corpore per venas haematitidas hoc est sanguinarias ap-
pellatas, & timor adest donec rursus redierit in venas ac cor-
pus, deinde quiescit. Angitur autem homo & inquietudine
multa iactatur intempestiue, dum cerebrum perfrigeratur,
& praeter consuetudinem compingitur. Hoc verò à pituita
perpetitur, ab hac autem affectione etiam obliuiosus euadit.
Noctu verò clamat & vociferatur, quum derepente cere-
brum percalefiat. hoc autem perpetiuntur biliosi: pituitosi
enim non percalefiunt: quum sanguis multus ad cerebrum per-
uenerit & efferbuerit, venit autē per venas praedictas: Quum
contigerit vt homo videat insomnium horrendum, & in ti-
more fuerit, velut etiā si vigilet, tūc magis facies ignescit, &
oculi rubescunt, quum timuerit, & mens meditatur aliquid
mali operari, sic etiā in somno patitur. Vbi verò experges-
ctus fuerit, & resipuerit, atque sanguis rursus in venas praedi-
ctas dispersus fuerit, quiescit. Et propterea iudico cerebrum
vim plurimam in homine habere. Hoc enim est nobis eo-
rum quae ab aere fiunt interpretes, si sanum fuerit. Sapiētiā
autem ipsi exhibet aer. Oculi verò & aures & lingua, &
manus & pedes, qualia cerebrum statuit ac cognoscit talia
subministrant. Sapiētia enim toti corpori contingit, prout
aere participat. Ad intelligentiā verò internuncius est ce-
rebrum. Quum enim homo spiritum in seipsum attraxerit,
primum quidē ad cerebrum peruenit, & sic ad reliquum cor-
pus aer dispergitur, relinquens in cerebro suum ipsius vigo-
rem, & quicquid prudēs ac sapiētia praeditū fuerit. Si enim
in corpus primum perueniret, & posterius in cerebrum, re-
lictā in carnibus ac venis dinotione ac iudicio, ad cerebrum
calidus iam existens perueniret, & non sincerus ac purus, sed
ammixto humore à carnibus & sanguine, vt non ampliū
exactē sincerus esset. Quapropter dico cerebrum intelligen-
tiae ac prudentiae internuncium ac interpretem esse. Cae-
terum praecordia nā fortuitum nomen apud Gracos per
consuetudinem habent, quum phrenes à sapiētia dicta vi-
deantur, reuera autem non, neque ex natura. Neque ego sa-
nē noui quam vim habeant praecordia, vt sapiant & intelli-
gant, praeterquam si homo ex improviso nimio gaudio per-
fundatur,

Obliui-
vnde & vo-
ciferatio
nocturna.

Spūs aere
sapiētia au-
thor.

Cerebrum
prudētiā
praebet prae-
cordia nō.

A fundatur, aut tristitia afficiatur, tunc sanè exiliunt & anxietatem exhibent prærenuitare & quòd distenta sunt maximè in corpore, & ventriculum non habent ad quem suscipiant aut bonum, aut malum allabens, sed ab vtrisque his turbantur, propter naturæ debilitatem. Nam nullo sane priùs sentiunt ex his quæ in corpore insunt, sed frustra hoc nomen & causam habent, Quemadmodum quæ ad cor sitæ sunt aures Cor cur nò
sedes sapiē-
tiæ. appellantur, quum nihil conferant ad auditum. Porro dicunt quidam quòd corde sapiunt, & quòd hoc est quod angitur, & quod curam gerit, Verum hoc non ita se habet, sed cōuellitur quidem velut præcordia, & magis etiam propter easdem causas. Ex omni enim corpore venæ ad ipsum tendunt, & conclusiones habet vt sentiat, si quis dolor, aut collectio homini contingat. Necesse est enim & dum angitur, inhorre corpus ac distēdi, & si quis nimio gaudio perfundatur idem pati. Quapropter cor quidē & præcordia maximè Cordis
præcordio-
rumq; pro-
prietas. sentiunt, sapientia tamen minimè participant, sed omnium horum cerebrū causa est, quemadmodum igitur etiam prudentiam ac aerem omnium primū ex his quæ in corpore insunt percipit cerebrū, Sic etiam si qua mutatio fortior in aere contingat, præ temporibus anni, etiam ipsum à seipso diuersum redditur in aere. Etenim cerebrum propterea primū sentit, quia etiam morbi in ipsum irruūt acutissimi, & maximi, ac præcipuè lethales, & qui difficilem iudicationem habent apud inexpertos. Hic verò morbus sacer appellatus, Morbus sa-
cer vnde. ex iisdem causis oritur, à quibus etiam reliqui, ab accedētib; nimirum ac decedentibus, velut frigore, Sole, ventis, quæ & transmutantur, & nunquàm quiescunt. Hæc autem sunt diuina. Quare nequaquam hunc morbum ab aliis discriminare oportet, neque reliquis morbis diuiniorē putare, sed omnes diuinos omnesque humanos. Naturam autem vnusquisq; habet & vim in seipso, & nullus nec auxilij nec remedij expers est, & pleriq; his ipsis curantur, à quibus etiam nascuntur. Alterum enim alterius nutrimentū est, alterius verò perniciēs ac afflictio. Hoc itaque Medicū nosse oportet, & Medicum
quæ scire
oporteat. temporis occasionē in singulis pernoscere, quòd alterū quidem per alimētum absoluet & augebit, alterum verò detrahet & minuet. Oportet autem tum in hoc morbo, tum in reliquis omnibus, nō augere morbos, sed festinare vt ipsos exteramus,

Hippocratis Liber I.

teramus, id quod aduersissimum est morbo exhibendo, non D
quòd amicum & familiare. A familiari enim & consueto flo
ret ac augefcit, ab aduerso verò & hostili perit & dissipatur.
Quisquis autem talem mutationem in hominibus nouit, &
humidum ac siccum facere potest hominem, calidum item
ac frigidum per diætam, hic utique & hunc morbum sana
uerit, si occasionem eorum quæ conferunt pernosceret, citra
expiamenta ac incantationes, citràque omnem aliam huius
cemodi machinamentorum absurditatem.

Comm. vid. vulgar. 29 dicit
H I P P O C R A T I S
COI DE MORBIS LIBER ^E
PRIMVS, IANO COR-
NARIO MEDICO
PHYSICO IN-
TERPRETE.

*Quæ medi
cus presta
re debeat.*



filio Hippocratis
VI DE sanatione rectè inquirere
velit, percunctantique respondere,
& contradicere rectè, eum hæc ani
maduertere oportet. Primum quidè
à quibus omnes morbi hominibus
fiunt. Deinde verò qui morbi neces- **F**
sario ubi facti fuerint, aut lōgi sunt
aut breues, aut lethales aut non le-
thales, aut aliquā corporis partem
mutilent, aut non mutilent, & qui postquàm orti sunt dubij
sint, an mala ab ipsis euentura sunt, aut bona. Et à quibus
morbis ad quales transitus fiat. Et quæ per fortuitum succes
sum medici ægrotos curantes faciunt. Et quæ bona aut mala
ægrotantes in morbis perpetiuntur. Et quæ importunè aut
dicuntur, aut fiunt à medico ad ægrotum, aut ab ægroto ad
medicum. Et quæ exactè fiunt ac dicuntur in arte. Et quæ
recta in ipsa, & quæ non recta. Et quod ipsius principium, aut
finis, aut medium, aut aliud quid eiusmodi demonstratum,
quòd rectè habet vt in ipsa sit, aut non sit. Et quæ parua &
magna,

A magna, & multa & pauca. Et quod omne in ipsa vnum est, & omnia quod vnum. Et quæ fieri possunt intelligereque ac dicere, & si opus sit, neque intelligere, neque dicere, neque facere. Et quod facilitas in ipsa sit, & quod difficultas, & quod oportunitas, & quod intempestiuitas, & quibus aliis artibus similis sit, & quibus nihil similis sit. Et de corpore, quod calidum sit aut frigidum, aut siccum aut humidum. Et quod forte aut debile, aut densum aut rarum. Et quæ multa, pauca fiunt, aut in peius, aut in melius. Et quod honestè aut turpiter, aut tarde aut citò, aut rectè aut nò rectè. Et quod malum supra malum fieri necesse est. Hæc animo versantem obseruare oportet in sermonibus, quantum quis ab his delinquat, aut in dicendo aut percunctando, aut respondendo. Et an quæ multa sunt, pauca dicat, & an quæ impossibilia sunt, possibilia esse asserat. Et quicquid sanè etiā aliud dixerit ac aberrarit, hac ratione obseruare oportet, & in contradictione aggredi & impetere. Morbi quidem igitur vniuersi fiunt ex his quidem quæ in corpore insunt, tum à bile, tum à pituita. Ab externis verò, à laboribus & vulneribus. Sed & à calido & supercalefaciente, & à frigido ac superfrigefaciente, & sicco ac superexiccante, & ab humido ac superhumectante. Et bilis quidem ac pituita vnà cum nascentibus gignuntur, & sunt in corpore aut plus aut minus. Morbos autem exhibent, partim à cibis & potibus, partim à calido supercalefaciente, & à frigido superfrigefaciente. Necessitatem autem talia habent, vt fiat hæc quum ipsa fiunt, velut verbi causa. In vulneribus eos, qui crassos nervos sauciatos habent, necesse est claudos fieri. Itémque si musculorum capita saucia sint, præsertim eorum qui sunt in femoribus. Moritur autem si quis cerebro sauciatus fuerit, aut spinali medulla, aut hepate, aut præcordiis siue lepto transuerso, aut velica, aut vena sanguiflua, aut corde. Non moritur autè vulneratus in his partibus, in quibus hæc membra non insunt, sed ab his longissimè absunt. Ex morbis verò tales necessitatem habent, vt ab ipsis perimantur quum fiant, Tabes, Aqua inter cutem ac subter carnem nascens, & si mulierem foetum in vtero habentem peripneumonia, id est, pulmonis inflammatio corripiat, aut febris ardens, aut pleuritis siue lateris inflammatio, aut phrenitis, id est, membranarum cerebri inflammatio, aut Erysipelas

Omne vnu est.

Quæ morbos creant.

Bilis & pituita congenita.

Morbi quæ mortiferi.

Hippocratis Liber I.

Quæ non
semper pe-
rimant.

pelas ignis sacer appellatus, in vtero fiat. Dubij autem mor- D
bi, vt & perdant, & non, tales sunt, peripneumonia, febris ar-

Quæ mu-
tilent.

dens, phrenitis, pleuritis, angina, vua, hepatitis, splenitis, ne-
phrytis, dysenteria, in muliere fluxus sanguinolentus. Tales
verò non lethales sunt, nisi quid ipsis accedat, affectiones flui-
dæ circa articulos, atra bilis, podagra, coxendicum morbus,
tinesmus qui est voluntas egerendi ineuitabilis, quartana,
tertiana, strangulatus vrinæ, lippitudo, lepra, impetigo, mor-
bus articularis. Multi autem frequenter ab his muti fiunt,

Longi mor-
bi.

sideranturq; manibus ac pedibus, & linguæ impotentes red-
duntur. Et ab atra bile quidam leuiter siderantur. Claudii
verò à coxendicum morbo fiunt. Oculi autem & auditus

Qui celeri-
ter decer-
nant.

Qui in alia
transeant.

mutilantur à pituita obfirmata. Longos autem necesse est E
esse, tabem, dysenteriam, podagram, affectiones fluidas circa
articulos, pituitam albam, coxendicum morbum, vrinæ stran-
gulatum, in senioribus verò Nephrytim, Mulieribus verò
fluxum sanguinolentum, hæmorrhoidas ani, fistulas. At ve-
rò febris ardens, phrenitis, peripneumonia, angina, vua, pleu-
ritis, citò decernunt. Transitu autem fit in his, ex pleuritide
in febrem ardentem, ex phrenitide in peripneumoniam. Ve-
rùm ex peripneumonia febris ardens non fit, ad dysente-
riam tinesmus accedit, & à dysenteria, lienteria siue leuitas
intestinatorum, sequitur: ex lienteria in aquam inter cutem
transitus fit, & ex pituita alba in aquam inter cutem, & ex
peripneumonia ac pleuritide, in pectoris suppurationem.

Quæ neces-
sario se-
quuntur.

Mala porrò supra mala fieri necesse est, velut si rigor cor- F
ripuerit, ardor igneus superuenit. Et si neruus dissectus fue-
rit, conuulsionem facit, & vt dissectus neque coalescat, & for-
titer inflammetur. Et si cerebrum concussum fuerit ac do-
luerit eius qui percussus sit, necesse est cuestigio mutum fie-
ri, & neque videre, neque audire. Si verò sauciatus fuerit, fe-
brem necesse est superuenire, & bilis vomitum, & aliquam
corporis partem sideratam fieri ac perire. Si verò omentum
exciderit, necesse est putrefieri. Et si sanguis ex vulnere, aut
vena effluerit, in supernum ventriculum, necesse est ipsum
in pus conuertere. Temporum autem occasiones, vt in summa
dicam, multæ sunt & variæ in arte, quemadmodum etiam
morbi & affectiones, & horum curationes. Maximè verò re-
pentinæ sunt, in his quibus animo defectis opitulari opor-
tet, &

Omentum
quando pu-
trefcit.

Tempora,
occasionef-
ve.

et, &

A tet, & qui neque urinam neque stercore egerere possunt, & qui suffocantur, & si mulierem parientem aut sauciatam liberare oportet, & quaecunque eiusmodi. Et hæc quidem occasiones repentinæ sunt, & paulò posterius non sufficiunt. Plerique enim paulò posterius pereunt. Occasio verò est, si horum aliquid perpetiatur homo, & qui antequam animam efflet opituletur, hoc totum ex occasione opituletur. Est quidem igitur ferme hæc occasio etiam in omnibus aliis morbis. Semper enim in quocunque sanè quis opituletur tempore, ex occasione opituletur. Quicunque verò morbi, aut vulnera non ad mortem tendunt, sed temporarij sunt ac periculosi, doloresque in ipsis fiunt, verum possibile est ut cessent, si quis rectè medeatur. His sanè non prostant auxilia à medico adhibita, quum adhibeantur. Nam & non præsentem medico utique cessassent. Alij verò morbi sunt, quibus occasio est ut curentur matutina diei hora, nihil autem refert an valde mane, aut paulò posterius. Alij morbi sunt quibus occasio est, ut semel in die curentur, nec refert quo tempore id fiat. Alij per tertium aut quartum diem curantur, & alij semel per mensem, & alij per tertium mensem, nec refert an id ipsum tertij augmento vel fine fiat. Tales itaque occasiones sunt, in quibus non aliam quàm hanc certitudinem habent. Intempestivitas autem hæc est, si quæ mane curari oportebat in meridie curentur. Propterea verò intempestivè curantur, quia inclinationem ad peius habent, propter curationem non in tempore factam. Quaecunque etiam citius siue in meridie, siue vespere, siue noctu curentur, intempestivè curantur. & si vere curari oporteat, curentur autem hyeme, aut si hyeme oporteat, curentur autem æstate: aut si quod iam curari oportet, id ipsum differatur, aut quod differre oportet, id ipsum iam curetur. Talia omnia intempestivè curantur. Rectè porro & non rectè in ipsa hæc fiunt. Non rectè quidem fit, si morbum alium existentem, alium esse pronuncies: & magnum existentem, parvum dicas, & vicissim parvum, magnum. & si superiurum, non superiurum pronuncies, & perituum non perituum. Et si suppuratum existentem non cognoscas, nec morbum magnum in corpore nutrire cognoscas. & si medicamento aut potione quis opus habeat, quo ipsi opus sit, non cognoscas. & si quæ sanari possunt, non san-

Curatio
opportuna.

Quæ ritè
fiant.

Quæ non ritè. nes, & quæ sanatu impossibilia sunt, te sanaturum recipias. D
Atque hæc quidem circa sententiam non rectè fiunt. Circa
non chirurgiam verò hæc. Pus in vlcere aut tuberculo existens
ritè. non cognoscere; & fracturas ac luxationes non cognoscere,
& specillo admoto ad caput non cognoscere an os fractum
sit; & fistulam in vesicam immissam demittere non posse, &
lapidem in vesica existentem nō cognoscere; & suppuratum
existentem ex concussione non dinoscere, & secando aut vrē
do, aut à profunditate, aut à longitudine aberrare, aut vrere
& secare quæ non oportet. Et hæc quidē non rectè. Rectè au-
tem fiunt hæc. Morbos cognoscere qui sunt, & à quibus, &
qui ipsorum longi, & breues, & lethales & non lethales, &
qui transmutantur, & qui augescunt, & qui minuuntur, &
qui magni, quique parui. & dum curas possibiles quidē cu-
rare, impossibiles verò scire cur curatu sunt impossibiles. &
dum curas eos qui tales habent, per curationem quantum

Quid ritè
fiat.

Perperam
medicadū
non est.

Quæ suo tē
pore ve-
niunt bona
sunt.

Erysipelas

possibile est opitulari. Quæ verò offeruntur agrotis, ea sic
obseruare oportet, rectène an secus fiant, veluti si quis quæ
ficcare oportet, humectet, aut si erassescere oporteat, non
exhibeat à quibus erassitudo inducitur. aut si quæ attenuare
oportet, non attenuet, quæ frigefacere, non frigefaciat, quæ
calfacere, non calfaciat, quæ putrefacere, non putrefaciat,
& reliqua iuxta eandem rationem. Talia autem sua
sponte accasu hominibus in morbis fiunt, tum bona, tum
mala. Febrienti ac bilioso, in tempore foras dispersa bi-
lis, bonum; diffusa verò ac dispersa sub cutē, toleratu leuior
est habēti, & curatu faciliior sananti. diffusa autem ac disper-
sa & ad vnam aliquam corporis partem allapsa, malum.

Aluus turbata in pleuritico aut peripneumonico, aut sup-
purato, malum. Febrienti aut vulnerato aluus resiccata,
malum. Subaquoso ac lienoso ab alba pituita detento, al-
uus fortiter turbata, bonum. Erysipelas si extra diffusum
intrò vertatur, malum. Si verò intra diffusum foras ver-
tatur, bonum. A profluuiio alui forti correpto, vomitus su-
perueniens, bonum. Mulieri sanguinem vomenti menses
erumpere, bonum. A fluxione verò infestata, ad nares aut
os fluxionem transire, bonum. Mulieri a conuulsione pres-
sa ex partu, febrem superuenire, bonum. Et tetano ac con-
uulsione occupante, igneum ardorem superuenire, bonum.

Talia

- A** Talia enim per nullam medicorū ignorantiam, aut scientiam, fiunt, & non fiunt, sed sua sponte ac fortuito casu fiunt, & profunt, & nocent, iuxta eandem rationem. Cate- Quæ bona malæ medicus faciat.
rū Medici talia per fortuitum successum bona, in curatione faciunt. Nimirum si medicamento sursum purgante dato, & sursum & deorsum probè purgāt. Et si mulieri medicamento dato, quod bilem aut pituitam deorsum purgat, menses aliās nō fluentes erumpant. Et si lienem suppuratum habenti medicamentum dederint, quod bilem ac pituitam deorsum purget, & sic pus deorsum à liene expurgēt, & à morbo liberent. Et si medicamēto exhibito calculoso, calculum in vrinarium meatum præ pharmaci violentia protrudant,
- B** ut per vrinam eiiciatur. Et si medicamētum dederint quod pituitam sursum purgat, ei qui pus in superiore ventriculo in tuberculo habet, non scientes quod habet, isque pus vomat ac sanus fiat. Et si eum qui ex medicamēto sursum purgante superpurgatur, sua spōte aluo subter erumpente, à vomitu sanum faciant. At verò Mala operantur Medici præ Quæ non bene medico succedant.
infortunio hæc. Si pharmaco bilis aut pituita sursum ducti-
uo dato, venam in pectore præ vomitu rumpāt, ei qui prius
nullum manifestum dolorem in pectore habuit, atque sic
fiat morbus. Et si mulieri in vtero habenti medicamentum
supernè purgans exhibeant, aluus autem infernè erumpēs
foetum expellat. Et qui suppuratum curat, si aluus profusa
fiat, ipsum perdit, & qui oculos curat ac subleuit, si dolores
C incidant acutiores, & si ita cōtingat, rumpantur oculi & destruantur, accusant medicū quod oculos subleuit. Et si puerperæ in ventris dolore medicus aliquid det, & malè habeat aut pereat, medicus in culpa est. Fermè autem quæcunque Quibus nō iure medici-
cus argua-
tur.
necessitatem habent ut fiant in morbis ac vulneribus mala
supra mala, ea ubi fiunt, in medicū culpā reiciunt, & neces-
sitatem talia fieri cogentem non agnoscunt. Et si ad febricitantem aut vulnus habentem ingressus, ad motis quàm pri-
mū remediis nō opituletur, sed postera die xger peius ha-
beat, medicum accusant, Si verò opituletur, non aequaliter
laudant. Oportere enim ipsum perpeti putant, vlceraq; in-
flammati, & in morbis quibusdā dolores fieri oportere, neq;
tales esse ut ne fiant. Nervus præcisus ac dissectus non co- Quæ non coeant præ-
cisa.
lescit, neque vesica, neque aliquod ex tenuibus intestinis,

Hippocratis Liber I.

Principiū
artis cur
nullū est.

neque vena sanguiflua, neque tenuis genæ pars, neque pu- D
dendi pellicula. Porro principium sanationis demonstra-
tum quidem non est, quod sane recte principium sit vniuer-
sæ artis, neque secundum aliquod, neque medium, neque fi-
nis. Sed incipimus ab ea aliquando dicentes, aliquando ope-
rantes, & desinimus eodem modo. Et neque dicentes ex
iisdem sermonibus incipimus, neque si de iisdem dicamus,
neque in iisdem desinimus & operantes iuxta eandem ra-
tionem, neque ex iisdem operibus incipimus, neque in iis-
dem desinimus. At verò facilitas ac promptitudo in his est.
Quum quis secans aut vrens, neque nervum secet, neque ve-
nam. Et si suppuratum vrat, pus consequatur. Et si secet,
eodem modo. Et fracturas recte componere. Et si qua pars E
corporis ex natura excidat, ut ipsam recte ad naturam re-
trudat. Item apprehendere fortiter ea quæ oportet, & ap-
prehendendo premere. Et apprehendere leniter ea quæ
oportet, & apprehendendo non premere. Et in obligando
tortuosa non facere ex rectis, neque premere quæ non opor-
tet. Et in contactu ubicunq; tandem contigerit, dolorem ex
superfluo nō exhibere. Hæc quidē igitur facilitatis ac prom-
ptitudinis existunt. At verò digitis decenter attingere, aut
probe, aut non probe, aut longis, aut brevibus, aut probe de-
ligare omnes deligaturas, non ad artem pertinere iudicatur
de facilitate ac promptitudine, sed seorsim. Quicunque sup-
purati sunt pulmone, aut superiore vel inferiore ventre, aut
tubercula habent, siue in superiore ventris siue inferiore, aut F
in pulmone, aut vlcera intrinsecus, aut sanguinem vomūt
aut spuunt, aut dolorem aliquem habent, vel in pectore vel
in dorso: Hæc omnia habent ex his quidem quæ in corpo-
re insunt, à bile & pituita: ab externis verò ab aere insito
calori ammixto. Sed & à laboribus ac vulneribus. Et qui-
cunque quidem pulmone suppurati sunt, ab his fiunt. Si
peripneumonia correptus in iudicatoriis diebus non purge-
tur, sed relinquatur in pulmone sputum ac pituita, suppurat-
us fit. Et si quidem statim curatus fuerit, ut plurimum effu-
git, si verò neglecta fuerint illa in pulmone corrumpitur, il-
lis & inhaerentibus & putrescentibus, ulceraturq; pulmo &
suppuratus fit, & nō ampliùs intro ad seipsum nutrimentum
memoralile trahit, neque quicquam depurgatur ab eo sur-
sum,

purulenti
pulmonis
signa.

A sum, sed suffocatur, & semper amplius difficulter spirat, & respirando stertit, & respirat illinc sursum ex pectore, tandem verò obturatur à sputo, & moritur. Fit autem & suppuratus, si pituita ex capite ad pulmonem destillet, & primum quidem ut plurimum latenter desuit, tussinique tenuem exhibet, & sputum paulo amarius solito, & aliquando tenuis adest calor. Temporis autem progressu, exasperatur pulmo, & intus exulceratur à pituita inherente ac putrescente: & grauitatem exhibet pectori & dolorem acutum ante & retro, calorésque acutiores in corpus incidunt, & pulmo à calore trahit ad se pituitam ex toto corpore: & maxime ex capite, Caput verò calefactum ex corpore, & hanc putrescentem subcrassam sput. Quanto verò magis tempus progreditur, tantò magis pus sincerum sput, & febres acutiores fiunt, & tussis frequens ac fortis, & inedia vexat, & tandem alius infèrè turbatur. Turbatur autem à pituita, pituita verò de capite descendit. Hic quum ad hoc peruenerit, perit quemadmodum dictum est in superioribus, purulento ac putrido pulmone facto, aut ventre infèrè erumpente. Fit praterea & ab his pulmo suppuratus. Quum venula videlicet aliqua in ipso fuerit rupta, rumpitur autem à laboribus: & vbi rupta fuerit, sanguinem fundit, si quidem crassior fuerit, amplius, sin tenuior, minus, & sanguinè quidem ipsum partim confestim sput, partim verò nisi vena adstringatur, in pulmonem funditur, & in ipso putrescit, & vbi putrefactus fuerit pus facit. progressu verò temporis aliquando pus sincerum, aliquando pus subcruentum, aliquando sanguinem, & si magis repleta fuerit vena, ipsam sanguinis copiam aceruatim à seipsa reuomit, sputurque pus crassum ab accessoria & intus putrescente pituita. Hic si anticipetur incipiente morbo, priusquam vena sanguinem fundat ac fortiter laxetur, & priusquam attenuetur, & in lecto decumbat, & caput corrumpi incipiat, & reliquum corpus collinqui, superstes ab hoc morbo euadit. Si verò neglectus fuerit, & hæc occuparint, ut ea perpetiatur aut omnia, aut plurima, perit. perit autem hic aut ex iisdem quæ superius dixi, aut à vomitu, sanguine multò multoties per vomitum reiecto. Si verò vena omnino quidem rupta non fuerit, verum Varix inter acutus tractus in ipsa fiat, fit autem maxime velut varix rior.

Venæ fractæ signa.

Varix inter-

3 qui

Hippocratis Liber I.

qui etiā statim vbi factus fuerit, dolorē quendā tenuem in-
ducit, ac tussim aridā. Si verò diu durauerit & neglectus fue-
rit, primū quidē sanguinem modicū ac subnigrum dimit-
tit ac reiicit, deinde verò adhuc copiosiorē & sincerissimum,
deinde pus, patiturque quæcunq; in superioribus dicta sunt.

Medela.

Conducit autē talibus, si ab initio curandos suscipiat, vt &
venæ de manibus sanguinem emittant, & diætā à qua quā
siccissimus & exanguissimus fiat. Eodē porrò modo etiam
venæ in latere afficiuntur, quæ intus in superficie sitæ sunt.

**Purulentus
vnde.**

Quum igitur affectæ fuerint, varicosæque factæ, & intus
eleuatæ, & neglectæ fuerint hæc perpetiuntur. Erumpunt
& spuunt à se sanguinem, & aliquando etiā vomunt, & sup-
purati fiunt, & vt plurimum pereunt. Si verò curentur inci-
piente morbo, rursus in loco venæ confidunt ad latus, humi-
lēsque fiunt. Et pulmo ab his suppuratus redditur, & ab ipso
etiam talia perpetiuntur, & sic moriuntur. Cæterum supe-
riore ventre suppurati multipliciter fiunt. Nam quum pi-
tuita de capite copiosa & acervatim in superiorē ventrē flu-
xerit, putrescit & in pus vertitur. Putrescit autē maximè in
diebus viginti vna. Hoc igitur pus concutitur & intus flu-
ctuat ad latera allabens. Hic si vratur aut secetur priusquam

**Purulentus
ventriculus
superior
quomodo
fiat.**

diuturnum fiat pus, sanus plerunq; euadit. Fiunt autē & su-
periore ventre suppurati ex pleuritide, quum fortis fuerit, &
in iudicatoriis diebus neq; putruit, neq; spuito reiecta est, sed
latus exulceratum fuerit à pituita affixa, & bile, & quum
vltus factū fuerit, reddit de se pus, & ex vicinis locis præ ca-
lilitate in seipsum pituitam adducit, & hæc vbi cōputruit,
pus spuitur. Aliquādo verò etiam ex venis sanguis se in vltus
ingerit, & putrefactus pus fit. Hic si euestigio assumatur, sa-
nus plerunque fit, si verò negligatur, perit. Fiunt præterea
suppurati etiam, si pituita de capite delapsa, ad latus adgluti-
nata fuerit & putruerit. Tunc enim latus vt plurimum in-
flammat, & patitur eadem quæ ex pleuritide suppuratus.

Fiunt & quum præ labore, aut exercitiis, aut alio quopiā
modo, vena antè aut retro fuerit rupta, & sic rupta vt nō sta-
tim spuatur sanguis, sed in carne acutus tractus siue varix
fiat: & carō tracta ac conuulsa humiditatē modicā traxerit,
& subliuida facta fuerit: & statim quidē sic affectus non per-
cipit præ robore ac bona habitudine, aut si etiā sentit nihil
molesti

- A** molesti esse putat. Hic ubi deprehenderit, quum iam præ febribus, aut potu, aut venere, aut aliqua alia re correptus, fuerit attenuatus, caro sauciata, subreliccatur & subcalescit, & humiditatem in seipsam à vicinis tum venis, tum carnibus trahit. Vbi autem attraxerit, intumescit & inflāmatur, & dolorem exhibet tenuem, & tussim rarā & siccam primū. Deinde adhuc magis trahit in seipsam, & dolorē inducit vehementiorem, & tussim frequentiorē. Et primū quidē subpurulentum sput. Aliquando verò liuidū & subcruentū. Et quanto magis tempus, progreditur, amplius in seipsam trahit ac putrefacit, & de ipsa carne quantum ab initio liuidum erat, hoc pus fit: & dolorem acutum exhibet, & febrem, & tussim
- B** multam ac frequentē, & per sputum sincerū pus expuit. Si verò pus in ventre morā traxerit, totum corpus ab ipso calefcit. Maximē verò vicinissimæ partes. Calescente autem corpore, humiditas maximē eliquatur. Et quæ quidem à supernis partibus eliquatur, in supernum ventriculū maximē confluit, & pus fit, ad hoc quod iam in ipso est. Pars verò eius etiam in infernum ventriculum fluit: & quādoque alius ab ipsa turbatur, & hominem perimit. Nā cibi ingesti secedunt inconcocti, & alimentū ab ipsis corpori non accedit. Et sputi sursum purgatio non æqualis cōtingit, aluo nimirum calefacta, & omnia deorsum trahente in seipsam. Et à sputo quidem suffocatur & stertit, dum non purgatur: à ventre verò fluente debilitatur, & plerumq; perimitur. In huiusmodi autem morbis hunc fluxū maximē exhibet caput, utpote quod Capitis rheuma. cauum est, & supernē situm. Quum enim ab aluo fuerit calefactum, tenuissimā pituitam de corpore in seipsum trahit. Vbi verò hæc in ipso fuerit collecta, reddit rursus aceruatam & crassam, velut dictū est: & pars quidē ipsius in supernum ventriculū defluit, pars verò in infernum. Quum igitur caput fluere inceperit, & reliquum corpus colliquari, nō amplius æqualiter, ne vsti quidem, superstites euadunt. Superant enim supra pus influentia mala, ea quæ defluunt: & carnes liquescunt magis à malis, quā nutriuntur ab ingestis. Qui verò huiusmodi morbos habent, partim ab his breui pereunt, partim diutius tempus extrahunt. Differt enim corpus à corpore, & ætas ab ætate, & affectio ab affectione, & tempus à tempore, in quo ægrotarint: & aliqui maiorem
- tolerantiā

Hippocratis Liber I.

tolerantiam in morbis habent, alij omnino ad tolerandum **D**
 impotentes sunt. Proinde certitudo exacta temporis in quo
 pereunt nō est, an longum, aut breue futurum sit. Neq; enim
 hoc tempus certū est quod quidam definiunt: & plerunque
 neque hoc ipsum suppurat. Differt enim & annus ab anno, &
 tempus à tempore. At si quis de ipsis rectè cognoscere ac di-
 cere velit, is cognoscet omni tempore, & perire, & supersti-

**Qui ventri-
 culus infe-
 rior puru-
 lentus fiat.** res euadere, & pati quacunque tandē patiantur. Caterū
 inferno ventriculo suppurati fiunt, maxime quidē quum pi-
 tuita aut bilis aceruata inter carnem & cutē collecta fuerit.

Fiunt autem & à conuulsionibus, quum venula conuulsa
 rupta fuerit, sanguis effusus putrescit & suppuratur. Si verò
 caro conuulsa fuerit, aut cōtusa, sanguinem ex venis sibi ipsi **E**
 propinquis trahit, atque hic putrescit ac suppuratur. His si
 quidem foras de se significationē præbuerit & eruperit pus,
 sani fiunt. Si verò sua sponte intro proruperint, pereunt. At
 verò diffusum pus in ventriculo inferno, veluti in superno
 dictum est, generari haud quaquam poterit, sed velut à me
 dictum est in tunicis & in tuberculis innascitur. Et si qui-
 dem intro notas habuerit, cognitu difficile est. Neque enim
 ex cōcussione cognoscere licet. Cognoscitur autē maxime
 ex dolore vbi fuerit, & si terrā figulinam, aut aliud quid hu-
 iuscemodi imposueris, breui id resiccat. Erysipelas autem
 in pulmone fit, vbi pulmo fuerit nimium resiccatus, id quod
 contingit ab ardore, & à febribus, & à labore, ac intemperie.

**Pulmonis
 erysipelas.**

Et quum superresiccatus fuerit, plurimum sanguinis in se **F**
 ipsum trahit, maxime quidē & plurimum ex magnis venis.
 Hæ enim ipsi vicinissimæ sunt, ac ipsi incumbunt. Trahit
 etiam ex aliis vicinis. Et tenuissimum ac debilissimū tra-
 hit. Postquam autem traxit, febris ex ipso fit acuta, & tussis
 sicca, & repletio in pectoribus, & dolor acutus in anteriori-
 bus ac posterioribus partibus, maxime circa spinā, nimirum
 magnis venis percalefactis: Et vomunt aliquando subcruen-
 tum, aliquādo liuidum. Vomunt item pituitam & bilem, &
 frequenter animo linquuntur, propter sanguinis transmuta-
 tionem derepente cōtingentem: atq; hoc maximum signum
 est Erysipelatis in pulmone generati, & si assidua febris in-
 uasio contigerit. Huic si quidem duobus aut tribus aut qua-
 tuor ad summū diebus, id quod intus est diffusum fuerit ac
 transierit

- A** transierit foras, plerunque sanus euadit. Si verò nō diffundatur ac foras transeat, intus putrescit, & suppuratus fit ac perit. Perit autē breui, utpote pulmone toto suppurato ac putrido. Si verò foras diffusum, intus veritatur & pulmonē corripit, huic nulla vitæ spes reliqua est. Quum enim antea resiccatus pulmo, traxerit in seipsum, non amplius dimittit, sed statim ab ardore, & siccitate, nihil amplius suscipit, nec; Pulmonis vomica. quicquam sursum distribuit, sed corrumpit. Tuberculum in pulmone fit hoc modo, quum pituita aut bilis coacta putrescit. Et quādiu quidē adhuc crudius fuerit, dolor ē exilcm, ac tussim siccam inducit. Postquam autē maturum factū fuerit, dolor & ante & retro acutus fit, & calores corripunt, ac
- B** tussis vehemens. Et si quidē quā citissimē maturuerit, & Pulmonis vomicaquā dosanescat. eruperit, & pus sursum veritatur, ac totum expuatur, & ventriculus in quo fuerat pus, contrahatur ac resiccetur, penitus sanus euadet. Si verò ruptum quidē fuerit quā celerrimē, & maturatum ac repurgatum, verū penitus resiccare non poterit, sed ipsum tuberculum à seipso pus produxerit, & à capite sanē tunc, itēque reliquo corpore pituita ad tuberculum defluens putrescit, & pus fit, ac expuitur, per quod homo perimitur. Perimitur autem à ventre fluente, ab his quæ antea relata sunt, & loquente ipso ac intelligēte omnes res, æquē ut in priori tempore, resiccatur ac perfrigeratur, conuiuentque venæ in corpore omnes, utpote sanguine ex ipsis à febre exusto: quādōque verò etiam præ temporis longi-
- C** tudine ac morbi magnitudine, tum malorum iam præsentium, tum eorum quæ insuper accedunt. Quod si multo tempore rumpi non possit, neque sua sponte, neque à medicamentis, cōsumitur debilitatus à doloribus vehementibus, & inedia, & tussi, & febribus, & ut plurimum perimitur. Si verò iam attenuato, & in lectum reclinato, pus eruperit, neque sic valde reualescunt, sed tali modo perimuntur. At si eruperit quidem quā celerrimē, & maturuerit, maturatum autē multa sui parte ad septum transuersum effundatur, statim quidem melius habere sibi videtur. Verū progressu temporis si quidē totum per sputum reiecerit, & ventriculus in quo pus inerat, confidat ac resiccetur, sanus euadit. Si verò & tempus longius protrahatur, & ipse debilior fiat, & per sputum reicere nequeat, sed vltus fuerit aut se-

Hippocratis Liber I.

**Costarum
vomica.**

Ruptiones.

Etus, & pus exeat, statim quidem & sic melius habere sibi vi- **D**
detur, verum tempore procedente perimitur ab iisdem quæ
prius relata sunt. Porro in latere fiunt tubercula, & à pi-
tuita & bile eadem ratione qua in pulmone. Fiunt etiam à
laboribus, quum vena aliqua tracta rupta fuerit, non tamen
penitus rupta, sed ita ut acutus tractus in ipsa factus sit. Si
quidem igitur rupta fuerit, statim sanguis è vena effusus pu-
rescit & suppuratur. Si verò acutus tractus in vena fiat, prin-
cipio quidem dolorẽ exhibet ac pulsat: progressu verò tem-
poris distribuit vena sanguinem in carnẽ, atque hic in car-
ne putrescens, pus fit. Eodem modo & caro, si quidem ma-
gis doluerit, & sanguinis plus in seipsam trahit ex vicinissi-
mis venis, & statim suppuratur. Si verò minus doluerit, tar- **E**
dius & trahit, & suppuratur. Quibusdam autem quum de-
biles facti fuerint tractus in carnibus, aut venis non suppu-
ratur, sed fiunt dolores diuturni, & vocantur Ruptiones. Et
quæ quidẽ in carne fiunt, hoc modo fiunt. Quum caro affli-
cta fuerit, aut conuulsa, aut percussa aut aliud quid perpeffa,
liuida velut antea dixi fit, non sincero sanguine, sed tenui &
aquoso, eoque modico. Quum autem plus solito fuerit re-
ficcata, percalefcit & dolorem exhibet, & à venis ac carnibus
vicinis humiditatem in seipsam trahit: & ubi nimium fuerit
humectata, atque ea ipsa humiditas ubi à carne fuerit super-
calefacta, per totum corpus dispergitur, qualis est attracta, ma-
gis tamen in venas dispergitur quàm in carnes. Venæ enim
magis trahunt quàm carnes. Trahunt tamen etiã carnes. **F**
Quando verò ad multam in corpore humiditatem, modica
de carne attracta fuerit, obscura iam fit, & doloris exors, &
pro morbida cum tempore sana euadit. Si verò caro magis
fuerit percalefacta, & ampliorem humiditatem traxerit, do-
lorem exhibet: & ad quamcunque corporis partem ab ipsa
processerit ac firmata fuerit, dolorem inducit acutum, & ali-
qui putant ipsis ruptionem transmutatã esse, verum hoc fieri
non potest. Propinquissima verò vlceri sunt quæcunq; ta-
lia & alia. At humiditas de carne exiliit per venas, quum au-
tem percalefacta, & crassa, & copiosa facta fuerit, dolorem
exhibet, donec similis fiat reliquæ humiditati, in tenuitate
ac frigiditate. Quæcunque verò in venis fiunt, sic habent.
Ipsa quidem vena, in quantum tracta est, in loco manet.
Quum

- A** Quum autem tracta fuerit (trahitur autem ac conuellitur à Ve- labore & violentia) fit veluti varix. Percalescit autem & tra- hit in seipsam, liquidam quandam humiditatem, quæ est à bile ac pituita. Et vbi mixta fuerint sanguis & humiditas de carne, crallescit sanguis, & multipliciter ipse seipso, ea parte qua vena conuulsa est, & morbosior fit, & amplius stabilior. Et quum copiosior factus fuerit, plenitudo ipsa transmigrat, *πλήρωμα*. quocunque tandem contigerit, & dolorem inducit acutum, vt aliquibus videatur ruptio locum permutasse. Et si contigerit vt ad humerum transferatur, & grauitatem in manu inducit, & torporem ac segniciem. Et si quidem ad venam proruperit, aut ad humerum & dorsum tendat, dolor plerun- que statim quiescit. Fiunt porro conuulsiones & à labo- ribus, & lapsibus, & à plaga, & si quis onus maius leuet, & à curilibus & lucta, & eiusmodi omnibus. Quicunque verò à vulneribus suppurati fiunt, aut ex hasta, aut pugione, aut ia- culo, intrò sauciatu fuerint, quandiu quidem habuerit vlcus respirationem foras, per antiquum vulnus, & hac parte frigi- dum in seipsum adducit, & calidum à seipso hac parte emit- tit, & sanè facile tum pus, tum si quid est aliud, expurgatur. Et si quidem & interna & externa pars simul fuerint sanate, sanus penitus homo euadit. Si verò externa quidem sanata fuerit, interna verò non, suppuratus fit. Et si etiam sanata si- mul sint interna ac externa pars, cicatrix autem intus debi- lis fiat, & aspera ac liuida, reulceratur quandoque, atque sic suppuratus fit. Rursus exulceratur etiam si quid amplius la- borarit, & si attenuatus fuerit, & si pituita aut bilis ad cicatri- cem affixa fuerit, & si alio morbo correptus attenuatus fue- rit. Vbi verò vlcus factum fuerit, siue hoc modo, siue vbi ex- terna pars priusquam interna coaluit, dolorem acutum in- ducit, & tussim, & febrem: & frigiditatem ipsum sibi ipsi vl- cus inducit, eo quòd amplius calidum existat: & ipsum à se- ipso caliditatem efficit, & pus expurgatur, & per longius tem- pus curatur, & tardius sanescit: quandoque verò neque sane- scit. Nam caro, & vlcus, ab ardore qui est in corpore coqui- tur, & nimium humectatur, vt non possit neque siccari, ne- que carnem producere, neque sanari. Sed cum temporis pro- gressu moritur, patiens talia quæ etiam prius dicta sunt. At alia de caus- si contingat vt crassarum venarum aliqua saucietur, & san- sa-
guis

Purulentus
vulnere.

Cur quan-
doque vul-
nus non co-
alescat.

Purulentus

Hippocratis Liber I.

**Diversitas
varia.**

**Morborū
affectus di
uersi.**

**Seniorum
& iuniorū
affectus.**

guis intro fluat ac putrescat, suppuratus sit. Et si quidem hoc **D**
pus totum per sputum reiectum fuerit, & vena fauciata co-
aluerit, & vlcus intus ac foris sanatum fuerit, penitus sanus
euadit. Si verò neque vlcus intus coalescere poterit, neq; ve-
na constringatur, sed alias atque alias sanguinem remittat.
Et si statim vomatur & spuatur, aut etiā putrescat, & pus ex-
puatur, plerunque perimitur, aut statim sanguinem vomēs,
aut posteriori tempore, dum perit ab iisdem quæ antea dicta
sunt. Sæpe verò hi quibus venarum aliqua intus fauciatur à
vulneribus, aut quibusdam laboribus, aut exercitiis, aut alia
quadam causa, quā coaluerit & sana esse videtur vena alio
tempore iterum rumpitur, idq; ab iisdem contingit causis,
à quibus etiam prius patiebatur. Vbi verò iterum rupta est, **E**
sanguinem fundit, & statim pereunt sanguinem multum ac
sæpe vomentes (aut aliàs atq; aliàs sanguinem recentem vo-
munt) pus autem spuantes per omnē diem multum ac cras-
sum, tali aut consimili modo pereunt, velut etiā in aliis mor-
bis dictum est. At verò in his ac similibus morbis multum
refert, quantum ad facilem ac difficilem curationem, vir sit
an mulier qui morbum habet, iuuenis an senex, & mulier iu-
uencula an anicula. Et præterea tempus à tempore differt, in
quo ægrotant. Interest item an ex alio morbo ægrotent, aut
non ex alio. Differt etiam affectus ab affectu, maior à mino-
re, & corpus à corpore, & curatio à curatione. His autem sic
inter se differentibus, necesse est etiam tempus diuturnita-
tis differre: & aliis longius fieri, aliis breuius: & alios perire, **F**
alios non: & morbos aliis durabiles esse & maiores, aliis mi-
nores & brevis temporis: aliis permanere vsque ad senectu-
tem & commori, aliàs perire ab ipsis breui. Et qui quidem iu-
niores patiuntur eas affectiones, quæ à laboribus fieri dictæ
sunt, hi & ampliores & vehementiores ipsas patiuntur, & ma-
gis quàm alij dolent, & statim in ipsis manifestæ fiunt, vt san-
guinem aut spuant, aut vomant. Sed & quædā fientia falsunt
ipsos, præ bona corporis habitudine. Seniores autē rarò qui-
dem patiuntur, & si patiantur, debiles ipsas perpetiuntur,
vtpote ipsi debiliores existentes, & remittunt magis ipsis, &
affectionum maiorem curam gerunt. Fiunt igitur ab initio
omnino minus seniori quàm iuniori, & vbi factæ fuerint,
seniori debiliores fiunt, iuniori vehementiores. Et iuniori
quidem,

- A quidem, utpote qui habet corporis vigorem & siccitatem, & carnem densam ac robustam & ad ipsa ossa assidentem, cute circum ipsam circumtenta: quum aliquid amplius laborarit, solito magis & derepente, convulsiones vehementes fiunt, & ruptiones multæ ac omnigenæ venarum ac carniū. Et horum aliqua statim manifesta fiunt, aliqua posteriore tempore comparent. At senioribus vigor fortis non inest, & carnes circum ossa dissiunt, & cutis cum carnes: & ipsa caro rara est ac debilis, & neq; tale quid pati possit similiter senior veluti iunior. Et si quid patiatur, leuiter patitur, & statim manifestum redditur. Atq; intantum quidem in affectionum principio, iuniores senioribus difficilius liberantur. Quum
- B verò morbus conspicuus factus fuerit, & aut pus, aut sanguinem, aut vtrunq; expuerint, qui quidem iuniores sunt, quum corpus ipsorum sit robustum ac densum, non æqualiter depurari possunt ab vlceribus, quorum pus in superno ventriculo existit. Nam & pulmo non valde trahit ad arterias, Pulmonis
varietas. ut qui densior sit: & arteriæ quum tenues & arctæ sint, pus non suscipiunt, nisi modicum & raro. Quare necesse est pus in thorace, & in vlceribus coaceruari & crassum fieri. At seniori & pulmo rarior ac cauior est, & arteriæ ampliores, ut Cur iuue-
nes magis
quàm senes
afficiantur. pus non diutius in ventriculo & vlceribus moretur, & quicquid eius insuper generatum fuerit, hoc totum necessario sursum attrahitur à pulmone ad arterias, & statim expuitur. In iuniore igitur, utpote quum sint affectiones vehementiores,
- C & purgatio pro sputi ratione non fiat, & febres acutiores & frequentiores fiunt, & dolores acuti incidunt, tum in ipso affectionis loco, tum in reliquo corpore: nimirum quum venæ sint robustæ ac sanguine plenæ. Vbi verò hæ percalescunt, dolores ab ipsis transiliunt alias ad aliam corporis partem. Achi quidem plerumque breui perimuntur. Senioribus verò quum affectiones sint debiliores, & sputum ab ipsis purgetur, & febres mitiores, ac paucae fiunt, & dolores adsunt quidem, verum exiles. Et ab huiusmodi affectionibus ne senes quidem penitus liberantur, sed longo tempore afflictī per-eunt. Et aliquando pus spuunt, quandoque sanguinem, quandoque neutrum, tandemque cum his moriuntur. Moriuntur autem hoc modo, quum ipsos morbus aliquis huic quem antea habent consimilis apprehendit, ita ut & hunc habeant, & is quem

Hippocratis Liber I.

Morbi periculosi. is quem prius habent vehementior fiat : & ut plurimum per-
eunt. At verò morbi qui hos morbos efficiunt, maxime sunt
pleuritis & peripneumonia. febris porro ab his fit. Quum
bilis aut pituita calefacta fuerit, totum reliquum corpus ad
his calefcit, & vocatur hoc febris. Calefcit autem bilis & pi-
tuita, intrinsecus quidem à cibis & potibus, à quibus etiam
nutritur ac augetur. Extrinsecus autem à laboribus ac vul-
neribus, & à calido nimium calefaciente, & à frigido nimium
frigefaciente. Calefcit item à visu & auditu, Verum mini-
mum ab his. Rigor autem in morbis fit quidem & ab exter-
nis, ventis, aqua, serenitate, & aliis huiusmodi. Fit autem &
ab ingestis cibis ac potibus. Maxime verò & vehementior
fit, quum bilis & pituita sanguini fuerint permixta aut alte-
ra ex his, aut vtraque. Magis tamen si pituita sola permixta
fuerit. Est enim pituita frigidissima ex natura. Calidissimus
autem sanguis. Frigidior est etiam aliquanto bilis sanguine.
Quum igitur hi humores ambo, aut alter solus, permixti
fuerint ad sanguinem, ipsum congelant, non tamen omnino.
Neque enim vivere posset homo, si sanguis densior & frigi-
dior seipso multis modis fieret. Frigefcente igitur sangui-
ne, necesse est & reliquum totum corpus perfrigerari, & ubi
huiusmodi quid factum fuerit, rigor appellatur. Et si quidem
vehemens fiat rigor, vehementior est etiam tremor. Nam
dum contrahuntur venæ, sanguine & coacto & congelato,
corpus & contrahunt & tremere faciunt. Si verò minus ali-
quanto sanguinis coactio fiat, hoc rigor appellatur. Horror
autem dicitur debilissimus rigor. Quod autem post rigo-
rem necessario corripiat febris, aut maior, aut minor, sic ha-
bet. Quum sanguis percaluerit, & vim depulerit, ac rursus
ad suam naturam redierit, concalescit simul & pituita, & bi-
lis sanguini permixta. Et sanguis ipse seipso multipliciter ca-
lidior euadit. His igitur percalefactis, necesse est febrem suc-
cedere post rigorem, præ sanguinis caliditate. Sudor verò
fit hac de causa. Quicumque morbi in iudicatoriis diebus iu-
dicantur, & febrilis ignis dimittit, in his de pituita & bile
quod tenuissimum est eliquatur & secernitur, & secedit par-
tim extra corpus, partim intus & isthic in corpore relinqui-
tur, partim præ caliditate attenuatur, & vapor fit, & cum spi-
ritu permixtum foras procedit. Atque hæc quidem huiusmodi
sunt,

A sunt, & ab his sudor generatur. Quare verò quandoque calidus, quandoque frigidus est, ita cōtingit. Calidus quidem de percalefacto malo, & exusto, & attenuato, & debili, & non valde multo secernitur, & necesse est ipsum calidiorem ex corpore excerni. Frigidus autē de ampliore malo secernitur, & de eo quod reliquum est & adhuc validum, & nondum putrefactum, neque attenuatum, neq; exustum, & frigidior ac crassior & graueolentior prodit. Manifestum autem hoc ex hac re fit. Qui frigidum sudorem exudant, ē longis morbis plerunque agrotant, inualeſcente malo eo quod in corpore relinquitur. Qui verò calidum sudorem excludunt, citius à morbis liberantur. **Pleuritis & peripneumonia fiunt hoc modo.** Pleuritis quidē, quum potiones aceruatę & fortes valde corripunt. Percaleſcit enim totum corpus ac humectatur à vino. Maximē autem & bilis & pituita percaleſcit ac humectatur. Et sanē his commotis ac humectatis, contingeret vt rigor inuadat ebrium siue ſobrium. Et cūm latus natura carne nudum ſit, præ omnibus corporis partibus: & non ſit quicquam in ipſo quod renitatur, præter ventriculi cavitatē: maximē rigorem percipit. Et cūm riguerit ac perfrigeratum fuerit, tum caro quę est in latere, tum venę, contrahuntur ac conuelluntur. Et quantum in ipſa carne inest bilis ac pituita, aut in venis quę in ipſa carne ſunt, id magna ex parte aut totum ſecernitur, intrōq; compellitur ad caliditatem, carne extrinſecus condensata: atq; id ad latus affigitur, & dolorem vehementem exhibet, & percaleſcit: & per caliditatem trahit ad ſeipſum, à vicinis venis ac carnibus, pituitam ac bilē. Atq; hoc sanē modo ſit, vbi verò ad latus affixa putruerint, & per ſputum reiecta fuerint, ſani fiunt. Si verò & antiquum multum affixū fuerit ad latus, & aliud inſuper acceſſerit, ſtatim pereunt, præ ſaliux copia expuere nequeunt: aut ſuppurati fiunt, & partim pereunt, partim euadunt. Indiciū autē hęc de ſe præbent in ſeptem diebus, aut nouem, aut vndecim, aut quatuordecim: dolorem quoq; inducunt ad humerum, & ad clauiculam, & ad alas, hac de cauſſa. Vena quę ſplenitis appellatur, tendit à ſplene ad latus, à latere verò ad humerum & ſiniſtram manum. Hepatitis autem ad dexterās partes eodem modo: & quum huius in latere pars à rigore contracta fuerit, & ſanguis in ipſa horruerit, ad alas & clauiculā ac humerum.

Calidus frigidusve cur.

Pleuritis, peripneumonia.

Vena splenitis.

Peripneu-
monia quā
fiat.

merum concedit, & conuellit ac dolorem inducit. Eodem modo & loci circa dorsum: ab affixo ad latus humore pituitæ ac bilis percalefcent: & quandoque dolorem locis infra latus exhibent. Sæpe verò si ad infernas partes cōuertatur, dolorem per venas ad vesicam distribuit, multumque ac biliosum æger mingit. Arbitrantur autem huius morbi causam ac principium rigorem esse. Peripneumonia fit quum comota ac calefacta pituita ac bile, pulmo præ caliditate traxerit in seipsum de vicinis locis, ad ea quæ iam sunt in ipso. Et percalfacit quidem totum corpus ac dolorem exhibet, maxime autem dorso, & costis, & humeris, ac spinæ, nimirum ab his in seipsum attrahens plurimam humiditatem, & superexiccantur hæ partes, & nimium calefcent. Postquam autem E attraxit in seipsum, & tum bilis, tum pituita, sedē in pulmone occupauit, putrescit ac suppuratur. Et si quidem in diebus iudicatoriis putrefacta per sputum reiecta fuerint, æger superstes euadit. Si verò & ea quæ ab initio aduenerunt susceperit, & alia insuper accesserint, & neque spuens, neque putrefaciens superarit, præ copia eorum, quæ insuper accedunt, ut plurimum moriuntur. Si verò ad dies perueniant duos & viginti, & febris remittat, & in his per sputum purgati non fuerint, suppurati fiunt. Fluit autem maxime ex his, quibus & pleuritis & peripneumonia vehementissima existit. Fit autem & peripneumonia & pleuritis sine sputo, ambe ex eadem causa præ siccitate. Siccant autem & calida, ubi nimium calfaciunt: & frigida, ubi nimium frigefaciunt. Congelatur F autem latus, & quæ sunt in ipso venæ, & cōuellitur, & quantum in ipso inest pituitæ aut bilis, id à caliditate resiccatur, & dolorem inducit, & à dolore febrem. Huic venam secare, cōducit in manu splenitidem appellatam, aut hepatitidem, iuxta vtram sanè fuerit morbus. Atque sic dolor mollior fit, & lateris, & aliarum partium. Nam venæ & quātum in ipsa inest bilis ac pituitæ, & ipsius sanguinis ægrotantis vnā cum his magnam partem foras dimittit. Pars verò ex carne per medicamenta & potiones diffunditur, & à calefactoriis forinsecus adhibitis, ita ut morbus per totum corpus dispergatur. Vocatur autem hæc pleuritis sine sputo. Peripneumonia verò quum pulmo etiam ipse superexiccatus fuerit, & quantum in ipso inest bilis aut pituitæ, neque putrefacit æquali

Splenitis
• hepatitis;
vena.

Aequaliter, neque per sputum reddit: & quantum in ipso est humiditatis, aut à potu, aut à sorbitione, aut à vicinis locis, hoc totum exurit, præ nimia siccitate ac caliditate. Huic portiones bibere conducit, à quibus pulmo humectatur, ac sputum reiecit. Si enim sputum non reiecerit, & durior fit, & coarescit, & hominem perimit. Febris ardens corripit magis *ναύσος*. biliosos, corripit item pituitosos. Corripit autem hoc modo. Quum bilis commota fuerit per corpus, & contigerit ut venæ & sanguis attrahant bilem, eamque plurimam ex carnibus ac vetriculo, ad eum qui prius inest, utpote quum etiam natura calidissimus sanguis in corpore existat. Cum itaque percaluerit ex carnibus & vetriculo, supra eum qui iam inest, adhuc magis à bile, percalfacit etiam reliquum corpus. Et quædam sanè partes præ multa humiditate, penitus resicari non possunt. Si verò resiccatae fuerint, homo moritur. Extremæ verò corporis partes, utpote natura sicca, resiccantur, & plurima humiditas ex ipsis exurit, & si ipsas continere velis, frigidas comperies ac siccas. Quapropter hi qui à febre ardente corripiuntur, internis quidem partibus à febre exuruntur, externis autem frigidi sunt. Et lingua ac fauces ab interno spiritu ac caliditate exasperantur & arescunt. Quantum autem in vetriculo & in vesica inest bilis, quod quidem in vetriculo est, aliquando, deorsum exturbatur. plerunque verò in primis diebus vomitur, aut in quatuor aut quinque. Vomitur autem hac de causa. Quum supernus ventriculus *Causa vomitionis* supercalfactus fuerit, attrahit in seipsum, & fit vomitus. Et *quæ.* ob hoc ipsum etiam ex febre ardente, & ex pleuritide, ad peripneumoniam maximè morbi trāsmutantur. Vbi enim supernus ventriculus supercalfactus fuerit, trahit in seipsum, & suscipit pulmo, & fit peripneumonia: & plerunq; pereunt, nimirum debiles iam existētes, & morbo alio nouo insuper generato, dies transigere nequeunt, donec sputum in pulmone concoquatur. Verum ut plurimum pereunt præ debilitate. Aliqui tamen euadunt. At quibus in vesicam confluit *Crassum loquium cur.* quid bilis, his crassa vrina mingitur, crassa autem à pituita. Biliosa verò alui egestio prodit, eo quòd combusta sint ea quæ sunt in ventre. Phrenitis hoc modo se habet. Sanguis *Phrenitis* qui est in homine, maximam partem ad prudentiam con- *quæ fiat.* fert. quidam dicunt totum. Quum igitur bilis commota ad

v

venas

venas & ad sanguinem ingressa fuerit, sanguinem ex con- **D**
 sueta compage ac motione dimouet, & ferolum facit, ac cal-
 facit. Calefactus autem, etiam reliquum corpus totum per-
 calefacit, & desipit homo, & non sibi constat, præ febris co-
 pia, & sanguinis ad ferocitatem transmutatione, & motione
 non solita cōtingente. Assimiles autem sunt maxime hi qui
 phrenitide tenentur, his qui ab atra bile delirant. Nam & hi
 ubi sanguis ex bile & pituita corruptus fuerit, morbum ha-
 bent, & dementes fiunt. Aliqui verò etiam insaniunt. Et qui
 phrenitide correpti sunt eodē modo. Tanto autem minor
 infania ipsūque delirium sit, quāto paucior ac debilior est
 bilis quā pituita. Porro subcruentum & liuidum est spu-
 tum in pleuritide ac peripneumonia, idque ob hāc causam. **E**
 Principiò quidem plerumque neutrum spuunt, neque liui-
 dum, neque subcruentum. vnde nosse conuenit morbum ve-
 hementem esse. Quum autem sputum subcrassum spueri
 cœperint, tunc maxime purgantur. Spuitur autem id à di-
 stēctione venarum, in pleuritide quidem earum quæ sunt in
 latere, in peripneumonia verò earum quæ sunt in pulmone:
 & caliditatē ad seipsam affectio trahit. Si verò agro abscef-
 sus fuerit ruptus, & purulentus fuerit, prima mox die sangui-
 nem, & pus subcruentum ac liuidum cum salua spuit. Liui-
 dum autē sit à sanguine, si modicus ad multam saliuam am-
 mixtus fuerit, & nō statim spuatur, sed semiputrefactum &
 effœminatum in corpore manet. Moriuntur autem ex pleu- **F**
 ritide, ubi & multum pituitæ ac bilis ab initio lateri fuerit
 affixum, & multum insuper ex reliquo corpore effluxerit, &
 neque spuens, neque putrefaciens superarit, præ materiæ af-
 fluentis copia. Implentur autem arteriæ ab his quæ insunt,
 pituita ac pure. Deinde stertit, & frequenter, & illinc statim
 respirat. tandem verò omnia obturatur, & moritur. Eodem
 modo ex peripneumonia pereunt. Quicunque verò ex febre
 ardente moriuntur, omnes præ siccitate moriuntur. Et resic-
 cantur primū quidem extremæ ipsorum partes, manus ac
 pedes. Deinde partes sicciore. Vbi autem humiditas ex cor-
 pore penitus fuerit exusta ac resiccata, sanguis quidem con-
 gelatur penitus ac perfrigeratur. Reliquum verò corpus
 exsiccatur, ac sic homo moritur. At ex phrenitide ita pe-
 rit. Desipiunt in hoc morbo semper, nimirum sanguine cor-
 rupto,

Sputū sub-
 cruentū &
 liuidū cur.

Liuidū spu-
 tū sanguis
 fit.
 Peripneu-
 monia quā
 do necat.

Febris ar-
 dens quan-
 do perimat

Phrenetici
 quomodo
 pereunt.

A rupto, & ex consueta motione emoto, & quum desipiant, nihil eorum quæ ipsis exhibentur accipiunt, quod saltem memoratu dignum sit. Quum verò progressum fuerit tempus, marcescunt ac imminuti consumuntur, tum ex febre, tum quòd nihil alantur. Et primùm quidem extremæ partes cōsumuntur ac perfrigerantur. Deinde ipsis proximæ. Sed & frigiditatis, & febris, & dolorum principium hoc habet. Quum sanguis qui est in venis perfrigeratus fuerit à pituita, transmutatur & conuellitur aceruatim aliàs alia parte, & tremit. Tandem verò omnia perfrigerantur, & moritur.

H I P P O C R A T I S
COI DE MORBIS LIBER
SECUNDVS, IANO CORNARIO MEDICO PHY-
SICO INTERPRETE.

*



C **M** **V**LTVM vrinæ emittitur vbi caput nimium *Cum quis*
 incaluerit. Liquefcit enim in ipso pituita, multum
 liquefcens autem secedit partim ad nares, *meit.*
 partim ad os, partim per venas quæ ducunt
 ad pudendum. Quum autem ad pudendum
 peruenerit, mingit homo & patitur quem-
 admodum ab vrinæ stillicidio. Cæcutiunt autē quum ad ve-
 nas in oculis peruenerit pituita, Aquosior enim fit visus &
 turbulentior, & splendor in oculis non similiter splendidus
 est, neq; in ipso cōparet si videre voluerit, similiter sicut antē
 quum splendidus & purus esset. Hic in quadraginta diebus
 maximè sanatur. Si verò longo tempore postea morbus re-
 uertatur, cutis capitis crassescit, & reliquum corpus attolli-
 tur, & crassescit, ac bonū colorem habet. Hac pituita ad car-
 nes conuertitur, & ab hac crassus esse videtur. Nam carnes
 quum sint perrigatæ & eleuatæ ac rariores, sanguinē ex ve-
 nis trahunt, & propterea bene colorati esse videntur. *Quis visus*
hebetetur.

Hippocratis Liber I I.

**Pustulariū
capitis ori-
go.**

morbus. Caput vlceribus impletur, & corpus intumescit, & D
color morbi regij est, & aliàs alia corporis parte vlcera erū-
punt: & febris aliàs atq; aliàs corripit, & ex dorso aqua fluit.
Huic quum in capite pituita subbiliosa connutrita fuerit, vl-
cera fiunt vbi sinciput pituita & bile perrigatū fuerit, & vbi
pituita rara & aceruata fuerit, itémque bilis. Hac enim con-
sistit, putrescit, & exulceratur. Attenuata verò pituita ad au-
res penetrant. At in reliquo corpore vlcera eadem ratione
qua in capite fiunt, sanguine & bile putrefactis quacunq; in
parte fuerint collecta. Hac enim parte caro putrescit & exul-
ceratur, & accedentem pituitam ac bilem insuper putrefa-
cit, & fit pus. Alius morbus. Dolor circum circa caput vexat,

**Caput cur
dolitet.**

& vomit bilem, & difficulter mingit, & desipit. Hic caput E
quidem dolet, præ nimia eius calefactione. Desipit autem
quum sanguis in capite à bile aut pituita fuerit calefactus,
& plus solito commotus. Vomit autem bilem, vtpote com-
mota ipsa in corpore. Et caput præ caliditate trahit in seip-
sum, & crassissimum quidem vomit, tenuissimum verò in
seipsum trahit, Mingit autem & in hoc morbo ab iisdem, ve-
lut etiam in superiore dictum est. Alius morbus. Si circa ce-
rebrum venulæ superueuomant, nomen quidem rectum mor-
bo non est. Neq; enim fieri potest vt aliqua vena, siue parua,
siue magna superueuomat. Nominant tamē & dicunt super-
uomitum. Si verò etiam quàm maximè superueuomant mor-
bum ab hoc ipso fieri nō est verisimile. Nam à bono malum

**Malum ex
bono non
fit.**

fieri non potest, neq; à malo vtiq; bonum fiat. Neque rursus F
bonum plus iusto fieri potest. Verum superueuomere viden-
tur, quum ad venas bilis aut pituita ingressa fuerit. Eleuan-
tur enim venæ & pulsant, & dolor per totum caput dispergi-
tur, & aures sonitum percipiūt ac nihil audiunt. Et sonitum

**Tinnitus
auriū vnde**

quidem percipiunt, vtpote venis pulsantibus & palpitanti-
bus. Tunc enim sonitus est in capite. Grauius autem audiūt,
partim præ interno strepitu ac sonitu, partim quum cerebrū
& venæ circa ipsum eleuantur. Præ nimia enim caliditate,
vacuam circa aurem partem cerebrum de seipso implet: &
quum æqualis aeris copia nō insit, velut priore tempore, ne-
que æqualem sonum exhibeat, ea quæ dicuntur non æquali-
ter se imprimunt, atq; ex hoc grauem auditum habent. Hic
si quidem erumpat ipsi ad nares, aut ad os aqua & pituita, sa-
nus

A nus fit. Si verò nō erumpat, septima die maximè moritur. At si in capite venæ supereuomant, id quod ab iisdem fit quæ & prius relata sunt. Signū verò quòd tali modo supereuomat hoc est. Quum quis aut manū, aut caput, aut aliam quādam corporis partem, hoc patientem incidat, sanguis niger profuit, & turbatus ac morbosus: quanquam neque sanguis nominari iuste mereatur, nisi tūc quū rubicundus ac sincerus fuit. Quum itaq; supereuomant ab iisdem causis, dolor & vertigo, & grauitas caput occupant. Dolor quidē, præ nimia sanguinis caliditate. Vertigo verò, quū aceruatus ad faciem processerit sanguis. Grauitas autem, quòd copiosior sanguis fit in capite, & turbulentior ac morbosior, quā intrinsecus.

Signū venularum cerebri id efficientium.

Vertigo, grauitas.

B

Cerebri corruptio.

SI cerebrum corruptū fuerit, dolor ex capite spinam occupat, & ad cor animi deliquium procedit, & sudor adest, & somni expers est, & ex naribus sanguis fluit. Sape etiam sanguinem vomit. Corruptitur autē cerebrum tali modo, quū aut nimium calefactus aut perfrigeratus, biliosus aut pituitosus plus solito factus fuerit. Vbi verò horum aliquid perpessus fuerit, etiam spinalem medullā supercalefacit. Et quum etiam hic percalefcit, dolorē spinæ inducit. Animo verò linquitur homo, quum pituita aut bilis ad cor consistit. Cōsistere autē necesse est cōmotis ac humectatis. Sudor autē fit præ dolore. Sanguinē verò vomit, quum venæ quæ sunt in capite, à cerebro fuerint calefactæ: quæ verò circa spinam sunt, à spina, spina autē à spinali medulla. Medulla verò à cerebro, vnde sanè originē trahit. Quum igitur calefactæ fuerint venæ, & sanguis in ipsis efferbuerit, quæ quidē in capite sunt, venæ, distribuūt ipsum ad nares, & ad os: quæ verò circa spinā sanguifluæ, in corpus. Hic tertia aut quinta die plerūq; perit.

C Alius morbus. Derepente dolor occupat caput, & statim vox intercipitur ac sui impotens fit. Hic in septē diebus moritur, si nō febris inuaserit. Si enim hæc inuaserit, sanus euadit. Patitur autē hæc, quum atra bilis ipsi in capite commota fluxerit, maximè in partē in qua plurimæ sunt venæ, in collū in quā, ac pectus. Deinde postridie sideratus fit ac impotens, sanguine nimium perfrigerato. Et si superior euaserit, ita vt sanguis caleseat, siue ab his quæ exhibentur, siue à seipso, at-

Dolor capitis qui vocem intercipit.

Hippocratis Liber I I.

tollitur & diffunditur ac mouetur, & spirationem inducit, & D
spumescit, & à bile separatur, & sanus euadit. Si verò supe-
rior non euaserit, adhuc magis perfrigeratur: & vbi penitus
perfrigeratus fuerit, & calor ex ipso defecerit, congelatur, &
Temulētia moueri non potest, sed moritur. At si ex ebrietatibus hæc pa-
hoc & ipsa tiatur (nam & hoc contingit) itidem moritur.
facit.

Caries ossis capitis.

QUum caries facta fuerit in osse, dolor ex osse corripit.
Temporis autem progressu cutis de capite alia atque
alia parte discedit. Talia verò patitur is cui in secunda ossis
lamina, pituita superueniens reliccata fuerit. Hac enim par-
te rarum fit, & omnis humiditas ex ipso deficit, & quia ari- E
dum est, cutis ab ipso discedit. Hic morbus lethalis non est.

Capitis stu Alius morbus. Si sideratus fiat, anteriorem capitis partem
por. dolet, & oculis non æqualiter videt, & soporatur, & venæ pul-
sant, & febris debilis tenet, & corporis impotentia. Hic pa-
titur hæc, quum venæ in capite fuerint calefactæ, & calefa-
ctæ pituitam in seipsas traxerint. Et principium quidem mor-
bi ex hoc fit. Anteriorem verò capitis partem ideo dolet, quod
venæ in hac sint crassissimæ, & cerebrum ad anteriorem ca-
pitis partem magis situm est quàm ad posteriorem. Et ocu-
lis ideo non videt, procumbente eo cerebro ac inflammato.
Impotentia verò ideo corpus occupant. Postquam venæ pi-
tuitam in seipsas traxerint, necesse est præ pituitæ frigidita-
te, sanguinem magis nunc sisti ac perfrigeratum esse quàm F
priori tempore. dum autem sanguis non mouetur, fieri non
potest, ut nō etiam corpus quiescat ac torpeat. Et si quidem
sanguis ac reliquum corpus superarint, ita ut calescant, ho-
mo euadit. Si verò pituita præualuerit, sanguis magis perfri-
geratur ac congelatur. Et si frigiditas ac congelatio auge-
scant, penitus cōgelascit ac perfrigeratur homo, & moritur.

Angina.

A Ngina siue cynanche fit, quum pituita in capite com-
mota aceruatim deorsum fluxerit, & in maxillis ac cir-
ca collum constiterit. Hic neque saliuam deglutire potest,
respirat autem violenter ac stertit, & aliquando etiam febris
ipsum corripit. Et morbus sanè ex hac causa fit, & aliquan-
do sub ipsam linguam, aliquando paululum supra pectus.

Vua

A

Vna morbus.

VVa fit quum pituita de capite ad gurgulionem descendit, & gurgulio princeps dependet, ac fit rubicundus. Temporis autem progressu, nigrescit. Nigrescit autem hoc modo. Venosus est gurgulio ac crassus, & postquam inflammatus est, calescit: & præ caliditate sanguinem ex vena adtrahit, ac ab ipso nigrescit. Quapropter si non turgentem feces, statim inflammantur. Nam vena calefacit, & præ caliditate partes circa gurgulionem sanguine replet, & breui suffocantur.

Tonsille ac vicina partes.

B**T**onsillæ, & partes sub lingua, & gingivæ, & lingua, & quæcunque huiusmodi hoc loco consistunt: hæc omnes partes ex pituita ægrotant. Pituita autem de capite descendit. Caput autem ex corpore trahit. Trahit autem ubi fuerit calefactum, percalefcit autem à cibis, & sole, & frigore, & laboribus ac febrili calore. Quum verò calefactum fuerit, tenuissimum ex corpore ad seipsum trahit, Vbi verò traxerit, rursus id ad corpus descendit.

Morbi à capite fientes.

Quum repletum fuerit caput, & ab aliquo ex relatis percalefactum, torpor caput tenet, & frequenter mingit, & alia patitur quæ ex urinæ stillicidio contingere solent. Idem per novem dies hæc patitur. Et si quidē per nares aut aures, aqua & mucus erumpat, à morbo liberatur, & urinæ stillicidium sedatur, mingitq; citra dolorem, urinā multā, & albā, ad viginti dies. Et dolor capitis cessat, & intuenti splendor ex oculis subtrahitur, & dimidiatas rerū facies se videre putat. Hic quadragesima die penitus sanus evadit. Multis verò quandoque morbus redit, septimo aut decimo quarto anno. Et capitis cutis ipsi crassescit, & ad tactum cedit, & de paucis cibis tener ac bene coloratus apparet, & non acutum auditum habet. Quum ita habentem offenderis in principio morbi, priusquam erumpat aqua per nares & aures, & tenuerit ipsum dolor: derafo capite utrem coriaceum circum frontem deligare oportet, aqua plenum calidissima, quantum sustinere potest, atque hinc ipsum calefieri permittere, & ubi perfrigeratus fuerit, alium adhibere. Si verò hinc debilitetur, desistere:

Capitis torpor narcēve.

Strāguria.

Medela quæ.

v 4

tempore

Hippocratis Liber I I.

tempore interposito eadem repetere, donec remiserit dolor. **D**
 Et si alius non egerat, infulum per clysterem immittere, &
 vrinam cientibus in potu datis, aquam mulsam aquosam in-
 super bibendā exhibere. & calore quā maximē foueatur.
 Sorbeat autem succum ptisanæ tenuem. Si verò venter non
 subeat, mercurialem in aqua coctā terito, ac succum excola-
 to, & de ipso, ac de ptisanæ succo, parem mēsuram permisce-
 to, & modicum mellis adiicito. Hunc succum ter in die sor-
 beat, & vinum mellei coloris, aquosum, album modicum, à
 sorbitione insuper bibat. Postquam autem eruperit ipsi per
 nares mucosa, & vrinam crassam eiecerit, & à dolore capitis
 liberatus fuerit, vtre amplius ne vtatur, sed multa calida lo-
 tus, vrinā cientia, & aquam mulsam aquosam bibat. Et pri- **E**
 mis quidem diebus milium delingat, & cucurbitā edat, aut
 betas per triduum. Deinde cibus vtatur mollissimis ac quam
 maximē per aluum subeuntibus, ita vt semper modicum ad
 cibos priores addat. At vbi quadraginta dies præterierint (se-
 datur enim morbus maximē in tanto tempore) capite ipsius
 purgato, prius medicamento exhibito, ipsum deorsum pur-
 gato, si tempus anni hoc permittat. Deinde serum ad dies
 septem bibendum dato, aut pauciores, si debilis existat. Si ve-
 rò morbus reuertatur, fomento per totum corpus adhibito,
 postridie veratrum bibendū dato. Deinde quanto tempore
 tibi visum fuerit intermittito, & tunc capite purgato, me-
 dicamento deorsum purgante exhibito, crustas octo capiti
 inurito. duas circa aures, duas in occipitio. hinc atque hinc **F**
 ad ceruicis neruum, duas in naso circa angulos oculorū. Ve-
 næ autem circa aures vrendæ sunt, donec pulsare desinant.
 Ferramētis verò cuneoli forma paratis obliquas venas per-
 urito. Atque hæc vbi feceris, sanitas continget. Alius mor-
 bus. Vlceribus impletur caput, & crura intumescunt, ve-
 lut ab aquæ potu, & in tibia tumor infarcitur, & si premas,
 color morbi regij apparet, & vlcera aliàs alia corporis parte
 erumpunt, maximē tamen circa tibia, & malum aspectum
 præ se ferunt. Vbi verò inflammatione liberata sunt, cito
 sana fiunt. & febris aliàs atque aliàs corripit. Caput autem
 semper calidum est, & ex auribus aqua fluit. Quum ita ha-
 bet, medicamētum ei dandum est, à quo pituita & bilis sur-
 sum purgatur, si quidē frigus fuerit, præfoto ac calida loto.
 Deinde

Caput vl-
ceratur.

Medela
quæ.

A Deinde tribus diebus interpositis caput purgato. Postea etiā deorsum purgans medicamentum bibendum dato. Si verò tempus anni ferat, etiam serum postea bibat. Sin minus, lac asininum. Post purgationes cibis quā paucissimis, & quā maximè per aluum subeuntibus vtatur, & non lauet. Si verò caput exulceratur, fecem vini ad smegma faciendū comburito, & glandis corticem tritum leuigatum ammisceto. & pari nitro ammixto, his defricus multa calida lauetur. Inungat autem caput baccis lauri tritis, & gallis, & myrrha, & thure, & argenti flore, adipéque suillo ac oleo laurino.

His permixtis inungatur. Post hoc autem tempus vomitibus vtatur bis in mense, & exerceat se ac calida lauet. At si

B his adhibitis, ex reliquo quidem corpore morbus fuerit exclusus, verū in capite ipsi vlcera adhuc fiant, rursus capite purgato, medicamentum deorsum purgans postea bibendum dato. Deinde raso capite, fissuras raras incutito, & vbi sanguis effluerit confricato. Postea lanas succidas vino imbutas superligato, & postquam exolueris, sponsia detergito, & ne humectato. Deinde oleo sublito cupressum inspergito. Laneis autem deligamentis donec sanus fiat vtatur.

Si morbus repululet quid agendum.

Alius morbus. Dolor caput corripit, & si paululum moueatur, bilem vomit. Quandoque etiam vrinam difficulter emittit, ac desipit, & septima die quandoque moritur: & nona quoque ac vndecima, septimam transgressus, si non eruperit per nares aut aures. Si verò eruperit, euadit. Fluit autem aqua subhiliosa. Deinde temporis progressu putrefacta pus fit. Quum igitur ita habuerit, quandiu quidem dolor tenuerit in principio, priusquam ex naribus ac auribus erumpat, spongas aqua calida imbutas cito capiti admovento. Si verò his non laxetur, vtre vtaris eodem modo velut in superiore morbo. Bibat autē aquam mulsam aquosam. Sin minus, aquam de farina crassa in ipsa macerata.

Curatio.

Sorbeat ptisanæ quoque succum, & vinum albū aquosum insuper bibat. Postquam verò per aures eruperit, & febris ac dolor remiserit, cibis vtatur per aluum subeuntibus, à modicis initio facto, semper aliquid addēdo. Et caput calida lauetur: & aures colluat aqua pura, & spongiā melle tinctam indat. Si verò neque sic resiccetur, sed diuturna fluxio fiat, collutione facta, argenti florem, sandaracham, cerusam

v s

singula

Hippocratis Liber I I.

singula æquis portionibus trita leuigatæque in aurē indito, D
eāque expleto, & si quid præterlabatur, de medicamento
amplius superaddito. Vbi verò reficcata fuerit auris, expur-
gato ac medicamentū eluito. Postea (obsurdescit enim pri-
mum reficcata) lenibus fomentis aures foueto. Nā & sic vix
ac longo tempore sedabitur. Moriuntur autem etiā, si dolor
in aure fuerit, & nihil in septem diebus eruperit. Hunc mul-
ta calida lauato, & spongas aqua calida imbutas exprime,
& tepidas ad aurem appone. Si verò neque sic erumpat, auri
fomentum adhibeto. Sorbitionibus autem ac potionibus

Cerebri iisdem vtatur quibus in superioribus. Alius morbus. Si
madētis si- aqua in cerebro fuerit, dolor acutus per sinciput ac tempora
gna. emergit, aliās alio loco: & rigor ac febris aliās atque aliās, & E

Medela
quæ.

regiones oculorum dolet, & cæcutit, & pupilla finditur, & ex
vno duo se videre putat, & si surrexerit, vertigo ipsum corri-
pit, & ventum nō sustinet, neq; solem: & aures tinniūt, ac in-
ter audiendū strepitu offenditur, & vomit saliuam ac pitui-
tam, quādoq; etiam cibos: & capitis cutis attenuatur, & con-
tactu gaudet. Quum sic habuerit, primū dandum est ipsi
medicamentum quod sursum pituitā educit, & postea caput
purgato. Deinde interposito tempore medicamentum deorsum
purgans bibendum dato. Postea cibus quā maximè
aliū subeuntibus ipsum reficito, semper modica adden-
do. Postquam verò comederit iam cibos sufficientes, vomiti-
bus ieiunus vtatur, lenticulæ decocto mel & acetum miscēs,
& olera antea comedēs: & in die illa qua vomuerit, primū F
cyceonem bibat tenuem, postea ad vespēram cibus modicis
vtatur, & non lauet. & à cibus deambulet, itēque mane, vi-
tans ventum ac solem, & ad ignem ne accedat. Et si quidem
talīa faciens, sanus fiat, bene est. Sin minus, vere vbi ipsum
prius purgaris primū veratro, postea etiā in nares medi-
camentum infundito, & paucō tēpore interposito deorsum
purgato, Deinde cibus reficito. Postea inciso capite iuxta sin-
ciput, ad cerebrum vsq; perforato, & veluti sectionē ac per-
forationem curato. Alius morbus. Rigor, dolor, & febris
per caput, maximè ad aurem, & ad tempora, & ad sinciput, &
oculorum regiones dolet, & supercilia ipsi incumbere viden-
tur, & grauitas caput detinet, & si quis ipsum mouerit min-
get, & multum ac facilè mingit. & dentes torpent, & stupor
iplos

Capitis a-
lius mor-
bus.

- A** ipsos tenet, & venæ attolluntur ac pulsant in capite, & non potest quietus esse, sed anxius est ac delipit præ dolore. Huic si quidem per nares aut aures eruperit, aqua profuit subpurgulenta, & sanus euadit. Sin minus, plerunque in septem diebus moritur. Hic morbus maximè fit ex febre lipyria, quū liberatus à febre, nondum purgatus, aut cibis se impleuerit, **Medela.** aut inebriatus fuerit, aut in sole laborarit. Quum sic habuerit, primū sanguinē de capite mittito, vndecunque tibi visum fuerit. Et post sanguinis missionem, raso capite perfrigatoria ipsi adhibeto. Et si alius nō subeat, infusum per clysterem immittito. In potu verò ptisanæ succū frigidum dato, & aquam insuper bibendā. Si verò ad perfrigatoria
- B** non remittat, transmutatione facta, vtre vitior ac calefacto, postquam autem quieuerit dolor, cibis vtatur aluum subeuntibus, & ne impleatur. Vbi verò vigesimum diem attigerit sedato dolore, fomento capiti ipsius adhibito, ad nares medicamentum apponito, & interposito triduo medicamentum deorsum purgans exhibeto. Alius morbus. Si venæ **Cerebri** circa cerebrum sanguinem superuomuerint, ac cerebrum **morb.** calefecerint, febris emergit fortis, & dolor ad tempora, & sinciput, ac posteriorem capitis partem, & aures tinniunt ac flatu implentur, & nihil audit, & anxius est, & seipsum præ dolore iactat. Hic quinta aut sexta die moritur. Cū sic habuerit, caput ipsius calefacto. Si enim per aures aut nares aqua eruperit, mortē effugit. Si verò sex dies euaserit, victum ipsi velut in superiore morbo constituto. Alius morbus. Si venæ superuomuerint in caput, dolor grauis totum **Capitis** caput tenet, & ad collum, & aliās ad alias capitis partes **morb.** trāsit. Et vbi surrexerit, vertigo ipsum corripit, febris autem non inuadit. Cū igitur sic habuerit, de raso capite si non calefactoriis cesserit, frontem ea parte qua capillus desinit à **Medela.** capite findito: vbi verò secueris disparata ac diducta cute, cū sanguis defluerit, salē tenuissimū inspergito: & postquam effluerit sanguis fissuram cōponito, & duplici filo totam ipsam includito. Deinde splenium cera ac pice illitum, vlceri imponito, & lana sordida superimposita deligato, & ad dies septem ne soluito, si nō dolor vexet: si verò dolor adfit, exoluito. Donec autem sanus fiat, aquam de macerata in ipsa crassa farina bibendam dato, & ptisanæ succum sorbendum,

Hippocratis Liber I I.

**Cerebrum
biliosum
eum est.**

Curatio.

**Quæ ven-
trement.**

**Cerebri
corruptio.**

Medela.

**Quo mo-
do sangui-
sistatur.**

**Capitis su-
bitus do-
lor.**

dum, & aquam insuper bibendam. Alius morbus. Si cere- **D**
brū bile infestatur, febris emergit debilis, & rigor, & dolor
per totū caput, maximè ad tēpora, ad sinciput, & ad regiones
oculorum: & supercilia ipsi impendere videntur, & ad aures
dolor procedit, & quandoq; per nares bilis defluit: & oculos
hebetes habent, & plerisque dolor ad dimidiam capitis par-
tem extenditur, quandoq; etiam per totum caput. Quum sic
habuerit, perfrigatoria ad caput apponito, & postquā dol-
or ac fluor cessarit, apij succum in nares instillato, & ne la-
uet quandiu dolor obtinuerit. Et sorbeat milium tenue mo-
dico melle affuso, & bibat aquam. Si verò alius non subeat,
brassicas edat & succum sorbeat. Sin minus, folia sambuci **E**
eodem modo. Et postquam tempestivum tibi esse visum fue-
rit cibos quā maxime aluum subeuntes ipsi exhibeto. Et si
depulso fluore ac dolore, gravitas ipsi supra supercilia incum-
bat, & in naso mucus crassus ac putridus fuerit, somento ex
aceto, & aqua, ac origano ipsi adhibito, deinde calida aqua lo-
to, florem aris & myrrham ad nares apponito. Atq; his factis
plerūque sanum efficies. Morbus autem non est lethalis.

Alius morbus. Si cerebrum corruptum fuerit, dolor ex
cervicis nervo ad spinam tendit, & ad cor frigus descendit, &
derepente novus sudor adest, & per nares sanguis fluit, Vo-
munt quoque multi. Hic triduo moritur. Si verò septem dies
transgrediatur: pleriq; autem non transgrediuntur: & si san-
guinem vomat, aut è naribus fundat, neque calida ipsum la- **F**
uato, neq; calefactoria adhibeto. Verū acetum albū aquo-
sum bibendum dato, & si debilis sit, ptisanam sorbendam. Si
verò plus iusto sanguinem vomere tibi videatur, aut ex na-
ribus ipsi fluat, à vomitu quidem bibat farinā trimestris tri-
tici in aquam inspersam. Si verò ex naribus fluat, venas & in
brachiis, & in temporibus, splenis suppositis deligato. At si
neutrum horum ipsi affuerit, dolet autem cervicis nervū, &
collum, & spinam, & frigus ad cor processerit, cum eruo pe-
ctora, dorsum, & cervicis nervū, & collum calefacito. Nam
his factis maximam vtilitatem capere poterit. Verū pauci
huiusmodi morbum effugiunt. Alius morbus. Sanum de-
repente inuadit dolor circa caput, & statim vox intercipitur,
& stertit, & os hiat, & si quis ipsum vocet aut moueat, solum
suspirat, nihil autem intelligit, & multū mingit, & mingere
se non

- A** se non sentit. Hic si nō febris ipsum corripiat, in septem diebus moritur. Si verò corripiat, plerunq; sanus fit. Huiusmodi verò morbus senioribus maximè fit, & magis quàm iunioribus. Hunc ubi sic habuerit, lauare oportet multa calida, & quàm maximè calefacere, & aquā mulsam tepidam in os instillare. At si resipiscat, & morbū effugiat, ubi ipsum cibis refeceris, ita vt viribus valere tibi visus fuerit, indito in nares ipsius medicamento, & paucis diebus interpositis, pharmacū deorsum purgans bibendum dato. Si enim ipsum nō purgaues, timor est ne rursus morbus reuertatur. Effugiunt autē non ita valde ex primo. Alius morbus. Si quis ex ebrietas voce priuetur, & statim sanè ipsum etiā febris corripiat, Senū morbus.
- B** sanus fit. Si verò non corripuerit, die tertia moritur. Si itaq; in ita affectum incideris, multa calida lauato, & spongias in aqua calida tinctas ad caput apponito, & cepas decorticatas in nares indito. Hic si quidem apertis oculis, & loquutus, ad se redierit, & nō nugetur, hac die sopore pressus iacet, postridie verò sanus fit. Si verò exurgens bilem vomuerit, insanit, & moritur maximè in quinq; diebus, si non dormierit. Huic igitur hæc facere oportet. Multa calida lauato, donec ipse ad seipsum redeat. Deinde multo oleo illitū, ad stragula molli- Medela.
- C** forbeat, aut ptisanæ succum, & vinum mellis speciē referens bibat. Deinde cibis vtatur mollissimis, ac paucis primū.

Cerebri corruptio.

SI corruptio cerebrum inuaserit, dolor tenet maximè anteriorem capitis partem, & paulatim etiam intumescit, & liuida fit: & febris, & rigor apprehendit. Quum ita habuerit, secare oportet qua parte intumuit, & perpurgato osse ipsum radere donec ad secundam laminam perueniat, deinde velut fracturam curare. Curatio.

Caries sine tereedo.

QUum caries facta fuerit in osse, dolor ex hoc corripit ipsum os, & progressu temporis attenuatur ac inflatur, & fit in ipso fractura. Et si hanc reseueris, comperies ipsum

Hippocratis Liber I I.

Curatio. ipsum os eleuatum, & asperum, ac fuluū. Quibusdam verò D etiam ad cerebrū vsq; corrosū. Vbi in hoc modo affectum incideris, si quidē vltra corrosū fuerit, sinere optimū est, & vlcus quā celerrimē curare. Si verò corrosū non fuerit, sed asperū, ad secundā vsq; laminā rasum, velut p̄cedens curare. Alius morbus. Si sideratus quis fiat, & anteriorem capitis partē dolet, & oculis videre non potest, sed sopor ipsum tenet, & venæ in tēporibus pulsant, & febris debilis tenet, & totius corporis impotētia, & emacescit. Quum sic habuerit, multa calida ipsum lauato, & calefactoria ad caput adhibeto. A fomentis verò myrrhā & æris florem in nares infundito. Sorbeat autem ptisanæ succum, & aquam bibat. Et si quidem vbi hæc feceris meliūs habuerit, bene est. Sin minus, quæ **E** vna spes reliqua est, sinciput ipsius findito, & vbi sanguis defluerit, labiis compositis curato ac deligato. Si verò non secueris, decimo octauo aut vigesimo die plerunque moritur.

Angina.

Febris corripit & rigor, & dolor capitis: & maxillæ intumescunt, & sputū difficulter deglutit. Expuit autē & saliuas duras ac paucas: & infrā in faucibus stertit: & si apprehēsa lingua inspexeris, gurgulio nō magnus est, sed mollis, fauces autem intrinsecus saliuā viscosa plenæ sunt, & non potest excreare, & decumbere non sustinet, verum si decūbat suffocatur. Hunc si ita affectū deprehenderis hæc facito. Primū quidem cucurbitas ad verticulū in collo primū affigito. Deinde in capite præraso, & iuxta aurē ab vtraq; parte apponito. Et vbi cucurbitā affixeris, ad multū tempus adhærere finito. Postea fomentū ipsi ex aceto, nitro, origano, & nasturtij semine adhibeto. Hæc terito, & cū aceto pari aqua permixta diluito, ac parum olei instillato. Deinde in ollulam infusis, operculo addito arundinē cauiam immittito, & prunis imposita feruefacito: & vbi per arundinis fistulā vapor ascenderit, hiantiore vaporem introtrahat, cauens ne fauces adurat. Forinsecus autē spongas aqua calida imbutas, ad genas ac maxillas apponat. Gargarismus porrò ipsi parādus est, ex origano,atureia, apio, mentha, & modico nitro, cum aqua mulsa aquosiore, & modico aceto instillato, prædictarū herbarum folia trita, & nitrum, in aqua mulsa diluito, reuefacito, ac sic gargariset. At si saliuā supprimatur, myrthi ramulum complana

Gargarismus.

Saliuz purgatio.

A planatū sumito, & tenera ipsius summa parte incuruata, ac molli lana obuoluta, in fauces immissa, saliuā expurgato. Et si venter non egerat, glādem subdito, aut clysterem adhibeto. Sorbeat autē ptisanā succum & aquam bibat. Si verò tumor ipsi oboriatur, & ad pectus intumescat, ac rubicundus sit, & ardeat, amplior spes salutis est. Facienda verò hæc sunt, postquam inflammatio foras conuersa fuerit. Betas in frigidam aquam tinctas apponat. Tepidas collutiones ore gargariset, & ne lauet. Hæc faciens maximè euaserit. Est autē morbus lethalis, & paucissimi euadunt. Alia angina. *Secunda angina.* Febris & dolor capitis corripit, & fauces inflammantur, itémq; maxillæ, & saliuam deglutire nō potest, sputat autem crassam ac multā, & difficulter loquitur. *Medela.* Quum ita habuerit, primū cucurbitam affigito, eodem modo veluti suprà diximus. Deinde spōgiam aqua calida imbutam, ad collum ac maxillas adhibeto. Aquam autem mulsam aquosam colluēdam dato. Et succum ptisanæ sorbere cogito. Si verò ipsi talia facienti saliuā non exierit, eodem modo velut in priore fomentū adhibeto. At si ad pectus conuertatur inflammatio, aut ad collum, betas aut cucurbitas cōcisas, in frigidam aquam tinctas superimponat, & frigidam aquam bibat, quo saliuā facilius excreetur. Cū autem ad pectus extumuerit, plei i q; euadūt. Si verò faucibus ac tumoribus sedatis, morbus ad pulmonē conuersus fuerit, febris statim corripit, & lateris dolor, & ut plurimum moritur, vbi hoc factum fuerit. Si verò quinque dies effugerit, suppuratus sit, si nō ipsum statim tussis inuasērit. Si verò inuasērit, facta excreatione depurgatus, sanus sit. Huic quā diu dolor latus tenuerit, latus calefaciēdum est, & adhibenda quæ in peripneumonia adhiberi solent. At si quinque dies effugerit, & febris remiserit, tussis autē remanserit, primis quidem diebus sorbitionibus vtatur. Postquam autem cibos sumere inceperit, quā pinguiissimos ac maximè salios edat. Quod si tussis non affuerit, nimirum suppuratum fieri scito, & vbi cœnauit cū dormire volet, allium edat crudum quā plurimum, & vinum insuper bibat vinosum meracius. Et si quidem ita pus eruperit, benè habet. Sin minus, postridie calida loto suffitum adhibeto, & si eruperit, velut suppuratum curato. Alia angina. *Tertia angina.* Lingux posterior pars inflammatur, itémque locus sub tonsillis ad guttur,

Medela. tur, & neque saliuam, neque quicquā aliud deglutire potest. Si **D** verò coactus fuerit, per nares ipsi effluit. Quum ita habuerit mentam viridem tritam, apium, organū, & nitrū, & rhoem rubrum melle diluito, & ad crassam formā redacta, intus linguae qua parte tumet illinito. Postea ficus aqua coquito, & de rhoe parum tritū, hoc ficuum decocto diluito, ac gargarisandum dato si id potest, sin minus colluendum. Bibendam verò aquā de farina crassa in ipsa macerata exhibeto. Foris autem ceruicem & maxillas, farina calida in vino & oleo cocta integito, & panes calidos apponito. Suppuratur enim plerunque in loco sub tonsillis, & si quidem sua sponte eruperit, sanus fit. Si verò non rumpatur, ubi digito contigeris an molle sit, feramento acuto ad digitum alligato perforato. His adhibitis **E** multi sani fiunt. Est autem hic morbus minimè lethalis.

Vua morbus.

Si vua morbus in faucibus fiat, summa gurgulionis pars aqua impletur, & rotunda fit ac pellucida, & spirationem intercipit. Et si maxillae ab utraque parte inflammatae fuerint, suffocatur. Si verò ipse morbus per se consistat, maxillis **Medela.** non inflammatis, minus moritur. Quum sic habuerit, gurgulionem digito apprehensum sursum ad palatum apprimito, & summam ipsius partem praescato. Postea foliorum hortensium condimentariorum decoctum gargarisandum dato, & farinam frigidam delingendam, aquamque insuper bibendam: & ne lauet. **F**

Tonsillae morbus.

Si tonsillae fiant, intumescunt sub maxillis ab utraque parte, & ad contactum foris durum est tuberculum, & gurgulio totus inflammatus est. **Medela.** Quum sic habuerit, immisso digito tonsillas protrudito, ad gurgulionem autem florem æris siccum illinito, & foliorum condimentariorum hortensium decoctum, velut à Sole calidum gargarisandum dato. Foris qua parte tumor est, ordeaceam farinam in vino & oleo coctam calidam pro cataplasmate apponito. Postquam verò tubercula mollia esse tibi visa fuerint intrinsecus ad contactum, scapello ipsa pertundito. Quaedam etiam sua sponte sedantur.

Tuberculum sub lingua.

Si tuber

A **S**I tuberculum sub lingua, hypoglossis appellatum, fiat, Hypoglossis. lingua intumescit, & pars sub ipsa ac externa ad tactū dura est, & salinā deglutire non potest. Cū sic habuerit, spongiam aqua calida imbutā apponito, & ordeaceam farinam vino ac oleo coctam, foris ubi tumor est imponito, Gargarium factum fuerit, secato. Aliquando verò sua sponte erūpit, & sedatur non sectum. Si verò foras suppurauerit, perurito.

Inflammatiō consistens ad palatum.

SI inflammatiō constiterit ad palatum, intumescit & suppuratur. Quū sic habuerit, tuberculum inurito. Vbi verò exierit pus, reliquū eluito, primū nitro & aqua calida. **B** deinde vino. Postquam autem elueris, vuam passam albam exemptis vinaceis tritam, in vstura locum indito, & ubi exciderit, vino meraco tepido colluat, & ubi edere quid aut sorbere valet, spongiam indat, atq; hæc faciat donec sanus fiat.

Polypus.

SI polypus fiat in naso, ex medio cartilaginum dependet, veluti gurgulio. & ubi expirationē facit, progreditur foras, & est mollis, ubi verò inspirationem facit, retrocedit: & loquitur obscure, & cū dormit, stertit. Quū sic habuerit, spongiam in rotundum concisam, & velut spiram factam, lino Aegyptio obuoluto, ac duram efficito. Sit autem eius magnitudinis, ut ad nāsum quadret. Spongiam verò quadruplici lineo filo deligato, ita ut vnumquodque longitudinem habeat cubitalem. Deinde facto vno ipsorum principio, virgam stanneam tenuem sumito, quæ ad alteram sui partem foramen habeat, & transmissio per foramen filorum principio, virgam in acutam in os transmittito, & attrahito donec filorum principium apprehendas. Postea specillo instar vngulæ bifurcato sub gurgulionem subposito, renitēs trahito, donec polypū extraxeris. Postquam verò ipsum extraxeris, & sanguis fluere desierit, siccum linamentum specillo obuolutum indito, & de cætero æris flore in melle cocto, linamentum illine, atq; sic in nāsum inde. Et ubi iam vlcus curatum fuerit, plumbū efformatum ita ut ad vlcus perueniat, melle illine, & donec sanus fiat, appone. Alius polypus. Impletur nāsus carnibus, & ad cōtactum caro dura apparet, & per nāsum

Hippocratis Liber I I.

Medela. sum spirare non potest. Quum sic habuerit, fistula immissa, D
ferramentis tribus aut quatuor vrito, & post vstionem vera
trum nigrū triticū iniicito, & postquā cōputruerit ac excide
rit caro, linamenta melle illita cum aris flore indito, & vbi
curatū fuerit vlcus, plumbeas massas sine fistulas melle illi-
tas immittito, donec sanus fiat. Alius polypus. Intrinsicus

Medela. ex cartilagine caro rotūda prominet, quæ ad cōtactum mol-
lis est. Cū ita habuerit, chordam nerueam accipito, & fa-
cta in ipsa parua ansula, eam tenui filo obligato, deinde alte-
rum principiū per ansulam trāsmittito, alia maiore ansula fa-
cta. Postea principium illud per virgam stanneam transmit-
tito. Deinde ansam illam maiore in nasum indito, & specil-
lo insecto ipsam circū polypum obducito ac adaptato, & vbi
circumsita fuerit, virgam in os transmittito, & a reptam ip- E
sam trahito, eodem modo specillo instar vngulæ bifurcato
supposito sub gurgulione ac renitente. Postquā autem extra-
xeris, curato velut superiorem. Alius polypus. Intrinsicus

Medela. circa cartilaginem alicunde durū quid nascitur, & videtur
quidem caro esse, si verò ipsum attigeris, strepitum edit ve-
lut lapis. Cū sic habuerit, fillo per scalpellum naso expur-
gato, deinde inurito. Atque hoc facto nasum rursus cōsuto,
& vlcus curato, linamētum melle illitum indens, & vbi con-
putruerit, aris florem cum melle illinito. Fiat autem cura-
tio plumbeis massis itidem immixtis. Alius polypus. Nascū-
tur ex obliquo cartilaginis in summo, velut cæcelli. Omnes
autem hos vrere oportet, & post vstionem veratrum in- F
spargere. Postquam autem computruerint, aris fore cū mel-
le expurgare. Curatio autem etiam plumbo immisso fiat.

Morbus regius niger.

Color fit niger circa faciem, & maximè circa partes ve-
lut in vmbra occultatas: & oculi cum virore pallidi,
itēque lingua infernè, & venæ sub lingua crassæ ac nigra:
& est homo sine febre, ac mingit vrinam crassam, biliolam.

Medela. Quum ita habuerit, primū venas sub lingua secato, dein-
de calida multa loto, asphodeli radices bibendas ieiuno da-
to, ita vt æquales quinque radices depurgatas in vino co-
quas, & apij foliorum quantum manu plena capit, addas. Af-
fundito autem vini dulcis tres heminas dimidiatas Aeginē-
ses

A ses, vt à coctura semihemina, super sit. Hoc permixtū bibendum dato. Postquā autem minxerit, cibus aluum subeuntibus vtatur, & à cibo cicer album edat, & vinum album, multum, aquosum bibat: & apium ac porrum in cibo edat, faciat autem hæc per dies septem, & si quidem in his color probè depurgatus esse tibi visus fuerit, bene est. Sin minùs, etiam alios tres hæc faciat. Postea interposita vna atque altera die, medicamentum ad nares apponito. Deinde pharmacum deorsum purgans bibendum dato, à quo bilis purgatur. Et si splenicus fuerit, asininum lac aut serum postea exhibeto. Hæc faciens, sanum efficies. Alius morbus regius. Febris corripit debilis, & grauitas caput tenet, & quibusdam sanè febres cessant, Ipse verò sit cū virore pallidus, & maximè oculi, & debilis est, & corporis impotentia adest, & vrinam crassam cū virore pallidam emittit. Hunc calida lauato, & vrinam cientia bibenda dato. Postquā autem purior esse tibi visus fuerit, & color melior apparuerit, medicamentum ad nares appone, & postea deorsum purgans bibendum præbe. Cibus autem veatur quā mollissimis. Vinū bibat album, dulce, aquosum, Hæc faciens sanus euadet.

Febris à bile.

Si bile infestatur homo, febris ipsum corripit quotidie, ac dimittit. Detinet autem in meridie, & os amarum est, & quum sine cibo manet, offendit hoc ipsum. Vbi verò ederit, strangulatur, & à modicis quibusdam cibus impletur, & abominatur, & vomitiones ipsum inuadūt, & ad lumbos accura grauitas incumbit, & multum dormit. Hic si post febrem exudarit frigidum ac multum sudorem, & febre non libere tur, morbum diuturnum sentiet. Si verò non sudarit, citius iudicatur. Quum sic habuerit, & ad nonum diem deuenierit, pharmacum dato. Nam si statim à febris initio dederis postquā purgatus est, febris repetit, & rursus medicamentum opus habet. At si os non afficiatur, verum ad imum ventrem tormē irruat, pharmacum deorsum purgans bibendū dato, & postea lac asininum, aut serum, aut aliquem succum. Si verò debilis fuerit, per clysterem subtus eluito. Ante medicamento verò potionē, si quis febriat, danda est ipsi aqua mulsā aquosa. Altera autem die qua febris detinet: aquam frigidam quantum bibere voler, dabis. Vbi verò remiser

Hippocratis Liber I I.

Continua
febris.

Curatio.

Medela.

Tertiana
febris.

Medela.

Medela.

miserit febris, ptisanæ succum, aut milium tenue sorbeat, & D
vinū album, odoratū, aquosum insuper bibat. Si verò febris
neq; noctu, neq; interdiu remittat, & ad cōtactum supernas
partes habeat calidas, venter autem & pedes frigidi sunt, &
lingua aspera: huic medicamētū ne dederis, sed molli infuso
per clysterē subluito, & ptisanæ succū bis in die frigidū sor-
bendum dato, & vinū aquosum insuper bibendum. Reliquo
verò tempore aquā frigidissimā bibat. Hic si quidē septima
die exudarit, & febris ipsum dimiserit, bene est. Sin minus,
decimaquarta die plerūq; moritur. Alia febris. Foris ad
cōtactum febris debilis est, intrinsecus autē ardet, & lingua
ipsius aspera est, & per nares & per os spirat calidum. Quin- E
ta die præcordia dura sunt, & dolor inest, & calor qualis in
morbo regio apparet, & crassam ac biliosam vrinam eiicit.
Hūc si septima die rigor & febris vehemēs apprehenderit, &
exudarit, bene est. Sin minus, moritur septima aut nona. Cor-
ripit autē maximē hic morbus, si nō annus squalidus fuerit.
Quū sic habuerit, quotidie calida lauato, aquāmq; mulsam
aquosam multā bibendā dato, & ptisanæ succū frigidū bis in
die sorbendū. A sorbitione verò vinū bibat aquosum, albū,
modicū. Si verò alius nō egerat, clysterē adhibeto, aut glan-
dulam subdito. Cibū autem ne exhibeas, donec febris remit-
tat. Vbi verò sedata fuerit, pharmacū deorsum purgans bi-
bat. Reuertitur enim quandoq; morbus, si impurgatus per-
manferit. Et ampliūs morbus hic rursus corripit, si sanguis
nimiū biliosus fact⁹ fuerit. Alia febris. Si tertiana febris te F
nuerit, si quidem nō omisis tribus inuasionibus, quarta cor-
ripiat, pharmacū deorsum purgans bibendum dato. Si verò
pharmaco non opus habere tibi videatur, radicū quinque-
folij tritarum acetabuli mensurā, ex aqua bibēdam dato. Si
verò neq; sic cesset, multa calida loto, trifoliū, & silphij suc-
cum, in vino pari aqua ammixta, bibenda præbeto, & recli-
nato vestimenta multa integito, donec exsudet. Postquā
verò exsudarit, si sitiāt, polētā cum aqua bibat. Vesperi au-
tem milium coctum tenue sorbeat, & vinum insuper bibat,
donec febris cesset: & cibis quā mollissimis vtatur.

Febris quartana.

Q Vum febris quartana ex alio morbo non purgatum ap-
prehenderit, pharmacum deorsum purgans bibendum
dato.

A dato. Deinde caput purgato. Postea rursus infra purgato. Si verò his factis non cesserit, interpositis duabus inuasionibus post purgationem infernam, multa calida ipsum lauato, & seminis hyoscyami milij magnitudinem, & mandragoræ tantundem, & succi silphij trium fabarum magnitudinē, & trifolij tantundem, in vino meraco bibat. At si firmus & sanum se esse putans, ex lassitudine, aut profectione febre correptus, ad quartanā deueniat: fomentis ipsi adhibitis allium dato in melle tinctum. Deinde lenticulæ decoctum bibat, melle & aceto ammixtis. Postquam autem repletus fuerit, vomat. Postea calida lotus, vbi frigidus factus fuerit, cyceonem ex aqua bibat. Vesperis cibus mollioribus & nō multis vtatur. Altera verò exacerbatione, vbi multa calida laueris, & stragula ipsi intexeris, donec exsudet, statim veratri albi radices trium digitorum longitudine, & trifolij drachmam, & succi silphij duarum fabarum magnitudinē, & in vino meraco bibat. Et si vomitiones ipsum vrserint, vomat. Sin minus, post caput purgatum. Cibus autem vtatur quā mollissimis & acerrimis. Quum verò exacerbatio ipsum inuaserit, ieiunus medicamentum ne bibat.

Pleuritis.

Pleuritis vbi corripuerit, & febris & rigor tenet, & dolor per spinam ad pectus, & erectæ cervicis spiratio, & tussis, & saliuæ alba ac subbiliosa, & nō facile per tussim reiecit, & per inguina dolor est, & cruentā vrinam mingit. Quum ita habuerit, si quidem febris septima die remiserit, sanus euadit. Si verò nō remittat, deuenit morbus ad vndecimum *Medela.* aut decimū quartum diem. Et sanè multi in his diebus moriuntur. At si decimū quartum trāsgrediatur, euadit. Quum ita habuerit dolor, calefactoria adhibeto. Bibat autem mel, æquali aceto affuso coctum, ita vt quanta fuerit mensura cocti mellis & aceti, vnde uigesimalam partē aquæ affundas. Hoc paulatim & frequenter bibendum dato: & postea quoque aquam modico aceto affuso ammisceto. Sorbeat & milij sucum, melle modico adstillato frigidū, quartæ heminae partis mensura, quoties vtrunque cibum sumit, & bibat vinum album vinosum, aquosum modicum. Sit autem vinū quā mollissimum, odorem nō habens. Vbi verò febris dimiserit, per biduum miliū bis in die sorbeat, & betas iucundissime

Hippocratis Liber I I.

paratas edat. Deinde catulum aut auiculam coquat, & ius D
sorbeat, & de carnibus parum edat. Reliquo vero tempore,
maximè quando à morbo tenetur: in prandio milium su-
mat, vesperi cibis paucissimis ac mollissimis vtatur. Alia
pleuritis. Febris tenet, & tussis, ac rigor, & dolor ad latus, &
quandoque ad clauicula[m] saliuam sput subbiliosam ac
Medela. ac subcruentam. Quòd si agro abscessus ruptus fuerit, qua
parte dolor maximè vrget, calefactoria adhibeto, & calida
lauato, si non magna febris ipsum teneat. Sin minus, non. Pi-
bendum autem dato fauum in aqua maceratum, ita vt aqua
iam subdulcem facias, & postea quoq; aquam ammiscens.
Sorbeat ptisanæ succum bis in die, & vinum inde bibat al-
bum, aquosum. Et si quatuordecim dies effugerit, sanus eu- E
dit. Alia pleuritis. Febris detinet, & dentium stridor, & tussis
sicca, & cum virore pallida reiicit, quandoq; etiam liuida: &
dolor latus corripit, & dorsum subrubidum fit. Caput & pe-
ctus calefcunt, aliquando etiam venter, & pedes, & crura. Et
quum erectus sedet, magis tussit: & aluus turbatur, & alui
egestio cum virore valde pallida est, ac graueolens. Hic in vi-
Medela. ginti diebus moritur. Si verò hoc effugerit, sanus fit. Huic do-
nec quatuordecim dies præterierint, aqua de farina crassa in
ipsa macerata bibenda dato, & vinum album vinosum, aquo-
sum postea bibendum. Sorbeat succum ptisanæ frigidum, bis in
die. Verum præ melle mali punici succum, ad ptisanæ succum ad-
misceto, postquam hic ptisanæ succus coctus fuerit, & lauet F
non multa. Vbi verò quatuordecim dies præterierint, in pran-
dio miliumumat. Ad vespertam carnibus auicularum, cum iuseu-
lo, & paucis cibis vtatur. At talem morbum pauci effugunt.

Peripneumonia.

Febbris detinet dies quatuordecim vt minimum, ad sum-
mum duas de viginti, & per hos dies fortiter tussit, & pri-
mum quidem excreat saliuam crassam ac puram, septima &
octaua die. Si verò febris corripuerit, nona ac decima, sub-
dulce & purulentum, donec quatuordecim dies præterierint.
Et si quidè decimaquinta die pulmo resiccatus fuerit, & tuf-
fiendo reiecerit, sanus fit. Sin minus, duas de viginti obserua-
to, & si quidem in his diebus tussis sedata fuerit, euadit. Si non
sedata, interrogato ipsum, an saliuam ipsi dulcior appareat, &
si hoc confessus fuerit, morbus annum durabit. Nam pulmo sup-
puratus

A puratus fit. Huic primis diebus vinum dare conuenit dulce, album, aquosum, paulatim frequenter bibendum. Sorbeat *Medela*. etiam ptisan e succum melle ammixto bis, in die, donec dies decem & octo praterierint, & febris desuerit. Periclitatur autem maximè in septem, aut quatuordecim. Postquam autem decem & octo dies transgressus fuerit, non amplius moritur, sed pus sput, & pectus dolet, & tussit. Quum sic habuerit, ieiunus cum salua vini illam potionē bibat, & leguminis fressi decoctum sorbeat, adipe multo ammixto, si non calor fuerit. Si verò fuerit, ne sorbeat, sed cibis vtatur salis ac pinguibus, & marinis potius quàm carnibus. Et si pro ratione purgari tibi visus fuerit, in os infundito, ac fomenta adhibeto, si quidem crassum fuerit pus, fomenta adhibeto: si verò tenue, infundito & ex cibis hæreat quàm maximè, & ab acris abstinenceat, & a carnibus bubulis, ouillis, ac porcinis.

Suppuratus ex peripneumonia.

Q Vum ex peripneumonia suppuratus factus fuerit, febris detinet, & tussis sicca, & difficultas spirandi, & pedes intumescunt, & manuum ac pedum vngues contrahuntur. Hunc ita effectum ad decimam diem à suppurationis *Medela*. initio pregressum, multa calida lauato, & ari radicem tali magnitudine tritam, & salis granum, & modicum mellis, & aquam, & olei parum, extracta lingua tepida infundito, & postea humerum concurito. Et si quidem ab his pus erumpat, bene habet. Sin minus, aliud facito. Cibos acres & cyclaminum exsuccato, sitque succi vtrorunque acetabulum paruum, deinde silphij succum fabæ magnitudine terito ac diluito, & lactis caprini aut asinini acetabulum ammisce-
C to. Hoc tepidum infundito. Quod si ab hoc non erumpat, raphani corticem, & æris florem, trium fabarum magnitudine terito: Sit autem raphani duplum: & oleo diluito quarta hemina parte. Hoc tepidum infundito. Et si eru-
rit pus, cibis quàm salissimis ac pinguisimis vtatur. At si non prodierit pus, paulatim fomentum adhibeto in os, ex
sij succo, vino Tornio, lacte bubulo, aut caprino, singulis pari mensura permixtis, ita vt sint heminae tres, in quas postea furni testas igni candefactas iniicito, atque inde vaporem per fistulam trahat, cauendo vt ne aduratur. Postquam autem purius iam sputum prodierit, vrticæ semen,
thus,

Hippocratis Liber I I.

thus, origanum in vino albo, melléque ab oleo modico, ipsi **D**
 infundito, idque per tertium diem. postea verò butyrum, re-
 sinam in melle eliquatā. Et cibis non amplius vtatur salis,
 neque pinguibus. At diebus interpositis, infusionum oris vsu
 cessante, saluiam, rutam, satureiam, origanum, pari portione
 ieiunus ex vino bibat acetabuli mensura, omnibus illis in-
 sperfis. Quòd si ab infusionibus his oris non eruperit, nihil
 miri est. Sæpe enim prorumpit ad aluum, & statim melius
 habere sibi videtur, vbi ex angusto ad ampliorem regionem

Vomica in
terior qui
signatur.
Curatio
quæ.

Pus de vo-
mica qui
educatur.

deuenerit. Alius morbus. Quum tēpus longius protrahi-
 tur, & febris vehemens actusis corripit, & latus dolet, & ad
 sanam partē decumbere non potest, sed ad dolentē, & pedes, **E**
 & oculorū cavitates intumescunt. Hunc vbi decimus quintus
 ab eruptione dies adest, multa calida lotum in sella firma
 collocato, & alius quidē manus ipsius teneat, tu verò hume-
 rum cōcutito, vt audias in vtrū latus affectio strepitū edat:
 optandum autē esset in sinistrum. Hunc ipsum igitur locum
 seces, minus enim lethalis est. Si verò præ crassitudine ac co-
 pia strepitum non edat, quo ipsum cognoscere possis, (nam
 hoc aliquando contingit) vtrum latus tumuerit ac magis
 doluerit, hoc infime secato retro tumore magis quàm ante
 ipsum, quo puris exitus facilem fluxionē habeat. Secato au-
 tem inter costas per nouaculam primum cutem, deinde scal-
 pello acuto, quod panniculo sit obligatū, ita vt summa ipsius
 pars, ad vnguis magni digiti mensurā expedita restet, quam **F**
 intromittas. Postea emissio pure quantū visum fuerit, vul-
 nus linamento ex lino crudo, alligato foras propendēte filo,
 concludito: & quotidie semel pus educito. postquam autem
 decimus affuerit dies, omni pure emissio linamentum ex lin-
 teo indito. Deinde vinū & oleum tepesacta per fistulam in-
 fundito, ne pulmo à pure humectari solitus derepente resic-
 cetur. Emmittendum autem est id quod mane infusum est, ad
 vesperā: quod vespera, mane. Vbi verò pus tenue velut aqua
 fuerit, & ad digiti cōtactum viscosum ac modicum, penicil-
 lum stanneum cauum indito. Postquam autē omnino ven-
 ter resiccatus fuerit, paulatim linamentū præfectum minui-
 to, donec vlcus coalescat, & ipsum penitus eximas. Signum
 autē an euasurus sit habes: si pus album ac purum fuerit, &
 fibræ sanguinis insint, plerunque sanus fit. Si verò prima die
 profluat

- A profluat lutei oui speciem habens, aut secunda die defluat crassum, cum virore subpallidū, fœtens, moriuntur vbi pus effluxit. Alius morbus. Quum quis ex pulmonis affectu tabescit, is saliuā crassam, cum virore subpallidam, dulcem, tussiendo reiicit, & stridor ac dolor ad pectus & ad dorsum fit, & in faucibus tenuis sibilus auditur, & fauces siccae sunt, & oculorum cavitates rubicundæ, & vox grauis, & pedes intumescunt, & vngues contrahuntur, & supernæ partes attenuantur ac imminuuntur, & saliuā abominatur vbi exscreaturus ipsam in ore habet, & tussit mane maximè & circa mediam noctem, imò etiam aliis temporibus. Et corripit magis hic morbus mulierculā iuuenulam quàm vetulam.
- B Huic si iam pili de capite defluant, & nudum sit caput, velut ex morbo: & si prunis inspuenti saliuā graueolens sit, intra breue tempus ipsum moriturū esse pronuncia, id verò quod occidet, alui profluuium fore. Vbi enim iam pus circa cor putruerit, nidorosum odorē prunis iniectum de se præbet: & cerebrum cōcalescens salsuginosum humorem effundit, qui aluum mouet. Huius autem signum est, quod capilli ex capite defluunt, Hunc vbi ita habuerit ne curato. Si verò à principio morbus obrigerit, lenticulæ decoctum bibendum dato. Deinde interposita vna die, veratrum dato temperatum, vt ne aluum infernam moueat. Et quum noctu ad os salsuginosus humor ipsi influit, medicamenta ipsi frequentiora ad nares appone. Si verò non fluit, appone quidē sed rarius, & mense semel, ita vt insuper veratrum bibendum des, quantum duobus digitis comprehendi potest, in vino dulci temperato. Statim verò lenticulæ decoctum inde bibendum dato. At medicamenta quàm paucissima bibat, si non febres acutiores ipsum corripiāt. Radicem dracontij albam, & veratri delingat, sed non ex melle. Sic enim minimè aluum mouebit. Si verò tormen in aluo inferna oboriatur, primū per clysterem illud infusum immittito, in quod coccus cni-
dius ammiscetur. Quòd si neque sic sedetur, lacte asinino cocto purgato, pharmacum autem nullum deorsum purgans dato. Si verò ante medicamentum, præpotato veratro bilem vomat, ab ipso lenticulæ decocto accepto vomat. Cibis autem vtatur, si febres acutæ tenuerint, carnibus ouillis coctis, & volucrum, & cucurbita, & beta. Iusculum autem ne
forbeat,

Tabes.

Signa mor-
tis.

Medela.

Coccus cni-
dius.Cibus qua-
lis.

Hippocratis Liber I I.

forbeat, neque ad intinctus vtatur. Piscibus vtatur scorpiis, D
& cartilaginei generis coctis. Calidum verò nihil edat, neq;
lauet si febris multa teneat. Neque oleribus acribus vtatur,
præterquam satireia, aut origano. Vinum bibat album. Si
verò sine febre sit, calores autem aliàs atque aliàs corripiant,
piscēs edat optimos ac pinguisimos. & pinguia, & dulcia, &
quàm maximè salsa. Et deambulationibus vtatur, neque in
vento, neque in sole. Et à cibis vomat, vbi tempestiuum vi-
sum fuerit. Et calida lauet, capite excepto. Ex cibis frumen-
taceis præstat panis, his qui non mazam edere soliti sunt,
Mazam verò edere solitis, vtraque dato.

Alius morbus appellatus Tabes.

T Vsis vexat, & sputum multum ac liquidum, & quan- E
doque facilè rufiando reiicitur etiam pus, veluti gran-
do. quod dum digitis conteritur, durum & male olens est. At
vox pura est & doloris exors, & febres nō corripunt, verū
calor quādoque aliàs atq; aliàs, atque hic debilis. huic vera-
trum bibendum est, & lenticulæ decoctum, & large cibus su-
mendus, ita vt abstineat ab acribus, & carnibus bubulis ac
porcinis & ouillis. Exerceatur modicè & deambulet, & à ci-
bis vomitu vtatur. A Venere abstineat. hic morbus per an-
nos septem aut nouem durat. quòd si ab initio æger curatus
fuerit, sanus euadit. Alius morbus. Si ex feruido vlcere,
aphtha appellato, pulmonis fistula laborarit, febris debilis
tenet, & dolor mediū pectus, pruritus corporis adest, & vox
raucosa, & saliuam liquidā ac tenuem spuit: quandoq; etiam F
crassam, velut ptisanæ succum. Et in ore odor oboritur ipsi
grauis, velut à piscibus crudis, & aliàs atq; aliàs in saliuā ap-
parent dura, velut fungus ab vlcere, & supernæ partes atte-
nuantur, atque adeò homo totus: & circuli faciei rubescunt,
& progressu temporis vngues contrahuntur, & aridi ac cum
virore pallidi fiunt. Moritur autem statim, si non curatus
fuerit, sanguinem ac pus spuens. postea etiam febres vehe-
mentes accedentes ipsum perimunt. Si verò curetur, effugit
ex hac tabe. Curare porrò oportet, vt lenticulæ decocto po-
to vomat. Quòd si tempestiuum esse visum fuerit, veratrum
bibat, siquidem potens fuerit homo, per se. Sin minus, dimi-
dium potionis ad lenticulæ decoctum ammisceto, ita vt in
quinta aut sexta potione desinat. At ventrem infernum me-
dica

Medela.

Pulmonis
fistula affe-
cta quid fa-
ciat.

Medelama-
li huius.

A dicamento ne moueas, si non febres fortes corripuerint. Si non autē corripuerint, lacte asinino subitus purgato. Quod si debilis sit, ut bibere non possit, per clysterem infundito. Minus autem caput moueas, & si quidem saliuā ad os prodierit multa ac fassuginea ~~ad nates~~ apponito quid, quod bilem non ducat. Si verò fluxio ad os non fiat, nihil capiti adhibeto, ubi autem saliuā graueolens fuerit, interpositis inter lenticule decocti vsu diebus, medicamentum in pulmonem infundito, & interposita vna die suffūto. Cibis vtatur carnibus ouillis & volucrum, & piscibus cartilaginei generis, & scorpiis coctis. Quarto verò quoque die fassamentum edat optimum ac pinguisimum, & in prandio mazamumat, in coena verò etiam panem ad hanc addat, & nihil forbeat, neque cyceonem bibat, si edere poterit. Porro obsonia condat ac edat sesamo pro tritico, & coriandro ac anetho. Silphio autem ne vtatur, neque alio copiam olere acris, præterquam origano, aut timo, aut ruta. Deambulationibus autem vtatur ante & post cibum, vitans ventum & solem. Ab ebrietatibus & re venerea abstineat. Lauet tepida, excepto capite, quod quam rarissimè lauari debet.

Tabes dorsalis.

Dorsalis tabes à medulla fit. Corripit autem maximè ~~recentes sponfos, & veneri deditos.~~ Sunt autem sine febre, & bene cibum capiunt, ac consumuntur. Et si interrogas ita affectum, dicet sibi superne de capite in spinam velut formicas descendere videri, & ubi mingit, aut ventrem exonerat, prodit ipsi genitale semen multum ac liquidum, & genitura in vtero non manet, & in somnis semen profundit, siue dormiat cum vxore siue non. Et quum iter fecerit aut currenit, tum alias, tum ad accliuem locum, anhelatio ac debilitas ipsum corripit, & capitis grauitas, & aures sonant. Hunc temporis progressu ubi febres fortes ipsum corripuerint, perdunt febres ~~lipyria.~~ Quum ita habuerit, si ab initio curandum suscepis, fomento per totum corpus adhibito, medicamentum sursum purgans bibendum ipsi dato, & postea caput purgato. Deinde deorsum purgans exhibeto. Optandum autem fuerit ut vere hanc curationem aggrediamur. Postea verò serum aut lac asinum bibendum dato. Cæterum bubulum lac per quadraginta dies bibendum præbeto.

Seminis
clandestina
fluxio.

Medela.

Hippocratis Liber I I.

beto. Ad vesperam verò quàm diu lac potat, alicam sorben- D
dam dato. A cibis autem abstineat. Postquàm verò lac bibe-
re cessarit, cibis mollibus ipsum reficito, ex modico initium
sumens, & quàm maximè crassum ac pinguem facere stude-
to. Per annum ab ebrietatibus, & ~~venere~~, & laboribus absti-
neat, exceptis deambulationibus, in quibus vitet frigus & So-
lem. Tepida autem lauer.

Pulmonis morbus.

S Aliua crassa ac fuliginosa tussi reiicitur, & color niger, ac
subturgidus est, & dolores tenues sub pectus & sub scapu-
las fiunt: & vlcera ipsis agrè sanescunt. Minus tamen pericu-
Medela. losus est hic morbus superiore, & plures euadunt. Hunc ve- E
raturum bibere oportet, & per se, & lenticula decocto amni-
xtum. Infundere etiam in pulmonem oportet ac suffitum fa-
cere. Cibis quoque largè vtatur, abstinendo à carnibus bubu-
lis, ouillis, & porcinis, & ab acribus oleribus, præterquàm
origano, aut satureia. Vtatur deambulationibus. Mane verò
ieiunus ad accliuem locum iter faciat. Deinde folia condi-
mentaria hortensia bibat in vinum temperatum inspersa.
Deinde verò cibis relatis vtatur.

Arteria vulnerata.

S I vulnerata fuerit arteria, tussis habet, & sanguinem tuf-
siendo reiicit, & fauces sanguine latenter implentur, &
grumos eiicit, & dolor fit acutus ex pectore ad dorsum, & sa-
liua viscosa ac multa, & fauces siccae, & febris ac rigor corri- F
pit, & strident fauces velut à pinguedine, atque hæc ad quin-
decim dies patitur. Postea verò pus spuit, & velut vlceris rici-
nos, bronchia in pulmone cartilaginosa, & rursus tussit, & sa-
nè sanguis erumpit, & postea pus crassius spuit, & febris for-
tior fit, & in pulmonem desinit, & vocatur ruptio pulmonis.
Medela. At si post primum sanguinem pus non spuat, à laboribus ac
exercitiis quiescere oportet, & vehiculum inscendere absti-
neréque à cibis salis, ac pinguibus, & ab oleribus acribus, &
postquam ipse seipsum optimè corpore affectum esse putat,
pectus ac dorsum inurito, ex parte vtrunq; & postquàm vlcera
sana fuerint, per annū abstineat ab ebrietate, & ne nimium
impleatur, neque manibus laboret, neq; vehiculum inscen-
dat, sed studeat vt corpus quàm maximè crassum efficiat.

Articuli

A

Articuli pulmonis conuulsi.

Qum articuli pulmonis fuerint conuulsi, sputum spuit album, quandoque verò cruenta, & desipit, & febris tenet, & dolor pectus, dorsum, ac latus: & si se vertat, tussit & sternutat. Huic qua parte dolor fuerit calefactoria apponito, & centaurei, & daucum, & saluæ folia trita, melle & aceto affuso, præforbenda dato, & aquam insuper sorbendam. Et ptisanæ succum præsorbeat, & vinum aquosum insuper bibat. Postquàm verò dolor sedatus fuerit, saluiam tusam ac cribratam, & hypericum, & irionem trita, & polentam, singula paribus portionibus, in vinum temperatum coniecta, ieiuno bibenda præbeto. At si ieiunus nō sit, leguminis fressi decoctum sine sale sorbendū dato. Si verò calor fuerit, cibis vtatur mollissimis, non salis, & minimè nidorosis, vbi iam probè se habuerit corpus, & in pectore, & in dorso. At si ambo conuulsa fuerint, tussis emergit, & saliuæ crassa ac alba apparet, & dolor acutus adest ad pectus, & sub scapulas, ac latus: & ardor detinet, & rubicūdis in tibiis circulis impletur, & pruritus habet, & non sustinet neque sedere, neque iacere, neque stare, sed agrè afficitur, ac viribus deficit. Hic quarta die maximè moritur. Si verò hanc effugerit, spes neq; sic multa superest, Verum periclitatur & in septima. Quòd si & hanc effugiat, sanus euadit. Hunc vbi sic habuerit, multa calida bis in die lauato. Et quū dolor habuerit, calefactoria adhibeto, & mel, & acetum bibendum dato, & ptisanæ succum sorbendum, & vinum album vinosum insuper bibendum. Si verò ad balneum & calefactoria affligatur, ipsaque non sustineat, crassi lintei panniculos ipsi adhibeto, quos aqua tinctos in pectus ac dorsum imponas. Et fauum mellis aqua frigidissima macerato, aquamque bibendam dato, & frigidum ptisanæ succum, & aquam insuper bibat, & ad frigus decumbat. Hac facienda sunt. Verum morbus lethalis est.

Curatio.

C

Erysipelas in pulmone.

Si erysipelas in pulmone fiat, tussis habet, & saliuam expuit multam ac liquidam, velut de gutture, non est autē cruenta: & dolor tenet dorsum, & vacuas partes ventris, ac laterum mollitudinem, & viscera sugunt, & vomit pituitam ac velut acetum, & dentes stupefcunt, & febris, ac rigor, & sitis

corri

corripit, & ubi quid ederit, in visceribus fugit, & acidum erud-
 etat, & venter stridet, & corpus torpescit, & ubi vomuerit, me-
 lius se habere putat. Quum autem non vomuerit, digressa die
 tormen & dolor in ventre oboritur, & excrementum alui li-
 quidum procedit, hic morbus maxime fit ex ebrietatibus, &
 carniū esu, & ex aquæ mutatione. Sed & ex aliis causis emer-
 git. Huic pharmacum deorsum purgans bibendum dato, &
 lac asininum insuper bibendum, si non natura fuerit spleni-
 cus. Si verò splenicus fuerit, ne purges, neque succis, neque la-
 cte, neque sero, sed eo quod modicum ingestum multum edu-
 cet. Per clysteres quoque infusio in aluum fiat, & glandulæ
 sudantur in omnibus morbis, si aluus non egerat. Adhiben-
 dum est & frigida lauacrum in hoc morbo, & exercitium, E
 ubi febres remiserint, & corpus leuiter se habere visum fue-
 rit. Et vere & autumnō vomitus inducatur. At verò alij ca-
 pita, & origani pugillum, quantum tribus digitis appren-
 di potest, duabus heminis vini dulcis affusis, & aceti acerri-
 mi hemina vna, & mellis quarta hemina parte, coquito do-
 nectertia pars reliqua fiat. Deinde ubi hominem exercueris,
 & aqua tepida laueris, calidum hoc bibendum præbeto. Da-
 to etiam lenticulæ decoctum, melle & aceto ammixtis, do-
 nec impleatur. Deinde vomat, & ea die pota polenta & aqua,
 ita ieiunus permaneat. Ad vesperam verò betam edat, & pa-
 rum de maza, & vinum aquosum bibat. Reliquo verò tem-
 pore, à lenticulæ decocto, & à cibis vomat. Et si discesserit do-
 lor sub scapulas, cucurbitā affigito, & venas in manibus per- F
 rundito. Cibis porrò vtatur non salis, neque pinguibus. Acris
 autem & acida edat, & frigida omnia. Vtatur & deambula-
 tionibus. Hæc si fecerit, optima victus ratione vsus fuerit, &
 per plurimum tempus morbus prorogari poterit. Est autem
 non lethalis, sed consenescentes relinquit. Si verò iuniorem
 aliquem citius à morbo liberare voles, ubi ipsum purgaris,
 pectus & dorsum inurito.

Morbus dorsalis.

Rigor & febris, & tussis, & spirandi difficultas corripit, &
 saliuam spuit cum virore pallidam, quandoque etiam
 subcruentam: & dolet maxime dorsum & inguina: & tertia
 aut quarta die cruentam vrinam mingit, & moritur septima
 die. Si verò quatuordecim dies effugerit, sanus euadit: effu-
 git

Agit autem non ita valde. Huic aquam mulsam bibendam Medela, dato, in olla noua feruefactam ac perfrigeratam, & apij aut fœniculi radicis cortice in ipsa macerato. Dato & ptisanæ succum bis in die, & vinum album aquosum insuper bibendum. Qua verò parte dolor constitit, calefactoria adhibe. to, & calida lauato, si non febris multa vexet. Postquàm autem quatuordecim dies præterierint, in prandio quidem summat milium, ad vespertinam verò carnes catulinas, aut volucrium, coctas edat: & de iusculo sorbeat. Cibis autem quàm paucissimis primis diebus vtatur.

Tuberculum in pulmone.

B **Q** Vum tuberculum in pulmone natū fuerit, tussis tenet, & erectæ ceruicis spiratio, & dolor ad pectus acutus, & ad lacera, & vsq; ad quatuordecim dies ita afficitur. Nam ple risq; per tot dies tuberculi affectio inflammatur. Sed & caput dolet & palpebras, & videre non potest; & corpus subfuluum fit, ac venis impletur, Hūc multa calida lauato, & aquā Medela, mulsam aquosam bibendam dato, & ptisanæ succum sorbendum, & vinum aquosum insuper bibendum. Si vero dolor vrgeat, calefactoria adhibeto. Vbi autem sedatus fuerit, cibis mollissimis vtatur. Quòd si liberatū à morbo, spirandi difficultas corripiat, dum ad accliuem locū recta pergit, aut aliàs festinat, pharmacū dato, à quo inferna aluus non moueatur. Et si vnā cum vomitu pus sequatur, si quidē pus fuerit albū, **C** & fibræ in ipso suberuentæ fuerint, effugit. Si verò liuidum, & cum virore pallidum, ac graueolens, moritur. Purgantur autem in quadraginta diebus ab ea qua erupit. Multis etiam annuus fit morbus. Hunc velut suppuratum curare oportet. Quòd si non erūpat (multis enim progressu temporis abscedit ad latus, & extumescit) hunc si hoc fiat secato aut vrito.

Pulmo repletus.

S I pulmo repletus fuerit, tussis tenet, & erectæ ceruicis spiratio, ac anhelatio, & linguam exurit, rubicundis circulis in tibiis repletur, & pruritus vexat, & dolor acutus emergit ad pectus & scapulas, & non potest sedere, neque iacere, neq; stare, sed agris viribus est. Hic quarta die maximè moritur. **Curatio.** Si verò hanc euaserit, spes plerunque est, periclitatur tamen etiam in septima. Si verò hanc effugerit, sanus euadit. hunc
vbi

vbi ita habuerit, multa calida bis in die lauato, & vbi dolor **D** habuerit, calefactoria adhibeto. Et mel & acetū cocta bibenda dato, & ptisanæ succū sorbendum, ac vinū insuper bibendum. Si verò ad balneū & calefactoria affligatur, & ipsa non sustineat, perfrigeratoriū ipsi adhibeto: & fauū mellis aqua frigidissima macerato, aquāmq; bibendā dato. Et decumbat ad frigus. Hæc faciat. Morbus autem grauis est & lethalis.

Pulmo ad latus prolapsus.

Si pulmo ad latus prolapsus fuerit, tussis tenet, & erectæ ceruicis spiratio, & saliuam tussiendo reiicit albam & dolor ad pectus & dorsum emergit, & incumbēs pulmo impellit, & graue quiddam in pectore incumbere videtur, & dolores acuti pungunt, & sanguis stridet velut pellis, & spirationem cohibet, & ad affectum quidem latus decubitū sustinet, non autem ad sanū: verū veluti graue quiddā ipsi de latere **E** pendere videtur, & per pectus transpirare se putat. Hunc calida multa bis in die lauato, & aquā mulsam ipsi bibendam dato. Post balneum, vinum album, cum modico melle misceto, & dauci ac centaurij semina trita his diluito, & tepida hæc sorbenda præbeto. Et infusam aquam calidam in vtriculo aut vesicam bubulam, ad latus apponito, & fascia pectori alligato. Decumbat in latus sanum. Ptisanæ succum tepidum præbeto, & vinum aquosum insuper bibendum. At si ex vulnere hoc fiat, aut suppurato secto (fieri enim in his solet) huic vesicam ad fistulam alligatam flatu impleto, ac intro **F** mittito, & penicillum solidum stanneum indito, ac vterius propellito. Sic curationem instituens, maximè profeceris.

Lateris tuberculum.

Quam in latere tuberculum fit, tussis emergit dura, & dolor, & febris, & grauitas in latere incumbit, & dolor acutus in eodem semper loco vrget, & sitis vehemens, & calidum potum auersatur, & in dolens latus decumbere non potest, sed in sanum. At vbi decumbit, velut lapis impendere ipsi videtur, & intumescit, & rubescit, & pedes intumescunt, hunc secato aut vrito. Postea pus emittito, vsque ad decimum diem, linamento ex lino crudo indito. Decima autem die pure omni emisso, vinum & oleum tepida immittito, vt ne derepentè resiccet, & linamento, ex linteolo vrito, **tor,**

A tor, vbi verò id quod infusum est emiseric, aliud infundito. atque hæc per dies quinque facito. postquam autē pus tenue effluerit, velut ptisana succus ac modicum, ad manus contactum, stanneum penicillum indito, & vbi penitus resiccatum fuerit, linamento semper modicè præfecto, vlcus ad linamentum coalescere finito.

Hydrops pulmonis.

SI hydrops in pulmone fiat, febris & tussis tenet, & acerua stim respirat, & pedes tument, & vngues contrahuntur omnes, & patitur talia, qualia is qui suppuratus sit, sed debilius ac diuturnius. Et si quid infundas, aut fomentū aut suffitum adhibeas, pus nō sequitur, atq; ex hoc sanè cognoueris, nō pus, sed aquam intus esse. Et si multo tempore aure ad latera adhibita audire tentaueris, ebullit intrinsecus velut acetum: & hæc quidem aliquandiu patitur, postea erumpit ad aluum, & statim quidem sanus esse sibi videtur, ac à morbo liberatus. Verūm progressu temporis aluus incenditur, eademque illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumescunt ventre, scroto, ac facie. Et quidam ab inferna aluo id esse putant, quum videant ventrem magnum, & pedes tumentes. Intumescunt enim hæc, si sectionis tempus transgrediatis. Hūc si quidem extra intumuerit, inter costas sectum curare oportet. Si verò non intumuerit, multa calida lotum velut suppuratos collocato, & qua parte strepitum perceperis, ea secato quā potes infimo loco, quo effluxio facilis contingat. Postquam secueris, linamētum ex lino crudo indito, ita vt crassum & acutum linamentum facias, & sanguinem paucissimum parcè emittas. Et si quidem in linamento pus adhæserit quinta die, plerunque euadit. Sin minus, vbi aquā exhauseris, sitis corripit & tussis, & moritur.

Curatio
qua.

Pectus aut dorsum ruptum.

SI pectus aut dorsum fuerit ruptum, dolores tenēt pectus ac dorsum perpetuò, & calor aliàs atque aliàs corripit, & saliuam subcruentam tussiendo reiecit, & velut pilus cruentus per saliuam transcurrit. Atque hæc maximè patitur, si manibus quid laborarit, aut in currū aut equum inscēderit. Hunc ante & retrò vritò ex partibus vtroq; loco, & sic sanus euadit. Cæterum per annū à labore se contineat, & ab vstura

Curatio.

y

pingue

pinguefaciendo corpori studeat.

Febris ardens.

Febris tenet, & sitis vehemens, & lingua aspera, & nigra,
 & cum virore pallida, & sicca, & vehementer rubicunda:
 & oculi cum virore pallidi sunt, & excrementum egerit ru-
 bicundum & cum virore pallidum, taleni quoq; urinā min-
 git, & multū sput. Sæpe etiam transmutatur velut ad peri-
 pneumoniā, & delirat. Ex qua re cognoueris quòd peripneu-
 monia sit. Hic si quidem peripneumonicus fiat, & quatuor-
 decim dies trāsgrediatur, sanus fit. Si verò in decem & octo
 diebus peripneumonicus fiat, si non impurgatus permanens
 suppuratus fiat, aquam de crassa farina in ipsa macerata bi-
 bat, & acetum album quā odoratissimum postea bibat, &
 ptisanæ succū sorbeat bis in die, si verò debilis fuerit, ter. &
 vinum vinosum, albū, aquosum insuper bibat, & quā mi-
 nimum lauet. At si suppuratus fiat, velut suppuratū curato.

Peripneu-
monicus.

Medela.

Febris singultiens.

Febris detinet vehemēs, & rigor, & tussis, & singultus, &
 vna cum salua grumos sanguinis tussiendo reiicit, & septi-
 ma die moritur. Si verò decē dies effugerit, melius habet. Ve-
 rū vigesima suppuratur, & primis diebus pus modicū tussie
 do reiicit, deinde amplius. Purgatur autē in quadraginta die-
 bus. Huic primis in diebus acetū & mel cocta bibenda dato,
 & postea acetū & aquam ammisceto, quo aquosior potio fiat.
 Et ptisanæ succum modico melle ammixto sorbeat, & vinū
 album vinosum insuper bibat. Postquā autē decē dies prate-
 rierint, si febris sedetur, & sputū purum sit, ptisanā integrā
 sorbeat, aut milium. At si vigesima die pus spuāt, saluiam, &
 rutam, & satureiam, & organū, ac hypericum, singula equis
 portionibus cōtusa ac cribra permisceat, ita vt omnīū cia-
 thy parui siue cōchæ marinæ sit mensura, & polentæ tantū.
 dem. Hæc ieiunus in vino dulci tēperato bibat. Et si hyems
 sit, aut autūnus, aut ver, sorbitionibus vtatur. Si verò æstas,
 minimē. Verū amygdalas, & cucumeris semē torrefactū,
 & sesamū, singula æquis partibus, vt in totū sit cōchæ mari-
 næ mensura terat, & aquæ heminam Aegineam affundat, &
 farinam ac fauum inspergat. Hæc post potum sorbeat. Cibis
 vtatur pinguibus & salis, & marinis magis quā carnibus.

Ptisana in-
tegra.

Potio quæ.

Calida

A Calida lauet, minimè verò caput. Hæc faciens à morbo liberatur.

Morbus lethargus dictus.

T Vfsis oboritur, & saliuam spuit multā ac liquidam, & nugas garrit, & vbi nugari desierit, dormit: & recremētum malè olens egerit: huic aquam de macerata in ipsa farina crassa bibendam dato, & vinum album vinosum postea bibendum, & prisanæ succum sorbendum Verū huic mali punici succum ammisceto: & vinum vinosum album insuper bibat, & ne lauet. Hic in septem diebus moritur, Si verò has effugerit, sanus euadit.

Curatio.

Morbus siccatorius appellatus.

N Eque sine cibo esse neque cibum acceptū tolerare potest. Verū vbi quidem sine cibo manet, viscera sugūt, & os ventriculi dolet, & aliās alia vomit, & bilem, & saliuā, & pituitam, & acria: & postquā vomuit, aliquantisper melius habere sibi videtur. At vbi cibū accepit, ructus adsunt, & cum rubore exardescit, & semper multum se cacaturū esse putat. Vbi verò ea gratia desederit, flatus prodit: dolor caput habet, & totū corpus velut aciculis pungi videtur, aliās alia parte, & crura grauiā sunt ac debilia, & consumitur, ac debilis fit. Huic medicamentum bibendum dato, primum deorsum purgans, postea supernè: & caput purgato, & à cibis abstineat dulcibus, & oleosis ac pinguibus, & ab ebrietatibus.

Medela.

C Vomat autē à succis, & à cibis, & pro anni tēpore, lac aut serum asininū bibendū præbēs, pharmacū insuper bibendum dato, vtro tandem magis opus esse tibi visum fuerit. Aestate & vere frigida lauet. Autumno autē & hyeme vnguēto vtatur, & deambulet, & modicè se exerceat. Si verò debilior sit quā vt exerceri possit iter, faciat. Et cibis frigidis ac aluū subeuntibus vtatur. Et si vēter nō egerat, molle infusum per clysterem iniicito. Morbus hic diuturnus est, & cōsenescentes, si ita futurum est, relinquit. Sin minùs, commoritur.

Febris interficiens appellata.

F Ebris tenet, & rigor, & supercilia impendere videtur, & caput dolet, & vomit saliuam calidam, & bilem multā, quandoque etiam infra egerit, & loci oculos non capiunt, & dolor ad ceruicem & ad inguina emergit, & affectis viribus

Hippocratis Liber I I.

bus est, & nugas garrit. Hic septima die aut etiam prius mor-
bitur. Si verò hanc effugerit, plerunque sanus fit. Morbus est
Medela. lethalis. Huic perfrigatoria adhibere oportet ad viscera,
& ad caput, & ordeum torrefactū vnā cū paleis fractū aqua
macerare, & de excolata aqua, mulsam facere, atq; hāc aquo-
sam bibendam dare. Cibum autē non offerre, neq; sorbitio-
nem, vsq; ad septimum diē, si non debilis esse visus fuerit. Si
verò sit, ptisanæ succum frigidum ac tenuē modicum, bis in
die exhibere, & aquā insuper bibendam. Postquā verò se-
ptem dies præterierint, & febris dimiserit, miliū lingat, Ad
vesperā cucurbitam, aut betas paucas sumat, & vinum albū
aquosum inde bibat, donec ad nonū perueniat diem. Postea
cibo quā paucissimo vtatur, miliū in prandio sumens. Bal-
neo donec dolor & febris affuerint, ne vtatur. Vbi verò cessa-
uerint, multa lauet. Quòd si venter non egerat, molle infu-
sum per clysterem immittito, aut glandulas subdito. Quum
verò validus factus fuerit, molli pharmaco ad nares apposi-
to, aluum infrā purgato, postea lac asininum bibendū dato.

Morbus liuidus.

Febbris detinet sicca, & horror aliās atque aliās, & caput
dolet, & dolor viscera tenet, & bilem vomit, & quū do-
lor tenet, suspicere nō potest, sed grauatur, & venter durus
fit, & color liuidus, & labia, ac albæ oculorū partes liuescūt,
& aspectū præ se fert velut qui stangulatur. Quandoq; etiā
colorem transmutat, & ex liuido, cum virore subpallidus fit. **F**
Medela. Huic medicamentum & deorsum, & sursum purgans biben-
dum dato, & clysterem adhibeto, & à capite purgato. Et ca-
lida quā minimè lauet, sed & vbi lauerit, ad solem aprice-
tur. Serum etiam & lac asininum pro anni tempore bibat, &
cibis quā mollissimis vtatur & frigidis, abstinēs ab acri-
bus & salis: verū dulcioribus ac pinguioribus vtatur. Cæ-
terū hic morbus vt plurimum cū agro commoritur.

Morbus ructuosus.

Dolor corripit acutus, & dolitat vehementer, & ipse se-
ipsum iactat, & vociferatur, & frequenter eructat, &
vbi eructauit, meliūs habere sibi videtur. Sape etiam bilem
reuomit modicā, poculi parui mensura: & dolor corripit à
visceribus ad imum ventrem, & laterum mollitudinem, &
vbi

- A** ubi hoc factum fuerit, melius habere sibi videtur: & venter inflatur, ac durus fit, & strepit, & flatus non egreditur, neque stercus. Hunc si dolor habuerit, multa calida lauato, & *Medela.* calefactoria ipsi adhibeto. Vbi verò in ventre dolor ac flatus fuerit, clysterem adhibeto, & mercurialis coctæ succum, ad ptisanæ succum ammisceto, ac sorbendum dato, & vinum dulce, aquosum, insuper sorbendum. Cibus autem ne exhibeas, donec dolor remiserit, & vuarum expressarum retrimenta dulcia, per noctem in aqua maceret, & hanc aquam per sex dies bibat. Si verò vuarum expressarum retrimenta non habeat, mel & acetum cocta bibat. Postquam autem dolorem emouerit, medicamento deorsum aluum purgato.
- B** Cibis vtatur inde mollibus & aluum subeuntibus, & marinis magis quàm carnibus, carnibus autem volucrum & ouillis coctis: edat etiam betas & cucurbitam: ab aliis verò abstineat. Morbus hic si iuuenem corripiat, tempore decedit: si seniozem commoritur.

Morbus pituitosus.

- C**orripit quidem morbus pituitosus etiam virum, sed magis mulierem, & est hæc quidem crassa & bene colorata, verum iter faciens debilitatur, & maximè si ad accliuè locum iter faciat. Corripit ipsam etiam febris tenuis, quandoq; etiam suffocatio: & euomit ubi ieiuna est, bilem & saliuas multas, sæpe etiam ubi cibum accepit, de cibo tamen nihil: & quum laborarit, dolet pectus & dorsum, aliàs alia parte, & rubicundis cutis eminentiis impletur, velut ab vrtica inustis. Huic medicamentum bibendum dato, & serum *Medela.* ac asininum bibat. Si verò serum potet, medicamentum deorsum purgans ad plurimos dies præbibendum dato. Et si serum bibere desierit, lac asininum postea bibat, & dum hoc potarit, à cibis quidem abstineat, vinum verò quàm iucundissimum bibat, donec purgari desinat. At ubi à potione cessauerit, milium in prandio sumat. Vespero cibo mollissimo vtatur ac paucissimo. Abstineat à pinguibus & dulcibus ac oleosis. Et aliàs atque aliàs, maximè tamen hyeme, à lenticulæ decocto vomat, oleribus præsumptis. Et calida quàm minimum lauet, sed & ad solem apriceretur. Morbus autem commoritur.

Hippocratis Liber I I.

Pituita alba.

D

INtumesceat totum corpus albo tumore, & venter ad cōtactum crassus est, & pedes ac femora tumēt, Tibiæ item ac scrotum, & acervatim respirant, & facies rubicunda est, & os siccum, & litis tenet, & ubi cibū accepit, spiritus frequens incumbit. Hic eadē die quandoq; melius habet, quādoq; peius.

Curatio.

Huic si quidē venter sua sponte turbatus fuerit in principio morbi, proximus sanitati est. Si verò non turbetur, medicamentum deorsum purgans dato, à quo aqua purgetur. Et calida nō lauet, & sub dio exponatur, & scrotum ubi impletum fuerit secato. Cibis utatur pane puro frigido, & beta, & piscibus scorpiis coctis, iusculo autem quā paucissimo. Et frigida omnia edat, & nō dulcia, neque pingua: sed trita & acida, & acria, excepto allio, cepa, & porro. Origanū verò & satureiam multam edat, & vinū inde vinosum bibat, & ante cibum iter faciat. At si à medicamēto tumeat, clysterē adhibeto, & cibo, deambulationibus, & illuie præmito. Medicamenta verò quā paucissima exhibeto Verum sursum purgans nō prius dederis, quam tumores ad infernas partes descenderint. Quòd si extenuato iam ipso suffocatio in pectore oboriatur, veratrū bibendū dato, & caput purgato, & postea deorsum purgās bibat. Morbus hic maximē à nullo discedit.

Cura, morbus difficilis.

IN visceribus veluti spina esse videtur, & pungere, & anxietas ipsum corripit, & lucē ac homines fugit, & tenebras amat, & timor inuadit, & septum trāuersum foris tumet, & ad contactū dolet, & expauescit, & terriculamēta ac somnia horrenda videt, & quandoque etiā mortuos. Et morbus hic ferē plurimos vere corripit. Huic veratrum bibendū dato, & caput purgato, & post capitis purgationē phar macum deorsum purgans bibat, postea verò lac asininum bibat. Cibis utatur quā paucissimis, si non debilis fuerit, & frigidis, & aluum subeuntibus, & nō acribus, neque salis, neque pinguius neque dulcibus. Et calida non lauet, neque vinum bibat, sed aquam maximē, aut saltem vinū aquosum. Neque exercitiis utatur, neque deambulet. Hæc si fecerit, à morbo liberabitur temporis progressu. Si verò neglexerit, cōmoriatur.

Morbus niger.

NIgrum vomit veluti fecem, quandoque cruentū, quandoque

A doque velut vinum secundarium, quandoque velut polypi atramentum, quandoque acre velut acetum, quandoq; saliuam & pituitā, quandoq; bilem cum virore pallidam. Et vbi quidem nigrum cruentū vomuerit, cadaueris foetorem refert: & fauces & os à vomitu adurūtur, & dentes stupeſcunt, & id quod vomitu reiectum eſt, terram eleuat. Et poſt quā vomuit, paululum melius ſe habere putat. Et neque ſine cibo eſſe, neq; ampliorem cibum ferre poteſt. Verū vbi ſine cibo manet, viſcera ſugunt, & ſaliuę acidę ſunt. Quum verò cibum accepit, grauitas in viſceribus eſt, & peſtus ac dorſum velut ſtilis pungi videntur, & dolor tenet latera, & febris debilis eſt, & caput dolet, & oculis non videt, & crura grauantur, & color niger eſt, & conſumitur. Huic pharmacum bi- Medela.

B bendum dato frequenter, & pro anni tempore & ſerū, & lac. Et à cibis abſtineat dulcibus, & oleoſis ac pinguibus, & frigidiffimis ac maximè per aluum ſubeuntibus vtatur. Et caput purgato, & poſt medicamentorū portiones ſurſum purgantes, de manibus ſanguinē detrahito, ſi non fuerit debilis. At ſi aluus nō egerat, molle infuſum per clyſterem immittito. Et abſtineat ab ebrietatibus & venere. Si verò coierit, ieiunus fomentis vtatur. Et à ſole abſtineat, neque multum ſe exerceat, neque deambulet, neque calida lauet, neque acria edat, neque ſalfa. Hęc facienda ſunt. Et vnā cū ætate aufugit etiam morbus, & cum corpore ſeneſcit. Si verò denigratus, fuerit commoritur. Alius morbus niger. Subfuluus & gracilis, & oculis cum virore pallidis fit, & tenuem cutē habet, ac debilis eſt. Quanto autem tempus amplius progreditur, tanto morbus amplius affligit. Et vomit omni tempore velut ſtillamentū modicum, ad duorum poculorum paruorū menſuram, & frequenter etiam cibum, ac vnā cum cibo bilem & pituitam: & poſt vomitum dolet totum corpus, aliquando etiam antea quā vomat. Et horrores tenues ac febris tenet, & ad dulcia ac oleoſa maximè vomit. Hunc medicamentis ſurſum ac deorſum purgare oportet, & lac aſinum poſtea bibendū præbere. Cibis autē vtatur molliſſimis ac frigidis, piſcibus littoralibus, & cartilaginei generis, & beris, & cucurbitis, & carnibus tritis. Vinum bibat album, vinoſum, aquoſius. Labore & deambulationibus vtatur, & calida ne lauet, & à ſole abſtineat. Atq; hęc ſanè facienda ſunt. Medela.

Hippocratis Liber III.

Verum morbus lethalis quidem est, non autem consenescit. D
Morbus corruptorius.

Alia quidem omnia eodem modo patitur. Verum grum-
mos bilis concretos vomit, & deorsum similiter egerit,
postquam cibos excreuit. Caterum eadem facere oportet,
quæ in priore morbo relata sunt, & clysterem adhibere.

HIPPOCRATIS

COI DE MORBIS LIBER

TERTIVS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.



E febris vniuersis à me dictum est, de
reliquis iam dicam.

Cerebri tumor.

Qum cerebrum ab inflammatione tu-
muerit, dolor totum caput occupat,
maximè qua parte constiterit inflamma-
tio: Constat autè in temporibus: & aures sonitu implentur, &
auditus hebescit, & venæ extensæ sunt, ac pulsant. & febris
ac rigor aliquando corripunt, & dolor nunquam deficit, sed
quandoque remittit, quandoque magis premit, & vocifera-
tur ac exilit præ dolore. Et ubi surrexit, rursus ad lectum de-
cumbere festinat, & iactat seipsum. Hic lethaliter quidem
affectus est, in quot verò diebus morietur, non habet iudica-
tionem. Nam alij aliter pereunt. Plerunque tamen in se-
ptem diebus moriuntur. Si verò vigesimum primum effu-
gerint, sani fiunt. Quum itaque dolor vexarit, frigefacere
caput oportet maximè quidem per rasuram, aut frigefacto-
rio aliquo, velut est solani succus, & terra figularis, in vesi-
cam aut folliculum immisso, ita ut vicissim modo apponas,
modo auferas, priusquam tepescant. Sed & sanguinem de-
trahere oportet, & caput purgare, ad apij succos odoratis
ammixtis. A vino autem in totum abstinere. Præsanæ suc-
cum

Medela.

A cum sorbere, & infernam aluum soluere.

Cerebri repletio dolorosa.

QUum doluerit caput præ cerebri repletionem, vitiosorum humorum purgationem non factam esse significat, & dolores totum caput tenent, & delirat, & moritur septima die, & euadere non poterit, si non eruperit humor septima die per aures. Sic enim & dolor sedatur, & resipiscit. effluit autem multus & inodorus. Huius aures priusquam pus erupisse videris, potius ne curato. Si verò supernam ac infernam *Medela.* aluum purgare voles, seorsum utramque soluito. Postea capiti maximè quidem vniuerso, sed, & per aures, & per nares, fomentum adhibeto. Sorbeat autem prisanæ succum, & à vino abstineat in totum. Postquam verò eruperit pus, contineto te donec multa fluxio sedetur, postea aures colluito vino dulci, aut lacte muliebri, aut oleo veteri, atque hæc tepida infunduntur. Caput verò frequenter mollibus ac odoratis fomentis foueto, quo citius cerebrum purgetur, hic primùm quidem non audit, progressu verò temporis & fluxio minor fit, & auditus vnà cum fluxione penitus quiescente continet, & maximè sibi ipsi similis redit. Cauere autem oportet solem, ventos, ignem, fumum, acrium odores, & alia huiusmodi: & quiescere, ac molli victus ratione uti. Sit autē aluus inferna præ vasorum vacuatione solutu facilis.

Syderati.

CVI iacti ac syderati esse dicuntur, quum cerebrum multa immundicia vitiosorum humorum repletum fuerit. anterior capitis pars primùm dolorē ipsis exhibet & suspicere non possunt, aliqui ambobus oculis, aliqui altero, & sopor ipsos tenet, & desipiunt, & tempora saliunt, & febris tenuis habet, & corporis impotentia. Hic tertia aut quinta die moritur, & ad septem non deuenit. Si verò deuenerit, à morbo *Medela.* liber euadit. Hunc si curare voles, capiti fomenta adhibeto, & sectione facta transpirationem effcito. Si verò dolor tenuerit, etiam sternutationes inducere oportet, & caput purgare leuibus ac odoratis, infernam item aluum purgare. A vino autem penitus abstineat, & prisanæ succo utatur.

Cerebri corruptio.

SI cerebrum corruptum fuerit, dolor caput tenet, & per collum procedit ad spinam, & æger non audit, & frigus

y s

ad

Hippocratis Liber I I I.

ad caput deuenit, & totus intumescit, & derepente priuatur D
voce, & ex naribus sanguis fluit, & liuidus fit. Quod si mor-
bus leuiter corripiat, ubi sanguis discessit, melius habet. Si
Medela. verò vehementer correptus fuerit, cito perit. Huic sternuta-
tiones per odorata inducito, & aluum vtranque, aut alteram
saltem purgato. & odorata quæ leues odores habent, naribus
ad moueto. & sorbitionem tenuem ac tepidam exhibeto. Ab-
stineat autem penitus à vino.

Lethargus.

MOrbi lethargi appellati status idem est, qui & peri-
pneumoniæ. Verum difficilior, & non omnino liber
ac remotus est ab humida peripneumonia. Sed multo tar- **E**
dior est morbus. Patitur autem æger hæc, Tussis & sopor
ipsum tenet, & saliuam liquidam ac multam educit, & vehe-
menter impotens est: & quum moriturus est, multum arque
Medela. id liquidum infraegerit. Huic valde exigua vitæ spes est.
Attamen hoc curandum est vt plurimum spuatur, & calefiat, &
à vino abstineat. Si verò effugerit, suppuratus fit.

Morbus siue febris ardens.

IN morbo febris ardente appellato, sitis tenet multa, & lin-
gua horret. At color eius primo quidem tempore est velu-
ti solet, verum sicca est. Progressu verò temporis induratur,
exasperatur, crassescit ac nigrescit. Si verò in principio hæc
patiantur, citiores iudicationes sunt, Si posterius tardiores.
Caterum remissionis eadem omnia signa lingua exhibet, **F**
quæ in peripneumonia: & vrinæ biliosæ aut cruentæ, dolorẽ
ampliorem: flauæ verò, minorem significant. & ipsum præ
caliditate ac siccitate, combustum ac crassum est. Sape verò
etiam in peripneumoniâ transit, quod si cõtigerit, breui mo-
Medela. ritur. Hunc hoc modo curare oportet, Calida bis aut ter lin-
gulis diebus lauato, capite excepto. At in iudicationibus la-
uare non oportet. Et primis quidem diebus deorsum purga-
to, & aquam bibendam dato. Nam plerunque vomitum aqua
ciere solet. Posterioribus verò post purgationem humecta-
to, & sorbitionibus vtatur, ac vinis dulcibus. Quod si non ab
initio ægrum curandum susceperis, sed signis iam in lin-
gua existentibus, sinere oportet donec iudicationes præ-
terierint, & linguæ signa mitiora facta fuerint: & neque
medica

A medicamentum dederis, neque ad purgationem faciendam clysterem adhibueris priusquam iudicationes prætereant.

Pulmo tumens præ calore.

Q Vum pulmo tumuerit præ nimio calore repletus, tussis tenet fortis & dura, & erectæ cervicis spiratio, & acuatim respirat, & frequenter anhelat, & intumescit, & nares expandit, velut equus ex cursu, & linguâ frequenter exierit, & pectus ipsi canere videtur, & grauitas in ipso inesse. Quapropter hanc capere pectus non potest, sed dirūpitur & impotēs fit, & dolor acutus emergit, & dorsum, & pectus, & lātēra velut acubus punguntur: & ardēt hæ partes velut eius qui sedet ad ignem & rubores exoriuntur ad pectus & dorsum, velut
B à flamma, & morsus fortis incidit, & angustia, vt neq; stare, neq; sedere, neq; decūbere possit. Verū ita velut desperatis rebus anxius iactat seipsum, & iam mori videtur. Moritur autem maximè quarta aut septima die, quas si effugerit, non valde perit. Hunc si cures infernā aluum quā citissimè clysteri adhibito, probe purgare oportet, & de cubitis, & naso, & lingua, ac de omni corporis parte sanguinem mittere. Potiones item frigefacientes exhibere & sorbitiones idē præstantes. Danda sunt & vrinam cientia sæpe, sed quæ non calefaciant. Et ad ipsos quidem dolores quum irruūt, calefactoria leuia ac humida adhibendo, locum calefacere ac humectare oportet, vbicunq; dolor fuerit: ad reliquas verò partes, frigefactoria adhibere, vicissim ea apponendo ac tollendo, & vbicunque arserit frigus facere. A vino autē penitus abstinere.

Medela.

Capitis dolor.

C **Q** Vum à capite initio sumpto, dolor acutus statim vocē interceperit, tum aliās, tum si ex ebrietate hoc contingat, ita affectus septima die moritur. Minus tamen moriuntur qui ex ebrietate tale quid perpessi sunt, & voce priuati permanserunt. Nam si eadem die, aut postera, aut tertia vocem edant, sani euadunt. faciunt autem hoc aliqui ex ebrietate, & neutri moriuntur. His sternutationes fortes inducere
 oportet, & infusum per clysterem iniicere, quod bilem vehementer ducat. Quòd si sensum æger receperit, Thapsiæ succū in multa calida aqua dato, quo quā citissimè reuomat. Postea attenuato, & à vino prohibeto per septem dies. Detrahendus est & à lingua sanguis, si venā cōprehendere possis.

Phreni

Phrenitides fiunt etiam ex aliis morbis. Patiuntur autem acri hęc: septū transuersum dolēt, vt ne cōtingere quidē permittāt, & febris accedit, & mente mouētur, & intētis oculis vidēt, & alia similia faciūt his qui peripneumonia affecti sunt, vbi sanē in peripneumonia mente mouētur. Hoc modo affectū calefacere oportet calefactoriis humidis & potionibus, excepto vino. Et si quidē fieri poterit, sursum purgare, & per tussim ac spuitionē educere oportet, quēadmodum in peripneumonia. Sin minus, inferna aluus præparāda est, vt egerat. Humectato autē potionibus, hoc enim cōducit. Morbus autē lethalis est. Moriūtur eīm tertia, aut quinta, aut septima die. Si verò leniter corripiat, iudicat velut peripneumonia.

Medela.

E

Angina.

AB angina appellata suffocatur homo, & in faucibus magis ipsi inharere videtur, & neque saliuam, neque quicquam aliud detrahit, & oculi affecti sunt ac prominent, velut strangulatis, & intentē per ipsos videt, & ipsos conuertere non potest, & anxius est, & exilit frequenter, & facies & fauces ardent, imo etiam collum. At videntibus nihil mali habere videtur, & videt ac audit obtusius, & præ suffocatione non intelligit, neque quid dicat, neque quid audiat, aut faciat. Verū hians decumbit saliuam fundens, ac talia faciens. Hic quinta, aut septima, aut nona die moritur.

F

Leuis angina paracynanche appellata.

AT vbi horum signorum quid abfuerit, laxiorem morbum significat, quem paracynanchen vocant. Huic venam secare oportet, maximē sub mamma. Concomitatur enim hac parte ex pulmone spiritus calidus. Oportet quoque deorsum purgare medicamento, aut per clysterem. Fistulas item detrudere conuenit in fauces iuxta maxillas, quo spiritus ad pulmonem trahatur. Et faciendum vti quā citissimē spuat, & pulmo gracilis fiat. Et suffitus fiat per hyssopum Cilicium, sulphur, & bitumen: & attrahat & per fistulas, & per nares, vt exeat pituita. Fauces & lingua cōfricentur his quæ pituitam ducunt. Et venæ sub lingua secantur. Sed & à cubitis sanguis dimittatur, si vires validæ fuerint. A vino abstinere, & pitisanæ succū tenuem sorbeat. Postquā verò remiserit

Medela.

A ferit morbus. & iam cibos gustarit, elaterio recenti purgato, ut ne in aliud malum incidat.

Morbus regius.

Morbus regius huiusmodi acutus est, & citò occidit. Color totus mali corium valde refert, & cum virore pallidus est, quales sunt lacerti cum virore pallicātes. Consimile est etiam corpus: & in vrina subsidet velut eruum fuluum, & febris ac horror debilis habet. Quandoque etiam vestimēta ferre nō potest, sed mordetur ac raditur. Et mane quū cibum nō accepit, viscera plerunq; lancinātur. Et quum quis ipsum excitat, aut alloquitur, non patitur. Hic plerunq; in quatuordecim diebus moritur. Has si effugerit, sanus euadit. Oportet autem ipsum calida lauare, & aquam mulsam bibendam dare, ita ut de nucibus Thais decorticatis, & absinthij coma, æquis portionibus acceptis, & de aniso cribrato dimidia parte ammixta, obolos tres ieiunus ex illa bibat, & rursus dum cubitum it, hāc aquā mulsam sumat. Bibat etiā vinum vetus tenue, & sorbitionibus utatur. Nec à cibis abstineat.

Medela.

Tetanus.

Quam distentiones Tetani appellati, corripuerint, maxillæ rigent velut ligna, & os aperire non possunt, & oculi lachrymantur ac distorquentur, & dorsum riget, & crura contrahere non possunt, similiter neque manus, & facies rubicunda est, & valde dolet, & ubi moriturus est, & potum, & sorbitionē, & pituitam per nares reuomit. Hic tertia die, aut quinta, aut septima, aut decima quarta perit. Vbi verò has effugerit, sanus euadit. Huic catapotia ex pipere & veratro nigro deuoranda dato: & insculum volucrum pingue calidum. Inducendæ sunt etiam fortes ac multæ sternutationes, & fomenta adhibendā. Quum autem fomentis non utitur, calefactoria humida ac pingua vndequaq; in vesicis ac vtriculis apponantur, maximè tamen ad partes dolentes, & calido oleo multo ac sæpe illinatur.

Medela.

Opisthotonos.

Quam autem distentio in posteriores partes, opisthotonos appellata tenuerit, reliqua quidem plerunque eadem sunt. Verum in posteriores partes conuellitur, & vociferatur aliquando, & dolores emergunt vehemētes, & crura inter

Hippocratis Liber I I I.

interdum contrahere non permittit, neq; manus extendere. **D**
 Sunt enim cubiti incuruati, & digiti in pugnum cōtracti, &
 pollicē plerunq; aliis digitis cōtinet, & clamat, & nugas gar-
 rit quandoq;, & non potest seipsum continere, sed aliquando
 exilit, vbi dolor premit, quum verò dolor remittit, quietem
 habet. Aliquando etiā vox intercipitur simul vt morbo corri-
 piuntur, aut insani & atra bile perciti fiunt. Hi tertia die mo-
 riuntur voce soluta, & reuomūt per nares. Si verò effugerint
 decimumquartum diem, sani fiunt. Curādus hic est velut su-
Medela. perior. Quòd si voles, etiam sic facies. Aquam frigidam plu-
 rimam superfundito, & postea vestimenta tenuia, pura, ac ca-
 lida superintegito. Ignem autem tunc non adhibeto. Hoc au-
 xilium & ad tetanos, & ad opisthotonos adhibere oportet. **E**

Voluuli.

Voluuli fiunt quum supernus ventriculus calefcit, infer-
 nus verò frigescit. Resiccatur enim simul intestinum,
 & prae inflammationis caliditate obturatur, vt neque flatus,
 neque cibi pertranseant, sed venter durus sit, & quandoq; vo-
 mat, primum pituitosa, deinde biliosa, postremū stercus. Et
 ager sitim habet ac dolorem, maximè circa prae cordia. Ve-
 rum & totum ventrem dolet, & inflatus est, & anxius est, & fe-
Medela. bres corripunt, & fiunt maximè septima die. Hos sic curare
 oportet. Supernum ventriculum quàm citissimè purgato, &
 sanguinē de capite ac cubitis detrahito, vt superna aliū ca-
 lefcere desinat, & partes supra septum transuersum frigefa-
 cito, excepto corde. Infernas autem calefacito, homine in so-
 lio aquae calidae collocato, ac semper oleo illito. Calefactoria
 quoque humida apponito. Et glandulam de melle solum de-
 cem digitorum longitudinis facito, & ex summa anteriori
 parte fel taurinum oblitito, atque sic bis ac ter subdito, quo
 omnia combusta stercora circa rectū ac princeps intestinum
 contenta educas. Et si quidem sic obedierit, postea clysterem
 adhibeto. Sin minis, follem fabrilem indito, & in ventrē fla-
 tum immittito, à quo & ventrem, & intestini contractionem
 distendas. Deinde extracto folle, clysterem adhibeto. Sit au-
 tem infusum per clysterem iniiciendum paratū non ex val-
 de calefactoriis, sed ex his quae stercora dissoluunt ac colli-
 quant. Postea obturata per spongiam sede, in aqua calida de-
 sideat

A fideat continens clysteris infusum. Et si hoc infusum susceperit, & rursus dimiserit, sanus euadit. Caterum priore tempore mel optimū delingat, & vinum splēdidum vernaculū bibat. Quod si voluulo amoto, febris ipsum corripiat, desperatus est. Fortassis enim & inferna alius soluta ipsum occiderit.

Desperatio
huius mor-
bi quando.

Peripneumonia.

Peripneumonia talia facit. Febris acuta tenet, & spiritum frequentem ac calidum respirat, & anxietas adest, & impotentia, & iactatio, & dolor sub scapulas, & ad claviculam, & ad mammam, & grauitas in pectore, quādoque etiam delirium. Quidam dolorem non sentiunt, donec tussire inceperint, Verum hic morbus diuturnior ac difficilior illo est. Saliuam tenuem, ac spumofam primū spuit. Lingua flaua est. Verum progressu temporis nigrescit. Si igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur. Sin posterius, tardius. Tandem verò etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas inheret. At liberationem à morbo significat lingua, similiter velut in pleuritide. Hæc autem patitur homo, minimū diebus quatuordecim, ad summū vna & viginti, & per hoc tempus tussit vehemēter, & vnā cum tussi purgatur, primū saliuā multa & spumosa. Septima verò & octaua die vbi febris in vigore fuerit, si humida sit peripneumonia, crassior prodierit: sin minus, non. Nona verò & decima, cum virore pallida ac subcruenta. Duodecima autem vsque decimam quartam, multa & purulenta. Atque hoc in his contigit, quorum naturæ & corporis affectiones humidæ sunt, & morbus fortis est. Quorum verò & natura, & morbi cōstitutio sicca est, in his minus. Si quidem igitur decima quarta die reficcatus fuerit, & non amplius purulentum tussiendo reiecerit, sanus est. Sin minus, ad duodeuigesimam, & vigesimam primam animum aduerte, & si quidem tunc sputum illud quieuerit, euadit. Sin minus, interroga ipsum, an dulcior sit saliuā, & si affirmauerit hoc, scito pulmonem ipsi suppuratum esse, & morbus annū durabit, si non in quadraginta diebus pus eduxerit. Si verò insuauem saliuā esse dixerit, status morbi lethalis est. Verū in primis diebus hi maximè manifesti fiunt. Si enim putrefactum ac purulētum expuerit in diebus duobus ac viginti, & non exulceratus fuerit, euadit. Si minus, non.

Purulenti
pulmonis
signa.

non. Hæc peripneumonia nihil abest ab affectionibus quæ in D pulmone sunt. Si igitur aliquid harum affectionum abfuerit, cognoscere oportet & quæ ægrotus mala habeat, & quæ medicus aggredi debeat. Si verò pauca horum signorum habuerit, ne decipiatur. Nam perniciofa non est peripneumonia, sed mollis. Caterùm peripneumoniam hoc modo cura-

Curatio. re oportet. Non tamen peccabit, si quis etiam pleuritidem & phrenitidem ita curare aggrediatur. Primùm caput leuius facere incipe, quo nihil influat ad pectus. Primis autem diebus sorbitiones sint dulciores. Sic enim id quod consedit ac compactum est potissimum elueris ac commoueris. Quarta die & quinta ac sexta, non amplius dulces, sed pingues. Nam ad sputum sursum excreandum conducunt. Si verò pro ratione spuere non possit, ex pharmacis sursum educentibus dato. Aluum autē in primis quatuor aut quinque diebus subducere oportet, & hoc paulò amplius, quo & febres obtusiores sint, & dolores leuiores. Quum autē euacuatus fuerit, & corpore debilis, infernam aluum tertio quoque die deorsum commoueto, quo & corpus potens sit, & supernæ regiones humoris exortes. Nam si multus humor infrà secedat, à quinta die, mortem inducit. Infra enim humore secedente, supernæ partes resiccantur, & sputi purgatio sursum non prodit. Oportet igitur & infernam aluum, neque valde suppressam esse, ut ne febres sint acutæ: neque valde egerere, quo salua sursum educi possit, & æger viribus valeat. At medicamenta sursum educentia, sexta & septima ac nona die, & morbo adhuc vltè F rius progressio, magis exhibeto. Sit autem medicamentum veratrum albū, thapsia, elaterium recens, singula æquis portionibus. Quòd si salua non probè purgetur, & spiritus fuerit frequens, & purgatio non præualeat, prædicendū est nullam spem vitæ reliquā esse, si purgatione nihil efficere possit. Sed & alia facienda sunt quæ in peripneumonia fieri solent, si inferna aluus ministerium suum probè obierit. Quin & aliter facere curationem oportet. A prima die initio sumpto, ari magni conchulam maiorem dato, dauci & vrticæ vtriusque itidem vnam, sinapis & rutæ quātum tribus digitis comprehendere potes, & succum silphij magnitudine fabæ. Hæc in aceto dulci & aqua permixta & diluta ac excolata, ieiuno tepida bibenda dato. Postquam verò purum expuere cœperit

Venter nimis solutus quinto die necat.

Curatio altera.

A cœperit, ari cōchulam maiore, & fefamū, & amygdalas purgatas, in aceto dulci aqua diluto bibēda præbeto. Si verò magis ducere voles, radicis Capparis corticem his ammisceto.

Pleuritis.

Q Vum pleuritis apprehēderit: hæc patitur. Dolor latus, & febris & horror tenet, & frequentē spiritum habet, & erectæ cervicis spiratio vrget, & tussiendo reiicit subbiliosa, velut à mali punici corio, si non ruptiones habuerit. Si verò habuerit, etiam sanguinem à ruptionibus. Est autem & sanguinea pleuritis, in qua subcruenta reiicit. Et est quidem biliosa mitior, si non ruptiones æger habeat: sin minus, dolorosior quidem est, sed non lethalior. At sanguinea fortis, & dolorosa, & lethalis est. Quum igitur affuerit simul singultus, simulque cum saliva sanguinis grumos nigros tussiendo reiecerit. septima die moritur. Si verò dies decem transgressus fuerit, à pleuritide quidem sanus fit, verum vigesima suppuratur, & pus tussiendo reiicit, demum verò reuomit, & non adeò facilis curatu est.

Pleuritides sicca.

S Vnt & sicca pleuritides sine spūto, Verum hæc difficiles sunt. Iudicationes autem similes aliis sunt, sed ampliore in potu humectatione opus habent quàm aliæ. Biliosæ verò & sanguineæ, nona & vndecima die iudicant, atque hi magis sani fiunt. At si à principio quidem molles quidam tenuerint dolores, à quinta verò ac sexta die acuti, hi vsq; ad duodecimum perueniunt, & non valde effugiunt. Periculum autem maximè est, vsque ad septimum. Imò etiam vsque ad duodecimum. Post has verò sanantur. Quæ verò ab initio molles sunt, à septima autem & octava acuta, ad decimumquartum iudicant, & sani fiunt.

Pleuritis ex dorso.

Pleuritis ad dorsum intantū ab aliis differt, dorsum dolet velut ex plaga, & suspirat, & aceruatim respirat. statim autem spuit pauca, & corpus delassatur. Tertia aut quarta die saniem mingit subcruetam. Moritur autem maximè quinta die: sin min⁹, septima. Has si effugerit, vixerit, Et morbus lenis est ac minus lethalis. Custodire tamē oportet vsque ad decimumquartum. Postea verò sanus euadit. Cæterum

z quib

Hippocratis Liber III.

quibusdam pleuriticis salua quidē pura est, mīctio autem **D**
 cruenta, velut serosa à carnibus affatis sanies, dolores verò
 acuti per spinam ad pectus, & ad inguem tendunt. Hic si se-
 ptimū diem effugerit, sanus fit. At si alicui in his pleuritidi-
 bus cōtingat dorsum rubesceri, & humeros calefacere, & in-
 ter desidendum grauari, & vēter exturbetur egestione cum
 virore pallida ac valde graecolenti, hic propter ventris ege-
 stionem, vigesima prima die moritur. Has si effugerit, sanus
 fit. Quibus autem statim sputa varia sunt, & dolores valde
 acuti, hi tertia die moriuntur. Hanc autem transgressi, sane-
 scunt. Qui verò sanus non fit septima, aut nona, aut decima,
 hic suppurari incipit. Melius est autē suppuratum fieri, etiā si
 dolorosum sit, Minus enim lethale est. Porro supra omnia re **E**
 lata signa, in vnaquaque pleuritide considerare oportet lin-
 guam. Si enim bulla subliuida fiat in lingua, velut ferro in
 oleum tincto, si quidē in principio fiat aspera, difficilior est
 morbi emotio, & necesse est sanguinem tussiendo reiicere,
 in diebus quibus id fieri oportet. Si verò facta morbi pro-
 gressu fiat. iudicationes quidem contingent ad decimum-
 quartum diem, Verū necesse est sanguinem spueri. **Medela.** **F**
 autē se res de liberatione ab hoc morbo, hoc modo. Si quidē
 tertia die inceperit maturari ac expui, citius liberabitur. Si
 verò posterius maturescat, posterius iudicationes fiunt, quē-
 admodum in capitis signis. Dolores porro in omni pleuriti-
 de, plerunque magis interdiu quā noctu leuiores fiunt. Cu
 rare verò pleuritidas hoc modo oportet, vt plurimum velut
 phrenitidem & peripneumoniam, præterquam quòd hic bal-
 neis calidis & vino dulci vtendum est. Si igitur prima aut se-
 cunda die postquam inuasit agrum, accesseris, si stercus pro-
 diit purum, aut leuiter biliosum & modicum, infusum ex
 Thapsia per clysterem iniicito. Si verò alius commota, no-
 ctu quidem egerat, postridie verò dolor & tormen vexet, rur-
 sus clysterem adhibeto. At si æger biliosus sit natura, & non
 purgatus correptus fuerit à morbo, priusquam saluam bi-
 liosam expuat, etiam medicamento bilem probè purgato.
 Si verò iam expuat biliosa, medicamentum ne dederis. Si e-
 nim dederis, sputum sursum prodire nō poterit, sed septima
 aut nona die suffocabitur, maximè si præcordia doleant.
 Quod si ad dolores in lateribus etiam præcordia doleant,
 clyster

A clysterem adhibere oportet, & in potu ieiuno bibendam dare. Aristolochiam, hyssopum, cuminum, silphium, peplum, mecona appellatum album, florem aris, mel, acetum, & aquam. Et per medicamenta quidem ita primas curationes facere oportet. Reliqua verò sic se habent. Multa calida pro viribus aëri lauato, capite excepto, & quum iudicationes sunt, dolentes locos humidis fomentis tepefacito, & oleo illinito. Quum verò impetu fertur morbus, & aëri & medicum à curationibus quiescere conuenit, ne quid mali inducatur. Dandus autē est ptisanæ succus coctus, aliquanto crassior spissitudine mellis. Post balnea etiam vinum dulce & aquosum bibendum est, non frigidum, modicum, ex angustioris pocillo, & vbi tussis inuaserint, amplius bibendum & quàm maximè exscreandum, & putu humectandū, quo pulmo humidior factus, facilius ac citius sputum reddat, & tussis minùs affligat. Sed & mali punici dulcis vinosi succum, lacte caprino modico, & melle ammixto, paulatim sæpe dato, & noctu & interdiu, & somnum quàm maximè prohibeto, quo purgatio & citius & copiosior fiat. At verò sanguineam pleuritidem sic curare oportet. Post iudicationes cibis leuibus reficito, & quietem agat, & nimium caueat solem, ventos, repletiones, acida, salsa, pingua, fumum, flatum in aluo, laborem, venerem. Si enim morbus recidiuarit, mors sequetur. In expuitionibus autem si dolor habeat, & expuere non possit, ieiuno aris florem dato. magnitudine oliuæ, & succi silphij dimidium eius, & trifolij seminis modicum. Hæc ex melle delingat. Aut piperis grana quinq;, & succi silphij magnitudinem fabæ, mel, acetum, & aquam, ieiuno tepida bibenda præbeto. Hoc etiam dolores sedat. Quòd si pro ratione spueri non possit, sed moretur sputum hærens in ipso, & stertat in pectore, ari magni radices conchulam maiorem, & oleum ac acetum mixta dato, & acetum aqua dilutum infer bibat. Aliud forte. Florem aris magnitudine fabæ, & nitrum assatum dupla portione, & hyssopi quantum tribus digitis comprehendi potest, molli misceto, & aquam ac oleum modicum adstillato, & tepefacta in conchula maiore infundito, vt ne suffocetur. Hoc etiam in peripneumonia facere oportet, si non purgetur. Si verò neque stertat, neque velut oportet, spuat, capparis fructus quantum tribus digitis

Pleuritis
hæmato-
des.

Hippocratis Liber I I I.

comprehendi potest, & piper, & nitrum modicum, & mel, & D
acetum, & aquam misceto, atque hac tepida sorbenda præ-
beto. Altera die eadem in aceto, melle, & aqua feruefacta sor-
beat. Hoc etiam stertentibus dato, & his qui purgari non pos-
sunt. At si fortius facere voles, hyssopi & sinapis, & nasturtij
concham maiorem, melle & aqua terito, & feruefacta ac ex-
colata, tepida sorbenda dato. Atque hoc modo hi morbi cu-
rati sanantur, si non quid sputi in pulmone relictum pus fiat,
à quo arida tussis sequitur, & febris ac horror emergunt, &
erecta ceruice spiratio tenet, & frequentem & acriatam
respirationem ager habet, & vox paulò grauior fit, & color
cùm calore faciem occupat. Progressu verò temporis, mor-
bus magis manifestus redditur. Hunc si intra decem dies su- E
sceperis, vbi victu & balneo calido calefeceris, medicamen-
tum quod pus ducat, in pulmonem infundito, aliisque pus
ducentibus vtitor, atque sic velut suppurato victus rationem
præscribas. Caput quoque resiccato, vt ne quid influat. Si ve-
rò ex eo quod in pulmonem infusum est, pus non educatur,
rumpitur hoc ipsum ex pulmone in thoracem, & post ruptio-
nem sanus esse videtur, quoniam ex angustia ad amplam ca-
pacitatem pus peruenit, & spiritus quem respirando trahi-
mus in pulmone locum ac sedem habet. Verum progredien-
te tempore pectus pure impletur, & russes, & febres, & alij
dolores omnes magis ipsum premunt, & morbus inclarescit.
Hunc post eruptionem per quindecim dies finire oportet,
quo pus rursus maturescat. Nam ex eo quod pus ad amplio F
rem locum deuenit, perfrigeratum est, & id quod in thorace
humidi erat ad seipsum attraxit, ita vt ipsum sit semiputre-
factum. Si quidem igitur sua sponte expui incipiat in hoc
tempore, bene est. Sin minus, medicamentis aut potionibus
opem ferre oportet, in vltimis ex quindecim illis diebus, fe-
stinando ad corporis excitationem antea quàm magis affli-
gatur, ita vt caput purum custodias, influxionum gratia. Si
verò non spuatur, sed sui significationem ad latera præbeat,
secato aut vrito. At si neque spuatur, neque ad latera de se si-
gnificationem præbeat, vbi multa calida ieiunum lauasti, &
neque potu vsum in firma sella locasti, alter ex humeris ip-
sum apprehendat, tu verò concute ipsum, aure ad latera ad-
mota, quo percipias ex vtra parte significationem sui præ-
beat.

A beat. Optandum autem esset ex sinistra. Nam dextras vrere aut secare lethalius est. Quanto enim robustiores sunt dextrae partes, tanto etiā fortiores morbi in ipsis fiunt. Quod si praecrasitudine, humor non fluctuet, neque strepitus sit in pectore: verum spiritum frequentem trahat, & pedes intumescant, & tussicula aliqua adsit, ne te decipiant, haec, sed thoracem pure plenum esse probe noris. Proinde in terra erectiade liquida, & valde trita acetepida, linteum tenue tingito, eoque thoracem circūcirca integito, & qua parte primū resiccatum fuerit, ea secato aut vrito, quā proximè ad septū trāsuersum, cauendo tamen ne hoc ipsum laedas. Si verò voles, ipsam terram erectiade illinito, & similiter velut in linteo considerato. Multi simul illinunt, ne quā primū illinuntur resiccentur. Post sectionem aut vstionem, linamento ex lino crudo vtere, & paulatim pus emitte. Caterum vbi secare vel vrere voles, corpori in eadem figura, in qua intersecandum aut vrendum futurum est, notam imprimito, vt ne cutis te decipiat, si in figurā trāsmutatione sursum aut deorsum magis cedat. Sed & tusses vitare oportet ex victu, vt ne rursus pus reuellant ad pulmonem. Malū enim hoc est: quare permittendum est vt ad sectionem quā citissimè resicetur. Postquam verò duodecima affuerit dies, reliquū pus totum emittito, & ex linteo linamentum indito, & bis in die pus emittito, & ventrem supernum ex victu quam maximè resiccato. Atq; hoc modo oportet etiā suppurationes ex vlnis, & ex peripneumonia: & ex magnis destillationibus, & pulmone ad lateres prolapso, considerare ac curare.

Frigeſactoria potiones in febre ardenti.

Frigeſactorias potiones in febribus ardentibus quando voles bibēdas dato. Sunt autem multarum operationū. aliae enim mictionem inducunt, aliae alui egestionem, aliae vtrunque praestant, aliae neutrum, aliae solū frigeſaciūt, velut si quis in vas aquae feruentis frigidam aquam infundat. aut ipsum vas ad frigidum ventum exponat. Dabit itaque alias aliis. Neque enim dulces omnibus conducunt, neque acerbae: neque eadem omnes bibere possunt. 1. Fauorum siccorum heminarum duarum mensurā aqua macerato, & conterens gustato donec subdulcis aqua fiat, deinde exco-

2 3 lato

Hippocratis Liber I I I.

lato, & iniectis apiis bibendam dato. D I I. Seminis lini ace-
tabulum, aquæ heminis decem affusis, in noua olla prunis
imposita coquito ac feruere finito vt transpirent, donec suc-
cus ad tactum pinguis fiat. I I I. Aquam mulsam aquo-
sam ad dimidias coquito, deinde apio iniecto frigidam pau-
latim exhibeto. I I I I. Ordeum Achilleum magnum ac-
plenum heminae mēsurā siccato, & acutis spicis ablatis, vbi
probè laueris, aquæ cogio affuso coquito ad dimidias, frige-
facito ac bibendum dato. v. Cumini Aethiopici heminae
decimae parti, tres aquæ semicongios affunde, & olla luto pi-
loso oblita, donec tertia pars restet feruere sine, & frigidam
hanc ad omnem ardentem aliāque febrem exhibe.

v I. Aquam coelestem ipsam per seipsam præbe. E

v I I. Ptisanæ heminae congio aquæ affuso, ad dimidias co-
quito, deinde excolato, & apiis iniectis frigidam dato.

v I I I. Profunt & vina alba aquosa ex vuīs passis.

I x. Profunt & vuarū passarū expressarū retrimēta aquosa.

x. Vuarum passarum albarum exēptis vinaceis heminae,
radicum quinquifolij manipulum, tundito, & affusis aquæ
heminis viginti, ad dimidias coquito, & frigidam hanc pau-
latim bibendā dato. x I. Ad farinae ordeī pleni crassæ chœ-
nicæ dimidiam, aquæ congium affundas, & quum iam in-
tumescent crassæ farinae partes, manibus teras, donec aqua
alba fiat, & adianti pugillo iniecto, sub dio per noctem expo-
nito, ac exhibeto. x I I. Quorum trium aut quatuor candi-
dum, in aquæ congio concussum bibat. Hoc valde frigefacit, F

& ægrum ad aluum exonerandam conturbat.

x I I I. Ordeī torrefacti probè loti chœnicæ dimidiā, in a-
quæ cōgio bis aut ter feruere finito, & frigidā hanc exhibeto.

x I I I I. Ptisanæ succum coctum tenuem, & vinum dulce
dato. Hoc vrinam inducit. x v. Cucumeris peponis corio

nudati pollinem ex aqua præbeto. Hæc potio vrinā ciet, fri-
gefacit, & sitim sedat. x v I. Eruum in aqua præcoquito,
deinde ollam nouam, in maiore ollam aqua plenā ponito, &
alia aqua eruo affusa, ad modicum tempus coquito. Postea
vbi coctum fuerit eruum, tertiam aquæ partem reliquam
excolatam bibendā dato, ita vt ad singulos cyathos, & cucu-
meris, & erui pollinē inspergas. Hoc constanter sitim sedat.

x v I I. Vinū Thasiū vetus parte vna, cū viginti quinq; aquæ
partib

A partibus dato. xviii. Trifolium, cucumeris pollinem, & crassam ordeï farinam in aqua macerato, & hanc bibendam dato. xix. Apij manipulos tres, pulegij pugillos duos, in aceti heminis decem ad tertias coquito. Hoc melle & aqua dilutum, aquosum bibat, adianti pugillo iniecto. Hoc vrinã ducit, & aluum soluit. xx. Mala odorata dulcia cõtundito, & aqua macerato, & aquam bibendã dato. xxi. Mala cydonea eodem modo, si aluus soluta fuerit in febre ardente.

xxii. Quòd si morbus regius insuper corripiat, vna passæ albæ exemptis vinaceis, & cicerum alborũ, vtrorumque dimidiam heminã, & ordeï Achillei magni ac pleni tantundem, cnici tantundem, aquæ heminas decem, & apium, & B mentam, & coriãdrum, de singulis parũ, terito donec placidè aqua dulcescat, & adianti pugillo postea iniecto, vbi sub dio per noctẽ exposuisti, exhibeto. Potes etiã alia his similia imitari. Omnia verò per noctem sub dio exposita dabis febrienti, exceptis his quibus alui plus quàm conuenit fluunt. xxiii. Pulegij pugillos tres, apij duplum, in vino diluto coquito ac exhibeto: hoc vrinã ciet, & bilem per aluum trahit.

HIPPOCRATIS

COI DE MORBIS LIBER

C QVARTVS, IANO CORNARIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.



A D hominis generationem de omnibus & membris partibus semen progressum, & in vterum muliebrem illapsum cõdensatur, temporẽque veniente natura hominis formam referens ex ipso producit. Habet autem & mulier, & vir, quatuor species humoris in corpore, à quibus morbi fiunt, qui non à violentia aliqua fiunt. Sunt autem species hæ, Pituita, Sanguis, Bilis,

Membra
omnia ge-
nerationi
conferunt.

Hippocratis Liber I I I I.

Pituita, san-
guis, bilis.

Bilis, & Hydrops siue aqua: & de his non minima, neque de-
bilissima, in semen procedit portio. Et quia animal secun-
dum parentes nascitur, tot humorum species, & sanorum &
morbosorum in seipso habet. Ostendam autem quæ in vna-
quaque harum specierum & plura & pauciora in corpore
sunt, & à quo agrotant. Et quod morbi imparibus diebus
iudicantur. Et quæ sint morborum principia. Et qualia sin-
gula ex ipsis in corpore efficiant, vt morbum inducant. & à
quo rigor febrilis fiat, & cur post ipsum febris irruit. Pri-
mum autem demonstrare volo, quomodo bilis, & sanguis, &
hydrops, & pituita, copiosiora & pauciora fiant à cibis & po-
tibus, hoc modo. Ventriculus dum plenus est, omnium ho-
rum corpori fons est. Verum vbi vacuus est, corpore fruitur
colliquecente. Sunt autem & alij fontes quatuor, à quibus

Quatuor
corporis
fontes.

Cor sangui-
nis fons, ca-
pit pituita
lien aqua,
fel bilis.

Quo pacto
hæc corpus
hauriat.
Terræ vi-
res.

Quædā
à rosa &
allio.

sanè ipsi à ventriculo acceperunt: & hi quoque fontes vbi
euacuantur, de corpore fruuntur. Sed & ipsum corpus attra-
hit, vbi ventriculus in seipso quid habuerit. Et sanè sangui-
ni fons est cor, pituitæ caput, Aquæ splen, Bili locus folliculi
in hepate. hi sunt quatuor humoribus his fontes, ventriculo
excepto. Ex his autem maximè caui sunt, Caput & Splen,
Nam in hoc ipso maxima amplitudo est. Verum de hoc pau-
lo postea clarius dicam. Quin & hæc sic se habent. In omni-
bus cibis ac potibus & biliosi quid est, & aquosi. & sangui-
nei, & pituitosi: in alio plus, in alio minus. Quapropter &
quæ eduntur ac bibuntur, alia aliis præstant ad sanitatem.
Atque hæc mihi de hoc dicta sunt. Postquam verò comedit
aut bibit homo, corpus in seipsum humorem relatum ex
ventriculo, & fontes trahunt per venas de ventriculo, simi-
lis humor similem, & corpori distribuunt. Quemadmo-
dum etiam in plantis similis humor similem trahit de terra.
Habet enim eodem modo tota omnigenas in seipsa ac in-
numeras facultates. Quæcunque enim in ipsa nascuntur, his
omnibus exhibet humorem similem unicuique, qualem &
hoc ipsum quod nascitur sibi similem, iuxta cognationem ha-
bet. & trahit vnumquodque de terra alimentum, quale etiam
ipsum existit. Nam & rosa de terra trahit talem humorem,
qualis ipsa in potentia est: & allium de terra humorem eius-
modi trahit, quale ipsum in potentia est. Et alia omnia
terra

A terræ nascētia, ex terra trahunt, singula iuxta seipsa. Si enim hæc res non ita se haberet, non nascerentur plantæ similes seminibus. Cui porro plantæ in terra cognātus humor multo vberior est quàm conuenit, ea planta agrotat. Cui verò paucior quàm opportunum est, ea resiccatur. At si ab initio non insit terræ humor, quem planta iuxta cognationem trahat, ne germinare quidem poterit. Intelligentiā autem huius rei, quòd si non habeat planta humorem secundū naturam, ne ab initio quidē germinet, inde nobis suppeditatur. Ionia enim regio & Peloponesus pro temporibus anni à sole non minimè calet ac illustratur, vt sol nascentibus è terra sufficere possit, attamen fieri nō potest, multis frustra iam id tentantibus, vt in Ionia aut Peloponeso Silphium nascatur. **Silphium.** At in Libya sua sponte nascitur. Non enim est neque in Ionia, neque in Peloponeso, eiusmodi humor qui ipsum alere possit. Quum autem sint & aliæ multæ medicinae, quas sole sufficiente, regiones alere non possunt, aliæ verò sua sponte producunt, hoc ipsum eius quod nunc dicturus sum considerandi occasionem exhibet, quantū videlicet locus alteri loco etiam valde vicinus præstet ad iucundi vini productionem, sole æqualiter sufficiente. Hic etenim in terra humor est, qui vinum suaue exhibere potest, illic non est. Sunt etiam syluestria non pauca in loco nascentia, quæ ad orgyæ seu cubitorum quatuor spatium translata, nasci minimè comperias. Non enim habet terra talem humorem translato, qualem illa syluestribus plantis exhibebat. Sunt enim ex ipsis quædam venenosiores, aliæ humidiores, aliæ dulciores, aliæ sicciores, aliæ asperiores, & innumeræ aliæ aliter se habent. **Diuerse terræ humores.** Innumeræ enim sunt in ipsa terra facultates. Et propter hæc genera primum nihil alteri simile ex terra productum est, quod non esset cognatum. Et mihi sanè videntur hæc omnes plantæ syluestres fuisse. Verum homines ipsas māsuefecerunt, fructum ferre efficientes vnāquāque iuxta suum **Prius syluestra omnia fuerunt.** semen. Trahit enim similis humor similem ex terra, & ex hoc augefcit ac nutritur. & nullum ex terræ nascētibz alteri simile est, quòd non æqualem, neque similem humorem ex terra trahat. Et omnia quæ nascuntur in cibi ac potus **Cibus potusq; quid secum habeat.** vsum venientia, multas facultates de terra ad se trahunt, & in omnibus est aliquid pituitosi ac sanguinei. Et ex hoc

adeò ad hanc demonstrationis necessitatem deueni, quod à cibis ac potibus in ventriculum procedentibus trahit corpus, secundū fontes quos nominavi, similis humor similem per venas. Referā quoque aliud argumentum, quod singula prout relatum est trahant, & simul dicam vnde pituita in corpore gignatur. Vbi quis caseum comedit, aut aliquid acre, aut aliud quid edit aut bibit, quod pituitosum est, statim ipsi ad os acnares accurrit, atque hoc ita fieri partim omnes videmus, partim ita esse credere oportet, ex his quæ ego referam. Affero itaque, quod quantum in cibo aut potu pituitæ inest, illud vbi ad ventriculum peruenit, partim corpus ad seipsum trahit, partim caput, vt quod cauum sit, & velut cucurbita corpori incumbat, ad se trahit, vt pote viscosa existente pituita, ita vt hanc anima per animam sequatur ad caput: & quæ quidem recens ex cibo generatur pituita, in capite manet. Vetus autem, prout copiosior est recens, ab ipsa violente extruditur. Quapropter vbi quis edit aut bibit aliquid pituitosi, excreat pituitam. Habet autem & hæc res se hoc modo. Si vbi edit aut bibit quid pituitosi homo, non rursus exeat quod redundat, neque per os, neque per nares, necesse est ipsum manere in capite, aut ad corpus descendere de capite, & ad ventriculum peruenire. Ac optimum quidem fuerit, si ad ventriculum perueniat. Exire enim poterit vnà cum stercore, & si quidem multum fuerit ac humidum, Pituita sterco humectare poterit. Si verò modicum, non hoc effecerit. At si in capite maneat, multum dolorem capiti exhibuerit, quum in venis est. Si verò modicum, nō hoc fecerit. Significationem autem de se præbet copiosum ne sit an modicum. Quod si ad corpus deueniat, atque illic alio humori ammixtum fuerit, si quidē multa fuerit pituita, statim corpus læserit: si verò pauca, nō adeò lædere poterit, quum magnum sit corpus, si nō & aliud quoddam principium ipsi reliquum sit. Verum temporis progressu, si alia pituita superaccedat, lædi vtique possit. At si corpus vesicæ ac ventriculo deleget, atque hæc foras perferant, nihil mali ex ipsa habuerit. In hoc igitur sermone demonstratum est, quomodo caput pituitam ex ventriculo trahat, & simile ad simile perueniat, & simul à me dictum est, quomodo & quare copiosior pituita homini à cibis ac potibus fiat. Nunc verò dicam de bile

Caput cucurbitulæ instar.

A bile, quomodo & cur copiosior in corpore fiat, & quomodo Bilis.

locus folliculi in hepate ipsam trahat. Habet se res hoc modo. Postquam comedit & bibit homo aliquid amari, quodq; aliàs biliosum ac leue est, copiosior etiam bilis fit in hepate, & statim dolet hepar, quod pueri cor vocant, atq; hoc ita fieri videmus, & clarum nobis est quod à cibo aut potu factū est. Trahit etenim corpus in seipsum de cibis omnē prædictum humorem. Trahit etiā folliculus in hepate, quicquid isthic biliosi inest. Et si derepente multa bilis fiat, homo hepar dolet, & de ventre copiosior fit. Hoc enim contingente, procedit de veteri bile propter multitudinem ad ventriculū, & ex hoc tormen ventriculo oboritur, & pars ipsius per vesicam,

B pars per aluum egreditur, atque sic minimā pars in homine manet, & dolores cessant. Si verò neutrum horum cōtingat, procedit primū de veteri bile ad corpus, distribuitur enim ad ipsum: & si multa fuerit, statim significationem sui præbet alijs humori ammixta. Si verò modica, non adeo læserit, quum magnum sit corpus, si nō & aliud quoddā principium suboriat, Verum tēporis progressu, si alia bilis superaccedat copiosior, hominem utique læserit. Si verò nō superaccedat, excolare illam poterit corpus, ut & bilis, & quæcunque biliosa sunt, prodeant. Nam quæ in cibo ac potu sumuntur, alia aliorum medicamenta sunt. Sic sanè etiam alia quæcunque lædentia sunt medicamēta, ubi aliud ab alio in ventriculum incidit, sua ipsius potestate caussam habēs, id, quod **C** superatum est expellit, ac ipsum lædit. At si superaccedat alia bilis in corpore, ab his quæ in ventriculum incidunt morbus huic oboritur. Atque in hoc sermone iam ego declaravi, quomodo bilis, & cur copiosior fiat in corpore, à cibis & potibus: & quod trahit in seipsum folliculus in hepate, iuxta similitudinem id quod biliosum est à cibis ac potibus.

Nunc verò dicā de aqua, quomodo, & cur copiosior fiat in corpore, & quomodo splen trahat in seipsum. Affero autem ubi homo bibit amplius, & corpus, & splenem aquam in seipsa trahere ex ventriculo. Et si plus traxerint quam oportet, statim hominem affligi, atque hoc ita fieri intelligunt quicunq; homines splenici existunt. Postquam autem traxit splen, optimum est, si vetus aqua quæ in splene inerat, ad vesicam aut vētriculum excoletur, & per hæc expellatur.

Nam

Hippocratis Liber I I I I.

Splen tur-
gens quid
agat.

Cor cur nō
laboret.
Venæ iu-
gulares.

Nam per supernas regiones nō purgatur aqua de splene, nisi **D**
quantum eius in valis inest, quæ de liene procedunt: verum
ad ventriculum & vesicā depurgatio fieri potest. Si vero hæc
ad fluxionem apta non fuerint, neque aqua per ea foras exco-
letur, de splene ad infernas partes aqua procedit, atque isthic
alij humori miscetur. Et si quidem pauca fuerit, non sanè læ-
terit. sed de corpore ad vesicam, & ad ventriculum, per venas
excolari poterit. Sunt enim multe ex hoc tendētes deorsum,
quæ ex infernis partibus ad seipsas trahūt, vbi sicciore fuer-
int quā prius erant. At si alia aqua generetur, & ventricu-
lus ac vesica foras non expellant, splen eleuatur, & infernæ
corporis partes dolore afficiuntur. Atq; hæc à me dicta sunt,
quomodo & cur aqua copiosior generetur in corpore à potu: **E**
& quomodo splen trahit. Nunc autem de sanguine dicam,
quomodo & cur amplior in corpore generetur. Postquā bi-
bit aut comedit homo aliquid quod sanguineum est, trahit
quidem & totum corpus in seipsum, trahit autem & cor san-
guineum ad seipsum. Et vbi plus attraxit, nō oboritur cordi
dolor. Est enim cor res solida ac densa, & propterea dolore
nō affligitur. Et ex ipso procedunt venæ crassæ iugulares ap-
pellatæ, ad quas statim si copiosius accedat, sanguineum il-
lud distribuitur, & illæ impletæ breuī ad caput & corpus de-
legāt. Et quum edirit aut biberit homo quid sanguinei, sta-
tim venæ iugulares attolluntur, & facies rubet. Accedēte ve-
rò ad cor & corpus sanguine quā satis est vberiore, à cibus ac
potibus, & ad alium humorē ammixto, si non ab ipso egres- **F**
sus fuerit, per alium aut vesicā, reliquo humori ammixtus,
dolorem corpori inducit. Si verò modicus accedat, non sanè
læserit corpus. Verum tēporis progressu distribuitur ab ipso
ad ventriculū, aut ad nares, quæ ipsum foras excolant, & nul-
la læsio contingit. Si verò paulatim copiosior fiat, morbosus
efficitur. Atque ita quomodo copiosior sanguis generetur, à
me declaratum est. Quum autem sint quatuor, Sanguis,
Bilis, Pituita, & Aqua, omnia hæc à me demonstrata sunt, &
quomodo, & cur copiosiora fiant, à cibus ac potibus. Quod au-
tem ex his fiant ac generentur, hoc argumento constat. Si ho-
mo parū edit, & parum bibit, nullum morbum hoc ipsi indu-
cit. Et hæc quidem de hoc mihi dicta sunt. Attigi etiam obi-
cer ostendere intelligenti, quomodo hæc pauciora fiant. Ve-
rūm

Arum de hoc paulò post melius tractabo. Ceterum fontes hi quatuor quos nominaui, quum pleni fuerint, semper corpori distribuunt: quum verò vacui, vice versa trahunt ab ipso, Sic etiam ventriculus facit. Et habet se res hoc modo, veluti si quis tria aut plura anea vasa in planissimo loco componat, & coaptata quàm optimè disponat, fistulis ad foramina insertis, atq; ita placide in vnum vas aquam infundat, donec omnia ab aqua fuerint expleta. Ab vno enim diffluet in reliqua vasa, donec etiam alia fuerint expleta. Postquàm autem plèna facta fuerint vasa, si quis de vno aquam effundat, retribuet se retro fluens aqua ad vnũ vas, & vacua fient reliqua vasa rursus, quemadmodum etiam susceperunt. Sic sanè & in corpore res se habet. Postquàm enim cibi ac potus in ventriculum inciderint, fruitur corpus de ventre, & vnà cum fontibus impletur. Vbi verò alius vacuatur, rursus retro humor ab ipso redditur, quemadmodum susceperat, veluti ex aliis ad vnum vasculum. Venæ enim sunt per totum corpus tendentes, aliæ tenuiores, aliæ crassiores, multæ ac frequētes. Hæ autem donec viuit homo, apertæ sunt, & suscipiunt & dimittunt nouũ humorem. Vbi verò mortuus fuerit, clauduntur & extenuantur. Quandiu igitur viuit homo, fruitur corpus de ventriculo, vbi quid in seipso habuerit: fruitur etiam fontes, & impleti corpori distribuunt. Si enim corpus non traheret de ventriculi humore, sed soli fontes, & hi ad corpus distribuerēt, non sanè haberet corpus sufficiens alimentum, sed paucius. Non enim amplius haberent alimentũ fontes, quod corpori subministrarēt. At verò si fontes isti non essent, dum edimus ac bibimus, verè non cognosceremus, neq; quid iucundũ, neque quid iniucundum esset, propter hanc quam referam necessitatem. Hi loci quum minores sint, & intra reliquum corpus, semper etiam antea quàm attrahat vnusquisque iuxta suam facultatem, reliquo corpori denũtiat de cibis ac potibus, qui biliosus sit, & qui pituitosus, & qui sanguineus, & qui aquosus. Quicquid enim horum humorũ plus quàm opportunũ est, in cibis ac potibus nobis obuenerit, neq; cibos illos iucundos facit. Quæ verò maximè appetimus, pro eorum ratione etiam illi iucundi sunt. Si verò cibis ac potibus opus habuerit fons quidam, pro hac ratione etiam corpus trahet ab ipsis fontibus, donec humor paucior quàm oportet fiat, & tũc sanè appe

Fōtes cor-
pori submi-
nistrāt, non
soli.

Quo pacto
sua quisque
trahat.

Hippocratis Liber I I I I.

Cur cum
multum
sumpsimus
plus appe-
timus.

Locus bilis
fel.

Caput pi-
tuitę locus,
cor sangui-
nis, lien a-
quę.
Venę iu-
gulares.

Cur cor nõ
afficitur,
caput & lię
multum.

Quo pacto
humores in
corpore mi-
nuantur.

nẽ appetit homo aut edere, aut bibere tale quid, quod por- D
tionem illam expleat, ac reliquis adæquet. Et propterea vbi
multum cibi sumpsimus aut bibimus, quandoq; adhuc cibũ
aut potum appetimus, & nihil aliud libenter edimus, quàm
quod appetimus. Postquàm autẽ comedimus, & adæquatus
fuerit humor, his perfectis & in fontibus, & in corpore, tunc
cessat appetentia. Atque hæc de hoc à me dicta sunt. Quin &
hoc se ita habet, quod ad folliculum in hepate, sola bilis à ci-
bis ac potibus secernitur. Venulę enim quum debiles & te-
nues sunt, alium humorẽ trahere non possunt, qui grauior &
crassior existit: & simul non est ea loci capacitas, vt alius hu-
mor in hoc folliculo consistat: & est hic locus maximẽ fami-
liaris bilis secũdum naturam, & ob id in ipso nullus alius fit R
morbis, quàm is quem homines Cardiognmũ, hoc est, cordis
morsum vocant. At caput, & cor, & splen, de omnibus humo-
ribus participant. Vnumquodq; tamen si non ægrotet, pluri-
mum de relatis participat, iuxta suam ipsius naturã, caput pi-
tuita, cor sanguine, splen aqua. Trahũt autẽ & de alio humo-
re venę in seipsas amplę & crassę, & instar pampini retortę
existentes, ita vt vbi trahant, alius humor alium sequatur. Et
cordi quidẽ propinquant venę iugulares crassę, ad quas citò
distribuitur, vbi illi amplior quàm cõmodus est humor acce-
dat. Hæc verò ad reliquum corpus delegãt: & simul ipsum cor
solidũ est ac densum, vt ab humore non ægrotet, & propterea
nullus morbus in corde oboritur. Caput autẽ & splen maxi- F
mẽ sunt morbis obnoxia. Aegrotant enim & ab his quę à na-
tura insunt, quum plura quàm opportunum est, accesserint,
Aegrotant itẽ ab aliis humoribus. Venę enim in ipsis crassę
ac multę sunt, & ipsa quoque venosa sunt ac caua, vt & aliis
humoribus recipiendis capacitas in ipsis sit, paulatim nimi-
rũ accedentibus, & ad eum humorem qui à natura inest, se
amiscẽtibis. Quemadmodũ in vase magno amplior capa-
citas est quàm in paruo. Sic sanẽ & in capite, aut in splene, res
se habet. Magna enim capacitas maximẽ in ipsis est. Si verò
repletę fuerint isthic humore venę, ab ipso sanẽ in illis mor-
bus oboritur. Atque hæc mihi de hoc nunc dicta sunt. Volo
autem meliũs declarare, quomodo vnusquisque horum hu-
morum in corpore paucior fiat. Quatuor equidem humores
esse demonstrari hominem lædentes, Quatuor item ipsorum
fontes.

A fontes. Quatuor quoque esse dico locos, per quos homo de singulis his expurgatur. Sunt autem hi, os, nares, podex, vrinae locis ^{Quatuor} meatus. Et ubi humor aliquis affligens copiosior facilius fuerit, si his locis homo depurgetur, nullus ipsum morbus ab illo premit. Et si ventriculus plenus fuerit, liquecente corpore ab humore, defluit ad ipsum, & extra prodit per aliquem horum locorum, & propterea humor paucior fit in corpore. Corpus enim velut & antea dixi, ventriculo retribuit, ubi vacuus fuerit, & fruitur de ipso, ubi plenus existit. Atque hac à me dicta sunt, quomodo & cur pauciores fiant humores hominem affligentes. Quomodo vero & cur homo sanus degat, referam. ^{Sanitas quâ} Postquam comedit ac bibit, & humor ad corpus peruenit, eo ^{contingat.}

B quo dictum est modo, ammixtus alij, tum ei, qui in corpore, tum ei qui in fonte est, ea quidem die qua accesserit, in corpore manet. postridie vero alius humor ad ipsum accedit. Atque hi ^{Tertio quo} quidem duo sunt dies, duo vero in corpore humores. Et alteri ^{que die} quidem humori duo dies sunt, alteri unus. Et qui quidem ^{quæ sumuntur pro-} postridie accessit, manet in corpore, ut qui sit crassus. Alter ^{deunt.} autem coctus à caliditate diffunditur, & tenuis fiens, postera die ad ventriculum accedit, & per omne tempus à recto expellitur. Ubi vero ad ventriculum peruenit, cibos in hoc loco coquit, & de se sanguinem in corpore facit. Si vero permanserit, tempore graueolens fit. Tertia vero die una cum stercore, & vrina exit, copia ipse sibi ipsi æqualis, & consimilis, & æquilibris, etiam si sui ipsius pars quedam sit, quo humor maneat in corpore iuxta relatam rationem. Influit autem & tertia die humor de corpore ad ventriculum amplior & graueolentior, qui videlicet reliquus fuit à secundo, & deferat cibos coctos, & quicquid est in corpore morbosum, & rursus simul exit. Indicio est autem vrina quæ salsuginosa est, quod cibi deferunt de corpore etiam id quod morbosum est. Et cibi quidem semper postridie per aluum secedunt, humor autem ad tertiam diem. Hoc modo sanitas contingere solet. Atque hæc dicta sunt, quomodo, & cur homines sani degunt. At vero humor hic si particulatim foras prodiret postridie, cibi non similiter ex ventriculo graueolentes facti foras prodirent, sed veluti cocti: & vrina potui similis, & corpus semper euacuaretur, & per omne tempus homo, ubi ventrem exonerasset ac minxisset, opus haberet statim potu ac cibo, pro egestionis factæ copia,

Quid esset
si statim o-
letaretur.

copia, si modo validus esse deberet, quum humor sufficiens in D
 corpore non relinquatur, sed una cum stercore foras prodeat
 postridie, aut eadem die. Et si quidem comedisset, bene esset.
 Sin minus, & euacuatus, debilis esset, neq; humor crassius fie-
 ri posset, ut postridie foras prodiret. Non enim sufficiens in
 corpore relinquatur. Nunc verò alium exonerantes probè va-
 lemus, & si per biduum nihil cibi acceperimus, & vivere, &
 facere quid possumus, & non penitus debilitamur ex euacua-
 tione in hoc tempore. Humor enim in corpore manens, robur
 exhibet. Atq; hæc à me dicta sunt, quomodo & cur fieri non
 possit, ut humor qui corpori accessit, foras egrediatur eadē
 die, imò neque postridie. Id porro assero, si humor pluribus E
 quàm tribus diebus in corpore permaneat, aut alius multus
 implens accedat, venis calescentibus ac stantibus, maius ma-
 lum, aut minus, homini significationem de se præbere: hye-
 me quidem minus, & posterius: æstate verò maius, ac prius.
 Atque hæc à me dicta sunt, de eo quod fieri solet, si humor in
 corpore maneat. At verò si corpus cibos eadem die egere-
 ret, non sufficienter humore uti posset, sed essent homines
tenuēs ac debiles. Nunc verò quum maneant cibi ac potus,
 quandiu permanent, corpus fruitur sensim de ventriculo tra-
 hens, & impletur. Hæc dixi & quomodo, & cur cibi non pos-
 sint eadem die exire. Si verò cibi maneant in ventriculo, am-
 pliorem tempore quàm opportunum est, & alij ad ipsos inci-
 dant, corpus utique repleatur, & dum premuntur à plenitu-
 dine venæ, calor ac dolor corpori accesserint, æstate quidem F
 citius, hyeme verò posterius. Aestate enim calidus est aer am-
 biens, & calidiorem corpus in seipsum trahit. Et si calido ad-
 huc existente ventriculo, calidior quàm opportunus est spi-
 ritus homini accedat, nihil miri est hominē ex tali febrile.
 hyeme verò cum frigidum spiritum trahat in seipsum, mul-
 tō magis poterit corpus repletionem ferre, hominē modicè
 ventrem exonerante. Et hæc à me dicta sunt de eo quod fie-
 ri solet, si cibi ampliorem tempore in ventriculo maneant. &
 attigi quoque obiter ut declararim omnem humoris ac cibi,
 & longioris & breuioris temporis differentiā, cur homines
 ægrotent. Verum de hoc melius tractabo temporis progres-
 su. Reuertor rursus retrò de sanitate dicturus, quod sanè cor-
 pus hominis humore de cibis ac potibus fruitur, & prodeunt
 foras

A foras in sano, tum cibi, tum humor, iuxta relatam rationē.
 Et si quidē foras prodeat plūs humoris, quā de cibis ac potibus accessit, homo attenuatur. Prodit autē foris plus quā de accessit ob hanc causam. Si in quiete degat homo & non laboret, mali aliquid ipsi in corpore inest. Verūm præ alia sanitate quæ multa est, nō ledit valde. Malum verò illud huiusmodi est. Postquam aliquid ex his quatuor corpori accedentibus, aduenerit copiosius, non ita multò corpus calefcit sensim, vt non valde latatur: & liquefcit in ventriculo, & cibum homini iniucundum facit. Si verò humor alius alio copiosior fuerit, febris ex hoc homini oboritur. Verūm de hoc exactius paulò post tradam. Quandoq; etiam vbi cibus iucundus est, homo attenuatur. Causa verò eadem est. His autem sentientibus, plus humoris extra prodit, quā succēturiatur. Et propterea in quiete degēti cōtingit vt attenuetur. At verò laborantibus hominibus itidem corpus coalescit. Et hoc à labore calefcere, tum humor in ipso attenuatur, tum attenuatur. Quid ex exercitatio possit.
 tionis morbus oboritur. Quum autem inutilis fiat humor, & ad ventriculum, & ad vesicā defluit, hæ autem foras expellunt. Pars verò ipsius extra exhalat, per internā corporis raritatem. Pars autem quæ adhuc intus manet, sudor fit, & per corpus foras procedit. Eodem modo & exercitationes iuuenum idem efficiunt quod labor. Si verò etiam non paucior fuerit humor eo qui prius exiuit, accedatque insuper alius à cibis ac potibus, attenuatur propterea homo. Paucior autem accedit, si nō aliud quid edere poterit, & si neq; laboret prioris laboris aut exercitationis ratione, alij aliis pauciores fiunt. Cæterum bonus corporis habitus accedit ex esu, hac de causa. Postquam resiccatus est tēpore humor, & in prior labore prius egressus est alius alio copiosior, & vnus alius alios valde superauit, homo repletus fit. Et si quidem à multis valde superetur, febris ex hoc modo oboritur. Si verò à paucis parum superatur. Sed & corpus hoc modo sufferre ac reualefcere potest, humiditate enim vberiore in ipso existente, calorem exoluit. Calefcit enim corpus à febre, & si quidē modicum fuerit id quod affligit, tertia die eodem modo dimittit, per duas autem cōtinuē tenet. Si verò copiosius, quinta die: per quatuor verò tenet pro ratione. Atque hoc modo morbi per dies iudicantur. At si dimiserit febris in imparibus diebus

Morborū
decreta.

Hippocratis Liber IIII.

diebus, & sanus homo fit, & moritur. Quae de causa, paulò D
Cur diebus
 nō paribus
 hæc fiant. post dicam. Nunc autem referā cur febris dimittat. Sic autē
 sentio, Quaecunque febris de corpore hominem corripuerit,
 necesse est tertia die humorem affligentem exire de corpore,
 aut in alio quopiā impari die, iuxta rationem antea relatā.
 Non enim exit prius quā alius bonus de ventriculo ipsi ac
 cedat. Nam intermedia & postera die corpus trahit de ven-
 triculo, quicquid ipsi in seipso dimiserit priore die, nisi ven-
 triculus id expulerit, & alium humorem habuerit, quod sa-
 nū malum homini esset. Si verò dimiserit febris tertia die,
 eodem modo dimittit quo etiam eadem die, velut dictū est.
 Atque ita quidem contingit, ut febris de corpore fiens, tertia
 die remittat. Dico autē, etiam si quinta die, aut septima, aut E
 nona dimittat, eodem modo dimittere, quemadmodum &
 tertia exiit. Etenim alimentum feбри contingit, secundum
 locos quos paulò antea dixi. Vbi enim humor copiosior præ-
 valuerit, homo liberatur à febre. Dimittit autē febris in die-
 bus imparibus ea de causa. Quòd videlicet in paribus die-
 bus trahit corpus de ventriculo: in imparibus verò dimittit,
 Ventriculus autem extra propellit in homine sano, iuxta hu-
 iusmodi necessitatem morbi in imparibus diebus iudican-
 tur. Atque hac quidem ratione homo febricitans sanus eua-
 dit. Afferro autem & quòd doleant maximè homines ægroti
 in imparibus diebus, propter hoc & secundum rationem fie-
 ri. Conturbatur equidem homo quum febricitat. Cuius rei
 signum est, quòd horror aliàs atq; aliàs per corpus transcur- F
 rit. Hoc verò non sanè ita cōtingeret, si nō cōturbaretur hu-
 mor, & de ipso aut plus, aut minus secerneretur, & alius aliū
 superaret. Cōturbatur autem maximè in imparibus diebus
 quum ægrotat. Sed & horror maximè tunc fit. Habet enim
 se res hoc modo, De humore affligente expellitur aliquid ex
 corpore, à recentissimo humore superatum, & procedit ad
 alium infernam, & alius ipsa vnà cum affligente calefcit, su-
 scipiēs in seipsam magis quā priore tempore. Hoc autem
 maximè fit in morbi iudicatione. Et si paulatim corpus ad
 alium dimiserit, & non multum fuerit id quod hominē af-
 fligit, & alius, & corpus, calorem sufferre in iudicatione po-
 test, & homo sanus euadit, vbi humor affligens egressus fue-
 rit, & is qui feбри alimētū præbuit cōsumptus, & sanus præua-
 luerit

A luerit. Atque hac ratione propter relatas à me causas, homo ^{Salutis mor} agrotus sanus euasit. Nunc verò referam cur moriantur ho- ^{tisque caus} mines in imparibus diebus. Sic autem sentio. Si multum fue-
rit id quod affligit in corpore, magis quàm opportunum est, & aceruatim robustum, turbatur ad ventriculū, & quum nō possit calorem sufferre corpus, eo fruitur, & graueolentiam circa spiritum fieri necesse est, & quum nequeat corpus præ debilitate, nimirum omni humore morboſo existente, spiri- tum trahere, quo ea quæ in ventriculo sunt refrigerentur, quicquid est humoris vitalis id foras exhalat, atq; ita homo moritur. Non enim superat alius humor, sed totus à morboſo qui multus est eleuatus, ac cōsumptus à febre exhalauit ac perspirauit. Atque hoc modo in imparibus diebus maximè dolor affligit. Neq; est quisquam cui hoc non sit notū. At verò quòd humor turbetur in iisdē diebus, hoc signū est. Qui- ^{Dispari-} bus diebus
cunque iam à febre continua correpti, pharmaco vli sunt in ^{omnia lan-} diebus paribus, hi nimum purgati nunquàm sunt. Qui verò ^{guentiū di-} in diebus imparibus medicamento forti vli sunt, nimiū pur- ^{scernuntur.} gati sunt. Multi verò etiam perierunt nimum purgati. Proinde priores Medici in hoc maximè peccarūt. Medicamen- ta enim exhibuerunt in diebus imparibus, & homines pere- merunt, non scientes quòd hæc res se ita habet. Humor enim in corpore agroti magis turbatur in imparibus diebus, ni- mirum corpore humorem ad ventriculū trāsmittente. Et si quis iam turbatū, adhuc magis perturbet medicamento im- misso, nihil miri est ex talibus hominē perire. Quin & vlce- ra si curentur, maximè in his diebus inflammantur. Venit enim humor ad omnes venas quum turbatur, easq; replet. Et vbi ad vlcus peruenit, si quidem non curetur, & pus exitum ha- beat, expellitur ab humore qui in turbatione accessit, & vl- cus foras expurgatur. Si verò curetur, pus exitū non habens, & isthic vnā cum eo qui accessit permanens, dolorē inducit, & carnē circa vlcus attollit: & ex illo si quidem in cruribus habuerit vlcus, attolluntur venæ quæ in iuncturis crurum existūt. Si verò in manibus, quæ in manuū iuncturis sunt, & ex hoc glandularū tumores fiunt. Quibusunque verò homi- nibus febris incidit, si nihil aliud malè habeat homo, à pin- ^{Cur febris} guiore quàm oportet existente humore incidit, & venæ im- ^{nulla de} pletæ dolorem ac calorem vlceri inducunt. Hōc autem cale- ^{causā fiat,} factum

Hippocratis Liber IIII.

Labor
quid fa-
ciat.

Disparia o
mnia decre-
toria.

Morborū
causae.

Signa se-
ptem mali
vnus.

Simile

factum, etiam reliquum corpus calefacit. Atque hoc modo **D**
caliditas ad vlcera peruenit. Calefcit enim corpus, & vlcera,
ab humoris commotione. Et labor talia efficit. Liberantur
autē vlcera ab inflammatione quinta die, & iuxta horum die-
rum rationem, prout etiā vlcera fuerint magna, & tertia, &
quinta, & septima, & nona, & vndecima. deinde absoluto pri-
mo circuitu, rursus secundi principium tertia sequens hinc
est. quæ à prima, decima quarta est. Maxima vero vlcera de-
cima quarta die ab inflammatione liberantur. Atque hæc ra-
tio docet morbos in imparibus diebus iudicari, & humore
in sano homine tertia die exire, stercus autē secunda. Et hæc
tertia die cōtingentia mutuū inter se testimoniū præbent,
quod res se ita habeat. Atq; ita mihi hic sermo vniuersus ad
summū perductus est. Nunc verò exactius referre volo, cur **E**
homines ægrotēt, simulq; cum hoc sermone dicam quæ sint
principia morborum, & qualia vnumquodque ipsorum effi-
ciat. Sic autē assero. Si cibi plures quàm opportunū est, qui-
am concocti sunt, intus maneat, & homo non purgetur, &
alii cibi superingerantur, corpus ab humore priore ac recen-
ti repletū calefcit, & febris ex hoc homini oboritur. Verū
febris hoc modo fiens, nō periculosa, neque fortis est, in qua
humor æqualis est, copia paululum vberiore nos affligens. Si
enim hoc ita se habuerit, & quis admodum validus sit, &
quæ cōmoda sunt, adhibuerit, sanus euadit. Vnus autē mor-
bus solus est ex omni humore, & septem signa habet. Nā &
rursus ipsum habet, quæ & debilis & sicca est: & venter durus **F**
fit, utpote & stercorē intus contento: caput grauatur: & vo-
mit: & febricit: & vrina non probè prodit. Hæc septem signa
huius morbi sunt ex omni humore fientis. Si verò alui ege-
stione non prodeunte, vnus ex aliis humoribus superet, me-
lius deget homo. Et si quis febre fiente ab omni humore, non
adhibeat idonea, inualecet morbus quantum ipse humores
superauerit, hoc modo. Calefcēte sanguine exhalat maximè
per hunc humor aquosus, qui febricit est infestissimus. Relin-
quitur autem pinguis ac levis, qui est biliosus, & febricit maxi-
mè nutrimentum est. Exhalat autem hoc modo, Velut si quis
aquam & oleum in vas æneum infundat, & ligna multa sub-
iecta ad multum tempus exurat. Aqua enim multo paucior
erit, ex vase enim exhalabit: oleum autem paululum immi-
nuetur

A nuetur. Nā aqua præ raritate ab igne attenuari potest, & le-
uis reddita exhalare. Oleum verò vt pote quod est coniunctū
ac densum, attenuari non potest, neque similiter vt aqua ex-
halare. Sic sanè & in homine se res habet. Aqua enim calefcē
te corpore foras exhalat: Biliosus autem humor, vt qui con-
iunctus est ac densus, non similiter attenuatus exhalare po-
test. Verū attenuatus hic biliosus humor, corpus magis ca-
lere facit. Copiosius enim & melius alimentū febri bilis sup-
peditat, & prorumpens aut firmata in corpore, morbum su-
pra priora corroborat. Atque hæc quidem dicta sunt de eo
quod afficitur homo, si non purgetur & curetur. Si verò non
ipsa copia præualuerit, siue semel multa siens, siue paulatim
colligatur, reliquum corpus dum hoc fit, præ robore sufferre
potest, donec principium aliquod superaccedat. Atque hoc sa-
nè modo morbus fit, si homo à copiosiore fiente humore non
expurgetur. Principia ex quibus fiunt morbi, tria sunt. Et v
num quidem iam à me relatū est, qualia & quod afficiat in
corpore. demonstraui enim quomodo & cur agrotet homo,
si non purgetur. Alterum est, si contingat vt ea quæ ex cælo
obueniunt, inepta & præter victus rationē sint. Tertium est,
si violentum quid accidat. Violentum autem esse dico, & ca-
sum, & vulnus, & plagam, & laborē, & si quid aliud est huius
modi. Horum verò principiorum maximum est Violētia si
magna fuerit: si verò parua non ita maximum. Secundū est
si non purgetur homo. Tertium, si quæ ex cælo obueniūt in-
cepta fuerint ad sanitatem. Proinde diligenter ab his se custo-
dire oportet. Singula verò talia in corpore faciūt, qualia ego
dicturus sum. Equidem si vulnus fiat, manifestū est quod ca-
ro dissecta est, & vlcus factum est. hoc autē morbum esse di-
co. Si verò contusio fiat, homine percusso, aut lapso, aut aliud
quid tale perpeffo, & tumor oboriatur, sanguis statim præ
violētia calefactus, & venis hiātibus illapsus, nō habēs exitū
præ copia, quò abire possit, cōglobatur: & propterea tumor
fit, & tādū adest, donec depurgatus fuerit, eo modo quo de
locis depurgari dictum est, aut etiam per ipsum tumorē, &
siue per chirurgiā, siue sine ea, sanguini trāsitus fiat, aut per
tempus suppurato, aut nō. Sed & labor tale quid efficit. Quū
enim homines laborarint, quibus sanè maxime sanguinis af-
fectio contigerit, illic firmatur ac calefcit, & ex hoc dolor faciat.

Tria mor-
borū prin-
cipia.

Tumoris
caussa.

Labor quæ

A

obo

Hippocratis Liber IIII.

oboritur. Si verò hæc quidem superarit homo, verum mul-
ta copia labor accedat, & alius ac vesica non breui copiam
expulerint, febris sanè ex hoc irruerit. Et si quidem prior
humor æqualis fuerit, nequaquam. Si verò in labore ipso-
rum plurimus in corpore permaneat, superat ille. Atque hæc
à me dicta sunt de violentia, qualia in corpore efficit. Et hæc
quidem duo sunt principia, Violentia, & plenitudo, quæ si

Cælestis non purgentur homines, corpora calefaciunt. At verò quod
vis quid fa ex cælo obuenit principium, si ineptum fiat in homine, su-
ciat. perat aliquid humoris, & velut ad morbum calefacit & fri-
gefacit prius si fieri contingat. Dicam autem prius de eo,
quod calefacit. Sic igitur sentio. Si in eodem homine fue-
rit aliquid morboſi, quale in priori dixi, & ea quæ ex cælo
obueniunt, incommoda fuerint, & caleſcat homo, turbatur
humor omnis in corpore caleſcens. Hoc autem violentia
facit. Et si quidem depurgetur homo, humore illo turbato,
ſecernitur quantum eius plus quàm commodum eſt, redun-
darit. Et habet hæc res ſimilitudinem ad id quod Scythæ
Scytharum faciunt ex equino lacte. Lac enim in caua vaſa lignea infu-
butyrum. ſumunt. Illud autem dum turbatur, ſpumefcit ac
ſecernitur, & pingue quidem, quod Butyrum vocant, quum
leue ſit, in ſuperficie conſiſtit: graue verò & craſſum, deor-
ſum ſidit, quod etiam ſecretum ſiccant. Vbi verò concre-
tum ac ſiccatum fuerit, Hippacen ipſum vocant. At ſerum
Hippace. lactis medium locum tenet. Sic etiam in homine, dum tur-
batur humor, quicquid eius eſt in corpore, de principiis quæ
dixi, diſparatur. Et in ſuperficie quidem bilis conſiſtit.

Leuiſſima enim exiſtit. Secundo loco ſanguis. Tertio
Qui humo pituita. Grauiſſimus autem horum humorum eſt aqua.
res febrem
creant.

His verò ita ſe habentibus, quiſquis ex his in morbo plu-
rimus fuerit, in principio ſiente turbatione, deuenit ad lo-
cum, ubi plurimus eſſe poſſit. Verum in turbatione, ſpacio-
ſa capacitate ſiente, ſecretus diſtrahitur, & calefacit corpus.

Aut aliqua corporis parte firmatus, vnà cum alio humo-
re, cum quo eſt in alio loco, dolorem ac calorem exhibet.

Qui verò calefactus eſt locus, in ſuper etiam reliquum
corpus concalefacit, & ex hoc febris oboritur. Et oboritur
magis à bile & pituita, & ſanguine, calidiſſimi enim hi hu-
mores exiſtunt. Et ſi quis horum in aliqua corporis parte
firmatus

A firmatus fuerit, ut plurimum morbus illinc nominatur, & cognomen habet. Caterum ab aqua non valde fortis febris oboritur, neque diuturna. Nam igni non bonum alimentum aqua præbet. Atque hæc quidem de hoc dicta sunt. At vero ante turbationem, non habet multus humor quò procedat, sed sursum ac deorsum voluitur & distrahitur alij humori permixtus. Omnia enim plena existunt. In turbatione verò euacuantur. Verum aliud alio magis euacuatur. Et multus humor suum locum occupat, & alienus alij non ammiscetur, si firmatus fuerit priusquam ille viribus adæquetur. Potest autem ipsi adæquari is qui ab ipso postea ad morbum superaccescit, donec purgatus fuerit locus qualicunque purgatione. Si verò multus fuerit affligens humor fruitur: & consumitur ad morbum etiam alius qui prius salubris erat. Et tali modo homo moritur. fruitur autem, si morbus non amplius sufficiens alimentum habuerit, & consumitur ab humore qui in loco dolente existit. primum enim propinquum assumit, deinde longius depascitur, donec consumptum fuerit, & non amplius inest in corpore alimentum. Alimentum autem est homini humor levis. Quemadmodum igitur ut cer-
 tum est, putrefactio primum paulatim fit, si maximè calefiat: Postea ubi isthic alimentum putrefactioni non amplius sufficit, depascitur de sano, initio sumpto à proximo, ad totum corpus, donec totum quicquid carnosum est, putrefecerit, postquam verò in totum depasta est, alimentum putredine consumitur: Sic sanè etiam in morbo. Sumpto enim à loco illo initio, ubi isthic alimentum sufficiens non amplius inest, depascitur ulterius, à proximo initio facto. Postquam enim per totum grassatus fuerit, alimentum morbo consumitur, & alius salubris humor non superat. Et si hoc fiat, homo moritur. Quin & in turbatione, ubi hic salubris humor amplior locum occupavit, & non firmatus fuerit, sed voluatur ac distrahatur, non amplius alij miscetur, sed ad morbum consumitur, si non depurgetur. Deinde venæ superimplentur. Valde autem impletæ, nihil ex seipsis remittunt, priusquam spaciola capacitas ipsis contingat. Quemadmodum ubi quis vehementer percussus est, sanguis sub plagâ subtercurrit, nimirum venis à plaga euacuatis. Postquam autem carnes veluti spongia fuerint repletæ, non amplius remittunt, sed

Hydrops
febrem le-
uem & non
longam fa-
cit.

Qui æquen-
tur super-
uenientia.

Mortis caus-
sa.

Simile.

Hippocratis Liber IIII.

sed continent in seipsis, donec in loco aliquid ab ipsis eua-
 cuatum fuerit. Quum enim collectus fuerit sanguis, præ co-
 pia viâ intercept. Quemadmodum si quis vas olearium co-
 riaceum angusti oris oleo impletum, in osculum vertat è di-
 recto, & si hoc fecerit, oleum ex ipso prodire non poterit: viâ
 enim ipsum oleum intercept, utpote multum & acervatim
 incumbens. Si verò quis ipsum vas inclinet, libera erit via
 osculi intercepta, qua effluet oleum ex ipso. Idem fecerit
 etiam aqua in mensa. Ita sanè etiam ubi multus humor in
 corpore præ turbatione locum occuparit, & venas impleue-
 rit, non amplius ab ipsis discedit, priusquam ubi locus va-
 cuus est, alimento à morbo consumpto. Atque hæc à me di-
 cta sunt de hoc, si in corpore quid fuerit unde morbi gignan-
 tur, redundantibus etiam aliis: & quomodo principia effi-
 ciant calorem & turbationem humorum deducant ad mor-
 bum. Nunc verò dicam quæ efficiant ea quæ ex cælo nobis
 obveniunt, si ad ea quæ in corpore generata sunt, inepta fiât,
 & quum humorem in corpore superarint. Affero autem
 partem humoris in homine, ubi liquatus fuerit, conglobari
 ac spissari, donec morbum pepererit: partem verò dilatari,
 ac secerni. Habet autem & hæc affectio similitudinem ad
 lac. Si quis enim succum in lac immittat, frigiditas in ipso
 oborta, lac inspissat & conglobat. Ac circum inspissatum, se-
 rum est. Sic etiam in homine humor, frigiditate in morbo
 oborta, conglobatur & inspissatur. Circum ipsum verò aquo-
 sum humorem, adhuc etiam alius humor, quanto copiosior
 fuerit in alio corpore, ammixtus est. At si quidem ad alium
 deuenierit, sterminus conturbat, & tormen in aluo inducit, & fo-
 ras pertransit, nullo magno damno illato. Si verò non ad
 alium deuenierit, firmabit se aliqua corporis parte, ubi ipsi
 plurima capacitas erit. Volutatur itaque exquirens sibi ipsi
 loci capacitatem. Et quod quidem aquosi humoris de con-
 globatione secretum est, utpote frigidissimū ac gravissimū
 in corpore existens, ad infernas partes descendit, & circum
 ossa ac nervos volutatum, adhuc magis corpus ad inflamma-
 tionem perducit, & clarum est quod circa nervos, & præser-
 tim circa ossa, aquosus humor, qui humorem facit, existit.
 Circa osseas enim corporis partes, homo maximè riget, &
 capilli erecti stant, contorta cuticula, ac sicciore fiente quàm
 priori

Hydrops.

Horroris
 causa.

A priori tempore: Nimirum aquoso humore isthic deficiente, & circa ossa obuoluto. Atque hinc sanè solus ille locus ubi primo tempore erat, humorem facere nō potest, vnde etiam rigor oboritur. At verò reliquus humor qui æqualissimè crassus est, partim quidem in toto corpore est, partim verò quantum abundauerit, si quidem aluus plena non fuerit, & quod affligit modicum sit: quandoque ad aluum deuenit, & nullum magnū damnum inducit. & aliquando quidem febrem nō inducit, aliquādo verò debilem & innoxiam. & quod affligit vnā cum stercore exit. Si verò aluus plena multum quod affligit habeat, periculum est ex ipso morbū aliquem fieri, si alicubi se firmet id quod affligit, aut ad latus, aut ad viscus, aut alicubi aliam partem contalefaciat, quo primū illum humorem simul turbet. Qui verò non valde ex calore ab aquoso humore victi sunt, utpote qui circa ossa, & prope medullam cōsistit: hos progressu temporis magis lædet, primū quidē in illum ipsum locum, deinde ipsi propinquum, & semper vterius depascitur, & aluus ipsum assumit, ut quæ calida sit, & postea tum aluus, tum lædens humor, adhuc magis calefacit. At humor crassus calescens primū diffunditur, is qui propinquus affligenti existit. diffusus autem aquoso humori affligenti miscetur: deinde in concutitur, & corporis inanior redditur. & tam diu rigor tenet, quā diu crassus humor alij humori ammixtus est. Quin & hinc modo generata oboritur. Affligentia ad locum hunc accens corpus febrem in se suscipere cogunt: & ab affligentia, & ab aluo calefactum, reliquum aquosum humorem superat, Atque sic febris fit post frigus, si qua corporis parte copiosior humor formatus fuerit. Si verò voluatur ac distrahatur, tali modo febris oboritur. Post frigus febris volutatur, maxime affligens circa aluum & supernam, & infernam. Isthic frigus febris fiat. enim plurima loci capacitas existit. Dum autem volutatur, primū propinqua calescunt, & viscera, & quæ in aluo sunt, Postea etiam alius humor diffusus calore fruitur, & aquoso humori miscetur. Atque febris post rigorem hic fit, ubi affligens volutatur, Imò etiam ubi firmatum fuerit reliqua corporis parte. Et hæc à me dicta sunt quomodo, & quando, rigor morbosus fiat, & quomodo, & ex quali necessitate febris post ipsum irruit. Et quæ sint principia morborum, & quæ

Venter plenus vel vacuus quid faciat.

Quid post frigus febris fiat.

Hippocratis Liber IIII.

Lumbrici
qui creen-
tur.

Lumbrici
nō gignūt.

lem vnumquodque ipsorum morbum in corpore inducat, & **D**
quomodo, & cur in diebus imparibus morbi iudicantur. Et
vnde homines sani sint, & vnde agrotent. & quomodo bilis,
& pituita copiosior & paucior fiat. Itēque alia multa quæ
in ipsa natura humana sunt, demonstraui, quæ sanè hic ser-
mo exigebat. Atque hæc ita relata finem habent. Nunc au-
tem de lumbricis latis dicam. Assero enim ipsos in puero
dum adhuc in vtero est nasci. Postquam enim semel ex vte-
ro egressus est, non tanto tempore stercus in aluo manet, vt
ex eius diuturnitate ac putrefactione, tantæ magnitudinis
animal generari possit. Excernit enim semper hesternum
stercus per omnes dies, si sanus homo esse debet. Tale verò
animal nasci non possit, etiam si multis diebus homo stercus **E**
non egeret. Multa enim nascuntur dum puer in vtero est,
hoc modo, Vbi ex lacte & sanguine computrescente ac re-
dundante, vtpote quod dulce est, pus factū fuerit feruidum,
animal isthic generatur. Nascuntur autem & rotundi lum-
brici isthic eodem modo. Signum verò quod hæc res ita se
habet, hoc est. Postquam in lucem editi sunt pueri mulie-
res ipsi in cibo offerunt medicamenta, quo stercus ex inte-
stino exeat, & non comburatur, & simul vt intestinum dila-
retur. Postquam vero cibum obtulerunt, multi sanè pueri & ro-
tundi lumbricos vnà cum primo stercore excer-
nunt, & non excreuerint, fiunt etiam insupérque na-
scuntur in intestinis. Et rotundi quidem pariunt, lati verò
non amplius, etiam si quidam ipsos parere dicant. Nam ho- **F**
mo qui latum lumbricum habet, velut cucumeris semē ex-
cernit aliàs atque aliàs, vnà cum stercore ipso, & sunt homi-
nes qui hoc lumbrici partus esse dicunt. Mihi verò non re-
ctè dicere videntur qui talia dicunt. Neque enim ab vno
animali tot pulli generari possunt: neque ea est loci in inte-
stino capacitas, vt partus educare queat. Augescente autem
puero, augescit etiam lumbricus in intestino, ab his quæ in
ventriculum ingesta sunt, & æqualis sit intestino, quibusdam
in pubertate, quibusdam posterius, quibusdam paulò prius.
Et postquam intestino adæquatus est, similiter augescit, &
quanto maior factus fuerit, vnà cum stercore excernitur de
intestino recto, & excidit velut cucumeris semen, sæpe ve-
rò etiam maior. Quibusdam verò iter facientibus, aut la-
boran

A borantibus, & ventriculo calescente, deorsum descendit, ipsique prominet ex podice inflatus, hocque facit, & de podice rescatur, aut retrocedit. Signa vero quod non pariat, sed ita habeat velut ego dico, hæc sunt. Si quis curet hominem latum lumbricum habentem, & medicamentum dederit aut potionem, si quidem fuerit homo bene præparatus, totus rotundus factus ad pilæ figuram exit, & homo sanus euadit. Si verò ad medicinam hæreat, recta pars de lumbrico abruptitur, longitudine duorum aut trium cubitorum, aut etiã longè amplior, & ubi abruptus fuerit per multum tempus signa cum stercore non prodeunt. Postea verò augescunt. Atque hæc argumenta sunt, quod lumbricus latus non parit, sed abruptitur. Est autem species ipsius, qualis alba intestini rasura. Signa habet hæc. Cacat aliàs atque aliàs velut cucurbitis semen, & ubi ieiunus est homo, exilit ad hepar aliàs aliàs, & dolorem inducit: & quandoque sputa ori influunt ubi ad hepar assilit, quandoque non. Quibusdam etiam vocem intercipit, si fortiter ad hepar irruat, & valde multa sputa ex ore fluunt, paulo autem post sedantur, & tormen multum in ventriculo aliàs atque aliàs oboritur. Quandoque etiam ad dorsum dolor incidit. Nam & hic aliquando firmatus innititur. Hæc lumbrici lati signa sunt. Contingit & hoc. Qui hoc animalculum habet, in toto quidem tempore valde debilis fieri non poterit. Vbi verò debilis factus fuerit, vix reualefcit. Latus enim lumbricus partis alicuius particeps fit, ex his quæ in vētriculum ingesta sunt. Si quidem igitur curatus fuerit iusto modo, sanus fieri poterit. Si verò non curetur, sua sponte non exit. Mortem tamen non inducit, sed consenescit. Atque hæc à me dicta sunt de lumbrico lato, unde nascitur, & quæ morbi ipsius signa sunt. Cæterum calculi morbo principium oboritur à lacte, ubi puer lac impurum fugit. Lac autem in nutrice impurum fit, si pituitosis cibis ac potibus, & alimentis impuris nutritur. Conferunt enim omnia in ventriculum illabentia in ipsa ad lac. Habet autem & hæc res se hoc modo. Si nutritrix non sana fuerit, sed biliosa, aut aquosa, aut sanguinea, aut pituitosa: Lac etiam malum puero generatur. Consentiant enim corpus & ventriculus. Plurimum verò ipsi ad lac cedit, de eo quod ipsa plurimum in seipsa habuerit. Et puer si de nutrice lac non

Longus
lumbricus.

Lumbrici
signa.

Calculus
puerorum
unde fiat.

Hippocratis Liber IIII.

Lapis in
vesica qui
fit.

Similitérq;
ferrum fit.

Calculi di-
uersa caus-
la.

Quinto
calculi si-
gna.

lac non purum suxerit, sed biliosum velut dixi, morbosus fit D
ac debilis: & in præsens maximè affigitur, quandiu lac pra-
uum ac morbosum suxerit. At vbi suxerit lac nō purum, sed
terreum & pituitosum, & habuerit puer venas de vētriculo
ad vesicam tendentes amplas ac attrahētes: procedit autem
& quod bibit nutrix, & lac in ventriculū pueri, tale quale
trahit à vētriculo de lacte in totum similiter prout venæ ad
ventriculū detrudere possunt: si quid sanè in lacte non pu-
rum fuerit, id quod vesica fruitur lapis fit tali modo, velut in
aqua nō pura in calice aut vase æneo turbata, & rursus seda-
ta, fex aceruata fit in medio. Sic sanè & in vesica de vrina nō
pura existente. Et non per vrinam eiicitur, vt quæ in cauo sit E
loco, & maximè aceruata fiens, præ dolore per misionem
non pertransit, & à pituita cruda cōcrefcit. Glutinum enim
fit pituita ad fecem ammixta. Et primū parua lanugo su-
perstat, deinde quod accedit arenosum fit glutino fiens pi-
uita, quæ est in vesica de lacte, & augetur, & quicquid hu-
moris in glutinatione accesserit, emingitur. Rursus autē fex
solida fit, & lapidis speciem accipit. Quemadmodū ferrum
ex lapidibus ac terra dum cōburuntur fit. Et in prima quidē
in ignem immisione, cōglutinati sunt lapides cum terra ad
ferri recremētum. At vbi iterum atque iterū in ignē immis-
sa fuerint, recrementū quidem foras decedit liquefcens ex
ferro, id quod ita fieri oculis videmus. Ferrum autē in igne
relinquitur, & recremento decedēte subsidet, fitque solidum
ac densum. Sic profectò etiā fex in vesica, dum pituita gluti- F
num fit, emingitur id quod ab vrina liquefcit. Fex autem
subsidet, & densatur, ac solida fit velut ferrum. Vbi verò sub
sedit ac solida facta est, sursum ac deorsum in vesica voluta-
tur, & feriens vesicam dolorem inducit, & si vehementer fe-
riat ac vlceret, aliquid de ipsa aufert. Verū id quod insuper
affertur, adhuc magis quā id quod arenosum decessit, con-
cretionem efficit. Atque tali modo fit lapis de lacte in vesica:
& si pueri anxietas aliqua ab hoc oboriatur, aliās atque
aliās, vbi meiere vult, vrina meatū apprehendit. At si puero
iam adulto lapis gignatur ex terræ esu, dolor non adest ipsi
prius quā ipse sibi ipsi cibum deligat. Et hæc à me de hoc
relata sunt. Cæterum morbus signa quinque habet. Nam
vbi meiere vult, dolore affigitur, & vrina paulatim fluit ve-
lut in

A lut in vrinæ stillicidio, & est subcruenta, nimirum vesica à lapide exulcerata, & vesica inflammata est. Verùm hoc signum inconspicuū est, indicat tamen summa pars præputij. Quandoq; mingit arenosa, verùm à talibus, qualia ego dicam. Eii-
cit autem aliquando lapides duos, aut etiam plures paruos, Quî duo, vel plures calculi fiât.
generatos eodem modo, velut de vno dixi. Fiunt etiam tali modo, Quum lapis fuerit concretus, & profundè subsederit in vesicam in arena separata, ita vt ipsam aduenientem lapis non assumat in seipsum, sed grauior ac copiosior fiat, vt tamen ipsa ad seipsam non concreascit, etiam sic duo lapides fiunt. Fiunt etiam plures eodem modo. Sed & collisis inter se in agitatione aliquid disparatur, & arenosum per vrinam
B eiiicitur. Quod etiam aliquando contingit, vbi arena ad vesicam descendit, & non coaluit. Quidam dicunt quòd potus in pulmonem deuenit, ex hoc verò in reliquum corpus. Potus pulmonem nō petit.
Hi autem qui hæc dicunt, redarguuntur ex hoc quod dicturus sum, quod videlicet pulmo cauus est, & in ipso fistula est. Quòd si pulmo cauus non esset, & fistula non ipsi adhereret, animalia vocem non ederent. Vocem enim edimus de pulmone, quia cauus est, & fistula ipsi adest. Vocem enim articulant labia & lingua, Verùm de hoc exactius in peripneumoniæ tractatione egi. Cæterum hominibus quibus potus in pulmonem ferri videtur, aduersabor, habetque res se hoc modo. Procedit potus in ventrē, à ventre autem in reliquum corpus expenditur. Oportet autē his quæ dicturus sum mentem adhibere. Sermonis argumenta, quòd potus non procedit in pulmonem, sed in ventrem, hæc sunt. Si enim potus procederet in pulmonem, quum pulmo expletus esset, homo non facile respiraret, neq; loqui posset. Non enim esset, pulmone pleno existente, quod resonaret. Et hoc quidem vnum argumentum est. Deinde si potus in pulmonem procederet, cibi in nobis sicci existentes non similiter concoquerentur. Atque hæc duo argumenta existunt. Sed & medicamenta alium subducentia, si in potu sumantur, extra ventrem procederent. Habet autē hæc res hoc modo. Quæcun- Medicamē ta quid agant.
que medicamenta purgatoria sunt aut supernè, aut infernè, aut etiam vtrunque præstant, ea hæc faciunt. Omnia valde ga-
vrunt, & fortia quidem ex ipsis, si partem aliquam teneram corporis contigerint, eam exulcerant. Mitiora verò turbu-
lentum

Libum ve-
stitus.

Cur lotium
oleat e scu-
lenta.

Lactis etiā
exēplo hos
refellit

Quid pul-
monis fistu-
lam regat
cū quid
edimus.

lentum corporis motum faciūt, quācunque tandem partem **D**
occuparint. Si verò aliquod ex his medicamentis in pulmo-
nem perueniret, videtur mihi magnū aliquod malum indu-
cturum esse, Pituīta enim de capite descendens, eum in valde
breui tēpore exulcerat. Tenera enim & rara res est pulmo,
& si exulceratus fuerit, non bene habebit homo ille, ob mul-
tas sanē causas. At verò venter à medicamento non exulce-
ratur. Nam res est valida ac robusta, nimirum velut pellis &
corium. Et plerique sanē ex Libyæ incolis pecorum pellibus
pro vestibus vtuntur, ventribus autem pro vtriculis. Robu-
sta enim res venter existit. Deinde vbi à vino nigro homines
repleti fuerint, nigra recrementa excernunt. Atq; hæc omnia
argumēta existūt. Et vbi allia comederimus, aut aliud quod **E**
dam edulium olidum, vrinam reddimus comesta odore refe-
rentem. Et hæc quidem omnia argumenta sunt. Sed & hoc
considerandum venit quòd dicturus sum. Si quis cyceonem
biberit, aut farinam coctam sorbuerit, aut aliud quid eius-
modi, & hoc ipsum in pulmonem peruenerit, certē arbitra-
mur ipsum ne minimū quidem tempus viuere posse. Vbi
enim modicum quiddam pituitæ in pulmonem peruenerit,
aut in fistulam ipsius, multa ac fortis tussis oboritur, ac con-
uulsio. Si verò vtrique & vixerit homo qui cyceonem biberit,
aut farinam coctam sorbuerit, vbi sanē concocta fuerit sorbi-
tio, videtur mihi multa & fortis caliditas corpori oboritura
esse, multusque dolor, vt omnino moriatur homo hoc modo,
si illa in pulmonem perueniant. Atque hæc iam argumenta **F**
septem sunt. Præterea quomodo lac infantes pueros nutri-
re posset, si ad pulmonem descenderet? Atque hoc mihi aliud
adhuc argumentum est. Et hæc ne produxissem quidem ad
sermonis mei confirmationem, nisi multi adeò homines es-
sent, quibus potus in pulmonem procedere videtur, & ne-
cesse est ad opiniones fortiter inhærentes multa argumenta
adducere, si quis velit auditorem à priore sententia abduce-
re ac conuertere vt suis verbis fidem habeat. Et propter hoc
etiam potus in pulmonem non procedit, sed in vētrem: quia
contigua & annexa est ipsi gula hominis semper hians, & in
hæc procedit. Et simul pulmonis fistulæ velut hedera: folium
incūbit, quare neq; descendere permetteret in transglutien-
do, si in ipsum procederet. Atq; hæc mihi de hoc relata sunt.
Procedit

A Procedit nanque potus in ventriculum, & vbi expletus est, splen de ipso suscipit, & distribuit ad venas, & ad omentum, & in decliue deorsum, & in scrotum, & ad crura, & ad pedes. Et postquam morbus ex aqua multa obortus fuerit, procedit de ventriculo, & semper ad splenem venit de potu, vbi biberit homo. Contingit autem in hoc morbo, vt neq; febricitent aliàs ex ventre, quàm vbi homo sitiatur, vesica autem & ventriculus non iusto modo excolunt, neque conueniente diata homo vtatur. At splen subagrotans à ventre de potu trahit. Morbus autem oboritur, & scrotum pellucidum fit, & clauiculae, & collum, & pectora attenuantur. Colliquatur enim ab hoc morbo, & humor ad ventriculum defluit, & infernae partes aqua plenae sunt, & venter cibum auersatur, & quandoq; valde adstringitur, quandoq; defluit. Nec vesica iusto modo excolat, & plerumque horror aliàs atque aliàs per corpus discurrit, & quandoque febris corripit. Et quibusdam facies tumida fit, quibusdam non. Aliquibus etiam tibiae rumpuntur, vbi morbus diuturnus factus fuerit, & aqua illinc effluit. Incidunt & vigiliae & impotentia corporis, ac maxime lumborum. Et postquam edit aut bibit, etiam paulò amplius splen affligitur, & spiritum frequentem semper emittit. Atq; haec signa hydropis sunt. Est autem & circa ventriculum solum, siue febris corripuerit, siue non. Et venter magnus fit. Excutiuntur aqua. Verùm supernae corporis partes attenuantur his qui in affectu putantur. At signa omnia debiliora sunt, & simul in eodem aqua non discedit, & dolor tanto minor existit. Excerum circa ventriculum solum hydrops & aqua hac de causa fit. Enim vbi aceruatim aqua accessit, & iam in principiis non pateat ad infernas partes, sed aceruatim in ventriculo concludatur, nimirum vt quae respirationem non habeat, neq; seorsum, neque deorsum inniti potest, haud aliter quàm si quis magnum vas angusti osculi occludat, ac subito inuertat, deinde sensim operculum de osculo detrahat. Et si enim hoc feceris, aqua non effluet foras, neq; enim respirationem habet, sed à spiritu qui intus est, conclusa est. Nā spiritus qui intus est replet vas, & externo spiritui renititur, & excursus aquae non datur praeter spiritu vas implente, & simul aere incumbente. Si verò quis sensim vas inclinarit, aut fundum perforarit, spiritus de vase exibat. Egresso autem spiritu, procedit

Quae gra-
cilis se
bescantque
in hoc mor-
bo.

Subtercu-
taneus mor-
bi signa.

Cur solus
venter au-
geat.

Simile.

Neque

imo

Hippocratis Liber


Mulieres
etiam hoc
patiuntur.

cedit etiam aqua foras. Sic sane in hydrope, si quidem per-
spiratio sursum aut deorsum contingat, in principio morbi,
transit ad crura hydrops, & ad pedes. Sin minus, isthic solum
volutatur circa ventriculum, Atque ita quidem de his à me
dictum est. Fit autem & mulieribus hydrops in vtero ipso,
& signa sanè in ventriculo, & in cruribus, & reliqua signa ead-
em habet. Et de hoc ipso à me dictum est in morbis mulie-
ribus. Atque hæ tres sunt species morborum ab hydrope.
Fiunt autem hi morbi omnes citò difficiles, & omnes citò au-
gentur. Adhuc autem difficiliore sunt, si ex alio morbo cor-
pus liquefactum, ad hunc deuenerit. Si quidem igitur subito
occupauerit morbus hominem, moritur, nempe alio morbo
diutissimè iam affligente. At vbi etiam aluus valde fluida
fuerit, citissimè moritur, & sentiens, & loquens. Atque hæc
à me relata sunt de hydrope, & unde oriatur, & quòd hæc sint
ipsius signa.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE AFFE-
CTIONIBVS, IANO COR-
NARIO MEDICO
PHYSICO IN-
TERPRETE.

Hunc Galenus Polybi esse dicit.



IRVM prudentem ratione apud se inita,
quòd maximi pretij res est hominibus sa-
nitas, nosse cōuenit quomodo ex sua ipsius
intelligentia, in morbis utilitatem capiat.
Nosse autem conuenit ea quæ à medicis &
dicuntur, & adhibentur corpori suo, eaque
diiudicare potle. Atque hæc singula hætenus nosse satis
est, quatenus idiota contingere potest. Hæc verò nouerit
quis

A quis maximè, si harum rerū cognitione ac studio teneatur. 193
Morbi omnes hominibus à bile ac pituita fiunt. Bilis au- Morborū
tem & pituita morbos exhibent, quum in corpore nimium origo.
aut resiccantur, aut humectantur, aut incalescunt, aut si

fiunt. patiuntur autem hæc pituita & bilis, & à cibis, & à potibus, & à laboribus, & à vulneribus, & olfactu, & auditu, & visu, & coitu, & calido, & frigido. patiuntur autem quum singula ex relatis, aut non in debito tempore corpori exhibentur, aut non consueta, aut plura & fortiora, aut pauciora & debiliora. Vniuersi igitur morbi hominibus ex his fiunt. Oportet autem ad hæc idiotam nosse, quæ par est nosse idiotam. Quæ verò artifices nosse par est, ea etiam adhibere ac tractare. De his autem quæ dicuntur & fiunt, & curantur.

B tractare. De his autem quæ dicuntur & fiunt, fieri potest ut
idiota ex intelligentia quadam coniecturam faciat. Iam ve-
rò vnde singula hæc nosse oportet, ego referam. Sin in ca- Capitis do
put dolores inciderint, huius caput calefacere conducit: ita lor.
ut multa calida lauemus, & sternamus.

ac mucos subducamus. Et si quidem ex his à dolore liberetur, sufficiunt hæc. Si verò non liberetur, purgandum est caput à pituita. Victus autem sit sorbitio, & potus aqua. Vinum autem non exhibeatur, donec dolor sedetur. Quum enim calidum existens caput, vinum attraxerit, dolor fortior euadit. Dolores incidunt à pituita, cum in capite mota cumalata fuerit. Si verò aliàs atque aliàs dolor & vertigo in caput inciderit, prosunt quidem & hæc adhibita, prodest autem etiam, si sanguis à

C prodest autem etiam, si sanguis à naribus fuerit detractus, aut à vena in fronte. Si verò diuturnus & fortis in capite fiat morbus, & purgato capite non decedat, huius caput aut scarificare oportet, aut venas in circuitu inurere. Ex his enim solùm sanum fore spes est. Aegrotos considerare oportet statim in constitutionis morborum principio, quare opus habeant: & quales sint ut pharmaco purgentur, aut ut aliud quid, quodcumque tandem volueris, exhibeas. Si verò omisso principio, ad finem iam vergente morbo exhibueris, in desperato iam corpore, forte quiddam præbere veritus, periculum est ne magis delinquas, quàm successum consequaris. Si in aures inciderit dolor, conducit multa calida lavare, & auribus fomentum adhibere. Et si quidē lor. ad hæc cesserit pituita de capite attenuata, & dolor cessaverit,

Hippocratis Liber

Fauciū in-
flammatiō

Vux tumor

Dentium
dolor.

Polypus.

pleuritis.
Peripneu-
monia.
πνευμονία.
Phrenitis.

rit, sufficiunt hæc. Sin minus, optimum omnium pharmacū **D**
fuerit, quod in potu exhibitum, sursum pituitā purgat. Aut
purgandum est caput medicamento, quo capitis pituita pur-
gatur. Fit autem & hic dolor, quum intrinsecus ad aures pi-
tuita ex capite allapsa fuerit. Si verò fauces inflammatae fue-
rint gargarismis vti oportet. Fit autem & hoc à pituita. Si
verò gingiua, aut aliquid sub lingua inflammatū fuerit, his
quæ commanduntur vtendum est. A pituita autem & hæc
fiunt. Si verò vna dependerit & suffocarit (Quidam hoc
gurgulionem vocant) statim gargarismis vtendum est, præ-
paratis velut scriptum est in medicamentis. Si verò ex his
gracilis non fiat, retrò raso capiti cucurbitæ duæ adhibean-
tur, & sanguinis plurimum detrahatur, & pituitæ fluxus re- **E**
trò reuellatur. Si verò neq; ex his detumescat, scalpello inci-
dito, & aquam educito. Sectio autem facienda est, vbi sum-
mum subrubicundum factum fuerit, Nam si tale factum se-
ctum non fuerit, inflammatur, & aliquando derepente stran-
gulat. Fit autem & hoc à pituita, vbi ex calefacto capite acer-
uatim defluerit. Cæterum quod ad dentium dolores at-
tinet, si corrosus fuerit dens, & mouetur, eximatur. Si verò
non corrosus est, neque mouetur, dolorem autem exhibet,
per vstionem resiccatur. Prosunt etiam quæ commaducan-
tur. Dolores autem fiunt, quum pituita sub radices dentium
subierit. Exeduntur autem & corroduntur, partim à pitui-
ta, partim à cibis, si natura debiles fuerint, & cavitatem ha- **F**
buerint, & malè in gingiuis fixi fuerint. Si in nare Polypus
nascatur: quæ res ex naso in obliquum per respirationē dif-
fluatur, ac intumescit: eximitur laqueo ex naso ad os distra-
ctus. Aliqui etiam pharmacis erodunt. Nascitur autem à pi-
tuita. Atque hi quidem sunt morbi qui à capite oriuntur, ex-
ceptis oculorum morbis, de quibus priuatim agemus. At
verò de morbis circa ventrem, hæc considerare oportet.
Pleuritis, peripneumonia, febris ardens, phrenitis, hi mor-
bi acuti vocantur, & fiunt maximè quidem ac fortissimi
hyeme: fiunt etiam æstate, verum minus, & molliores. Quòd
si fortè in tales incideris, hæc sanè faciens ac consulens, maxi-
mè successum senseris. Pleuritis. In pleuritide febris
detinet, & lateris dolor, & erecta ceruice spiratio, & ruffis, &
sputum ab initio quidem subbiliosum sput. Postquā autem
quinta

- A** quinta aut sexta dies aduenerit, etiam subpurulentum. Huic Morbi late-
ad lateris quidem dolorem dandum est, quod pituitam & rum cura-
bilem à latere deducat. Sic enim dolor lenissimus fuerit. Al- uo.
uus autē curanda est per clysterē subducentē ac frigefacien-
tem. Hoc enim vniuerso morbo cōmodissimum erit. Exhi-
bendus est etiā potus, & sorbitio. Et potiones dandæ sunt aci-
diores, quo sputum de latere repurgetur. Quum autem pus
purgari inceperit, latus calefacere cōducit, & forinsecus ma-
turare ea quæ circa latus sunt, prius autē hoc facere non ex-
pedit. Resiccatur enim. Fit autē hic morbus maximè ex po-
tu, quū quis humecto corpore, aut ebrius, aut sobrius, frigue **Causa morbi huius.**
rit. Fit etiā aliter. Iudicatur autē morbus breuissimus septi-
B ma die, longissimus decimaquarta. Et si quidem in hac, per
sputum reiectū ac purgatū fuerit pus à latere, sanus fit. Si ve-
rò per sputum nō fuerit pus reiectum, pectore suppuratus ef-
ficatur, & morbus longus erit. Porro iudicari in morbis est, **Morborū decretoriū quid.**
quum morbi augescunt, aut marcescunt, aut in aliū morbū **Peripneu- monia.**
transeunt, aut desinunt. Peripneumonia. In peripneumonia
febris detinet, & tussis, & excreat primū quidem pituitam
crassam ac puram, Sexta verò & septima, subbiliosam & sub-
liuidam. Octaua autem & nona suppurulentam. Huic si qui-
dem dolor adest, aut dorsi, aut laterū, dandū est medicamen- **Medela.**
tum, quod in pleuritide ad lateris dolorē, in medicamenta-
rio libro scriptū est. Per potus autem, & sorbitiones, & ven-
tris subductionem ac frigefactionem, eadem curatio adhi-
C beatur quæ in pleuritide. Quo verò sputū & pus ex pulmone
repurgetur, danda sunt pharma in potu, quibus pulmo hu-
mectatur, & pus sursum purgatur. Fit autē hic morbus, quū
pituita aceruatim ex capite ad pulmonem fluxerit. Aliquan- **Morbushic vnde fiat.**
do etiam ex pleuritide in peripneumoniam & febrē arden-
tem transitus fit. Iudicatur autem breuissimus quidē in die-
bus quatuordecim, longissimus verò in duobus de viginti.
Pauci verò hunc morbū effugiunt. Fiunt etiā pectore suppu-
rati ex hoc morbo, si non in iudicatoriis diebus pulmo fue-
rit purgatus. Phrenitis vbi apprehenderit, febris primū **Phrenitis.**
debilis detinet, & dolor circa præcordia, magis autem dexte-
ra, ad hepar. Quum autem quarta aut quinta aduenerit, &
febris fortior fit, & dolores augescunt, & color subbiliosus
efficitur, & mens percellitur. Huic ad dolorem quidem dan- **Medela.**
da sunt

Hippocratis Liber

da sunt quæ in pleuritide, & tepor faciendus ubi dolor hæret. **D**
 Sed & alius curanda, ac reliqua similiter facienda sunt, exce-
 pto potu. Potu verò vtendum est quocunque alio volueris,
 præter vinum. Aut acetum & mel ac aquam dato. Vinum au-
 tem non conuenit mente motis, neque in hoc morbo, neque
 in quibusuis aliis. Conducit autem in hoc morbo etiam ca-
 put multa calida lauare. Mollito enim corpore, sudor quoq;
 magis sequitur, & alius & vrina secedit. Et æger ipse seipso
 temperatior euadit. Fit hic morbus à bile, quum mota visce-
 ribus ac septo trāsverso infederit. Iudicatur autem morbus,
 breuissimus septima die, longissimus vndecima. Effugiūt &
 hunc pauci, transitque etiam ipse in peripneumoniam, & si
Causos. transierit, pauci effugiunt. Febris ardens siue causos, quum **E**
 habuerit, febris detinet, & sitis fortis, & lingua aspera ac ni-
 gra fit, à spiritus sanè caliditate. Et color subbiliosus fit, &
 sputa biliosa. Et æger extrinsecus quidē frigidus fit, intrinse-
Medela. cus verò valde calidus. Huic conducit frigefacientia adhibe-
 re, & ad aluum, & forinsecus ad corpus, cauendo ne inhorre-
 scat, potiones quoque ac sorbitiones dandæ sunt frequentes,
 & paulatim quàm frigidissimæ. Venter autem curetur, & si
 quidem non subeant quæ insunt, infusa frigidissima per
 clysterem immittatur, aut quotidie, aut alternis. Hic autem
 morbus fit à bile quum mota intra corpus firmata fuerit.
 Solet etiam in peripneumoniam transire. Iudicatur autem
 breuissimus quidem nona aut decima die. Longissimus au-
 tem decimaquarta. Et si quidem transierit in peripneumo- **P**
 niam, pauci effugiunt. Si verò nō transierit, multi effugiunt.
 Atque hi quidem morbi acuti vocantur, & oportet hos sic cu-
Hybernæ rare. Quæcunque verò aliæ febres hyeme fiunt, siue ex vino,
febres cur siue ex lassitudine, siue ex aliqua alia re, eas obseruare oportet.
obseruādē, Transeunt enim aliquando in morbos acutos. Transito
 verò ipsarum talis est. Quum cōmotis duobus humoribus,
 pituita & bile, non conducentia corpori exhibentur, ipsi in-
 ter seipsos coacti, pituita videlicet ac bilis, corpori ubicunq;
 tandem contigerit allabuntur. Et fit pleuritis, aut phrenitis,
 aut peripneumonia. Obseruare igitur ac vitare oportet fe-
Quæ obser bres in hyeme. Sit autem obseruatio, & tutela ab ipsis, quies,
natio. & gracilitas, & ventris euacuatio. In sorbitionibus autem &
 potionibus degendum est, donec febris imminuta fuerit. **Ex**

- A** Ex morbis ferme maximè acuti & occidunt, & laboriosissimi sunt, & opus est ad ipsos plurima tutela, & exactissima cura ratione. Et à curante nullum malum accedere oportet, sufficienti enim quæ ab ipsis morbis adsunt. Verùm ut boni quid præstet, pro viribus conetur. Et si quidem rectè curante medico, à magnitudine morbi superetur ager, non hæc culpa medici est. Si verò non rectè curante, neque cognoscente, à morbo superetur, medici culpa est. Aestate porro hæc fiunt febris detinet fortis, & sitis. & vomunt aliqui bilem, aliis quibus verò etiam infernè secedit. His in potu dandum est, & ad sorbendum, quodcunque tandem tibi idoneum esse visum fuerit. Si verò bilis aut pituita ad cor confederit, aqua frigida, aut aqua mulsa pota, vomant. Si verò venter non secesserit, clysteri utendum est, aut subdititia glande. Morbus autem fit à bile. Liberantur autem maximè septima die, aut nona. Si verò febre detinente non purgentur, neque deorsum, neque sursum. dolor autem affuerit per totum corpus, tertia aut quarta die, pharmaco leui aut potione, deorsum purgato. facito autem sorbitionem ex milio, aut farina: & iisdem potionibus curato. Patiuntur autem & hæc à bile. Si verò externæ partes non valde feruidæ fuerint, verùm internæ, & lingua aspera ac nigra fit, huic pharmacum ne dederis, curato autem frigefacientia adhibendo, & ad aluum, & ad reliquum corpus. Vocatur autem hæc febris æstuosa. Iudicatur maximè vndecima die, & decima quarta. Si verò febrilis calor apprehenderit ac dimiserit, grauitas autem corporis ipsum detinuerit: hunc donec quidem calor tenuerit, sorbitionibus ac potionibus curato. Quum autem non tenuerit, etiam cibos dato. purgato autem quam celerrimè pharmaco, siue sursum siue deorsum opus habere tibi visum fuerit. Si verò febris quidem nō tenuerit, os verò amarum habuerit, & corpus grauetur, & cibū auersetur, pharmacum dādum est. Patitur autem hæc à bile, quum in venas ac articulos incubuerit & firmata fuerit. Quicumque verò alij dolores in æstate circa ventrem fiunt, si quidem ad præcordia & cor tēderint, aquam mulsam aquosam facito, & aceti tribus heminis affusis, tepidam bibendam da. & ubi modico tempore ipsam retinuerit, & igne ac vestibus concalesfactus fuerit, vomat. Si verò à vomitu rursus accesserit

Morborū
acutorum
natura.

Per æstatē
quæ vexēt.
Medela.

Feruoꝝ in-
teriorum.

Causodes
febris.
Curatio.

Dolores æ-
statis.

Medela.

Hippocratis Liber

cesserint ac suffocauerint, rursus vomitum faciat. Aut ipsum D multa calida lotum, per clysterē subluere, & tepefactoria adhibere, si affuerit dolor. Patiuntur autē hęc maximē à pituita, quum cōmota ad cor collapsa fuerit. Danda sunt etiā his qui talibus doloribus vexātur, pharmaca quę descripta sunt ad eiusmodi morbū, in medicamētario libro. Si verō transierit dolor aliās ad alium ventris locum, & febre caruerit, multa calida lauetur, & doloris gratia bibēda dentur, quę in pleuritide sunt descripta, aut alia prout tibi visum fuerit. Si verō à dolore nō liberetur, per pharmacum deorsum subpurgetur. A cibis autem abstineat, quousque dolor affuerit. Tales autem dolores, qui sic errāt, à bile fiunt. Quicumque verō dolores infrā vmbilicum fiunt, in his molli infusō per cly- E sterem immisso subluito. Si verō non sedentur, pharmacum deorsum purgans dato. Quicumq; verō dolores derepente in corpore fiunt citra febrem, in his lauare multa calida cōducit, & tepefacere. Nam pituita & bilis compacta quidem, fortia sunt, & praualent in quacunque corporis parte constituerint, & laborem ac dolorem fortem exhibent. Diffusa verō debiliora sunt, quacunque corporis parte manifesta fuerint. At verō morbi qui in æstate fiunt, sic fieri solent. Quum

Causa horum malorum æstatis.

Tertiana.

Quartana.

corpus à sole fuerit calefactū, humectatur, humectatum autem ægrotat, aut totum, aut ea parte in quam pituita & bilis incubuerint. Si quidem igitur quis ipsos incipientes curet, neque longi fiunt, neq; periculosi. Si verō non curet, aut male curet, & longiores fiunt, & sæpe quoque occidunt. Sed & Tertianæ & quartanæ febres, ex talibus fieri solēt. Hac morborum constitutio maximē quidem æstate fit, aliquibus verō etiā hyeme. Tertiana febris quum apprehenderit, si quidem videbitur tibi nō purgatus esse, quarta die pharmacum dato. Si verō pharmaco non videbitur opus habere, medicamenta in potu exhibeto, quibus febris aut transmutetur, aut deficiat. Exhibeto autem velut scriptum est in medicamentis. Et in apprehensione quidem, sorbitione & potu nutritio. Interposito verō tempore, cibis per aluum secedentibus. Apprehendit autem plerunque non ita sæpe. Si verō non curetur, in quartanam transire solet, & diuturna fieri. Si verō quartana apprehenderit, si quidem impurgatus fuerit, primū caput purgato, & interpositis tribus aut quatuor diebus,

A diebus, pharmacum sursum versus purgās dato in ipsa apprehensione. Et interpositis diebus rursum aliud deorsum purgās dato in ipsa apprehensione. Si verò ex his nō sedetur, rursum interpositis diebus, multa calida lauato, & pharmaca quę scripta sunt dato. potibus autem & sorbitionibus, & reliqua diata vtendū est velut in tertiana. Apprehendit autē hęc febris plurimos multo tēpore, alios verò pauco. Et fit tum tertiana, tum quartana, à bile & pituita. Cur autem tertiana & quartana, alibi à me scriptum est. Vim porrò habēt medicamenta in his febribus, vt potis his corpus in loco sit, in cōsuetā caliditate ac frigiditate. & neq; prāter naturā calefiat neque frigeat. Dāda sunt autē velut scriptū est in medicamē-

B ratio libro. Pituita alba quum tenuerit, corpus totū intumescit albo tumore. & in eadē die alia parte melius sibi videtur habere, alia deterius. Et tumor aliās in alia corporis parte maior & minor fit. Huic pharmaca danda sunt deorsum purgātia, à quibus aqua, aut pituita purgatur. Viētus autem ratio constituenda est, in cibis & potibus, ac laboribus, à quibus siccissimus ac gracilimus euadat. Morbus autē hic fit à pituita, quum quis ex febribus diuturnis pituitosus existens, impurgatus māserit, & pituita ad carnes ipsius cōuersa fuerit. Et nihil quidē albidior est hęc pituita quā alia. Verū corporis color albidior apparet. Sanguis enim à pituita copia aquosior fit, & nō inest similiter in ipso bonus color. Qua

Pituita alba.

Medela quæ.

Morbi huius causa.

C alba. Si quidem igitur curatus fuerit inchoate morbo, sanus fiet. Sin minus, in hydropem transit morbus, & hominē corrumpit. Quicunq; splenē habent magnū, qui quidē fuerint biliosi, hi mali coloris fiunt, & malis vlceribus scatent, & ex ore graue olent, & tenues euadūt. Et splen durus est, & semper cōsimili magnitudine. & cibi non secedunt. Qui verò pituitosi sunt, hęc & minus patiuntur, & splen aliās maior, aliās minor efficitur. His conducit si quidē impurgati fuerint, & caput & reliquum corpus purgare. Si verò purgatione non egeant, viētus ratio constituenda est, ita vt pituitosis corpus resiccemus ac attenuemus, cibis & potibus, & vomitibus, & exercitiis plurimis. & deambulationibus. Et in vere

φλγμα λευκόν.

lienosi quales sint.

Medela.

Yursum per veratrum purgētur. Biliosis autē conducit, vt per victum humectantē, aluum & vesicam subducamus, & vt de

Hippocratis Liber

vena splenitide frequenter sanguinē mittant & medicamen-
tis vrinam cientibus vtantur, quæ splenem mollire scripta
sunt, & vt pro anni tempore bilem purgent. Quidam verò
splenici à pharmacorum potu nihil vtilitatis sentiunt, neq;
à reliqua curatione quicquam gracilior splen ipsorū euadit,
sed quæ adhibentur à magnitudine morbi superantur. pro-
gressu verò tēporis, aliquibus in hydropem morbus degene-
rat, & corrumpuntur. Aliquibus autem splen suppuratur, &
vsti sani fiunt. Cum quibusdā verò consenescit durus & ma-
gnus existēs. Morbus autē fit, quum ex febribus & mala cu-
ratione, bilis aut pituita, aut ambo in splenē incubuerint. Et
diuturna quidē est affectio, nō autem lethalis. Ex pharmacis
quæ splenis gratia exhibentur, alia per vesicam purgant, & E
ipsum molliorē faciunt. Alia verò purgant quidem, verū
neque per vesicam quicquam, quod manifestius fiat, neque
Voluulus. vsquam alia parte. Splenē tamē molliunt. Voluulus quum
apprehenderit, venter durus fit, & nihil secernit, & dolor in-
fernē omnem aluum tenet, & febris, & sitis. Aliquando verò
Medela. præ dolore ager etiam bilem vomit. Hunc humectare oportet,
& intrinsecus, & extrinsecus. Et multa calida lauare. Et
bibenda dare quæ aluum mouēt, & vrinā subducunt. Et cly-
sterem adhibere, si admittat. Si verò nō admiserit clysterem,
fistulam ad vtricoli extremitatē alligato, & insufflando mul-
tum flatum immittito. Et vbi intestinum & venter eleuata
fuerint à flatu, exempta fistula, statim infusum per clysterē
immittito. Et si susceperit, secessum emittet, & sanus euadet. F
Si verò nō sic susceperit infusum, moritur maximē septima
Morbi hu-
ius causa. die. Talis autē morbus fit quum stercore aceruatim cōbu-
sto in intestino, pituita circa hoc colligitur. Et intestinum in-
tumesceat, vtpote his aceruatim induratis, & neque pharma-
ca quæ supernē bibuntur suscipit, sed reuomit. Neque infusa
infernē adhibita admittit. Est autem morbus acutus & peri-
Aqua inter
cutem. culosus. Aqua inter cutem fit plerunq; quum quis ex longo
morbo impurgatus multo tempore manet. Corrumpuntur
enim carnes, & liquantur, & fit aqua. Fit etiā hydrops à sple-
ne, quum ægrotauerit: & ab hepate, & à pituita alba, & à dy-
senteria ac lenteria. Et si quidem ex purgatione non facta
fiat hydrops, venter aqua impletur, pedes autē & suræ attol-
luntur. humeri verò & clauiculę, & pectora & femora lique-
fiunt.

A fiunt. Hunc si à principio acceperis, priusquam aqua super- **Medela.**
 excrescat, pharmaca bibenda dato à quibus aqua aut pituita
 purgatur. Bilem verò ne moueto. Cibos autè & potus & la-
 bores ac deambulationes constituito, à quibus gracilis ac sic-
 cus euadat, & carnes quam robustissimæ fiant. Morbus autè
 est lethalis, cum aliàs, tum si venter aqua repletus fuerit.

Quum verò à splene, aut hepate, aut pituita alba, aut dy-
 senteria in hydropem trāsitus fit, conducit quidè per eadem
 curare, effugiunt autè non valde. Nā in morbis quum alter
 alteri succedit, plerunq; occidit. Quum enim corpori à præ-
 senti morbo debilitato, alius morbus accesserit, præ imbecil-
 litate perit, priusquam alter morbus qui posterior accessit,

B desinat. Aqua porrò sic fit. Quum carnes à pituita, & tēpore, **Morbus**
 & morbo, & nō purgata immunditia, & mala curatione, ac **quī fiat.**

febris corruptæ fuerint, liquefcunt & fiunt aqua & venter **Medela an**
 quidem non distribuit aquam in seipsum, verum in circuitu **ceps.**

circa ipsum consistit. Siquidè igitur à pharmacis, & alia vi-
 ctus ratione, ager vtilitatē percipiat, & venter ipsius euacua-
 tur, bene est: Sin minus, sectione facta, aquam emittito. Seca-
 tur autè vel iuxta vmbilicum, vel retro iuxta lumbos. Effu-
 giunt autè & hinc pauci. Dysenteria quum habuerit, dolor

adest per totū ventrem, & tormē, & egerit bilem ac pituitā, **Dysente-**
 & sanguinē cōbustum. Huius vbi purgaueris caput, phar- **ria.**

maco in potu exhibito, quod sursum pituitā purgat, & aluū **Medela.**
 lacte cocto elueris, reliquum corpus curato, & si quidem fe-

Cbre caruerit, pinguibus & dulcibus ac liquidis semper quæ
 insunt, ex aluo subducito. Et multa calida partes sub vmbi-
 lico lauato, si dolor affuerit. Potus autè & sorbitiones ac ci-
 bos exhibeto, velut scriptum est in medicamentario libro.

Morbus hic fit, vbi bilis & pituita in venas ac aluum incu- **Morbus**
 buerint, agrotat quidè sanguis, & corruptus secedit: agrotat **hic vnde.**
 autem & intestinum, & raditur ac exulceratur. Fit autè hic
 morbus, & longus, & laboriosus ac lethalis. Et si quidè robu-
 sto adhuc corpore curetur, spes est fugæ. Si verò colliquato
 iam, & ventre omnino exulcerato, nulla vitæ spes superest.

Lienteria. In lienteria, hoc est intestinorū leuitate, cibi se- **Lienteria.**
 cedunt nō putrefacti, liquidi, dolor autè non adest, & corpus
 attenuatur. Hunc per eadē curato, velut à dysenteria deten-
 tos. Morbus autè fit, quum ex capite & superiore ventre, pi-
 tuita

Hippocratis Liber

tuitæ defluxus fit in ventrē inferiorē. Quod vbi cōtingit, cibi D
ab ipso si igeſiunt ac humectātur. Et ſecellus ipſorum nō pu-
trefactorū velox cōtingit. Et corpus liqueſcit, dum ſimul ci-
bi per multum tempus in ventre nō cōcoquuntur, & ſimul à
ventre calido, præter naturam caleſcit. Profluuium ventris

**Profluuiū
ventris.**

longum quum detinuerit, ſecedūt primū quidē liquida, quæ
ſunt ingeſta; poſtea pituita. Et probē quidem edit, verū à
multo ſecellū debilis ac tenuis fit. Hunc ſurſum verſus reſic-
cato, veratro in potu dato, & capite à pituita purgato. Ven-
trem quoq; lacte cocto eluito. Deinde reliqua cibis ac poti-
bus curato, à quibus venter & totū corpus reſiccetetur. Mor-
bus autē ab iisdem fit, à quibus etiā inteſtinorum leuitas. Hi
morbi, dyſenteria inquā, & lenteria, ac diarrhœa ſiue pro- E
fluuium vētris, cōſimiles ſunt. Et oportet ipſos ſic ſanare, ita
vt defluxum à capite & ſuperiore vētre intercipias, aut auer-
tas. Morbi enim natura hinc eſt. Et nemo ſententiā tuam re-
prehendet. Ferme autem & reliquos morbos ſic conſiderare

**Malorum
obſervatio
Tenefmos.**

oportet, vnde vnicuique natura ſit. Et ſi ſic conſideraueris ac
deprehenderis principiū morborum, minimē aberraueris,
Tenefmos vbi apprehenderit, ſecedit ſanguis ac mucus, &
dolor ſit in ventre inferiore, maximē vbi ad ſecellum deue-
nerit. Huic cōducit ventrē humectare, & pingueſcere, ac te-
peſcere. Et quæ in ſunt ſubducere, & calida lauare, excepto
capite. Solet autem hic morbus plures cibos expetere, Tor-
mina enim euacuato vētre à ſanguine ac mucō pertrāſeun-
tibus, & ad inteſtinum allabētibus, ſunt. Quum autē in ſunt F
cibi minorē mordacitatem inteſtino inferunt. Et ſit quidem
ex iisdem à quibus & dyſenteria, verū debiliſ, & brevis,
& nō lethalis. Quum ex vino aut à conuiuiſ bilis ſupernē

Cholera.

ac infernē fluxus, aut diarrhœa corripuerit, diarrhœa qui-
dem cōducit ieiunare. Et ſi ſit im habeat, vinum dulce dare,
aut vuarum paſſarum dulcium reſtrimenta. Ad vespērā verò
danda ſunt, quæ etiā his qui à pharmaco purgati ſunt dan-
tur. Si verò non ceſſet, velis autem ſedare, vomitū à cibo, aut
lenticulæ decocto facito, & conſeſtim ſurſum reuellit in-
fernus ſecellus, & ſi ſucco lentium aut cicerum inſuſo elue-
ris, etiam ſic ſanē ſedabitur. At verò bilis fluxui conducit, ſi

Medela.

dolor adſit, dare quæ in pharmacis ſcripta ſunt ſedantia do-
lorem. Vēter autem curetur, tum ſuperior, tum inferior, per
potio

A potiones humectantes, & per balnea calida corpus mollientia, capite excepto, & sic tū vomitus procliuior fit: & si liquor aliquis ingressus fuerit, ea quę aduersantur sursum reuomuntur: tum infernus secessus magis prodit. Si verò euacuaueris, violenter vomuntur, & violentius secedunt. Ad vespērā verò dato & huic ea quę dari solent ei qui pharmacū bibit. fiunt autē & hi dolores qui ex potationibus aut ex conuiuio oriuntur, quum cibi & potus plus solito in ventrem ingressi fuerint, & quę extrinsecus corpus supercalefacere solent, bilem, ac pituitam mouerint. Vrinę stillicidij modi quidem multi & omnigeni sunt. Conducit autem forinsecus quidem corpus balneis calidis mollire. Intrinsecus verò humectare **Dolores**
B aluum quidem per cibos, à quibus fluida fiat, Vesicam verò per potus, à quibus vrina quā plurimum diffunditur. Danda sunt & vrinam cientia medicamenta, quę scripta sunt in medicamentario libro sedantia dolorem. Morbus autem fit à pituita. Et quum quidem vesica siccata fuerit, aut perfrigerata, aut euacuata, dolorem exhibet. Quum verò humida est, & plena, aut etiam diffusa, minus. fit autem senioribus diuturnior hic morbus. Iunioribus autem breuior. Neutris verò lethalis. Coxendicum morbus quum fit, dolor corripit coxę iuncturam, & summas nates, ac coxendicem. Tandem verò etiam per totū crus dolor vagatur. Huic confert quum dolor tenuerit, mollire in quacunq; tandem cruris parte dolor hæserit, per balnea, & tepesfactoria ac fomenta. Et aluum **Curatio.**
C subducere. Vbi verò quieuerit dolor, pharmacum dandū est infrā purgans. Et postea bibat lac alinum costum. Doloris autem gratia dentur quę scripta sunt in medicamentis. Morbus hic fit, quum bilis & pituita in sanguisquam venam incubuerint, aut ex alio morbo, aut aliter quantumcunque sanguinis à pituita & bile compactum agrotarit. Hic enim per crus vagatur per sanguisquam venam: & ubicunque constiterit, ibi etiam dolor manifestus fit maximē, molestus quidem, sed non lethalis. Si verò in vnum aliquem locum incubuerit dolor, & constiterit, & medicamentis non fuerit exactus, vrito quocunque loco fuerit dolor. Vrito autem lino crudo. Articularis morbus quum tenuerit, corripit calor & dolor corporis articulos. Corripit autem acutus, & in alium atque alium articulum dolores incumbunt, **Articularis morbus.**
tum

Hippocratis Liber

Medela. tum acutiores, tum molliores. Huic conducit adhibere quæ D
parte dolor hæret, frigefactoria. Et quæ insunt ex aluo sub-
ducere, per clysteres, aut glandem subditam. Ad sorbendum
verò & bibendum dato quodcunque tibi conducibile visum
fuerit. Quum verò dolor intus fuerit, pharmacum infra pur-
gans bibendum dato, & post hoc serum coctum, & asininum
lac. Hic morbus à bile fit & pituita, quum commota in ar-
ticulos incubuerint. Et brevis quidem fit & acutus, non au-
tem lethalis. Solet autem iunioribus magis quam senioribus
contingere. Podagra violentior est omnibus eiusmodi circa
Podagra. articulos morbis, & diuturnissimus ac ægrè cedens morbus.
Et est quidē hic morbus sanguinis in venulis à bile ac pitui-
ta corrupti. Quantò autem in tenuioribus fuerit venulis, & E
in plurima corporis necessitate constitutis, & in nervis, & of-
sibus multis ac dēlis: tantò sanè durabilior est morbus, & qui
ægerrimè depelli possit. Conducunt autem & huic eadem
quæ morbo articulari. Et longus quidem est & hic morbus
ac molestus, sed non lethalis. Si verò in digitis dolor relin-
quatur, venas paululum supra articuli in digito nodum inu-
rito. Vrito autem cum lino crudo. Morbum autem regium
Regius morbus. sic curare oportet. Extrinsecus quidem corpus molliendum
est balneis calidis. Aluus verò & vesica humectanda, & urinā
cientia danda, quæ sunt præscripta. Si verò fortis fuerit, pur-
gato capite, pharmacum quoddam potandum dato quòd bi-
lem deorsum purgat. Postea verò urinam ciētibz vtendum
est. Morbus autem fit, quum bilis commota sub cutem ver- F
titur. Quòd si hæc nouerit vir idiota, non similiter in incu-
rabiles morbos inciderit. Solent enim morbis ex paruis oc-
casionibus magni ac diuturni fieri. Et quicunque cibi, aut po-
tus, aut sorbitiones congruè ac consequenter se habent, &
Quæ me- dicamenta cautius dā- da. quæcunque pharmaca doloris gratia, ea omnia sine periculo.
semper exhibentur, si iuxta præscriptum exhibueris. Quæ-
cunque verò pharmaca purgant bilem aut pituitam, in his
pericula fiunt, & culpæ medentibus imputantur. Quàm ma-
ximè igitur ea vitare oportet. Atque hi quidem sunt morbi
qui circa ventrem fiunt. Exceptis pectore suppuratis, & tabi-
dis, & muliebribz morbis. Hi enim seorsim describentur.
Tubercula. Tubercula quæ enascuntur omnia, à pituita aut sanguine
nascuntur, quū sanè à vulnere, aut casu fuerint collecta. Con-
ducit

A ducit autem horū aliqua cataplasmatibus integere, & per pharmacum in potu data diffundere. Aliqua vero impositis cataplasmatibus maturare, & diffundunt quidem cataplasmata, quæ quum calida sint, humectant, & non in seipsa trahunt. Maturant autem, quæ calefacientia contrahunt. Quum verò aliquod sectum fuerit, aut sua sponte ruptum, pharmaco humorem repurgare conuenit, ubi autem pus effluere desuerit, velut vlcus sanare. Lepra, & pruritus, & scabies, & impetigines, & vitiligo, & alopecia, à pituita fiunt. Sunt autem talia turpitudine magis quam morbi. Fauus, & struma, & pani, & furunculi, & carbunculus, à pituita fiunt. Quo verò hæc depurges, pharmacis sic vtendum est. Quicumque biliosi sunt, his dato ea à quibus bilis purgatur. Pituitosis verò, ea à quibus pituita. Atrabiliarij autem, ea à quibus atra bilis. Hydro picis ea per quæ aqua. Quæcunque verò pharmaca in potu dantur, & non purgant neque bilem, neque pituitam, ea quum in corpus ingressa fuerint, vim exhibere oportet, aut frigefacientia, aut calefacientia, aut siccantia, aut humectantia, aut contrahentia, aut diffundentia. Quæ verò somnum faciunt, ea quietem sanguini exhibere oportet. Quum ad agrotum deuenieris, interrogare oportet quæ patitur, & ex qua causa, & quot iam diebus: & an venter secedat, & quo victu vititur, Et primum considerare, an morbus à bile aut pituita factus sit, aut vtrisque. Et hoc probe nosse conuenit, quod necesse est, ut ab altero horum, aut vtrisque fiat. Deinde vtrum siccitate aut humiditate opus habeat. Aut aliquæ quidem partes corporis siccitate, aliq̃e verò humiditate. Postea an morbum sursum purgare oportet, aut deorsum, siue per vesicam. Et an auge-scit morbus aut marcescit, & an soluitur, aut in alium transit.

C Vulneratos fame affligito, & ex alio quæ insunt subducito, aut per clysterem, aut pharmaco infra purgante exhibitto, & in potu dato aquam, aut acetum. Aut sorbitiones præbeto. Inflammata cataplasmatibus frigefacito. Talia verò cataplasmata sint, aut betæ coctæ in aqua, aut apium, aut oleæ folia, aut fici folia, aut rubi, aut quercus, aut mali puniceæ. Atque his coctis vtendum est. Crudis verò rhamni foliis, aut viticis, aut saluæ, aut Tithymali. Aut pulegium viride, aut porrum, aut apium, aut coriandrum, aut isatidis folia impone. Si verò nihil horum habueris, neque vllum aliud cataplasma,

Lepra, pruritus, scabies, impetigo, vitiligo, alopecia.

Fauus, struma, pani, furunculi, carbunculus.

Sauciorum curatio.

Quæ vulnus refrigescit.

Hippocratis Liber

plasma, polentam aqua aut vino subactam imposito. Tanto D
autem tempore hæc cataplasmata profunt, quāto frigidiora
fuerint quā vlcus. Quum verò fuerint calidiora, aut simi-
liter calida, nocent. Pinguia ad inflammata non conducunt,
neque ad ea quæ non sunt purgata, neq; ad putrescentia. Sed
ad inflammata conferunt frigida. Et ad impurgata ac pu-
trescentia, acria faciunt, & quæ mordacitatem aliquam indu-

Quæ vul- trescentia, acria faciunt, & quæ mordacitatem aliquam indu-
neri cōplen- centia purgant. Vbi verò carnem producere voles, pingui-
do profint. & calida magis conducunt. Ab his enim caro pululat. Qui-
Tempera- buscunque cibis aut potibus homines sani in victu vtuntur,
mentum o- ex his oportet præsentibus vti ad ægrotos, ita vt præpares ca-
mnium. lidos & frigidos, & humidos, & siccos. Ex frigidis quidem ca-
lidos, & calidos ex non calidis, & siccos ex non siccis, & reli-

Quæ for- quos iuxta eundem modum. Neque verò de præsentibus de-
beantur. sperare oportet, tanquam nihil possint, & absentes quærere,
qui nullam vtilitatem ægro afferant. Comperies autem, si
rectè consideraueris, extra hos, paucos quibus ad ægrum vta-
ris. Sorbitiones autem in morbis omnibus dato, aut ptisa-
nam, aut milium, aut farinam, aut alicam. Et quæcunque ex
his dederis ad secessum, tenuia dato, & magis percocta, &
dulciora potius quā saliora aut calidiora. Quæ verò ad ro-

Quæ ven- dulciora potius quā saliora aut calidiora. Quæ verò ad ro-
trem vri- bur aut refocillationem, crassiora, pinguiora, & moderatè
nāmq; ciūt. cocta. Potibus autem vtendum est, si quidem aluum & vesi-
Quæ strin- cam subducere velis, vino dulci aut aqua mulsa. Si verò ad-
gunt. stringere, austero, albo, tenui. Si corroborare, austero, nigro. F

Qui vinum bibunt citra affectionem erga ipsum, his dandi
sunt potus qui præparantur, & in medicamentario libro scri-
Post purga- ptii habentur. His qui medicamentum biberunt, post pur-
tionē quæ gationem detur, febrientibus quidem, aut lenticula, aut mi-
dantur. lium tenue, aut ptisanæ succus. Danda est autem ptisana &
milium, velut quæ leuia sint. Alica verò velut omnium ro-
bustissima. Et farina velut his robustior. Lenticula autem
odorata præparetur, & modica secundo loco detur, vt quæ le-
uis sit sorbitio, & stomacho grata sursum versus. Ammiscea-
tur autem aut sal. aut mel, & cuminum, & oleum. Ad lenticu-
lam verò ammisceatur pulegij herba, & parū aceti. Non fe-
brientibus autem, panis puri medullam in iusculum interi-
to, aut mazam & frustum piscis dato, aut ouiculæ tenerimæ
carnem, aut volucris aut catuli coctam. Febrientibus autem
etiam

A etiam betam dato, aut cucurbitā, aut blitum. Et post cibum bibant vinum vinosum, vetus, album quā aquosissimum.

Quibus lauari non conducit, vngantur vino & oleo calido, & alternis exergeantur. Quum album debilis, à cibis humectare volueris, mazam dato & obsonia. Et marinorū quidem piscium frustra cocta cum intrito. carnes autem ouiculæ tenerimæ, aut hœdi, aut catuli, aut volucris coctas. Et betā, aut blitum, aut rumicem, aut cucurbitam, si tempus tulerit.

Ex oleribus verò apium, & anethum acocimum, & vinum mellei coloris, vetus, album item ac aquosum. Quum verò *Quæ siccant.* ficare volueris corpus, panem dato, & obsonia alia, & sicca, & hæc omnia calidiora, & carnum partes carnosas: pisces, pe-

B trosos, olera, rutam, aut thymum, aut origanum. Vinum verò nigrum austerum. Præparentur autem obsonia cum sale & cumino. Aliis verò condimentis parcissimè vtendum est.

Quum autem ex morbo refocillare volueris, alia quidem eadem dato, quæ exhibes quum ventrem humectas, Verum pro latentibus carnes fortiores, & pro catulis, volucrum, ac leporinas, & ex his aliquas assatas, tum de carnibus, tum de piscibus, & quā optimè preparatas. Quibuscunque mor- *medicaria.*

bus siccitas conducit, his semel in die cibum exhibere expedit, & cibos ac potus pauciores dare, quā vt repleantur, & hos laboribus ac deambulatione perficere, & quā minimū dormire. Quibuscunque verò humiditas conducit, his expedit inediam non ferre, & cibi ac potus non indigos esse,

C neque laborare, & dormire quantum voluerint. Quoscunque cibos, aut obsonia, aut potus ægroti concupiscunt, exhibeto, si non corpori damnum inde accessurū est. Quum aut *Quicquid languēs patient dato.* cibos aut potus augere inceperis aut detrahère, paulatim & additiones, & detractiones facere oportet. Quicunque cibos

sufficientes perficere possint, his sorbitiones ne dederis. Excludunt enim cibum. Qui verò non possunt, his dato. Si verò quid dare volueris refectionis gratia, alicam dato, & prisanam triticeam. Hæ enim sorbitiones sunt fortiores. Den- *Sorbitiones validæ.*

tur autem post cœnam. Pharmaca quæ potantur, & quæ ad vulnera adhibentur, discere oportet: omnibus enim hoc expositum ac procliue est. Non enim ex intelligentia homines *Medicamenta casu* hæc reperiunt, sed potius ex fortuna. Neque artifices magis quā idiotæ. Quæcunque verò in arte medica, intelligentia reperta, discun-

Hippocratis Liber

discuntur & reperiuntur, aut de cibis aut de medicamentis: De ea ab his qui dinoscere possunt quæ in arte sunt, discere oportet, si quid discere velis. Post sorbitiones cibum debilibus dato, & vinum vinosum insuper bibendum. Ante cibos vero & potus aut sorbitiones, & postea, & cibum & potum quicumque tandem tibi videbitur debilibus exhibeto, ita ut & corpus & animam inspicias. Sic enim maxime profueris.

Qui vis cor-
rū quæ por-
riguntur co-
gnoscat.

Quam facultatem linguli cibi habeant, coniectare oportet, ex his qui vim manifestam faciunt. Quicumque flatum, aut morsum, aut repletionem, aut ructum faciunt, aut tormen, aut secedunt, aut non secedunt: hi manifesti sunt quod hæc operantur, & ex his etiam alios considerare oportet. Habent enim singula edulia, & quo prosunt, & quo lædunt. Verum alia manifestissimè operantur quæ operantur, alia vero obscurius. Cibi & obsonia præparentur ac exhibeantur debilibus, à quibus neque flatum sit, neque ructus acidus, neque tormen: & quæ neque valde per aluum secedunt, neque valde reliccantur. Hæc autem sic fiunt. Quæcumque quidem venter superat & corpus ipsa suscipit, ea neque flatum exhibent, neque tormen. Si verò venter non superarit, ab his & flatum,

Leuia quæ.

& tormen, & alia huiusmodi fiunt. Leuissima sunt cibaria, & potus ac obsonia, quæ moderata in corpus ingesta, aut paulò amplius supra modum, neque repletionem exhibent, neque tormen, neque flatum, neque aliud quiddam eiusmodi, & celerimè concoquuntur, & concocta secedunt, & per omnem diem in ventrem ingesta, minimè molesta sunt, etiam si diu antea fuerint ingesta. Grauia autem sunt, quæ moderata exhibita, aut infra modum, repletionem & dolorem exhibent. & quæ neque dari, neque edi, neque bibi possunt, ut non dolorem exhibeant. Et si quis ipsa per tempus rursus bibat aut edat, etiam sic dolorem exhibent, & non pro ratione secedunt.

Sanitati
conducen-
tia.
Robur fa-
cientes.

Ad sanitatem optima sunt, quæ modicè ingesta, sufficiunt, ut & famis & sitis sint medela. Et plurimo tempore corpus ipsa suscipit, & pro ratione secedunt. Ad robur autem optima sunt, quæ carnem plurimam ac densissimam producant, & sanguinem crassefaciunt, & pro ingestorum ratione secedunt, & corpus plurimo tempore ipsa suscipit. Pinguia, & caseosa, & mellita, & ex sesamo parata, ructum acidum maxime faciunt, & bilis fluxum supernè ac infernè, & tormen, & flatum,

A flatum, & repletionem. Hoc ipsum etiam contingit, cum quis plura ederit aut biberit, quam venter concoquere potest.

Debilibus siquidem pro morbi ac corporis ratione dederis, quaecumque tandem dederis, consumit hac corpus, & neque indigum est, neque repletum. Si verò aberraris à temporis occasione, detrimentum in vtraque sequitur. Quaecumque cibaria aut potus, aut obsonia corpus suscipit, ab his maxime neque tormen fit, neque flatum, neque ructus acidus. Quum enim in ventrem ingesta fuerint, corpus ab ipsis trahit quod ipsi commodum est. Et necesse est iam quod restat debilius esse, quam ut tormen, aut flatum, aut aliud quid huiusmodi in ventre faciat. Vina dulcia, & austera, & mellei coloris vetusta, ventrem subducunt, maximeque urinam cient ac nutriunt, & neque flatum exhibent, neque tormen, neque repletionem. Carnes percoctae & exassatae, vtraque debiles sunt ad robur augendum. Ad secessum verò percoctae commodae sunt, Assatae verò magis sistunt. Quae verò moderatam habent & cocturam & assaturam, haec & ad robur, & ad secessum moderatè se habent. At verò crudiores ad robur quidem commodae sunt, sed non ad secessum. Ex cibis ac potibus qui commodissimi sunt corpori ac maxime sufficere, & ad alimentum, & ad sanitatem, & ex his ipsis etiam, ubi quis ipsis non in tempore vtatur, aut pluribus quam tempestiuum est, & morbi, & ex morbis mortes fiunt. Reliqui verò cibi ac potus, qui talem vim non habent, parum utilitatis afferunt, etiam si quis semper ipsis in tempore vtatur: parum autem etiam laedunt. In vtranque enim partem debiles sunt, ut & boni aliquid faciant, & mali. Sunt autem cibi & potus qui hanc vim habent hi, panis, maza, carnes, pisces, vinum. & ex his alij magis, alij minus. Quicumque ex sicco victu viuunt, his non cum cibo potus detur, sed post cibum, multo tempore interposito. Et sic quidem siccus humor à siccis cibis ortus, corpus siccatur. Si verò quis simul cum cibo bibat, cibus humidior factus, corpus humidius facit. Panis calidus, & carnes calidae, ipsae per se comestae, siccant. Si verò cum liquore dederis, aut statim à cibo potum praeberis, non siccant. Panis purus ex farinis, ad robur ac refectionem commodior est, quam qui non est ex tenuibus farinis paratus, & recens utilior est quam vetus, & ex farinis recentibus melior quam veteribus. Polenta ex

Cibaria potulâq, conferentia, & contra.

Vina.

Carnes.

Siccus nutriticus.

Panis differtentia.

Polenta.

ordco

ordeo non madefacto, sed circuncirca consperso ac decorti- **D**
 cato, fortior est quam ex madefacto: & recens quam vetusta.
Vinum quî Et maza prius subacta fortior est, quam nō subacta. Vinum
debilitetur diffusum, ac perfrigeratum, & excolatum, tenuius sit ac debi-
 lius. Carnes coctæ, si quidem percoctas feceris, debiliores
 sunt ac leuiore. Assatæ verò si exassatæ fuerint, & inuetera-
 tæ ex aceto aut sale, debiliores sunt & leuiore recentibus.
 Debiles ac leues cibi, ventrem quidem nō lādunt, neq; cor-
 pus, eo quòd calefacti non intumescunt, neq; replent, sed ci-
 tō mollescunt, & concocti secedunt. Humiditas autē ab ipsis
 debilis corpori accedit, & neq; augment, neq; robur memora-
 bile exhibent. At fortes cibi & intumescunt vbi in ventrem
 ingesti fuerint, & replēt, & difficilius quidem ac tardius con- **E**
 coquuntur, & nō secedunt. Verum humor ab ipsis fortior ac
 incorruptus accedens, multum robur ac augmentum corpo-
 ri addit. Ex carnibus leuissimæ sunt in corpus, caninæ, &
Caro quæ volucrium, & leporinæ coctæ. Graues autem sunt bubulæ. Et
leuissima. porcinae moderatiores, statum autem faciunt, & coctæ & as-
Grauis. sata. Et sanis autē & debilibus conueniunt ouillæ. Suillæ ve-
 rō his qui laborāt & exercitantur, & ad bonum habitum, &
 ad robur cōmodæ sunt. Debilibus autem & priuatam vitā
 degētibus fortiores. Sed & farinæ māsuētis leuiore sunt,
 eo quòd fructum non similem edunt. Differunt autem &
 pecorum carnes, & eorum quæ fructum edunt, & quæ non e-
 dunt. Et fructus non idem in omnibus facit, sed partim den- **F**
 sam ac fortem victimæ carnem efficit, partim rarā & humi-
Pisces. dam, ac debilem. Vt in summa dicam, pisces leue sunt edu-
 lium, & cocti, & assati, & ipsi per se, & cum aliis cibis. Ipsi ve-
 rō inter seipso sic differunt. Stagnorū pisces, & pingues, &
 fluuiatiles, grauiore sunt. Littorales autem marini, leuiore
 res, Et percocti assatis sunt leuiore. Ex his itaque fortes da-
 to, vbi reficere aliquem voles. Leues verò, vbi gracilem &
Balneum. tenuem facere oportuerit. Balneum calidum moderatum
 quidem, mollit, & auget corpus. Quòd verò opportunū mo-
 dū excēdit, siccās quidē corporis partes humēctat, humidās
 verò resiccat. Et siccæ quidem humēctatæ debilitatē & ani-
Holera. mi deliquium exhibent. Humidæ verò siccāt, siccitatē ac si-
Allia. tim. Ex oleribus allia, & coctæ & assatæ, vrinā cient, & per
Cepæ. alium secedunt, & ad menses muliebres conducunt. Cepæ
 ad

A ad vrinas cōmodæ sunt. Succus enim acrimoniā quandā exhibet, vt secedat. Atque his quidem sic vtendum est, sed debilibus non exhibenda. Apium & coctum & crudum vrinam **Apium.** ciet, & palustre magis quā satiuū, quōd etiā maiorem vim habet. Coriandrum stomacho gratū est, & per aluum secedit, tum coctum, tum crudum. **Coriādrū.** Ocimum & humidum est & **Ocimum.** frigidum, ac stomacho gratum. Porrum coctum quidē vrinam ciet, & secedit. **Porrum.** Crudum verò æstuosum est & pituitosum. **Malum punicum.** Malum punicū reficit & pituitosum est, & cū nucleo quidem, aluum sistit. Citra nucleū verò, secedit. **Cibaria.** Calidi cibi, sicci quidem sistunt, humorē enim in ventre resiccant. Si verò humidi sunt, humectantes per caliditatē, aluū subducunt.

B Acerba siccant, & contrahunt corpus. Habent & vim sistēdi. Acida attenuant, morsum inducentia. Salsa secedunt, & vrinam ciet. Pingua & dulcia, humiditatē & pituitam exhibent. Reficiunt cucurbita, & beta, & blicum, & rumex, & per humiditatē secedunt. **Brassica.** Brassica verò acrimoniam quandam habet ad secessum, & simul boni succi est. Caseus, & sesamum, & vua passa, reficiunt & pituitosa sunt. Vinum dulce, & mellis speciē referens, ambo & reficiunt, & vrinā ciet, **Vinum.** & pituitosa sunt. Austera verò, ad robur & siccitatē commoda sunt. Vrinam autem ciet etiam austera vetusta, quæ alba & tenuia existunt. Oleum & quæcūq; oleosa, reficiunt & **Oleum.** pituitosa sunt. Ex oleribus coctis secedunt, quæ ex natura humidissima aut acerrima sunt, aut caliditatē habent. Danda autē sunt hæc repidiora ac flaccidiora, Sic enim ad secessum cōmodat. Cucumis pepo, & vrinā ciet, & aluo secedit, ac leuis est. Alter autē pepo, frigiditatē quandam exhibet, & sitim sedat. Alimentum verò à neutro horum contingit, nisi tenue quoddam. Sed neque malum, neque memorabile. Mel cū aliis quidem comestum, & nutrit, & bonū colorem exhibet. Ipsum autem per seipsum ~~attenuat~~ **Mel.** magis quā reficit. Nam & per vrinam, & per secessum plus iusto expurgatur. Vrinam ciet in ventre & cito calefiunt, & calefacta marcescunt ac liquefcunt, & ob id citum secessum faciunt. Stabiles autem ac aluum sistentes cibi, & calefcunt, & calefacti cito resiccantur ac compinguntur, & propter ea obduri facti, non secedunt. Quæ per aluum secedunt, succosa sunt, & natura calida. Quæ per vrinam ciet, sicca & frigida.

Hippocratis Liber

Frumētum Frumentum & vinū, differunt quidem & ipsa inter seipsa **D**
vinum. ex natura, tum robore & debilitate, tum leuitate ac grauita-

te. Differunt etiam locus à loco, ex quo illa fuerint. Est enim
 alius aquosus, alius aquarū inops, & aprius, & vmbrosus, &
 bonus, & malus. Quare omnia hæc ad hoc conferunt, vt sin-
 guli cibi aut fortiores sint, aut debiliores. Quicunque sanè
 panem comedere soliti fuerunt, his dandus est & in morbis.

Quā plus Quum quis cibos aut potus plures solito acceperit, si non
iusto come- solito more perfecerit, optimum est vt statim reuomat. Po-
ditur quid ma & fructus arborei, tum mollis, tū duri corticis, propterea
agendum. post cibū molestiora sunt, & sano, & debili, quia corpus eius
 qui cibum sumpsit, solum ab ipsis humores trahit. Si verò ie-
 iunus quis edat, plures. Quicunque cibi aut statum, aut a-

Cibaria cū statum, aut morsum, aut repletionem, aut tormen faciunt. à ta
vexat, quid libus liberat vinum meracum insuper potatū. Corpus enim
agas. à vino calefactum, per calorem amouet ea quæ insunt à ci-

Ventris di- bis & potibus ac similibus. Venter aliquando perturbatur,
uersitas, aliquando listitur, aliquando etiam pro ratione secedit. Cur
 autem hæc sic se habent: primū quidem venter quum hu-
 mi lior fuerit, & quum sicci or, susceptum cibum corrumpit.
 Deinde quum mutatio facta fuerit, siue ex frigore ad calidi-

tatem, siue ex caliditate ad frigiditatem, itidem corrumpit.
 Quare necesse est ventrem, ab iisdē cibis ac potibus propter
 hæc ipsa, & molliorem fieri, & duriorē. Cibaria & potus &
 obsonia, excepto pane, & maza, & carnibus, & piscibus, & vi-
 no, & aqua, reliqua omnia tenues ac debiles vtilitates exhi-

Languen- bres non continenter detinent, sed intermittentes corripiūt,
tium nutri- his cibi dandi sunt post apprehensionem, ita vt coniecturam
catio. facias, ne febris à recens accepto cibo irruat, sed cibis iam cō-

de san
de vi
de agas
 • coctis. Vinum & mel optima iudicata sunt in hominibus, si
 iuxta naturam & sanis, & debilibus cū temporis opportu-
 nitate ac mediocritate exhibeantur. Et bona quidem sunt ip-
 sa per seipsa, Bona verò etiā permixta, & tum alia, tum quæ-
 cunque memorabilem vtilitatem habent. Quæcunque sanis
 commoda sunt, ea etiam agrotis exhibita fortiora sunt. Et
 oportet de tra to ipsorum vigore ea dare, alioqui non feret
 ipsa corpus, sed magis ledunt, quàm prosunt.

HIPP

AHIPPOCRATIS

203

COI LIBER DE INTER-

NIS AFFECTIONI-

BVS, IANO CORNA-

RIO MEDICOPHY-

SICO-INTER-

PRETE.

*5. Cap.
27
Ous gum.
2. opus d
lib. de pass.*

B



I PULMONIS arteria fuerit exulcerata, aut aliqua tenuis venula ex his quæ in pul-
monem dependent, rupta fuerit, aut aliqua
fistula ex his quæ per pulmonem distenta
sunt: & alia in aliam distracta fuerit, & san-
guine fuerint impleta: distrahūtur sanè ac

*Pulmonis
arteria sau-
ciata venæ-
ve fracta.*

rumpūtur ob has maximè causas, propter laborem, propter
cursum, ob casus, ob plagas, ob vomitus violenti fientes, ob

febres. Hæc igitur patitur. Primum quidem tussis sicca obti-
net. Deinde paulò post expuit saliuam subcruentam, aliquā-

do autem puram. Et si quidem hic breui à morbo liberetur,
satis est: Si verò non, tēporis progressu sanguis amplior pro-

dit, aliquando purus, & aliquando etiam subputridus. Sape

verò etiam fauces nō animaduertentibus sanguine imple-
tur. Postea sanguinis grumos paulatim & frequenter emer-

gentes reiciunt. Aliquando verò etiam graecolentia ab ip-
sis contingit, & fauces aliquando spuma quadam replentur.

Et rigor ac febris apprehendit, circa initia quidem morbi,
vehementer. In progressu autem debilius, & alias atq; alias

corripit, & dolor quandoq; in pectoribus insitus est, & in dor-

so, & in lateribus. Et ubi sanguinē spuere desierit, saluā mul-

tam liquidam expuit, quandoque verò etiam viscosam. Atq;

hæc quidē sic patitur donec quatuordecim dies præterierint.

Post hos verò si nō desierit morbus, squamas ab arteria tuf-

siendo auellit, quales à pustulis decedunt. & dolor incidit in

pectus, & in dorsum, & in latus, & præcordia cōtingēs velut

vlcus dolet. Huic cōducit ut quàm maximè quietē intus ha-

Curatio.

C

3

lor

Hippocratis Liber

lor acutior. & tussis magis quā prius premit, & rigor ac febris magis occupat. Et si sternutauerit, dolor acutus irruit. Dolet autē & in lecto, quū se circūuertit. Huic cibos quidem eosdē, quos & pectore suppurato exhibere oportet, verū hos nō multos. Ex obsoniis autē his vtatur. De piscibus quidem, squatina, aut pagro, aut galxo magno albo, aut aliis similibus, omnibus cū rhoe & origano cōditis. Carnē autē edat galinā, assatā, sine sale, aut capræ coctam. & vino austero vetustissimo ac iucundissimo nigro vtatur. Deambulationib. autē moderatis. Verūtamē hęc fiant febre nō tenente. Si verò febris tenuerit, sorbitione farinæ aut miliij vtatur. Si verò cibos assumat, paucos assumat, & obsonia per aluum secedētia. Et si pharmaco tibi vtēdū esse videbitur, cnidio cocco, aut tithymalide ipsum subpurgato. Et post purgationē, farinæ coctæ pinguis heminā absorbēdā dato. Deinde quā maximē reficito, vt quā minimū tenuis sit. Ad huiusmodi enim morbū nō cōducit tenuē esse. Deambulationes etiā primū paucas faciat, vt ne lassitudo succedat. Fomentū verò aliās atq; aliās adhibeatur. Et qua die fomentū adhibetur, sine cibo sit excepta farina cocta, cuius heminā absorbeat. Aquā autē bibat. Postera die minus quā solitus fuit edat, & bibat vinū nigrū, iucundū, austerū modicū. De cæterò verò bis aut ter in die cibi dētur. Sic autē huic paulatim dato, donec ventrē cōfirmaueris. Nā ex febribus, & inedia, si os quidē appetiuerit, venter autē suscipere noluerit, vbi acruatim suscepit, inflammat. Quare paulatim dare oportet. Si verò acruatim dederis, & parū laborarit, deambulationibus venter nō perfrigeratur, nimirū cibis quiete cōpactis. Quare etiam febris succedere solet, & hyeme quidē minus, æstate verò periculū est ne delinquat. Hūc quā maximē reficere oportet, quo quā crassissimus fiat. & deambulationib. moderatis vtatur, & min⁹ solito luctetur, & parū labore primū, deinde ampli⁹, nūquā aut multū. hęc si fecerit, celerrimē san⁹ erit. Si verò tenuis fiat propter laborem, remittat ac quietē agat. Hic vbi sanus fuerit, neq; ad vētū celeriter curret, neq; equū. neq; currū cōscēdat. Vitet etiā vociferationē, & iracundiā. Periculū est enī ne morbo reuertat. Quare hęc oīa vitare oportet. Si verò cibū auersetur, etiuū torreto, & corticē depurgato, deinde per triduiū in aqua macerato, singulis aut diebus aquā diffundito, & alia affundito. Postea

Medela
quz.

Quæ cauenda.

- A** Postea quarta die excolato ac resiccato, deinde tenuissimè molitum cribrato. Et lini semen tostum tundito ac terito. Et sesamum tostum tundito ac terito. Et polentā nō salsam, puram, tenuē accipito. Et erui quidē ac polētā, amborū æqualis sit mēsurā, sesami verò tertia pars, lini verò dimidia vnius partis. Hæc in lacte caprino cocta quā liquidissimè absorbent. Postea verò in prandium ipsi dentur cibi puri, & obsonia fortiora. Vinū autē idem bibat. Dato autē ipsi & centaureæ radices, ad has rupturas faciētes, in vinū ipsas deradens. dato item dracontij radices in vinū derasas. Sed & tussis gratia, dracontiū derasum in melle delingendum dato: Et si decoctum in lacte asseuerarit se sorbere nō posse, lac bubulum quā plurimū bibat, tertia parte aquæ mulsæ ammixta. Atque sic celerrimè sanus erit. Morbus autem curatione multa opus habet. Est enim difficilis. Si enim curatus & sanus factus nō seipsum custodierit, plerisq; reuertens morbus interitus causa fit. hic si quidē ab hac curatione sanatus fuerit, latis est: Sin minus, ipsum lacte crassefactum, & in pectore, & in dorso vrito. Si enim successerit vltio, fugæ morbi spes est. Si verò arteria conuulsa fuerit, aut aliqua vena ex his quæ ad pulmonē tendunt, hæc patitur. Ab initio quidem morbi, tussis acuta obtinet, & rigor, & febris, & saliuam expuit multā, albā & spumofā, aliquādo verò subcruentā, & dolor caput ac collum detinet. hic morbus fortior est priore, & vsq; ad decem primos dies talia patitur. Postea pleriq; vndecima die pus crassum violenter expuunt. Decima quarta verò die puriora expuit, si euasurus est, & dolore minus vexatur, & breui sanus fit. Si verò morbus diuturnus futurus est, tunc & pus multo amplius expuit, & reliquus dolor multo amplior in corpore inest. Calores autem debiliores habent quā prius. Hunc si à principio acceperis, infra subpurgato scammonia succo, si nō febricitarit. Post purgationem autē accipiat ea quæ prius, & alia eadē assumat, quieto quā maximè corpore & molliter cubet. & hæc quidem ab initio faciat vsq; ad decem dies. Si verò pectore suppuratus fiat, eadem quæ etiā prius faciat. Si verò sanus fiat, ab his cibis ac potibus abstinere oportet, ab acidis, & aeribus, & salis, & pinguibus. A labore itē ac iisdem à quibus prior, abstinereat. Hæc si fecerit, celerrimè à morbo liberabitur. Si verò

Sorbitio
guz.

Prand

Curatio.

Arteriz lā-
cinatio.

Medela

C 4

quid

Hippocratis Liber

quid horum non fecerit, rursus reuerso morbo periclitabitur, & morbus peior erit. Nā multi rupto pulmone vitā degunt, donec moriantur. Hunc si nō statim quis curret, recidivante morbo postea non habueris quo prodelle possis, nisi hac feceris. Lacte bubulo crassefactum, in pectore & dorso vrito. Si enim vstio successerit, proderis. Morbus autem hic ex iisdem delictis fit, ex quibus etiā prior. Pneumonis siue pulmonia, ab his maxime fit. Quum pulmos sanguinem in seipsum traxerit, aut pituitā salsam, & non rursus dimiserit, sed in ipso coacta ac compacta fuerint: ab his tubercula fieri solent in pulmone & suppurari. Hic autem hac patitur. Ab initio & per totum morbum tussis acuta sicca obtinet. Et rigor, & febris, & dolor in pectoribus & in dorso incumbit. Aliquando etiā in latere, & erecta ceruice spiratio vehemens incidit, hic vsque ad quatuordecim dies talia patitur. Sape verò etiam plures. Deinde erumpit pus, & multū expuit. Sape verò etiam velut araneorum tunicas expuit. Sape etiam subcruentum. Et si quidē depurgatus fuerit & breui gracilis factus pulmo, interitum effugit. Si verò non adharet, & per annum morbus tenet, & transmutatur, vt aliās alia ager patiatur, huic in principio antequam pus erumpat, hac adhibere oportet. Quum febris remiserit, multa calida lauetur, & sorbitionibus multis vtatur. Prisanæ succum coctū, melle ad coctum affuso, sorbeat. Et vinum bibat dulce allum, aut aquam mulsam coctam. Quum verò pus expuere inceperit, eadē bibat, quā prior suppuratus, & cibis ac potibus, & obsoniis iisdem vtatur, abstinens ab acidis, & acribus, & salsis, ac pinguibus. Et a venere ac ebrietatibus, nisi morbo commodum fuerit. Ex coloris autē inspectione aestimandum est, qualibus opus habere videatur. Reliqua verò eadē faciat. Bibat etiā lac bubulum, ac caprinum pro tēpore. prius autem subpurgetur lacte asinino cocto. Bibat etiā equinum lac excolatum quotidie manē, poculi tres heminas continētis mensura, si facere poterit. Si quidē igitur sic curatus melius habebit, satis est. & si non eruperit pus in pectus, ipse seipsum curret, quietē quā maximē corpori exhibens, & quæ comoda sunt sibi ipsi exhibēs. Si verò erumpat pus in pectus, neve educi qua parte tibi significationem de se præbere videbitur, illic maxime sectione aut vstione facta, pus emittito modicum primum.

Pulmonis
morbus vn
de fiat.

Medela.

Pus seca-
rione vstio-
neve educi
tur.

A primū. Reliqua verò eadem facito, quæ & in priore suppu-
rato factò descripta sunt. Si in pulmone varix fiat, tussis sicca
corripit, & rigor, & febris in principio quidem morbi valde
vehementer, habet etiam erecta ceruice spiratio, & dolor in
capite consistit. Et supercilia impendere videntur, & tumor
in faciem descendit, & in pectus, & in pedes. Sæpe verò etiam
in capite innititur, & præ dolore ubi is vexat, respicere non
potest, & corpus subpallidum est, & venæ per ipsum tendunt
flammeæ, aut nigrae. Huic quum sic habuerit, & dolor ma-
ximè premit, primū sanguis detrahatur. Deinde multa ca-
lida lauato. Et ubi situs habuerit, Cyceonem in vinò nigro
altero quàm iucundissimo, æquali mēsurā aquæ mixtum,

B bibendum dato. Frigidum autem maximè bibere oportet.

Sorbtionibus autē vtatur ptisanæ succo cocto, melle bono
affuso. Hac exhibere oportet in primis quatuordecim die-
bus. Si verò diutius morbus teneat, & dolor amplior fuerit
in corpore, & impotētia aderit, huic sic habenti eadē exhi-
beto, quæ ei qui pulmonem suppuratū habet, ubi quatuorde-
cim dies præterierint. Hic morbus fit à labore, & atra bile.

Quum venæ cauæ per pulmonem tendentes, sanguine aut atra bile impletæ fuerint, venulæ aliæ in alias rumpuntur, ut quæ in angustiis sunt conclusæ, & exitum non habeant: & dolorem exhibet ac flatum in pulmone. Hic morbus diffi-
lis est, & multa curatione opus habet, Alioqui agrum nō re-
linquit, & plerumq; in multis simul commoritur. Si inflam-
matio in pulmone fiat, fit autē maximè à vinolentia, & gu-
lositate, piscium capitonum, & anguillarū. Hi enim pingue-
dinem habet naturā hominis infestissimam. Iam verò etiā
factus est morbus à pituita, ubi sanguini mixta in pulmo-
nem influxerit. Accidit etiā ex carnis esu, & ex aquæ muta-
tione. Hac igitur ager patitur. Tussit fortiter, & saliuam ex-
puit liquidā ac mustam. Sæpe etiā crassam & albam, velut
a raucedine, Et dolor premit acutus in pectora, & dorsum, &
laterum mollitudinem ac latera. Et acidum eructat. Et ex
pectoribus ac pulmonibus, velut venter murmurat. Et vo-
mit pituitam acidam. & si id quod vomuit in terram effun-
das, radit terram velut aceto infuso, & dentes stupe-
sunt, & rigor ac febris, & sitis fortis detinet, & si quid pingue vo-
luerit edere, exugitur ad viscera, & vomitum inducit.

C 5 Et

Hippocratis Liber

Et totum corpus torpor occupat. Quum verò reuomuerit, D paulò leuior sibi esse videtur. postea vbi vespera dici accessit, venter sonitum edit, & tormine versatur, ac murmurat. Huic quum sic habuerit, & tempestiuum esse visum fuerit, Medela. curationem sic adhibeto. Mel & lac, & acetum, & aquam, mixta in ollam infusa tepescacito, & origani capitati ramulis agitato, vbi verò tepida facta fuerint, bibenda dato, aut apprehensa lingua, sentim per fistulam infundito. Deinde conuolutum quietem habere iubeto. Postea si vomitus succedat, promptè vomat. Si verò non succedat, irritatione per pennam facta vomat, & si quid pituitæ vomuerit, per dies quinque idem faciat. hinc enim leuior euadet. Bibat autem hæc exercitatus, si fieri poterit, & multa calida lotus: Sin minus, saltem lotus. Postquam verò quinque dies præterierint, manè ieiunus bibat in aqua mulsa, aut vino mulso silphij succum, erui magnitudine, & allium comedat ac raphanidas ieiunus: & meracum vinum insuper absorbeat nigrum, aut album austerum. Bibat etiā inter cibum, & post cibum. Cibus verò siccis, & carnibus caninis vtatur coctis, si rigor & febris non apprehenderit. hic si à tali infusione per fistulā in os, purgetur, satis est. Sin minus, sursum per veratrum ipsum purgato. Post purgationem verò farinæ coctæ duas heminas absorbendas dato, melle affuso. Vinum verò idem bibat aquosum. At si nō in principio affueris morbo, lacte ipsum crassefactum in pectore ac dorso vrito, ita enim maximè à Vltio. morbo liberari poterit. Si verò non fuerit vltus permanet, F & nō valde deficit, sed ad senectam vsque adheret. Sæpe etiā commoritur, si non in primis quadraginta diebus mortuus fuerit. Quare multa quàm maximè opus est cura. Et serum ac lac pro tempore bibat, bubulum & caprinum, & asininum ac equinum. Sic enim facilimè deget. Est autem Pulmonis morbus difficilis. Si pulmo ab erysipelate intumuerit, erysipelas. Hic autem tumor maximè à sanguine fit, quum pulmo in seipsum sanguinem attraxerit, & susceptum tenuerit. Morbus autem hic æstatis tempore maximè fit: Hæc igitur ab ipso ager patitur. Tussis incidit sicca, & rigor, & febris, & erecta ceruice spiratio, & dolor fortis in pectoribus, & nares aperit, velut equus à cursu. Et linguam exerit, velut canis æstate ab ardoris flatu vltus. Et tumor detinet pectora.

A stora. & parum loquitur. & rubor est in facie. & pruritum fert in corpore. & præ dolore decumbere non potest. Sed ipse seipsum anxius iactat. Hic in septem diebus moritur. Veruntamen in principio quum sic habuerit, per hæc curetur. *Medela.*

Corpus quidem perfrigeretur, betis in aqua frigida tinctis, ac corpori impositis, in recenti maximè dolore. Aut lintea frigida aqua tincta ac expressa apponito. Et si quidè sic melius habuerit, satis est: Sin minùs, terram figuralem frigidam pro cataplasmate imponito. & sub dio decumbat. Sic enim tractatus sæpe septem dies effugerit. Quum autem septem dies præterierint, & dolor adhæserit, dolentem partem intus, cum oleo illinito, & tepesfactoria eadem quæ in

B pleuritide adhibeto: & potionē ad subpurgationem ipsi dato, ex peplio, & meconide, siue peplo, & grano cnidio. Et post purgationem, lenticulæ heminam absorbendam dato. Bibat autem aquam. Postera die multa calida aqua ipsum lauato, capite excepto. Postea origanum in aqua mulla macerato, & bibendam dato. Potibusque quàm calidissimis utatur.

Si-
bos autem accipiat eosdem quos & qui à pleuritide correptus est, si non febris adhæserit. Hic morbus grauis est, & pauci effugiunt. Si pectus & dorsum dirupta fuerint: (Dirumpuntur autè maximè à labore) æger hæc patitur. Tussis obtinet acuta, & saliuam expuit aliquando subcruentam, & rigor & febris plerunque corripit. & in pectore, & in dorso, dolor inest acutus. & in latere velut lapis incumbere videtur, & à dolore perpetuò pungi, velut si quis acu stimulet.

Huic quum sic habuerit, statim lacte in potu dato, pectus & dorsum inurito. Et sic celerrimè sanus erit. De cætero verò quietam maximè corpori vitam degat. Si quid enim laborarit, & aut currum, aut equum ascenderit, aut humeros oneri subdiderit, periclitabitur ne rursus morbus recidiuū faciat. Et si hoc contingat, periculum est ut corrumpatur. Morbus enim reuersus magis premit quàm ab initio. Si verò nō fuerit vltus, iisdem ipsum curato quibus & suppuratum, forbitionibus, & potibus, & cibis. In summa verò, quietem agat, & commodis cibis alatur, Si enim sic tractatus fuerit, celerrimè sanus erit. Morbus autem grauis est. Si in latere tuberculum nascatur, & suppuratus fiat, hæc patitur. Rigor tenet & febris, & tussis sicca per multos dies. Et dolet latus. & lateris.

Cur, & à dolore perpetuò pungi, velut si quis acu stimulet. Huic quum sic habuerit, statim lacte in potu dato, pectus & dorsum inurito. Et sic celerrimè sanus erit. De cætero verò quietam maximè corpori vitam degat. Si quid enim laborarit, & aut currum, aut equum ascenderit, aut humeros oneri subdiderit, periclitabitur ne rursus morbus recidiuū faciat. Et si hoc contingat, periculum est ut corrumpatur. Morbus enim reuersus magis premit quàm ab initio. Si verò nō fuerit vltus, iisdem ipsum curato quibus & suppuratum, forbitionibus, & potibus, & cibis. In summa verò, quietem agat, & commodis cibis alatur, Si enim sic tractatus fuerit, celerrimè sanus erit. Morbus autem grauis est. Si in latere tuberculum nascatur, & suppuratus fiat, hæc patitur. Rigor tenet & febris, & tussis sicca per multos dies. Et dolet latus. & lateris.

ad mam

Tuberculi
lateris.

Hippocratis Liber

ad mammam, & ad clauiculā, & ad scapulas dolor impetum **D**
 Curatio. facit. Hic quū sic habuerit, in primis decē diebus sorbitio-
 nibus vtatur, p̄tisane succo cocto melle atuso, quū sorbitio
 cocta fuerit. Vno autem vtatur albo, dulci, aut aultero, & a-
 quoso. Et vt vinū sepe sorbeat, ac expuat iubeto. Et à somno
 impedito, donec vñdecim dies praterierint. Post hos dies ci-
 bis paucissimis vtatur, carnibus catulinis aut galli calidis.
 Oportet autē ipsas p̄tiones iusculo preparare, & iusculū
 a sorbeat. Et sorbitionibus prius quā cibo vtatur, & ne si-
 tiat, donec latus suppuratum fiat. Suppuratur autē maximē
 in quadraginta diebus, aut paulo prius. Hoc autē cognosces,
 puris emissio. vbi suppuratum fiat latus. Pus enim non expuit, neque reuo-
 mit. Hunc quū sic habuerit, vbiunque tumor significatio- **E**
 nem de se præbuerit, secato aut vrito. Et postea pus paulatim
 emittito. Et postquā exhausteris, linamentū crudi lini im-
 mittito & hoc postridie rursus exempto, paulatim pus exhau-
 rito. Deinde rursus linamentum indito, & rursus tertia die, &
 aliis deinceps, bis per diem exhausto, donec resiccatum fue-
 rit. Dato autem & cibos & obsonia, si admiserit. Et bibat mo-
 dicum non multum, siue vinum, siue aquam. Edat etiam ori-
 ganam tenellam plurimam melle tinctā. Si verò tenellam
 non habeat, siccam tritam & melli ammixtam plurimā ex-
 hibeto. Et neq; frigeat, & balneis lauet, & molliter cubet. Et
 sic hunc morbū curans, celerrimē sanum feceris. Quū au-
 tem sanus euaserit, viret frigus, calorem, solem. Et deambu-
 lationibus modicis vtatur post cibum, vt ne lassitudo corpus **F**
 corripiat. Hac faciens sanus erit. Ex his morbis quoscunq;
 videris, statim post vitionem, porrum multum tritum super
 vsturas imposito, & per diem vnā finito. Tres sunt tabis
 species. Prima quidem fit à pituita. Quū enim caput pitui-
 ta impletum agrotarit, & calor accesserit, pituita in capite
 computrescit, vt quæ moueri non potest vt decedat. Postea
 quū crassæfactæ fuerint & putrefactæ ac superexpletæ ve-
 nula, fluxio in pulmonē fit. Et pulmo vbi susceperit, statim
 agrotat, vt qui à pituita mordetur quæ salsa est ac putrida.
 Hac igitur æger patitur, febris debilis inuadere incipit, &
 rigor, & dolet pectora ac dorsum. Aliquando etiā tussis pre-
 mit acuta, & expuit saliuam, multam & liquidam ac salsam.
 Et hæc quidē in principio morbi patitur. In progressu verò
 corpus

A corpus attenuatur, cruribus exceptis, hæc enim intumescunt, & pedes & ungues contrahuntur, ex humeris autem tenuis & debilis est, & fauces velut lanugine implentur, & velut per arundinem sibilat: & fortiter sitit per totum morbum: & multa impotentia corpus habet. Hic quum sic habuerit, in anno corruptus male perit. Verum studiū quā maximè adhibere oportet, ac reficere. Et primū quidem veratrū bibendum *Medela* dare infra autem subpurgare epithymo, aut peplo, aut gra- quæ.

B no cnidio, aut tithimalide. Hæc quater in anno dare oportet, sursum bis, deorsum bis. Dandum est & lac asininū coctum ad subpurgationē, aut bubulum, aut caprinum. Bibat etiam crudum lac bubulum, tertia aque mulsæ parte ammixta, per quinque & quadraginta dies, ammixto etiā origano. Caput autem ipsius prius purgetur, pharmaco ad nares appposito. Cibaria autem & obsonia dentur, neque pingua, neque nidorosa, neque valde acris. Hæc autem morbum obseruando facere oportet, & deambulationibus ad cibos vti, obseruando ne frigeat. Hyeme verò iuxta ignem habitationem faciat. Vinum autē bibat austerum, nigrū, quā vetustissimum ac iucundissimum, verum modicū. Et si tibi visum fuerit, ante pharmacū fomētum adhibeto, & sic pharmacū dato. Si verò dare nolueris, facto fomento, vomitum ex cibis facere cogito, velut prius scriptum est. Huic si commodæ fuerint, deambulationibus vtatur. Si verò non conducant, corpore quā maximè quiescat. Hic hoc modo tractatus, facillimè in morbo deget.

C Est autem morbus lethalis, & pauci hunc effugiunt. Secunda tabes fit à labore. Eadem autem ager patitur quæ & prior. Morbus autem hic magis priore quiescit, & æstate remittit, Saliuam verò expuit crassiorē priore, & tussis premit maximè senes, & dolor fortior est in pectoribus, & velut lapidis incumbere ipsis videtur. Dolet etiam dorsum. Et color ipsius limpidus existit, & si quid laborarit, flatus & anhelatio oboritur. Hic ex hoc morbo in tribus annis maximè moritur. Curare autem oportet iisdem, quibus etiā priorem.

Hic morbus multis adhæret vsque ad tres annos, sed moriuntur. Estq; morbus grauis. Tertia tabes. Ab hac hæc patitur. Medulla ipsius spinalis sanguine plena fit. Tabescit autem similiter & à cauis venis. Hæ verò pituita hydropiformi, & bile replentur. Patitur autem eadem, ab vtris tandem tabescat.

Tabes secunda.

Tabes tertia.

tabescat. Et homo statim niger fit ac subtumidus. Et partes **D**
sub oculis pallidæ fiunt. Et venæ in corpore pallidæ distentæ
sunt, quædā verò valde rubicundæ. Maxime autē manifestæ
sunt, quæ sunt sub alis. Et sputit pallida, quæ vbi ipsum inua-
serint, suffocāt: & tussire volens aliquando non pōtēst. Quā-
doque autem præ suffocatione & tussendi cupiditate, bilem
aceruatim vomit, aliquādo verò pituitam. Sæpe verò etiam
cibos quū comederit. Et vbi reuomuit, leuior sibi esse vide-
tur. Deinde modico tempore interposito, in iisdē doloribus

Curatio. iacet. Hic etiam acutius loquitur quā quum sanus esset. Et
rigor ac febris interquiescens, rursus sudorosa corripit. Hūc
vbi sic habuerit, cibis & sorbitionibus, & potibus ac pharma-
cis, & reliquis omnibus curato, velut priores. Morbus autem **E**
durat maxime annos nouē. Postea durat dum corrumpitur,
pauci verò ex ipso effugiunt. Grauis enim est morbus. Si ve-
rò voles, sic ipsum curato. Primū fomentū adhibeto, & vbi
fomentum adhibueris, postridie aquæ mulæ dimidium con-
gium ipsi bibendum dato modico aceto affuso, & hæc citra
respirationē bibere iubeto. Deinde stragulis ipsum ad mul-
tum ac quā longissimū tempus cōtegito. Si verò non susti-
neat, & euomere velit, vomat. Si verò vomitus non sequatur,
tempore iam aliquo interposito, aquæ tepidæ poculo magno
superingesto vomat, irritatione per pennā facta. Quum ve-
rò euomuerit, vt bene habeat, quietē agat per hūc diem. Vbi
autem cœnæ tempus fuerit, cœnet mazam modicā, & obso-
nium habeat, salsamentū & porrum. Hęc autem quā pluri **F**
ma edat. Vinum verò bibat dulce. Reliquo tēpore per totam
diē, exordio manē facto, multa calida lauetur, & post balneū
cauere oportet, vt ne frigescat, sed decūbens plurimo tēpore
dormiat. Quum autē à somno surrexerit, viginti stadia mi-
nimum circumeat illa die. In aliis autem diebus alia quin-
q; stadia prioribus addens vadat, singulis diebus additione fa-
cta, donec ad centum stadia perueniat. Ventrem verò quoti-
die subpurgare oportet, succis betæ, & à brāsica, ita vt vtran-
que seorsim coquas, & de vtraque congium excoles. Deinde
adipis à rhenibus detracti minæ quadrantē ammisceas ac si-
mul coquas, in vtrisque succis diuisim facta coctura. Quum
autē bibere voluerit, ad brāsicę quidem succū, salem adjici-
to. Ad betæ verò succum, mel affundito. Licet autem seorsim
vtranque

A vtranq; bibere: Aut melle in alterum poculum affuso bibat, in alterū verò immisio sale. Ebibere autem oportet totū succum, & hac facere per triginta dies. Secundo verò mēse edat panē, & carnes pingues suillas coctas, aliud verò nihil. Vinū autem bibat albū, austerum, & iter faciat, non minus stadiorum triginta ante cœnam. Post cœnam verò decem, & ne frigeat, sed cōtegatur. Hæc si fecerit, leuius morbū feret. Tertio autem mēse cyceonem floridum bibat, apij radices, & anethum, & rutam, & mentam, & coriandrū, & papauer tenerū, & ocimum, & lentē, & mali punici dulcis & vinioli succum. Oportet autem dulcis duplam mensuram esse, ita vt vtriusq; succi simul sit hemina dimidiū, & vini nigri iucundi austeri hemina dimidiū, & aquæ hemina dimidiū. Postea flores tritici in hoc diluantur permixto, & in poculum infundantur. Et postea farina erui acetabulum adiiciatur, & polentę tantundem, & casei veteris caprini rasi tantundem, & hæc permixta ebibat. Deinde modico tēpore interposito prandeat panem, & obsoniū habeat, frustū torpedinis aut squatinæ, aut galei, aut raia. Et carnes suillas edat coctas & crasse faciat seipsum, quietē quā maximē agens. Et decimo quoq; die fomētum sibi ipsi leuiter adhibeat. Quarto autem mēse, quinto quoq; die leuiter fomento vtatur. Et edat obsonium plurimū. Sint autē obsonia, caseus, & carnes ouillæ coctæ pauca. Et iter faciat per stadia, velut antea dictū est. Et prima quarti mensis die, initio à decem stadiis facto eat, & quotidie addat, donec octuaginta stadia fiāt, & deambulet in die stadia octuaginta. Ante cœnā, triginta. Post cœnam, viginti. Mane triginta. Reliquo verò tēpore victu vtatur, mazam & panē vtrāq; edens. Et obsoniū habeat, chartilaginea. Sed & carnes omnes edat, exceptis bubulis ac porcinis. A piscibus autem is abstineat, à mugile, anguilla, & melanuro. Edat autem torpedinē, squatinam, raiam, galeū, pastinacā, & ranas. Ex aliis nihil. Si verò videatur innoxius esse, etiam cyceonē bibat. Postquā autē dormire voluerit, bibat de vino nigro, iucundo, veteri, poculum duarū heminarum. Et per diem eodē vino vtatur inter cibum. Et in die iter faciat per stadia centum quinquaginta. Ante cœnā nonaginta. Post cœnā, viginti. Mane, quadraginta. Hic non modo curatus, in anno sanus euadit. Resiccatur medulla spinalis maximē, quū venulæ ad medullam tendentes

Secūdi mensis curatio.

Tertij.

Quarti.

Medulla spinæ cur

tes

res fuerint obturat; itemq; ex cerebro accessus. Propter corporis autem afflictionem hæc patitur, & agrotat. Reliccat etiam à venere. Hæc igitur patitur. Dolor acutus incidit ipsi in caput, & in collum, & in lumbos, & in lumborū musculos, & in articulos crurum. ut aliquando flectere non possit. Et stercus non secedit, sed sistitur. Et urinae difficultate vexatur. Hic in principio quidē morbi quietius degit. Quāto autem magis tēpus morbo prolongatur, tanto magis omnia dolet. Et crura velut ab aqua inter cutē tument. Et vlcera à lumbis emergunt, & alia quidē sanescunt, alia verò nascuntur. Huic quum sic habuerit, caput purgato, hippophaeis succo, aut enidio grano, corpore prius valde bene foto. Vesperī verò post purgationem, ptisanæ duas heminas sorbeat, melle affuso. E Vinum autem bibat albū molle. Postera die alinini lactis cocti, melle affuso, octo heminas ebibēdas ipsi dato. Si verò alinini non habeas, bubuli, aut caprini cocti tres semicongios, melle affuso. Et dum temporis opportunitas adest, lac bibat, sero & lacte vtens, per quinq; & quadraginta dies. Cibis autē & obsoniis vtatur quā maximē per alium secedentibus. Vinum bibat album molle, Mendelium. Quum autem crassissimus fuerit, in lumbos ipsius ab utraq; vētriculorū parte crustas quatuor inurito, & in dorsum vtrinque quindecim, & in ceruicem duas, inter tendines. Si enim vstio successerit, sanum facies. Est autem morbus hic grauis. Quatuor morbi à rhenibus fiūt. A primo hæc patitur. Dolor acutus incidit in rhenem, & in lumbos, & in testem secundum rhenem situm. F Et frequenter mingit, & adstringit paulatim ac supprimitur urina, & cum urina procedit arena. Et vbi per urinae meatū exit arena, dolorem fortem in meatu exhibet. Quum autem ipsam per urinam eiecerit, dolor remittit. Postea verò rursus in iisdem doloribus iacet. Quum autē mingit, etiam colem præ dolore fricat. Vulgus autem medicorum quod non intelligit morbum, vbi videt arenam, putat vesicam ē calculo laborare. At nō vesica, sed rhen lapide laborat. Hic morbus fit à pituita, quū rhen susceptam in seipsum pituitam, non rursus dimiserit, sed in ipso in totum concaluerit, & fiunt ex ea tenues lapilli, velut arena. Huic quum sic habuerit, cum scamonix succo aut ipsa radice, fomento prius adhibito, totum corpus purgato, postera verò die duobus congiis succi ciceris albi

Medela.

Vstio quæ.
Rhenum
morbi qua
tuor.Medicorū
error.
Calculi
caussa.

Medela.

- A** albi subpurgato, quē sale iniecto bibendum dabis. Post hæc potibus, & cibis, & balneis curato, & eadē quæ in vrinæ stillicidio exhibentur pharmaca dato. Quum autē dolor preserit, multa calida lauato, & tepefactoria qua parte maximè dolet, adhibeto. Cū autē intumuerit & eleuatus fuerit, sub id tempus iuxta rhenem secato, & extracto pure arenam per vrinam ciētia sanato. Si enim sectus fuerit, fugæ spes est. Sin minus, morbus homini cōmoritur. Secundus rhenum morbus. Dolores fortiter premunt, velut in priore. fit autē morbus à labore, quum ruptæ fuerint venulæ ad rhenem tendentes, & postea rhen sanguine repletus fuerit. Hic vbi hæc patitur, cū vrina sanguinē mingit in principio morbi, deinde progressu temporis pus: hic si quietem corpore habuerit, celerimè sanus erit. Si enim quid laborarit, dolores multo magis obtinebunt. Quum itaq; suppuratus fuerit rhē, circa spinam intumescit. Hunc vbi sic habuerit, circa tumētē partem secato, profunda maximè sectione iuxta rhenē. Et si quidem successerit sectio, euestigio sanum facies. Si verò aberraueris, periculum, est ne vlcus linamētis curandū fiat. Si autē concreuerit vlcus, vēter intrinsecus à rhene suppuratur, & si quidem pus intus rumpatur, & ad intestinum rectum procedat, fugæ spes est. Si verò contigerit alterum rhenem, periculum est ne pereat. Curetur autē pharmacis, & iisdem omnibus, quibus & prior, & diatæ eandem habeat. Hic morbus grauis est, & multi ex ipso ad tabem rhenalem deuenerunt.
- C** Tertius rhenum morbus. Vrina prodit, velut à carnibus bubulis assatis succus. fit autem morbus ab atra bile, cū bilis in venas confluerit quæ ad rhenem tendunt, & cū constiterit, exulcerat venulas & rhenē. Ab vlceratione igitur tale quiddam cū vrina procedit, Dolores autē hærent in lumbis, & in vesica. & inter anum & pudendum, & in ipso rhene ad modicum tēpus. Deinde remittit dolor, & rursus acutus breui corripit. & in tenuem ventris partem aliquando dolor incidit. Huic quum sic habuerit, vētre subpurgato, epithymo. aut scammonia radice. Bibēda verò eadem dato, quæ & ex vrinæ stillicidio laborāti, & quum dolor habuerit, multa calida lauato, & tepefactoria ad dolentē maximè locum adhibeto, & sorbitione vtatur farina cocta, melle affuso, & reliquo victu vtatur quā maximè per aluū secedente, & vinū bibat

Secundus
rhenū mor-
bus.

Morbus
hic qualis.

Curatio.

Tertius
rhenū mor-
bus.

Medela.

D

bibat

Hippocratis Liber

**Quartus
rhenū mor-
bus.**

Curatio.

**Obsonium
obseruato.**

bibat album Mendæū mellei coloris. Aut aliud albū iucun- **D**
disimum probè temperatum. Hic morbus nō valde deficit.
& pro tēporis opportunitate serum & lac bibat. Serum qui-
dem ad purgationem. Lactis autem potum faciat in tēpore
per quinq; ac quadraginta dies. Hæc si ita feceris, morbum
in melius dispones. Quartus rhenum morbus. Morbus hic
fit à bile & pituita, maximè tempore æstatis. fit etiā à vene-
re morbus. Hic æger hæc patitur. Dolores premunt ipsum in
lateris mollitudinē, & in lumbos, & in lumborū musculos:
& patitur qualia solet mulier ex partu laborans, & non susti-
net in sanam partem decumbere, sed valde dolet, & ex late-
ris mollitudine quædam pendere videtur, velut obrupta. Si **E**
verò pronus decubat, non dolet. pedes & tibiæ ipsius semper
frigent. Vrina verò vix prodit, præ pituitositate & crassitudi-
ne sua. & si siueris ipsam ad modicum tempus depositam do-
nec defederit, videbis subsidentiam crassam, velut farinam,
& si quidem bilis præualuerit, subfuluā ipsam videbis. Si ve-
rò à pituita fuerit morbus, alba & crassā erit. & primū qui-
dem in annū, aut paulò amplius aut breuius tēpus. æger ta-
lia patiens perseuerat. Si verò prolongetur morbus, & magis
dolet, & suppuratur. & quum suppuratus factus intumuerit,
qua maximè parte intumuerit, in rhenē secato, & pus emitti
tō & si quidem successerit sectio, statim sanū facies. Hūc cū
sic habuerit, iisdem omnibus curato, quibus etiam priores. **F**
Et à principio morbi oportet & purgare, & ante subpurga-
tionē fomentū adhibere, & balneis frequenter lauare. Vnga-
tur item & magis calefiat, neq; frigeat, & à sole abstineat: &
neq; venere vtatur. Hæc si fecerit, & nō celerrimè sanus eua-
serit, nihil noui est. Morbus enim est grauissimus. Si verò
citra pharmaca curari velit crassum, ex diæta facere oportet,
siue ex hoc morbo ægrotet, siue ex aliquo de prioribus, diui-
sis cibis quos edere solet in decem portiones, ita vt vna parte
detracta, reliquas comedat. Obsonium autē habeat, carnem
suis tritam. & ea die decē stadia deambulet. postera verò die
& tertia vsq; ad decem dies, portionem minus edat, & deam-
bulet decem stadia aut plura singulis diebus addens. Quum
autem ad vltimam cibi portionem deuenerit, etiam ad cen-
tum stadia iter faciat. & edat quidem vnā tantū portio-
nem, & ea die centum stadia deambulet. Post cœnam autem
viginti

A viginti, mane verò quadraginta. Vinum autē bibat Mendaũ album, austerum, atq; hæc per tres menses faciat. postea reliquo tempore deambulationes imminuat, & cibos plures comedat, eodem modo additione facta velut detrahebat. Deambulationem verò detrahat vsque ad decimũ diem. & post ea quàm maximè quietē habeat, & cibis puris alatur, & obsonia quàm pinguisima habeat, & dulcia omnia ipsi cōmoda sunt. Ab oleribus autē, & acidis omnibus abstineat, itemque ab acribus, & quæ flatũ faciūt, Multa etiā calida lauet, & ne frigeat. Hæc si fecerit, celerrimè sanus erit. A rhenũ morbo corripit morbus magnus venarum cauarũ, quæ à capite iuxta iugulum per spinam tendunt, ad malleolũ pedis externum, & ad intermedium magni digiti locũ. Morbus hic fit à pituita & bile, quũ in venas cōfluxerint. Venæ autē hæ sanguine plenæ sunt. Si igitur quid alieni in ipsis præter lapsum fuerit, agrotant. Si dextram partē morbus corripiat, dolorē ex coxæ acetabulo in principio exhibere incipit. Quanto autem amplius tempus progressum & prolongatũ fuerit, tanto acutior dolor infra descendit. & quum ad malleolum pedis externum, & ad magni digiti intermedium locum deuenit, rursus ad caput venire incipit, & vbi in ipso vlcus cōstitit, fortiter premit, & homo caput sibi distringi putat. & oculi pituita replentur, itemq; totum corpus. huic quum sic habuerit, elaterium bibendum dato, aut thapsiæ radicē, aut veratri, aut succum scammonia. post purgationē verò eadē exhibeto quæ superioribus. Si verò ab hac curatione non desinat, lacte ipsum crassefacito, & in scapulam dextrā quatuor crustas inurito, & in acetabulũ coxæ dextra, tres: & sub nates, duas: & in medio femore, duas: & supra genu, vnā: & supra malleolum, vnā. Hic vbi sic vltus fuerit, neq; sursum neque deorsum morbũ procedere permittit. Si verò alicubi dolor ruptus visus fuerit, si quidem in crus incubuerit priusquã vratur, claudus erit. Si verò in caput, surdus aut cæc⁹. Si verò in vesicā, prodit simul cum vrina sanguis maximè, per quadraginta dies. Verũ si in vesicam eruperit, eadem pharmaca quæ & in vrinæ stillicidio dato, & si alicubi dolor congregatus fuerit, vrito. Vrere autem oportet carnosā quidē, ferro: ossēā verò & neruosa, fungis. Carterũ ante hæc si in principio morbi accesseris, ista facere oportet. In potu exhibendum

Quàm magnus morbus hinc fiat.

Medela. anceps.

Curatio.

Hippocratis Liber

est vinum album Mendacum, aquosius, plurimum per diem, D
& inebrietur donec sanguis à naribus erumpat. Quum autē
fluere inceperit, minimum tres & decem dies fluit. Vbi verò
hi dies præterierint, non ampliùs inebrietur, neq; vbi semel
fluere inceperit. Bibat tamen paulò ampliùs vinum inter ci-
bum, quo sanguis fluere possit. Iam verò quibusdam sedato
sanguine, erupit in vesicā, & prodiit sanguis ac pus. Si igitur
eruperit, eadē pharmaca quæ & ex vrinæ stillicidio laborāti
dato. Et de eodem vino plus bibendum exhibeto. Hic si ita
curetur, & cibos per aluum secedentes assumat, & obsonia
eiusdē facultatis, citissime sanus erit. Morb⁹ autē grauis est.

Vena sini-
stra lesa.

Alius morbus à sinistra vena. Hic æger alia quidem eadē E
patitur, quæ etiā prior. Verum in splenem dolor acutus in-
cumbit statim, & in principio morbi. Et si non intellexerit
priusquā incubuerit, profilit in pulmonē. Huic per fungos
crustas octo inurito, capita lienis quā celerrimē interci-
piens. Et vbicunq; alius dolor incubuerit, vrito. Sic enim sta-
tim sanus erit. Si verò nō fuerit vstus, sanus autē spontē fiat,

Medela.

plerisq; post duodecim annos, morbus rursus reuertitur, &
si splenē occuparit, multis aquam inter cutem inducit. Verū
oportet statim curare velut priorem, & si visum fuerit, vrere
velut priorē, si dolor in iisdem articulis cōstitit. Si verò nō

Pituita.

sic curatus fuerit, de cætero colliquescent moritur. Morbus
enim grauis est. De pituita easdem sentētiās habeo, quas &
de bile, & species ipsius multas esse puto, & alia quidē popu-
laris est, quæ sanē recētissima est. Cuius etiā curatio facilima F

Curatio.

est. Vomitus enim post cibū facere oportet per duos aut tres
dies, ita vt & prandeat insuper ac quiescat, si prioribus die-
bus semel in die cibū capere, & laborare solitus fuit. Sin mi-
nus, huiusmodi dicta vtatur. Primum multa calida lauetur,

Vitus.

quū vomitū facere voluerit, & edat mazā oleo & melle sub-
actam, & panem ex assatū vererem. Hæc enim magis pituitā
trahūt. Obsoniis autē vtatur & oleribus acribus. Sed & pin-
guia, & dulcia, & acida omnia idonea sunt, vt permixta assu-
mātur. Et oleribus omnibus viridibus vtatur. Et bibat inter
cibum frequenter modicum vinū dulce, & in fine placētā

Vomitus
qui.

insuper edat, & mel, & ficus. Et quū cœnabit, pocula largē ex-
hauriat, & vbi iam repletus fuerit, parū dormiat. Deinde ex-
perrectus vomat, magno vini poculo epoto, cum tepida aqua
temp

A temperato. Trahit enim magis pituitā & humorē ex carni-
bus, & corpus magis resiccat. Euomat autē donec ficus euo-
muerit. Hæ enim postremū euomuntur. Atq; hæc quidē hæc
die faciat. postera verò contineat seipsum vsq; ad cœnā, & in
cœna sumat panē, cui nihil fursurū decessit. Obsonium autē
sit ex fortioribus. Vinum verò bibat nigrum, austerū. Atque
hæc quidē popularis pituitæ medela est. Si verò edere & bi-
bere potest, & cibis delectatur, deinde verò crura grauentur,
& color immutatus fuerit, huic ostendendū est, pituitā mo-
lestantem in ventre esse. Verū oportet quum sic habuerit,
mel & vinū dulce, & oleum, & nitrum tali ouilli magnitudi-
ne, permixta per clysterem infundere. hæc enim mitissima
sunt in clysterem ad hominis naturā. Mensurā autē singulo-
rum esse oportet, vini quidem heminam, olei verò heminæ
dimidium, & mellis tantundē. Si verò clysterē non voluerit,
humeſtum hominē facere oportet, fomento humido admo-
to. Fortassis enim etiā sic stercoſus subeuacuari poterit. Nam à
ciborum nimia resiccatione hæc patitur. Siquidē igitur quis
edat cibos valde succosos, fortassis hæc non ita vehementer
patiatur. Si verò etiā aliquando patiatur, modica curatione
opus habuerit. Hunc ita curans, celerrimē sanum feceris.

Quæ faciliē
subluant.

At si antiquior fuerit pituita, appellatur autē hæc pituita
alba, hæc patitur. Grauat hominē magis, & speciem à popu-
lari alienā habere videtur pallidiorem & totū corpus laxo
tumore intumescit, & facies rubet, & os siccum est, & sitis te-
Cnet: & quum comederit, spiritus densus ipsi incidit. Hic eadē
die aliquādo melius habet, aliquando derepente dolet, & sibi
mori videtur. Huic si quidē venter sua sponte turbatus fue-
rit, sanitati proximus erit. Si verò non sua sponte venter tur-
betur, purgare oportet cneoro dato, aut hippophae, aut cni-
dio grano, aut lapide Magnesiæ. Et post purgationem, lenti-
culæ hemina vna aut duæ dentur ad absorbendū. Coquatur
autem allium in lenticula. Detur etiā betæ pinguis hemina
non conditæ, dolenta circuminspersa. Bibat vinum nigrum,
austum, & forte. Postera verò die mane stadia viginti de-
ambulet. A qua deambulatione reuersus, panē edat paruum
exassatum, & obsoniū habeat allium coctum. & de eodē vi-
no paulo meracius bibat. deinde stadia vadat triginta. & vbi
tempus adierit cœnet, quātum etiā prandere cōsuevit: obso-
nium.

Quæ ven-
trem mo-
ueant.

Hippocratis Liber

Quæ caro sonium autem habeat, maximè quidem pedes, & capita suil **D**
piscisve dā la. Sin minus, galli carnibus & suis tritis vtatur. Ex piscibus
di. autē scorpio, aut dracone, aut cuculo, aut callionymo, aut go

Morbi hu- ribus autē solo allio, & nullo alio vtatur. Hoc verò quàm plu
ius causa. rimum edat, & crudum, & assatū, & coctum, semper plus sin
 gulis diebus. & laboret ex modico ampliùs, respectu ad cibos
 facto. hic morbus maximè sit tempore æstatis ex aqua potu.
 Insuper & à somno multo. Iudicatur autē in triginta diebus,

Medela. an lethalis sit, aut non. Atque hæc quidem faciat vbi trigin-
 ta dies præterierint. In primis autem diebus, sorbitionibus
 vtatur, lenticula cocta acidiorē ab aceto, & ptisana acida. Bi-
 bat aquam mulsam tepidā, polēta modica inspersa; quo cor **E**
 pus præparatū sit ad pharmacorū potum. Et his diebus sub
 dio dormiat. & si tibi visum fuerit sanguinē à lūbis detrahe-
 re cucurbitā affigito, & venas in scroto crassissimas secato.
 hic ita curatus citissimè san⁹ fiet. A pituita maximè in aquā

Aqua inter
cutē de pi-
uita qui
fiat.

inter cutem trāitus sit, hoc modo. pinguedo colliquescit, & à
 calore qui in pituita est, sit aqua. Cognosces autē hoc an quis
 sanari possit, aut non. Donec enim quis in pectine pinguedi-
 nem habet, fieri nō potest vt ipsum sanes. Cognosces autem
 ex his maximè, an pinguedo insit in pectine, aut non. Si qui-
 dem febres succedāt, & nō potest exurgere, & vmbilicus in-
 flatus extra prominet, indicium est non ampliùs inesse pin-
 guedinem, & sanabilem esse. Huic conducit vētrem siccare,
 & panem dare cui nihil furfurum decessit, antiquū calidū. **F**
 Obsonium autem carnē leporinam, & canis perfecti, & oui-
 culæ, & suis assatam, & galli assatā ac calidā & polypos edat

Vitæus. coctos in vino nigro austero. Vinū autem bibat nigrum, au-
 sterum quàm crassissimū ac acerbissimū. Piscibus autē vta-
 tur, gobio, dracone, callionymo, cuculo, scorpio, & aliis hu-
 iusmodi, omnibus coctis, nō recētibus, & frigidis. hi enim sic-
 cissimi sunt, & in iusculū ne intingat, & insulsi sint pisces. ex
 oleribus autē vtatur raphanis, & apio. Torreat autē lēticulā
 ab aceto acidiorē, & edat. Et deambulet quotidie, & post co-
 nā, & mane. & serotino tēpore dormiat, & mane exurgat. Et
 si quidē ab his restituitur, satis est: Sin minus, cneorū, aut hip-
 pophais succū, aut granū cnidiū, bibedū dato. Et post purga-
 tionem, lēticulæ heminas duas sorbeat, & panē parū come-
 dat.

A dat. Vinum verò bibat nigrum, acerbum modicū. Bibat autem pharmacum bis in die, donec vacuus fiat. Si verò tumor constiterit in scroto, & femoribus ac tibiis, acuto scalpello multa & frequentia vulnuscula incutito. Et si hæc feceris, cito sanum efficies. Aqua inter cutem ex his fit. Quum æstatis tempore siti vexatus aquam multam biberis: nam ex hoc maximè fieri solet: & pulmo expletus fuerit, rursus ad pectora dimittit. Et quum in pectoribus fuerit, calorē vehementem exhibet, ut pinguedo quæ in arteriis inest colliquescat. & si semel liquari pinguedo inceperit, multo amplius in brevi tempore aquam inter cutem facit. Fit etiam si tubercula in pulmone fuerint enata, & aqua repleta, & in pectora rupta. Quòd autē fiat etiā à tuberculis aqua inter cutem, testimonium habeto, & in boue, & in cane, & in sue. In his enim quadrupedibus maximè fiunt tubercula in pulmone, quæ aquam habent. Si enim dissecueris, citissimè cognoueris. Fluet enim aqua. Videntur autē talia multo magis in homine fieri, quàm in pecoribus, quanto etiam morbosiore diata vtimur. Facti sunt autē & multi pectore suppurati tuberculis obortis. Hæc igitur in principio ad morbum consequuntur.

Aquæ inter cutē vnde.

Tubercula pulmonis.

Exemplo probat.

Purulentia etiam hinc fiunt.

Tussis sicca, & fauces exasperari videntur, & rigor ac febris succedit, & erecta ceruice spiratio, & corpus intumescit, & pedes tument, & ungues contrahuntur. & donec quidē in superno ventre fuerit aqua intercus, adest dolor acutus. postquam autem ad infernum ventrem venerit, melius habere sibi videtur. Postea progressu temporis patitur qualia prius impleto ventre. Quādoque etiam ad latus intumescit, & indicat ubi secare oportet. Si verò non indicat, multa calida lauato, & humeris apprehensum concutito, & deinde in vtro latere magis fluctuet audito. Quo intellecto costam tertiam ab vltima vsq; ad os secato. Deinde cum terebra caua vltra perforato. Et ubi perforata fuerit, aquæ parū emittito, & ubi emisericis, linamentum ex crudo lino indito, & spongiā mollem superimponito. Deinde ut ne excidat linamentum deligato. Emittere autem per duodecim dies aquam oportet, semel in die. Post duodecimum autem diem sequenti decimartertia totā aquam emittere, & reliquo tempore si subnascat aqua emittere, & ventrem cibus resiccare. Post sectionem autem hæc exhibere oportet. Succus silphij drachmæ pondus

Curatio.

Hippocratis Liber

dus parato, & aristolochiam tali ceruini magnitudine dera- **D**
 dito, & lentium ac erui torrefactorum polentam, dimidia
 chœnicis mēſura vtrunque purgato, atq; hac melle & aceto
 subigito. Deinde paſtillos ſexaginta efformato, & quotidie
 vnum tritum in vini nigri auſteri ac iucundiſſimi hemina
 dimidia diluito, & mane in potu dato. Reliquum verò viſū
 ac laborem eundem, velut priori tēpore, habere iubeto, Et ſi
 intumuerint pudenda ac femora, cōfidenter vulnuſculis im-
 paſtis pertundito. Hunc ſi ita curaueris, celerrimè ſanum fa-

Aqua inter
 cus ab he-
 pate.

Curatio

Aqua inter
 cus alia.

Alia à lie-
 ne.

cies. Ab hepate fit aqua intercus, quum in hepar pituita ac-
 ceſſerit, & hepar ipſam ſuſceperit, & humectum fuerit. Sta-
 tim igitur calorem huic exhibet, & flatum inducit. Deinde **E**
 temporis progreſſu aqua impletur. Poſtea morſus in corpus
 incidit. Et tumor in tibiis ac pedibus ineſt, & hepar durum
 eſt ac intumeſcit, & clauiculæ attenuantur. Huic quum ſic
 habuerit, in principio ſi hepar doluerit, origanum tritum, &
 ſilphij ſuccum erui magnitudine, in vini albi dimidia he-
 mina diluta, bibēda dato. & lactis caprini poculum quatuor
 heminarum, tertia aquæ mulſæ parte ammixta. A cibis autē
 per primos decem dies abſtineat. Hi enim iudicāt morbum,
 an lethalis fit, aut non. Sorbeat autē ptisanæ ſuccum coctum,
 melle affuſo. Vinum autē bibat album Mendæum, aut aliud
 iucundiſſimum aquoſum. Quum autem decem dies præ-
 terierint, cibos accipiat puros, & obſonium habeat, galli car-
 nem aſſatā calidam. Habeat & catulinam coctā. Piſce verò **F**
 vtatur galeo, & torpedine aſſatis. Vinum verò idem bibat, &
 ſi quidem ab his quieſcat, ſatis eſt: Sin minus, poſtquam ſanè
 craſſiſſimus factus fuerit, & hepar maximum, fungis vrito.
 Sic enim celerrimè ſanum feceris. Inurere autē oportet cru-
 ſtas octo. Si verò aqua intercus innascat, & rumpatur in
 ventrem, iſdem medicamētis & potibus, & cibis, ac labori-
 bus, quibus priores curato. Vinum verò bibat auſterum ni-
 grum. Si verò tibi videatur diſceſſiſſe ab hepate, per ferrum
 vbicunque apparuerit vrito, & aquam paulatim emittito, &
 velut reliquos priores curato. Si verò ab his non ſanus fiat,
 temporis progreſſu corrumpitur ac moritur. Morbus enim
 eſt grauis, & pauci hunc effugiunt. Aqua verò intercus à
 ſplene, hoc modo fit, & ab huiusmodi maximè cauſa, quum
 quis ficuum viridiū, & malorū fructus multos ederit. Multi
 verò

A verò iam etiam à cibo botrorum multorum, & à multo misto, morbum inciderunt. Si quidē igitur in morbū collabatur, statim in doloribus est. Dolores enim acuti in splene consistunt, transeunt autem & in humerū, & in claviculam, & in mammam, & ad lumbos, & febres fortes tenent. Et si parum quid ederit, venter impletur, & splen attollitur, & dolorem exhibet. Hic morbus si durauerit, reliquo quidem tempore minus dolet. Quum verò fructuum malorū tēpus fuerit, & hos ederit, magis quàm prius dolet. Hunc ubi sic habuerit, à principio curato, & sursum quidem veratrum exhibeto. Deorsum verò cneorum, aut hippophais succū aut cnidium granum, Lactis item asinini heminas octo melle affuso: & si quidem ab his restituitur, satis est: Sin minus, quum maximus fuerit lien, & maximè intumuerit, fungis vrito, capita eius interceptiens: aut ferramentis, cu multa cautione ac observatione ne ultra peruras. hæc à morbi principio facito, & hac diæta nutriatur. Si quidem febris nō affuerit, pane utatur triticeo assato, aut ex duro tritico bis cocto: obsoniū autem habeat salsamentū Gaditanum, aut saperdā. Et carnem ouillam tritā. Et acida ac salsa omnia edat. Et bibat vinum austerum Coum quàm nigerrimum. A dulcibus abstineat. Quum autē exsurgit, & potens est, luctetur summis humeris, & laboret per circuitus multos in die, & comedat ea quæ dicta sunt. Si verò aqua intercus fiat, iisdem curato quibus & priores. Alia aqua intercus ab his fit. Acstatis hora si iter faciens per viā longam, in aquam pluuialem ac stabilem inciderit, & biberit de ipsa multum affatim. Si igitur carnes absorbuerint & cōtinuerint in seipsis aquam, secessus autem nusquam fiat, hæc patitur. Si quidē fuerit in carne, calorem facit & in ventre, & in corpore, ut pinguedo ventrē ambiens colliquescat. hic quandiu quidem iter facit, nihil mali habere videtur. Postquam autem iter facere cessarit, & sol occiderit, statim dolorem multū habet progressu verò morbi valde attenuatur. Si verò etiam cibi fastidium accedat, multo plus attenuatur. Si verò cibos edere poterit, & ad laborē impotens fuerit, etiam amplius læditur, & plerisque horum tumor in totum corpus deducitur. Et tenui quidem color corporis liuidus fit, & venter magnus, & sitis fortis tenet, & viscera ipsius à calore resiccantur. progrediente verò tempore,

Medela.

Alia aqua intercus.

D 5

ad

Hippocratis Liber

ad edendum quidem promptus fit, & edit quodcunq; quis de- D
derit, & bibit, & dolet nihil. Si verò tumor obtumuerit, color
huic fit pallidus. Et venæ nigræ frequentes per corpus disten-
duntur. Indignatur autem & tristatur ex quavis re, etiam si
nihil noui accidat. Venter verò aqua perhumescit, & ma-
gnus fit, & laternæ speciem præ se fert. Et tēporis progressu
cibos nō admittit, sed videtur ipsi cucumeris syluestris odo-
rem habere, præ abominatione. huic ubi sic habuerit, cneori

Curatio.

aut hippophais succum dato, aut cnidium granū. hæc verò
pharmaca ita dare oportet. Cneorum quidē per sextā diem,
Hippophais autē succum per octauam. Cnidium verò gra-
num per decimam. & dare ipsa oportet donec expurgetur, & E
vacuus fiat. Interpositis autē diebus alatur ex iisdem qui-
bus & prior. Maximè autem de eadem aqua bibendū dato,
ex qua morbus corripuit, plurimum, quo ventrē ipsius tur-
bet, & valde secessum faciat. Sic enim potissimum sanum fa-
cies. Si verò tibi videbitur, etiam frequēter clysterem adhi-
beto, ex cneori triti dimidia hemina, mellis tertia hemina
parte ammixta, his cum quatuor succi betæ heminis dilutis,
atque sic infusis. postea die etiā asinini lactis coctis octo he-
minæ dentur affuso melle, aut adiecto sale potandæ. Et post
purgationem, iisdem vtatur quibus prior. & interiectis die-
bus, cibis ac potibus iisdē vtatur, & deambulationibus simi-
liter, & sic curatus breui à morbo liberabitur tertio mense,
aut sexto. Si verò negligentia aliqua contigerit, & non sta-
tim curatus fuerit, breui moritur. Sed & in attenuato iisdē F
vtendum est ad sanationem. Præhumescere verò antea cor-
pus ipsius oportet per fomenta, quo magis pharmacis obe-
diat. At verò statim curā adhibere oportet: Sin minus, cum
multis consenescit morbus. Sed & vter tandem morbus sit,
clysterem ex his adhibere cōuenit. Vini albi heminas duas
accipito, & mellis heminam dimidiam, & olei heminam di-
midiam, Nitri Aegyptij rubri torrefacti quadrantem, fo-
liorum cucumeris syluestris tusorum ac expressorum succi
heminam. hæc omnia mixta & in ollulam infusa feruefaci-
to, & per clysterem infundito. Morbus hepaticus. Fit ab
Morbus he- atrabile, quum influxerit ad hepar. Accidit autem maxi-
paticus. mè in autumnno, in mutationibus anni. Hæc igitur æger
patitur. Dolor acutus ipsi in hepar incidit, & sub vltimas
costas,

A costas, & in humerum, & in claviculam, & sub mammam.

Et suffocatio fortis tenet. Et aliquando liuidam bilem reuomit. & rigor, & febris primis diebus debilior habet, & dum attingitur, hepar dolet, & color ipsius subliuidus est, & cibi quos prius comedebat, suffocant ipsum, & ingesti vrunt ac torquent ventrem. Atque hæc quidem in principio patitur. Morbo verò progrediente, & febres remittunt, & a paucis cibis repletur. In solo autem hepate dolor restat, & ipse aliquando fortis, aliquando quietus. Quandoque verò acutus corripit, & sæpe derepente æger animam efflauit. Huic con-

Medela.

B multa calida ipsum lauato, & aquam mulsam bibendam dato, & vinum album dulce, aut austerum, vtrum tandem profuerit. Et sorbitiones easdem quas etiam à pleuritide correpto. Caterum ad dolorem hæc bibenda dato. Oui gallinacei cocti liquorem terito, & succi solani dimidiâ heminam affundito, & aquæ mulsæ dimidiam semiheminæ partem ammisceto, diluito, ac bibenda dato, & sedabunt dolorem. dato autem quotidie donec dolor quiescat. Bibat etiam silphij succum erui magnitudine, & cum eo origanum tritum in vino albo diluat, & sic ieiunus bibat. Bibat insuper & pharmaca quæ in pleuritide dantur doloris gratia. Bibat & caprinum lac, tertia parte mellis ammixta, Sin autem lactis heminæ quatuor. Hoc mane bibat, quum alia non biberit.

C A cibis autem abstineat, donec iudicetur morbus. Iudicatur autem maximè in septem diebus, in his enim manifestum fit, an lethalis sit, an non. Si verò etiam suffocatio accesserit, hæc dare oportet quo vomat. Mel, aquam, acetum, salẽ, permixta in ollam nouam infundito. Deinde tepesacito, & organi capitati ramulis vnà cum semine agitato. Vbi verò tepesacta fuerint, tepida ebibenda dato. Deinde stragulis iniectis cõtectum finito, donec quàm maximè exudarit. Et vbi vomitus ipsum apprehenderit, promptè vomat irritatione per pennam facta. Si verò vomere nõ possit, aquæ mulsæ tepidæ poculum duarum heminarum insuper bibat, & sic vomat. Et si quid pituitæ aut bilis euomuerit rursus idem facere oportet ad horas quatuor. proderit enim. Post morbi verò iudicationem curato modicis cibis, iis que puris datis. & si quidem

Suffocatio
nis medela.

Hippocratis Liber

quidem panem edere cupiuerit, panem calidum maximè pu-
rum edat. Si verò mazam, eam quæ vino dulci subacta non
est, edat, ubi tamen prius aqua subegit. Obsonium autem ha-
beat carnes catuli coctas, aut columbæ, aut pulli gallinacei
carnibus omnibus coctis vtatur. Ex piscibus autem galeo,
torpedine, pastinaca, & raiis paruis, omnibus coctis. Lauetur
autem quotidie, & frigus vitet & parum deambulet antea in
securitate. Hec si seruauerit nō est timor vt morbus reuertat-
tur. Nam huiusmodi morbus grauis est ac diuturnus. Alius

**Alius he-
paticus
morbus.**

hepaticus morbus. Dolores quidem eodem modo premunt
in hepar, & color differt à priore. Malicorij enim formam
habet. In tempore verò æstatis maximè incidit. Fit autem à
bubulæ carnis esu, & vini potu nimio. Hæc enim omnia isto
anni tempore hepatis sunt infestissima, & bilem maximè ad
hepar adducunt. hæc igitur æger patitur. Dolores acuti inci-
dunt, & non deficiunt vlla hora, sed semper magis premunt.
Aliquando etiam vomit bilem pallidam, & ubi vomuit, pau-
lo melius sibi habere videtur. Si verò non vomuerit, bilis ad
oculos peruenit, & fiunt valde pallidi. Et pedes intumescunt.
Atq; hæc patitur quandoq; valde quandoque minus. Quum
autem dies præterierint, in quibus morbus iudicatur, dolor
minus vrget, si nihil deliquerit, & eiusmodi dietam huic con-
stituere oportet, qualem & priori. Si enim inebriatus fue-
rit intempestiuè, aut venere vsus fuerit, aut aliud quid fece-
rit quod commodum non est, hepar statim ipsi durum fit, &
intumescit ac à dolore pulsatur. Et si quid facere festinarit, de-

Medela.

repente hepar & totum corpus dolet. Huic ubi sic habuerit, &
primi dies præterierint, fomentum adhibeto: deinde scam-
monio subpurgato. Si verò venter combustus fuerit, clyste-
rem ex iisdem quibus in prioribus vsus es, adhibeto, quæ pro-
bè ducant: & post clysterem, lacte asinino cocto subpurgato,
octo heminis eius, melle affuso, in potu datis. Dato etiam ca-
prinum lac mane poculi quatuor heminas complectentis
mensura, tertia parte aquæ mulsæ ammixta. Dato item co-
cti lactis caprini heminas duas, tertia aquæ mulsæ parte
ammixta, aut ipso solo melle affuso. dandum est etiam equi-
num lac, eodem modo velut asininum, & si quidem ab his
morbis curatus cedat, satis est: Sin minus, dextri cubiti in-
ternam venam secato, & sanguinem detrahito. Si verò non
visus

A visus fuerit tibi per asininum lac subpurgandus esse, bubuli lactis crudi duas heminas dato, tertia aquæ mulsæ parte amixta, quotidie ad dies decem. Deinde ad alios duodecim dies, sexta parte aquæ mulsæ affusa, ad bibendum dato. De cætero verò ipsum lac duarum heminarum mensura, donec pinguefiat exhibeto. Si verò neque sic desinat, vrere oportet, quum maximū hepar factum fuerit, & maxime eminuierit. Vrito autem per buxeos fusos, in oleum feruens tinctos. Apponito autem donec tibi bene habere, & vstionem factā esse visum fuerit. Aut per fungos octo crustas inurito. Si enim vstio successerit, sanum facies, & reliquo tempore melius deget. Si verò non successerit, de cætero ab aliis sanus non fies,

B corrumpitur ac moritur. Alius morbus hepaticus. Reliqua quidem eadem patitur hic æger velut priores. Color autem niger est. At hepatis fel, pituita & sanguine repletum, Hepatis tertius morbus. velut ratiocinamur, dirumpitur, & vbi disruptum fuerit, cellerrimè insanit, & indignatur, & loquitur stulta, & latrat velut canis. Et ungues punicei fiunt, & oculis videre non potest, & pili in capite erecti stant, & febris acuta corripit. Huic eadem adhibere oportet quæ etiam prioribus. Plerique verò moriuntur in vndecim diebus, paucique effugiunt. Splenis morbus primus. Fit huiusmodi morbus, propter caliditatem Solis bile commota, quum in seipsum bilem traxerit. Hæc igitur æger patitur, febris acuta in principio accedit, progrediēte verò morbo remittit, excepto ipso splene, in quo Splentis. semper calor hæret, & dolor aliàs atque aliàs incidit acutus, & in lateris mollitudinem, & in ventrem. Et cibos in principio quidem admittit, non autem valde secedunt, progressu autem temporis, & color pallidus fit, & dolor fortis irruit, & clauiculæ attenuantur, & cibos non similiter admittit, velut in principio, & à modico impletur. Lien verò aliàs magnus Medela. fit eadem die, & aliàs minor, huic quum sic habuerit veratrū purgans deorsum, bibendum dato, & cnidio cocco subpurgato. Ad vesperum autem post purgationem, lenticulæ acidioris heminam sorbendam dato: & betarum pinguium heminam polenta inspersa, postera verò & tertia die panem paruum dato, pro obsonio autem lenticula vtatur, & carne suilla in lenticula cocta trita. Vinum bibat austerum, nigrum, paulò meracius. Et quietem his diebus habeat, nisi quod in-

Hippocratis Liber

Saperda.

tus in vmbra paululum deambulet. Reliquo verò tempore **D**
hæc exhibenda sunt. Cibus sit panis cui nihil furfurum deces-
sit. Obsonium habeat carnem canis maioris, vel capra, vel
ouiculæ tritam. & salsamentum Gaditanum, aut saperdam.
& acida ac salsa omnia assumat, & acerba. Bibat vinū Coum
subastringens quàm nigerrimum. à dulcibus autem & pin-
guibus ac nidorosis abstineat. & silphium non accipiat, ne-
que allium, neque carnem porcinam. Neque mugilem, nec
recentem, nec salsum, neque anguillam. Neque olus vllum
coctum sine aceto. Ex troximis autem, hoc est, his quæ cruda
eduntur, raphanide vtatur & apio, in aceto tinctis. & polen-
tam vino subactam edat, & vinum meracum sorbeat. Si ve-
rò velit, etiam panem in vinum interat, ac calidū edat. Den- **E**
tur etiā pisces, scorpius, draco, cuculus, gobio, callionymus.

**Quæ lienē
exiguunt.**

Hos coctos & frigidos dato. Dato etiam quæ splenem atte-
nuare possunt singulis diebus, asphodeli semen, aut visci fo-
lia, aut fœnum Græcum, aut viticis semen, aut rutā, aut men-
tæ radicem. ex his quodcunque volueris tritum in vino auste-
ro dato ieiuno. Si verò adeò validus fuerit, per triginta dies
ad ligna secanda cogito. & summis humeris luctetur. & in-
terdiu deambulet. & vespere dormiat. Mane verò surgat, &
quæ relata sunt edat. Si verò ab his non melius habeat, sple-
nem fungis vrito, decem magnis crustis inustis, quum maxi-
mus fuerit splē, & maximè eleuatus. Si enim successerit vstio
facta velut oportet, sanum facies, verū non breui. Opus
enim habet morbus curatione. Grauis est enim & diutur- **F**

**Lienis se-
cūdus mor-
bus.**

nus, si non fuerit statim curatus. Alius splenis morbus sit
quidem ab iisdem à quibus & prior, patitur igitur ager ab
hoc morbo hæc. Venter inflatur. postea verò etiam splen intu-
mescit, & durus est, & dolores acuti in splenē incidunt. Color
autem mutatur, & conspicitur niger, pallidus, malicorij spe-
ciem referens, & ex aure male olet, & gingiux malè olent, &
à dentibus discedūt. & ex tibiis vlcera erūpunt, velut pustulæ
nocturnæ. Membra verò attenuantur. & stercus non secedit.

Curatio.

Hunc quum sic habuerit, iisdē pharomaticis & eduliis, & po-
tibus, & laboribus, atque aliis omnibus curato. & vbi stercus
secedere noluerit, clysterem adhibeto, ex mellis hemina di-
midia, & nitri Aegyptij magnitudine tali ouilli. Hæc trita
in quatuor heminis aquæ de betis coctis diluito, & per cly-
ste rem

Asterem infundito. Si verò morbus ab his nō sederur, splenem ipsius vrito velut prioris, & si vstio successerit, sanū efficies.

Alius splenis morbus fit, in anno, veris maxime tempore, verū à sanguine. Quum enim repletus fuerit splen sanguine, erumpit in ventrem, & dolores acuti in splenem incidūt, & in mammam, & in claviculam, & in humerum, & sub scapulam. Color autem corporis est plumbiformis, & parua vlculcula velut lancinata in tibiis exurgunt, ex quibus vlcera magna fiunt, & quæ primū infrā secedunt, sanguinolenta sunt, & æruginosa, & venter durus subit, & splen velut lapis est, hic morbus magis lethalis est quā priores, & ex ipso pauci effugiūt. hunc quum sic habuerit, iisdem purgato quibus & priorem, veruntamen pharmacum sursum purgās ne dederis. Deorsum verò granum cnidium exhibeto. Et postera die etiam lactis equini cocti octo heminas dato, melle affuso. Si verò hoc non adfuit, bubuli aut caprini cocti duos congios præbeto, ita vt alternatim mel in poculū ammisceatur & vicissim bibantur. Ad vesperam autem post purgationem eadem quæ priori dato. Et si visum fuerit ab interna cubiti sinistri vena sanguinem detrahito. Reliquis autem diebus quotidie ieiuno lactis bubuli quatuor heminas dato, tertia muria parte ammixta. Cibis verò & potibus, & aliis omnibus iisdem curato, quibus & priorem. Abstineat autem à venere, & ebrietate, hic velut prior. Et si videatur etiam vrito, quum crassissimus & maximus splen factus fuerit. & si oportune vsseris ac successerit, sanum facies. Si verò ab hac curatione sanus non fiat, tempore corruptus moritur. Est enim morbus valde grauis. Alius splenis morbus. Accidit & hic morbus vere maximè, quum splen pituitam assumpserit in seipsum, & statim magnus factus fuerit ac durus, & deinde rursus sedatur. Et quū quidem eleuatus fuerit, dolores incidūt acuti. Quum verò mollis fuerit, doloris exors est. Et vbi diuturnus factus fuerit morbus, obscurior esse videtur, & insurgit, & citò sedatur. Hic quū sic habuerit, in principio morbi cibos admittere non potest, & citò attenuatur: & corpus impotentiam multam habet. Morbus autem si non statim curatus fuerit, aut sua sponte quieuerit, interpositis quinque aut sex mensibus, rursus insurgit. Intermittit autem maximè per hyemem. hunc si in principio acceperis, decem crustas

Lienis tertius morbus.

Medela.

Lienis quartus morbus.

Lienis quin-
tus mor-
bus.

Medela.

Regius
morbus pri-
mus.

Medela.

stas in splenem vrito, & statim sanū facies. Si verò non vffe- **D**
ris, iisdem pharmacis curato, quibus & priores. Et aliis item
iisdem, & potibus, ac laboribus. Sic enim celerrimè sanū fe-
ceris, huius autem color fit exalbidus, subpallidus, & squali-
dus. Alius splenis morbus. Fit autumnò maximè ab atra-
bile. Fit autem ab olerum multorum quæ cruda edūtur esu,
& ab aquæ potu. Patitur itaq; ager hæc. Quum morbus cor-
ripuerit, splenem vehementer dolet, & rigor & febris appre-
hendit, & inedia ipsum habet, ac cibos auersatur, & corpus
citò cōcidit. Splen autem, magnus quidem non valde fit, ve-
rùm durus, & ad viscera allabitur, & adhærens fugit. Hunc
quum sic habuerit, iisdem pharmacis & eduliis ac laboribus
quibus priores curato. Et si se tibi exhibuerit, vrito ipsum eo **E**
modo quo etiam alios. Hic morbus in plerisque si statim cu-
ratus fuerit, breui decedit. Quatuor morbi regij, primus
quidem æstate maximè corripit, bile commota. Constat igi-
tur bilis sub cute, & in capite, quare statim corpus in alium
colorem mutat, & fit pallidum, velut malicorium. Et oculi
pallidi fiunt, & in capite sub pilis velut cortex subest, & rigor
ac febris corripit, & pallidam vrinā mingit, & crassum sub-
pallidum in ipsa subidet. & manè quàm diu ieiunus fuerit,
ad cor & viscera exugitur, & si quis ipsum alloquatur aut in-
terroget, ægrè fert, & anxius fit, & non sustinet audire. Ster-
cus autem excretum cum pallore albicat, & malè olet. Hic
quum ita habuerit, maximè moritur in quatuordecim die- **F**
bus. Si verò has effugiat, sanatur. Curare autē oportet ipsum
sic. Quum febris remiserit multa calida lauato, & aquā mul-
sam bibendam dato. Et sorbitionibus vtatur, ptisanæ sacco,
melle affuso. Mel autem non simul coquito, donec præter-
ierint quatuordecim dies. Hi enim iudicant an lethalis sit
morbus, aut non. postea verò bis in die lauato, & nutrito pri-
mū modicis quæcunque maximè admiserit. postea tamen
plura dato. Vinum bibat album plurimum per diem. & si
progressu temporis videatur tibi pallidus esse & debilis, vo-
mitum à cibis facere iubeto, velut in superioribus morbis
habetur. Et si quidem ab his morbis quiescat, satis est; Sin-
minus, veratrum bibendum dato. Post talem autem purga-
tionem, ad vesperam edat mazam mollem, aut panis medul-
lam. Obsonium verò edat, pullum gallinaceum percoctum,
probè

- A** probè conditum cum cepa, coriandro, caseo, sale, sesamo, & vua passa alba. Vinum autem bibat album, austerum, vetustissimum. Aluum verò infra subpurgato, postera die succo cicerum alborum, melle affuso, vtatur, & duas heminas eius modi succi ebibat. Tertia verò die initio facto, singulis diebus hanc aquam bibat, ex his rebus coctam, fœniculi radices tenues ea copia quanta tribus digitis cōprehendi potest, in duos aquæ congios mittito, ac coquito vsq; ad dimidias. Et cicerum alborum chœnicen, in duobus aquæ congiis ad dimidias ite coquito, & quod superest excolatum sub dio per integrā noctem exponito, & ambo hæc decocta misceto. Cum hac aqua & vinum temperatum bibat, & ipsam aquam solam si velit, quā plurimam bibat: & aliam aquam non bibat. Si verò hanc potionem non admiserit, aliam sic præparatam dato. Caricarum albarum chœnicen in duobus aquæ congiis coquito, excolato, & sub dio per integram noctē exponito. postea hanc aquam bibat, siue nudam ipsam voluerit, siue cum vino mixtam. Bibat autem non aceruatim multam, sed pro vna vice dimidiam heminam, vt ne alui profluuium ipsi succedat, & modico tempore interposito rursus bibat. Commoda autem sunt & hæc in potu data ieiuno singulis diebus, trita & in vini veteris albi hemina diluta, apij semē, cucumeris semen, fœniculi semen, cuminum Aethiopicum, adiantum, coriandrum herba, vuae passæ albæ. His & illis in potu acceptis vtilitatem percipies, & celerrimè sanus fiet.
- C** Alius morbus regius siue arcuatus. Hic corripit tempore Secundus. hyemis, & ex ebrietate & rigore. Incipit autem primū rigor inuadere, postea etiam febris detinet. Et humor qui est in corpore, cōgelatur in cute. Quod autem sic habeat, ex his ostenditur. Liuidum est ipsius corpus & subdum. Et venæ per corpus distentæ sunt pallidæ. maiores autem & crassiores sunt quā prius. Et aliæ venæ subnigriores distentæ sunt. Quales in Et si quis aliquam ipsarum secet, sanguis effluet pallidus, si hoc morbo pallidæ sunt venæ. Si verò nigra fuerint, niger sanguis effluet. Et vestem interiorem corpori adiacentē, præ pruritu nō sustinet. Hic promptus est ad iter faciendū & ambulandum, sed præ debilitate crura labascunt, ac ipsum non sufferūt, & sitit vehementer. Hic morbus non minus priore lethalis est. Procedit autem ad amplius tempus, si non in primis diebus
- E sanus

Hippocratis Liber

- sanus fiat. Si verò morbus prolongetur, & ad octauum aut **D**
nonum diem duret, in morbum incidit, & morbus, & dolor
Medela. magis premit, & exurgere non potest. Et plerique in hoc tē-
quæ. pore statim pereunt. Huic ubi sic habuerit, si quidem prin-
cipio morbi accesseris, quum iam septem dies præterierint,
veratrum bibendum dato. Ventrem verò infra subpurgato
per succum, velut priori. Et alia eadem pharmaca dato. Ex-
Cātharidæ hibeto & cantharidas, sine alis & capite, quatuor tritas, & in
vini albi hemina dimidia dilutas, modico etiam melle affu-
so. Atque has bis aut ter in die bibat. Progrediente verò mor-
bo, balneis & fomentis curato. Edat autem quæcunque ad-
mittit. Vinum bibat album, austerum, & alia eadem assu-
mat quæ prior. Hic morbus diuturnus est & grauis, si non ab
initio probè fuerit curatus. Alius morbus regius. Popu- **E**
Tertius. laris appellatur hic, eo quod omni tempore corripit. Fit au-
Morbi cau- tem à repletionem maxima ac ebrietate. & postquam rigue-
sa. rit, statim sanè corpus immutatur, & pallidum fit, & oculi
pallidi valde sunt. Et sub pilos & sub ungues morbus proce-
dit. Et rigor ac febris debilis tenet. Et debile est corpus, &
in capite dolor adest. Et pallidū ac crassum mingit, hic mor-
bus minus lethalis est prioribus, & curatus breui sanatur.
Curatio. Huic quum sic habuerit, cubiti venam secato, & sanguinem
detrahito, Deinde fomento adhibito, elaterium bibendum
dato. Tertia verò die rursus infra subpurgato, cum lacte asi-
nino. Reliquas verò sorbitiones, & potus, ac edulia, eadem
dato quæ priori. Et caput ipsius frequenter purgato. & de **F**
succo bibendum dato. Et multa calida ipsum lauato, ac car-
nem defricato, & defricatas sordes in vino albo bibendas da-
to. & ad alia omnia iisdem vtatur. & breui sanus euadet.
Quartus. Alius morbus regius, fit quidem à pituita, hyeme autem
maximè corripit. & color ipsius agri est albus, & pectora ip-
sius pituita plena fiunt, & sputum saluam: & quem excreat, sin-
gultus ipsi oboritur. Et album lotium ac crassum mingit &
in vrina subsidet, velut farina. Hic morbus non est lethalis,
Medela. & breui sanatur. Huic quum sic habuerit, cnidium granum
bibendum dato. Et post purgationem, succi ptisanæ qua-
tuor heminas, melle affuso, exsorbendas dato. Superio-
rem verò ventrem vomitu inducto, velut in prioribus pur-
gato. Sic enim facilimè pituitam à pulmone & arteriis ab-
duxer

A duxeris. Sed & gargarismum ipsi frequenter præparato. Hic aliquando etiam febrit debili febre, & horror tenuis succedit. De cætero verò iisdem quibus priores curato, & pharmacis, & fomentis, & balneis, & eduliis, & potibus, & forbitionibus. Sic enim maximè sanum facies. Morbus Typhos. Typhos vocatus. Typhos quidem appellatur hic morbus, hoc est stupor attonitus, corripit autem tempore æstatis, quum canis sydus oritur, bile per corpus commota. Statim igitur ipsum febres fortes tenent, & calor acutus, & à gravitate debilitas, & crurum ac manuum impotentia: maximè enim inutilia ipsi fiunt hæc membra, & venter turbatur, & quæ sedunt graue olent. Et tormen forte succedit. Sed & hæc patitur, si quis ipsum erigere velit, erigi non potest, neque oculis videre potest præ calore. Et si quis ipsum interrogat, præ dolore respondere non potest. Quum autem moriturus est, acutius videt, & loquitur confidenter, & bibere ac edere cupit, & si quis det quod edat, breui etiam animam emittit, si non euomuerit. Huic morbus hic iudicatur in septem, aut quatuordecim diebus. Multi verò perueniunt etiam ad viginti quatuor. Si igitur hos transferit, sanus erit. Nam in his diebus iudicatur, an lethalis sit morbus, aut non. Hunc quum ita habuerit, sic curato. In primis quidem diebus à balneo Medela. absteineat. Vngatur autem vino & oleo tepido, in lecto, & à cibis absteineat. Sorbitiones autem tenues frigidæ dato. Vinum autem bibat nigrum, austerum, si ipsi conducat: Sin minus, album, aquosum, austerum. Si verò sitis fortis premat propter calorem, potu aceruatim dato, euomere iubeto, bis aut ter hoc repetito. Et quum calor habuerit, lintea Quæ æstus leniatur. aqua frigida tincta apponito, qua parte se maximè ardere dixerit. Si verò horrorem habuerit corpus, frige factoria remittito. Hic quum doluerit, ab huiusmodi maximè dolore periclitatur, ne repente animam relinquat. Verum exhibere oportet ipsi doloris causa festinanter, eadem pharmaca quæ ei qui à pleuritide tenetur. Quum autem exsurrexerit, cibo & potu, & balneis quæ celerrimè refocillato. Morbus enim est difficilis, & pauci effugiunt. Alius typhos. Corripit Typhos alter. quidem hic morbus omni tempore, fit autem propter corporis humiditatem, quum cibos humidos, & potum multum, carnes combibunt, & fluidæ fiunt, ab his maximè fit morbus.

Hippocratis Liber

Incipit igitur febris, tertiana aut quartana, in principio fiēs. D
Et dolor fortis in capite consistit, Aliquando etiam in corpo
re intermittens. Et vomit saliuam, & frequenter eructat, &
oculorum regiones dolet, & facies albescit, & tumor in pe
des descendit. Quandoq; verò etiam totum corpus intume
scit. Et ad pectora, & ad dorsum aliquando dolor currit, &
venter turbatus est, & oculis fortiter tuetur, & saliuam mul
tam & spumofam expuit, & in faucibus detineri videtur, &
exasperat ipsas. Sæpe verò etiam inflāmātur fauces. Hic ubi
sic habuerit, & dolor ita presserit, & erectæ cervicis spiratio
fortis inciderit, quandoque derepente præ dolore animam
emittit, in septem diebus, aut quatuordecim. Multi verò vñ
que ad viginti quatuor dies durant. Sæpe verò etiam dere-

Medela. E
pouo quæ. pente morbus remittit, & ager sanus esse sibi videtur. Ve
rùm obseruare oportet donec quatuor & viginti dies præ
terierint. Si enim has effugerit, non ita valde moritur. Huic
quum ita habuerit, in primis diebus sorbitiones dare oport
et, farinam coctam, tenui melle affuso. Vinum verò dan
dum est nigrum, paulatim, prout voluerit temperatum. Cibi
autem ne exhibeantur priusquàm hi dies præterierint. Po
lypi verò in vino cocti edendi dentur, & iusculum sorben
dum. Et raphanidas multas edat, & nasturtij semen torrefa
ctum, molitū ac cribratū, vino nigro acerbo affuso bibat. Et
polenta tenuis modica manè bibēda detur. A balneo autem
abstineat, donec hi dies præterierint. Vino verò & oleo tepe
factis in lecto illinatur, & extergatur. Et fructus præoniæ gra
na decem in vino nigro cocta bidenda dato, & rapi probè
percocti succum sorbeat, caseo insulso conditum, & papaue
re, & sale, & oleo, & silphio, & aceto. Si verò etiam pharma
cum bibēdum dare volueris, cnidium granum dato. Et post
purgationem, farinæ coctæ & pinguis duas heminas exfor
bendas dato. Vinum autem bibat idem. Et ex pharmacis &
sorbitionibus ac potibus quicquid dederis profuerit, siue sin
gulatim, siue plura simul exhibueris. Atque sic celerrimè sa
num feceris. Morbus autem est grauis, & pauci effugiunt. A
lius typhos. hic quidem propter hoc fit. Quum bilis putrefa
cta ammixta fuerit sanguini, per venas & articulos, quum
Typhos
tertius. sanguis steterit, consistit quidem maximè in articulis. In
cumbit autem quandoque etiam in reliquum totum cor
pus

Apus & dolores acutos exhibet. & multi ex huiusmodi morbo claudi fiunt, quum bilis in articulis conclusa in totum callescit. Dolor autem intermittens, corripit per tres & quatuor dies. Hunc ubi sic habuerit, hoc modo curato. Dolo- **Medela.** re in corpore prævalente, tepefactoria facere & adhibere oportet, oleo prius illito. Quum autem remiserit, veratrum ipsi dato, toti corpori antea fomento adhibito. Postera die serum caprinum coctum bibendum dato, duorum cōgiorum mensura, ita ut in alterum cōgium mel affundas, & in alterum sal adicias, deinde poculis vicissim permutatis bibat, donec totū **Potio quæ.** ebiberit. Ad vesperam verò post purgationem, lenticulæ hæminam sorbeat. & betarum pinguium heminam, polëta inspersa ebibat. Et pulli gallinacei carnem, aut columbæ, aut turturis, aut ouiculæ, aut suis pinguem edat. Veratrum autē per sextum diem dato. & si alicubi in articulis tumor fiat, & discessus fieri nolit, cucurbita affixa sanguinem detrahito, punctura per acum triangularem facta in genua, si in genibus tumor fuerit. Verum nullum ex aliis articulis perpunxeris. Interpositis autem diebus cibum accipiat, panem maxime assatum. Mazam verò maximè oleo & melle subactam. Obsonia verò habeat, maximè quidem assatas carnes volucrum, non salsas: Sin minus, etiam coctas, conditas, verum sine caseo, & sesamo, & sale. Piscibus autem utatur carnosissimis, assatis eodem modo velut carnes: & cæctis origano conspersis, ac oleo ipsis affuso. Vinum autem bibat album, si conducat: aut si hoc non commodet, nigrum. & in deambulationibus se exerceat per diem, & post cœnā, & mane. Serum autem & lac pro tempore semper bibat. Si verò tibi visum fuerit, etiam asininum lac decoctum dato. Et si sanus fiat, in custodia ipsum esse oportet, ut ne à frigore & aestu lædatur. & cibis nō valde expleatur. Periculum est enim ne morbus reuertatur. hic itaque morbus si sic curetur, in sex mensibus sanatur. In tot enim mensium spatio iudicatur an mortalis sit, aut non, etiam si statim curetur. Nam morbus est gravis, & plerisque commoritur. **Typhos quartus.** Alius typhos. Fit quidem hic morbus in tempore pomorum, quū quis se fructibus mollis corticis, & foris nō lignosi, omnis generis repleuerit. Plerisque verò etiam ab his factus est talis morbus, ubi videlicet placenta- **Morbi hu-** rum, & liborum sesaminorū, & aliorū dulciorū ex ius causa.

Hippocratis Liber

melle paratorum, et se infatigabiliter expleuerunt. Mel enim **D** coctum aestuosum est, & venter adharet: postea quum coctum fuerit in ventre, effervescit: & venter derepente attollitur, & ardet ac dirumpi videtur. Deinde repente ventris profluuium succedit. & quum semel secedere inceperit, per multos dies purgatur. & multi post hanc purgationem sani sunt. Quum igitur sua

Medela. sponte purgari cessauerit, lenticum succi tres semicongios ipsum ebibere cogito, sale adiecto. post purgationem vero succi, ad vesperam, lenticulae frigidae non salsae hemina sorbeat: Multum autem silphij in ipsam deradat: & betae pinguis non conditae heminam, polenta inspersa. Vinum autem bibat nigrum, austerum, paulatim. Reliquo vero tempore eadem faciat. Et cibos accipiat panem exassiatum, & Mazam oleo & melle quam maxime **E** subactam. Primis autem diebus farinam edat coctam frigefactam, melle affuso. Vinum autem bibat nigrum, acerbum, & donec quieuerit morbus haec assumat. At qui ex fructibus morbo arreptus est, statim sentit, & tormem, & dolorem: & cibi secedere non volunt, & venter ipsius magnus ac durus est, & rigor ac febris habet. huic si quidem sponte turbatus fuerit venter, in viginti diebus ut minimum purgatur. Et quum purgari cessauerit, sanus statim erit. Si vero non fuerit purgatus, purgato ipsum hippophais succo, aut enidio grano. Ad vesperam autem eadem exhibeto, quae ei qui sponte purgatur. Postera die si febris habuerit, quietem habeat. Et de eodem vino in aqua frigidissima ipsi bibendum dato. Si vero febris non habuerit, victum utatur non humido, sed fortiore. Et deambulet coiectura iuxta cibos facta. Ab hoc morbo multis iam aqua intercus facta est. Et si tibi clysterem adhibere visum fuerit, eadem quae etiam hydropico per clysterem infundito. Si vero volueris, haec infundere potes. In aqua mulsae hemina, herbam thapsiae coquito, & sic infundito. hic hoc modo curatus

Typhos. celerrime sanus erit. Alius typhos. Fit hic morbus quum **quintus.** humor qui est in corpore, putrefactus fuerit, & magis quam opportunum est resiccatus. Fit igitur ager hoc morbo correptus, specie limpidus ac humectus, subpallidus, pellucidus, & vesicae urinae similis, verum non intumescit, sed tenuis & aridus est, ac debilis. Attenuantur autem in corpore maxime clauiculae, & facie fortiter gracilescit, & oculi valde sunt excavati. & haec quidem a morbo patitur. Color autem corporis niger

A niger est, causa verò hæc est. Quum bilis atra in venas, & ad cutem subierit, & postea calor successerit, necesse est à calore venas comburi ac resiccare, Quare sanguis è venis excedit. hæc igitur patitur. Hic tenuis fit, & fortiter gracilis. & oculis raro nictat, & muscas à stragulis venatur. Et grauitas ciborum maior est quàm quum sanus esset. & lucernæ extinctæ odore delectatur, & frequenter semen per somnum effundit. Sæpe verò etiã inter eundum genitura ipsi exit. huic quum **Medela.** sic habuerit, ventrem nigro veratro purgato, supernum videlicet: infernum verò scammonia succo. Post purgationem verò eadem quæ & aliis dato. & serum ac lac bubulum, aut caprinum pro tempore exhibeto. dato & lac asininum decoctum, ad purgationem.

B Hic ita curatus in duobus maximè annis sanus fit. Cibos autem quos vult assumat, & quàm maximè nutriatur, & deambulet coniectura ad cibos facta. hic morbus corripit maiorem viginti annis. Vbi verò corripuit, si non à principio morbi quis curatus fuerit, non desinit, nisi viginti anni præterierint, sed adhæret. postea ab aliquibus dum curantur decedit. Morbus autem grauis est. Voluuli porro vocatur **Voluuli.** hi morbi. sunt autem maximè ab his, Si hyemis tempore quis calido & humido victu vitur, & non deambulationibus se exerceat, respectu ad cibos factum. Verum repletus semper dormit, & deinde longum iter perficere cogatur, frigore sauiiente. Deinde riguerit sub ossa. hæc igitur patitur. Flatus in toto corpore oboritur. & color ipsius fit plumbiformis, & riget semper, ut etiã calida ipsi affusa, calida esse non videatur.

C Corpus autem ipsius dum lauatur, à calida desquamatur, maximè scrotum, & si digito corpus compresseris, impressionem facies, & notæ tibi apparebunt, velut in farina aqua subacta. Maximè autem in potibus impressionem perfert. Crura verò ipsius graua sunt. & si obambulet, tremit, & si ad accliuem locum iter faciat, vehementer anhelat, & vlnæ depedere videntur, & sitis urget noctu. cibi verò crudi secedunt quoscunque ingessit. Huic quum sic habuerit, fomento prius adhibito, eneorum bibendum dato, aut hippophais succum, aut cniidium granum. post purgationem verò, eadem dato quæ prioribus. Postera die lactis asinini cocti cõgium dato bis ebibendum. sale adiecto. Ad vespërã cœnet panem. Obsonium autem sem habeat, ouiculæ carnes coctas, & polypos coctos in vino

Hippocratis Liber

nigro, & iusculum sorbeat, & lenticulā habeat sic præparatā: D
hemina lentis coctā probè terito, deinde farinā ammisceto,
& silphium deraſum addito, & ſalem adiiçito, & acētū affun-
dito, & allium ad hæc ſimul coquito, & affuſa aquā bis aut
ter feruefacito, & cum rudicula vndiquaque expaſſa brachia
habente, ſimul ipſa agitato: deinde ablata frigeſacito. Sit au-
tem nō valde craſſa, & odoris gratia etiā pulegium vt ſimul
coquatur, adiiçiat. Intermediis verò diebus vomitus fa-
ciat per ſextū diem. Verū aliàs atq; aliàs ante vomitum, &
pharmaci potum, fomentū adhibere oportet. Et per tertiam
diem lauetur, ſi cōducatur: Sin minus, vngatur. Et deambulet ſi
ita potens fuerit, cōiectura ad cibos facta. & ſambuci, ac co-
nyzæ ſemper teneræ. folia cocta edenda dato. Sic enim cura- E
tus, facilimè deget, & morbus annum deſinet. Multis verò
iam ſanis factis, poſt duos annos morbus reuerſus eſt. Sed ſi
hoc contingat, eodē modo curetur. Si verò tertiu reuertatur,
tumor quidē nō ſuccedit. Tenuis autē fit & gracilis, incipitq;
à facie attenuari, & colore exalbescit magis quā prius. huic
quandoq; aqua intercuſ fit in vētre. Si igitur facta fuerit, ſe-
care ipſum nō oportet, moritur enim, ſed iſdem curare qui-
bus eum qui à ſplene aqua inter cutē laboret. hunc maximè
in principio curare velis, & ſic cito ſanū facies. Opus autem
habet morbus multa curatione. Eſt enim grauis. Alius vol-
uulus arcuatus. Hic maximè æſtatis tempore in paluſtribus
regionibus corripit. Magis autem ab aquæ potu. Multi verò
iam à tali morbo correpti ſunt, ex volutatione ad ſolē capi- F
tis dolore affecti. Verū ſimilia prioribus patiūtur, excepto
colore. Nā pallidus fit æger, velut malicorium. Et oculi ali-
quando morbo arcuato implētur. hūc vbi ſic habuerit, iſdē
curare oportet quibus priorē. Danda etiā in potu aqua à ci-
cere albo cocta, & cum vino eadē permixta danda eſt. Et ca-
put eius tetragono medicamento purgetur. hic minus quā
prior lethalis eſt, & vocatur voluulus arcuatus. Voluulus hæ-
matites. Reliqua quidē eadē patitur cum prioribus. Incipit
autē morbus autumnino fieri. Hæc verò in morbo accedūt. Ex
ore male olet à dentibus, & gingiuz diſcedunt, & à naribus
ſanguis fluit. Aliquando etiā ex cruribus vlcera pullulant, &
alia ſaneſcunt, alia emergunt. Et color niger fit, & cutis te-
nuis. Eſt autem ad deambulādum ac laborādum promptus.

Hunc

Malū hoc
redit.

Voluulus
ſecundus.

Curatio.

Voluulus
hæmatites.

- A** Hunc ubi sic habuerit, iisdem curato quibus priores, & hæc per Medela.
 clysterem infundito. Cucumeris sylvestris folia quinq; ter-
 rito, & mellis dimidiū heminae ammisceto, itēque olei he-
 minā dimidiā, & salis quantū vna manu cōprehēdere potes,
 & succi betarum heminas quatuor. Ad subpurgationē verò
 lactis asinini cocti heminas octo exhibeto, melle affuso. Bi-
 bat etiā bubulum lac pro tempore, per quadraginta dies. Bi-
 bat itē mane bubuli lactis duas heminas, tertia aquæ mulsæ
 parte ammixta, per intermedios dies. Hic morbus multa
 medela opus habet. Sin minus, non exit, sed cū homine mori
 tur. Vocatur autē voluulus hæmatites. Morbi crassi appel-
 lati. Ex crassis appellatis morbis, hi maximè fiunt. Quū pi- **Morbi cras**
B tuita & bilis mixta fuerint in corpore, fluunt in vētrem, & si.
 quum cōgregata fuerint in ventre, attolluntur, & sursum ac
 deorsum discurrūt, velut vnda. Et rigor ac febris corripit. Et
 dolor in capite cōsistit, & quū dolor circa viscera constiterit,
 suffocationē inducit. Aliquādo verò vomit pituitā acidam,
 quādoq; etiā salsam & postquam euomit, os amarū ipsi esse
 videtur. In lateribus autē rubores detinentur. Nā quum pi-
 tuita in ventre sit, sanguis à caliditate congregatus in latere
 allapsus est, & rubores in lateribus excitat. Et calor maximè
 latera occupat, ac costas. Et dorsum ipsius incuruū fit. Et quū
 maximè doleat, corporis contactum nō sustinet. Nā velut ex
 vlcere dolet. Et carnes præ dolore vibrantur, & testes cōtra-
 huntur. & in sedē, & in vesicā calor quidā ac dolor irruit, Et
 mingit crassum velut in aqua inter cutem. Et ex capite de-
 fluunt capilli, & pedes semper frigidi sunt. & dolor premit
 maximè latera, & dorsum, & collum, & ad cutē aliquid ipsi
 proserpere videtur. Morbus verò quandoq; vrget, quādoque
 remittit. In progressu autē magis assiduè premit, & cutis ca-
 pitis crassa ac rubicunda est. Hic vsq; ad sex annos talia pati
 perseuerat. Postea & sudor multus diffunditur, & male olet.
 Sape verò etiā per somnum semen effundit. Quod verò per
 coitum emittit, subcruentū ac subliuidū prodit. Hic morbus **Medela.**
 fit propter calorē solis, & aquæ potū. proinde hunc quum sic
 habuerit, cneoro aut hippophae, aut cnidio grano dato, sub-
 purgato. dato etiā lactis asinini cocti heminas octo bibēdas,
 melle affuso. postera die post purgationem, eadem quæ aliis
 exhibeto. Primis autē diebus ex iisdem nutriatur, ex quibus
 E 5 etiam

Hippocratis Liber

Morbus
crassus se-
cundus.

etiam is qui ab aqua inter cutē correptus est, & deambula- **D**
tionibus se exercent, si ita potens fuerit. Si verò præ febribus
impotens fuerit, & cibos edere nō poterit, lenticulæ sorbitio
ne utatur. potu verò vino nigro quam maximè austero. Hic
morbus maximè corripit autumno, & tēpore fructuū pomo-
rum. hic si quidē curatus fuerit in sex annis, satis est: Sin mi-
nus, adhæret vsq; ad decē annos. Cū multis verò simul mo-
ritur, si nō statim curatus fuerit. Alius crassus morbus. Ta-
les crassi morbi à bile fiunt, quum bilis in hepar influxerit,
& in capite constiterit. hæc igitur ager patitur. hepar intum-
escit, & præ tumore ad septū transversum expāditur. & do-
lor statim in caput irruit, maximè verò in tēpora. & auribus
non acutè audit. Sæpe verò etiā oculis nō videt, & horror ac **E**
febris corripit. Atq; hæc quidē in principio morbi ipsi fiunt,
intermittentia quādoq; valde, quādoq; minus. Quāto autem
magis morbus progressus fuerit, tātō amplior dolor in cor-
pore existit, & pupillæ oculorū disperguntur ac habetantur,
& si digitum oculis admoueris, nō sentit, eo quòd non videt.
Quòd autem nō videt ex hoc cognoueris, quòd admozo di-
gito nō niſtat, & floccos de stragulis tollit, si quos viderit, pe-
diculos ipsos esse putās: & quum hepar magis ad septū trās-
uersum expassum fuerit, delirat. & ob oculos ipsi obuersari
videntur reptilia, & omnis generis peregrinæ feræ, & mili-
tes armati pugnātes. & ipse sibi inter ipsos pugnare videtur,
& talia loquitur velut qui videat pugnas & bella geri, & in-
uadit, & minatur, si quis ipsum exire vetet, & si surrexerit, **F**
crura eleuare non potest, sed concidit, & pedes ipsius frigidi
sunt. Et quū dormit, exilit à somno, & timet quum insomnia
viderit horrēda. Cognoscimus autē hoc, quòd ab insomniis
exilit ac timet, postquam resipiscit. Nā insomnia denarrat,
& ea quæ corpore fecit, & quæ lingua loquutus est. Atq; hæc
quidē sic patitur. Quādoq; verò etiā per totā diē ad noctem
voce priuatus iacet respirās spiritū multū aceruatū. Quum
autem delirare cessauit, statim euestigio resipiscit, & si quis
ipsum interroget, rectè respondet, & cognoscit ac intelligit
omnia quæ dicūtur. deinde rursus post modicū tēpus, in iisdē
afflictionibus iacet. hic morbus accidit maximè in peregri-
natione. Et si quis alicubi per desertā viā iter faciat, & timor
Medela. ipsum ex spectro corripiat. Fit etiā aliter. huic quū sic habue-
rit,

Arit, veratri nigri obolorū quinq; pondus, in vino dulci bibendum dato. Aut hæc per clysterē infundito. Nitri Aegyptij magnitudinem tali ouilli terito, & mellis optimi cocti dimidiā heminā, & olei dimidiā heminā, in mortario ammisceto, & aquæ à betis coctis heminas quatuor per noctē sub dio expositas addito: aut si volueris, pro beta lac asininū coctū ammisceto. & hæc mixta per clysterē immittito, siue febris habeat, siue nō. Sorbitionibus autē vtatur, ptisana cocta, melle affuso. Bibat etiā mel & aquā & acetū, simul permixta, donec iudicatus fuerit morbus. Iudicatur autē in quatuordecim diebus ad summū, siue lethalis est, siue non. Multis autē iam huiusmodi morbus sedatus, rursus rediit. Si igitur redierit, periculū est ne æger pereat. Iudicatur autē morbus in septē diebus, an lethalis sit, aut nō. Si verò has effugerit, nō valde moritur, sed morbus in plerisq; curatus decedit. Quū autē desuerit morbus, diæta bona vtatur, quiete ingerens quæ venter suscipiat, & non cōburantur, neq; ventris profuuiū succedat. Ambo enim hæc periculosa esse videtur. Lauetur autē quotidie, & deābulet post cibos modicè. Veste verò induatur leui ac molli. & pro tempore anni lac & serū bibat, per quinq; ac quadraginta dies. Hæc si fecerit, celerrimè sanus erit. Morbus autē grauis est, & multa cura opus habet. Alius morbus **Tertius** crassus. Fit à pituita putrefacta. Quòd autē putrida est vnde **crassus morbus vnde.** fit, ex hoc manifestū est. Eructat ab hac quod odorem habet, velut si quis raphanides edisset. Incipit autem fieri talis morbus à cruribus, deinde ab his ascēdit ad ventrē. Et quū in ventre cōstitit, rursus decurrit ad viscera. Et quū in his cōstitit, fugit & vomitū facit, pituitā acidā subputridā educens, & vbi euomuit, nō habet seipsum neq; sibi cōstat æger. Deinde angustia fit circa viscera. Quandoq; etiā in caput derepente dolor incūbit acutus. Et auribus acute audire nō potest, neq; oculis videre, præ grauitate. & sudor multis diffunditur male olens, & maximè quū dolor habuerit, & morbū leuat. Color autē ipsius arcuatus apparet. hic morbus priore paulò minùs lethalis est. Huic quū ita habuerit, ventrē purgato, deorsum quidem, per hippophaes. sursum autē, per veratrum. & caput tetragono purgato. & quū à veratro purgatus fuerit, postera die lacte asinino cocto subpurgato. Tertia deinde caprino cocto, & similiter quarta ac quinta. Reliquis verò viginti

Hippocratis Liber

viginti diebus, lac bubulum crudum, aut etiam caprinū da- **D**
 to, tertia aquę mulsę parte ammixta. Bibat autem lactis con-
 gium. Post purgationem verò deorsum versum, eadem phar-
 maca exhibeantur, quę hydropicis. Reliquo tempore quum
 lac bibit, cœnet panem exallatū. Obsonium autem habeat,
 ex piscibus scorpium, aut callionymum, aut cuculū, aut squa-
 tinę frustum cum condimentis coctum. ex carnibus, ouillas,
 aut gallinacei pulli coctas. Vinum bibat album, si conducat:
 Sin minus, nigrum austerū. deinde post cibum deambulet,
 vt ne frigeat. Si quidem igitur cōducant, cibos huic dato qui
 dicti sunt. Si vero non conducunt, sorbitiones dato ptisanę
 aut milij. In hoc morbo si ager triginta dies trāsgressus fue-
 rit, sanus fit. hi enim iudicant an lethalis sit, aut non. Est au- **E**
 tem morbus grauis. Alius morbus crassus. Fit hic morbus
 à pituita alba. Congregatur autem in ventre, quum febres
 diuturnę corpus occuparint, Initium hic morbus à facie su-
 mit, & intumescit facies. deinde descendit in ventrem, & vbi
 in ipso constiterit, ventrem magnum attollit, & corpus velut
 à labore lassatur, & in ventre grauitas inest, & dolor fortis,
 & pedes tument, & si pluuia in terram effundatur, pulueris
 odorem non sustinet. Si verò in pluuia steterit, & terram odo-
 ret, derepente cadit. Hic morbus interquiescens, longiore
 tempore quàm prior occupat, & tardius decedit. Curare ve-
 rò ipsum oportet iisdem quibus hydropicum, fomētis vide-
 licet & pharmacis, & eduliis ac laboribus. Hic morbus per
 sex annos maximè obtinet. Deinde decedit tēporis progres- **F**
 su, si probè curetur, etiam si non in principio fuerit curatus.
 Est autem morbus difficilis, & multa cura opus habet. Co-
 xendicum morbus ex his maximè causis fit plerisq;. Si quis
 diutius in Sole versetur, & coxendices fuerint calefacti, & hu-
 mor qui est in articulis, à calore fuerit resiccatus. Quòd autē
 id quod resiccatur, condensatur, ac constringitur, hoc mihi
 signum est. Aeger enim articulos vertere aut mouere non po-
 test, præ dolore qui est in ipsis, & eo quòd verticula sunt com-
 pacta. Dolet autem maximè lumbos, & verticula ex obliquo
 iuxta coxendices, & genua. consistit autem dolor multò tem-
 pore in inguinibus simulque coxendicibus, acutus & æstuo-
 sus, & si quis ipsum erigat, aut transmoueatur, præ dolore ei-
 lat quàm maximè potest. Aliquando etiam conuulsio succe-
 dit,

Quintus
 crassus mor-
 bus vnde.

Curatio
 quæ.

Coxendicis
 dolor.

- A** dit, & rigor ac febris, fit autem & à bile, & pituita, fit item à sanguine, dolor cōsimilis velut ab omnibus morbis, & rigor ac febris aliquādo corripit debilis. Cæterum eum qui à Sole hoc morbo correptus est, sic curare oportet. Corpus ipsius fo-
mento humectetur, & cibi ac potus, & alia quæ exhibentur, tepida ac humida præbeantur. Atque hæc omnia cocta, cibo vtatur maza molli, vino dulci non subacta. Vinum bibat album, aquosum, & corpore quietem habeat, & quamuis impotens fuerit vt exsurgat, tamen modicè singulis diebus deambulet, & ne frigeat, & non multa aqua lauetur, & quum tibi bene habere visus fuerit, & corpore humidus esse, leni fomento vehementer foueto. Magis enim remittit, & condensatio-
B nem ex articulis humectat ac relaxat. Deinde postera die cnidium granum bibendum dato. Si verò non profuerit. hæc per clysterem infundito, cumini heminā dimidiam terito, & colocynthidem integram paruum ac rotundam in mortario tundito ac cribrato, & nitri rubri Aegyptij minæ quadrantem torreto, ac terito. Atq; hæc in ollam conicito, & olei heminam, mellis heminam dimidiam, vini albi heminam, & succi betæ quantum videbitur affundito, & donec bonā crassitudinem habere visa fuerint coquito. Deinde per linteum excolato, & si mel non simul coquere velis, mellis Attici heminam ipsis ammisceto. Si verò Atticum nō habeas, optimi aliās cocti heminā in mortario ammisceto. Si verò crassius fuerit hoc infusum, de eodem vino affundito, iustæ crassitudinis respectu habito, & per clysterem infundito, deinde usque ad dies tres purgari sinere oportet. Si verò pluribus diebus purgetur, bubuli aut caprini lactis heminas tres ebibendas dato. deinde betas pingues non salsas, condimentis conspersas, edendas exhibeto. Ex hoc morbo multi claudi facti sunt. Si verò à bile morbus fiat, veratrum deorsum purgans
ip̄i bibendum dato, aut scammoniæ succum, post huiusmodi verò purgationem, succi ptisanæ melle affuso, heminas duas exorbendas dato, postera verò aut tertia die adhibito fomento, lacte asinino cocto subpurgato. At vesperam autem pinguis betæ heminas duas edat, polenta inspersa. Vinum bibat album, aquosum dulce, & nunc, & post pharmaci purgationem. Si verò à pituita agrotet, cnidium granum, aut hippo-
phaes, adhibito prius fomento, bibendum ip̄i dato, post purgatio

Medela.

Biliosus
morbus.

Pituitosus.

Hippocratis Liber

Sanguis-
nus.

Tetani
tres.

Curatio.

gationem verò, easdem sorbitiones ac potus exhibeto. Itém- **D**
que lactis potionem. Inter mediis autem diebus, diætā quā
leuissima vtatur. Et si quidem ab his vtilitatem sentit, bene
est: Sin minus, ipsum vrito multis ac profundis crustis inu-
stis, in ossibus quidem partibus, per fungos. In carnosus autem,
per ferramenta. Si verò à sanguine agrotarit, fomentum ad-
hibeto, & cucurbitam affigito, & venas in poplitibus secato.
Si autē tibi visum fuerit, etiam cnidium granum ipsi biben-
dum dato. Diætā verò quā siccissima vtatur. Vinū autem
ne bibat. Si verò bibere velit, quā minimum & aquosissi-
mum dato, & modice deambulare iubeto, aut si potens fue-
rit, plurimum. Conducit autem & à pituita agrotanti talia
facere. Si verò stare non possit, in lecto ipsum quā frequen- **E**
tissime circumferre oportet, à quacunq; causā agrotarit, per
omnia similiter, vt ne intus chartilago concre scat. Si verò
concreuerit, & articuli conglutinati fuerint, omnino necesse
est hominem claudum fieri. Et si clysterē adhibere volueris
ei qui à sanguine agrotat, quo sanguinem ac pituitam à co-
xendicibus abducas, hæc infundere oportet. Salis pugillo tri-
to, olei heminam, & de ordeï decocto duas heminas ammi-
sceto, atque sic infundito. Si enim sic curationem feceris, ce-
lerrimè sanum facies. Morbus autē grauis valde est ac diu-
turnus. Tetani tres. Si ob vulnus tetanus siue distentio fiat,
ager hæc patitur. Maxillæ conglutinantur, & rigent, & os
aperire non potest, & oculi lachrymantur ac detrahuntur, &
dorsum conglutinatum riget, & crura flectere nequit, neque **F**
manus, neq; spinam. Quum autem lethalis fuerit, potum &
cibos quos prius accepit, aliquando per nares reddit. Hunc
quum sic habuerit, fouere oportet, & pinguius vntum, ad
ignem nō ita prope calefacere, & tepesfactoria illito corpori
adhibere. Et absinthiū, aut lauri folia, aut hyosciami semen,
& thus terito, deinde vino albo diluta in ollam nouam infun-
dito, & oleum pari cum vino mensura affundito, & cum his
calefactis largè calidis corpus ac caput illinito. Postea super
pelliceum indumentum reclinatum, ita vt pars ad quam fuit
animalis caro sursum vergat, mollibus ac puris stragulis ac
vestimentis contegito, quo vehemēter exsudare possit. Aquā
verò mulsam tepidam, si quidem hanc bibere poterit, per os
exhibeto. Si verò non poterit, per nares infundito. Vinum
autem

- A** autem album quàm iucundissimū ac plurimum bibendum dato. Hoc quotidie facere oportet, donec sanus fiat. Est autem morbus grauis, & statim curatione opus habet. **Opi-**
sthotonos. In distentione retrorsum fiēte (opisthotonum **tonos.** vocant) alia quidem eadem æger patitur. Fit autem, quum tendines qui sunt retrò in cervice ægrotarit. Aegrotat autē, aut ab angina, aut ab vna, aut locis circa tonsillas suppuratis. Aliquando etiam à capite febribus succedentibus, conuulsio succedit. Iam verò etiam à vulneribus. Hic trahitur in posteriorem partē, & præ dolore circa dorsum ac pectora, eiulat. Hic conuellitur vehementer, vt vix detinere possint ipsum præsentēs, ne e lecto excidat. Hic sæpe in die dolore affligitur, **Curatio.** sæpe etiam leuius degit. Huic sic habenti eadem exhibere oportet, quæ priori. Morbus autem adhæret ad summum diebus quadraginta. Si verò hos euaserit, sanus fit. **Tetanus**
tertius. Alius tetanus. Hic tetanus minus lethalis est quàm priores. Fit autem ab iisdem. Multi verò etiam ex casu in partes posteriores, à morbo correpti sunt. patitur igitur æger hæc. Totum corpus conuellitur. Aliquando verò quacunq; corporis parte id contigerit conuellitur, & primum quidem obambulat. Postea temporis progressu in lectum cadit. & rursus remittit & dolor, & conuulsio. & si surrexerit, & fortassis ad paucos dies obambularit, postea rursus in iisdem afflictionibus iacet. Atque hæc patitur ac transmutat, per multum tempus, & si quid comedit, non secedit infra, nisi difficulter, atque hoc combustum. At in pectoribus hæret cibus, & suffocatio-
Medela. nem inducit. Hunc si iisdem curaueris quibus priores, celerimè sanum facies. clysterem verò ex ptisana cocta tenui, ac melle adhibeto.

HIPPOCRATIS

COT LIBER DE VIRGI-

NVM MORBIS, IANO

CORNABLO MEDI-

CO PHYSICO IN-

TERPRETE,

PRIN



RINCIPIUM sit mihi cōpositio-
nis eorum, quæ perpetua sunt in ar-
te medica: Non enim possibile est
morborum naturam cognoscere (si
quidem artis est inuenire) nisi quis
nouerit naturam in indiuisibili, ex
qua in principio discreti sunt: pri-
mum de morbo sacro appellato, &
de attonitis siue syderatis, & de ti-

moribus. ex quibus adeò fortiter pauet homines, vt delyrēt.
& dæmones quosdam videre putent, ipsis infestos, quandoq;
nocte, quandoque interdiu, aliquando vero vtroq; tempore.
Postea ab huiusmodi spectris multi iam se strangulauerunt, E

Virgines
quæ percel-
lantur.

plures autē mulieres quàm viri. Est enim muliebris natura
animi magis deiecti ac imminuti. Caterum virgines nubi-
les & maturæ viro, hoc magis patiuntur, vnā cum mensium
descēsu, antea non valde hinc afflicte. Postea enim sanguis in
vteros confluit, velut effluxurus. Quum igitur osculum exi-
tus non fuerit apertum, sanguis autem amplius influxerit,
propter cibos & corporis augmentum, tunc sanguis non ha-
bens effluxum, præ multitudine resilit ad cor, & ad septum
transuersum. Quum igitur hæc repleta fuerint, cor fatuum
fit, deinde ex fatuitate torpedō, postea ex torpedine delyrīū
apprehendit. Quemadmodum quum aliquo longo tempore
delidente, sanguis ex coxis ac femoribus depressus, in tibias

Quid pedu
torporem
discutiat.

ac pedes torporem inducit. A torpore autem, pedes ad iter fa-
ciendum impotentes fiunt, donec sanguis ad seipsum reuer-
tatur. Reuertitur autem celerrimè, quum steterit in aqua fri-
gida, quæ vltra malleolos madefaciat. Atque hic quidem tor-
por facilè cedit. Citò enim propter venarum rectitudinem
refluit. Et locus corporis non est periculosus. At ex corde &

Causa fu-
roris.

lepto transuerso tardè refluit. Venæ enim oblique sunt, & lo-
cus periculosus, & ad delyrīum ac insaniam paratus. Quum
enim hæ partes repletae fuerint, & horror cum febre ingruit,
erroneas febres appellant. his autem sic habentibus præ acu-
ta quidem inflammatione, insanit: præ putredine verò, cla-
mat: præ caliginositate autem, timet ac formidat: præ com-
pressionē verò circa cor, strāgulationes parat: præ sanguinis
autem malitia, animus mœrens ac anxius malum attrahit.
Sed

Planetes
febres.

A Sed & alium horribiliter compellat, & in puteos profligare ac incidere iubet, & strangulari, tanquam meliora sint hæc, & omnem vitæ utilitatem excedentia. Aliquando verò sine ipse & tris ac phantasmatis, voluptas quædam adest, ex qua mortem, velut bonum aliquod, amat. Postquam autem resipuit homo, mulieres tum alia multa, tum pretiosissimas muliebres vestes Dianæ consecrant, à vatibus id iubentibus deceptæ. Caterùm curatio ut hinc liberentur, est sanguinis detraçtio, si nihil fuerit quod impediatur. Ego verò iubeo virgines quum huiusmodi patiuntur, quàm citissimè viris cohabitare. Si enim conceperint, sanæ fiunt. Si verò huiusmodi non affuerint ipsis, simul cum pubertate, aut paulò post corripiuntur, si non viro nupserint. At verò ex mulieribus viro iunctis, steriles magis hæc patiuntur.

Quæ Diana darent. Furoris me dela.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE NATURA


MVLIEBRI, IANO CORNARIO

MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*



C E MVLIEBRI natura ac morbis hæc dico. Maximè quidem numen in hominibus causam esse. postea verò naturas mulierum, & colores. Nam quæ superalbidæ sunt, humidiores sunt & fluidiores. Nigræ verò duriores acerbioresque ac adstrictiores. Quæ verò vini colorem referunt, medium quid inter utrasque habent. Sic autem & in ætatibus contingit. Iuenculæ enim humidiores sunt, & multo sanguine plerunque refertæ. Aniculæ verò sicciore, & modicum sanguinem habentes. Mediæ autem, medium quiddam inter utrasque habent. Oportet autem eum qui hæc rectè tractare velit, primum quidem ex diis ordiri. Deinde mulierum naturas discernere, itémque ætates, & tempora, & locos, in quibus-
F cunque

Deus potissimus author & causarum humanarum.

Medici minus.

Hippocratis Liber

Humoris a
quatici co-
gnitio &
medela.
Primus lo-
cellorum
morbus.

Stercus bu-
bulum.

Cum vteri
hepar pe-
tunt.

cunq; degunt. Frigidi enim loci, fluidi sunt. Calidi verò, sicci **D**
& stabiles. Initium autem faciam ab humido secundum na-
turam. Si aqua intercus in vteris oboriatur, menses paucio-
res ac deteriores fiunt. Deinde repente deficiunt, & venter
intumescit, & mammae siccae fiunt, & reliqua male habet. Et
in ventre sibi habere videtur. & ex his cognoscet, quod aqua
inter cutem laborat. Sed & in ore vterorum significationem
de se præbet. Tangentibus enim gracile apparet: & calor &
aqua ipsam corripit. Quum autem tempus amplius proces-
serit, dolor in venterem, & lumbos, ac laterum mollitu-
dinem occupat. Hic morbus maxime fit ex abortu. Accidit
item ex aliis. Quum sic habuerit, calida lauare oportet, & re-
pessatoria adhibere, donec dolor sedetur. pharmacum autē **E**
deorsum purgans bibendum dare oportet. post pharmacum
verò, vteros bubuli stercoreis fomento fouere, & postea medi-
camentum cum cantharide præparatum apponere. Et inter-
positis tribus diebus, id quod cum felle paratur. Vna ve-
rò die interposita, per triduum aceto infuso colluatur, & si
quidem vter mollis & vacuus fiat, & febres sedatæ fuerint,
& menses prodeant, viro condormiat. Sin minus, rursus ea-
dem facito, donec menses prodeant. & aliquibus subdititiis
vtatur. Intermediis autem diebus crethmi corticem bibat,
& prœnæ grana nigra, & sambuci fructum, ieiuna in vino,
& Mercurialem quam plurimam edat, & album coctum
& crudum. & cibis mollibus, & polypis, ac aliis mollibus vtatur.
Si verò pepererit sana erit. Si vteri ad hepar accesserint, **F**
muta de repente fit, & dentes conserit, & color niger fit. pati-
tur autem hæc derepente dum sana est. Est autem huiusmo-
di affectio virginibus maxime antiquis, & viduis, quæ iuue-
culæ sunt & pepererunt, ac viduæ manent. Quum sic habue-
rit, depulsionem per manum infra facta, sub hepate aut sub
præcordiis, fascia deligato, & aperto ore vinum odoratissi-
mum infundito. Et graecolentia naribus adhibeto ac suffi-
to. Sub vtero verò bene olentia. Postquam autem resipuerit.
pharmacum infra purgans bibendum dato. & lac asininum post-
ea bibendum exhibeto. Deinde vteros odoratis foueto, &
medicamenta cum buprestis præparata apponito. Postridie ve-
ro Netopon vnguentum. Intermissis autem duobus diebus,
vteros cum odoratis colluito. Et postridie pulegium apponi-
to.

A to, die verò vna interposita, aromata suffito. Atque hæc quidem viduæ facito. Virginē autem vt viro cohabitaret persuadeto, ad vteros verò nihil adhibeto, neque pharmacum bibendum dato, verum conyzam & castoreum in vino ieiunæ exhibeto, & caput odoratis ne vngat, neq; odorata olfaciat.

Si vteri prociderint, & foras egressi fuerint, calor habet **Cum vteri** maximè pudenda, & sedem. Et vrina paulatim destillat, ac **prociderint.** mordet, hæc patitur si ex partu progressa viro cōdormierit.

Quā autē sic habuerit, myrti baccas & loti ramēta, in aqua coquito, & aquā per noctē sub dio exponito, & pudenda cum eo decocto quā frigidissimo perfundito, & eadē trita pro cataplasmate adhibeto, postea bibens aquā lentium, & mel, **B** & acetū, donec vteri fuerint eleuati, vomat. Et lectum à pedibus altiore facito, & graueolentia sub pudenda suffito, odorata verò sub nares. Cibis verò vtatur mollissimis ac frigidis. Et vinū aquosum album bibat, Ne lauetur autē, neq; cum viro dormiat. Si verò penitus ex pudendis exciderint, **Cum exci-** dependent velut scrotum. Et dolor corripit imum ventrem, **derint.** & lumbos, & quum tempus processerit, ad locum redire nō volunt. Morbus autē corripit, quum ex partu progressa vteros doluerit, aut cum viro in puerperij purgatione cōcubuerit. Quum verò sic habuerit, frigefactoria ad pudenda ap- **Medela.** ponere oportet, & quod foris est depurgatū, & cum vino nigro, in quo malum punicum coctum est, ablutum, intro de- trudere. Deinde mel & resinā mixta infundere. Decumbat **C** autem supina pedes sursum extentos habens, postea spōgias imponito, & ex lumbis deligato. Quum autē sic habuerit, à cibis quidem abstineat, potu verò, quā paucissimo vtatur, donec septem dies præterierint, & si quidem sic ingredi voluerit, bene habet: Sin minus, summas vteri oras deradito. calefacito, abluito, ac cerato picato illinito, & alligata ad scalam muliere, scalam iuxta caput pulsato, & vteros cū manu intrudito, postea crura ipsius alternatim colligato, & sic per diem ac noctem finito, & modicum ptisanæ succum frigidū dato, aliud verò nihil. Postera die decubenti cucurbitā quā maximam ad coxendicem affigito, & multo tempore trahere finito, postquam verò detraxeris, ne scarificato, sed reclinatam finito, & nihil aliud quā succū exhibeto, donec septem dies præterierint. Si verò sitiat, aquam dato frigidam **F 2** quā

Hippocratis Liber

quàm paucissimam. Vbi verò septem dies præterierint, cibis D
mollissimis ac paucissimis vtatur. Si verò ventrem exonerare
velit, decumbens exoneret, donec quadraginta dies præ-
tereant, postea surgat, & parcissimè obambulet, & ne laue-
tur, sed intra pudendum graueolentium suffitum admittat,
Cum locel & modica edat. Si vteri adglutinati fuerint, incumbunt. &
li hæserint. si contigeris, videbis locum durum sub lateris mollitie, & do-
lor corripit imum ventrem, & laterum mollitudinē, & lum-
bos, & in crure dolor irruit, eaque extendere non potest. Sæ-
pe verò etiam suppurantur, & linamentis inditis curatæ ac
Medela. fluentes moriuntur, si nō vsseris, aut secueris. Quum autem
sic hahuerit, pharmacū infra purgans bibendum dare oportet,
& multa calida lauare ac fouere, & quum recens lota aut E
fota fuerit, iubere vt admota manu, cum digito os vterorum
abstrahat, & myrrham caloniam suffiat, rosaceo affuso. Bi-
bat autem pæoniæ grana nigra quinque, castorio ammixto,
in vino odorato, & in coxam sanam decumbat, & apponat
Baccarim vnguentum, aut oleum album ad coxam sanā, &
edat allium plurimum, & crudum, & coctum, & succum sor-
beat, & cibis mollibus vtatur, postquam autem dolor quie-
uerit, abduces euntem super sanam coxam, postea verò fo-
mentum ex vrina adhibeto, lauro inspersa, & à fomento cy-
claminū apponito, postera die lota suffitus ex aromatis ad-
hibeatur. Caterum ex hoc morbo maximè steriles fiunt. Si
Si os vtero complicatum fue- rit. Si
Curatio. rit. Si os vtero complicatum fuerit, verò prodeant, pauci ac prauis sunt. Et vbi cum viro coit, do-
let, & dolor imum ventrem tenet ac lumbos. Et si contingat
digitis & os requirat, non est manifestum. Quum sic habue-
rit, vrina humana foueatur, & post fomentum lenticulæ de-
cocto lauetur, & postquam lota fuerit, vteri vnguento Aegy-
ptio foueantur. Et si odor ad nares ascenderit, spes est ipsam
sanam fore. Et quum dormire voluerit, Aegyptium oleum
in lana subdat. Postera verò die consideret an magis corre-
cti sint vteri, postea odoratis foueto, & purgatoria quæ non
mordeant subdito. & post subdititia medicamēta, pari men-
sura aceti ad aquam ammixta eluito. Quum autem menses
Cum vteri coxæ dicem petunt. prodierint, ieiuna & illota, & suffita, cū viro coeat. Maximè
verò ex hoc morbo steriles fiunt. Si vteri ad coxam decur-
rerint, & menses non procedunt, & dolor ad imum ventrem
accedit,

A accedit, & ad lateris molliciem. & si digito cōtigeris, deprehendes os in coxa. Quum ita habuerit, calida lauato, & allia plurima edēda dato. Et lac ouillum purum bibat, & postquā lac purum exhaustit, fomento adhibito, postea pharmacū infrā purgans exhibeto. Quum autem purgata fuerit, rursus vteros foueto, ex fœniculo & absinthio permixtis. Vbi verò recens fota fuerit, os cum digito abstrahito, & scillam apponito, & interposita die postea id quod præparatur cum narcissi no adhibeto. Si verò tibi purgata esse visa fuerit, Netopon apponito. Et postridie rosaceum vnguentum. Cæterum prima mensium decurrentium die ab apponendo cessato. postera verò incipito vbi defecerint. At in mēlibus si quidem sanguis eruperit, satis est: Sin minus, cantharides quatuor bibat, pedibus & alis ac capite reiectis, & pæoniæ grana nigra quinque, & sepia oua, & apij semen, cum vino. Et si dolor habuerit, & vrinæ stillicidium vexarit, in aqua calida desideat. & aquam mulsam bibat aquosam. Si verò à primo non fuerit purgata, rursus bibat donec fiat. postquam autem purgatio decurrit, ieiuna cum viro coeat. In purgatione verò mercurialem edat, & polypos coctos. & cibus mollibus vtatur. Liberabitur autem à morbo, si in vētre habuerit. Si ex partu non fuerit purgata, tumet venter & crura, & rigor ac dolor inum ventrem, ac lumbos tenet. Quandoque etiam ad viscera ascendit, & animo linquitur. Atque hæc patitur incipiente morbo. progressu verò temporis, cauæ faciei partes rubescunt. Quum igitur sic habuerit, fomento vteris adhibito, cyclaminum apponito. Bibat autem medicamentū cum trda præparatum, donec fluxus fuerit commotus. Ad os verò vterorum, adipem anserinum illinito, & myrrham, & resinam tepidam. & quā maximè deambulet. & ante cibum Mercurialem coctam edat, & allium ac porrum. & brassicæ succum sorbeat. & cibus mollibus vtatur, & magis marinis. & calida lauetur. A pinguibus autem & dulcibus abstineat. donec sana fiat. Si vteri pituita impleti fuerint, flatus oboritur, & menses albi pituitosi superueniunt. Aliquando etiā sanguis tenuis pelliculis plenus. & præ humiditate cum viro coire non vult, & pallida ac tenuis fit. Interrogare igitur ipsam oportet, an quod fuit mordeat & exulceret, & si non mordeat, pronunciare à cerebro fluxū esse. Si verò mordeat,

Curatio.

Cum puerpera non purgatur.

Curatio.

Cum vteri pituita opulentur, quid accidat.

Curatio.

Hippocratis Liber

à ventre. Si quidem igitur à ventre fuerit, à lenticulæ deco- D
cto vomat. Deinde veratro purgato. postea idem in nares
immittito. Postquam autem superior venter tibi purgatus
esse videbitur, pharmacum infrà purgans bibendum da-
to. A cibis autem pinguibus ac dulcibus abſtineat. Acres
autem exhibeantur, velut commodi, niſi pudenda fuerint
exulcerata, præſtant autem frigidi. Et modicè lauetur,
non tamen calida, neque caput. Ieiuna verò bibat hyperi-

Cum vteri cum, ſemen apij, ſaluiam in vino aquoſo. Quum autem
penitus in- ceſſauerit fluxus, cum ſucco groſſorum eluito, & poſtea acer
flāmantur. bis colluito, Eſt autem morbus grauis. Si vteri inflam-
quid agen- mati fuerint menſes omnino non prodeunt, aut prauī & pau-
dum. ci. Et quum ieiuna eſt, vomitus ipſam corripit. Vbi verò E
quid ederit, vomit cibos, & dolor imum ventrem ac lumbos
habet, & animi deliquium inuadit. Venter autem aliquādo
durus, aliquando mollis eſt, & inflatur ac magnus fit. & pu-
tat ſe in ventre habere. Si verò contigerit, plenitudo illa va-
cua fit. Huic uſque ad decimū menſem tumor paulatim au-
geſcit, velut in ventre habenti. Vbi verò decem menſes præ-
terierint, venter aqua impletur, & umbilicus eminet. Et ſi di-
gitum admoueris, os vteri gracile & collapſum comperies.
Et vbi menſes apparuerint, pauci ſunt & prauī. Et clauiculæ
ac collum attenuantur. Et pedes intumeſcunt. Quum igitur
ſic habuerit pharmacum infrà purgans bibendum dato. &
ad vteros quæ purgant & non mordent apponito. Et poſt ap-
poſitionem vteros eluito, pari menſura aceti acerrimi ad a- F
quam ammixta & Mercurialem edat, & ſuccum eius farina
inſperſa, vbi cocta fuerit abſorbeat. Morbus autem eſt peri-

Vteri cryſi culofus. Si ignis ſacer eryſipelas dictus in vteris oboriatur,
pelas. tumor fit à pedibus exorſus, & ad crura & ad lumbos proce-
dens. Quum autem tempus ampliùs proceſſerit, intumeſcit
etiam venter, & rigor ac febris corripit, itēque debilitas.
Præ dolore verò, quieſcere nō poteſt, ſed iactat ſeiſam, Do-
lor autem ex imo ventre aſcendit ad lumbos. Poſtea ſurſum
vergit ad præcordia, & pectora, & caput. Et mori ſibi vide-
tur. Quum autē remiſerit, torpor occupat manus. Aliquādo
etiā inguina & crura, & poplites. & liuida fit, & modico quā-
doq; tempore ſibi meliùs habere videtur. Deinde rurfus ea-
dē patitur. & corpus puſtulis impletur. & facies rubeſcit, &
ſitis fort

- A** fitis fortis tenet, & fauces siccae sunt. Hic morbus si pragnati fiat, moritur. Sin minus curata sanatur. Quum igitur sic habuerit, adhibere oportet, si dolor habeat, frigefactoria, & ventrem turbare. Et si quidem in ventre habeat, cibis ac potibus vtatur, à quibus fixus non corrumpitur. Si verò non secedat, clysterem adhibeto. Si autem in ventre non habuerit, pharmacum bibendum dato, & cibis paucissimis vtatur mollissimis ac frigidis, & Mercurialem edat, & sambucum, & neque falsa, neque pingua, neque acria, velut est origanum, aut thymus, aut ruta. Postquam autem calor & strangulatio remiserit, & tumor non fuerit sedatus, medicamentum fortius infra purgans postea bibendum dato. Morbum autem hunc paucae
- B** effugiunt. Si vteri prater naturam hient, & menses plus quam oportet prodeunt, viscosioresque ac frequentiores, & genitura non manet intus. Et si digito contigeris, os hians comperies, & febris ac rigor & dolor, inum ventrem & lumbos corripit. Hic morbus à fluxu sanguinolento corripit. fit autem quum menses suppressi derepente eruperint. Huic quum dolor maximè habuerit, tepefactoria apponito. Et cum remiserit, vteros foueto, & pharmacum infra purgans bibendum dato. Et quæ non mordent subdito, & post subdititia medicamentum, cum acerbis colluito, & quam minimum lauato. Cibis autem siccissimis vtatur. Si verò his factis sana non fiat, pharmacum bibendum dato, à quo sursum ac deorsum purgetur. Et quum menses moti fuerint, & quum quieuerint,
- C** eiusdem modi victum exhibeto. Morbus autem lethalis est. Si vteri ad medium lumborum processerint, dolor inum ventrem habet, & crura contrahuntur, & quum aluum exonerat, dolores acutiores fiunt, & stercus cum vi prodit, & vrina destillat, & animo linquitur. Quum sic habuerit, fistula ad vesicam alligata vteros sufflato, & fomentum adhibeto. Aut multo calido lauato, & male olentia sub pudenda suffito. Sub nares autem odorata. Quum autem dolor cessarit, lenticular decocto prapotato, pharmacum sursum purgans bibendum dato, à quo venter moueatur. postquam autem vteri ad locum suum redierint, medicamentum infra purgans bibendum exhibeto, & postea lac bibendum dato. Postea fomento ad vteros adhibito ex vino, medicamenta cum lauro preparata immittito, & apponito quæ non mordent, ammixto aceto.

Curatio.

Cum vteri
prater natura
hiant.

Curatio.

Cum vteri
lumbos penet-
runt.
Medela.

F 4

Postea

Hippocratis Liber

Postea aromata suffito. Caterum steriles & claudae sunt ex D
profluuiū hoc morbo. Quum fluxus albus obortus fuerit, velut vrina
album.

& lateris mollitudinē, & tumores sunt crurum ac manuum,
& caua eleuantur, & oculi humidi sunt, & color arcuatus ac
albus fit. Et quum iter facit, anhelat. Morbus autem fit, si vbi
natura pituitosa est, febricitarit, & bilis commota purgata
non fuerit. Si quidem igitur venter acuerit, ventris proflu-
uia sunt. Si verò ad vteros vertatur, fluxus fit. Postquam igi-
tur vteris profluuium habuerit, papaueris albi ac rubri cor-

Medela. ticem pari pondere, & spinæ fructum in vino diluto terito,
& polenta recenti inspersa bibat. Si verò velis, malicorium E
calido cinere torrefactum ac tritum ex vino bibat, pari po-
lenta ac farina inspersa. Minimum verò lauetur. Cibis au-
tem vtatur quàm siccissimis ac frigidis. Vbi verò fluxus
quieuerit, pharmacum bibendū dato, à quo superna purgen-
tur, & lac asininum bibat. Postquam autē infra purgata fue-
rit, bubulum lac bibat, ad dies quadraginta, si poterit mera-
cum, sub dio per noctem expositum, quarta aquae parte am-
mixta. Vesperi verò vbi ebibit, alicam sorbeat. Quum au-
tem decem dies fuerint transacti, lactis & aquae decimā par-
tem detrahito. Quātum autem detraxeris, tantam tepidi re-
cens multī portionem additam bibat. postridie verò duas
portiones, vt in decē portionibus pro modico diluto sit me-
racum, & ad quatuor dies bibat. Dum autem decimā par-
tem detrahit, etiā de sorbitione amplius addat. Postquam F
autem quatuordecim dies transegerit decimam lactis par-
tem bibens, postea tertiā aquae partem affundens, ad dies de-

profluuiū aliud. cem bibat, & cibis vtatur, & sic fiant omnes dies quadragin-
ta. Quum conceperit & vterum ac partus gestarit, ea quae
natura sterilis est, primū quidem menses deficiunt, & pau-
ciores fiunt, & tempus in quo prius fiebant, transmittunt.
Postea derepente multi fiunt, & puri ac fortes, & si quidē se-
mel facti fuerint, de cetero secundum rationem in ventre
habet. Sin minus, & primū fiunt & iterum atque iterū in
mense, postea ex seipso desinet fluxus, pallidāque ac tenuis
fit. Pharmacum igitur & sursum & deorsum purgās biben-

Medela. dum dare oportet. Et lac asininum postea bibendum aut se-
rum. Postea adhibito fomento, vteros medicamēto quod nō
mordeat

A mordeat purgato. Deinde cum aceto colluito. Postea aromata suffito. Hæc autem facito ut prima mēsum die facta sint. Et ne sit illota & impasta, cyceonem insulsum crassum bibens, & aromatis suffiatur, netopo affuso & vnguento rosa-
 ceo. Postea cum viro coeat. Si acetabula pituita plena fuerint, menses quidē bene succedunt, & in ventre habet. Cor-
 rumpit autē fætum vbi fortior factus fuerit. Non enim retinere potest, sed abrupitur. Cognoueris autem hoc modo. Humida sit, & mucosum ac viscosum defluit, & nō mordet, & in mētribus vbi à fluxu purgari cessauerit, per duos ac tres dies muci ab vteris prodeunt. Hanc grossorum succo eluito, & collutione per acerba postea bis aut ter facta. de cætero
B apponito id à quo pituita purgatur, & mollia fomenta adhibeto. Et post subdititia appolita, pari mēsurā aceti ad aquam ammixta eluito, & in mētribus aromata suffito. Postea im-
 pasta & illota cum viro dormiat. Quum menses occultati fuerint dolor imum ventrē tenet, & onus incumbere ipsi videtur, & lumbos dolet, ac laterum mollitudinē. Quum verò ad præcordia vteri allapsi fuerint, suffocant, & vbi frequēter acida euomit, admodicū tēpus melius habet. Dolor autem & ad caput & ad collum procedit. Postquam igitur allapsum parant, aut allapsi sunt, tepesfactoria adhibeto, & graucolentia suffito, infra autem odorata, & castorium bibendū dato, & conyzam. Vbi verò deorsum prociderint, infra graucolentia suffito. sub nares autem odorata. Sedatis autē doloribus, pharmacum bibendū dato. Et lac asininum postea bibendum. Deinde succum à quo vomat dato, & ad nares apponito. Postquam autē purgaueris, fomento vteris adhibito ex his quæ cum lauro præparatur, id quod ex narcisso præparatur apponito. Et tribus interpositis diebus, fomento adhibito, id quod ex cantharide præparatur apponito, & postera die adipem anserinū. postea intermissis tribus diebus, collutione cum aceto parata eluito. In purgationibus autē mercuriale ante cibos edat, & cibis mollissimis vtatur, & acria edat. Et bis in die calida lauetur. Si verò menses non fiant, vbi hæc opportuno tempore feceris, cantharides bibendas dato, & postquam prodierint, ieiuna & illota, ac suffita, cum vino dormiat. Quum in ventre habēs, fætum menstruum aut bimestrem corruerit, & ad perfectionem gestare non
 F s poterit,

Cum acetabula pituita implentur.

Medela.

Menses cum non decurrunt.

Medela.

Cum prægnans partum menstruum perdit.

Medela. poterit, & tenuis præter naturam fiat. Huius vteros purgare D
oportet ac corpus pinguefacere. Nō enim prius fœtum per-
ferre poterit, quā vteri ipsius crassi fiant, & robusti eua-
dant. Si verò crassēfacta fuerit mulier præter naturam non
Crassa car non concipiant. concipit in ventre. Nā omentum multū ac crassum incum-
bens vteros deprimit, & genituram non suscipit. Hanc atte-
nuare oportet, & pharmacum infra purgans bibendū dare,
& ad vteros apponere quod purget ipsos, & flatus inducat.

Cū os vul- Si verò os vterorum durum fiat, aut ceruix, digito intro-
uæ dures- missō id cognosces. Itēmq; si ad coxā fuerint auersi. Quum
cit. sic habuerint, nihil acre adhibeto. Si enim os exulceraueris,
Medela. vbi inflammatum fuerit, periculū est ne penitus sterilis fiat.
Verū apponito quæ non mordent, à quibus purgetur. Si E
mulierem parere non potentem purgare velis, & fuerit bi-
liosa aut pituitosa. Cognosces autē vtrum horum sit, si are-
na substrata quum menses fiunt, in sole sanguinem super-
fundas, ac siccare linas. Si enim biliosa fuerit, supra arenam
sanguis pallidus erit. Si verò pituitosa, velut mucus erit. Et
Cum men- sanē vtrum horum fuerit, infra purgato, & ad vteros subdi-
ses non de- titia apponito. Si menses omnino non fiant, si quidem præ
currunt. dolore id cōtingat, primum ventrem infra purgato, deinde
medicamentum à quo sanguis ex vteris purgatur apponito.
postea intermissa die vna aut altera, rursus id à quo sanguis
purgatur apponito. Reliquo verò tēpore corticem crethmi
Cum hu- in vino tritum bibat. Si humidius fuerit os vterorū quā
**midius fue-

oportet, acria apponito, quo morsum perreptet, & inflam- E
matum valde durum fiat. Si verò induratū fuerit, acria ad-
hibeto. Mordentia enim saniem diffundunt. Deinde mollia
apponito. Sed & ad alios morbos non minus apponito. Si
puerperæ vteri in coxam incubuerint, aut ad lateris molli-
tudinem, ad sanam coxam oleum Aegyptium album, aut
baccarim vnguentū apponere oportet, & in sanam coxā de-
cumbat, & præniæ grana nigra quinq; bibat, & fructus sam-
buci, conchæ testam maiorem, & castorij magnitudinem fa-
bæ in vino. postea lota suffiatur, & potibus ac cibis mollibus
vtatur, & mercuriali, & acribus omnibus, excepto raphano
ac cepis. Quum suffocarint vteri, graueolentia omnia suf-
Strangula- fire oportet, bitumen videlicet, sulphur, cornu, lucernarium
tio vuluæ. funiculum, phocæ adipem, castorium. Odorata verò subter
puden**

Apudenda. Si verò puerperæ inflammati fuerint vteri, ar- **Cum vteri**
 det, & suffocatio habet. Quum autem sic habuerit, muscum **inflammā-**
 marinum tenuem tritum super linteolo extentum pro cata **cur.**
 plasmate adhibeto. postea crudam ordeaceam farinam, & **Medela.**
 cinerem sarmentitium, ac lini semen, oleo & aceto affuso co-
 quito, donec velut farina subactæ massa fiat. Deinde quàm
 calidissima ferre potest imo ventri imposito. Si verò fixi **Cum vteri**
 fuerint vteri, lentem & mentam multam in aceto coquito, **compacti**
 vt vaporem inde in os trahat, & nares adhibeat. & graueolē **fuerint.**
 tia suffito. & mercurialem edat, & in succo eius farinam co-
 ctam sorbeat. Quam celerrimè autem & priusquam dolor
 occupet, exhibere oportet pharmaca, quæ vteros à dolore le-
 uant. & cibos per aluum secedentes assumat. Si verò venter
 calefiat, clysterem adhibeto. Si ex partu inflammati fuerint **A partu**
 vteri, solani succum in pudenda infundito. & vbi hic calidus **inflamma-**
 factus est, alium infundito, Si verò hic nō fuerit, lentisci aut **tio vuluæ.**
 rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succum expressum infunde.
 & quod in medio huius est tenerimum, dera sum longa for-
 ma inde. postea cerusam aqua tritam & lana exceptam ap-
 pone. Si verò horruerit, tolle. Si mulier ab vtero debilis sit, **Debilitas**
 & bilis ipsam suffocet, & opus sit ipsam leuiter purgare, & **à partu.**
 dolorem sedare, peucedani succū trium cyathorū mēsurā bi-
 bendū dato. Si in lumbis aut lateris mollitudine fuerint vte **Cum lum-**
 ri, & trāsmouere velis, sulphur & bitumē terito, & melle co **bi & ilia ve**
 cto affuso, glandulā crassam facito, & in sedē indito. & vteri **xantur.**
 si sicci fiant, hæc quàm celerrimè apponito. Mulieri si vteri
 sicci fiant, & ad pudenda promineant, & inguina dura fiāt, &
 calor in pudēdis insit, cancerari incipit. Quū sic habuerit, cu **Cū vulua**
 cumeris syluestris internā partem aridam terere oportet, & **durefcit.**
 aquæ hemina affusa, in sedē immittere, & purgari sinere do-
 nec purgetur. Quum autē mulieri pharmacum dederis, am-
 misce ad pharmacū ea quæ vteros purgant, & quæ expellūt.

*Potiones, & subdititia medicamenta quæ se-
 cundas educere, & menses detra-
 here possunt.*

CAntharides quinque; auullis alis & pedibus ac capite, de-
 inde tribulos ad mare nascentes vnā cū radice mēsurā
 quanta est cōchæ testa terito. & anthemi pallidā siue luteam
 internā

Hippocratis Liber

internam partem siccam tritam, conchę testam addito, & seminis apij tantundem, & sepię ova quindecim & in vino dulci diluto bibenda dato. & quum dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat. Aliud. Ranunculi foliorum & floris triti Aegini stateris pōdus, in vino dulci bibat. Quum autem dolor habuerit, cicer album & vuas passas in aqua coquito. & perfrigeratam bibendā dato, & vbi vrinę stillicidium vexarit, in aqua tepida desideat. Aliud. Adianti staterē Aeginæum, in vino albo pari aqua ammixta, bibendū dato. Aliud. Violę albę semē quantum tribus digitis apprehendi potest, in vino albo eodē modo temperato, bibendum dato. Aliud. Leucoij nigri radicem, in vino eodem modo sumat. Aliud. Crinanthemū E quod in domibus nascitur, eodem modo misceto ac bibendū dato. Aliud. Anchusę foliorum pugillos duos, in vino albo æquali aqua ammixta, bibendos dato. Aliud. Chamę leonis radicem, velut veratri potionē, derafam in vino albo, aqua pari mensura ammixta, bibendā dato. Aliud. Brasicę & porri succū, ad vtrunq; succi silphij obolis tribus ammixtis, & vino albo cum pari aqua bibendum dato. Aliud.

Oluias albas priusquam oleum insit compunctas siccato, postea tulas & cribratas ac in vinum iniectas bibēdas dato. Hoc & menses detrahit, & secundam expellit. Aliud. Dictamni Cretici obolū in aqua bibendū dato. Et si hoc in potu dato, secundam eiicere non potes, sambuci succo cocto immisso foueto, & cantharidē apponito. Hoc etiam fœtum F expellit. Quum autē morsum intulerit, auferat, & rosaceo vnguento tinctum apponat donec elapsa fuerit. Aliud. Populi nigre creticę grana nouem trita, in vino bibenda dato, Cum hoc etiam abluatur: si difficulter pariat. Aliud. Conyze testam conchę maiorē cum porri succo diluito, & netopi testam conchę maiorem ammisceto, & hæc in vino bibenda dato. Aliud quod menses detrahit. Peucedanum & panaces, & pręnię radicē, in vino bibenda dato. Aliud quod fœtum mortuum & secundas eiicit. Violę & portulacę semen contundito ac misceto, & in vino albo veteri exhibeto. Aliud quod menses detrahit. Seminis violę albę quantum tribus digitis apprehendi potest, & stercoris capriini pillulas quinq; aut sex, in vino odoratissimo permisceto, & biben

A & bibenda dato, vbi prius fomentum ex aqua & oleo immiseris. Adhibeto autē fomentū in sella, & vbi hæc bibit, quā celerrimē lotam reclinato. Brassicam verò edēdam exhibeto, & succum eius sorbendum. Aliud. Seminis violæ albae quantum tribus digitis apprehendi potest, in vino bibendum dato, & in aqua calida desideat. Si verò id non habeat, fœniculi radices contusas, in aqua mulsā tepida macerato, & exhibeto. Aliud. Fraxini grana decem, in vino bibenda dato. Hoc in omni vterorum morbo commodū est, & valde ciet vrinam. Aliud. Succum silphij magnitudine erui, & nasturtij semē terito ac ammisceto, & in vino aut lacte canino bibenda exhibeto. Hoc etiam fœtum expellit. Aliud fœtum eiiciens. Ranūculum herbam, & parum elaterij, in aceto temperato mixta bibenda dato. Aliud ad idem.

Brassicæ caulem tenerū, extremitate ex netopo illita, affricato. Aliud si menses non fiant. Terebinthi fructum tritum, in vino & aqua dilutum ac excolatum, ieiunæ bibendum dato, & calida lauetur. Aliud menses ciens. Rubra præoniæ grana, in vino ieiunæ bibēda dato. Aliud ad puerperij purgamenta purganda. Fœniculi semen, & crethmi corticem, & thus, in vino bibenda dato, Aliud. Tædam quā pinguiſsimam in vino coquito, & præoniæ grana quinque in vino terito, & heminae quadrantem bibendam dato.

Aliud. Mercurialis semen & folia, in vino bibenda præbeto. Aliud. Præoniæ grana nigra quinque, & sepia oua in vino bibenda dato. Ad omnē puerperam. Ad irionem & polentam, oleum affunde, & coctū sorbeat, & cibis quā mollissimis vtatur. Aliud. Scammoniam in lacte muliebri tritam, lana exceptam appone. Aliud. Mercurialis folia trita in linteo subde. Aliud. Herbam artemisiā tritam, & vnguēto rosaceo imbutam appone. Aliud. Albam radicē tritam ac rosaceo vnguento subactā appone. Aliud.

Præoniæ radicē melle, vnguento rosaceo & Aegyptio subactam, in lana subde. Aliud. Farinam non lotam eodem appone. Aliud. Lolij & tritici farinam, simul melle subactas, in lana subde. Aliud quod menses & puerperij purgamenta purgat & aquā ducit. Radicis struthij tusi triti quantum tribus digitis apprehendi potest, melle subactum appone. Nascitur autem in Andro in littoribus. Aliud ad vteros depurg

Hippocratis Liber

depurgandos. Mercurialis contusa, & cucumeris sylvestris modicū, in vino tere, & melle subacta appone. Aliud. Pilos leporis cōbustos, ac tritos in vino, & melle cocto & aqua subactos, bibēdos dato, & aqua calida lauetur. Aliud partus purgatoriū. Polentā crassius fresam dimidij hemichœnicis mēsurā, in aqua heminis quatuor coquito, & vbi efferbuerit, bis aut ter sorbendā dato. Aliud purgās puerperij purgamenta. Sambuci folia coquito, & oleo affuso bibenda dato. Edat & brassicas coctas, & porrū. Aliud purgās vteros. Rhœis folia & irionē terito, & in vino, polēta inspersa, bibēda dato. Aliud. Misys obolos duos tritos & vino subactos apponito. Aliud.

Lini semē tritū, vino subactū apponito. Aliud. Trifolij semē in vino bibēdū dato. Si verò ad lūbos vteri incubuerint, **E** polypos coctos edat, itēmq; assatos, & vinū bibat nigrū, odoratum, meracū quā plurimū. Aliæ potiones, medicamēta subdititia ac purgatoria. Rhœ rubrū, & vinacea, in aqua coquito, & farina tritici recētis in aquā inspersa, bibendā dato.

Aliud. Farinā in aquā iniectā bibēdā dato. Aliud. Mora rubi siccato ac terito, & polēta recēti ammixta, amborū acetabuli mēsurā, in vino odorato & aquoso, bibat. Aliud. Terram nigrā famiā in aqua tritā, tali magnitudine bibēdā præbeto. Aliud. Hypocistidē in vino bibendā dato. Aliud. Mala punica vinosa exsuccato, & polētā cum succo, subactā siccat. Postea tritā in vino bibendā dato. Aliud. Baccas myrti nigras tritas in aqua diluito, & polēta inspersa, bibendas exhibeto. Aliud. Mali punici dulcis assati drachmā, in vino **F** tritā bibendā dato. Aliud. Triticū & ordeū torrefacta, trita, & ad farinā redacta, in vino nigro bibenda dato. Aliud. Mali punici dulcis internā partē, pari aqua ammixta bibendam dato. Aliud. Cicutæ quantū tribus digitis apprehēdi potest, cū aqua bibendū dato. Aliud. Farinæ tritici recētis, & gypsi, æquales partes mixtas in aqua bibēdas dato. Aliud. Mali punici dulcis corticē ac coriū, in vino bibēdū dato. Aliud, si sanguis ex vteris fluat. Viticis folia in vino nigro bibenda dato. Aliud, ad fluxū ac dolorē. Rosmarini radicē in vino bibendā dato. Alias itē potiones ad vteros habes. Cedri fructus, seseli, cuminum Aethiopicum, casia fructū, iuniperi baccas, miliū lentisci fructū, nigellā, dauci radicē ac semen. Aromata verò, thymū, thymbrā, ericē, hypericum, papauer album

A album crethmi radices ac semē, malux radices mercurialis semen, & folia, vrticæ semē, saluiam, populū nigrā, dictamnū, pseudodictamnū, amomum, cardamomū, heleniū, aristolochiā, caltorium, adiantū, dracontiū, peucedanū, rutæ folia ac semē, apij semē, fœniculi semen, hipposelini semen & radices, hippomarathri semē & radices, struthij semen & radices, hyslopum cilicium, irionē, præoniam, panaces. Quodcunq; horū volueris, & cū altero permixtū, & per se in vino aut aqua prout volueris coctū, exhibeto bibendū. Cōmoda sunt & purgatoria, & quæ dolores sedant. Malux radicem in aqua dato. Aliud. Præoniæ semen modico cedrino oleo ammixto, in vino bibendū dato. Et vterorū dolores sedabis.

B Aliud, quum vteri suffocarint. Castoriū & conyzam in vino albo bibenda dato. Si verò ad nares accesserint, enidij internam partē albā, melle ammixto, naribus illinito. Aliud sedans dolores. Malux radicē, & fœniculi ac crethmi corticem, ex aqua bibenda dato. Aliud. Stellas marinas nigras, & brassicam misceto, & in vino odorato bibenda præbeto.

Aliud. Myrrhæ obolos tres, coriandri parum, resinam, præoniæ radicē, cuminum Aethiopicū, hæc trita in vino albo diluta, leuiter tepefacta bibenda dato. Aliud, quod secundas expellit. Ricini radicem bibendam dato. Aliud, si ad cor allapsi vteri strangularint. Viticis & præoniæ semen, in vino bibendum dato. Apposititia acria sanguinē ducentia. Cantharidas quinque thuri ac myrrhæ ammisceto, & glādulam

C longam magnitudine gallæ formato, & lana obuolutā linteo albo circumdato, & vnguento Aegyptio albo aut rosaceo madefactam apponito. Aliud. Buprestim si parua fuerit, totam, si magna, dimidiā, ad prædicta ammisceto, & eodem modo apponito. Si verò mollioribus vti velint, buprestidas in vinum mitte, & cuminū Aethiopicum, & seseli, ac anisum addito ac feruefacito. ad decem verò buprestidas, acetabulum olei ammisceto, reliquis omnibus æquali portione acceptis. Ammisceto etiā myrrhæ, ac thuris parum. Ex hoc pugillum accipito. & velut priorem glādulā subdito. Aliud. Nigellam terito cū melle, & vino subactā in glandulam redigito, ac vtere velut superiore. Aliud. Philistium eodem modo præparatum apponito. Aliud. Telephium eodē modo præparatū subdito. Aliud. Anemonæ folia trita linteo excipito

Hippocratis Liber

excipito, & myrrha parū ammisceto, & eodē modo vtor. D

Aliud, quod sanguinem ducit. Glandem Aegyptiam terito, & susinum vnguentum quod est in terra Aegyptia addito, & aqua diluta, ac lana inuoluta apponito. Aliud bilē purgans. Cucumeris syluestris medullā tritam, ac melle subactam, & ad glandis formam redactam apponito. Aliud. Colocynthis syluestris internam partem terito, & melle subactam eodem modo subdito. Aliud. Elaterij potiones quatuor, adipe anserino & caprino, & misy ammixto, in glādulam formato, & in linteo apponito. Aliud Thlaspi tritum, & melle imbutū apponito. Aliud. Foliorū ficū sanīē deradito, & elaterij potiones duas ammisceto, & nitri tantūdem, mellēque subacta apponito. Aliud, si vteri inflamma- E
ti fuerint. Nitrum rubrum, ficus pinguedinem internam, vtriusque pares portiones tritas, & ad gallæ magnitudinem eformatas subdito. Aliud. Cumini folia cum vino trita, in linteo subdito. Aliud. Radicē albā terito, & melle affuso feruefacito, & glādulā inde factā subdito. Aliud. Succū sulphij, & ficū, mixta in glādē formata apponito. Aliud. Cucumeris syluestris semen tritū eodē modo. Aliud. Fel tauri, nitrū rubrum, netopō, cyclaminū terito, & de singulis gallæ magnitudinē, de cyclaminoverò plurimū, melli ammisceto & apponito. Aliud. Cyclamini caput purgatū in aqua tritum ac linteo illigatum apponito. Aliud. Myrrham, salem, cuminum, fel tauri, hæc melle subacta ac linteo excepta subdito. Aliud. Grana cnidia triginta deligito, & tria F
Indici pharmaci oculorum, quod piper vocatur, & alia tria de rotūdis. Hæc tria in vino veteri trita, & oleo dulci diluta ac subacta, lanāq; excepta subdat, & vrina eluatur. Aliud. Tithymali succum melle subactum, ac linteo exceptū apponito. Aliud. Scillæ radicem longitudine digitorum sex sumito, & duobus digitis lana obuolutis subdito. Alia mollientia, à quibus aqua purgatur, & sanguis ac menses decuntur, si non diuturni fuerint, & os vteri mollietur. Narcissinum, cuminum Aethiopicum, thus, absinthium, cyperum, aliorum quidem singulorum æquales portiones sumito, narcissini verò partes quatuor. Hæc trita & in glādulā efformata, linteoque crudi lini excepta apponito. Aliud. Cyclaminum magnitudine tali, & florem aris magnitudine fabæ terito,

A terito, melle subigito, & efformatam hinc glandulā subdito.

Aliud. Pulegium, mirrham, thus, fel suillum, melle subigito, & in glandulam efformata subdito. Alia acerba. Rhoem vino nigro subactum apponito. Aliud. Cnicum eodem modo praparatum subdito. Aliud. Loti ramenta eodem modo apponito. Aliud. Rhoem melle ammixto subdito.

Alia mollientia. Sulphur, adipem, vitellum oui, farinam, melle subige, & tepesacta in lana subde. Aliud. Pinguetudinem anseris, adipem ouillum, ceram albam, resinam vnguentum rosaceum, tenui linteo excepta appone. Aliud.

Medullam cerui & adipē liquefacito, & in lana apponito.

Aliud. Adipem ouillum aut caprinum, & oui candidum B rosaceo vnguento subactum, ac lana exceptum apponito.

Quæ ad eluendos vteros infunduntur. Grossos hybernos in aquam missos ad lentum ignem coquito, & oleo ad decoctum affuso eluito. Deinde verò malicorium, & gallam, & loti ramenta, in vino acerbo coquito, & hoc excolatum infundito. Aliud. Fecem vini combustam in aquam mitte, & postea cum aqua collue. deinde malicorio, myrthi baccis, foliis rhois in vino coctis, vinum excolatum infunde. Aliud.

Lentisci, saluix, hyperici folia, in vino nigro coquito, ac infundito. Aliud. Si quid in vteris fuerit exulceratum. Butyrum, thus, myrrham, resinæ parum, infunde. Aliud. Porrum in aqua coquito, & excolatam aquam ad vinū ammixtam infundito. Aliud. Sambuci fructum, anisum, thus, myrrham, vinum sumito & horum succum infundito. Aliud.

C Brassicam in aqua coquito, & in brassicæ succo, mercuriale coquito, modico lini semine adiecto, & postea excolatū infundito. Aliud. Myrrhæ acetabulum, thus, seseli, anisum, semen lini, netopum, resinā, mel, pinguedinē anseris, acetū album Aegyptium, horum singulorum æquales portiones terito, & in vini albi heminis duabus diluito, & postea tepida infundito. Aliud. Mercurialem in aqua coquito, ac excolato, & myrrhæ acetabulum, thuris, netopi, singulorum æquas portiones ammisceto, ac tepida infundito. Aliud. Saluiam & hypericum in aquam coquito, ac infundito. Aliud. Sambuci fructum, & lauri baccas, æquis portionibus in vino coquito, deinde vinum infundito. Aliud. Pulegium in aqua coquito, & oleo ad aquam affuso immittito. Aliud. Pinguetudinem

G

dinem

Hippocratis Liber

dinem auferis, & resinam, colliquefacta infundito. Aliud. **D**

Butyrum, oleum cedrinum modicum, cum melle liquefacto, & tepida infundito. Aliud. Cyperum, iuncum rotundum odoratum, calamū aromaticū, pari portione myrrhæ ammisceto, & cum his Sisymbrium in vino coquito, ac infundito. Aliud. Semen apij, anisi, fœelis, nigellam, in vino coquito ac infundito. Aliud. Cedrum creticam in vino coctam infunde. Aliud. Bryoniam albam & myrrham, in aqua diluta infunde. Aliud. Argenti florem cum vino & aqua infunde. Aliud. Elaterij potiones duas aqua dilutas infunde. Aliud. Cucurbitas siue colocynthidas syluestres duas, in vini aut lactis cocti heminis quatuor madefacito, excolato, ac infundito. Aliud. Cucumeris syluestris medullam palmi parui magnitudine, in aquæ heminis quatuor coquito, & melle ac oleo affuso infundito. Aliud. Radicis thapsiæ duas potiones, & mel ac oleū, in duabus aquæ heminis diluito ac infundito. Aliud. Veratri duas potiones in duabus aquæ heminis tepidæ infundito. Aliud. Thlaspiæ acetabulum melle admixto, in duabus aquæ heminis diluito, ac tepidè infundito. Aliud. Cucumeris syluestris magnitudinem palmi parui, in aquæ heminis quinque coquito, & melle affuso infundito. Aliud. Grana cnidia sexaginta, oleo & melle diluta infundito. Aliud. Si natura pituitosa fuerit. Cneorij potionē tritam in aquæ mulæ hemina Aeginea diluito, ac infundito. Aliud. Si biliosa fuerit, Daphnes potionem odoratā illius drachmæ pondus, scammoniaæ **P** potionē, terito & in aquæ mulæ, aut aquæ vix passæ hemina Attica diluito. Aliud. Daphnoidis potionem eodē modo, & si biliosa fuerit, hæc infunde: Si verò pituitosa, grana cnidia electa, & succi rithymali potionem infundito. Similiter etiam cneoro, & peplo, utrisque his uti oportet. Immitto autem cum infuso non ampliore quàm duarum heminarum. Suffitus porro sunt hæc contusa. Gallam suffito.

Aliud. Ramenta loti ad oleæ folia sicca cōtusa misceto, & oleo subacta suffito. Aliud. Prunas subiicito, & ordeï paleis humidis inspersis suffitum facito. Aliud. Super amphoræ oleariæ operculo stœben incendito. Aliud. Cupressi ramenta suffito. Aliud. Scammoniam, myrrham, thus, vnguento affuso suffito. Aliud. Bitumen, & ordeï paleas
misce

A misceto, ac addita pinguedine phocæ suffito. Aliud. Fraxinum, cupressi ramenta, cyperi radicem, vnguento rosaceo subacta suffito. Aliud. Calamum, cyperum, bryoniam, muscum, arboreum, anij semen, anisum, simul mixta & vnguento rosaceo subacta suffito. Aliud. Resinam siccam cineri feruido inspersam suffito. Aliud. Cinamomū, myrrham, cassiam, paribus singula portionibus suffito. Aliud.

Crocum ammixta myrrha, & musco, æquali cum croco portione suffito. Aliud. Calamum, cneorum, crocum, folia rosarum rubra suæque lentia trita & siccata ad crocum ammisceto, & styracem dimidia croci portione addito. Hæc trita mixta & siccata, melle cocto modico subigito. Horum

B verò omnium suffitus sit oboli Attici pondus. Suffiantur autem super stercore bubulo. Formetur autem stercus velut acetabulum olearium, habeatque fundum tenue, & sit siccum. Ignis autem sit sarmentitius, in quo stercus iaceat, & ex illo mulier insidens contexta suffiatur. Aliud. Galbanum, resinam, mannam, vnguento rosaceo subacta suffito.

Aliud. Panacis & cupressi ramenta, vnguento Aegyptio albo subacta suffito. Aliud. Cinamomum, nardum & myrrham vnguento rosaceo imbuta suffito. Aliud. Violæ albæ semen, cedri ramenta, & galbanum, melle subacta suffito. Aliud. Stercoris caprini pilulas, & leporis pilos, pinguedine phocæ subacta suffito. Aliud. Coaguli phocæ pelliculam contusam ac tritam, & spongiam, & muscum

C arboreum, trita simul mixta, atque phocæ pinguedine excepta suffito. Aliud. Stercus caprinum, & pulmonem phocæ, accedri ramenta suffito. Aliud. Stercus bubulum, cedri ramenta, & bitumen suffito. Aliud. Spinæ Aegyptiæ fructum, & cedri ramenta, & myrti siccae folia. Hæc trita & vnguento molli subacta suffito. Multa verò aromata in vnguentum iniicito. Aliud. Vinacea tusa trita, & cedri baccas, & resinā pinus, simul mixta & passo cocto subacta suffito. Fomenta. Stercus bubulum contusum ac cribratum, aceti dimidia mensura, & decocti erui dimidia adiecta, leniter pro fomento adhibeto. Postquàm autem fomentum adhibueris, lenticulæ decoctum bibendum dato ac reuocandum. Et farinam sorbendam, ac vinum insuper bibendum. Postridie verò granum cnidium deuorandum exhibeto. Se-

Hippocratis Liber

quenti die quod urinam ciet, hoc scilicet. Ciceris albi partes **D**
 duas tritas, vix passæ tertiam partem, affusa aqua ad dimi-
 dias coquito, deinde excolatam aquam per noctem sub dio
 exponito, & postridie bibendam dato. Et de cætero saluiam
 ac lini semen, polenta ad ambo hæc ammixta, bis per diem
 in vini diluti heminis quatuor dato. Aliud. Olei heminas
 dimidias tres, foliorum sambuci manus plenæ mensuram.
 Hæc cocta in craterem calidum fundito, & per testas calidas
 immixtas fomentum facito, muliere in sella collocata, ac ve-
 stimentis cooperta. Aliud. Foliorum sambuci manus ple-
 næ mensuram, & myrti tantundem in aquam missa coqui-
 to, & ad excolatam aquam, ordeï paleas iniicito, coquito, &
 linteo excipito, ac cum hoc fomētum facito, prout maximè **E**
 calorem ferre poterit. Aliud. Acetum, oleum, aquam, mel,
 hæc mixta valde feruefacito, deinde accepta vesica capiente
 congiū, aut vtriculo ex tenui corio factō, infundito, & pan-
 niculo laneo obuoluto, foueto. Quum autem tepidus factus
 fuerit panniculus, alium obuoluto. Aliud. Pini corticem,
 & rhois folia in aquam coniecta fortiter coquito: & in exco-
 lata aqua ordeï paleas coquito, oleo affuso, vbi verò simul cu-
 xeris linteo excipito, ac foueto. Aliud. Loti ramenta & co-
 pressa, aqua & oleo affuso coquito. Deinde simul cocta lin-
 teo excipito, ac foueto. Aliud. Aromata in aquæ chœnicem
 coniecta coquito, & in excolata aqua furfures triticeos co-
 quito, & foueto. Aliud. Eodem modo gallam contusam, &
 rhamni corticem in aqua coquito, & cum aqua furfures tri- **F**
 ticeos subigito, ac oleum ammisceto. Postea semiaffatum pa-
 nem duos chœnices habentem facito: linteoque excipito, ac
 foueto. Aliud. Brassicam & porrum decoquito, & cum
 succo eodem modo fomentum facito. Aliud. Ordeï paleas
 coquito, oleo affuso, & linteo excipito, ac foueto. Aliud.

Solanum & oleæ folia coquito, & eodem modo fomen-
 tum facito. Atque hæc sanè, si quidem humidis vti volue-
 ris, pro fomento velut scripta sunt adhibe. Si verò siccis,
 panes parato & exassatos, & semiaffatos, & cum his foue-
 to. Sed & testis calidis linteo inuolutis foueto, itémque
 cum ipsis linteis calefactis, & cum lenticulis vasis testaceis,
 feruente aqua infusa, Apponito autem ad pedes. Aliud.

Iridis radicem tundito ac coquito, & eodem modo foue-
 to

A to. Si aqua in vteris gignatur, menses pauciores fiunt, & de- Menses quā
do paucio-
res.
teriorēs, & per longius tempus, & pręgnans est semper per
duos menses, aut paulo amplius. Quum autē hoc tēpus ad- Medela.
uenerit, & corrumpit, & aqua multa in ipsa gignitur. huic
autem lac bibendū dare oportet, & peplum, mecona dictū,
donec fœtus moueri inceperit. Plerunque verò ante hoc cor-
rumpitur, & per abortum extruditur, & vteri sanguine ma-
nant. Hęc autem patitur nihilo magis ex labore, quā ali-
ter. Hoc autem cognoscere poteris quod hydrops inest, ex
digiti cōtactu. Comperies enim osculum ipforum gracile, &
obscuratum ac plenum humiditate. Si verò non circa initia,
sed dum iam mouetur, fœtus ipsi corrumpatur ac suffocet-
B tur, tunc & venter imus intumescit, & ad cōtactum dolet, ve-
lut vlcere præsente. & febris ipsam ac dentiū fremitus cor-
ripit. Et dolorem habet acutum & vehementē, circa puden-
da, imum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem ac
coxendices. Quum sic habuerit, calida ipsam lauare oportet.
Et qua parte dolor haferit tepefactoria adhibere, experimē-
to facto de eo quod maximē admittat. & pharmacum deor-
sum purgans bibendū dato. Interposito verò tempore quan-
tum tibi sufficiens esse videbitur, & collutione facta, & fo-
mento adhibito, cyclaminū apponito, ita vt melle subactā,
& linteo exceptam deliges, & ad os vterorum apponas. Cu-
pressi etiā ramenta in aqua madefacta, eodem modo appo-
nit. Verū hęc breuiore tempore, & per longius temporis
C interuallum, quāto magis mordent & exulcerant. Et specil-
lum stanneum paratum immittito, & digitum eodem mo-
do. Potiones quoque bibendas dato, experimentum faciens
quas libetē admittat. & cum viro dormiat, maximē oppor-
tuno tempore præsente. Si enim genituram conceperit, &
pręgnans facta fuerit, ac pepererit, subexpurgantur & quę
prius in ipsa fuerant, cum ipso puerperij purgamento. Atque Vteri dari
tues.
sic maximē sana fieri poterit. Si indurati fuerint vteri, & os
ipforum asperum sit, & menses occultantur. Quum verò
apparuerint, velut arena sunt. & genitura hoc tempore non
fit. Si verò etiam digito contigeris, asperum comperies os
vterorum. Quum sic habuerit, cyclaminum terere opor- Curatio.
tet. & salem ac ficum crudā ammiscere. & cum melle effor-
mata apponere. & fomento adhibito, purgatoria infundere.

Hippocratis Liber

Edat autem mercurialem, & brassicas coctas, & succum sor-
beat, & calida lauatur. Si indurati fuerint uteri, & menses
occultantur, & os ipsorum conuiet: & non concipit. Quum
sic habuerit, si digito contigeris, comperies os asperum, & di-
gitum non intromittit. & febris ipsam corripit, ac dentium
fremitus. Et dolor habet inum ventrem, & laterum molli-
tudinem, & lumbos. Patitur autem hæc, si foetus in ipsa cor-
ruptus fuerit putrefactus. Quibusdam verò etiam ex partu
contingit. Sape etiã aliter. Quum sic habuerit, multa calida
ipsam lauare oportet, & fomentum adhibere. Quum autem
recens lota aut fota fuerit, immisso specillo os aperito ac di-
latato, & per digitum eodem modo, & velut in priore scri-
ptum est apponito. Et potiones similiter bibendas dato. & eo
Vteri ad la- dem modo curato velut priorem. Si uteri ad latus allap-
tus allap- si. fuerint, tussis detinet, & dolor sublatus, & uterus durus velut
pila insidet. & ad contactum dolet velut ab ulcere. Et conta-
bescit, & videtur peripneumonia esse, & conuellitur, & gib-
bosa fit. Et menses omnino non apparent. Quibusdam verò
prius conspecti, euanescent. Tunc autem fientes, debiles sunt
ac pauci, aut deteriores quàm antea & genitura non fit hoc
Medela. tempore. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgãs
bibendum dato, & eo epoto, multa calida ipsum lauato. &
ex tepefactoriis quod maximè admittit adhibeto. & à quib⁹
sanguis purgatur ea apponito. & lini semen tostum, tustum
ac cribratum, & peplum album, & saluiam cum polenta te-
nui, & caseum caprinum, sordibus & salis muria deratis: hæc
misceto, vt casei sint partes duæ, reliquorum verò una: po-
lenta autem sit antiqua non falsa, & ieiunæ in vino bibenda
dato. Vesperis verò cyceonem crassum melle affuso exhibe-
to, & ex potibus quemcunque libenter admiserit bibendum
dato. Et frequenter fomentum adhibeto. Calidam verò as-
pergito, & per ceratum leniter mollito, ac à latere detru-
to. & latus fascia lata deligato, & lac bubulum quàm pluri-
mum ad dies quadraginta bibendum præbeto. Cibis autem
vtatur quàm mollissimis. Morbus hic vehemens est & leth-
alis. & paucae etiam si curentur ipsam effugiunt. Si os utero-
rum cõcludatur, forte fit velut grossus ficus. Et si digito con-
tigeris, comperies durum ac contractum. & digitum non in-
tromittit. & menses occultantur. & geniturã nõ suscipit hoc
tempo

Cum os v-
terorum cõ-
cluditur.

- A** tempore, & dolor habet in um ventrē, & lumbos, & laterum mollitudinem. Quādoq; etiam sursum procedit, & suffocatur. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgās bibēdum **Medela.** præbeto, & multa calida lauato, & quæ os molliunt apponito, & specillum immittito ac aperito, & digitum similiter, & calidam aspergito. Quum autē molle factum fuerit, ea quæ sanguinem purgant apponito, & ex potionibus dato, experimento facto quam libenter admittat, & brassicam edat, & succum eius sorbeat. Si vteri obliqui fiant, etiam os ipsorum obliquum fit, & menses ipsi nunc occultantur, nūc prius **Vterorum obliquitas.** apparentes euanescent, & non similes fiunt, sed deteriores & pauciores quā antea, & genitura nō fit hoc tempore, & dolor habet in um ventrem, & lumbos, & coxam, & attrahit ipsam. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgās bibendum dare oportet, & calida lauare, ac fouere. Vbi verò recens fota aut lota fuerit, digito immisso os vterorum corrigat ac dirigat, & odoratorum suffitum admittat, & ex potionibus dato, iuxta experimentum quam libenter suscipit. Cibus autē vtatur mollibus, & allia edat cocta ac cruda. & cum viro dormiat, & in sanam coxam decumbat. Alteri verò fomentum adhibeat. Morbus autē difficulter cedit. Si inflati **Vterorum inflatio.** fuerint vteri, & venter attollitur ac inflatur, & pedes intumescunt, & tauræ faciei partes. Color verò iniucundus fit, & menses nō fiunt, & genitura hoc tempore non fit, & anhelat, & anxia mœret, & quum surrexerit, aut progressa fuerit,
- C** erectæ cervicis spiratio ipsam tenet, & quicquid ederit aut biberit, ipsam molestat, & gemit, & magis a gram tristatur quā priusquam ederet. Sæpe verò etiā suffocatur. Quum sic habuerit, pharmacum deorsum purgās bibendum dato, **Medela:** & calida lauato, ac fomentū adhibeto. Interposito verò tempore quodam, apponito ea à quibus purgetur, ac nō mordeatur. Frequentissimè verò totum corpus foueto. Tunc autem & sub pudenda odorata suffiantur. Sub nares autem graueolentia, & potiones dato quæ vteros purgāt, & ad locum compellunt. Et Mercurialem edat, & lac bibat, velut de latere dictum est. Morbus autem non est diuturnus. Si sanguinis grumi in vtero coierint, os ipsorum velut eruo plenum fit, **Grumi sanguinis in vtero.** & si attigeris, ita habere deprehendes, & menses non fiunt. Quum igitur

Hippocratis Liber

Medela. igitur ita habuerit, cyclamini corticem detrahito, & allium **D**
& salem, & ficum, & mellis parum terito ac permiscero, &
glandulam hinc formatam ad vterorum os apponito, & alia
vteris cōuenientia medicamēta subdito, quæ videlicet acria
sunt ac corrodunt, & à quibus sanguis purgatur, & de potio-
nibus dato eas quæ vteros purgāt, & omnia circumrad. to, &
vesicæ pellicula siue cuticula digitis obuoluta, os vterorum
Vteriobtor deradito. Si obtorti fuerint vteri, & menses non fiunt, & ge-
ti. nitura non manet intus, & dolor habet imum ventrem, &
Curatio. lumbos, & laterū mollitudines, & si digito cōtigeris, os vte-
rorum attingere nō poteris, nam fortiter secessit. Quum sic
habuerit, pharmacum bibendū dare oportet, à quo sursum
ac deorsum purgetur, magis tamen deorsum. & os ipsum ac **E**
vteros quàm maximè fouere, ac calida lauare bis in die, &
de potionibus dato quam libenter susceperit pro experimen-
to, & viro condormiat frequentissimè, & brassicam edat.

Cum vteri Si vteri commoti in loco non manserint, quo prolapsi fue-
non consi- rint dolores exhibent, & inconspicui fiunt. Quandoque verò
stunt. eminent, velut sedes prolapsa. Et quum quidē supina decu-
buerit, in loco manent. Quū autē surrexerit, aut se inclina-
uerit, aut aliàs se commouerit, exeunt. Sape verò etiam
Medela. quietem habent. Hanc quàm maximè quiescere oportet, &
non moueri, & lectum ad pedes altiorē statui, & iisdem vti,
velut in superioribus, & cum acerbis infusis conspergere, &
graucolentia suffire. Sub nares autem odorata, & malum **F**
punicum in medio per vmbilicum perforato, & in ipso pi-
cem quæ maximè cōgruat cum vino tepefacito, & nō valde
premens quàm penitissimè apponito. Quum autem quid
apposueris, lata fascia exceptum ex lumbis deligato, vt ne
dilabatur, sed maneat & faciat quod expetitur, & peplū cum
caseo, & polenta, bibēdum dato, velut in allapsu ad latus di-
ctum est, & ex portionibus quam maximè admiserit biben-
dam præbeto. Cibis autem mollissimis vtatur. & cum viro
Cum vteri quàm maximè dormiat. Si hiauerit os vterorum magis
biant. quàm solet, menses plures fiunt, & deteriores, & humidio-
res, & per longius tempus. & genitura ipsam non contingit,
neq; intus manet, sed rursus foras effunditur, & si digito con-
tigeris, os vterorum hians comperies. & impotentia ipsam
corripit præ mēsisibus, & febris ac rigor, & dolor tenet imum
ventrem.

A ventrem, & lumbos, ac lateris mollitudinem. patitur autem hæc maximè, si quid in ipsa fustum fuerit, & corruptum com-
putruerit. patiuntur etiam ex partu, & aliæ aliter. Quum sic **Medela.**
habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, à quo sursum
purgatur, & quum dolor habuerit, tepefactoria apponere, &
calida lauare, & interposito tempore. per infusa colluere, ve-
lut scriptum est in priore, & de potionibus dare quam liben-
tissimè susceperit, & suffire quæ siccant. Edat autem polypos **Cum vteri**
& mercurialem. Si leuigati fuerint vteri, & menses plures **leuigati fue-**
sunt, & deteriores, & humidiores, ac frequentiores, & genitu-
ra intus non manet, sed rursus exit, & si digito cōtigeris, com-
peries os leue. Et impotentia ipsam corripit præ mensibus,
B & febris ac rigor, & dolor inum ventrem, & lumbos, ac la-
teris mollitudinē, maximè si quid in ipsa corruptum cōpu-
truerit, & ex partu, & aliis. Quum sic habuerit, curare opor-
tet vbi dolor habuerit, velut scriptum est in priore. Si vteri **Medela.**
ad ventrem nutauerint. dolor acutus & vehemens coxendi-
ces, & lumbos, ac laterum mollitudinē habet. Et crus clau-
dicat. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibe-
dum dare oportet, postridie verò suffire hoc modo. Ordei
chœnices duas, & oleæ folia probè contusa, & gallam contu-
sam ac cribratam, & hyoscyami tertiā chœnices partē. Hæc
mixta, & olei hemina dimidia affusa, efformata in olla per
dies quatuor, ter in die suffito. Noctu verò lac bubulum, &
mel, & aquam bibat, & calida lauetur. Si ad caput conuersi **Cum vteri**
fuerint vteri, signum hoc est. Venas in naso & sub oculis do-
lere videtur. Hanc calida multa lauare oportet, etiam in ca-
pite, lauro & myrto in aqua incoctis, & caput vnguento ro-
faceo illinatur, & odorata subter suffiantur, & brassicā edat, **caput ve-**
& succum absorbeat. Si ad crura & pedes conuersi fuerint, **xant.**
ex hoc cognosces. Magnis pedum digitis conuellitur sub **Medela.**
vngues. Et dolor crura ac femora tenet, Quum sic habuerit, **Cum vteri**
multa calida ipsam lauare oportet, & fomentum adhibere **crura & pe-**
quod maximè libèter admiserit, & subter suffire graucolen-
tia. Et vnguento rosaceo vngere. Si mulier cibum auer-
sant vteros doleat, & febris ipsam ac rigor corripit, pep-
li **fastidium**
albi quintā dimidiæ chœnices partem, & seminis vrticæ tan-
tundem, & casei caprini rasi dimidiā chœnicem, simul cum **ob vuluæ**
vino vetere mollito, deinde cocta sorbenda dato. Si ex **dolorē ob**
partu **repiit.**

Hippocratis Liber

**Cum fluor
post partū
vexat.**

Medela.

**Sanguinis
vomitus.**

Medela.

**Cum diu-
turno tem-
pore non
conciat.**

**Morborū
vterorū re-
medium.**

**Purgamēta
vterorum.**

**Cum vteri
sedem pe-
tunt.**

**Cū os vte-
rorum vlce-
atur.**

**Cum secun-
da decede-
re non pos-
sunt.**

partu fluxus corripiat, & cibi in ventre non maneat, vnam **D**
passam nigrā, & mali punici dulcis grana trita, & coagulum
hœdi, vino nigro diluito ac vitior, ita vt caseum caprinum
derasum, & polentā tritici torrefactam adicias, & bene tem-
perata bibēda præbeas. Si ex partu sanguinem vomat, he-
patis fistula sauciata est, & dolor ad viscera procedit, & cor
conuellitur. Hanc multa calida lauare oportet, & tepefa-
ctoria quæ maximè admiserit adhibere, & asininum lac bi-
bendum ad dies quinque dare. Postea verò vaccæ nigræ lac
bibendū præbere, ita vt sine cibo degat, ad dies quadraginta.
Ad vespērā verò sesamum tritū bibat. Morbus hic est peri-
culosus. Si mulier diu nō concepit, mensibus apparentibus **E**
tertia aut quarta die, alumen tritum vnguento dilutū, lana
exceptum apponito, & per tres dies appositū habeat. Tertia
verò die fel bouis radito, & ramētum oleo dilutum ac suba-
ctum, linteo exceptum apponito. Et tres dies appositum ha-
beat. Sequenti verò cū viro coeat. Ad vterorum morbum
sedandum, lini scissi vnā cum stipula pugillum tenuiter tu-
sum, in vino albo quā iucundissimo per noctem madefa-
cito, deinde excolatum in ollula tepefacito, & in eo lanā mol-
lissimam tinctā apponito, & vicissim priore detracta aliam
subdito. Si vteros purgare voles, primum quidem ordeum
oleo imbutum in prunis suffire oportet. Postridie verò car-
nem ouillam coquere, cum ordei decocto sub dio per no-
ctem exposito. Sit autem decoctum ordei congiij mensura, & **F**
valde ipsas coquito. Vbi verò coctæ fuerint, leniter tepidas
edat, & iusculum sorbeat. Postridie autē thus & pulegium
tritum, melle subactum & lana exceptum ad triduum sub-
dito. Si vteri ad sedem conuersi fuerint, & secessus secedere
prohibuerint, dolores habent & lumbos, & imum ventrem,
& ilia. Quum sic habuerit, calida ipsam lauare oportet, &
lumbos fouere, & graueolentia suffire, & apponere quæ pur-
gant & impellunt ipsos vteros, & bibenda dare ea quæ ma-
ximè admittit. Si vteratum fuerit os vterorum aut inflam-
matum, myrrham & adipem anserinum, & ceram albam, &
thus, in leporis pilis qui sub ventre sunt misceto ac verito, &
in lana mollissima apponito. Si secundæ decedere nō pos-
sint, statim quidem à cibo abstinere oportet. Viticis autem
folia trita in vino & melle, oleo affuso tepefacito, & heminae
mensuram

A mensuram bibendam dato. Si inflammati fuerint vteri, Cum vteri sambuci folia tenerrima in tritici recentis crassiore farina flāmescent. coquito, & leuiter tepida sorbenda dato. Si vteri transmo-
 ti fuerint, hederam siccissimam tritam, & linteolo tenui illi- Cum vteri
 gatam subdito, & pingue aliud nihil adhibeto. Bibendum mouentur.
 verò dato triticum recens, & peplum tostum, & saluiam, & Cum men-
 cyperum, & anisum. Hæc trita vino diluta cum furfuri- ses stato tē
 bus ordeï bis in die dato, pro vice dimidiam heminam. Si pore non
 menses constituto tempore non fiant, brassicæ folia & ru- fiunt.
 tam terito, postea paleas ordeï chœnicis mensura madefaci-
 to donec flaccescant, & per noctem sub dio exponito. Ma-
 ne verò in hemina inde excolata brassicam ac rutam dilui-
 to, & affuso oleo conuassato, & bibenda dato, postea poly-
 pum vino albo suffocatum edendum dato, & vinum ebiben-
 dum. Si verò volueris, pisces odoratissimos coctos edendos pudenda
 dato, & iusculum sorbendum. Si ex feruido & superficiali- vlcera-
 rio vlcere pudenda fuerint exulcerata, myrti baccis in vino
 coctis pudenda colluat. Et postea mali punici dulcis putami-
 na in vino coquito, & myrrham ac resinam simul mixta vi-
 no diluito, & intinctum in his linteum subdito. Si vrina Straguria.
 stillicidium corripiat, cucumeris siue cucurbitæ os & fun-
 dum rescato, & subiecta pruna cucumim circumponito,
 & inspersa in ignem myrrha, mulierem super cucumim lo-
 cato, ita vt summam cucumeris partem quàm penitissimè
C in pudendum indat, quo vapor plurimus in pudenda trans-
 mittatur. Et ex potionibus vrinam cientibus ieiunæ ali-
 quas exhibeto. Si ad cor progressi vteri suffocent, & non Cum vteri
 decedant, porri semen tritum, & pulgium, in aquæ cyathis corpetunt.
 tribus, & aceti albi cyatho vno, & mellis tertia cyathi par-
 te diluito, tepesacito, & ieiunæ sorbenda dato. Si ex par-
 tu, aut abortu, rigor corripuit iuniperi fructum & saluiam Rigor &
 simul trita, in aceti albi cyatho diluito, & vini albi dilu- partu.
 ti poculum affundito, versato ac stare finito. Mane ve-
 rò excolato, & tepesacitum bibendum dato. Si vteri infla- Vterorum.
 ti fuerint, & siuentus in vtero fiat & dolor, saluiam & cype- inflatio.
 rum tusa madefacito per noctem, & mane excolato, & pu-
 rum cremorem in ollam fundito, tritici farina crassio-
 re adiecta, & aceti albi cyatho affuso, & succi silphij ma-
 gnitudine fabæ addita, & cocta crudius sorbenda dato.
 Si in

Hippocratis Liber

Graueolentia in pudendis. Si in pudendis graueolentia fuerit, & columella nascatur, D. & dolor habeat, dolorem quidem sedabit apij semen ieiunae in vino datum. Graueolentiam verò, anisum eodem modo datum. Columellam verò refecare oportet. Si vlcera fiant in pudendis, & pruritus corripiat, olea & hederæ & rubi & mali punicæ dulcis folia trita in vino veteri dilue, & postea carnem recentem foliis intege & appone. Et habeat subditam per noctem. Mane verò eximat, & myrtū in vino decoquat, & cum vino pudenda colluat. Si genituram non suscipiat, mēlibus secundū naturam fientibus membrana ante vteri os excreuit. Contingit etiam ex aliis causis. Cognosces autem hoc, si digitum ad moueris, membrana prætextū continges. Ad hæc medicamentum subdititium facere oportet. Re. inam itaque & aris florem melle diluito, & linteum ex his tinctum penitissimè indito, filo ad extremā partem dependente illigato. Quum itaque hoc exiuerit, myrtum in vino coquito, & cum vino tepido eluatur. Si anhelationes corripuerint mulierem, sulphuris magnitudinē fabæ, & nasturtij tantundem, & rutam, & cuminum Aethiopicum, hæc trita & vino diluta, ieiunæ bibenda præbeto. Oportet autem & à cibis abstinere, & non frequenter edere. Si pariens inflata fuerit, hepar ouillum aut caprinum calido cinere obrutum, edendum dato meracius ad dies quatuor. & vinum bibat vetus. Si lumbos doleat, anisum & cuminum Aethiopicum bibat, & calida lauatur, & subcalidam bibat. Si menses non fiant, testam crassam exurito ac terito, & origanum F in pinguedine anseris coctam terito, & ad testam in linteū ammisceto, ac tepida apponito. Si vteri conclusi fuerint, & menses nō apparuerint, colocynthidem syluestrem, & filphij semē, cuminum Aethiopicum, nitrum, salem thebaicū adipem rhenalem, farinam, myrrhā & resinam. Omnia hæc feruefacito: simulque mixta ac trita in glandulam efformato, & apponito. Si vteri ad viscera conuersi strangularint, vinum cedrinum, & cuminum Aethiopicum bibat, & calida lauatur, & subcalidam bibat. Si menses non fiant, adipem anseris, & netopum, & resinam, mulier lana excepta subdat. Si verò magis quàm conuenit prodeant susinum, & raiz linguam, in lana apponat. Si transmoti vteri aliquò allapsi fuerint, ordeum decorticatum tritum vnā cum paleis sume, & cum

A & cum cornu ceruino vino subige, & hinc vteros suffito.

Si secundæ decedere non possint, fœniculum vino & oleo ac melle feruefactum bibendum dato. Si menses non appareant, & velis ipsos detrahere, crassiolem tritici farinam & ordeum coquito, & oleo affuso edenda dato. Si inflama-

Cum secun-
dæ non de-
cedunt.

Vteri infla-
mati.

Vterimoti.

ti fuerint vteri, cotyledonis folia, & porrum, in crassiole tritici farina coquito, & affuso oleo edenda dato. Si moti vteri aliquò allapsi fuerint, & dolorem exhibuerint, oleæ scabiam, & lauri ac cupressi ramenta, in aqua coquito, & linteo excepta apponito. Si vterus doleat, & ad vesicam fuerit dolor, porri semen in aqua tritum ieiunæ bibendum præbe.

Vterus do-
litans.

Vteri pro-
minentes.

& tepesfactoria adhibe. Si vteri prominuerint, lotos ipsos

B cum aqua tepida, & vino ac oleo illitos, rursus intrudito, & ex lumbis deligato, & graueolentia suffito, & si urinam emittere non poterit, calida lauato ac foueto, & cupressi ramenta suffito. Et porciones urinam cientes bibendas dato. Si flu-

Fluxus.

xus fiat, acerba suffito, & stercus asini derafum, lanæ illigatum subdito. Sit autem stercus siccum. Si in pudendis vl-

Pudenda.

ulcerosa.

Os vteri vl-
ceratus.

Vteri do-
lor.

cera fiat, adipem bubulum illinito, & apponito, & cum vino in quo myrtus cocta est colluito. Si ex partu os vterorum fuerit exulceratum, florem rosarum tritum & vino imbutum in pilis leporinis apponito, & acerbis colluito. Si vterus doleat, alij caput integrum, & nitrum tostum, & cuminum terito, & melle subacta subdito, & calida lauatur, & subcalidam bibat. Si ex feruido ac superficiario vlcere pudenda

C fuerint ulcerata, adipem bubulum, & butyrum, & anseris adipem, ac susinum vnguentum misceto, & ex his pudenda illi-

Vteri ascen-
dentes.

nito, & aqua tepida colluito. Si vteri ascendentes suffocant, funiculum lucernarium accensum extinguito, & naribus admovento, quo fumum attrahat, postea myrrham vnguento dilutam, & lana excepta apponito. Et resinam oleo dilutam bibendam dato. Si secunda non secedat, cony-

Secunda nō
secedens.

Capitis do-
lor.

zam tritam lana exceptam apponito, & ignem in vino tritam bibendam dato. Si caput doleat, & inum venter, & lumbos, bilis in vteris est. Huic itaque pharmacum dare oportet, quod sursum ac deorsum purgare potest, & calida lauare, & apponere quæ bilem purgant. Et anisum ac nigellam vino diluito, & bibenda dato. Si fluxus oboriat, caneros fluui-

Medicamen-
ta aduersus

les in vino suffocato, & vinum bibendum dato, & quæ siccant suffito.

suffito.

suffuso & apponito. Si fluxus oboriatur, porri pugillum in D
vino tritum bibendum dato, & siccis & acerbis vtatur. Si
fluxus oboriatur, muli sterco combustum, tusumque ac cri-
bratum, vino dilutum bibat. Reliquis autem eodem modo
vtatur. Si fluxus oboriatur, & iam diuturnus fuerit, spon-
giam combustam ac tritam, vino odorato dilutâ, bibendam
dato, & per suffusus resicca, & quæ restringunt appone. Si
vteros purgare velis, nitrum, cuminû, allium, & ficus terito,
& melle subacta apponito, & calida lauetur, & subcalidâ bi-
bat. Si vteros doleat, cyclamini radicē in vino ieiunæ bi-
bendam dato, & calida lauetur, & subcalidam bibat. Si lac
extinctum fuerit, reliqua quidem eodem modo curato, fœni-
culi verò semen bibendum dato, & radices fœniculi decorti- E
catas, ac butyrû simul coquito. Quum autem cocta fuerint,
frigefacito ac bibenda dato. Commodum est etiam hyppo-
marathrum & hipposelinû simul coctum. Si lac extinctum
fuerit, porrum tritum aqua dilutum bibendum præbe, & ca-
lida lauetur, & porrum ac brassicâ edat, simul coctis Cyrti
foliis, & succum sorbeat. Si lac extinctum fuerit, saluiam,
cedri aut iuniperi baccis adiectis coquat, & ad diffusum, vi-
num affundat, ac bibat, & ad cætera farina inspersa additô-
que bulbo, & modico oleo affuso, edat. Et acria, & acida, &
falsa, ac cruda olera omnia vitet. Nasturtiû verò in vino po-
tum commodû est. Nam lac purgat, & calidâ lauetur, & sub-
calidam bibat. Si velis mulierem prægnantem fieri, ipsam
& vteros purgato, postea farinam ieiunæ edendam dato, & F
vinum meracum insuper bibendum, & nitrum rubrû, cumi-
num, ac resinam, melle subacta in linteo subdito, & vbi aqua
defluerit, nigros pessos mollitorios apponat, & cû viro dor-
miat. Si prægnantem facere voles mulierem, ipsam & vte-
ros purgato. Deinde lintheum tenuissimum resiccatum, ac
melle imbutum in glandes efformato, & in fici succo tin-
ctos apponito, donec fuerint aperti. Postea verò magis
intrudito. Vbi autem defluerit aqua, vino & oleo colluta
cum viro dormiat. Bibat autem & pulegium in vino cedri
no, quum viro condormire volet. Medicamentum fœtum
ex vteris pellens. Cucumeris syluestris succum potionis
mensura, in mazam conspersum apponito, vbi ad duos dies
antea ieiunauit. Aliud. Staphidis syluestris pugillos
duos

Vteri pur-
gatio.
Vteri do-
lor.
Lactis ex-
tincti reme-
dia.

Vt mulier
prægnans
fiat.

Vt fœtus
ex vtero ex-
pellatur.

A duos, in aqua mulsa dilutos, bibendos dato. Experimentum fecunditatis. Caput allij integrum derafum vteris apponito. Postridie vero digitum immittat, ac cōtingens consideret. & si quidem oluerit inde os, bene habet: Sin minus, rursus apponat. Aliud experimentum. Netopum modicum in lana inuolutū apponat, & consideret an per os oleat. Alia subdititia medicamenta. Scorpij marini fel, in lana inuolutum, & in vmbra siccatum apponito. Pulegium siccum tritum, melle imbutum in lana apponito. Cucumeris sylvestris semen, & testam combustam, vino subactam, cum pilis leporinis, in lana subdito. Alumen Aegyptium, lana inuolutum apponito. Cantharidas vino subactas, in lana subdito. **B** Herbā artemisiā vino subactam apponito. Nigellam in vino tritam, in lana subdito. Aliud ad recens enixam. Vnguentum rosaceum & ceram, in lana apponito.

Bulbion ex tritico, tritum & vino subactum in lana subdito. Vini albi veteris fecem combustam, & in vino albo extinctam ac tritam, in lana apponito. Galbanum, netopum, & misy, cum vnguento rosaceo, in linteo apponito. Elaterij portiones duas, & fauum cum vino, in linteo apponito. Butyrū & alumen melle subactum, in linteo subdito. Scammonia succum, & adipē, cum maza misceto, & vino imbuta, & linteo apponito. Si concipere nolit, misyos fabæ magnitudinem aqua dilutam bibendam dato, & per annum non concipiet. Si periculum facere velis in muliere, an prægnans sit aut nō, rubro lapide siue terra erythrea oculos sublinito. **C** Et si quidem ingrediatur pharmacum, prægnans est, sin minus, non. Si prægnati pudenda feruido & superficiario vlcere fuerint exulcerata, amygdala trita, & medullā bubulā in aqua coquito, & modica farina adiecta, pudenda illinito. & baccarum myrti decocto colluito. Si virgo ex lapide laborarit, semen radice Aethiopica, in vino veteri ad dies decem dato. Deinde in aqua ad dies viginti, & bis in die multa calida lauato. Cataplasmata. Allium, portulacum, apium, loti & cedri ramenta, trita simul mixta aqua mulsa diluito, & cataplasma hinc factū imponito. Rubi folia, myrti folia, simul trita aqua mulsa diluito, & polenta ammixta subacta imponito. Sābuci folia, myrti folia, terebinthi folia tenerissima, eodē modo apponito. Loti ramenta, mori folia, simul

Ne concipiat mulier
An concipiat
perit experimentum.
Pudenda si
vulnerosa
sint.

simul trita mixta, aqua diluta cum vua passa imposito. Suf- **D**
 fitus. Ouiculæ aut capræ cornu tusum, & ordeum tostum
 ac fresum, oleo subigito ac suffito. Cerui cornu, & olinas
 nondum habētes oleum, simul trita mixta suffito. Rhoem
 rubrum, & polentam tostam, oleo subigito ac suffito. Po-
 lentam, & stercus bubulum, & paleas, oleo subigito ac suffi-
 to. Loti ramenta, & rhois folia, & cupressi sicca ramēta,
 vino nigro austero subacta suffito. Galbanum, mannam, &
 resinam vnguento subacta suffito. Capræ cornu, & gallā,
 & adipem suillum, & cedriam suffito. Terram ex alinorū
 pedibus deradito, ac stercus alininum, cum vino nigro subi-
 gito ac suffito. Collutiones. Folia myrti, & lauri, ac he-
 deræ in aqua coquito, & cum hac tepida colluito. Rhois, **E**
 & mali punice, ac rubi folia, in aqua mulsa coquito, & cum
 ea excolata colluito. Sambuci & lentisci folia in aqua co-
 quito, & excolatam leuiter tepidam infundito. Fœniculi,
 & brassicæ radices tufas in aqua coquito, oleo affuso, & post-
 ea cum excolata colluito. Oenanthen, & cyperum, & vuas
 passas, in aqua mulsa coquito, ac colluito. Malagmata.

Maluam & fœnogræcum in aqua feruefacito, & cum ex-
 colata aqua leuiter tepida colluito. Cupressi ramenta &
 amaracū, in passo aqua temperato coquito, ac colluito. Ser-
 pillum & violæ albæ radicem, in aqua mulsa coquito, ac col-
 luito. Hypericū, & lentiscum, & baccas cedri in aqua co-
 quito, & cum leuiter tepida colluito. Fauum, & butyrū, &
 resinam, & adipem anserinum, in aqua coquito, & colluito. **F**

Fomenta. Lolium tostum ac molitum, in posca meracio-
 re coquito. Postquam autem coxeris, linteo illigato, & foue-
 to. Lentem tostam, decorticatam, & in farinam crassiorē
 alicæ similem redactam, in aqua coquito, & linteo illigato,
 ac foueto. Eruum eodem modo parato, ac foueto. Com-
 moda est & salvia eodem modo parata. Saluiam & hype-
 ricum in aqua coquito, & ordeï paleis in decocto coctis, &
 linteo exceptis foueto. Loti & cupressi ramenta in vua pas-
 sæ cremore coquito, linteoque ipsa illigato ac foueto. Olea,
 & myrti, & hederæ, & lauri folia, in aqua coquito, & in deco-
 cto, ordeï paleas coquito, deinde linteo illigato, ac foueto.

Cupressi ramenta & cedri, & ordeï fursures, simul misce-
 to, & in vua passæ cremore subigito, ac panem formato, &
 cum

A cum hoc affato, calido in linteum alligato, foueto. Violæ albæ semen, aut radices, in aqua coquito, & cum aqua furfures tritici subigito, ac panē formato, cum quo calido in linteum inuoluto, foueto. Serpillum in aqua coquito, & furfure triticeo in aquam coniecto, eodem modo foueto. Spōgias calefacito & adhibeto. & cum mollibus lanis, & panniculis laneis, & vasis testaceis aqua infusa, & vtriculis eodem modo, & decoctionibus in vtres infusis foueto. Purgatorium.

Si mulierem parere non potentem, facere velis vt prægnans fiat, considerare oportet in mensibus, an biliosa aut pituitosa sit: cognosces autem hoc, arena tenui sicca ad solem conspersa, & quum menses prodierint, sanguine super arenā
 B in sole effuso, ita vt ipsum siccari sinas. Si enim biliosa fuerit, sanguis super arenam siccatus, pallidus fit. Si verò pituitosa, velut mucus existit. horum igitur vtrum tandem fuerit, ventrē purgato, siue sursum siue deorsum purgatione opus habere visa tibi fuerit, postea paucis diebus interpositis, vteros purgato. Vterorum fomenta. Si duri fuerint vteri, & non Vteri cum
 concipiat, Vinum quā iucūdisimum cum pari aqua rem- duri fue-
 peratum, trium semicongiarum Atticorum mensura, & fœ- rint.
 niculi radices, & seminis fœniculi quartam partem, & vnguenti rosacei semiheminam. Hæc in vas nouum fundito, & vinum affundito. Vasis autem operculum perforato, & imposita arundine foueto. Arundinem verò cum operculo tollito. Si enim sine operculo abstuleris, exuretur. Postquam autem fota fuerit, scillam apponito, velut infra scriptum est.
 C Apponito autem donec dixerit molle & amplum esse vterorum osculū, & si quidem exulcerata fuerit, & pustulæ in purgatione fuerint, si summa labia vlcerata fuerint, anisum, & adipem anserinum, in rosaceo oleo terito, & in lana inuoluto & accepta carne bubula, magno pedis digito crassiore, sed digitorum longitudine, ipsam pharmaco illinito. & lana exceptam inuoluto. & ad extremā carnis partē quæ foras spectat filium alligato, & reliquā in vteros indito, vbi est vlcus. Mensium purgatoria. Si non procedat mēstrua purgatio, cucumeris syluestris internā partem pondere trium obolorū, & artemisiā herbam, & thuris obolum terito, & ammixto melle in lana inuoluto, & ad os vteri opponito, quinquies in die hoc faciens. Aliud. Vitem viridem terito, & melle am-
 H mixto

Hippocratis Liber

mixto lana excipito, & eodem modo apponito. Aliud. D

Cupressi fructum, & cucumeris sylvestris internam partem, & thus, terito & melle ammixto lana excipito, & eodem modo subdito. Aliud. Cupressi fructum & thus terito, & melle ammixto lana excipito, ac subdito. Aliud. Abrotani obolos tres, cum melle lana excipe, ac subde. Aliud. Elatherij obolum, & myrrha obolum terito, & cum melle lanæ inuoluto, ac subdito. Purgatorium si mulier non concipiat.

Cū mulier
nō cōcipit.

Tauri urinam collige trium heminarum mensura. Deinde artemisiam herbam, aut parthenium, aut adiantum & laurum viridem, & cedri ramenta simul contunde. Deinde in effosa scrobe carbones accēde, & imposita olla urinam tauri infunde, & contusa in mortario adice. postea sellā circompone, & artemisiam herbam, aut hyssopum, aut origanum impone, & muliere super hanc collocata, donec sudet fove. Vbi verò sudarit, laua cum calida. & in lauacrum artemisiam & laurum immitte. Deinde subdititium medicamentum adhibe. Aut artemisiam, aut bulbium in vino albo tritum lanæ inuolutum subdat. Hæc ad tres dies faciat, & deinde cum viro dormiat. Subdititium pharmacum ad conceptum faciens. Ex nitro & thure, cum melle glandem formato, & apponito. Aliud purgatorium molliens. Caricam coquito donec granula abiiciat, & hanc expressam leuissime tritam in lana cum rosaceo vnguento apponat. Aliud acrius. Brassicæ, rutæ, pares portiones tere ac vtere eodem modo.

Aliud molle & purgatorium. Medullam anseris, aut bouis, aut cerui, magnitudine fabæ, affuso vnguento rosaceo & lacte muliebri terito, velut molle pharmacum teri solet. Deinde ex hoc os vteri illinito. Aliud tepidum purgatorium. Anseris medullam magnitudine nucis, resinæ lētissimæ aut terebinthinæ magnitudine nucis. Hæc in vnguento rosaceo ad lentum ignem liquefacito, & velut ceratum facito. & deinde ex hoc tepido os vteri illinito, & pectinem mædē facito.

Aliud detrahens purgationem & sistens. Pæoniæ grana nigra aut rubra, tria aut quatuor in vino trita bibenda dato. Si verò magis detrahere voles, grana nigra eodem modo trita bibenda præbeto. Aliud purgans ac detrahens.

Lauri baccas ad summum viginti, & seselis dimidium acetabulum, cum vino trita bibat. Aliud. Tauri fel trium dimid

A dimidiorum obolorum Atticorum pondere, in vino ieiuna bibendum dato. Et efformata quoque ex ipso catapotia deuoranda dato. Aliud. Farinam recentem, myrrhae obolos tres, croci tantundem, castorij obolum, Hac cum vnguento rosaceo trita apponat. Aliud purgatorium. Semen vriticæ, & maluæ succum, cum adipe anserino tritum subdat.

Aliud. Si non purgata fuerit ex partu, floris farinæ quantum tribus digitis comprehendi potest coquito, & melle affuso, ventri velut cataplasma imposito, & bibendum dato.

Aliud quod vteros aperit & purgat. Cantharidas quinque aceto albo affuso terito, & non valde liquidum pharmacum facito, sed vt digitis effingi possit, & de ficu alba pingui, sine granulis & pelle, duplam cantharidum partem ammisceto, & efformatam glandulam tenui lana inuolutam subdito.

Aliud. Si ex partu non fuerit purgata, trifolium in vino albo bibendum dato, hoc etiam menses educit, & fetus expellit. Aliud purgans vteros. Quum puero immortuo sanguis intus manserit, colocynthidem syluestrem in melle tritam delingat, aut subdat. Aliud sanguinem purgans.

Sanguinem ex vteris expelles, si violæ albae semē tritum, vino dilutum bibendum dederis. Aliud quod similiter sanguinem ex vteris expellit. Rhoeis seminis quum rubrum fuerit, grana viridia triginta terito, & rosas caninas, rubras rubicundo ex ipsis delecto, in vino bibenda dato, quum sanguis eruperit. Aliud purgatorium. Si menses non appa-
C ruerint, styracem & organum terito, commisceto, & adipe anserino affuso apponito. Aliud quod subditum vteros purgat ac euacuat. Absinthij radicem tritam cum melle, cum oleo apponito. Subdititia vteros purgantia, aperientia, & aquam ducentia. Scillæ frustum longitudine sex digitorum, & digiti parui crassitudine accipito, & de hoc duos digitos circunderadito ac leuigato, & reliquum lana sordida inuoluito, eam verò partem quæ circumrasa est ad os vterorum subditā, per diem ac noctem appositā finito. Postquam autem lauit & abstulit, aqua odorata colluatur. Aliud pur-
gatorium molle, quod aquā & pituitam ducit, & pallidos ac horū medi-
subcruentos menses detrahit, si non diuturni fuerint, & os camentum
emollit. Vnguentum narcissinum, cuminum quod edimus, myrrham, thus, absinthiū, cupressum, salem, rosaceū oleum

Hippocratis Liber I.

sumito. Et de alijs quidem singulis congiū accipito, narcis ^D lini verò partem quartam, & omnia in glandem efformata, ac crudi lini linteo excepta subdito, aut linteum tenue pen- næ circumdato ac deligato, & in oleo albo Aegyptio tinctum apponito, & tota die appositum finito. Deinde vbi lauit & ab- stulit, aqua odorata colluatur.

H I P P O C R A T I S

COI DE MORBIS M V-

LIEB RIBVS LIBER PRI-

MVS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

P R E T E.

Cur mulie-
res crebrius
laborant.

Quæ puer-
peria facile
decurrant.

Cur steri-
les magis
afficiantur.



E muliebribus morbis sic sentio. Mulierem quæ non peperit grauius & citius è mē- sibus agrotare, quàm eam quæ peperit. Quam enim peperit venulæ fluidiores sunt ad mē- ses. Fluidas autem ipsas facit purgatio illa quæ fit à partu. Et vbi hæc erumpit, vicinæ ^F maximè ventri ac mammis corporis partes discinduntur. Discinditur item reliquum corpus, à quo verò hoc fiat, dictū est à me in natura pueri in partu. Discissio autem corpore ne- cesse est venas magis aperiri, & ampliores ac fluidiores ad menses fieri: itēque vteros magis aperiri, nimirum puero per ipsos egresso, qui & vim & dolorem induxit, & quū hæc sic se habeant, mulier purgationem à partu experta, minus laboriosè mē- sibus decurrentibus purgatur. Si verò etiam affectio aliqua mulieri quæ iam peperit accadat, vt menses venientes probè purgari non possint, facilius dolorem feret, quàm si nō peperisset. Assueti enim sunt vteri, & corpus ido- neum vt impleatur, vtpote in ventre habenti, & simul multa amplitudo in corpore est. Maior autem fit etiam amplitudo vbi peperit, nimirum corpore discisso, & corpus in amplitu- dine

A dine existens minus dolore affligitur, si non venæ superim-
plentur, & nimium doleant. At verò ei quæ non peperit,
quum corpus non alluetum sit, si impleta fuerit, & fortius ac
solidius & densius sit, si purgationem à partu experiatur: &
quum vteri ægrius aperiantur, menses laboriosè prodeunt,
& affectiones plures accidunt: vt propterea menses obturen-
tur, si prius non peperit. Habet autem res se hoc modo, velut
etiam prius à me dictum est. Dico mulierem rariore car-
ne præditam & teneriorem esse quàm virum. & hæc res sic
se habet. à ventre trahit humiditatem, & citius, & magis,
corpus mulieris quàm viri. Etenim si quis super aqua, & per **Exemplo**
regionem aquosam, duobus diebus ac duabus noctibus, mol **cōprobat.**
les lanas ponat, & vestem puram & contextam æquali ad la-
B nas pondere, sublatis vtriusque apponderatione facta, multo
graviore lanas comperiet quàm vestem. Fit autem hoc ex
eo quod semper ab aqua sursum decedit in vasa ampliora of-
cula habentia. & lanæ quidem tanquam raræ & molles, ex
decedente amplius suscipiunt. Vestis autem vt quæ plena
est & ex contextu obturata, explebitur, non multum ex dece-
dente aqua suscipiens. Sic sanè etiam mulier, velut quæ ra-
rior est, ampliorem à ventre humiditatem corpori attrahit,
& citius quàm vir. & tanquam teneriori carne prædita mu-
lieri, vbi corpus sanguine repletum fuerit, si non ab ipso se-
cesserit, carnibus impletis ac calefactis, dolor oboritur. Ha-
bet enim mulier sanguinem calidiorem, & propterea cali- **Cur mu-**
dior est quàm vir. Si verò amplior accedens sanguis sece- **lier cali-**
C rit, dolor non fit à sanguine, neque calor. Vir autem vt qui so- **dior sic**
lidior carne præditus est quàm mulier, neque in superna **quàm vir.**
ventris parte adeò sanguine superimpletur, vt nisi aliquid
sanguinis singulis mensibus secedat, dolorem fieri necesse
sit: & sanguinis quantum satis est ad nutrimentum trahit: &
quum corpus ipsi non sit tenerum, non dolore affligitur, ne-
que superincalescit à plenitudine, velut mulieri. Multum
autem confert ad hoc viro, quòd magis laborat quàm mulier.
Nam labor aliquid humoris abducit. Postquàm igitur mu-
lieri quæ nō peperit occultati fuerint menses, & viam foras
reperire nō potuerint, morbus fit. Hoc autem cōtingit, si vte **Vteri inue-**
rorum os cōclusum fuerit, aut distortum, aut aliqua pudēdi **sio.**
pars cōtracta. Si enim horum quid fuerit, menses exitum inue-

Hippocratis Liber I.

nire non poterūt, priusquā vteri ad sanā naturā redierint. **D**
 Fit autem hic morbus his maximē, quæ angustos vteros ha-
 bent, aut cervicem ultra pudendū sitam. Si enim horū alterū
 fuerit, & mulier viro non milceatur, & venter magis quā
 oportet euacuetur, ab hac affectione vteri obtorquentur.
 Neq; enim humidi in seipsis sunt, vtpote muliere nō coeun-
 te: & amplitudo ipsis spatiosa est, vtpote quū venter magis
 vacuus existat. Quare obtorquetur, dum sicciior & leuior est
 venter quā cōuenit, & aliquādo dum ipsi obtorquetur, etiā
 os ipforum distorqueri cōtingit, nimirum cervice ultra pu-
dendum sita. Si enim humidi fuerint vteri, à coitu, & venter
 non euacuetur, non facile distorquentur. Hæc igitur causa
 est vt ipsi sint conclusi, nimirum à venere abstinere muliere. **E**
 In tertiis porrò mensibus optime afficietur, si quæ prius in-
 sunt progressa fuerint educta. Sin minùs, mulier hæc patie-
 tur. Suffocatio aliàs atque aliàs in ipsa irruet, & febris aliàs
 atq; aliàs corripiet, ac horror, & lumborum dolor, hæc patie-
 tur in tertiis mensibus, si ipsi non prodierint. In quartis verò
 si non egressi prioribus exitū fecerint, etiā tunc tertij mensis
 afflictionibus omnibus magis affligetur, & maximē tēpore
mensium. Deinde minùs. Sæpè verò etiā à dolore libera sibi
 esse videbitur. Erunt autem in quartis etiā hæc signa. Vri-
 nam multam ac crassam eiiciet, aliàs atque aliàs. Et venter
 ipsius durus erit, & maior quā prius, & dentibus fremet, &
cibū auersabitur, & vigilabit. Hæc patietur in quartis men-
 sibus. Si verò curetur, etiam in his sana euadit. Et in quintis **F**
 si non multi menses descenderint, dolor adhuc fortior acci-
 dit. In sextis verò iam incurabilis est. & iuxta priora quidem
 signa magis dolebit. Deinde ad ea etiam hæc aderunt. Anxia
 erit, & aliàs atq; aliàs seipsam iactabit, & animo deficiet, &
 pituitam vomet, & sitis fortis ipsam corripiet. Nimirū dum
 exurit venter ab vteris sanguine plenis, & ad contactum
 dolebit, maximē pectinem. Et aliàs atque aliàs acutè fe-
 briet, & vteri aliàs atque aliàs murmurabunt, dum videlicet
 sanguis in ipsis commouetur ac discurrit, & venter consueto
 modo non secedet. Neque vesica urinam excolabit, maximē
 quū vteri ad stomachum qui neruosus est, mulieri allapsi
 fuerint, & ad ventrem irruerint, dolet spinam, & totum dor-
 sum, & lingua ipsius refrenatur, & hanc nō claram habet, &
 animi

Menses diu-
 tius remo-
 rati quid
 agant.

Menses sex
 mēibus re-
 tenti nō ha-
 bent mede-
 lam.

- A** animi deliquium adest. Aliquibus etiā vocis priuatio, & stomachus mordetur. & flaua bilis exit. & spiritus offendens. & anxiosa est, & iactat seipsam, & ardet. Postquam autē transmutati fuerint, & vesica tenuem sanguinē ab utero trahet, tunc vrina mingitur rubra, Et dolet quidē reliquum corpus, maximē verò collum, & spinam, & lumbos, ac inguina. Et ipsi ad hoc progressi, & venter attollitur, & crura supra modum intumescunt, & tibiæ ac pedes. & mors succedit. Et circa hāc quidem sic finiunt menstruæ purgationes ad sex menses occultatæ. fiunt item hęc. Quibusdam mulieribus menses bimestres in utero existentes multi ad pulmonem procedunt. & vbi recepti fuerint, omnia patiuntur quæ in tabe dicta sunt. & non est possibile ipsam superesse. fiunt & hęc. Mensium varius affectus.
- B** quibusdam suppurati fiunt menses, vbi per duos aut tres menses moram traxerint. Hoc autem maximē fit, si à febre fuerint combusti. Signa verò sunt si suppurati fuerint. dolores enim incidunt in pectinem. & pulsationes fortes, & contactum nō sustinet. & si melius habitura est, menses ipsi erumpunt in pudendum, & procedit pus ac sanguis, & procedit graueolens, ad septem, aut octo, aut nouem dies. In priore verò tempore dolet velut dictum est antea. Postquam autem depurgata fuerit, optimum quidem est si non fiant vlcera. Si verò relinquantur vlcera, ampliore curatione opus habebit, quo vlcera non putrescant, & graueolentia fiant. Sterilis autem euadet, etiam si melius habebit, vbi magna vlcera fuerint quæ in utero facta sunt. Menses cum non in pudendum procedunt.
- C** Si verò non contingeret, vt menses ipsi in pudendum procedant suppurati facti, ad partes supra inguen, iuxta lateris mollitudinem erumpent, circa tuberculum, vt pote pure rupto, & illa parte purulenta graueolentia procedent. & si hoc fiat, mulier non superstes manet. Si verò etiam superstes maneat, semper sterilis erit. Hac enim parte de cætero via fit mēstribus vt foras prodeant. Nam os uterorum ad hunc locum allapsum est. fit & hoc.
- Quibusdam vbi bimestres aut trimestres aut diuturniores fuerint menses, & ad lateris mollitudinem allapsi fuerint, quum non suppurati sint menses, velut tuberculum fit supra inguen, sine capite, magnum, rubrum. & vulgus medicorum ignarum quid hoc esset, iam sæpe secuerunt, & sic in Cum veteris exuberet. periculum induxerunt. Cæterum id quod velut tuberculum

lum fit, tali modo fit. Fruitur sanguine caro ipsa, utpote osculo vterorum lateris mollitudini adiacente, & impletur caro ab ipso, & insurgit ac eminet, velut sanguine repleta. Et aliquando si transmotum fuerit os vterorum, & ad pudendum conuersum, & menses processerint per pudendum, id quod circa lateris mollitudinem eminuit sedatur. In vteros enim distribuitur, hi verò foras laxatur. Si verò non conuersum fuerit os vterorum ad pudendum, circa lateris mollitudinem suppuratur, & hac parte transitus fit mensibus, & eadē pericula sunt, quæ prius sunt relata. Sed & ad vomitum conuertitur, & quibusdam in sedem, velut in virginum morbis à me dictum est, & signa & dolores eosdē ostendit, quos isthic retulimus. Ad hanc viam minus faciunt menses mulieribus quàm virginibus. Quum menses fuerint occultati, dolor habebit inum ventrem, & onus quoddam incumbere videtur, & lumbos & laterum mollitudinē mirum in modum dolet. Si verò omnino non procedunt, præ morbo aut crassi & viscosi, aut glutinosi fiunt. Primùm igitur ventrem purgare oportet sursum ac deorsum. Deinde vteros subditio medicamento, à quo sanguis purgatur. Atque ita quiescere, & potandum dare pharmacum, à quo sanguis prodeat. Bibat etiā Crethmon in vino tædaceo. Si verò fluxus ipsi non fiat, continget ut prægnans esse videatur, & dum cum viro coit doleat, ut putet quid incumbere, & grauitas fit in ventre, & venter prominet, & desiderii similibus afficitur, velut in ventre habeat, & stomachi dolore afficitur, maximè ubi quinquaginta dies præterierint. Et dolor aliàs atque aliàs habet ventrem, & partem circa vmbilicum, & collum, & inguina, & lumbos. Et postquam menses duo aut tres præterierint, quandoque menses acruatim ipsi in pudendum erumpunt, & quæ prodeunt velut carnem esse putat, quemadmodum ex fœtus corruptione & nigra. Quibusdam etiā vlcera fiunt in vteris, & opus habent diligenti animaduersione. Multis verò contingit ut putent se sex mensibus in vtero habere, aut etiā paulo breuiore tempore, & venter prominet, & alia sibi fieri putat, velut in ventre habenti. Postea sunt & quibus suppurati eruperunt supra inguen, simul cū quinto aut sexto mense, & viam ea parte patefecerunt. Quibusdam autem vlcera fiunt in vteris etiam infra sub inguine, & periclitatur mulier

Signa mensium non defluentium.

Medela.

Vterorum vlcera.
Vterorum varij morbi.

Alier de vita. Si verò etiam superstes maneat, sterilis erit. Quibusdam etiam in pudendum erumpunt, & prodeunt ipsi putrefacti ac purulenti. Et ab his vlcera fiunt in vteris, & periclitatur. Et oportet vt ne antiqua fiant vlcera, cum attentione mederi. Sterilis autem & hæc fit, etiam si fuerit curata. Si verò nō eruperint menses sex mensibus intus cōclusi, omnia patietur velut ea quæ non peperit, in qua menses viā inuenire non possunt. Et si quidem curata fuerit, sana erit. Sin minus, etiam ad octo menses durans moritur. Multis verò contingit, vt menses pituitosi ad multum tempus prodeuntes, etiā pauciores sanis sint. sana autem talis fit, si cōuenienti cura fuerit sanata. Si verò menses mulieri prodeant quidem, verum pauciores quàm conuenit, vtpote osculo vterorum paululum à pudendo emoto, aut nuper cōcluso ad hoc, vt prodeant quidē, verum obturentur ab ipsis etiā transitus, per quos penetrant vbi ad vteros descendunt: moderati sanè paulatim prodeunt, sanguine semper perfectè osculo incumbente. Et postquam dies præterierint quibus purgari solet, & conclusus fuerit sanguis in vteris relictus, & alij menses subdescendentes non expulerint conclusum sanguinem, sed semper paulatim grauant, & primis mensibus duobus aut tribus non valde prodeunt. Postquam autem plures menses præterierint, adhuc magis dolebit, & non habet in ventre, quàm diu sanè sic habuerit, & febris corripit ipsam debilis, maximè in diebus quibus purgari solet. Verisimile est autem & in intermedio tempore ipsam febrile, & horrere, & stomachi dolore vexari, & ad multitudinem addere singulis diebus. Et dolet aliàs atque aliàs corpus, & maximè lumbos, & spinā, & inguina, & articulos manuum ac pedum. Verum his locis non simul dolet, sed aliàs atque aliàs, qua parte sanguis discretus, & in vteris esse non potens impetu suo grauarit, & qua sanè corporis parte incubuerit, tumor, est fitq; etiā conuulsio fortis articularū corporis. Et aliàs aliud ex relatis antea signis ipsi apparet. Hæc siquidem iuxta debitū modum curata fuerit, sana euadet. Sin minus, morbus septimestris aut diuturnior factus, lethalis fuerit, aut claudā faciet, aut partes aliquas impotētes efficiet, si præ rigore & cibi fastidio, sanguis circa nervos compactus fuerit, quencunq; nervos cōtandem locum occupauerit. Hic autem morbus magis fit

Cur sanguis circa nervos cō-

Hic his

Hippocratis Liber I.

his quæ virum non habent. Si verò hi morbi iam relati, aut D
quicunque postea referentur, incidant in eam quæ partum
non sit experta diuturniores erunt, & minus dolorosi. Verùm
signa eadem, & iidem fines, tum ei quæ non peperit, tum ei
quæ puerperia experta est, contingunt, si nō curentur. Opor-
tet autem statim curationem facere. Sin minus statim com-
parent morbi. Si verò menses plures quàm oporteat pro-
deant, & crassiores: Nimirum corpore natura fluido exi-
stente, & osculo vterorum prope pudendum sito, & ad hæc
multo cum viro coitu vtatur, & conuiuetur, semel aliquan-
do multi descendentes, & cumulatè prodeuntes, os vterorum
& impetu suo magis dilatant. & si ad hæc non incidat vasorum
euacuatio, sed rursus multus accesserit calor, & os amplum E
faciunt, & corpus: vt pote dum conuiuante & voluptatem ac
consuetudinem viri conestante muliere, facili fluxu ad vte-
ros etiam calor defertur, & decolor erit quàm diu sic habue-
rit. & si postea morbus aliquis aut affectio inciderit, vt cor-
pus affligatur, & vteri similiter iuxta solitum morem ampli
sunt, & corpus facili fluxu in ipsos præditum est. Et post hæc
febris habet, & cibum auersatur, & anxia est, & tenuis ac de-
bilis. & lumbos ex mensibus dolebit. & progressu temporis
si non curata fuerit, omnia ipsam magis affligent in inter-
medio tempore. & periculum ipsi imminet, ne sterilis fiat,
aut à tempore & morbo vexata, si alius morbus coincadat,
ex hoc moriatur. prodeunt autem menses crassiores & plu-
rimi, in intermediis diebus. Incipientes autem & desinen- F
tes, pauciores & tenuiores. Moderati verò sunt menses
prodeuntes in omni muliere si sana sit, vt duarum hemina-
rum Atticarum mensura secedant, aut paulo plures, vel pau-
ciores. atque hoc ad duos aut tres dies. Longius autē tem-
pus aut breuius, morbosum & sterile est. Coniectare por-
rò oportet mulieris corpus inspiciendo, & interrogare col-
latione ad priora facta, an semper morbosa viuat, aut non.
Si enim pauciores aut plures dies quàm solent prodeant, aut
ipsi pauciores aut plures fuerint, morbofi sunt: Nisi natu-
ra ipsa morbosa & sterilis fuerit. Si verò hoc fuerit, & ad sa-
lubriorem statum transmutatur, melius est. procedit autem
sanguis velut à victima, & cito congelatur si sana fuerit mu-
lier. Quibus verò in natura est, vt plures quàm quatuor dies
purgen

Cur mul-
ta purga-
tiones men-
struæ &
crassæ de-
fluant.

Mensium
modus &
qualitas.

- A** purgentur, & menses valde multi prodeunt, hæc tenues sunt, & foetus ipsarum tenues, & emarcescunt. Quibus autem purgatio infra tres dies fit, aut pauci menses secedunt, hæc crassæ sunt, & bene coloratæ, virilèsque ac partus immemores, & neque concipiunt. Si suffocatio repente accesserit: fit autem maximè his quæ cum viris nõ coeunt, & senioribus magis quàm iunioribus. Leuiiores enim vteri ipsarum sunt: fit autem potissimùm tunc, vbi mulieri vasa euacuata fuerint, aut plus solito laborarit: resiccati à labore vteri cõuertuntur, ut qui vacui sint ac leues. Est enim ipsis locus spaciosus ut conuertantur, utpote vêtre vacuo existente. Dum autem cõuertuntur, impetunt hepar, & iuxta consistunt, & ad præcordia irruunt. Currunt enim & progrediuntur sursum ad humiditatē, tanquā à labore magis quàm opportunū est resiccati. Hepar autē humidum est. Postquā autē impetierint hepar, suffocationē faciunt, derépente perspirationē circa ventrē intercipientes, & aliquādo simul incipiunt hepar impetere, & à capite pituita defluit ad præcordia, velut ab eo quod suffocatur, & aliquando simul cū pituitæ defluxu, descendunt ab hepate ad locum suū, & cessat suffocatio. Descendunt autē detrahentes humiditatē, & grauati. Stridor autē ab ipsis fit, dum ad suā ipsorum sedem procedunt, postquā autem eò deuenerint, aliquando venter post illa humidior fit quàm superiori tēpore. Laxatenim iam caput pituitam in ventrem. Vbi verò apud hepar & præcordia fuerint vteri, & strangularint, mulier albas oculorum partes subuerit, & frigida fit. Sunt autē & quæ liuidæ fiunt.
- C** Quædam etiam dentibus frēdunt, & saliuæ ad os fluunt, & similes sunt his qui ab Herculeo morbo detinentur. Si verò diutius moram traxerint vteri apud hepar & præcordia, mulier strāgulatur. Quādoque verò vbi mulier vasa euacuata habuerit, & insuper laborarit, vteri cõuersi ad vesicæ stomachū allabuntur, & vrinæ stillicidium inducunt. Aliud autē nihil mali habet, & curata citò sanescit, quandoque etiam sponte. Quibusdam verò ex labore aut inedia, ad lumbos aut ad coxas allapsi, dolores exhibent. Si mulier corpore male habuerit, & menses biliosi prodierint, ex hoc probè cognoscibilios. Nigri sunt valde, quandoque verò nigri aut splendidi, & paucissimi prodeunt, & citissimè congelantur, & semen amborum, & maris & foeminæ euanescit, & non habet

Suffocatio
nis vuluæ
caussa quæ-

Menses bi-

Hippocratis Liber I.

Febres erraticæ.

Cum femina corpus male habet menses minores defluunt.

Profluviorum consuetudo.

Vterorum vlcera.

habet in ventre, & incipiente quidem morbo, purgatur diebus quibus solita fuit, non pluribus, progredientibus autem mensibus, pluribus diebus purgatur, & menses pauciores singulis diebus apparent. Et febres succedunt erroneæ acutæ, cum horrore & cibi fastidio aliàs atque aliàs, & stomachi dolor, & dolebit maximè ubi menses ipsi appropinquarent. Postquam autè purgata fuerit, & ad modicum tempus, superiorum respectu melius habuerit, postea rursus ad idem pertinet. Dum autè curatur, citò sana fit. Si verò non curetur, & tempus procedat, omnia prius relata valde ipsam affligent, & dolor corripiet, nunc venter partem infra umbilicum, nunc inguina, nunc lumbos & coxendicum ad sedem iuncturam, nunc collum. aliquando verò stragulatio fortis accidet, & caligo ante oculos obuersabitur, & vertigo, utpote purgatione sursum vergente ac ascendente. Si enim corpus male habuerit mulieri menses pauciores fiunt, & quibus corpus plenum fuerit, his menses plures prodeunt. At verò biliosa si menses prodeant, pusillanimitas incidit, & cibi fastidium aliàs atque aliàs, & anxietas, ac vigilia, & eructat frequenter, & non vult deambulare, & tristis est, & non videre sibi videtur, & timet. Et si curetur, ex his sana erit. Si verò tempus processerit, adhuc magis dolebit. Optimè autè cum hac agatur, si vomitus biliosus succedat, aut venter turbetur, non fortiter, & subeant biliosa. & si fluxus succedat ipsi non fortis. Si enim quid ex his fortè inciderit in corpus afflictum, periclitabitur. Si verò leniter depurgetur aliquid biliosi aut totum id quod molestum est, sana fiet. Si verò neque curetur, neque quicquam horum fiat, moritur mulier, plerumque tamen contingit ut fluxus incidat biliosus ex hoc morbo, & si fluxus fiat, primum quidem pauca sunt quæ cõparent: per omnes autè dies omnino plura contingunt. Temporis autem progressu plerumque etiam morbus acutus fit: & vteri à purgatione biliosa prodeunte mordentur, ac exulcerantur. Sed & in hoc adhuc sana fit, si curetur, & fluxus compescatur. Si verò vteri ab vlceribus fuerint inflammati, adhuc acutior morbus erit, & multa graueolentia ac purulenta prodibunt, ab ipsis vteris iam egressa, & semper velut aqua de carnibus, & prius relata omnia ipsam magis affligent, & vlcera adhuc magis efferatiora erunt, donec ipsam vincant. Si verò etiam sanata fuerit, sterilis erit à cicatricibus. Si mulier corpore

- A** corpore malè habuerit, & pituitosi menses prodierint, cognosci autem possunt si pituitosi prodeant. Pelliculosi enim apparent, & velut araneorum casles distenduntur, & subalbidi sunt. Hoc autem contingit, si corpus & caput ipsi pituita repleta fuerint, & hæc non subpurgetur, neq; per nares, neque per sedem, neque per urinæ meatum. Sed in mensibus, & in turbatione sanguinis, vnà cū purgatione foras exit. Et si hæc sic habuerint, ad duos quidem aut tres menses nihil egrotat. postquam autem amplius tempus progressum fuerit, & non curetur, magis dolebit, & febris erronea corripiet, & cibum aliàs atque aliàs fastidiet, & stomachum dolebit, & maxime dolebit vbi menses appropinquant. Quñ verò purgata fuerit, ad modicum tempus, superiorum respectu melius habebit, postea ad idem relabitur, & si non curetur, sed tēpus procedat, fient ipsi omnia quæ ei cui biliosi menses prodibant, donec fluxus sistatur. Consequitur etiam vt hæc fluxum pituitosum habeat, aut alia quæ ego dicam paulò postea. Et si quidē fluxus succedat, semper procedūt per omnes dies, nunc acervata, nunc pauca, & quandoque velut à carnibus aqua prodit, quandoque velut sanies, & in hoc ipso multi sanguinis grumi insunt, & radit terram velut acetū, & mordet vbiunque mulierem contigerit, & vteros exulcerat. Et vbi ad hoc peruenit, reliqua quidem similiter patitur, velut prior. Minus verò quàm illa caput dolebit, & vlcera neque deformia, neque magna, neque purulenta, neque graueolentia, similiter velut illi fiunt, sed minùs huic. Si verò curetur, sana euadit, etiam vbi morbus progressum fecit, & non valde moritur. Verùm prægnaus esse non potest quæ sic habet. Quæcunque viro cohabitantes in ventre habere non possunt, interrogandæ sunt, an ipsis menses prodeant, aut non: & an purulenti sint, aut frigidi. Si quidem igitur responderit, interrogetur an statim exeat genitura, an postera die, aut tertia, aut sexta, aut septima. Si igitur dixerit statim exire vbi coiuit, vteri osculum rectum non est, sed distortum, & geniturā nō capit. Si verò dixerit, postera die, aut tertia, vterus perhumectus est, & semen eluitur. Si verò sexta aut septima, semen computrescit, putrefactum verò exit. Si igitur ab initio nō suscipiat semen, os vteri primū curandum est, vt rectum sit. Si verò eluatur postera, aut tertia die, vterus & caput. Si

Pituitosi
menses.

Qualis vexatio in
his.

Fluxus pituitosus.

Quid in his
agendum,
quæ nō concipiunt.

Mensium
cognitio.

put. Si verò computrescat & exeat, & uterus, & totū corpus **D**
curetur. Atque hac singula sic cognoscere oportet, Quali ve-
rò purgatione opus habeat, hoc modo cognoscit. Quum
menses prodeunt, linteum complicatum palmi magnitudi-
ne super tenuem cinerem expandito, deinde ut quæ exeunt
super hoc defluant curato. Præstat autem duo esse lintea,
vtrunque seorsim, alterum diurnum, alterum nocturnum, &
diurnum quidem, postera die lauare oportet. Nocturnū ve-
rò, ubi per diem ac noctem super cinere situm fuit. In lo-
tura verò considerare oportet, qualiānam fiant lintea lota,
ubi in sole fuerint siccata. Optimum tamen est in tenebri-
coso loco ea reliccari. Si quidē igitur pituita fuerit quæ con-
ceptionem impedit, mucosa lintea erunt. Si verò propter sal- **E**
suginē & bilē impeditur, fulua & subliuida. His igitur con-
sideratis, & diligenti animaduersione expensis, totum etiam
corpus inspicito, an multa purgatione opus habeat, aut se-
cus, ita ut & ad colorem, & ætatē, & robur, & anni tempus, &
qua diæta vtantur respicias. Curatio verò & totius corporis
est, & uteros ac osculum ipsorū sanare, & si hoc conclusum
fuerit, aperire. Si verò illi distorti fuerint, dirigere oportet.
Si autem humidi fuerint, resiccare, & alia quoq; facere con-
traria. Fæmē autem omnibus multa curatio eadem est, ex-
cepta mensiū detractiōne. Nam quibus nihil prodiit, his de-
trahere oportet. Imò quicquid in mensibus mali inest, hæc
auferre oportet: quum videlicet pituitosi sunt, & pelliculosi,
& saniosi, & tenues, aut albi, & grumosi: & quum nigri sunt, **F**
& carbūculosi, aut caliginosi, aut acres, falsi, turbati, purulen-
ti. Hæ omnes causæ tollendæ. Prohibēt enim in ventre con-
ceptum. Quibuscūque igitur menses pituitosi ac pelliculosi
sunt, hæ carnosæ sunt, & his os humectum est, & saliuā multa
ac viscosa. Et si acidum aut acre quid gustarint, sputū in ore
liquidius erit, & insulsum, & ad omnia quæ ederint aut bibe-
rint, turbatio sequitur, & supprimitur ipsis ac attollitur ven-
ter, & nausea adest, & anxietas ac iactatio multa. Et à capite
fluxus defluit, & omnia obducit, & multā humiditatem in-
ducit, & partes sub oculis liuidæ sunt ac inflatæ. Has totas
fouere oportet & frequenter vomere, & à cibis, & ieiunare.
Infernum autem vētrem mollire, sed pharmacis omnino le-
uibus, quæ minimē bilem ducunt, & semel in die cibum ca-
pere

Medela.

Medela.

A pere, & frequenter exerceri. Et cibo siccissimo uti, & potu paucissimo meraciore. Melius autem est ut venter facile solibilis conseruetur. Verum uteros si ad hanc dietam non paruerint, pharmacis subdititiis non mordacibus purgare oportet. Fomentum tamen semper purgationibus præmittendum est prius id quod ex fœniculo paratur. Deinde quod ex suffimentis. Fomenta verò & subditiōes medicamentorum facito coniectura facta ut omnia fiant, & pro ratione adhibeantur, quo tempore menses prodeunt. Si quidem igitur puri & sinceri & cruenti fiant, ita ad virum accedat incipientibus mensibus. Optimum autem, desinētibus, & adhuc euntibus magis quam ubi disparuerūt. Quum autem ad virum itura

B est suffimentum quoddam ex adstringentibus suffiat. Atque hoc per canistrum, & arūdinem, pharmaco calido cineri insperso. Quum verò insperferis, & canistrum, sine operculū circumponito, & per arundinem insidenti fomentum adhibeto. Vbi verò opus fuerit ipsam suffiri, plumbea fistula utere, ut aperto osculo suffiatur. Deinde cum surrexit, rursus in lecto plumbeam fistulam apponat, Deinde ea subtracta cum viro coeat. Et si ea quæ à viro prodeunt, non fuerint ei manifesta, extentis & alternatim politis cruribus quiescat. Ieiunium autem utile est in hac die, præterquam si cyceonem velit non falsum in aqua. Hunc autē tunc bibat quum vult suffiri. Si verò ubi cum viro coiuit, postridie detineat geniturā, & neq; altera die exeat: à cibis quidem & balneis prohibeatur.

C tur. Bibat autem polentam in aqua non falsam, bis ac ter in die. Atque hæc diætā sit per sex dies, aut quod melius est, septem, si non exierint ea quæ à viro suscepit dum cum ipsa coiuit. Illota verò maneat per omne tempus, & det operam ut motus vitet. si verò deambulare velit, deambulet in loco plano & leui, nequaquam accliui, neq; decliui. Desideat etiā super mollia, si conceperit. Reliquam verò dietam eandē faciat vsque ad dies triginta. Illota autem sit, aut si lauare opus habeat, pauca & non valde calida lauetur. Caput verò ne mafaciat. Cibis autem utatur & panibus, & maza si velit. Ex carnibus autē, palūbe, & similibus. ex marinis, his quæ aluū sistūt. prohibeatur ab oleribus acribus. Vino verò nigro utatur. Carnibus autem assatis potius quam coctis, tum mansue ris, tum ferinis. Et hæc quidem si conceperit, hoc modo facere

Vterorum
purgatio.

post viri
cōgressum
quid agat.

Quæ semen cere oportet. Si vero non conceperit, sed secunda aut tertia **D**
non continet die exeunt ea quæ à viro immissa sunt, fluentia cum multa
quid agat. humiditate: manifestum est quod vteri sunt humidiores. Cu-

rare itaque oportet iuxta relatum modum, donec sicci fiant.
Quum virū autem sicci esse videbuntur, sic curato. Optimum est
adeat hæc pharmacum mollitorium, & retro, & anteriori parte ipsi ad-
mulier. hibitum, donec vteri ad naturam suam redeant, & rursus ad
virum accedat, quum menses non amplius multi, sed pauci &

bene colorati fuerint, & ad libidinem concitatur. Sed & in
aliis diebus cum viro consuetudinem habere oportet, si opti-
me habuerint vteri. Quum autem in relatis diebus consue-
tudinem habuerit cum viro, si probè parati fuerint vteri, &
si geniturā ad decem aut duodecim dies detinuerit, ne adeat **E**

Cur nō cō- virum Si verò non concipiat, vteri autem sani sint: con-
cipiāt sanq̃. tingit enim & hoc plerisque, quum debiles existentes vteri,
ab affectione macilenti fiunt: aut præ medicamentis & fo-
mēto multo, genituram ferre non possunt, priusquam assue-
ti fiant & conualescant. Hoc autem sic cognosci potest. Quū
ab ipsa exierint, secūda aut tertia die exeūt, aut adhuc prius,
crassa & compacta velut mucus: nisi mali quid sit, & propter

Curatio.

alium vterorum morbum genitura discedat. Quum igitur
talìa apparuerint, curatione quidem vterorum non est opus,
verū reliqui corporis cura habenda est, quo huiusmodi bo-
nus habitus sit ipsi, vt contractū simul sit corpus, & iusta mo-
le præditū, ex paucorum balneorum, plurium verò & leuiū
laborum usu, Ab acribus autem & salis prohibeatur. Vomi- **F**
tibus vtatur ante dies quibus menses fieri solent, & rursus fa-
me maceretur, & alia perficiat quæ dicta sunt. Atq; hæc qui-
dem harum curatio est. Quibus autē statim vbi coierint

Quum sta-
tim postcoi-
tum genitu-
ra exit.

Medela.

Quum os
vteri est di-
stortum.

Medela,

diffuunt ea quæ à viro sunt immissa, his os vterorum causa
est. Curare verò sic oportet. Si quidem valde conclusum fue-
rit, tædis & plūbeis fistulis immissis aperito, & molli fomen-
to ex fœniculo foueto, & subdititiis, quæ vteros attenuant,
& in directum redigūt, purgato. Post purgationes autem &
fomenta, ea infundito quæ causæ sunt contraria. Quibus
verò os distortum est, & ad coxam allapsum: sunt enim etiā
talìa prohibentia ne vterus semen suscipiat: Quum igitur ta-
le quid acciderit, odoratis fomentis fouere oportet, post fo-
mētum autē per digitum auulsum à coxa detrahito. Quum
autem

A autem discesserit, tedis & plumbéis fistulis immisis iuxta priorem rationem in rectitudinem dirigit. ubi, verò rectificari ac aperti fuerint vteri, medicamentis subdititiis purgato, & alia facito iuxta relata rationem. *Quum autem ma* *Cum vteri nimis hiat.*
 gis quàm oportet aperti fuerint vteri, purgatione opus habent. post purgationes autem, collutionibus & suffimentis. Si verò propiores sint quàm oportet, vomitibus vteri opus habent, & fomento foetido, donec ad suum locum redeant. Dieta verò vtendum est relata. Si verò os pingue fuerit & crassum, & propterea non concipiat, sinapi coctum ieiuna edat, & meracum insuper bibat. Apponat autem nitrum rubrum. & cuminum, ac resinam. Optimum autem fuerit nitrum vino ammiscere & resina, vnà cum cumino & vnguento albo. Aut cornu cerui vrito, & duplum crudæ ordeaceæ farinae cum vino ammisceto. Si verò non melius habeat, porrum coquito, & ipsam insidere facito. Aut phagum id est glâdem tritam apponat. Et allio recenti vescatur, & aqua mulsa insuper pota vomat. *Quibus porro intus manet viri semen & computrescit, & turbationem facit, his attriplicis semen aut succum, cum melle aut cum cumino delingendum* *Quum semen intus putrescat.*
 dato. *Quum autem à viro immissa graueolentia fuerint, nō concipit. Portulacā igitur & adipem anserinum misceto & apponito. Quibus verò sexta aut septima die, à viro immissa prodeunt putrefacta his verisimile est ab vtrisque fieri, & bilis, & fæculis influxu. Curare autem sic oportet, per* *Curatio.*
C yeratrum, aut scammoniam, aut peplium. Hæc enim sursum ac deorsum pituitam & bilem purgant, & flatu educunt. Ante purgationes autem fomentis vtendum est, ex suffimentis. Vbi verò fomentū adhibueris, per subdititia purgato, eodē modo velut in prioribus. Et post subdititiorum ac purgationum vsum, mollitoriis vtere, & subdititio medimamēto ex mercuriali & artemisia herba, & anemona, & veratro albo & nigro. Atque hæc quidem medicationes hoc modo his conducunt. Dietam verò respectu, ad totum hominis corpus facto constituere oportet, siue siccior, siue carnosior mulier esse videatur. Et si quidem siccior fuerit, balneis pluribus, & obsoniis omnibus coctis, tum marinis, tum carnibus *Vterorū humescit.*
 vtatur. Vino verò aquoso, & oleribus coctis, & pinguibus omnibus ac dulcibus. Hæc enim plerunque faciunt vt humi-
 I ditas

ditas sit, tum in reliquo corpore, tum in vteris. Si verò humi-
dior fuerit, tales vteri nullo ex his opus habent, sed vice ver-
sa neque contrectare, neque lauare recenti motu facto oportet,
neque suffire. Nam ad periculum hæc procedere solent. Et si magis quàm pro natura fuerint humectæ, siccare sanè,
ac suffire oportet. Si verò biliosa in ipsos confluant, medica-
mentum dare quod bilem purgat. Si verò falsuginosa, lac
aluminum, & vinum, & alia auxiliaria. Morborum porro vi-
res considerare oportet, & causas ex quibus morbi fiunt ex-
quirere, atque sic ad alia procedere, & morbos circa locos
curare. & quæ quidem ob causam osculorum hiantium pro-
hibentur, vt ne detineant in ventre, horum oscula prepara-
re, vt probè diducta sint. Quum verò humiditas prohibe-
rit, hanc inspicere vt ne impediat, totis mulierum negotiis
expensis, siue ex toto corpore, quid moueri videatur, siue ex
ipsis vteris, siue ex vtrisque. Vteros autem sic curare oportet,
vt neque humidi sint, neque valde sicci. Imò sicciore
quidem, tanto magis bono succo, quanto sunt sicciore, eius-
modi humiditate vt pingues magis fiant quàm graciles. Hu-
mectos verò & madidos siccare, ita vt relinquantur quo humidi
sint, & non valde resiccentur. Excessus enim in his valde sunt
vitandi. Concipit autem in ventre, neque ea quæ humidita-
tem habet, neque quæ resiccata est, nisi quid horum in vteri
natura fuerit. Cæterum virum adire ipsam oportet, post

Adhibitam curationem, desinentibus aut inchoantibus men-
struibus. Optimum est etiã vbi quieuerint. Maxime verò in his
diebus expeririendũ est, an pragnans fieri possit. hi enim sunt
opportunitissimi. Si verò nõ statim concipiat, & reliqua be-
ne habeant, nihil prohibet etiam aliis diebus cum viro coi-
re. Nam hæc exercitatio alacritatem ipsi inducit, & venulæ
hinc laxantur: & si ea quæ à viro prodeunt concurrerint se-
cundum reſtitutionem cum eo quod à muliere, citius concipiet.
Hæc enim causa est his, quibus siue statim, siue poste-
riore tempore exeunt. Atque hæc quidem de his dicta sunt.

Quæ duri-
tiam vul-
uarum tol-
lant.

Si verò humidius fuerit os vterorum, genituram attrahere
non possunt. Utendum autem est medicamenti subditiis
acribus. Commorsus enim & inflammatus stomachus soli-
dus ac firmus quandoq; fit, & aliquo modo accommodatur.
Sed & si in callum indurati fuerint, præstat acrima apponere
quæ

A quæ mordeant. Quæ enim tenuia & feruida sunt, calli duritiam diffundunt. Si verò mollitus fuerit callus, mollibus curato, & his quæ non mordent. Quòd si diu non concipiat, mē Medela nō libus non apparentibus, quum tertia aut quarta dies aderit, cōcipientis. alumē tritū, vnguēto dilutū, & lana exceptū apponito, & habeat per triduū. Quarta verò die fel bubulum siccū in oleo feruefacito, & lanā tenerā eo imbutā subdito, & habeat per triduum. Postridie autem eximat, & cum viro coeat. Si genituram non suscipiat mulier, mensibus secundum naturam prodeuntibus, mēbrana præposita est, sit etiam ex aliis causis, cognosces autē vbi digito obicem cōtigeris, facito autem medicamentum subdititium, resinam & aris florem cū melle subacta in linteo apponito quā penitissimē, filo ad extremitatem alligato, vbi verò hoc extraxerit, myrtum in vino coquat, & vino tepido perluatur, præstat autē membranā auferre. Sunt autem mulieres quæ facillē quidem in ventre concipiunt, gestare verò non possunt, sed fœtus ipsis cor rumpuntur, aut tertio, aut quarto mense, nulla causa accedēte, neque cibo incommodo ingesto, & hæc est causa quæ relata est, & maximē quum vteri augmentum fœtus dimiserint. aut venter ipsis turbetur. Debilitas autē, & febris vehemēs, & cibi fastidiū incidit eo tempore quo fœtus corrumpunt. Est autem & hæc causa, si vteri fuerint leues, aut natura, aut vlceribus in ipsis innatis. Si enim leues fuerint, quandoque continentem ipsum pelliculæ, minùs quā oportet. coharēt: Partus retinendi cura

C vtpote quū vteri ipsi pleni existant, cognouerit autem quis hæc singula, si de his exactē interroget. De leuitate verò cognouerit, si alia mulier cōtigerit, dum vteri vacui sunt. Non enim hoc tempore manifestum sit. Si verò menses prodierint his aceruatim prodeunt. Quibusdam tamen ipsarū contingit vt fœtus edant. Et si qua curetur, spes partus adest, & de his quidem sic habet. Si mulierem puerperam facere velis, aliàs concipere nequeuntem, menses cōsiderare oportet, an pituitosi sunt aut biliosi. Cognosces autē sic. Arenā tenuē ac siccā subiicito, & quum menses prodeunt, in sole sanguinem superfundito, ac siccare finito. Et si quidem biliosa fuerit, sanguis in arenā siccatus pallidus erit. Si verò pituitosa fuerit, velut mucus. Vtrum igitur horum fuerit, ventrē purgato, siue supra opus habuerit, siue infra, postea vteros purgato

Hippocratis Liber I.

Quæ fœcū gato. Si verò concipere voles, hederæ grana septem, aut fo-
ditatem pa- lia, singulis mensibus in vino veteri, cessantibus mensibus
r. nt. bibenda dato. Et malicorium in vino odorato meraco coqui-
to, & glandem ex hoc factam in meridie subdito. Aut alumē
Aegyptium tritum lanæ illigatum apponito. Quum autem
sol occiderit, eo detracto, vino odorato perluatur. Hæc autē
cessantibus mensibus facere oportet. Sed & hoc sic habet.

Conceptus tempus. Quum purgatæ fuerint mulieres, maximè in ventre con-
cipiunt cum viro consuetudinem habentes, & genitura ipsis
confirmatur, si quando oportet coierint. Et semen viri fa-
cile ammiscetur, & si prævaluerit, illi accommodatur ac ap-
propriatur. Tunc enim maximè os uterorum hiât, & disten-
tum est post purgationes. Et venæ genituram attrahunt. At
in priore tempore, & os uterorum cōclusum est, & venæ ma-
gis sanguine plenæ existentes, nō similiter genituram attra-
hunt. Si verò genitura iugi cursu defluat, mulier viro mi-
sceri non cupit, & si misceatur, non concipit: & lumbi ac co-
xendices doloribus vexantur, & febris debilis corripit, & im-
potentia ac animi deliquium succedit, & aliquando uteri in
suo loco non sunt. Si quidem igitur præ plenitudine defluat,
finere ipsam optimum est. Si verò uterus latus fiat, diætæ sit
alica, caro suilla, aut palumbis, & vinum nigrū, portiones ve-
rò, quæ ad fluxū describentur. Nunc porro dicam de mor-
bis earum quæ in ventre habent. Pronūcio autem de mulie-
re in ventre habente duos aut tres menses & ultra, si menses
statim prodeant singulis mēsis, necesse est tenuem ipsam
fieri ac debilem. Quandoq; etiam febris ipsam corripit his
diebus, quàm diu menses prodierint. Et dum prodeunt, &
postquàm prodierint, pallida fit. Sed & pauci prodeunt. His
uteri magis quàm opportunum est, hiant, & augmentum fœ-
tus dimittunt. Descēdit enim quum mulier in ventre habet,
sanguis paulatim in uteros à toto corpore, & in orbem circa
id quod in uteris est circumstans, illud auget. Si verò hiant
uteri magis quàm oportet, sanguinē singulis mensibus, ve-
lut procedere solet, dimittunt. Et quod in uteris est, tenue ac
debile fit. Si verò curetur mulier, melior & fœtus, & mulier
euadit. Si verò non curetur, fœtus corrūpitur. Sed & ipsa pe-
riclitatur, ne diuturnum habeat morbum, si purgatio plus
quàm oportet prodeat. Quia & post corruptionem pericu-
lum

Viæus ra-
tio.

Prægnatiū
mala.

Alum imminebit, nimirum vteris magis apertis, Si verò ^{Causa va-} mulieri in vtero habenti caput pituitosum fuerit, & pituita-^{ria abor-} acris in ventrem descenderit, & à capite ventrem perfrun-^{tus.} pit, & febris debilis ipsam corripit, & palpitaciones quibus-
dam debiles subexolutæ, augescentes acutæ. Si verò etiam
cibi fastidium, & impotentia corripit, periculum est ne
breui fœtus corrumpatur. Sed & ipsa in periculum adduce-
tur, si non curetur. vbi verò effugerit, vt pote ventre fluido
existente, statim concludere ac constringere oportet. Multa
verò etiam alia sunt pericula, in quibus fœtus corrumpun-
tur. Nam si mulier in ventre habens agrotarit, aut debilis
fuerit, aut onus leuarit, aut percussa fuerit, aut saltarit, aut
B cibum fastidierit, aut animi deliquio correpta fuerit, aut
amplius aut minus nutrimentum accipiat, aut timeat, &
consterneretur, aut vociferetur, aut intemperanter viuat. fœ-
tum corrumpet. Nam & cibus corruptionis causa est, &
potus multus. Sed & ipsi vteri naturas habent, quibus
abortum faciunt, quum sunt flatusosi, densi, magni, parui,
& alia his similia. Si mulier in vtero habens, ventrem aut ^{Quam fa-} lumbos doleat, formidare oportet ne fœtum per abortum ^{cile abor-} edat, pelliculis qui ipsum continent ruptis. Sunt etiam quæ ^{tus fiat.} fœtus corrumpunt, si acre quid, aut amarum ederint, aut
biberint præter consuetudinem, dum adhuc paruus intus
est puerulus. Si enim puero quid accidat præter consuetu-
dinem, & si paruulus adhuc fuerit, moritur. Et si eiusmodi
edat aut bibat, velut diximus, vt necesse sit ipsi turbari ven-
C trem, dum adhuc paruus est puer. Percipiunt enim & con-
citantur ipsi vteri, fluxione ex ventre secedente. Et si la-
borauit mulier plus quam oportet, & ventet ipsius conclu-
datur, aut magnus fiat, etiam sic puer corrumpitur, velut
à labore calefactus, & à ventre pressus. Plerumque enim
dum parui sunt, debiles sunt. Quidam verò etiam magni
corrumpuntur, Quare mirari non oportet mulieres, quod ^{Pregnan-} inuitæ corrumpunt. Nam custodia & scientia multa opus ^{tium varij} est, vt in vteris gestent puerum & enutrient, & vt euadant ^{affectus.} ab ipso in partu. Si verò mulier in ventre habens corpo-
re male habeat, & fuerit biliosa & doloribus vexata, & aliàs
atque aliàs febricitet, & os examarescat, & lingua cum vi-
rore pallida fiat, oculi velut morbo regio affecti, ungues bi-
liosi

Hippocratis Liber I.

liosī, vrina acris: hæc tum aliās, tum si febricitet, aliās at- D
que aliās ipsi accident: postquam verò etiam purgationem
contigerit biliosam esse, planè timendum est etiam pueros
debiles fore: hæc si biliosa per secessum egerat (id quod val-
de contingit) meliùs deget. Et si biliola aut valde nigra
sunt partus purgamenta, etiam vt plurimum pinguedo suc-
cedit, & prodeunt paulatim, & non cito congelantur. &
primo quidem tempore leuius fert, postea verò grauiùs, &
minùs purgatur quàm oportet. Si enim corpus malè habue-
rit, etiam partus purgamenta pauciora ac deteriora ipsi pro-
cedent. Patietur autem & hæc omnia, etiam si menses pro-
deant biliosi. Verùm breuiori tempore agrotabit. Et mor-
bus ad eadem pericula, & signa, & transmutationes deue- E
niet. Aut enim ipsi vomitus biliosus, aut purgatio per ven-
trem, in hoc morbo fit, & vteri exulcerantur. Multa verò cu-
stodia mulier opus habet. Quum igitur tale quid factū fue-
rit, vt ne moriatur, sterilis erit. Si verò nihil horum fiat, &
non curetur, sed partus purgamenta fuerint ipsi occultata, in
triginta & vna diebus vt plurimum moritur. Huic pharma-
cum in potu exhibendum est quod bilem ducat. Prodest &
anisum, & quæ ad vrinam ciendam dantur. Vomat autem
& sudores eliciantur, & alius succo ptisanæ, & melle, & ouis,
& maluæ aqua infusa eluatur. Quibus in ventre habenti-
bus circa septimum aut octauum mensem, derepente man-
marum & vëtris plenitudo collabitur, & vbera gracilescunt,
& lac non apparet, his dicendum est, puerum aut mortuum F
esse, aut viuere & debilem esse. Si enim in ventre habuerint,
& apparuerint menses: aut abortus fiunt, si plures fuerint &
male olentes, aut fœtus morbofi fiunt. Si mulier in ventre
• habens pituitosa fuerit, & caput dolet, & aliās atque aliās fe-
brit, & in capite obuoluitur pituita. Et grauitatem exhibet
ac frigus, & in corpus procedit, & in venas, quum caput fue-
rit repletum. Fit etiam colore plumbo similis, & vomit pi-
tuitam, lingua alba est, & vrina communiter exalbescit, fri-
gida est, turbatio adest, & ager motus. Vbi verò pepererit,
procedet ipsi purgatio pituitosa & apparebit pelliculosa, &
velut arancorū casses in hac distēti erūt. & patietur quidē ea
de omnia etiā ea cui menses pituitosi prodeunt. verū breuio-
re tēpore agrotabit. & eadē pericula, & signa, & transmuta-
tiones

Medela.

* Quid signi-
ficet partū
periisse.

A tiones morbus habebit. Cōtinget enim ipsi vomitū pituitosum fieri, & affectiones similes velut illi accident. Dependent enim eodē modo partus purgamenta, & menses pituitosi, verū purgamenta partus breviori tempore quā menses, & nisi eruperit ipsa purgatio quæ diu moram traxit, moritur in quinque & quadraginta diebus, etiam si pituitosum partus purgamentū ipsi prodierit. Curata autem mulier, sana fit, & inhabitur ab initio si sanata fuerit, grauis enim erit hic morbus. Huic dare oportet phar̄macum quod pituitam ducit, & lac caprinum coctum cum melle miscere. Si verò sepe nō obediat, nasturtiū, aut enicum, aut cneorū, aut poly-

Periculum
mortis in
prægnante.

Medela.

B hibeto, & quæcunque pituitam laxant, ac educunt. Si verò mulier in vtero habens, lienosa sit à relatis affectionibus, in hoc morbo menses hydropi similes & pituitosos demittit, & partus purgamenta procedent hydropi similia, & prodibunt modò multa, modò pauca, & fiunt quemadmodum aqua à carnibus, velut si quis carnes cruentas abluat. Aliquando verò paulò crassiora, & non cōgelantur. Et patietur eadem omnia etiā ea cui menses aquosi procedunt, & pericula eadem ac trāsmutationes morbus habebit. Continget enim ipsi fluxum aquosum fieri, aut purgationem occultari, & ad ventrem conuerti, & ad crura, aut ad pectus, aut aliquam harum partium, & pericula erunt eadē quæ prius sunt relata.

Prægnas
lienosa quid
patiat.

C Si prægnans intumescat, vrticæ semen plurimum, & mel, & vinum dilutum odoratum potandum dato, bis in die. Si prægnatē bilis vexet, ptisanæ succum dato, rhoe rubro insperso, aut eo qui ex moris paratur. Sorbeat autem frigidam, & sistetur. Si suffocatio derepente accadat prægnanti. Fit autem hoc maximè vbi mulier laborarit, & cibum fastidierit, vteris à labore calefactis, & pauciore humore fœtui accedente. Et quum vterus ac venter inanior sit quā oportet, procedit fœtus ad hepar & præcordia, ut quæ sunt humectata, & suffocationem fortem derepente inducit. Intercipit enim perspirationem circa ventrem, & mulier voce priuatur, & albas oculorum partes subuertit, & reliqua patitur omnia quæ relata sunt, si mulier non præguans ab vtero suffocetur. Quin & suffocatio fieri incipit mulieri in ventre habenti, quum à capite defluit pituita ad præcordia, ut pote

Suffocatio
vulæ cur.

corpore respirationem trahere non potente. Et si quidem **D** vnà cum pituita descensu, fœtus redierit ad suum locum, velut qui humorem attraxit, & à pituita delatus sit, mulier sana fit. Stridor autem fit fœtu locum suum occupante. Et venter mulieris ut plurimum humidus fit. Si verò non breui redeat fœtus in suum locum, duo iam fiunt quæ fœtum affligunt, pituita quæ à capite descendit, grauat enim & insists frigefacit: & loci alienitas, & periclitabitur. Et si non breui quis commodiorem diatam adhibuerit, mulier suffocabitur. Et de his quidem sic habet. Si verò mulieri in ventre habenti, tempus partus iam affuerit, & dolor partus tenuerit, & ad multum tempus mulier puerum edere non poterit, omnino obliquus aut in pedes procedit. Utile est autem in caput procedere. Et si obliquus procedat, difficilis fit affectio. Sicut enim si quis in vas olearium angustis oris nucleum immittat, non proclive est extrahere ipsum obliquatum. Sic sanè etià mulieri grauis affectio est, vbi fœtus fuerit obliquatus. Difficile est enim ipsum exire. Graue autem est etiam si in pedes processerit, & sæpe aut matres pereunt, aut pueri, aut ambo. Est autem & hæc magna causa ut non facile exeat, si mortuus, aut syderatus, aut duplicatus fuerit.

Partus difficultas.

Cur grauida pallidescat.

Parturitionis signa.

Quum mulier in ventre habuerit, tota fit cum virore pallida, quoniam purus ipsius sanguinis semper quotidie ex corpore destillat, & in fœtum descendit, & augmentum ipsi accedit. Et quum paucior sanguis sit in corpore, necesse est ipsam esse pallidam, & semper alienos cibos appetere, & sanguinea in ventrem intrare. Et debiliior fit, quoniam sanguis minuitur. **F** Assero porrò mulierem vbi pariet, frequentem spiritum emittere. Et si purgatio inceperit, venter plenus est, & calore pressus. Maxime verò frequenter respirat, vbi partus appropinquat. Et tunc maxime lumbos dolet. Nā & lumbi à fœtu colliduntur. Dolet autem stomachum siue ventriculi osculum in intermedio tempore aliàs atq; aliàs, utpote dum venter, maxime verò vterus, circum fœtum obuoluitur. Et si puerperæ vterus infetetur, ouicula aut capræ hepar cinere obruito, deinde coquito, & hoc edat, ac vinum meracius vetus, si nihil prohibuerit, bibat ad dies quatuor, si longius aberit à partu. Si verò lumbos doleat, anisum & cuminum Aethiopicum bibat. Et calida lauetur. Si verò

A verò anhelatio corripiat, sulphuris magnitudinem fabæ, & cardamoni tantundem, & rutæ ac cumini Aethiopici tantundem. Hæc terito, & vino diluta ieiunæ bibenda præbeto. Et à cibis frequenter abstineat. Si in partu purgatio multa prodierit, vterus contrahitur, & vesica, & intestinum, & neque sterqus continent, sed & urinam emittunt. Oua igitur forbenda dato, & panem cinericium edendum, & reliqua quæ scripta sunt. Si verò ea quæ in partu est, sicca fuerit, & difficulter humectetur, oleum bibat, & locos oleo calido. cum malux aqua irriget, & cerato liquido illinat, & anserinum adipem cum oleo infundat. Si verò parere non poterit, resinam, aut cuminum, aut pinus corticem suffito. **Quicumque**

Partus difficultasque tollatur.

B verò tumores vteri in partu, aut ex partu fiunt, eos adstringere non oportet, velut medici faciunt: verum pharmaca optima exhibeto. Cuminum Aethiopicum quatum tribus digitis capi potest, & anisi, & sesellis grana quinque aut sex, præoniæ radicis aut etiam seminis testam conchæ maioris dimidiam. Hæc in vino albo odorato maxime, ieiunæ exhibeto. Aut dauci Aethiopici radicem, seselli, præoniæ radicem, eodem modo. Aut hipposelini, aut dauci Aethiopici semen, eodem modo. Aut crethimi radicem. Aut cuminum Aethiopicum quatuor obolorum Atticorum pondere. Aut piper, anisum, daucum, præoniæ Atticæ radicem, hæc in vino terito, & bibenda dato. Aut myrtidani ramulos duos aut tres, & cuminum Aethiopicum, & præoniæ radicem. Aut etiam lini semen similiter, quo etiam pueros tussientes nutriunt, cum oui assati vitello, & cum sesamo tosto. Si prægnanti pudenda superficiario ac feruido ulcere affecta sint, amygdalas tritas, & medullam bubulam in aqua coquito, & modica farina adiecta, pudenda illinito, & aqua à coctis myrti baccis perluito. Nunc verò dicam de puerperij purgamentis, & his quæ post partum exeunt. Quum mulieri aut partus purgamenta non fuerint purgata, aut menses non prodierint, aut etiam vterus durus fuerit: dolor habet lumbos, & lateribus mollitudinem, & inguina, & femora, & pedes amarè delectat, & venter attollitur, & horrores per corpus discurrunt.

Puerperarum purgatio.

Ex talibus autem febres fiunt acutæ. Hanc ita habentem, si quidem sine febre fuerit, balneis curato. Caput autem oleo anthino inungito. Maluam autem coquito, & oleo cyprino

cyprino in aquam eius infuso, mitigandi gratia insidere iubeto. In omnibus autem morbis in quibus fomentum auxiliatur, melius est postea oleoungi. Si vero febris habeat, à balneis abstinere, fomentis autè & tepefactoriis imum ventrem & lumbos curare. In potu autem exhibere phar maca vterina, aut sapiæ ouis, aut castorio ammixtis. post hoc verò farinam cum ruta coctam, aut ptisanæ succum sorbendum dare. Si verò mulieri cum puero in partu non prodierit humor velut oportet, sed si quidem in capite habuerit humorem à calore attractum, in partu & ante, caput dolebit. Si verò in ventrem aceruatim descenderit, vbi concitatus fuerit, ipsum turbabit. Et nō oportet longè progredi sinere, sed auxilium ferre, vt ne ex partu ventris profluuium succedens, corpore male habente, ipsam dolore affligat. Si verò à capite delatus fluxus, ad puerperij purgationē vertatur, & multum concitetur, melius habebit. Si verò plus moderato, curam adhibeto. Si verò in ventrem, facilior vtique exitus puero contigerit. Si verò purgatio modica mulieri prodierit, dolor fortis corripit lumbos, & omnem circa pudenda locum, & intumescit, & femora ardent. Et ex ore ac naribus pituita fluit fortiter aquosa, & dolet caput, & febris habet, & horror, & tumet, & dentes stridunt, & venter, & vesica constringetur, & oculus subuertit, & caliginosum visum habet. Quum mulieri puerperæ purgatio non facile procedit, velut vteris inflammatis, & osculo ipsorum concluso.

Obtorquetur enim stomachus vteri post pueri egressum. F

Si enim quid horum fuerit, purgatio non procedet. Si verò non processerit purgatio, continget ipsam febrile, & horrorem habere, & ventrem magnum esse. & si ipsam attigeris, totum corpus dolore, maximè si quis ventrem attingat, & aliàs atque aliàs stomachi dolore vexatur, & lumbos dolet, & cibi fastidium, & vigilæ, & punctura adest. postea quinto aut septimo die quandoque venter turbatur, & secedunt nigra, & valde graueolentia aliàs atque aliàs, & vrina velut alimina. Et si secesserint, videtur sibi melius habere, & curata, breui sana fit: sin minus, periclitabitur profluuium ventris forti ipsi illapso. Et puerperij purgamenta ipsi occulta buntur. Si verò venter ipsi nō turbetur, neque purgatio prodeat sua sponte, neque ea quæ cōmoda sunt breui exhibeantur,

Quid si nō
curatur eu
niat.

A tur, tempus autem progrediatur, multò magis ex prædictis affligetur. Et insuper periclitabitur, ne liuida fiat velut plumbum, & aquam intercutem incidat. & umbilicus extabit ipsi, ab utero eleuatus. Et circumcirca nigrior erit. & ubi hæc facta fuerint, fieri non potest ut mulier superstes maneat. Pereunt autem alia alio tempore, pro corporis & affectionis ratione. Verum vnâ & vicesimâ diem non excedunt, id quod plerunque sic cõtingit. Si verò purgatio ipsi eruperit, siue à pharmacis, siue sua sponte: fit enim & hoc si uteri os laxarint, à sanguine aceruatim de repente delato coacti: & si eruperit, graueolentia purulenta depurgatur, Quâdoque etiâ nigra: & melius habebit, & curata sanescit. Fiunt autem & vlcera

B in utero, utpote puerperij purgamentis putrefactis. Si verò fiant, maiore cura opus erit, ut ne ipsi vlcera magna & putredinosa fiant: periculum est autem ne aut moriatur, aut sterilis fiat. Signa verò hæc fiunt, si vlcera intus fuerint. Quum purgatio ipsi prodierit, velut spina per uteros transire videtur, & calor ipsam corripit, ac maximè ventrè inuadit. Et si attingatur, partem infra umbilicum dolet, velut si purum neruosum vlcus contingat. Post dolores fortes aliàs atque aliàs in uteros incidunt. Et febris aliquando ad contactum manus debilis & aliàs atque aliàs puerperij purgamenta procedunt, maligna, purulenta, graueolentia. Hæc sunt signa, si vlcera in utero fuerint, & multa cura opus habent. Atque hu-

Signa vlc
rum in vul
uis.

C perij primis tribus aut quatuor diebus processerit, verum postea de repente euanescit: easdè affectiones cõsimiles priori patitur, sed minus. & si transmutetur morbus, id idem transmutabitur. Diuturnus autem & debiliior priore erit. Si verò curetur mulier, superstes erit, si cito curetur. & de hoc morbo sic habet. Si verò ex partu non fuerit purgata, venter intumescit, & splen, & crura. Et febris habet, & rigor corripit, & dolores profiliunt ad lumbos. Aliquando etiam ad viscera. Et perfrigeratur, & febris habet. pulsus debiles sunt, & aliquando acuti, & aliàs attolluntur, aliàs deficiunt. Hæc patitur incipiēte morbo, & sic habet. Temporis autem progressu, caua faciei partes rubescunt. Quum sic habuerit, leues cibos exhibeto. Et si turget, pharmacū infra purgans bibendum dato, si biliosa fuerit, quod bilem purgat: Si pituitosa,

Cur puer
perz pur
gatio sub
sistit.

Cur post
partum nō
purgatur.

Medela.

quod

quod pituitam. Postea vero vteros odoratis foueto, & molli- **D**
 torium in die apponito. Si verò osculum solidum fuerit, tota
 die foueto, & mollitoria apponito. Deinde calida aqua lau-
 to, & plumbeas fistulas indito. postea salis grana, & myrrhā
 in lintheū illigato, & picem coctā ammixtis aromatis lana
 excipito, & singulorum pares portiones ad gallæ parua figu-
 ram efformato, & per diem ac noctem apponito. Deinde ve-
 rō intermissis tribus diebus, iisdem foueto. Et grana cnidia
 decorticata duarum potionum mensura, & piperis grana tri-
 ta, oleo Aegyptio albo, & melle optimo ammixto, in lanā in
 farcito. & pennæ obuoluta tota die ac nocte apponito. Et si ti-
 bi purgata esse videatur, melius est sinere: Si verò purgatio-
 ne opus habere videatur, duobus diebus interpositis, rursus **E**
 id quod ex cucumere syluestri paratur, per diem ac noctem
 subdito. Deinde Netopon, & oleū rosaceum odoratissimum,
 & adipē cerui liquefacito, & die vna in lana subdito, & mul-
 ta calida, quantum eius fieri potest, leniter lauato. Statim au-
 tem vbi purgatoriis, & calida, fuerint purgata loca affecta,
 adipe anserino, & myrrha, & resina tepida os vterorum illi-
 nat, & foueat, vteros verò postridie vino & oleo narcissino
 eluat, Aut si narcissinum non sit, vino solo. Atque hæc die
 vno ante menses faciat. Postquam autem menses prodierint
 primis diebus attramētum, hoc est spodium cyprium terat
 & salis granum addat, & hæc lana excepta paululum in cor-
 pore habeat. Et ieiuna vinum meracum odoratū absorbeat,
 Vbi verò quieuerint menses, per diem id quod ex pullegio pa- **F**
 ratur apponat, & virum accedat. Et si in ventre cōceperit, sa-
 na euadit. Cibis autem in purgatione vtatur. Ad hæc cōmo-
 dat, mercurialem coquere, & porrū, allium, brassicam, & gra-
 na mali punici ammiscere, & succum sorbere. Aliis autē ob-
 fontis marinis potius quàm carnibus vtatur. A dulcib⁹ verò
 & oleosis prohibeatur. Bibat autē semper ieiuna id quod ex
 tæda paratur, donec purgetur. Et mēlibus prodeuntibus idē
 valde bibat. Si verò paulo pauciore quàm oportet prodie-
 rint mulieri puerperij purgamenta, velut vteris angusto ore
 præditis ac distortis, Aut aliqua pudēdi pars valde fuerit con-
 clusa ab inflammatione. Mulier acutē febricit, & stomachi do-
 lore vexatur, & dolor totum corpus, & molestē fert, & ad ar-
 ticulos manuum ac crurum & lumborum dolor procedit. &
 locum

Puerperæ
 mala pur-
 gatio quid
 apportet.

- A** locum circa collum, & spinā & inguina dolebit, & quædam corporis partes impotentes fient. Postea calor quietus erit, & horror valde manifestus. Vomunt autem & pituitosa, amara, acria, & de hac sic habet, & continget ut si curetur, sana fiat. Sin minus, clauda & quarundam corporis partium impotēs erit. Non autem valde sterilis est hic morbus. Si quidem ^{Vterorum} ~~vi-~~cerati fuerint uteri, & puerperij purgamenta non prodierint, ^{vlcera,} velut oportet, omnia dolebit, & si non magna fuerint vlcera, curata breui sanescit. Oportet autem curationē vlcerum in vteris exactē facere, ut quæ in tenera & subtili sensu prædita sint parte, & in nervosa cavitare. Multæ autē sunt partes cum quibus societatem habet, sicut, stomachus. Mens percellitur, & improba fit, & nō facile intelligit. Si verò uteri angustii oris ipsi fuerint, & puerperij purgationem nō emisierint, inflammatur: & si non curetur breui, omnia magis ipsam affligent. Et odor malus erit, & exitus intumescit. Et si non inflammati fuerint uteri, sua sponte exit malū graue olens, & liquidum, aut nigrū grumosum, & mulieri puerperij purgamenta purgantur. Quandoque verò non exit, sed mulieri ^{Purgatio} mortē portendit, nisi quis breui venā secet, aut ventrē emolliat, præstat autem etiam clysterem adhibere. Si verò ad vomitum facilis fuerit, etiā vomitum inducere. Melius autem est lotium ciere & exudare. Verū in his ocasio optima est, quum opus his fuerit. Si verò ex partu purgata mulier fuerit, paulo ultra quā oportet. Cōtingit enim hoc, si uteri amplioris osculi fuerint, & venæ quædam ruptæ sint, quæ sub vteros tendunt, præ violentia egressus ipsius fœtus; febris & rigor habebit ipsam tenuis, & calor per totū corpus. Aliquando etiā horror, & cibi fastidium, & omnino abominabitur, & tenuis erit ac debilis, & pallida, & tumida, & cibū auersatur. Si verò quid edat aut bibat, non concoquitur. Quibusdam verò etiā aluus & vesica erumpit, & horror magis obtinet. Et de hac sic habet. Si verò puerperæ aliqua pudendi ^{Cū pudenda obturatur.} pars obturata fuerit: iam enim etiam hoc cognoui: si vlceratum fuerit os pudendi, ubi sanē vlceratum fuerit, in partu à pueri exitu violatū, simile quid sit vlceri superficiali ac feruenti, & valde inflammatur. Et labia præ inflammatione inter se coincidunt, & se mutuò contingunt, utpote quæ sunt exulcerata. Sed & frig⁹ fit, & ambo labia clausa sunt, cōstringentia

gentia purgationē relictam. Si verò prodiret purgatio, vlce-
ra non cōclusa essent. Nunc autē inſiuit, & aliena carne cras-
fescunt. Proinde ea sanare oportet, velut in reliquo corpore,
& ad cicatrices perducere. Locus autē levis & cōcolor red-
datur. Mulier quādam patiebatur eadem quæ patiuntur
uteri dum à puerperij purgamentis non purgantur, & ad hæc
dolebat pudendum. Et ex cōtactu cognouit, quòd obturata
esset, & narrauit, & curata depurgata est, & sana euasit ac fœ-
cunda. Si verò curata non fuisset, neque purgatio ipsi sponte
erupisset, vlcus maius fecisset, & malo non remittente, peri-

Cum pur-
gatio caput
petit.

clitata fuisset ne vlcera cancerosa fierent, Si verò processe-
rit mulieri puerperij purgatio ad caput, thoracemque ac pul-
monem: fit enim & hoc: moriuntur sæpe statim, si detineatur E
ac firmetur. Si verò probè exeat per os aut nares, sana euadit.
Si verò morbus paulo diuturnior fiat, patietur sanè mulier
ea quæ dicta sunt de virgine, cui mēses primū cōparentes
sursum impetum fecerunt. Verū mulier lōgiore tempore
superstes erit quā virgo, & affectiones debiliores erunt, do-
nec pulmo purulentus fiat. Si verò puerperij purgatio nō ex-
eat per os, sed sursum tamen impetum fecerit, occultabitur,
& non procedat iusto modo. Et tussis corripiet, & anhelatio-
nes. Et impleto pulmone à sanguine, valde dolebit latus &
dorsum. Et quum tussiet, siccè tussiet. Aliquādo verò spumo-
sum expuet. Temporis autem progressu spurū apparet sub-
nigrum & turbatū. Et calor pectora tenet, magis quā reli-
quum corpus, nimirum sanguine ipsa calefaciente. Et febrit F
mulier, & venter ipsi coarctatur, & cibū fastidit, & vigilabit,
& abominabitur, & nō superstes manet, sed moritur plerun-
que vicesima septima die. Si verò purgatio sursum progressa,
per os non exeat, neque in pulmonem vertatur: conuertetur
ipsi ad faciē, & erit hæc valde rubicūda, & caput graue, quòd
neque mouere potest absque doloribus, & oculi valde rubi-
cundi erunt, & ex ipsis sanguis tenuis fluet. Et quibusdam ex
naribus sanguis manat. Et si his exierit, diuturnior morbus
fit. Et aures nō acutè audiunt in hoc morbo, & stomachi do-
lore vexatur, & eructat, & mente alienatur, & deliria fiunt
furiosa. Quibusdam autem adest oculorū distortorū feroci-
tas. Et reliqua omnia perpetietur, velut si purgatio ad pulmo-
nem vertatur. Verū nō tussiet, neq; expuet eiusmodi, neq;
dorsum

Cum pur-
gatio faciē
petit.

- A** dorsum similiter dolebit. Curata verò sana fit. Nō multa verò spes est de vita ipsius. Et si etiam superstes maneat, surditas aut cecitas omnino ipsi accedet. Atque hic est huius morbi finis. Si ex partu fluxus corripit, & cibi in ventre nō maneant, uā pāssam nigram, & mali punici dulcis grana terito, & vino nigro dilutis utitor, ita ut caseum caprinum derafum, & polentam tritici torrefactam inspergas, & bene temperata bibenda præbeas. Si ex partu sanguinem vomat, hepatis fistula sauciata est: & dolor ad viscera procedit, & cor cōuellitur. Hāc multa calida lauare oportet: & tepefactoria quæ maximè admiserit adhibere: & lac asininū in dies septē vel quinque bibendum dare: postea verò vaccæ nigræ lac bibendū præbere, ita ut sine cibo degat, si fieri poterit, ad dies quadraginta. Ad vesperam verò sesamum tritū bibat. Morbus hic est periculosus. Quomodo autem lac fiat, dictū à me est in pueri in partu natiuitate, & alia similiter. Si lac fuerit extinctum, porrum tritum & aqua dilutum bibendum dato. Et calida lauetur, & in cibo porrū ac brassicam edat. Sed & cytisi folia simul coquat, & succum sorbeat. Bibat etiā fœniculi succum, & de radicibus fœniculi. Et ordeum molitū ac butyrum simul coquito, frigefacito, ac bibenda præbeto. Bonum est & hippomarathrū, & hipposelinum, & cytissus. Hæc omnia simul multum lac faciūt & augent. Capræ item Scyriæ, casei autē maximè commodi sunt. Sed & saluiā coquat: Aut à iuniperi baccis, aut cedri fructu, succum diffundat, & vino affuso bibat: & reliqua oleo affuso edat, & ab acribus, & fallis, & acidis, & crudis oleribus omnibus prohibeatur. Nasturtium verò in vino potum commodum est. Nam lac purgat: & calida lauetur, & subcalidam bibat. Viticis itē fructū in vino bibendum dato: & betæ succus potatus multū lac facit. Sesamum quoq; recens, & ordeum trimestre, in mortarium coniecta terito, & succum per linteū exprimito, & mel aut amamelidas ammisceto: deinde in vino nigro bibenda dato. Quū mulier peperit, & à secunda non fuerit liberata, præstat dare ea à quibus maximè purgatur puerperij purgamenta: allia cocta aut affata in vino & oleo cū polypis ac sepiolis super prunis tostis, quicquid tandē ex his voluerit. Castorium verò aut nardum bibat. Bibat etiā rutam in vino nigro dulci ieiuna, aut sine vino. Si verò vinum non fuerit dulce,

Profluuiū
post partū.

Quæ lac
reparent.

Quæ post
partū en-
nunt.

Hippocratis Liber I.

œ, melius est mel ammiscere. Edat etiam brassicam coctam **D**
 cum ruta & mercuriali, & semen aliquod vtero commodū
 bibat. Si verò puerperij purgamenta in grumos fuerint co-
 cta, & dolor in imo ventre fiat, porrum coctum, & quæcunq;
 sylvestria ac hortensia olera dato, verum omnia pingua fa-
 cito: & per tertium quenq; diem sub clementi cælo lauetur.
 Frigus enim his inimicum est, & post balneū inungere me-
 lius est, & non multa calida vti. Quum secunda non statim
 exierit post partum, imi ventris dolores fiunt, in laterū mol-
 litudine, & rigore ac febres. Et si discesserit secunda, sanatur
 etiam mulier. Sæpe verò putrescit, & discedit sexta aut septi-
 mæ die, aut etiam prius. Huic autem dare oportet pharmaca
 quæ ego describam, & spiritum continere iubere. Omnium **E**
 verò optimum noui artemisiâ herbam, & dictamnū, & vio-
 læ albæ florem. Et silphij succus optimus est fabæ græcæ ma-
 gnitudine in aqua potus. Et si secundas excludere non poterit,
 a cibo absteineat, Et postea viticis folia trita in vino & melle
 oleo affuso tepescito, & hemina mensuram bibendam dato.
 & exhibunt. Si mulieri secunda in vteris relicta fuerit, hoc
 sic cōtingit. Si per vim ruptus fuerit vmbilicus, aut ab obste-
 trice vmbilico seca per imperitiâ resectus, quæ videlicet vmbi-
 licum pueri prius incidit, antequam secunda ex vteris exiis-
 set, & vteri sursum retrahunt secundam, utpote lubricam &
 diffusam, & in seipis detinet. Nam secunda ex vmbilico pue-
 ri hæret, & vmbilicus postremus ex vteris exit. Si enim prior
 exiret, non accederet per ipsum puero nutrimentū, quoniam **F**
 ex ipso dependet. Quum in ventre habens fœtum corru-
 perit, menstruum, aut bimestrem, & secundæ exire non pote-
 rint, fuerit autem tenuis: huius corpus tunc purgare oportet
 ac pinguefacere. Non enim prius exeunt fœtus putrefacti,
 nisi fortes fuerint vteri, & probè compacti. Si mulieri secun-
 da relicta fuerit, si non ampli fuerint vteri, purgatio ipsi mi-
 nus quàm oportet procedit, & venter durus fit ac magnus. Et
 frigus detinet, & febris acuta, & dolor per totum corpus, &
 ventris maximè partem eam quæ est infra vmbilicū: & gra-
 uitas fit in vteris, & tormen, velut fœtus insit. Et curata secū-
 dam breui eiicit putrefactam, & sana euadit. Si ex partu
 vterus vlceratus fuerit, rosarum floribus curato. Sed & acer-
 bis infusis colluatur. Si verò os eius vlceratū fuerit ac inflam-
 matum,

Cur secunda
remanet.

Cum par-
tus minor
non exit.

Cū secun-
da nō exit.

Cum post
partū vte-
rus vlcera-
tur.

- A** matum, myrrham, & adipem anserinum, & cerā albam, & thus, pilis leporinis sub ventre enatis misceto, & simul trita in lana apponito. Si ex partu vteri fuerint inflammati, febris debilis corpus tenet, & caligo adest. Ex ventre verò nunquā deficit calor, & sitit, & coxas dolet, & venter imus fortiter intumescit, & aluus turbatur. Secessus autem est malus & olidus, & calor vehemens corripit, & cibum auersatur, & dolor iuxta sinciput est, & ventris stomachus non potest trahere cibos ac potus, & cōcoquere nequit. & nisi curentur statim, plurimè moriuntur. Venter autē est in causā. Sambuci igitur *Medela* folia tenerima, in crassiore tritici recentis farina cocta, leuiter tepida sorbeat. Dato & aquam mulsam, & vinum aquosum. Et pectinem cataplasmati frigefactoriis integito. Cibus autem quā minimū edat, & venter sistatur, & caput curetur. prae cordiis verò & vterorū loco, cataplasmata adhibeto. Quum doluerit sedem, aut aliud quid, iuniperi baccas, *Quum sedes post partum doluit.* aut apij & vrticæ semen terito, ac bibendum dato. Si ex partu doleat, resinam terebinthinam, & mel, & vinum tepidū, sorbenda dato. Et si inflammati fuerint vteri, inde sedantur. Si verò non doleat vterorum locum, amygdalas amaras tritas, & oleū folia tenera, & anisum, & irionem, & origanum, & nitrum. Hæc misceto, terito & vterorū collyria *Medela vterorum inflammationum.* formato. Si verò inflammati fuerint, & dolor habuerit, rosarum folia, cinamomū, & cassiam simul terito, & netopo affuso, plantulas ac pastillos drachmales formato, easque in ollam nouam si stille igne candentem mittito, circumlocatāque muliere ac vestibis contestā, in vteros suffito. Hoc dolores sedat. Si verò ex partu vteri doluerint, calor debilis habet. *Quum post partum vteri dolent.* verū venter imus intus igne ardet, & ad coxendicem aliquando intumescit: & dolor habet imum ventrē, & laterum mollitudinem. Et secessus biliosi sunt, & graueolentes. & si non sistatur venter, derepentē moritur. Quum igitur sic habuerint, ventrem frigefacere oportet, cauendo ne horrescat. *Medela.* Bibat autem si non sistatur, aquam de crassiore tritici farina in ipsa macerata, & panis farinam edat. Sorbeat autem mali punici vinosi succum aqua dilutum, farina lentium inspersa. Et hoc coquito, misce lentem, & cuminum, & salem, & oleū, & acetum, atque hanc sorbitionem frigidam exhibeto. Lenticulam item acidam dato, & vinum vinosum pramniū in-

K super

super sorbendum. Ab aliis autē cibis abstinere oportet donec **D**
febris soluatur. Si vero visum fuerit, etiā lauetur. Si vero de-
bilis fuerit, polentā bibēdā dato. Et si imbecillior sit, ex aqua
frigida. Cibum autē exhibeto leuem, qui nō euacuet, vbi ca-
lor remiserit. Morbus hic acutus est & lethalis. Si inflāmati
fuerint puerperæ vteri, venter ardet, & magnus fit: & ad præ
cordia suffocatio habet. Quam sic habuerit, muscum mari-
num quē super pisces iniiciunt, pro cataplasmate adhibeto.
Verū in mortario misceto ac tundito, crudā ordeaceā fari-
nam, & cinerē sarmentitiū, & lini semen tostum, & hęc oleo,
& aceto subigito, & velut cyceonē crallum facito, deinde co-
quito donec velut farina subacta massa fiat, atq; ita quā cali-
dissima imponito: & si opus fuerit, etiam incidere facito. Si **E**
puerperæ inflāmati fuerint vteri, intumescunt, & vbi puer
peri, purgamenta intus manserint, occultē distenduntur: di-
stenduntur autem vbi cōdensati fuerint à frigore. His si qui-
dem perfrigerentur, calefacere conducit. Si verò indamina-
ti fuerint, & frigus discesserit, medicamentum subdititiū fa-
cere quod in inflāmatiōni aduersatur, & simul lauare, ac foue-
re, & pharmaca adhibere, quæ ego describam, & vaporem in
os ac nares attrahere. Si verò suffocet, lentes in aceto, & sale,
& origano multo coquere, & attractionem facere. Et mercuri-
ale edat. & in succo eius tenuem farinā sorbeat: & quā ce-
lerimē ac prius quā dolor corripit, pharmaca dato quæ
vterorum dolores sedant: & cibos per aluum secedētes assu-
mat, & si vēter sit inflāmat, clystere adhibito quā citissi- **F**
mē subluatur. Si vteri pituita fuerint impleti, flatus in vte-
ris sunt, & menses procedūt pauciores, albi pituitosi. Quan-
doq; etiam sanguis tenuis sincerus, pelliculis plenus. Quibus
dam etiā conturbatur, & ter in mense comparet: & præ hu-
miditate cum viro cōmisceri non vult, neq; libidine ad hoc
faciendum concitatur, & tenuis sit. Dolet autem imum ven-
trem, & lumbos & inguina, & si mordeat id quod effluit, &
exulceret osculi vteri circumferentiam summam, fluxionem
diuturnam fore pronuntiato. Et si nō multa fuerit fluxio, lē-
ticulæ decoctum cum veratro exhibeto ad vomendum. De-
inde in nares infundito: & pharmacum deorsum purgans bi-
bendum dato. A cibis autem acribus prohibeatur. Si verò
grauetur, & frigeat, & torpedō habeat, lac præbeto, & vinum
odorat

Quum in-
flamantur.
Medela.

Quum puer-
peræ le-
choeue in-
flamman-
tur.

Medela.

Quum stran-
gulatio tol-
latur.

Quum vteri
pituita im-
plentur.

profluuij
longi signa

Medela vl-
cerum vte-
rorum.

A odoratum. Bibat autē ieiuna hypericū, apij semen, saluiam, in vino odorato aquoso, & vteros medicamento ex vini facie colluat, & si vlcerati fuerint, interpositis diebus duobus aut tribus, pharmaco ex grano cnidio eluat, & postea cum acerbis lauet. myrti ac lauri decocto, & medicamento ex flore argenti illinat. Morbus autem est grauis & paucae effugiunt.

Si verò acetabula pituita plena fuerint, menses fiunt pauciores, & si in ventre habuerit, corrumpit vbi foetus fortior factus fuerit. Non enim corroboratur, sed defluit. Cognou-
Cum acera
bulavulu
pituita ple
na sunt.
 ris autem hinc. Humida fit, & quod defluit mucosum & viscosum velut à ventre defertur, & non mordet, & in mensibus postquam sanguine purgari desierit, per duos aut tres dies, muci ex vteris prodeunt, & horror tenet, & calor non acutus, verum non deficit. Hanc succo grossorum colluito, à
Medela.
 quibus omnis aqua purgatur, & hoc iterū atq; iterum. Postquam autem purgata fuerit, de cetero acerbis vtatur. Apponat autē mollia, à quibus pituita purgatur, & foueat vteros medicamento ex lauro, & colluat pharmaco ex aceto, & aromatis suffitum faciat, postquam menses cessarint, postea verò à cibis & balneis abstinere oportet. Coeat autem cum viro, & cibos ac vinum parcè sumat, & calidè degat, & tegumenta cruribus circūdet, & oleo illinat. Si aqua intercus in
Aqua inter
cus vteri.
 vteris nascatur, menses pauciores & prauī fiunt, & ante tempus deficiunt, & imus venter intumescit, & mammae solidae, molles fiunt, & lac malum. Et putat se in ventre habere, & ex his cognoscet quod aqua intercus est. Sed & in vterorum osculo significationem de se præbet. Ad tactum enim gracile & humidum apparet, & rigor ac febris corripit. Quanto verò magis tempus procellerit, tanto magis dolor habet inum ventrem, & lumbos, & laterum mollitudinem, ac inguina. Hic morbus ex abortu fit. Sed & ex aliis causis, & quum menses fuerint occultati. Hanc multa calida lauare
Medela hu
ius quæ.
 oportet, & tepefactoria adhibere si dolor habuerit, Postquā autem sedatus fuerit, pharmacum infra purgans bibendum dare oportet, & vteros medicamento ex bubulo stercore fouere. Deinde id quod ex cantharide paratur apponere, & biduum aut triduum intermittere. Et si robur affuerit, ne topo colluere, & si venter mollis fiat, & febres cessent, & menses secundum rationem prodeant cum viro dormiat, &

in medicamentis subdititiis perseueret, & interposita die D
crethmi corticem bibat, & pæonia grana nigra quinque, &
sambuci frustum in vino ieiuna. Et mercurialem quàm plu-
rimam edat, & allium crudū ac coctū, & mollibus ad som-
num vtatur, & multa potione, & aliis mollibus, & obsoniis
marinis potius quàm carnibus, & si peperit, sana euadit.

Hydrops
vulvæ.

Si hydrops in vteris fiat, menses pauciores fiunt ac dete-
riores, & per longius tempus, & pauciores quàm oportet, aut
paulò plures, & venter intumescit, & locus supra pectinem,
& tibi, & lumbi. Vbi verò multum temporis processerit, &
in ventre habuerit, corrumpit ac eiicit, & aqua cum ipso fœ-
tu effunditur, & mulier plerunque moritur. Sanguis autem
corrumpitur, & aquosus redditur. Huic lac bibendum dato, E
& peplum album potandum, donec fœtus moueri poterit.
Quin & ante hoc vt plurimum fœtus corrumpitur, & per
abortum eiicitur, & vteri sanguine & aqua manant. Hac au-
tem patitur nihilo magis ex labore, quàm aliter. Cognosce-
re verò poteris quòd hydropss est, ex digiti contactu. Depre-
hendes enim osculum ipsorum gracile & plenum humidi-
tate. Si verò fœtus in ipsa non circa initia, sed iam bimestris
corrumpitur ac suffocatur, tunc & venter imus intumescit,
& ad contactū dolet, velut vlcere præsente, & febris magna
ipsam ac dentium fremitus corripit, & dolor acutus & vehe-
mens pudenda, & imum ventrem, & lumbos, & laterum
mollitudinem, & coxas. Quum sic habuerit, calida ip- F
sam lauato, & si dolor habuerit, tepesfactoria adhibeto, ex-
perimento facto de eo quod maximè admittat, & pharma-
cum deorsum purgans bibendum dato. intermissione verò
facta per tempus quantum tibi satis esse videbitur, & collu-
to, & foneto, & cyclaminum melle subactum, ac linteo ex-
ceptum, ad os vterorum apponito. Et cupressi ramenta in
aqua madefacta, eodem modo apponito. Verum hæc breui-
ore tempore, & per longius temporis interuallum, quàm ma-
gis mordent & lancinant. Et specillum stanneum paratum
immittito, & digitum eodem modo. Portiones quoq; biben-
das dato, quascunq; maximè libenter admiserit, & cum viro
dormiat, maximè opportuno tempore præsente. Si enim ge-
nituram cōceperit, & prægna facta fuerit, ac pepererit, sub-
purgantur, & ea quæ prius in ipsa fuerunt, vnà cū ipsis puer-
perij

Aperij purgamentis subeuntia. Atq; sic maxime sana fieri poterit. Si mulier aqua intercute laborarit, splene ipsius magno & aquoso existente. Fit autē splen aquosus ab hac affectione, quum febris habuerit, & nō dimiserit hominē, & sitis ipsum corripuerit fortis, & biberit, ac non reuomuerit. Nā quod in vesicam penetrat, per vrinam eiicitur. Reliquum verò splen capit, abstrahēs à ventre ad seipsum, vt qui rarus est & spongiformis, & secundum ventrem situs. Et si his sic habentibus non exudari, neque aliud laxetur, ab hoc splen attollitur, & hoc magis si aqua fuerit potus. & si quis ipsum contingat, mollis est velut mollissima pluma siue lana: quandoq; verò etiam renititur. Eleuatus autē & impletus, distribuit per venas corpori, & maxime in omentum, & locos circa ventrem,

Caussa hydropis in foemina.

Bnas corpori, & maxime in omentum, & locos circa ventrem, & crura. Altera enim pars ad alterā delegat in corpore, vbi singulis plus quàm oportet effluerit, & continere nō poterint. Succedit autem ex hoc semper hydrops, vbi splen ad seipsum trahere consueuerit, quum natura rarus sit ac mollis.

Lienis natura.

Quibusdā verò hoc morbi principium fit sine febre, si calor quidē in ventre cōstituerit, velut pituita in ipsum collap̃sa. & si homo sitim nō cōtinuerit, neque vesica, neq; venter, vrinā & stercus iusto modo excolarint: neque commoda diata homo vtatur. Si verò hydropica fuerit, prodeunt menses multi derepēte quādoque verò pauci. Et fiunt aliquādo velut aqua à carnibus, sicut si quis cruentas carnes abluisset, aliquando vero paulo spissiores, & non cōgelantur. & anhelatio ipsam

Hydropides mulier quæ patiatur.

Ccorripit priusquam menses prodeunt. & dolor in splene, & magis si quid dulce ederit. & venter attollitur ac magnus fit. Et vbi plura quàm solita est ederit, dolet ventrē, & lumbos aliās atque aliās dolor vexat. & febris ipsam paulatim corripit. postquam autem depurgata fuerit, melius sibi habere videtur superiorum respectu. postea ad idē relabitur. & si cureretur velut conuenit, sana euadet. Sin minus, & fluxus cōparet, & per omne tempus semper fluet paulatim velut serosa sanies, & ampliore curatione opus habet. Si verò fluxus nō succedat, sed vteri à prioribus menses non laxarint: tunc & venter ipsi magnus erit, & grauitas intus erit, velut in ventre habenti. & velut puer in ventre ipsius moueri videbitur, nimirum dum vteri aqua pleni sunt, & aqua mouetur. Aliās enim atque aliās fluctuat in ipsis aqua, velut in ventre pars

Signa huius mali.

K 3

infra

Hippocratis Liber I.

Languen-
tis & medi-
ci error.

infra umbilicum ad cōtactum dolet. & clauicula, & thorax, D.
& facies, & oculi attenuantur, & mammae attolluntur. Qui-
busdam verò & venter, & crura aqua implentur. Quibusdā
autem alterum horū, & si quidē ambo impleta fuerint, nul-
la spes est de hominis vita. Si verò etiam alterum horum,
modica spes est si curetur, & non valde fuerit attenuata. Diu
turnus est autem hic morbus. Et fiunt omnia magis his quæ
non pepererunt, fiunt autem sæpe etiam his quæ pepererūt.
Periculosa verò sunt velut dictū est, & plerunq; acuta & ma-
gna, & intellectu difficilia, eo quòd mulieres participāt mor-
bis, & aliquando neq; ipsæ sciunt quòd agrotant, priusquam
morbos experiātur à melibus, & seniores factæ fuerint. Tūc
autem & necessitas, & tēpus, ipsas morborū causā docet. E
& quandoque non cognoscentibus ex quo morbo agrotent,
morbi incurabiles fiunt, antequam doceatur rectē medicus
ab agrotante ex quo morbo agrotet. Verentur enim narra-
re, etiam si sciant: & præ imperitia ac ignorantia, turpe sibi
id esse putant. Sed & medici simul peccāt non exactē causā
morbis percunctantes, sed velut viriles morbos sanātes.
& multas noui iam ab huiusmodi affectionibus corruptas.

Vterorum
viceratorū
signa.

Quare statim causā exactē interrogare oportet. Multum
enim differt muliebrium morborum ac virilium curatio.

Morbi
causa.

Si uteri fuerint vicerati, sanguis & pus purgatur, & fœ-
tor grauis oboritur: & dolor acutus corripit lumbos, & in-
guina, & in imum ventrem. & dolor sursum procedit ad la-
terum mollitudinem, & ad costas, & ad scapulas. Ali-
quando etiam ad clauiculas peruenit, & mordetur, & caput
vehementer dolet, & delirat. Progressu verò temporis
tota intumescit. & debilitas ipsam corripit, & animi deli-
quium, & febris tenuis, & perfrigeratio. Intumescunt autem

Medela.

maximè crura. Morbus autem corripit ex abortu, si qua cor-
rupto ac putrefacto intus puero, non fuerit expurgata. & ca-
lor totum corpus tenet. Corripit etiam ex fluxibus, & si in
ipsis acria fuerint, & biliosa mordeant. Si in hoc modo ha-
bentem incideris, vbi quidem dolores habuerint, multa
calida lauato. & tepefactoria adhibeto qua parte fuerit do-
lor. & si quidem supernè fuerint dolores, & mulier fortis
est, totam fomentato, & pharmacum deorsum purgans bibē-
dum dato. & vbi tempus anni fuerit, serum coctum insuper
bibend

Abibendum præbeto, per dies quinque, si id facere poterit. Si verò non fuerit serum, lac asinum coquito, & per dies tres aut quatuor bibendum dato. Post lactis autem potum, cum aquis ipsam reficito, & cum cibis commodis, carnibus ouillis tene Quæ refi-
ciant. ris recentibus, & volucrium: & beta, & cucurbita. Abstineat autem à salis & acris, & marinis omnibus. Et à carnibus porcinis, & bubulis, ac caprinis. Edat autem panes. Si verò animi deliquia teneant, & non valida sit, & perfrigeretur, sorbitionem accipiat. Sunt autem quidam qui his caput dolentibus lac bibendum præbent, quia caput dolent. Alij aquam, quia Quid capi
tus dolorem
sedet. animo linquantur. Ego verò vice versa, si caput dolent, & mente percellantur, aquam commodam puto. Quum autem **B** mordentur, & acris sunt quæ pungunt, lac his lenitatem inducit. Vbi verò tibi valida esse videbitur, uteros colluito, primum medicamento ex vini fece postea interpositis diebus tribus aut quatuor, eo quod cum brassicæ decocto tepido paratur. Et rursus intermissis diebus tribus eo quod cum butyro paratur eluito. Et si vbi hæc feceris sanescant uteri, eo quod cum malicorio paratur colluito. Super vlceras verò argenti florem, & gallam, & myrrham, & thus, & spinæ Aegyptiæ fructum, & œnanthen sylvestrem, & chrysocollam, & squamam æris, & loti rameta, & crocum, & alumen Aegyptium combustum illinito. Horum singulorum una aqualis sit portio. Alumen verò & gallam, & crocum, una omnium portione sumito. Hæc omnia trita ac permixta in vino albo dulci **C** diluito, deinde coquito donec mellis crassitudo fiat, & dato ut cum hoc pharmaco bis in die vlceras inungat, vbi aqua tepida prius lauit. Coquantur autem in aqua, & hederæ, & salvia. Et vbi tibi hæc facienti melius habere visa fuerit, lac caprinum coctum præbibendum una die dato. Postea verò lac bubulum præbeto eodem modo velut in prioribus. post lactis autem potum, per cibos quam maximè crassifacito, & ut in ventre habeat facito. Sana enim fiet. Plerumque vero ex hoc morbo enadunt, & steriles fiunt. Senioribus autem non valde quid horum accidit. postea verò bibenda sunt pharmaca, lini semen torrefactum, & sesamum, & urticæ semine, & pæoniae radix amara, hæc in vino nigro odorato trita bibat. Si Signa vte-
rorum vlce-
ratorum. uteri vlcerati fuerint, & sanguis, & pus, & serosa sanies fuit: putrescentibus enim uteris, morbus ab ipsis fit, & venter

Merbi cau-
sa.

Medela.

imus eleuatur, & attenuatur, & ad contactum dolet, velut D
ulcere praesente. Et febris ac fremitus ipsam occupat, & do-
lor acutus ac vehemens inuadit pudenda, & pubem, & imum
ventrem, & lateris mollitudinem, & lumbos. Morbus au-
tem maxime corripit ex partu, si quid in ipsis diuulsum co-
putruerit. Itemque ex abortu, & alias sua sponte. In has si in-
cideris, aqua multa calida lauato, & qua parte dolor habue-
rit, tepesfactoria adhibeto & spongiā ex aqua calida expres-
sam, & colluito acribus & acerbis vitatis. mollioribus vero
ammixtis, prout tibi tempestiuum esse videbitur, & lini se-
men ac sambuci fructum tundito, & ammixto melle phar-
macum facito, atque hoc vtitor. calida vero aqua lauato. Et
acceptam spongiā, aut mollem lanam, in aqua calida tingi- E
to, & pudenda ac vlcera expurgato. Deinde in vino meraco,
rursus spongiā aut lanam tingens, eodem modo vttere. Et
postea pharmaco hoc inunge, quoties tibi tempestiuum esse
visum fuerit. Postea resina & adipe suillo mixtis simul illi-
nito saepe interdiu ac noctu. postea vero lini semen torreto,
tundito, ac cribrato: & peplum album in polenta tundito ac
cribrato: & caseum caprinum assato, & sordes ac salsuginem
deradito, & pinguitudinē eius, & polentae pollinem ammis-
ceto. Sit autem vna pharmaci mensura, & casei, & polen-
tae. Haec bibenda dato mane ieiunae, in vino austero dilu-
to. Ad vesperam autem misceto, & crassum cyceonem pra-
beto, & quicquid muliercula maxime libenter admiserit bi-
bendum dato. Et donec quidem sanguis multus fluxerit, & F
dolores acuti habuerint, & modico tempore intermiserint,
haec facito. Postquam autem vlcus minus fuerit, & dolo-
res debiles apprehenderint, & per longius tempus, phar-
maca bibenda dato a quibus purgetur deorsum magis quam
sursum, & intermisso tempore quantum opportunum esse vi-
sum fuerit, lenibus fomentis foueto, muliere in alto colloca-
ta, prout tempestiuum esse videbitur. Haec si fecerit, sana
euadet. Morbus autem est lenior & lethalis, & pauca ipsum
cum valde effugiunt. Si vero vehementer exulcerati fuerint, sanguis
vulcerat fuit & pus purgatur, & odor fit grauis. Et quum dolor appre-
henderit, velut a partus dolore fiunt ea quae circa fluxum co-
tingere solent. Et quum tempus affuerit, crura & pedes in-
tumescent. Et curant medici hunc morbum velut hydro-
pem

A pem, verum hictalis non est. Hanc si curandam acceperis, primum calida lauato, & calefacito. Et acribus ac mollibus & acerbis, & aqua & vino colluito. Et polycarpon, & polycnemon, ac mel simul coquito, deinde lanam in his tingito, & pudenda illinito. Et resinam, ac mel, & pinguedinem suillam illinito. Et bibendum dato semen lini ac sesamum torrefactum, & butyrum, & caseum caprinum, & polentam in omnibus. Bibat autem in vino ieiuna. Ad vesperam vero plurimum mellis affundito. Et donec quidem sanguis purgetur, & dolores acuti habuerint, & modico tempore intermiserint, hoc facito. Quum autem ipsi minus prodierit, & dolores debiliores per longius tempus tenuerint, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, ac finito. Hac si fecerit, sana euadet. Sobolis autem spes non adest. Quacunque ulcerationes in vteris sunt, ex abortu, aut alia quadam causa, eas omnes respectu ad totum corpus facto curare oportet, quacunque curatione opus habere visum fuerint, siue ex vniuerso corpore hominem curandam esse putaueris, siue ex ipsis vteris. Cognosces autem an ab ipsis vteris sint, hoc modo. Quae enim ulcerationes ab ipsis vteris sunt, purgationem exhibent purulentam & compactam: quae vero non ab ipsis, tenuem & saniosam. Quum igitur tenues sunt fluxiones, cum pharmaco eas curare oportet, & dare quod & sursum, & deorsum purget. Primum autem sursum. Et si quidem post pharmaci portionem, fluxiones pauciores sunt ac faciliores, intermissione facta rursus eodem modo medicari oportet. Post pharmaci portionem, talem victum praescribito, ex quo homo ipsa quam siccissima fiat. Id autem continget, si toti ipsius corpori, per tertiam aut quartam diem, fomentum adhibueris, & a fomentis statim vomitus feceris. post vomitus autem & fomenta, dietam constituito ex illuue, & aquae potu, & panis cibo, nullo vero obsonio, quam vino nigro meraco. Nullo item olere. Quum vero vomitum praeparas, multis & acribus oleribus opus habes, quibus ipsam impleas, multis etiam cibis, & obsonio quodcunque voluerit. Et ut impleas ipsam multo vino aquoso, & ut a fomentis ipsam laues multa calida. Atque haec quidem curatio est huiusmodi fluxionum. Melius tamen est ut utrasque pharmacis cures, & vomitum procures, & sursum trahas.

Medicina
post dolores.

Causa ulcerum.

Cognitio.

Nutricatio
post portiones.

Quis vomitus
procuratur.

K 5 &

& illuuias. Ceterum vteros hoc modo curare oportet. Pri-
Smegma. mum quidem fouere sambuci foliis in aqua coctis. Deinde
 post fomētum sinegmate ex vini fece colluere. Et si quidem
 putredo in vlceribus fuerit, & quæ exeunt graueolētia, sine-
 gmate meraciore. Si vero nihil tale, aquosiore. post fecem
 autem, cū aqua in qua cocta est myrtus & salvia. l' ostea verò
 cum vino colluere, meraco albo, tepido. Quum autē mor-
 detur iam à collutionibus, tunc iam pura sunt vlcera. collue-
 re igitur oportet fece aquosiore, & vino nigro. post vinū ve-
 rò, adipem suillum recentē liquato, & pinguedinem anseris
 si affuerit, sin minus, aliam, maximē gallinaccam, aut ex vo-
 lucrum gente. Si vero neq; hæc adit, oleum vetus ex oliuis
 ammiscero, atque hoc tepido colluito post vinum, per alium **E**
 clysterem in os vteri infuso. Et si fuerit vlceratū, linamen-
 ta ex mollitoriis facta apponito. Et si hæc subdita ardorem
 induxerint, his ademptis mulierē aqua tepida lauari iube-
 ro: tali quali colluebatur. Si verò ad hanc dietam fluxiones
 non discedant, pauciores tamen fiant, & vehementer mor-
 deant, & ea quæ effluunt bilis fuerint ac falgore: & nō solum
 internas partes, sed etiam externas exulcerent, dietā trans-
 mutare oportet, & totam humectare, quæ fluxiones quā-
Medela. aquosissimæ fiant, & minimē mordaces, balneis multis cali-
 dis, maza, oleribus coctis omnibus pinguibus piscibus car-
 tilagineis, cum cepis & coriandro, in muria dulci coctis: eo-
 quantur autē pingui modo: carnibus coctis omnibus, exce-
Cibus. pta bubala & caprina: His enim percoctis cū anetho & fo- **F**
 niculo: vino mellei coloris, fuluo, aquoso, vberiore lactis po-
 ru cum vino dulci. Reliqua verò de collutionibus iuxta re-
 latum modum facito. Atque hæc quidē est eiusmodi fluxio-
 num curatio. Quum verò purulenta & compacta exierint,
 harum quidem totum corpus non mouere oportet. Verū
 colluere, & per collutiones totā curationem facere. Colluere
 autem oportet cū iisdem infusis, quæ prius dicta sunt eodem
 modo. Conscribentur tamen etiam aliæ collutiones. Vlcē-
 rum curatio. Ceruinum adipem recentem ac viridem sub-
 dito. Omnia verò statim vino sirao siue sapa colluere opor-
 tet. Optimum autē est cerussa, si vlcera fuerint, & oleo nar-
 cissino. Cibus autem mollissimis vtatur non acerbis. Si ve-
 rò sordida fuerint, & proserpant, ac proximum locum mor-
 deant,

A deant, purgato, & nouam carnē producito, & carnem ad cicatricem perducito. facile enim resoluuntur, & maligna fiunt. & frequenter lauato. Si verò mulier ex abortu vulnus accipiat, aut ex medicamentis subdititiis vteros exulceretur: Qualia multa semper mulieres faciunt ac medicando excitant, & foetus corruptus fuerit, & mulier nō purgetur, sed vteri inflammati fuerint vehementer ac conclusi, & purgationem emittere non poterint, nisi primum emittāt sanguinem qui est in foetu. hæc si quidem curetur, breui sana euadet, verum sterilis. Si verò puerperij purgamenta ipsi sua sponte eruperint, & vlcerata sanata fuerint, etiam sic sterilis erit. Si verò purgatio quidem ipsi fiat, vlcerata autē non purgentur, **B** periculum est ea putredinosa esse. Si verò purgatio prodierit ipsi iam afflicta ac extenuata, moritur. Quin & si in partu vteri valde fuerint exulcerati, foetu non secundum naturam exeunte, eadē patientur quæ patitur ea quæ ex corruptione foetus vteros vlceratos habet. Et trāsmutationes ac fines eodem morbus habet, siue ex foetus corruptione: siue ex partu vteri fuerint vlcerati. & si puerperij purgamenta omnia prodierint, minus dolebit, nisi magna vlcerata fuerint. Et si curetur, breui sanescit. Oportet autem curā cito adhibere, si vlcerata in vtero fuerint. Nam vt quæ in tenero loco sunt, cito augescunt, & breui putrescunt. Curare verò oportet vlcerata, **Curatio.** velut etiam ea quæ in reliquo corpore sunt, Nimirum vt inflammationem arceas, & repurges, & repleas, & ad cicatricē perducas. Danda est autem aqua in potum, vinum minimè. cibos item paucos, ac minimè multos exhibeto. Quicunque abortus facti discedere non possunt, dum aut toti, aut partes foetuum sunt maiores, aut minores & obliqui ac impotētes, tales siquidem secundum naturam siti fuerint, pharmaco aliquo dato ex his quæ ego referam expellito, vbi multa calida prælaueris. Et si prodire volentes, nō facile exeant, quum siti sint secundum naturam, talibus sternutatorium admo- uero. Apprehendito autem nasum, & os comprimito, ac sic sternutet, quo sternutatio quàm maximè efficax sit. Utatur item concussionibus. Sic autem cōcussionem facito. Lectum altum robustum ac instratū sumito, & mulierem supinā reclinato. pectus verò & axillas ac manus, fascia aut molli lato loro ad lectū alligato ac cingito, & crura incuruato, & mal- leolis

Cum vte-
ri partu vel
abortu vl-
cerantur.

Curatio.

Hippocratis Liber I.

leolis apprehensam det. neto. Quum autē sic disposueris, sar- D
mentorū molliū fascē, aut aliquid huic simile parato, tantū
quantus sufficit, vt lectū nō negligat excipiendo ipsum, dum
in terrā proiicitur, quo nō pedibus iuxta caput, terrā contin-
gat. Postea verò ipsam manibus lectū apprehēdere iubeto, &
lectū ad caput suolimem habere, vt decluis sit in pedes, ani-
maduerſione habita ne prona sit homo ipsa. vbi vero hęc fa-
cta fuerint, & lect⁹ suolimis fuerit, retro sarmēta supponito
maximē autē dirigito, quo pedes terrā non contingant dum
lectus proiicitur, & vt sint intra sarmenta. Eleuent autē duo
viri ex vtroq; pede hinc atq; illinc, quo in directū lectus ca-
dat, planē ac æqualiter, & cōuulſio ne fiat. Concutiendum est
autē maximē vnā cū partus dolore. Et si quidē discedant, sta- E
tim quiescendū. Sin minus, interstitio factō rursus cōcutito,
& in lecto gestatam attollito, ac agitato. Atque hęc quidē sic
facienda sunt, vbi rectē & secundū naturam discedant. Opor-
tet autem cerato liquido præillinare, quod in omnibus hu-
iusmodi circa vterū affectionibus optimū est: & malux aquā
affundere, & fœnigræci, aut potius ptisanæ triticeæ succum.

Quum par-
tus nō rite
prodeunt,
quid agen-
dum.

Oportet autem vsq; ad inguina, sedem & pudendum fovere,
& insidere, vbi partus dolores maximē infestarint, & nihil
aliud mēte versare. eā verò quæ medicatur, oscula mollibus
aperire oportet, & leniter hoc facere. Umbilicū verò vnā cū
fœtu attrahere. Quicumque verò duplicati cōplicantur, & in
osculo vterorū incumbunt, eos siue viui fuerint, siue mortui, F
rursus retro p̄trusos vertere oportet, quo secundū naturā in
caput exeāt. Quum autē retrudere voles aut vertere, supinæ
ipsi reclinatæ molle quiddā sub coxas substernere oportet, &
sub lecti pedes, quo altiores sint hi à pedibus, semper aliquid
supponere. Sed & coxæ altiores capite sint, & vt nullū cerui-
cal sub capite sit prouideto. Quū verò retrusus fuerit fœtus
& hinc atq; illinc obuoluitur, vt secundum naturā constitua-

Cum par-
tus viuis
manū vel
crus emit-
tit, & cum
mortuus,
quid agas.

tur, & quicquid sub lecti pedes supposuisti ac lapides, & quic-
quid sub coxas subdidisti, subtrahito. Capiti verò puluinar
subiicito. Atque talia hoc modo curato. Quicumque verò
fœtus viui, manū aut crus foras præmittunt, aut etiā ambo:
eas oportet quā celerrimē vbi exitum significarint, prædicto
modo intro retrudere, & in caput vertere, & ad viā reducere.

Et quicūq; fœtus cōplicatur, ad lateris mollitudinē, aut coxā
in par

A in partu collapsi, eos dirigere ac vertere oportet, & in aquam calidā delidere facere, donec mulier refocilletur. Quicunq; verò fœtus mortui, aut crus, aut manū, foras protendunt, eos optimū quidē fuerit, si id fieri posset, intro retrudere, & ambas has partes in caput vertere. Si vero hoc fieri non poterit, verū intumescit, secare hoc modo. Dissectū per scalpellū caput, cū cōtusorio instrumēto, vt ne in rāmēta findatur cōtundito, & ossa per ossiū volsellā, aut tractoriū instrumētū, iuxta clauiculā immissum, prout habuerint extrahito, non multis simul, sed paulatim exēptis, ac rursus ablatis. Quū verò hæc foras extraxeris, & in ipsis humeris fueris, ambas manus in articulis cū ipsis humeris secato. Et vbi hæc extraxeris, si quidem fieri poterit vt exeāt, etiā reliqua facilē extrahito. Si verò nō obediāt, totū pectus vsq; ad iugulū findito. Verū caueat ne in ventrem seces, & aliquid de intestino denudes. Exit enim vēter, & intestina, & stercus. Si verò horū quid excidat, maioris negotij iam res fit. Contundito autē costas, & scapulas contrahito. Et facilē postea reliquum fœtus procedet, nisi iam vētrē tumidū habuerit. Si enim tale quid fuerit, melius est vētrē fœtus leniter perforare. Flatus enim solū à ventre exit, & sic facilē prodibit. Si verò exciderit manus, aut crus, in mortui fœtus, si quidē fieri poterit, ambas partes retrudito, & fœtū rite dirigit. Hoc enim optimū fuerit. Si verò fieri nō poterit vt hoc facias, quicquid sanē foris fuerit quātum potes penitissime rescato, & reliquū profunditate intus explorata protrudito, & fœtū in caput vertito. Quū autē vertere ac secare puerū voles, vngues de manibus tuis rescato. Scalpellū verò quo dissecas, incuruū potius sit quā rectū, & huius caput occultato per indicē digitū eodēmq; interna explorato ac deducito, ita vt caueas ne vterū cōtingas. Ceterū molæ cōceptus hæc caussa est. Quū multi mēses, modicū & morbosum semen cōceperint, neq; cōceptus rectus sit, & venter plenus est velut pręgnātis. Nihil autē in vētre mouetur, neq; lac in māmīs generatur. Mammæ autē turgidæ sunt. Hęc igitur ad duos annos, sæpe etia tres, sic habet, & si quidem vna caro fiat, mulier perit. Neq; enim fieri potest vt superstes maneat. Si verò plures, erūpit ipsi per pudēdū sanguis carnosus plurimus, & si hoc moderatē fiat, seruatur. Sin minus, à fluxu correpta perit, & morbus quidē talis est. Iudicāre verò oportet.

ex

Partus quo ex plenitudinis mole, & quod in vētre nō mouetur. Nā **mas D**
tus in vtero trimestris, fœmina quadrimestris motū habet. Postquā igitur
moueat. tēpore hoc prætergresso nō mouetur, nimirū hic morbus

Curatio
molæ.

Puerperia
purgatio-
nis mensu-
ra, & color.

Magis læ-
dit abortus
quā par-
tus.

Lactis pro-
creatio.

tur hoc prætergresso nō mouetur, nimirū hic morbus
 est, est autē hoc magnū signū, quod lac in māmīs nō genera-
 tur. Hāc igitur maximē quidē ne curato. Aut certē cū prædi-
 ctione. Et primū quidē totū corpus foueto. Deinde per sedē
 clysterē adhibeto, quo sanguis multus erūpat. Fortassis enim
 quod cōpactū est cōmoueris, id quod fœtus esse putatur, mu-
 lierē à pharmaco cōcalefacta. Sed & vteros colluito, quo san-
 guinē educas. Sin minūs, subdititiis vtatur fortissimis ē bu-
 presti. Et dictānū creticū in vino bibat, sin minus, castoris te-
 stem. Et retro cucurbitā ipsi ad laterū mollicudinē affigito,
 & plurimū sanguinē detrahito. Atq; hoc maximē rerū ac vi- **E**
 rium ipsarū coniectura facta facito. Et hastenus quidē dictū
 est de morbis à puerperij purgamētis fiētibus. Sunt autē pe-
 ricula in ipsis nō parua. Acuti enim sunt, & citō trāsmutātur,
 & magis affliguntur primipatæ, quā quæ sunt partuū ex-
 pertæ. Prodeūt autē puerperij purgamēta sanæ mulieri suffi-
 cienter, primū sesquiheminē mēsurā, aut paulo plura, postea
 adhuc pauciora iuxta hāc rationē, donec cessent. Prodeūt au-
 tem velut sanguis à victima, si sana velut dixi, mulier fuerit.
 & sana futura est, & cito cōgelātur ac purgātur, & post partū
 plerūq; sanæ mulieri cōtingit vt post puellæ partū, in qua-
 draginta duobus diebus diuturnissima purgatio fiat, extra
 periculū autē est etiā si vigintiquinque diebus purgetur, post
 masculi verò partū, purgatio diuturnior fit in triginta die- **F**
 bus, extra periculū est etiā quæ in viginti diebus cōtingit, &
 in his quæ fœtus corruerūt secūdū horū dierū rationē pur-
 gatio cōtingit, & in iunioribus quæ corruerūt paucioribus
 diebus. In senioribus autē, pluribus. Exdē verò sunt affectio-
 nes ex puerperij purgamētis, & ei quæ corruit fœtus, & ei
 quæ peperit, si menstruū corruerit fœtū, & quæ corruerūt
 magis periclitātur. Corruptiones enim grauiores sunt quā
 partus. Nō enim fieri potest vt citra violētiā fœtus corru-
 tur, aut pharmaco, aut potu, aut cibo, aut subdititiis medica-
 mentis, aut aliqua aliā re. Violētiā verò malū est. In huiusmo-
 di enim periculū est ne vteri exulcerentur, aut inflāmentur.
 Hoc autē est periculosum. At verò lac quōmodo fiat, dictū est
 à me in natura pueri in partu. Postquā autē prægnans fuerit
 mulier,

A mulier, menses nō valde prodeūt, prater quā quibusdā pauci.

Dulcissim⁹ enim humor ex cibis ac potib. ad mamas vertitur ac exsugitur. Et necesse est etiā reliquū corp⁹ magis euacuari & minus sanguine plenū fieri. Atq; hoc ita contingit. Sunt autē quæ natura sine lacte sunt, & quibus lac deficit ante tēpus. Hæ vero natura solidæ sunt. & densæ carnis. & ppterca sufficiens humor nō penetrat à ventre in mamas, quum via sit densa. Ad menses detrahendos. Elaterij portiones duas sumito, & adipē ouillū de rhenibus, pari elaterij portione amisceto, & non cōterito, verū duas glādulas subdititias facito. Aut melāthium ex tritico terito, & aqua subigito, & duas glādulas formato, atq; has ante dies quibus affuturi sunt apponito. Si enim nō prodeūt, rigores ac febres inducūt. Mollitoria, à quibus aqua & arena purgatur, ducunt etiā menses, si nō fuerint diuturni, & osculum emolliunt. Narcissum, myrrhā, cuminum, thus, absinthium, cyperum, singula æqualib⁹ portionibus sumito, narcissi verò solū quatuor portiones: & puluillū stupæ dum pectinatur crudū linū ammisceto, & hæc cū aqua origani cocti terito, ac glandē formato & subdito. Aut cyclaminū magnitudine tali, & aris florē magnitudine fabæ terito, & cum melle glandē formato, ac apponito. Aut pulegiū, myrrhā, thus, fel suis ac bouis, cum melle subigito, & glandē efformato. Si menses non prodeant, adipem anseris, & netopum, ac resinā permixta ac lana excepta apponito. Medicamētum subdititium, purgatoriū, mollitorium,

Cur quædā lac non habeāt aut ab eo deserantur. Mensium prouocatio.

Diuerſa de hac re medicamēta.

Caricam percoctā ac expressam leuissimè terito, & in lana subdito cū rosaceo vnguēto. Aut acris brassicæ & rutæ, vtriūsq; dimidium terito, ac vtror eodē modo. Purgatoriū. Medullam anseris aut cerui magnitudine fabæ affuso vnguēto rosaceo & lacte muliebri terito velut pharmacū teri solet, & cum hoc os vteri illinito. Aliud subdititium molle. Medullam anseris magnitudine nucis, cerā magnitudine fabæ, resinæ lētiscinæ aut terebinthinæ magnitudine fabæ. Hæc cum rosaceo vnguento ad lentum ignē liquefacito, & velut ceratum effacito, deinde ex hoc tepido os vteri illinito, & pectinem irrigato. Aliud purgatorium. Farinā recentē, myrrhæ obol. iij. croci tantundē, castorij obolum, hæc trita cum vnguento irino apponat. Aut vrticæ semen, & malux succum, ac anseris adipē simul permixta subdat. Aliud subdititium purgato

Hippocratis Liber 1.

purgatorium. si menses non compareant. Syracē & origanū terito, & permixtis adipem anserinum affundito ac apponito. D

Aliud quod vteros expurgat, ac sanguinē euacuat. Absinthij radicem tritā, melle ac adipe anserino ammixtis apponito. Aliud purgatoriū. De buprestis caput & pedes, & alas tollito, & reliquū ipsius terito, ac ficus internā partē ammisceto. Sit autē pinguitudinis ficus portio dupla. Hoc vteros inflat. Hoc etiā desperatis optimū est. Aut mercurialis folia trita subdito. Hoc tenuē biliosam purgationem ducit. Sed & artemisia facit velut mercurialis, & melius purgat. Veratrū quoq; nigrū cum aqua tritū, velut aquā à carnibus ducit. Sed & alumen ac resina idē facit cyperū, absinthiū, aristolochiā, cuminū, salem, mel. Hæc oīa simul terito ac apponito. Et veratrum cū vino dulci, & farina lolij ac tritici, melle subacta in lana subdatur. Subdititia si catapotia nō purgarint. Mercurialē, myrrham, violam albam, cepam, acerrimā, & melanthium ac mentā, si sufferat, permixta apponito. Subdititia acria sanguinē ducentia. Cātharidas quinque demptis pedibus ac capitib. & myrrhā ac thus simul misceto, & mel addito. Deinde in oleū rosaceum aut Aegyptium tinctū per diē subdat, & vbi mordet, tollat. & rursus in lac muliebre ac vnguentum Aegyptiū tingat, & hoc per noctē apponat. & aqua odorata perluat. & apidē subdat. Conduxerit & buprestis, si quidem parua fuerit, sine alis & pedib. ac capite. Si verò magna fuerit, non cōmisceto eadē quæ cātharidibus, sed solā sumito ac similiter apponito. Si verò molliore opus habuerit F
ad buprestim vinum & cuminū Aethiopicū immisceto, vñ item passam & pollinem seselis ac anisi. & vinū feruefacito, eōq; affuso reliqua terito, & pastillos drachmales efformato eōsq; apponito myrrha ac thure ammixtis: facito autē eodē modo velut cū cantharidibus. Aut melanthium ex tritico, tritum ac melle subactū apponito. Aut hoc ipsum melanthiū cum melle tritum velut glandem effcito, circum pennam autem obducito. Subdititium efficax. Succum mandragoræ & cucurbitæ syluestris, cū lacte muliebri apponito. Aut fecē siccā ex vino veteri albo vrito, & vino extinguito ac subdito. Cucurbitā item syluestre, mercurialē, nitrum & irionem. Citius detrahit & madragoræ radix, cātharis, serpyllū, lauri fructus, vnguentum irinum, laurinum. Tithymali succū permi

A permisceto ac agitato, & detracto visco, erui magnitudine exhibeto. Optimū est & glādē subdititiā ex eo facere. Si verò amplius prodierit, vino proluatur. Aut æs vstū dissoluito, & tepidū lana excipito ac apponito. Medicamentū ad cōceptū. Concepto- Cedriæ acetabulū, adipis bubuli drach. iij. simul terito, & ta-
lorū figuras efformato, quas ieiuna apponat, & dū appositas habet per diem ieiunet. Apponat autē bis, mane & vesperi, post mēses post cœnā verò lauatur: & cū viro dormiat. Aut melanthiū contūdito, & in linteū illigato, & adipe anserino addito, subdendū dato. Aliud ad cōceptū. Quo cures mulierem vt in ventrē cōcipiat, vrinā sumito veterem, & ferri recrementuum tantū, vt in fragmenta resoluerē possis. postea
B mulierē in sella collocato, & corpore & capite velato, peluī- que ad pedes supposita, ignita recremēti ferri fragmēta tria pro vna vice iniicito. Sit autē vetus hæc vrina cōgij mensura, & cum his triginta fomētis ipsam foueto. Dum autem fomentū adhibes, caput lauato, ita vt donec fota fuerit rursus lapides illos recremēti ferri in vrina extinguas, & fomētum rursus calefacias. Postea verò caput lauato plurimū, polio & viticis foliis quā plurimis in aqua coctis. Hæc autē facito ad dies septē. Ter verò per singula hæc fomēta suffito, antequā laues. A balneo verò oleo laurino inungatur. post cœnā autē, vbi cepas melle tinctas comedit, & aquā mulsam tepidā quatuor heminarū mensura bibit, & paululū continuit, vomat. & supina reclinata, rutā habeat auribus & narib. inditā. Et
C panem fermentatum sexta chœnicis parte, in iusculū volucris confringat, habeat autē hoc iusculum apij chemā, & sic assumat; & rursus tantundem in cœna dato. Et hoc per dies septem facito; postea verò veteri per dies septem clysterē adhibeto, Sit autem infusum clysteris, resinæ drach. iij. mellis acetabulum, olei plataensium tantundem, furfurum recentium succus, spuma nitri, oua tenuia. Sit autem infusum hemina octo, & ex his tres succi ptisanæ. Obliquæ verò clysterem adhibeto, & parum lauato. Apponat etiā glandes septē in die, & detineat donec fuerint liquefactæ. Sint autē ex thure, nitro, galbano, melle cocto. Cibo verò eodem vtatur. Suffito autē asini albi pilos, & lupi stercus. De his plurimū prunis iniice, ipsamq; circumlocatā ac cōtectā suffito, cauendo ne cōburas. Si verò mulier parere nequeat quæ prius peperit,

L

rit,

Quæ conce-
ptus pare-
tur.

Conceptus
reparatio.

rit, nitrum & resinā, & myrrhā, & cuminum Aethiopicū, & D
unguentum simul terat, & apponat. Aut pulegiū siccū in lin-
teo subdat. Bibat autē pulegium ubi dormire volet. Aliud
ad conceptum. Victus rationem mulieri cōstituere oportet,
quæ prægnans fieri cupit, & ad edendum ac bibendum exhi-
bere ipsi, quæ libēter admittit. Viro autem mulieris reliqua
dato, præter alliū, & cepā, & legumina fresa cocta, & silphij
succum, & que insunt. Ab his sane abstineat. Medicamentum
quod similiter infunditur si nō concipiat. Lac mulieris ma-
sculum alentis, grana mali punici recētis terito ac succum
exprimito, & testudinis marinæ partē inter anum & puden-
dum cōburito ac terito, & hæc in pudēdum muliebri infun-
dito. Aliud quod similiter infunditur nō cōcipiēti. Lac & re- E
sinam, & mali punici dulcis succum, Hæc omnia melle am-
mixto infundito. Aliud ad cōceptum. Bulbi albi semē aut flo-
rem cum melle terito, & lanæ inuolutum per tridū ad vte-
rum apponat. Quarta verò die, malū sylvestrē latifoliā te-
rat lacte muliebri ammixto, & lanæ inuolutā apponat. dein-
de cum viro dormiat: præforbeat autē pulegium in farina
coctum, & bibat pulegiū tenue in vino. Si verò huic nō obe-
diat, conyzā odoratā cōtundat, & expressum succū vino mix-
tum ieiuna bibat. Aliud. Asparagi semen similiter in vino
bibat. Aliud. Secundā mulieris, & vermium carniū capi-
ta, & alumē Aegyptium, cum adipe anserino diluito, & in la-
na ad os vteri apponat. Aliud. Aeruginē, florem æris, vtrun- F
que oboli dimidij pondere, thuris masculi, aluminis scissi,
fructus vitis sylvestris, gallæ, myrrhæ, malicorij, resinæ, polij,
singulorum obolum, in melle tritum, per triduum bis in die
apponat. Si verò fortassis acrius fuerit, anseris adipem ac ni-
trum tostum ammisceto. Vinū autem exhibeto, fortitudinē
in ipso vitans. Aliud ad conceptum. Vermem carniū qui
caudam habet accipito, & de ipso tres aut quatuor partes su-
mito: & origanum tenuem simul cum rosaceo vnguento te-
rito, & hoc ad vteri os apponat. Aliud. Portulacā cum adi-
pe anserino, & myrrhā, & porri semine, & felle bubulo teri-
to, & lanæ inuoluta ad os vteri apponito. Si menses quidem
siant multi, non cōcipit autem, floris æris obolos duos, & alu-
minis scissi tantundem, cum melle terito, & lana excipito.
Illiget autem mulier lanā in linteū cum filo, & sibi ipsi sub-
dat,

A dat, ita ut filum extra promineat. Deinde quum probè purgata fuerit extrahat, & vino odorato myrti foliis iniectis feneſto proluat, & virum accedat. Subditiu ad cōceptum. Mel, myrrham, myrica fructum, reſinam liquidam, adipem anſerinum, omnia ſimul trita lanæ inuoluta apponat. Aliud, quod vterum valde aperire poteſt, quum cōcluſus eſt, & cōcipere non poteſt, & ad aquam expurgandam. Accipe anchuſam paruā, & lentiſcum, & cuminum, & cyperum, & cucurbitam ſylueſtre, & nitrum rubrum, & ſal Aegyptium, & anchuſam magnā. Hæc omnia trita per linteum rarum excernito, & acceptū mel ad lentum ignē coquito. Poſtquā verò efferbuit, cerā ac reſinā ammiſceto. Deinde etiā aliis omni-

B bus ammixtis oleum affundito. ac ab igne tollito, & tepida lanæ cōuolutæ inuoluta vtero apponito, donec purgata fuerit. Aliud. Si mulierem cōcipere velis, ad purgatoria quibus vtitur, etiā virū accedere oportet. Et baccas lauri nigras decem, thuris pugillos tres, & cumini modicum, cum melle trita in lanam ſuccidam inuoluat, & ſemel in die ſubdat, & ſemel auferat, ad quatuor dies, & iſdem diebus à cibo abſtineat. Conceptum impediens. Si verò concipere non oportet, miſyos magnitudinē fabæ aqua diluito, ac bibendā dato, & per annum ut ita dicam, non concipiet. Partum accelerans ægrè parienti. Lauri radicem deſaſam, aut lauri baccas dimidij acetabuli menſura in aqua calefacta bibēdas dato. Aliud partum accelerans. Dictamni obolos duos tritos in

Cōceptum
impediētia
Partum ac
celerantia.

C aqua calida bibat, aut abrotoni drachmā, & lauri baccas, & aniſum, in vini dulcis veteris cyatho terito, & aquæ cyatho affuſo bibendum dato. Hoc bonum eſt ſi ante partus dolores fuerit datum. Aut dictamni obolū, myrrhæ obolū, aniſi obolos duos, nitrī obolum. Hæc cum vini dulcis cyatho vno terito, & aquæ calidæ cyathis duobus affuſis bibenda dato. Deinde calida lauato. Aliud partum accelerans. Reſinā terebinthinam, mel, oleū duplum horum, vinum odoratū quā ſuauiſſimū. Hæc mixta tepefacta ſæpe ebibenda dato. Oportet autem, & vteros ſedare, ſi fuerint inflammati. Aliud.

Cucumeris ſylueſtris quicunq; albus fuerit ſemē ceræ infarcito, deinde lanæ rubræ inuolutum lumbis alligato. Si verò pregnans multo tēpore cohibeatur, & parere nō poſſit, ſed diebus pluribus ex partus doloribus laboret: Sit autem

L 2 iuuen

Hippocratis Liber I.

Quæ puer-
peria pur-
gent.
 iuuenis, in vigore, & multo sanguine referta, secare oportet **D**
 venas in malleolis, & sanguinē detrahē, viriū respectu ha-
 bito, & postea calida lauri corticibus incoctis lauato. Viticis
 autem semen, & dictānum creticā, vtrunq; pari portione, in
 vino albo aut aqua bibendū dato. Subdititium autem medi-
 camentum facito galbano, & baccis lauri, & oleo rosaceo, in
 lana inuolytis ac subditis. Aliud. Filicis quercinæ radicem

tritam in vino bibendam dato, & adiantū tritum in oleo di-
 lutum illinendum, & in vino meraco bibendū dato. Aliud,
 quod puerperæ puerperij purgamentā melius purgat. Testu-
 dinis marinæ hepar viride adhuc viuentis, in lacte muliebri
 terito, & cum vnguento irino ac vino subigito, & apponito.
 Aut mercurialem tritam in lana apponito, Aut artemisiā tri-
 tam similiter in lana subdito. Aut mercurialis & cucumeris **E**
 syluestris parum terito, & vino ac melle subactū apponito.

Purgatoriū puerperij purgamentorum ex partu. Triticū
 trimestre fractū ac fresum, dimidię chenicis mēsurā, in aquę
 heminis quatuor coquito. Quū autē efferbuerit ter aut qua-
 ter, sorbendū dato. Aliud. Sambuci folia in aqua coquito, &
 aquā bibendam dato. Edat autē & brassicas coctas, & por-
 rum, & sceniculum, & anethū, & polypos, & locustas piscicu-
 los. Aut rhois folia & erysimū ex vino, aut polentæ pollinem
 bibendū dato. Aut misy duorū obolorū pōdere tritū ac vino
 subactum apponito. Purgatorium mēsiū & puerperij pur-
 gamentorum. Ducit etiā aquā & alia. Radicis struthij tusi
 triti quantum tribus digitis apprehendi potest, melle sub-
 actū apponito. Nascitur autē in Andro in littoribus. Aliud **F**
 similiter purgans. Erysimū in aqua coquito, & vbi ebulliit
 oleū affundito, ac bibendum dato. Commodum est etiā suc-
 cum pro fomēto adhibere per suffitum, & cibis molliorū vti.

Aliud quod puerperij purgamentā purgat. Erysimum pla-
 cide terito, & corticē diffiato. Quum autem purum feceris,
 leuiter terito, & aquā adstillato, salēmq; ac oleum ammisce-
 to, & vbi polentam insperferis coquito, ac sorbendum dato.

Aliud. Si non descenderit purgatio, aut puerperij purga-
 menta nō prodierint. Cucumeris syluestris internā partem,
 trium obolorum pōdere sume, & artemisiam herbā, & thus
 oboli pōdere, & hæc trita, & melle ammixto, lanæ inuoluta,
 ad vteri os appone. Et hoc semper noctu ac interdiu per dies
 quinque

A quinque facito. Aut vitris pampinos aut folia viridia terito, & melle immixto lana excipito, & eodē modo subdito. Aut cupressi fructū & thus simul trita, rosaceoq; ac melle diluta, & lana excepta apponat. Aut abrotoni drachmā, & cucumeris sylvestris medullæ obolum, & thus cū melle terito, & in lana inuoluta apponito. Aut elaterij obolū, & myrrhā, cum melle terito, & lana excepta apponat. Aut cupressi fructum, & cucumeris sylvestris internam partem, & thus, melle amixto, in lana subdat. Purgatoriū si ex partu nō purgetur. *Puerperarū purgatio diuersa.* Trifolium in vino bibendū dato. Idē etiā appositum menses erumpere facit, & fœtum eiicit. Purgatorium vterorū, quū puero mortuo sanguis in hoc māserit. Cucurbitā sylvestrem tritā cum melle delingat, aut apponat. Ad omnia puerperij purgamenta si nō probē prodeant. Erysimum coquito cum polenta, & oleo affuso vbi coctū fuerit sorbeat: & cibis molliissimis vtatur. Aut scāmoniā cū lacte muliebri tritam, ac lana exceptā apponito. Aut radicem dulcem melle, & rosaceo aut Aegyptio vnguento subactam, in lana subdat. Aut farinam lotā similiter apponat. Bibat autē crethmi: & seselis, & rutæ, & silphij semen, ita vt de singulis obolos duos simul terras, & in vino meraco, si non febricitarit, præbeas. Subdititium quod secundam relictam eiicit. Ex sambuci foliorum decocto prius fomentum adhibeto, & id quod ex cantharide fit apponito. Hoc & ea quæ debilia sunt sanat. Si verò lancinet ac mordeat, statim tollito, & lanam rosaceo tinctā subdat. *Secundam quæ educant.* Potiones quæ secundam educere possunt, & menses detrahē, itēque fœtum euectum. Cantharidas quinque, alis & cruribus ac capite auulsis, & tribulum ad mare natum cum radice ac foliis tritum conchæ mensura, & euanthemi, ac seminis api j tantundem, & sepia oua quindecim, in vino dulci temperato bibenda dato. Et vbi dolor habuerit in aqua calida desideat, & aquam mulsam aquosam bibat, & vinum dulce. Alia. Ranunculi foliorum ac floris triti, stateris Aeginæ pondus, in vino dulci bibat. Si verò dolor habuerit, cicer album & vuas passas, in aqua coquito, perfrigerato, ac bibendum dato. & vbi vrinx scillicidium vexarit, in aqua tepida desideat. Aliud quod eiicit secundas. Cucumeris sylvestris succum in mazam conspersum apponat, vbi prius ad biduum ieiunarit. Hoc nullum aliud præstantius

Fœcundita inueneris. Fœcunditatis experimentū. Caput allij integrum D
 tis experien deraſum appone, & vide an per os oleat. Aliud experimētū.
 tia.

Netopon modicū lana inuolutū apponito, ac videto an per
 os oleat. Alia ſubdititia. Scorpij marini fel, lana exceptū &
 in vmbra ſiccātū appone. Aut pulegiū ſiccātū & tritum ac
 melle ſubactū, in lana apponito. Aut florē æris cū melle lin-
 teolo illigātū ſubdito. Aut cucumeris ſylueſtris ſemen, & te-
 ſtam cōbuſtā, cū vino ſubigito, & leporinis pilis ac lana exce-
 pta ſubdito. Aliud ſubdititiū. Alumen Aegyptiū lana inuo-
 lutum apponito. Aut cātharidas tritas vinōq; ſubactas ſubdi-
 to. Aut artemiſiā herbā vino ſubactā apponito. Aut melan-
 thium cū vino tritū in lana ſubdito. Aut bulbion ex tritico
 tritum & vino ſubactū apponito. Aut vini veteris albi facē E
 comburito, & vino albo extinguito, teritōq; ac in linteo ap-
 ponito. Aut galbanū, & netopon, & miſy cū roſaceo vnguen-
 to in linteo ſubdito. Aliud. Elaterij potiones duas, & fauum
 cum vino in linteo apponito. Aut butyrū & alumen melle
 ſubacta ſimiliter. Aut ſcammonia ſuccū & adipē cum maza
 miſceto, & vino imbuta in linteo apponito. Potiones quæ
 poſſunt ſecundā in vtero detentā educere. Colocynthis ſyl-
 ueſtris internā partē cum lacte muliebris tritā, in linteo appo-
 nat. Ad idē. Silphium magnitudine fabæ in vino bibendū
 dato. Aliud quod fœtū expellit. Mulierē ſub alis apprehen-
 ſam fortiter cōcutito. In potu verò dato, viticis folia in vino,
 Aut dictānum creticū oboli pondere in aqua terito ac exhi-
 beto. Aut conyza graueolētis manus plenā mēſurā cū porri F
 ſucco diluito, & netopū chemæ plenā mēſurā addito, atque
 hæc trita in vino bibēda dato. Aut tadā pinguiſſimā cū vino
 dulci coquito, trium cyathorū mēſura vini affuſa, & galbani
 obolos tres & myrrhā adiicito, & vbi cocta craſſa facta fue-
 rint, tepida bibenda dato. Aut porri ſuccū, & myrrhā, & vinū
 dulce ſimul exhibeto. Aut portulacæ ſemen terito, & in vino
 albo veteri dato. Aut populi nigræ creticæ grana nouē in vi-
 nō trita bibat. Aut ranunculi herbæ foliorum ac floris triti,
 drachmæ æginæ pondus, in vino dulci bibat. Si verò adhuc
 ſecunda intus detineatur, Senegætæ anguiū obolū in vino teri-
 to, ac bibendū dato. Aut apij radicē, & myrti baccas coquat,
 & per dies quatuor bibat. Aut cuminū Aethiopicū, & caſtorij
 obolum, & cātharidis parū hæc in vino bibēda dato. Aut fœ-
 niculi

Quæ fœtū
 expellant.

A niculi radicē, & in vino & oleo ac melle feruefactā bibat. Si secunda nō prodierit, conyzam tritā in lana subdito. Melius autē est vt bibat. Aut conyzæ quātum manus capit, & porri succum, & netopū chemæ mēlura misceat, & hæc in vino bibat. Aliud quod secūdā eiicit. Holoconitidis dulcis radicē, est autē velut bulbus, & parua velut oliua: Hæc in vino terito, ac bibendā dato. Et si quidē parua fuerit duas dato. Si verò maior, vna sufficit. Ammisceto autē ex seminibus cumini Aethiopicum, & feseli māsiliēse. Aut sulphij libyci semē siccum chœnicis dimidiæ mensura, in vini heminis tribus coquat, & ad dimidias redigat, & de hoc bibat. Aliud. Viticis semen, & feselis, pari portione simul cū myrrha terito, & cū

B aqua bibēda dato. Alia secundas expellētia. Viticis alba recentis acetabulum, in vino albo odorato tritū bibendū dato. Aliud. Castorij aut sagapeni obolū, bituminis drach. j. nitrī drach. ij. Hæc omnia terito, & in vino dulci, ac olei hemina dimidia obolos duos ieiunæ bibēdos dato. Et calida probe lauato. Aliud similiter habens. Herinaceos marinos tres totos tenuiter tritos, in vino odorato bibendos dato. Aliud. Mentæ fasciculū paruum, & rutæ & cōriandri, & cedri aut cupressi semē, in vino odorato bibēdum dato. Et de herinaceis si habuerit, plurimū sorbeat. Postea verò similiter calida lauato. Aliud. Anisum, cedri baccas, semen apij, cuminum Aethiopicum, feseli, singulorū dimidiū acetabulū, tenuiter tritum, ex vino albo bibendū dato. Aliud. Dictamni fasciculū,

C & dauci seminis drach. ij. & melanthij tantundē, tenuiter terito & in vino albo bibenda exhibeto, & multa calida lauato. Dato autē iuxta corporis robur. Aliud. Galbanū oliuæ magnitudine, in oleo cedrino tritum apponat. hoc corrūpere & eiicere morātes secūdas potest. Aliud secundarū expulso-rium quod vteris infunditur. Quum secūda à frigore mortificata cōputruerit, vbi ventus frigidus fuerit, crocum leuiter tritum drachmæ pondere, cū adipe anserino infundito, & ad plurimum tēpus finito. Potus ad idē probe cōferens. Conyzā suaue olentē, & mel, & resinā terito, inq; vino odorato, aut in syrmaea potione moderate purgāte bibenda dato, & calida lauato. Alius similis potus ad puerū & mala intus existētia. Aeruginē tritā cum melle, & syrmaea potione, bibendā dato. Aliud subdititiū, ad eiiciendū factum immortuū. Aeris

ramenta in molle linteū indita, ad os vteri apponito, & pro-
 fueris. Aliud. Testā recentē, & adipē anserinū terat ac appo-
 nat. Aliud. Nitrū cū resina coctū, & in glandē efformatum,
 gallinaceo adipe tinctū appone. Aliud. Charien appellatur
 herba, huius radicē non multo adeò tēpore ad vmbilicū ap-
 ponito. Aliud. Cucurbitā syluestrē, & murium stercus, leui-
 ter trita apponito. Aliud quod alligatur. Resinā & adipem
 gallinaceum, trita ac simul mixta, super vmbilicū ac ventrē
 deliget. Aliud subdititiū. Hedera alba semen, & cedri ra-
 menta terat, & glādes hinc factas subdat. Aliud. Testudinis
 marinæ cerebrū, & crocum Aegyptiū, & salē Aegyptiū teri-
 to, misceto, glandes formato, ac subdito. Suffimentū expulso-
 rium quod & sanguinē ventris expellere potest. Salicis folia
 in ignē posita suffito, & mulierē circumlocatā finito donec
 fumus in vterū intrauerit. Abortus sanatio. Quum mulier
 abortum fecerit, & puer nō fuerit egressus, siue putrefactus
 fuerit, & intumuerit, aut aliud quid eiusmodi passus fuerit.

Abortus.
sanatio.

Porri & apiij succum per linteū expressum, de vtriusq; colli-
 gito, & olei rosacei heminā, & adipis anserini quadrantem
 adiicito, resināq; obolos tres in oleo liquefacito, & vbi mu-
 lierē ad pedes altiorē feceris, in vteros infundito, ac decum-
 bens ad plurimū tēpus cōtineat. deinde ad dies quatuor desi-
 dere iubeto, & egreditur puer putrefactus. Sin minus. Salem
 Aegyptium & cucurbitā syluestrē viridē accipito, & melle
 ammixto trita edēda dato. Et postquam ederit, hinc & hinc
 moueatur. Aliud. Salē Aegyptiū, & murium stercus, & cu-
 curbitam syluestrē sumito, & mellis semicocti quadrantem
 affundito, & resinā drach. j. in meliniicito, & cucurbitam ac
 muriū stercus, omnia probē cōterito, & in glādes efformato,
 easq; ad vterū subdito, quā diu opportunū esse visum fue-
 rit. Aliud expulsoriū, quod puerū enectum eiicit. Helxinē in
 vino tritā bibendā dato. Aliud eiectioniū, quod puerū liuidū
 expellit. Veratri nigri radices tenues tritas. quātum tribus
 digitis apprehendere potes, & myrrhā magnitudine fabæ, in
 vino dulci bibēda præbe. Aliud expulsoriū. Coriandrū cum
 radice, & netopū apponat, ac deambulet. Aliud quod infun-
 ditur, si mortuus fuerit puer, ut ipse eiiciat. Crocum teri-
 to, & anserinum adipē affundito, & excolata in vteros infun-
 dito, & ad plurimū tēpus relinquito. Ad fœtum immobilem
 corrumpendum

Partus im-
mortui eie-
ctio.

A corrumpendū ac expellēdū. Aluminis scissi drach.j. myrrhæ Cam par-
tantundē, veratri nigri obolos tres, in vino nigro leuiter tri- tus nō mo-
ta, in glandes afformato. & apponito donec paulatim fuerit uetur.
exolutus. Collutiones vteros purgātes, si ex partu aut inflam- Lotiones
matione fuerint exulcerati. Grossos hybernos aqua affusa diuersæ.
feruefacito, & excolato. Deinde oleo tepido affuso misce, &
duas heminas ad summū infunde. Omnes autē collutiones
nō ampliore quā hac mēsurā vteris infundātur. Malico-
rium itē & mānā thuris, in vino nigro austero coquito, & ex-
colato vinū infundito. Alia collutio. Facē vini vstā lique-
facito, & cū aqua infundito. Deinde malicoriū, myrti bac-
cas, iuncum odoratū, lētes in vino coquito, & diffusum vinū
B infundito. Alia. Butyrū, thus, resinā, mel, simul liquefacito,
& affuso vino, tepida infundito. Aut sambuci fructū in aqua
coquito, & excolata aqua, apium myrrhā, anisum, thus, simul
in ipsa terito, & vinū odoratū pari aquæ mensura affundito,
excolatoq; per linteum, & tepefactū infundito. Alia. Brassi-
cam, & mercurialē, & lini semē, & linum viride, in aqua co-
quito, excolato, ac infundito. Aut foliorū myrti acetabulū,
myrrhā, anisum, mel, resinā, vnguentū Aegyptiū, omnia teri-
to ac vnito, affusisq; vini albi odoratissimi heminis duabus,
excolato tepefacito, infundito. Aut lauri fructū & pulegium
in aqua coquito, & vnguentū rosaceū affundito, & cū hoc te-
pido colluito. Aut anseris adipē resinæ ammisceto, affusóq;
C ad hoc vino, tepefactū infundito. Alia. Butyrū & oleum ce-
drinum, in modico melle tepefacito ac infundito. Aut mel,
butyrū, iuncū odoratū, calamum odoratū, muscū marinū su-
mito, & in vino coquito, excolato, ac infundito. Aut apij se-
men, seselli, myrrhā, anisum, melāthium, in vino coquito, &
excolato vinum infundito. Aut cedrū in vino coquito, & cum
vino colluito. Aut hederā in aqua coquito, & aquam infun-
dito. Aut elaterij, aut cnestri portiones duas in aqua coquito,
& duas heminas ex hac tepida infundito. Aut cucumeris syl-
uestris interioris magnitudinē digiti in duabus aquæ hemi-
nis coquito, & melle ac oleo ad aquam affuso infundito. Aut
radicis thapsiæ portiones duas leuiter terito, affusóq; oleo ac
melle, in duabus aquæ tepidæ heminis diluito, ac infundito.
Aut veratri nigri portiones duas, vino dulci & aqua dilutas
infunde. Aut grana caidia sexaginta terito, melléq; ac oleo

L 5

& aqua

& aqua affusa infundito. Collutio corroboras, si vlcera pura **D**
 fuerint. Grossos hybernos terito, & aquam affundito, & per
 totā diē macerato, & oleo affuso colluito. Aut malicoriū, &
 loti ramenta in vino nigro coquito, & infundito. Quū autē
 impura fuerint, & sordes deferuntur, facē vini vnā, cū vino
 & aqua infundito. Aut malicoriū, rhoem coriariū, myrtiq;
 ac rubi folia, in vino nigro coquito ac infundito. Collutio-
 nes quæ infunduntur ad vetera vlcera. Succo brassicæ cocto
 collue. Et mercurialē similiter ac nitrum rubrū modicum
 ammisce, & myrrhæ acetabulū, thus, seseli, anisum, apij se-
 men, netopū, resinā, mel, adipē anserinū, acetū albū, vnguen-
 rum albū Aegyptiū, Hęc omnia simul trita, & vini albi hemi-
 nis duabus diluta, tepida infunde. Aut mercurialē in aqua **E**
 coque & excola, & myrrhæ acetabulū, thus, seseli, netopū, sin-
 gulorū pares portiones adde, ac tepida infunde. Aut saluiā
 & hypericum in aqua coquito, & cū aqua colluito. Aut sam-
 buci fructū, & lauri baccas, æquis portionibus in vino coqui-
 to, & cū vino colluito. Aut pulegij aqua colluito. Aut adipē
 anseris in resina liquefacito, & similiter oleū cedrinū modi-
 cum affundito, & cū melle liquefacito, ac tepida infundito.

Aut argēti florē in vino & melle ac cera liquato, & cyperū,
 & iuncū odoratū, ac calamū (quæ sanē etiā in vnguentū am-
 miscētur) & iridē ac muscū in vino coquito & infundito. Aut
 apij semē, anisum, seseli, Myrrhā, melāthium, in vino coqui-
 to ac infundito. Aut cedrum creticā in vino coquito, aut in
 aqua, & infundito. Aut hederā creticā in aqua coquito ac in- **F**
 fundito. Atq; hæc faciēda sunt si vulnus habet, & myrrhā in
 aqua dilutā infunde. Aut elaterij portiones duas cum aqua
 infunde. Aut colocynthidas sylvestres duas in vino aut in
 lacte cocto, quatuor heminarū mēsurā macerato, & excola-
 to, aut infundito. Aut cucumeris sylvestris interioris, palmi
 magnitudinē in aquæ heminis quatuor coquito, & melle ac
 oleo affuso colluito. Aut radice thapsiæ duas portiones, in vi-
 no dulci dilutas, cū aquæ heminis duabus, tepidē infundito.

Aut veratri portiones duas in vini dulcis heminis duabus
 dilutas infunde. Aut thlaspios acetabulum melle ammixto
 in aquæ heminis duabus dilue, & tepido vtere. Aut cucume-
 ris sylvestris magnitudinē palmi, & cneori potionē vnā, in
 aquæ heminis quinque coquito, & melle ac oleo affuso col-
 luito.

- A** luito. Aut grana cnidia sexaginta, in melle aut in oleo diluta, cum aqua infundito. Si ex partu alui profluuium corripiatur. Bibat uua passam nigrā, & punici dulcis malicoriū, & internū nucleū, & coagulum hœdi. Hęc vino nigro diluta, & caseo caprino, ac polenta triticea inspersis, bibenda dato. Triticū autem modice torieto. Si verò ex partu sanguinē vomat, huic hepatis fistula sauciata est. Hęc lac asini bibat, dein de vaccæ nigræ, ad quadraginta dies. Et sesamū tritū donec probè habeat. Bibat autem lac ieiuna. Si ex partu sedem doleat, iuniperi fructū & appij radicē coquat, & ad dies quatuor habeat, & lactuce semen cum anserino adipe tritū edat. Si verò ex partu vteri inflāmati fuerint, solani succum infundito,
- B** aut betæ, aut rhamni. Si ex partu crus ab vteris claudū factū fuerit, & exurgere non poterit, semen hyosciami chemæ mensura, in vino nigro ad triduū bibat. Si verò mēte percellatur ipsa bibēs, lactis asinini periculū bibendū dato. Deinde pharmacum à quo pituita purgatur, ex sandaracha aut & cerato, & pilis leporis, per triduum suffitus fiat. De inflāmatione ex partu. Si ex partu vteri inflāmati fuerint, solani succum intra pudēda infundito. Aut apij, aut rhamni, aut betæ, aut cucurbitæ succū expressum. Aut sambuci medullā ac tenerrimā partem derasam, oblōgam indito. Aut absinthiū in aqua terito, & lana exceptū subdito. Si verò horruerit tollito. Aut cotyledonis folia, & porrū, in crassiore tritici farina corquito, & oleo ipsis affuso præbeto. Bilem ex vtero purgantia.
- C** Cucumeris sylvestris internā partem tritā ac melle subactā, in glandē efformato ac apponito. Pharmacū autē dare oportet, qđ sursum ac deorsum purget, & calida lauare apponere vero anisum, aut melanthiū: aut colocynthidis sylvestris internā partē terito, & melle subactā apponito. Aut elaterij portiones quatuor, ammixto adipe anserino aut caprino, in oblongiorē glandem redactas apponito. Aut nitrū, & cuminū, & allium, & ficū oīa leuiter trita & melle subacta apponito. Calida verò lauet, & à balneo bibat. Aut thlaspi leuiter tritū & melle subactū apponito. Aut ficus veteris pinguitudinē derasam elaterij portionib⁹ duab⁹ ammixtis, & nitro tm̄ quantum est elateriū, cum melle subigito ac apponito. Aut puce dani tres cyathos bibēdos dato. Et anisum ac melanthiū vino diluta bibenda dato. Aut elaterij portiones quatuor, adipe ouil

Sanguinis
vomitus
caussa.

Contravte
rorum in-
flammati-
nem.

Diuersæ
medele.

**Collutiões
varia.**

**Pituitosa
& biliosa
lauatio.**

pe ouillo ammixto apponat. Et hoc ablato aqua odorata la-
uet, quæ leniter adstringat. Aut elaterij potiones tres cū ouil-
lo adipe, in glandē circū pennā efformato, & vbi amouerit,
sufficienti aqua probe eluatur. Aut thlaspi potione cū melle
dato. Collutio si biliosa fuerit. Elaterij potiones duas
aqua dilue, & oleū narcissinū affunde, & cum tepido collue.
Aut colocynthides syluestres duas in lactis asinini cocti he-
minis quatuor macerato, & vnā excolato, ac oleū narcissinū
ammisceto, & infundito. Alia collutio biliosa & pituitosa.
Cucumeris sylvestris internā partē palmi magnitudine, in
aquæ potabilis heminis quatuor coque, & melle ac oleo an-
thino ammixto infundito. Alia pituitā & bilē purgans. Gra-
na cnidia sexaginta, melle ac oleo anthino ammixto, cū aqua
infundito. Aut cnestrū in aquæ potabilis heminis quinq; co-
quito, & duabus excolatis, mel & oleū anthinū cum narcissi-
no ammisceto, ac colluito. Collutiones purgatoriæ. Grossi
hyberni vsti in aqua macerantur, & ad aquā excolatā oleum
ammiscetur, ac infunditur. Postea verò collutio fiat ex mali-
corio, galla, lori ramētis. Hæc autē in vino nigro coquere o-
porteret. Aut facce vini vsta vttere cū aqua. Et postea hæc infun-
dito, myrti folia & rhoem coriarium. Coquātur autē in vino
nigro odorato. Et postea lētisci folia, & hypericum. & saluiā,
cum vino nigro odorato cocta infundito. Aut cum brassicæ
aqua, in qua mercurialis cocta sit, modico nitro adiecto, col-
luito. Aut elaterij potione, cū oleo narcissino aut anthino, te-
pidam infundito. Si verò biliosa fuerit, colocynthidas duas,
in lactis asinini cocti quatuor heminis macerato, & cū exco-
lato colluito, oleo narcissino aut anthino ammixto. Aut cu-
cumeris sylvestris internā partē palmi magnitudine, in aque
potabilis heminis quatuor coquito, & melle ac oleo anthino
addito, colluito. Hæc collutio pituitosæ ac biliosæ conducit.
Collutio pituitā trahēs. Granum cnidium, & mādragoræ li-
quorē terito cum aqua. Nā purgatio multa & oīs generis ex
hac collutione contingit. Aut allij caput integrū, nitrū, ficus
internam pingue partē, æquis portionibus trita ad gallæ ma-
gnitudinē efformato, ac apponito. Aut cumini folia cū vino
trita, in lana subdito. Aut radicē albā terito, & melle affuso
feruefactā in glandē redigito, ac apponito. Aut silphij liquo-
rē cum ficis emollito, & glandē efformato. Bonū est & cucu-
meris

- A** meris syluestris semē similiter tritum ac preparatū. Aut fel tauri, & nitrū rubrum, & netopū, ac cyclaminū, illorū quidē gallē magnitudinē, cyclamini verò ampliorē portionē, melle ammixto mulier quæ curatur apponat. Aliud subdititiū. Cyclamini caput purgatum aqua terito, & lana tenera exceptū apponito. Aut myrrhā, salē, cuminū, fel tauri, cum melle eodem modo. Aut grana cnidia triginta, & indici pharmaci oculorum, quod vocat piper grana tria, decorticato: & rotundi itē tria. Hęc autē terito, & vino veteri tepido diluta, instar glādis circū volucris pennā efformato, & sic adhibeto. Aut thymali succum melle subactū. Aut scillæ radicē lōgitudine digitorum sex, duobus digitis lana obuolutis subdito. Aut
- B** ipsam scillā absq; radice terito, & similiter lana obuolutā apponito. Collutio si pituitosa fuerit mulier. Veratri potiones duas in vini dulcis heminis duabus diluito, & p̄mixta infundito. Si purgatione opus habuerit, porrum coquere oportet, aut sambuci fructum, anisum thus, myrrhā, vinum. Hęc omnia terito, & cū succo horū colluito. Aut brasicā in aqua coquito, & in huius succo mercurialē coquito, & nitri parū, & excolatum infundito. Aut cnestri portionē in melle dilutā immittito. Verū mēses cōsiderare oportet, an biliosi sint, aut pituitosi. Ad hoc arenā siccā tenuē in solē subiicito, & quū mēses prodierint, sanguinem superfundito, ac siccari finito. Et si quidē biliosi fuerint, sanguis in arena siccatus viridis euadit. Si verò pituitosi, velut mucus conspicitur. Si igitur pituitosi
- C** fuerint, cnestri portionē cum aquæ mulsæ hemina infundito. Purgatorium molle, aquā ducit & pelliculas, ac saniem subcruentā. Detrahāt & mēses, nisi diuturni fuerint, & vterorum os molliat. Vnguētū narcissinū, & cuminū quod editur, myrrhā, thus, absinthium, cyperū, vnguētum rosaceū. Horū singulorū pares portiones, narcissini verò quatuor partes sumito, & crudi lini puluillo dum à stupa depectinatur ammixto, omnia terito, & glandē circū pennā efformato, & linteo tenui circumdato deligato, & in oleum album Aegyptiū tingito, ac apponito, & per totā diem finito. Et vbi lauit & amouit, aqua odorata perluaat. Aliud purgatorium. Ducit aquā & pelliculas, & mucus, & saniē subcruentā. Myrrhā, salē, cuminum, fel tauri, melle subacta & linteo indita apponito, & totū diē infusa finito. Deinde vbi lauit & amouit, aqua odorata perluatur,

Mensium
cognitio.

Purgamen-
tū ad mul-
ta.

tur. Aliud. Salē, cuminum, fel tauri, melle subigito ac subdi- D
to. Et silphium ficui ammisceto ac apponito, Deinde vnguen-
to rosaceo illinito. Aut grana cnidia decorticato portio-
nēmq; ipsorum terito, ac in glandē efformato. Aut allium &
nitrū rubrū, & ficū, paribus portionib⁹ melle ammixto sub-
denda dato. Et vbi amouerit, cerui adipē apponat in vino li-
quefactum. Aut piperis grana quinq; cum modico elaterio,
muliebri lacte instillato, in lana vnguēto tincta apponat, ac
amoueat eodem modo. Aut pinguisimā ficus partē cum ela-
terij portione, & nitri rubri ac mellis aequali portione, eodem
modo. Aut fel tauri, nitrū rubrum, netopum, cyclaminū, pa-
ribus portionibus, eodē modo cū melle in glandē efformato.

Aut fel tauri oleo Aegyptio tinctum apponat. Et eo amoto E
rosaceum illinat. Aut cucumeris syluestris longi internā par-
tem, exēpto semine, cū lacte mulieris masculū alētis, & myr-
rhā purā, & modicum mel, & vnguentum Aegyptium, terito
& apponito. Aut cucumeris syluestris partē internā siccato, &
siue semine tundito, & adiecto melle feruefacito, & glādem
oblongā efformato, atq; oleo albo tinctum subdito. Aut syl-
uestrē cucurbitā eodē modo. Aut elaterij portiones tres cum
farinæ massa terito, & glādē formato. Aliud similiter faciēs.

Purgatio-
nes diuer-
se.

Grana cnidia decorticata triū potionū mēsurā coquito, &
melle affuso apponito. Deinde rosaceum illinito. Quacūq;
verò glandē subdunt, eas prius lanā in glandē infigere dein-
de linteum tenue circumdare oportet, atq; sic oleo Aegyptio
tinctam apponere. Ducunt autem hęc maximē, & pelliculas F
auferunt, Subditiua purgatoria fortia, quæ aquā ducere pos-
sunt, & mucos, & pelliculas, magis quàm priora. Piperis gra-
na quatuor maxima, aut etiā parua, si opus fuerit, ad elaterij
portionē ammixta terito, & muliebri lacte instillato, cū mo-
dico melle subigito. Atq; hęc in lanā mollē circū pēnā obuol-
uito, & linteo circumdato apponito, vbi prius in oleū Aegy-
ptium tinxeris. Maneāt autē subdita per diē, & vbi amouerit,
adipē cerui apponat. Portiones, similiter purgatoriæ, quæ se-
cundas eiicere possunt, & mēses detrahē, & fœtum enectū
educere. Cantharides quinq; alis & cruribus ac capite auul-
sis: & tribulū ad mare natū cum radicibus ac foliis tritū con-
chæ mēsurā: & euanthemi viridē siue luteā internā partem,
& seminis appij tātundē, & sepię oua quindecim, in vino dul-
ci temp

- A** ci tēperato bibenda dato. Et vbi dolor habuerit, in aqua calida desideat, & aquā mulsam aquosam bibat, & vinū dulce. Alia. Ranunculi foliorum ac floris triti, egrinei stateris pondus in vino dulci bibat. Cū autē dolor habuerit, cicer albū & vuas passas in aqua coquito, & perfrigeratam bibendam dato. Et vbi vrinæ stillicidiū vexarit, in aqua tepida desideat & vinum dulce bibat. Subdititia purgatoria si potiones non purgarint. Mercurialē tritam, ac myrrhā apponito. Aliud ad omnem morbum, & aperire, & purgare potens. Myrrham modicā & saluiam, & anisum terito ac vtitor. Purgatorium quod sterilem purgare potest. Si os vteri non rectē habuerit, stercus bubulū siccū tusum ac cribratū quatuor chœnicum **B** mēsurā, & aceti heminas decē, & vrinæ bubulæ tantundē, & falsuginis marinæ heminas viginti, pro fomēto adhibeto, & ad multum tēpus hoc leniter facito. Deinde lota vbi lēticulę decoctum, & mel ac acetum mixta bibit, vomat. Et farinam sorbendā dato: & vinum odoratū vetus sub dio per noctē expositum, insuper bibendū. Cibum autē ea die ne gustet. Sequenti verò granum cnidium deuorādum dato. Tertia verò pharmacū vrinā ciens exhibeto, ita vt vuas passas & cicer album, duarum chœnicum mēsurā sumas, & aque semicōgios tres affundas. Deinde factā coctura excoles, & sub dio per noctem exponas, & postera die bibēdum prębeas: & subdititiis pharmacis vtatur. Aliud purgatorium mensium. Stercus bubulum velut cōchæ testā efformato, & cupressi ramenta amisceto ac subigito, & in sole siccato: & in hoc suffimēta iniicito, ac suffito. Aliud quod infunditur ad similem affectionem, si mēses non prodeant. Spinæ albæ folia trita, & excolata ac tepefacta infundito. Illitio purgatoria, quæ vteros purgat. Porri & nasturtij semen tritum, & vino ac lacte cocto dilutum, imo ventri illinito. Illitio mollitoria. Ducit aquā, & mucos, & pelliculas. Et puerperij purgamēta detrahit, & nō exulcerat. Myrrhæ optimæ dimidiā partē, & salis granum, & picem aromatibus conditā, cōtundito ac trita misceto. Sit autē myrrhæ dimidia pars, ad salē ac picē cōtusam. Hæc in linteum ad gallæ magnæ magnitudinem efformata immit-tito. Sint autem duo linteā, vt alterum in die, alterum nocte habeat, donec colliquescāt. Lauetur autem calida. Et deinde **Vt cōcipiat** vbi amouit, aqua odorata perluatur. Si voles mulierem con- **mulier.**
cipere

cipere, ipsam & vteros purgato. Deinde ieiuna farinā edenda dato, & vinum meracū insuper bibendum, & nitrū rubrū aut cuminū, & resinā, melle subigito, & in linteo subdito: & vbi aqua defluerit, nigros subditios talos ad emolliendum apponito, & cum viro concumbat. Si verò os cōclusum fuerit, etiā fici succum apponat, donec fuerit apertum, & statim aqua eluat. Cæterum accipitris stercus in vino dulci terat, & ieiuna bibat, & tunc viro condormiat. Aut vbi menses defierint, anseris aut vulpis stercus, in rosaceo vnguento terat, & pudendum illinat, ac condormiat. Si vlcera fuerint acria & inflāmata, hac collutione vtere. Adipē anseris & resinam misce, & aqua tepida diluta infunde. Aut butyrū melle ammixtum liquefacito ac infunde. Aut bryoniæ albæ conchæ testā E parua deradito, & myrrhā ac mel similiter. Hæc in vino nigro odorato diluito, ac tepidum infundito. Si ulcerata aut pustulis plena fuerint summa labra, carnē bubulā sumito, & butyrum siue adipē anserinum, & anisum aut crocū, aut spodium cyprium. Hæc omnia terito, & carni oblita apponito.

Si vlcera fiant ac mordeant, Bubulā carnē adipe illinito, & carnē subdito. Et si sordida fuerint, eluito, & fomētum ex fici radice adhibeto. Et postea etiā de pinguedine in vino dulci bibat. Si in pudendis fiant vlcera, bubulum adipem illinito. Et myrtum in vino coquito, & cum vino perluat. Aut oleæ folia, & rubi, & mali punice, eodē modo. Sit autē vinū pramnium. Atq; hæc quidē sic facienda sunt. Et perseæ arboris videlicet folia terito, & ad pudenda apponito. Aut Anethi & F appij semen tritum illinito. Si feruido ac superficiario vlcere pudenda laborēt, sic curare oportet. Carnē bubulā longitudine duorum palmorum paruorū, crassitudine verò ligni quod in foramen bipennis immittitur, pudendi videlicet virilis forma, vsq; ad vesperam apponat. Noctu verò auferat. Postera die autem rursus apponat vsque ad meridiem, & bibat vinum dulce, melle ad vinum ammixto. Collutio si ulcerati fuerint vteri, & si vrinæ stillicidium vexarit. Porrum, sambuci fructum, seseli, anisum, thus, myrrhā, & vinum æquali mensura ad horum succum. Hæc mixta & feruefacta frige facito, & moderatè colluito. Aut mel, butyrum, medullam, & ceram immittito, ac illinito. Ad vlcera quæ in pudendo sunt ac nascuntur. Folia oleæ, & rubi, & hederæ, & mali punice dulcis

Medela omniū quæ in pudendis nascuntur.

A dulcis terito, & vino veteri diluta, noctu in lana pudendis ap-
ponito, & pro cataplasmate adhibeto. Quū autē dies venerit,
detrahito. & myrti baccas in vino coquito, ac colluito. Aut
anseris adipē, & resinā liquefacito ac infundito. Aut butyrū
& oleū cedrinū, modico melle ammixto infundito, Ad vlcera
in vtero resiccanda. Argenti florem in vino terito ac infundi-
to, Aut butyrū cum melle infundito. Aut bryoniā albam, &
myrrhā, & mel, vino diluta infundito. Postridie verò vino ni-
gro tepido eluito. Aut lentisci folia in aqua coquito, & cum
hac postea colluito. Si vlceratū fuerit os vterorū, Butyrum,
thus, myrrhā resinā, medullā ceruinā infundito. Aut lenticu-
lā in aqua coquito, & cū excolata aqua colluito. Quum verò
B aqua ex vteris fluxerit, & vlcera fuerint, & lancinarint, anse-
ris adipem & ouum illinito. Aut ouillū aut suillū adipē: & lē-
tem in vino coquito & hoc pari aqua tēperatum infundito.
Quæ verò in pudēdo sunt vlcera, cū hoc perfundito, & man- Fœtus im-
nam thuris, rubum, pini corticem inspergito. & cum aqua mortui in-
horū lauentur. Expulsiuū si mortuus fuerit fœtus. Galbanū iectio.
oliæ magnitudine linteo inuolutū, ac oleo cedrino tinctū,
ad os vteri apponat. Aliud. Calamū odoratū, & cucumeris
sylvestris medullā, cum adipe anserino terito. Deliget autē
vmbilicum & pectinem, & de hoc modicū lanæ instillatum
ad os vteri apponat. Et ab hoc paulatim extrahitur. Aliud.
Rubiā & cedri ramēta cōtundito, & aqua affusa sub dio per
noctem exponito, Deinde mane ad dolores partus exhibeto.
Aliud. Silphij drach. j. & porri succi acetabulū, cedrini olei
C dimidio cyatho paruo ammixto, bibēda dato. Aliud. Tauri
fel oboli vnus aut semioboli pōdere, in vino terito ac exhi-
beto. Aut fermento oblitū, torrefactum deuorandum dato.
Aliud. Cancros fluuiatiles quinq; & rumicis ac rutæ radicē,
& fuliginē de furno, omnia simul trita, & cū aqua mulsā vni-
ta, sub dio per noctē exponat, & ieiunia ter bibat. Aliud. Cu-
cumeris sylvestris medullā tritā, in cedrina pice lanæ inuol-
uito, & cum filo ad pennam deligato, apponat autē intro, ita
vt penne dura pars paululum foras promineat ex lana Quū
autem sanguis apparuerit, amoueatur. Aliud. Veratri nigri
virgulā lōgitudine sex digitorū lana obuoluito, extremā ve-
rò ipsius partē nudā finito. Deinde quā maximè intrò ap-
ponat, & vbi extrema pars cruētata fuerit, amoueat. Aliud.

M Vera

Veratrum nigrum, & cantharidas, & conyzam in aqua teri-
to, & glandulam mollem sex digitorum lōgitudine efforma-
to, siccato, & vbi dura facta fuerit, lana inuolutā apponat. Sū-
mam autē partē cedria illinat, sitq; ipsa nuda. Cūm verò san-
guis apparuerit, amoueatur. Aliud expulforiū. Si fœtus mor-
tuus aut syderatus intus fuerit, ranunculū & elaterij parum
in aceto meraco misceto ac bibendum dato. Aut brassicæ te-
ner coliculus. in summa parte netopo illinitus immittatur.

H I P P O C R A T I S
C O I D E M O R B I S M V- E
L I E B R I B V S L I B E R S E-
C V N D V S, I A N O C O R N A-
R I O M E D I C O P H Y-
S I C O I N T E R-
P R E T E.

Diuersiflu-
xus.



L V X V S albus in senioribus mulieribus ma-
gis fit quā in iuniorib. Fluxus fuluus in v-
trisque. Fluxus ruber ex iunioribus. Et ruber
quidē fluxus fit in febre. Magis autem ex
abortu. fit & ex mensū interceptione, quū F
cōclusi derepentē eruperint. Fit etiā ex par-
tu & febribus, & sanguis profuit valde multus, & grumi ex-
cidunt. Et dolor fit clauicularū ac tēdinū, & corporis torpor,
& crurū perfrigeratio. Aliquando verò etiam nasus effundit
ad dētes, si amplior sanguis discesserit. & sudor multus dif-
funditur. Ad hęc & stomachi morsus fiunt, & perfrigeratio-
nes, & febris bilis meracæ ac pruriginosæ: & eadem die saepe
rigent, & rursus sudant. & aliquando à supernis locis conuul-
siones ipsi fiunt, aliquādo ab infernis. & ad inguina dolores
acuti ac fortes irruūt, procedētes velut dolores partus. Quan-
doq; etiā vrinx stillicidiū adest, & os siccū est, & sitis premit:
& lingua aspera est: & digiti pedum magni cōtrahuntur, &
ad suras semper cū femore distenduntur. Et lūbi dolores ve-
xantur

Axantur: & manus impotentes fiūt. Quum autem huiusmodi fiunt, tunc etiā neruorū antrorsum ac retrorsum distētionēs fieri solent, à clauiculis iuxta iugulū, ad maxillas & linguā. A talibus verò paulo post retrorsum, à tēdinibus iuxta spinā ad lūbos, atq; sic per violentiā pereunt, prēdicere igitur oportet fluxibus inchoatibus, & diartā cōstituere hoc modo. Mane quidem dandū est pharmacū ad fluxiones, ex his quæ ego describā. quocūq; maximè opus habere visæ fuerint. Dandū autē & ter & quater, si multus sanguis discesserit. Diarta igitur cōstituatur, si quidē sine febre fuerint, ex cibis. Si verò febricitarint ex sorbitionibus. Sunt autē ex sorbitionibus hæc cōmodissime panicū, lenticula, farina horni ac recētis tritici cocta, alica cocta sorbilis, zea cocta. Ex potionibus verò polentæ pollen in aqua, & ramenta à panibus derafa cōtusa. Et polentæ recentes tenues in aqua madefactæ, quas etiā insulas delingere prodest. Ex cibis verò panis exallatus in cinere. Obsoniū autē sit leporis caro, & colūbæ, ac palumbis, & cocta, & allata. Et hœdi caro allata, nullo ascititio cōdimēto addito, sed vt in acetū salem intingant. Hepar item capræ aut bouis in cinere allatum. Oui tenue, aut ipsum luteū. Caseus insulsus. Ex oleribus autē nullū gustent, neq; coctū, neq; crudū. Et à balneis abstineāt. Et manus ipsis deligato, ita vt lana sordida ipsas circundes, & laqueū immittas supra cubitos, & ad poplites, supra genua. Et cum cucurbitis sub māmas affixis, ipsas eleuato, modo ad dextrā, modo ad sinistram partē trāslatis. Si verò spirandi difficultas oriatur ad cucurbitæ admotionē, cucurbitā amoueto, sanguinē autem ne detrahitō. Verūm subdititiis vtēre, quæ ego describā, & ad sistendum sanguinem in talibus sunt apta. Et si quidem ex fluxionibus mulier euaserit, vbi multus sanguis discessit: & color est exalbidus, & facies eleuata, & sub oculis tumores laxi, & crura turgida, & vterus humidus, ac semper præter rationē hians. Et quæ discedunt aquosa sunt, velut à crudis carnibus succus. Talibus si robustæ fuerint, vomitus ciere oportet ieiunis, & post vomitus prandium exhibere. Hīs cōducit modicus cibus. Vinum nigrum meracius. Illuies, aut frigidæ lotio. Deambulationes. Semel in die cibū capere, omnis resiccatio. Si verò ad hæc non sedentur, neque confidant vtēri, neque à fluxionibus liberentur, respectu virium corporis

Medela.

Sorbitio-
nes.

Potiones.

Cibus.

habito, si quidē robusta fuerit, veratrū dare oportet. Si verò **D**
 non obediat, caput purgare, facta autē purgatione, per diatā
Quæ in his reliqua curare eodem modo velut circa steriles. Cōsiderare
consideren porrò oportet etiam naturas mulierū, & colores, & etates, &
tur. tempora, & locos, & ventos. Aliæ enim frigida, aliæ humida
 ac fluida, aliæ calida quidem, sicciore autē & stabiles sunt.
 Nam quæ superalbida sunt, humidiores sunt ac fluidiores.
 Nigra verò, sicciore & acerbiores ac adstrictiores. Quæ ve-
 rò vini colorē referunt, medium quiddā inter vtrasq; habēt,
 Sic autē & in ætatibus cōtingit. Iuenculæ enim humidiores
 sunt, & multo sanguine plerunq; refertæ. Aniculæ verò sic-
 ciores, & modicum sanguinē habentes. Mediæ verò medium
 quiddam inter vtrasque habēt, vt quæ nunc æquales existūt. **E**
 Oportet autē eum qui rectē hæc tractare volet, semper mu-
 lierum naturas discernere, & temporū occasiones, & atates,
 & tēpora, & locos, & ventos. Si fluxus in vteris obortus fue-
 rit, sanguis multus fluit, & grumi cōpacti excidunt, & dolor
 occupat lumbos, & laterū mollitudinem, ac inum ventrē, &
 durus est venter, & ad cōtactum dolet, & rigor ac febris acu-
 ta corripit, & debilitas oboritur, & omnia præter humeros
 ac scapulas dolet, & calor inuadit, & rube scit, & venæ duræ
 fiunt ac renitentes. Morbus hic maximē fit ex abortu. Fit &
 quū menses multo tēpore retenti derepente eruperint. Huic
Morbi vbi sic habuerit, grossum siccum cōtulum ac cribratū in lin-
caussa. teū alligato, ac apponito, & imo vētri perfrigerātia imponi-
Medela. to, cauēs ne horreat. Postquā autē fluxus steterit, oleæ sylue-
 stris folia in acerrimo aceto coquat, eoque pudenda perluat. **F**
 Bibat autē vinacea, & rhoē rubrū in aceti acerrimi hemina
 dimidia coquat, & eo pudenda perluat. Aut mora rubi rubra
 siccata ac trita, cum farina recenti, pari portione mixta, ieiunæ
 bibenda dato, Si verò fortius facere voles, duabus farinæ
Qualis partibus ammixtis, bibendum dato. Et ne lauetur. Cibis au-
fluor. tem vtatur siccis, & vino nigro vinoso. Si verò intumuerit,
 fluxu iam sedato, pharmacū deorsum purgans bibendū da-
 to, post pharmacū autē vteros grossorū decocto colluito, &
 postea acerbā infundito. Si verò his factis, humecta fuerit,
 suffitum faciat donec resiccet. Ruber fluxus fluit talis, qua-
 lis sanguis victimæ recens mactatæ, & grumi pellucetes.
 Aliquando verò etiā fluxum rubrum emittit, & venter imus
 attollitur

A attollitur, & attenuatur, & impotēs fit, & indurefcit, & ad cō
 tactum dolet, velut vlcere prefente. & febris habet: & dentiū
 fremitus. & dolor ad ipfa pudenda, & pubem, & lateris mol-
 litudinē, & lumbos, & tēdinem, & ventrem, & pectus, & sca-
 pulas irruit. Et alias omnes partes dolet, & impotentia ac pu-
 fillanimitas occupat. & color mutatur. In principio quidem
 morbi hac corripunt. Si verò hac omnia morā trahant, ad-
 huc magis debilitatur. & manifestus est morbus. & cauae par-
 tes attolluntur, & pedes intumescunt. Morbus hic ex partu ma-
 ximē corripit, si quid in ipfa dilaniatum nō prodierit, sed in-
 tus cōputruerit, & fœtus exasperatus fuerit. Hanc si in princi *Medela.*
 pio cōtigeris, spōgiā humectā ipsi adhibeto, quum fuerit do-
 lor. Aut linteū tenue molle rasum, aqua frigida madefactū
 B ventri imposito, & aqua perfundito. & lectum à pedibus al-
 tiorem facito, atq; sic insternito. & ad mēses ciendos medi-
 camentum quodcunq; magis admiserit, bibendum prebeto.
 Apij semen torreto, tundito, ac cribrato, & erysimum simili-
 ter, & peplij semen cum polēta cribratum, & vr ticæ semē si-
 militer, & scabiem oleæ syluestris, & gallā, & rutā, & origa-
 num, & pulegium cum polenta cribrato ac misceto: polentā
 verò crassā torreto, & triticeam polentam cōmolito, & ca-
 seum caprinum sordibus derasis, & de alliis quidem singulo-
 rum æquales portiones misceto. Origani verò & rutæ, & sca-
 bie, & gallæ dimidium. Hac ieiunā ante motū bibenda da-
 to. Miscere verò etiā oportet ad vsum, si acriora prodierint,
 C & cyceonem exhibere. Et de pharmaco quidem pars vna sit,
 & casei vna, & vna polēta. Ad vesperā autem melle ammix-
 to bibenda dato. & donec quidem principium morbi fuerit,
 & sanguis multus prodierit, & modico tempore intermise-
 rit, & dolores acuti tenuerint, hac facere oportet. Si verò san-
 guis paucior fluxerit, & per breuius tēpus, ea quæ deorsum
 aut sursum ducunt bibenda dato. & pudenda lenibus fomen-
 tis foueto, prout semper oportunum visum fuerit, & zeam
 vnā cum cortice fractam, & grossos siccatos, tusos ac cribra-
 tos, & oleæ folia similiter, singulorum pares portiones in ca-
 taplasmate adhibeto. & lac bubulum coctum, aut crudū bi-
 bendum dato, respectu ad id quod rectē habet factu, & pro-
 ut opportunum esse visum fuerit. & videtur morbus hic de- *profluuiū*
 bilis ac lethalis esse, & pauca ex ipso effugiunt. Quum mu- *ex abortu*
lieri

Hippocratis Liber I I.

Medela.

lieri sanguis ab articulis fluxerit, à partu aut à labore corru D
ptæ, quidam putant ex medicis hoc fluxum esse. Est autem
aliud. Nam hoc quod ex articulis, & ex lumbis, ac coxendice
aliud est, glutinosum est simul cū sanguine. Illud verò quod
ab uteris & cauis venis fuit, sanguis purus est. Hāc suffire o-
portet hoc modo, Zeæ fractæ semodium aceto modico subi-
gito, ut ne per totum uteros humectes : & sulphuris viui se-
miobolū ad zeas tritas ammisceto, & aceto subacta per no-
ctem finito. Mane verò multo igne accenso, obturamenta de
doliis oleariis imposito, & sordes officinæ fullonum, & ser-
pentis semē ammisceto. Mox autem multum ignem tollito,
& non vrito, sed maximè suffumigare facito. Oportet autem
sellam perforatam adesse, & mulierem vestibis contactam E
insidere, ut ne quid præterspiret. In ignem verò medicamen-
tum cum aceto præparatum inspergito, itēque de semine
serpentis. Sed & myrrha ammixta efficax est, ut suffita, pude-
dorum cruentationem sedet. Si verò satis habuerit, erysimi
semen torrefactū terito, & in vino exhibeto. Fluxus fulvus
fuit velut ex quo vitioso multus & graueolens. & uteri in-
flammanur. & dolor ex lumbis & inguinibus emergit. &
prodeuntia multa sunt, & si non liberetur, celeriter fluentia.
At etiam si tempus accedat, quæ restāt putrefacit, quā ma-
ximè id fieri potest. Riget enim, & velut à carnis assatis
humor defluit. & cum his simul febres fortes ac rigores
sunt. Ex huiusmodi verò fluxibus multæ pereunt, paucae ef-
fugiant, & si quidem in principio accesseris, sic curare opor- F
tet. Si sine febre fuerint ac robustæ, veratrum ipsis dato. &
intermissis tribus aut quatuor diebus, pharmacum deor-
sum purgans exhibeto. Post purgationem verò sic diatam
constituere debes, quo fluxiones aquosæ sint ac tenues. Ma-
ne quidem ieiunæ pharmacum aliquod ex his quæ ego de-
scribam ad fluxum, ebibendum dato in vinum inspersum.
Post pharmacum autem, alia diata curato. Uteros verò
sic curato. Si quidem inflammati fuerint ac conclusi, fo-
menta adhibere oportet mollia, donec os uterorum molle
fiat. Post fomenta, infusis qualibus opus habere visæ fuerint
colluito, siue magis purgantibus, siue mollioribus. Post col-
lutiones, mollitoria apponito. Si verò non facile solubile sit
osculum, foueto & subdititiis mollito, quæ ego describam,
donec

Curatio.

A donec apertū fuerit. Quod si ad hæc fluxiones non sedentur, caput purgato, & sic victus rationē constituito. Si quidē sine febre fuerit, alinum lac bibat. & oleribus coctis hortēlibus **Cibaria.** ac syluestribus vtatur, excepto allio, porro, brassica & rapha no longo. Ex marinis autē, raia leui, scorpio, cōgro, torpedi- ne, anguilla, passere, gobio: coquere verò oportet cū cepis & coriandro, in muria dulci ac pingui, ita vt probe percoquan- tur. Ex carnibus autē, maximē suilla, deinde agnina, aut ouil la, coctis potius quā aſſatis, & ipsarum iusculis. Vino verò albo mellei coloris, aut aquoso. Balneis autem nō valde cali- dis, neq; multis, excepto capite. Si verò ex hac diætā, ab vlce- **Nutricatus** ratione & inflammatione liberētur, humidi verò sint vteri, **mutatio.**

B pro balneis quidē, illuue. pro fuluis autē vinis nigris. & pro aquosioribus meracioribus. & pro polēta panibus, & pro pis- cibus carnibus aſſatis, & omnibus cibis siccātibus, quibus sa- nē in alui profluuiis vtimur. a collutionibus autē omnibus abstineat, excepto vino & aqua. Suffitūs autē fiat per adstrin- gentia. Optimū autē esset si cōciperet. Si verò iuencula fue- rit, frequēter ieiuna vomat, & postea parum prandeat. Atq; hæc harū fluxionum diætā est. Fluxus albus fuit velut alba **Profluuiū** alini vrina, & in facie sunt tumores albi, & partes ambæ sub **albū qua-** oculis tument. & hydropiformes ac non valde bona specie **le.** præditi sunt oculi, & splendor abest. & lacrymosi sunt oculi ac hebetes. & color corporis exalbidus ac pustulosus. & vter imus tumidus. & in maxillis pustulæ paulatim rubētes, par- uæ, aquosæ ac malignæ. & in ciuribus tumores laxi, & si pres- seris digito, notæ imprimuntur velut in fermēto, & os saliuā impletur. & stomachi morſus percipiunt quū ieiune fuerint, aut etiā vomuerint velut acidā aquam, & si ad accliuē locū procedūt, anhelatio citius corripit, & strāgulatio, & crurum perfrigeratio. & genuum impotētia & in ore vlcera feruida ac superficiaria. & vterus præter rationē aperitur, & ad oscu- lum procidit grauis, veluti plumbū. Et dolores per femora tendunt. & omnia inferna perfrigerantur, ab imo ventre in- choantia vsque ad pedes. & plātæ torpent, ac ingredi nō pos- sunt. Tales difficile est à morbis liberare. Nā & ætate proue- cta sunt, & afflictiones cōsenescunt. Nisi catus aliquis sponta- neus forte fortuna allapsus ipsas soluat. Has exhaurire oportet **Curatio.** quum redundarint, per pharmaca quæ bilē flauā nō pur- **gant.**

Hippocratis Liber I I.

Profluuiū
aliud albū.

Curatio.

Profluuiū
aliud.

Medela.

gant. Sed vrinā ciente his pota cōferunt, & capitis purgatio-
nes, & illuies. & epithymi albi potus, & deambulationes. &
omnis resiccatio in victu, Hæc vbi fecerint, sanæ quidē peni-
tus nō fiunt, facilius autē degunt. Fluxus albi alterius cura-
tio. Purgatur album subluteū, & quū mingit, morsum perci-
pit, & lancinatur, & vterus vlceratur. & febris corripit acu-
ta, & calor multus, sitis, vigiliæ, & mente mouetur. Et quum
aliquid festinanter egerit, anhelatio ipsam inuadit, & mēbra
exoluuntur. Hæc mecona, hoc est peplum albū bibere oportet,
& vrticæ semē, & quod præstat, mali punicæ dulcis radi-
cem, & rhoem, ac gallā. Hæc in vino acerbo bibenda dato, &
mali punici succum, aut caseum caprinū ammisceto. Subter
autē suffito zeam, & grossos hybernos, & oleæ folia, & scabiē
eiusdem, & cucumeris syluestris cortices ex tertia parte, reli-
qua paribus portionibus. Sorbeat etiā olera cocta, & sorbi-
tiones ex amygdalis & sesamo. & gestetur ac curru vehatur,
& nō quiescat. Alius fluxus. Defluit multū velut vrina ouil-
la. color est albus, & tota intumescit, & in tibiis eminētiæ la-
xæ & rubicundæ emergunt. & si digito attingas, notæ foueas
præ se ferētes tibiis ac pedibus imprimuntur. & si quid edat,
impletur ac inflammatur. & vbi iter fecerit, & opus aliquod
obierit, anhelatio & dolor ipsam corripit, & color albus, quā-
doq; subluteus. huic si robusta & iuuecula fuerit, & alia appa-
ruerint, ab initio pharmacū sursum ac deorsum purgans bi-
bendū dato. & caput purgato, si pituitosa est per ea quæ pitui-
tam purgāt. Si verò biliosa, per ea quæ bilē. & si tempus anni
fuerit, & à natura nō est lienosa, & si quid ex relatis fuerit, se-
rū dato. Decoquat autē hoc & bibat quàm plurimo tēpore.
& ad vespērā vinū dulce aquosum, si opus habuerit. Cibū ve-
rò ne cōtingat. Si verò debilis fuerit, sorbitione modica uta-
tur. & nō lauet. Postquā autē tēpestiuum esse tibi videbitur,
à potu cesset. & post purgationē cibis vtatur, ita vt abstineat
à pinguibus & acribus, & dulcibus ac salis. & ab olerib. acri-
bus. Vtatur autē piscibus petrosi, & carnibus ouillis, aut vo-
lucriū, aut leporinis, pane frumentaceo, aut ex ordeo freso. &
oleribus coctis vtatur, & syluestribus quæ cruda eduntur, itē
hortensibus acribus exceptis. & deambulet mane & à cibo.
Vbi verò his factis sicior esse visa fuerit, vteros facce vini col-
luito. & tribus aut quatuor diebus interpositis, postea acerba
infundito.

- A** infundito. & intermissione facta, si quidē sicca fuerit, quiesci-
ro. Et si à natura fuerit biliosa aut pituitosa, à victu verò &
pharmacorum potione attenuata, & se recolligere nō pote-
rit, lac bubulū bibat per xl. dies, calidū de vacca. Præstat ta-
men pituitosam cibis quàm paucissimis vti, quādiu lac bibe-
rit. Sit autē mēsurā sex heminarū Atticarū. Incipiātq; à dua-
bus, & singulis diebus vnam apponat, donec sex fiant. & inde
paulatim ad duas rursus descendat. & post lactis potū, cibis
reficito & per victus rationē & post lactis potum, mane ieiun-
na adiantū bibat, hoc siccātū, tūsum, & exacte cribratum, in
vino nigro odorato diluto exhibeto. Si verò reuertatur mor-
bus, totā ipsam foueto, & rursus pharmacis infra purgato, &
B postea vteros colluito, si quidem natura fuerit pituitosa, per
cnidium granū, aut thapliæ radicē. Si verò biliosa, scammo-
niæ succo, aut colocynthide sylvestri. hāc enim coniectā, dua-
bus aquæ heminis affusis, coquere ad dimidias oportet, &
huic mel, & oleum narcissinum aut anthinū ammiscere. Sit
autē mellis quadrās heminae. olei verò hemioliū mellis, hoc
est mensura ipsius tota, insupérque dimidia. Postea verò col-
luendū est melle, & vino, & oleo solo. & suffitus adhibendi. &
tribus aut quatuor diebus quiescendū. Bibat autē adiantū. &
si in ventre nō cōceperit, morbus reuertitur. & si morbus re-
uertitur, perit. Quum verò seniores morbus hic corripuerit,
etiā vteri cōputrescunt. Valde verò pauca euadūt. Alius fu-
xus. Purgatur velut ex ovo crudo luteum subalbidū, & vlce-
C rat pudendū. & tument pedes ac tibiæ. & cauæ oculorū par-
tes intumescunt. & oculi humidi ac lachrymosi sunt. & si
iter faciat, anhelatio ipsam corripit & debilitas oboritur. Si
verò euaserit, morbus pituitosus fuerit, & si nō purgata fue-
rit, febricitat, bile vehementer cōmota. Seniores autem hic
morbus magis inuadit quàm iuniores. Quū sic habuerit, si
quidem vehemēter intumuerit, pharmacū deorsum purgās
bibendū dato, quod pituitā & bilē purgat. Si verò nō fortiter
rumuerit, & pituitā ipsam presserit, pharmacū sursum pur-
gans dato. & si quidē potēs fuerit, veratro purgetur. Sin mi-
nus, pharmaco quod bilē & pituitā ducit. Post pharmaca ve-
rò serum coctū bibendū dato, per plurimos dies, cū modico
sale. Edat autē insuper mentā. Ad vespērā cibū ne attingat,
sed modicum sorbeat, & vinū dulce insuper bibat, si opus ha-
buerit.

Profluuiū
aliud.

Medela.

Lac asini-
num pro
sero.

buerit. Si verò nō affuerit serum, lac asininū coquito, & exhibeto per quatuor dies. Ad vespērā verò eadē faciat, nisi febris noctu corripiat. Si verò natura fuerit lienosa, aut flatuosa, & exanguis, neq; serum neq; lac bibat. Sed purgātibus internē purgato. & vbi tibi tempestiuū visum fuerit, vteros colluito, primum quidem medicamēto ex vini facce, bis aut ter. Post hoc scammoniz succo. Affundito autē ad hūc, vinū dulce, heminae Atticae mensura, & olei narcissini maximē, quartā heminae partē. Postridie verò cū vini hemina colluito, & mellis quarta heminae parte, & resinae tertia mellis parte. Oleum autē sit melli æquale. Si verò ea quæ ab infusa collutione succedunt prodierint pituitosa, etiā rursus colluito, interpositis iij. aut iiij. diebus. postea grani cnidij duas portiones decortico, & ipsas infundito. Si verò nō affuerit cnidiū granū, radicis thapsia potione vnā infundito. & postea iisdē colluito. postquam autē purgata fuerint ea quæ scedūt ad has collutiones, & si prodierit aliquid cruentum, velut ab vlcere, per acerba postea colluito. & si post hæc ipsa interrogata, dixerit os vterorū durum esse, & dolorē habere, eodē modo eo quod paratur cum butyro colluito donec vteri fuerint resiccati, & sana esse videbitur. diebus verò inter collutiones intermediis, sambuci fructū bibat, & leporis coagulū, & pepli corticem, & vrticæ semē, & mali puici dulcis corticem, ita vt de singulis pares portiones terat, & polentā ac adiantū ammisceat, & in vino nigro odorato ieiuna bibat. cibus autē vtatur

Caro quæ his danda. mollibus nō salis, neq; acribus. Carnes autem præstatiores sunt pisciū, aut volucriū, aut leporinæ. & lauetur calida non multa. Si verò nō quiescat fluxus, sed relinquatur, & vteri humescāt, medicamentū ex malicorio suffito. & postea virū accedat. & si in ventre cōceperit, sana euadit. At seniores à morbo leuari non possunt, sed pereunt præ debilitate. Fluxus aliud.

Profluuiū aliud. Fluit subluteum velut ex ovo, & viscosum, & venter imus intumescit, ac durus fit. & si cōtingas dolet, & dentibus stridet, & febris occupat. & dolor ad pubem, & ad pudēda, & ad imū ventrē, & ad lūbos irruit. & animi deliquiū. & anxio- tates, & perfrigerationes, & sudor multus, & pulsus ad manū accelerātes, debiles, deficientes. & statim pereunt. Si verò iuxta perites manserit, & color ipsū mutatur, & fit velut fauus aut cera. & si corpus digito prematur, mollescit, & notæ velut in massa

ment. d.
in fac.

A massa farinæ subacta fermēto imprimuntur: & pedes intumescunt ac crura. Hic autē morbus fit maximē, si in ipsis aliquid dilaniatū fuerit, aut intus cōputruerit in partu. Seniores autē magis afficiūtur. & huiusmodi morbus nō est valde **Profluuiū aliud.** leuis. Alius fluxus. Purgatur velut à carnibus assatis, humor, & pudendū exulceratur, & ad quācūq; aliā corporis partē destillarit. Et rigor, & febris acuta: dēsa, magna, & simul horror corripit. Dolores autē quales in omnibus fluxibus. Hac tota intumescit, & infra vmbilicum & cruribus. & color fit morbi arcuati. Talis autē fluxus ex hoc fit. Postquam sanguis exhaustus, subbiliosus factus fuerit, & non fuerit purgatus. Quū sic habuerit, pharmacū bibere oportet, Si quidē fortis **Curatio.** fuerit, ex veratro. Si verò debilis, radicē & elateriū. & posteriore tēpore lac caprinum. Aut pharmacū deorsum purgans dato, quod bilē & pituitā ducit. Vteros autē medicamēto cū brasiæ decocto parato colluito. Bibat autē saluiā, hypericum, apij semē, singula in vino nigro austero. Ieiunæ autem hæc bibēda dato. Si verò vlceratū fuerit pudendū, postea butyro colluito. Deinde pharmacū bibendū dato. & vlcera butyro, resina, myrrha, flore argenti illinito. Perluantur autem myrti ac saluiæ ex aqua decocto tepido. Cibis vtatur neque falsis, neq; acribus. vt ne mordax vrina fiat. & à marinis prohibeatur, & carnibus bubulis, & ouillis ac porcinis. Aliis autem carnibus vtatur coctis. Edat etiā panē, & vinū vetus odoratum nigrū bibat. Si verò hæc fecerit, & sana nō fiat, totam **C**oueto, & postridie pharmacū sursum purgans dato. Deinde intermissione facta, rursus quod infra purget. & si quidē māserit fluxus post pharmaca, decoctū serum quotidie bibendū præbeto. Vesperī verò sorbitionibus, & vino dulci albo vtatur. Si verò nō affuerit serum, lac asininū cōtū per dies quatuor bibat. Ad vesperā autem iisdem vtatur. Postea per dies quadraginta lac bubulū calidū bibat. & per diē nihil edat. vt ita dicā. Optimum enim hoc est. Nā & purgetur & nutritur, & fluxus obtūditur ab huiusmodi lacte. Vesperī verò cōnet **Nutricus.** carnem volucris modicā assatā, & parēm modicū subcineritium. Bibatq; insuper vinū nigrū vetus vinosum quandiū lac biberit, si multa prodierint, & acrimonia vexat. & si his factis in vētre cōceperit, sana fit. Quęcūq; verò seniores sunt, in his morbus quādoq; reuertitur, & pereunt. Iuueculis autē

non

Hippocratis Liber I I.

non est lethalis. Diuturna porro est saniosi fluxus curatio, D
fuit autē talis suberuētus, velut à carnibus afflatis humor, &
mordet velut muria, & corrodit ac exulcerat pudenda, & vte-
rus exulcerat circūcirca, & fœmora, & aliæ partes, & vbi su-
per vestes distillarit, tinguntur & agrè elui possunt, & vter
attollitur ac durus fit, & ad cōtactum dolet, & calor corripit.
& dolor ad pudenda, & sedē, & imum ventrē, & laterū molli-
tudinem, & coxas, & lumbos irruit, & impotētia adest, & co-
lor mutat, velut morbi arcuati. Si verò tēpus & morbus pro-
ducatur, hæc omnia amplius corripunt, & caux partes attol-
luntur, & pedes tumēt, & crura à lumbis. At hic morbus cor-
ripit vbi quid de fœtu dilaniatū fuerit, aut in abortu, aut in
partu. Oportet autē fomenta adhibere, & suffire, & bibenda E:
præbere omnia ea quæ fluxū sistunt, & lac asininū & alia ex-
hibere, & vomere si opus fuerit. Si verò sine febre fuerit, &
debilis febris habuerit, siccum fomentū adhibere melius est.

**Causa hu-
ius morbi.
Medela.**

**Strangula-
tio varia.**

Quum ad caput conuersi fuerint vteri, & hac parte suffo-
catio desinit, caput grauat. Verū aliis alicubi aliās finis ha-
betur. Signū autem hoc est. Venas in naso, & partes sub ocu-
lis dolere dicūt, & sopor altior tenet, & spumat, vbi leuius ha-
buerit. Hæc multa calida lauare oportet. Si verò nō obediat,
frigida etiā circa caput, ita vt laurum & myrrhā in aqua co-
quas, sic frigefacias. Vnguēto autē rosaceo caput illinatur, &
odorata subter suffiātur, graucolētia verò sub nares, & bras-
sicam edat, & succum sorbeat. Si verò ad cor progressi vteri-
suffocent, & aēr impeditus violenter attrahatur, anxia est & F,
vomit, & quibsdā statim tractus deorsum cedit, & flatus exit.
& aliqua quidem vomit spumosa. alicui verò quies cōtingit.
Quibus autē non decedunt, his porri semen, & peplum, trita
& tribus aquæ cyathis diluta, bibenda dato. Auxiliatur &
aceti albi cyathus potatus. Aut iuniperi fructū & saluiā dato,
aceto aut vino ad has species ammixto. Oportet aut ipsam ca-
lesceri. Aut adipē sumere anserinū, & ceratum resinatū ac pi-
cem, & in ipso liquefacere, & subdititias glādulas efformare.
Quum autē ad præcordia allapsi strāgularint, vbi hic fuerit
affectionis soliditas, & vomitus feruid⁹ acris corripit, & mo-
dico tempore mitior fit, & dolor ad caput & ad collum pene
trans. Tepefactoria igitur apponito, si sursum strangularint.
Sub nares verò graucolentia suffito, sensim progrediēdo; Si
enim

- A** enim aceruatim vteri infra decedunt, turba oboritur: Odo-
rata verò infernè, & castoriū ac conyzā bibēda dato. Quum
verò deorsum tracti fuerint, abominanda subter suffito, sub
nares aut odorata. Si verò dolores q̄uerint, pharmacū deor-
sum purgās bibendū dato, & postea lac asininū aut serum bi-
bendum præbeto, si nō lienosa fuerit à natiuitate, aut exan-
guis, aut decolor, aut auriū sonitus habuerit, velut hæ quib⁹
propter cognationē morbi à iuuetute sunt familiares. At su-
pernū ventrem ne moueto, cæcutient enim, aut circa fauces
turbationes, & alia infestabūt. Verū ptisanā succū dato. Si
verò etiā valde facilis sit ad vomitū, vomat. Collutio autem
optima est ex narcisso. Subdititiū verò id quod ex canthari-
dibus præparatur. Quum vteri apud præcordia constiterint, **Cum vteri
superiora
petunt.**
suffocatur velut à veratio, & recta ceruice spirat, & stoma-
chus fortiter vellicatur. Quādā etiā vomunt quādoq; saliuā
acidā, & os aqua impletur, & crura perfrigerātur. Tales si nō
breui à præcordiis vteri discedant, loqui nō possunt, & par-
tes circa caput ac linguam torpor occupat. Proinde ad vt eros
quidē lanā quāmaximè fieri potest ad foramen apponito,
ita vt pennæ obuolutā, vngueto albo aut Aegyptio, aut Bac-
chario, aut amaracino tingas. In nares verò, de pharmaco ni-
gro ad caput præparato, specillo exceptum infarcias. Si verò
hoc nō fuerit, silphij succo nares illinas. Aut pennā aceto tin-
ginto, & immittito, narēsq; illinito. Aut sternutatoriū appo-
nito. Quū autē conclusum fuerit osculū & internus trames,
C castoriū in vino bibendū dato. Nares verò phocæ adipe illi-
nito. Lanā autem appolitā finito, donec cōlidant. Quum autē
quieuerint, auferre oportet. Si verò ea ablata rursus recursa
rint, lanā rursus eodē modo apponere. Sub nares verò cornu
capræ nigrū, aut ceruinū suffire, scalptū & in cinerem calidū
inspersum, quo maximè suffumigetur, & nidorē sursum per
nares quāmaximè potest trahat. Suffito etiā phocæ adipē,
prunis testæ impositis, ipsaq; obuelata, & capite imminēte,
quo odor maximè ingrediatur, ita vt de adipe instilles, &
ipsa odorē sursum trahat, os verò clausum habeat. Et si qdē
sursum allapsi fuerint vteri, hæc facere oportet. Si verò ad he-
par cōuersi fuerint vteri, mulier derepēte voce destituit, & **Cum vteri
iecur ve-
xant.**
dentes cōserti sunt, & color liuidus fit. Derepēte verò hæc pa-
tit̃ sana existēs. Cōtingit autem maximè virginib. antiquis,
& viduis

Medela.

Vterorum
inflamatio
diuersique
eorum affe-
ctus.

Medela.

Curatio.

& viduis que pepererūt aliquādo, & viduitatē agūt. Maximē D
verò cōtingit omnino nō ferentibus vterum, & sterilibus, ex
partu, Nō enim prodit puerperii purgamentū, & nō intume-
fcit vterus, neq; mollitur, neq; vomunt. Quū sic habuerit, tu
morē ab hepate cū manu infra leniter detrudito, & præcor-
dia cū fascia deligato, & os aperito. Vinū verò odoratissimū
dilutū infundito, quādo sanē etiā graueolētia ad nares adhi-
bere ac suffire cōuenit, ad vteros verò odorata & suffimenta,
& postquā sic curaueris, pharmacū deorsum purgās bibendū
dare oportet, si quidē biliosa fuerit, quod bilē purgat. Si ve-
rò pituitosa, quod pituitā. Et postea lac asininū coctū bibe-
dū præbeto, & vteros odoratis foueto, & medicamentū quod
cū buprestī præparatur apponito postridie verò netopū. In- E
terpositis autē duobus diebus rursus vteros odoratis colluito,
& postea intermisso die, aromatis suffito. Atq; hæc vidua fa-
ciat. Optimū autē in vētre habere. Virginē verò persuadeto
vt viro cohabitet. Ad nares autem nihil adhibeto, neq; medi-
camentū ieiuna bibat. Verū castoriū & conyzā in vino odo-
ratissimo bibat per dies viginti, & caput odorato aliquo ne
vngat, neq; aliquod odoratū olfaciat. Si verò vteri inflamma-
ti fuerint circa latus, si cōtigeris durum apparet, & quum ad
præcordia allapsi fuerint, strāgulant, & vomit pituitā acidā.
& dentes stupefcunt & vbi vomuerit, meliūs habere videtur,
Quum verò deorsum processerint, discedunt de ventre aliās
aliō. Maximē verò ad laterū mollitudinē quādoq; incidunt,
& ad velicā, & vrinæ stillicidiū corripit, & ad fedē, & cacare F
sibi videtur, & menses prius aut posterius solito fiunt, aut nō
statim huic apparēt. In hoc morbo si sursum strāgularint, te-
pefactoria apponito, & graueolētia ad nares suffito, ad vte-
ros autē odorata, & conyzā fœminā, & castoriū, in vino ieu-
na bibat. Postquā verò ad naturā suā cōsederint, placidē suf-
fito. Bibat autē vrinā cientia, Atq; hæc faciat quā diu dolo-
res tenuerint. Vbi verò quieuerint, totā foueto. Deinde phar-
macum deorsum purgās bibendū dato, si biliosa fuerit, quod
bilem purgat: si pituitosa, quod pituitā ducit, & lac asininum
bibendum dato, aut serum caprinū decoctum. Si verò lieno-
sa fuerit, lac ne bibat, neq; serum, & in purgationibus, cibis
vtatur mollibus, & per aluū secedentibus. pisces autē melio-
res sunt carnibus, & vteros foueto, ac subdititiis purgato,
ipsosque

A ipsosq; colluito, & vbi suffitū admittit, ad virum accedat. Solutio verò morbi cōtingit, vbi in vētre cōceperit. Si vteri ad latera allapsi fuerint, tussis obtinet, & dolor sub latus, & infidet vterus durus velut pila: & ad cōtactū dolet, velut ab ulcere, & cōtabescit, & videtur ipsū peripneumonia esse, & cōtrahitur, & gibbosa fit, & mēses nō apparent, Aliquibus autē quibus prius apparuerunt, etiam pereūt: & si tunc prodeant imbecilles sunt, & pauci, ac deteriores, & genitura nō fit hoc tēpore. Quum sic habuerit, pharmacū deorsum purgās bibē-
 dum dato, & multa calida lauato, & ex tepefactoriis quacū-
 que admiserit adhibeto, & à quibus sanguis purgatur ea ap-
 ponito. Et lini semen torreto, tundito, ac cribrato: & peplum
 albū & saluiā cū tenui polenta, & caseū caprinū muria dera-
 fa. Hæc misce, vt casei sint partes duæ, reliquorū vero, & po-
 lētæ nō falsæ pars vna, & ieiunæ in vino bibēda dato. Vespē-
 ri vero cyceonē crassum melle affuso exhibeto, & ex potibus
 quencunq; admiserit bibendū dato. Et frequenter fomētum
 adhibeto, & calidā aspergito, & per ceratū leniter mollito, ac
 à latere detrudito, & latus fascia lata deligato. Et lac bubulū
 q̄ plurimū ad dies quadraginta bibendū præbeto. Cibis autē
 vtatur q̄ mollissimis. Morbus hic vehemēs est & lethalis, &
 paucae etiā sic curentur effugiunt. Si vero in lumbis fuerint
 vteri, aut in lateris mollitudine, & spiritus sublimis iuerit, &
 suffocatio habeat, & anhelatio densa ipsam corripiat & mo-
 ueri nō vult: sulphur, aut bitumē, aut cicutā, aut myrrhā teri-
 to, & melle cōcto affuso, glandulā longā efformato ac cras-
 sam, eāque in sedem indito. Si vteri deuoluerint seipsas ad
 intermediā lumborum ac coxarū partem, dolor habet imū
 ventrē, & crura contrahuntur, & iuncturas coxarū ad sedem
 dolet, & quum aluū exonerat, dolores emergūt acuti, & ster-
 cus cum violentia prodit exiguū, & vrina destillat, & pusilla-
 nimitas ipsam corripit. Quum sic habuerit, fistulā ad vesicā
 alligare oportet, & oleū calidum in vteros infundere. Et fo-
 mētum adhibere, aut multa calida aqua lauare, & in oleū &
 in aquam delidere. Suffire autē subter pudenda, graueolētia.
 sub nares vero odorata. postq̄ aut dolor quieuerit, pharmacū
 sursum purgans dato. Infernū vero ventrē turbare nō opor-
 tet. Vbi verò vteri cōfederint, pharmacū deorsum purgās bi-
 bendū dato, & lac asininū, si nō fuerit lienosa. Postea fomēta
 adhibeto

Cum vteri
latera pe-
tunt.

Medela.

Curatio.

Cum vteri
lūbos mo-
lestant.
Medela.

Cū mos vte
rorum aliò
vertitur.
Curatio.

Quid mu
lieres fati
tar.
i.

adhibeto vteròsq; aspergito. & subditiū purgatoriū quod D
cum lauro præparatur, & nō mordet, apponito. Deinde aro-
matis suffita, ad virū accedat. & si in vētre habuerit, sana sit.
Verū pleræq; steriles & cruribus mutilatæ fiunt. Quibus-
cunq; osculum aliò inclinatur, & ad coxam allabatur. Cōtin-
gunt enim & hæc, quæ vterū purgari prohibent, & geniturā
iūscipere, & liberos gignere. Hæc odoratis fouere oportet. &
post fomentū, digito reuellere & à coxa disparare. & postea
tædulis & plumbeis fistulis immisis dirigere. Non eī velo-
citer cogi potest, velut dictū est. Cū autem ad naturalē situm
redierit, & vteri aperti fuerint, subditiis mollibus purgato
& alia cōuenienter facito. Quibuscunq; vteri ad coxā colla-
buntur, si nō breui discedāt, & rursus in locum suum redeāt, E
ad coxam reliccantur. Necessariū est autem osculū auersum
esse, & in supernis detineri. Quum verò auersum fuerit con-
clusum esse. Ex auersione verò ac cōclusionē, durum fieri, &
mutilatū esse, Vbi verò vteri conclusi fuerint, mēses sursum
ad māmās delegare, & ad pectus ascendere facit, & imus ven-
ter attollitur, & inexpertę in ventre se habere putāt. Talia e-
nim patiūtur, qualia prægnantes, vsq; ad septē aut octo men-
ses. & venter pro temporis ratione crescit. & pectora eleuan-
tur, & lac innasci videtur. Quum autē hoc tempus præterie-
rit, & māmæ gracilescunt ac minores fiūt, & venter idē per-
petitur, & lac euanescit, venter item eo tempore in quo se pa-
riturā sperabat, euanescit ac cōcidit. His verò cōtingentibus,
vteri modico tempore fortiter cōtrahuntur, & osculū ipso- F
rum reperire nō datur. adeò omnia cōtrahuntur & resiccan-
tur. & in māmīs tubercula fiūt dura, partim maiora, partim
minora. Hæc autem nō fiunt suppurata, sed semper duriora.
Deinde ex iplis nascuntur cancri occulti. Cū autem cancri
futuri sunt, pri^{or}a amarescūt, & quicquid edierint, oīa ama-
ra esse vident. & si quis plura dederit, accipere renuūt, & cō-
pescenda faciūt. Mente verò percelluntur, & oculi duri fiunt,
& nō acutē vidēt: & ex māmīs dolores ad iugulū transiliunt,
& sub scapulas, & sitis tenet, & māmæ graciles, & ipsæ p to-
tū corpus attenuatæ sunt, & nares siccæ ac obstructæ sunt, &
nō leuant. Spiritus est imminutus, & nihil oīno olfaciunt, &
in auribus dolor quidem nō oboritur, verū aliquando callo-
sa cōcretio. Cū igitur ad hoc temporis progressæ fuerint,
sanæ

A sanæ fieri nō possunt, sed pereunt ex his morbis si verò prius quam huc perueniāt curatæ fuerint, & mēses soluti fuerint, Cura quæ. sanæ fiunt. At verò curare tales oportet hoc modo. Primū quidem omniū si adhuc fortē assumpseris, reliqui corporis respectu habito. quacunq; tādē purgatione opus habere videtur, medicamētū exhibeto. Vbi verò corpus præparaueris sic ad vterorū medelam procedito. Si verò totū corpus minime mouēdū esse videatur, neq; morbi causæ hinc proficisci, verū vteri à seipsis morbū habeāt, curā hoc modo auspica- re. Primū quidem vteros sic foueto. Ollæ duas sextulas ca- Fomētum
pienti, operculū imposito ac adaptato, vt nihil præterspiret, aduerte.
deinde verò operculi fundum pertundito ac foramen facito.
B In foramen autem arundinem indito longitudine cubitalē. Oportet autē arundinem operculo probè adaptari, vt penitus nihil præterspiret. Cū autē hæc paraueris, operculū ollæ obdito, lutōq; oblinito. & vbi hæc feceris, fossā duorum pedum altitudine effodito, ea magnitudine quæ ollam capere possit. postea verò ligna immissa vrito, donec fossa ab igne excādescat. Quod vbi factū fuerit, ligna ac prunas quæ crassissimæ ac ignitæ fuerint, eximito. Cinerē verò ac fauillā in fossa relinquito, Quū autē olla efferbuerit, & vapor sursum processerit, si quidē valde calidus fuerit vapor, abstineat. Si verò nō, summæ arūdinis parti infideat, ipsāq; in vteri stoma- machū indat. Atq; sic fomentū admittat. Si verò perfrigeretur, prunas ignitas adiicito, cauēdo vt ne acutum fomētū facias. Si verò adiectis prunis, acutū fiat fomentū, magis quam cōuenit, prunas detrahito. At verò hoc fomentū clemētī cœlo parare oportet, vbi ventus nō afflarit, neq; perfrigeret. Ipsam autem indumentis obuelatā esse oportet. Cæterū in ollā allium siccum iniicere oportet idq; magis cōminutū quàm ea quæ sunt cōtusa, & aquā affundere, quo ipsum permadescat, & aqua tribus digitis ipsum excedat. & phocæ oleum superfundere, atq; sic calefacere, ac fomentū adhibere per multū tēpus. post fomentū verò si potens fuerit, lauetur toto quidem corpore ad voluptatē, lūbis autē & partibus infra vmbilicum, amplius. In cœnā porrò dato mazā, panem, & allium coctum. Postridie verò si quidem exoluta fuerit à fomento, eam diem intermittito. Sin minus, rursus fomētū adhibeto. A fomento verò cōsiderare hoc potest, osculum contingere
N iubeo

iubeto, num fomentū ipsum vteros flatu implet. Si enim flatu implētur, osculum ex valida auersione, & ad coxā allapsu magis dirigūt, ac aperiuntur. Tāquā igitur tale sit fomentū, & hæc facere possit, sic fouere oportet. Quū autem fomentū adhibebis, allium iniicere oportet, & phocæ adipē superfundere. Atq; hoc faciendum est. donec vteri videbuntur inflati, & osculum fortiter sursum tractū. Nam ad hoc fomentum talia cōtingent. Post fomentum verò diatā cōstituito, velut priusquā fouebatur. Cū vero cōmoti fuerint vteri, ac facile solubiles fiant. fœniculi radicibus foueto. & aliam ollam eodem modo præparato. Radices autem fœniculi elotas cōtundito, & in ollam mittito, & affusa aqua eodem modo fomentum facito. Postea verò lauato: & ad vesperā mazam cœnet. **E**

Cibus. Si vero panem voluerit, & bolbidia parui polyporū generis, & sepiolas paruas, in vino ac oleo coquito, & edenda dato. At inter fomenti adhibitionem, osculū cōtingere coneris, an fomentum vteros propinquissimè adducat. Hos fouere oportet a 1 dies quinq; vel sex, hominis consideratione habita. & si quidē exoluatur ac debilis sit, differre ad sufficiens tempus. Si verò nō exoluatur, fouere per omnē diē. Post fomēta verò subdititia apponere conare, ex albicante tæda pinguisima. Illitio autem sit oleum. facito autē hæc lōgitudine quidē digitorū sex, numero verò quinq; vel sex. figura verò in angustum abeunte. Sit autē alterū altero paulò breuius. crassitudo verò eius quod crassissimū est, sit digiti indicis, & forma **F** similis digito, summa parte tenuissima, in processu verò crassior. Hæc autē leuissima, ac rotundissima facito. cauēdo ne vlla adsit fissura. Apponat autē primū id quod tenuissimū est, & vbi apposuit quiescat, obseruās ne excidat. Apponatq; primum summā partē, deinde semper amplius, simulq; obtorqueat ac circūcirca tædā intrò trumat: & vbi parū suscepit, in hoc paruo se cōtineat, cauēdo ne excidat. postea rursus eodem modo intrò trumat, donec quatuor digitorū mēsurā intra osculū vterorū recipiatur. Cū autē hæc suscepit, alterum postea apponat simul vt prius insitū aufert, quo priusquā osculū cōniueat recipiatur. dum adhuc rectū est & apertum. Hoc autē ita cōtinget, si alterū eximatur, alterū autem indatur. Oportet autē & plūbū simile figura crassissimæ tædæ formatū intrudere, quod cauū sit, quo cōtinere quid possit.

A sit. plūbi verò amplitudo sit talis fabricata, qualis in vlcera impellitur, ita vt os ipsius leue sit, & nō sauciet, formato autem hæc velut etiā subdititia ex tædis. Quū autē factus fuerit huiusmodi plūbeus penicillus, adipe ouillo trito ipsum expleto, & vbi ita præparatus fuerit, tædā quidē subtrahito, plūbū autē indito. Si verò plūbū appositū ardorē exhibeat, plumbum quidem detrahito, tædā verò rursus apponito. Et plumbū in aquā frigidā immergito, & postea rursus apponito, ac tædam eximito. Sæper autē aliquid appositū esse oportet. & interdiu quidem melius est tædā habere, noctu autem plumbum. Si verò surgere voluerit, cū cautione hoc faciat, quo penicillus intus quiescat. Sin minus, statim rursus subdatur. Si verò ex tædis apposis nullā suscipiat, tenuiorē facito, donec suscipiat, ex his ad illa trāseundo, & odedientes vteros faciēdo. Si verò neq; osculū aperiri poterit, neq; vteri propē accesserint, rursus ad veterē medicinā redito, à prima ad secundā, donec mollescāt, & propinquissimè accedāt. Et postquā im aperti fuerint subdititia facta apponito. Sint autē magnitudine oliuæ. Horum autē alterum appositū sit donec liquefcat, & deinde alterū apponito. Quum autē apponere voles, ipsum subdititiū medicamentū ex resina præparatum, in oleum rosaceū aut irinū tingito. Nam aliàs ab osculo vterorum recedit. Prius tamen plumbū appositū esse oportet, quo recto osculo, in internā osculi partē attrahatur. Postea verò mollitoria apponito, Lauet autem calida, & ante, & post subdititia medicamenta. Et in cœna exhibeto quid ex relatis marinis. Exhibeto autem duobus aut tribus diebus ab appositione, cōsideratione habita an osculū vterorū bene habeat, & purum sit. Quòd si est, ab hoc subdititio quiescito. Postea verò mollitoria apponito. Quum verò inflammatum fuerit os vterorū, rursus eodē modo pharmaca apponito, reliquāq; facito iuxta relatū modū. Vbi verò probè habuerit corpus, velut dictum est sufflato. Sed & osculum, & vteros sufflare oportet sic. Subdititium factū cum ficu apponito, duo autem subdititia facito, & antequā subdas fomentū adhibeto ex fœniculo prius relatū, postridie verò post fomentum, apponito medicamentum, & quum apponere voles, præ omnibus subdititiis vbi prius laueris ipsam ita apponito, postera autem die mollitoria auxiliantur quādiu inflammati fuerint, post

N 2.

inflam

Hippocratis Liber I I.

inflammationem verò alia facito iuxta priorem rationē, fa- D
 cito itē de hoc subditio talia, qualia de priore. Et si quidem
 in mēse semel appositū, satis videbitur inflasse vteros, quie-
 scito. Si verò aliqua opus habuerit, rursus apponito eodē mo-
 do quo prius. postea verò vbi bene habere tibi visa fuerit, &
 tempestiuum esse, fomentum ex suffimentis præparato, præ-
 paratur autem hoc modo. Cyperum tulum præparato testæ
 conchæ mensura, & calamum vnguentariū eadem mēsurā,
 & iunci vnguentarij tantundem, cardamomi tantundē. Cu-
 mini item Aethiopici, anisi, & rutæ siccæ, & hyperici ac fœni-
 culi seminis. Quū autē hæc præparaueris, vini austeri albi
 odoratissimi heminas sex in ollam infundito, & de contusis
 quadrantē inspergito ac permisceto. Deinde vnguētū Aegy- E
 ptij optimi, aut amaracini, aut irini, triū obolorū pondus af-
 fundito, permisceto, & molli fomēto plurimo tempore foue-
 to. Ante fomentum verò lauato, & duos aut tres dies foueto.
 Quū autē foueri desierit, operculum quoddā fomēto impo-
 nēre oportet, vt nē transpiret, postea verò tædis & plūbis vte-
 re. Quū autē duobus aut tribus diebus fomentū adhibueris,
 alias duas aut tres intermittito. Intermediis autē diebus bis
 in die lauato. Edat autem porrū coctum & crudum, & rapha-
 nos, & nasturtiū, & allium assatū ac coctum, & potus sit me-
 racior, & marinis prædictis vtatur. Quum verò intermedij
 dies præterierint, rursus fouere oportet, ita vt modicū de sin-
 gulis cōtulis ad prius fomentū inspergas, & vinū in super af-
 fundas, si opus esse videbitur. itēmq; oleum, atq; cū hoc fo- F
 ueas. Postquā autē fomenta bene habere tibi visa fuerint, &
 osculum molle esse ac apertū, velut cōuenit, & ipsi vteri pro-
 pè: postera die à fomento, pharmacū quod cum myrrha præ-
 paratur apponito. Sunt autē apposititia duo, postridie verò
 post purgationem, mollitoria subdito, quandiu vteri fuerint
 inflāmati. Postea verò tædis ac plumbeis penicillis vtēre.
 Post hæc intermissis diebus quotquot visum fuerit respectu
 ad inflammationes vterorū habito, & viriū corporis conie-
 cturā facta rursus velut scriptū est refoueto. Si quidē prius
 fomentū adhuc sufficiēs esse videbitur cōiectis ad hoc suffi-
 mentis velut prius, & vino ac oleo affuso. Si verò inutile esse
 prius illud fomentum videatur, aliud ex integro præparato.
 Oportet autem hoc pharmacum renouare in singulis adhi-
 bition

De Morbis Muliebribus.

283

A bitionibus, quandiu subcruenta purgatur. Si verò talia purgata fuerint, quiescat. Diata porro hoc modo constituatur. Interrogato in quibus diebus menses ipsi prodierint, & ab his initio facto, hanc diatā præscribito. Primum quidē multa calida lauetur, capite excepto. Quum autē cessauerit, caseum acrem, & ruta, vino nigro pari aqua tēperato diluito, & postea polenta inspersa, statim ex balneo bibēda dato. Deinde pradium tempestiuē exhibeto. Edat autem mazam aut panem, & porrum coctum aut crudum, & de huiusmodi omnibus acribus præscriptis, & aliquando leguminis fracti decoctum: spumā autem ne detrahito, & silphium multum detrasum addito, ac multa allia incoquito. Obsoniis autem vtatur pisciū, chartilagineis omnibus coctis aceto mulso dulci, aut fauorum cremore cocto: bolbidiis, polypodiis, in vino & oleo, & silphij semen tritum bibat. & quā plurima tum in prandio, tum in cœna edat. Lauetur autem post cœnā, quum requiescere volet. Hac diata ad dies quinque vel sex vtatur. post hos dies, mane ieiunæ sambuci fructus baccas sex, in vino meraco dato, & sepiæ oua decem aut duodecim. Hæc tria simul mane ieiunæ bibenda præbeto. post hoc verò pharmacum, potionem dato. At vbi interquieuit lauetur. Sit autē potio, ruta & caseus, atque sic prandeat præscripto modo. Serius autem cœnet, & semper bis in die lauetur. Hæc autē diata ad dies tredecim aut quatuordecim procedat. Quū verò hi dies præterierint, cataporia ex succo silphij fabæ magnitudine formato, atque hæc primum dato, postea verò alia præscripta facito. Quum autē dies trāsacti fuerint viginti quinque in hac diata, reliqua quidem facito eodem modo. Ante prandiū verò vbi prandere volet, allij segmenta quatuor, & caseum acrem tali magnitudine terito, & polentam modicam ammisceto, ac massam efformato, eamq; primum edendam dato. Ante cœnam verò meracum obsorbeat, atque ita cibum capiat. De cætero verò eadē diata vtatur. Quum autem nouem dies reliqui fuerint ad tempus mensium, primū hoc dato. Cum ouis & sambuco, cuminum Aethiopicum, & castorij obolum, Vbi verò duo dies reliqui fuerint, ab his omnibus potionibus ac catapotiis abstineat. Verū pharmacū cum tæda præparatum ieiuna vbi lauit, sumat. Post medicamento verò potum, mercurialem & brassicam simul in aqua

Vicus.

N 3

cocta

Hippocratis Liber I I.

cocta dato, cum aceto mulso dulci, aut fauorum cremore co-
cto, sale, tilphio & oleo cocta. Atque hæc in prandio edenda
præbeto, & succos sorbendos. & potu meraciore bibat. Obso-
nii autem utatur polypodio cocto aut sepiolis. & hæc qui-
dem in prandio. In cœna verò sumat carnem caprinam, aut
ouillam, aut agninâ percoctâ, & porrum, & alia acria, quæ-
cunque voluerit. A cœna verò lauetur. & hæc sit diata po-
stremis duobus diebus. Si verò ex hac diata menses nō fue-
rint detracti, sequenti mense eandē diatā ab initio repetito,
vsque ad postremos duos dies. In quorum priore appositio-
nia facta apponat, iuxta superiorē rationem, ex pharmaco in
aqua facto. Apponat autē prælota. Verum cōsiderare oportet
etiā vteros quomodo habent, quo semper omni tempore
bene habeant, & os rectum ac apertum sit, & si ita visum fue-
rit ante appositionem fomenta adhibeto. Quod si eruperint
menses, si quidem frequentes fuerint, paucioribus lauacris
utendum est, & reliqua diata ac curatione. Si verò paucio-
res, pluribus. Si verò significationem de se præbuerint, rur-
sus eadē diata utendum est, ac curandum donec menses appa-
ruerint. Quum autē semel talibus prodierint, optimū fue-
rit in ventre cōcipere. Atque hæc est omnium huiusmodi
morborū curatio. Si vteri cōtingant coxam, & incumbant,

Cum vteri dura ac solida sit coxa ad lateris mollitudinem. & dolores
coxæ dicem imi ventris, & ad ipsam lateris mollitudinem. & lumbos ac
petunt. crura dolor incidit ac extenditur, & suppuratur. & linamen-
tis opus habent, & pereunt, nisi quid feces aut vras. Quum

Medela.

si habuerint, pharmacum deorsum purgās bibendū dato, &
multa calida lauato, & vteros foueto, ita ut urinā veterem in
peluim infundas ac feruefacias. & supra ipsius cavitatē mu-
lierem colloques vestibis contectam, ut ne præterspiret, & si
frigeat urina, ferri igniti si iusta in urinā immittas, & fomē-
tum facias donec se obscurē videre, & animo deficere dixe-
rit. Lauato autem calida aqua, & postea digito contingens
os vterorum ad sanā coxam trahat. Et noctu mollitoria ap-
ponat. Postquam autē dixerit directum esse, facto prius cum
odoratis fomento, rursus mollitoria quædam apponito. Imò
& plumbeos penicillos per triduum. singulis diebus vnum
post hos verò bryoniā albam, aut scillā per triduum, postea
verò consideratis mensibus disce, an biliosi sint, aut pituitosi,
aut

A aut an sanguis sit corruptus. & si opus fuerit ipsi sanguinem purgare, quocunque maximè opus habere tibi visa fuerit, id apponito. Et postea cū eiusmodi colluito. Apponito autē subdititia medicamenta, donec sanguis purus educatur, & hoc per triduū facito. Deinde ceruinū adipem liquatū, molli lana eo imbuta apponat. postea per diem pulegium subdat. & aromatis suffita sic ad virum accedat. Si vero ex partu morbus fiat, vbi ex vrinx fomento penitus purgata est, statim ad odorata accedat, & postea lota. oleum albū Aegyptiū ad sanā coxam apponat, & super hāc decumbat. Si verò neq; ad hāc transmueatur vteri, ieiuna pronia grana nigra quinq; in vino odorato bibat. Et in cibo sumat allia cruda, & assata, & cocta. Obsoniis autem vtatur paucissimis. Si verò sana non fiat, similiter ipsam purgato velut in priore dictū est. Ceterum in hoc morbo si nō statim in ventre habuerint, steriles fiunt. Si verò sic habuerint, mensesque nō fiant, neq; febrilis calor corripit, primū pharmacis sursum maximè purgato. Si verò debilis fuerit, deorsum. Et post pharmaci potionem, si pituitosa esse visa fuerit, vomat ieiuna, & accepto cibo, & plerunq; sana fiet. Si vteri ad coxā decurrerint, menses crassiores existentes nō prodeūt. Verū dolor ad imum ventrē procedit, & ad lateris mollitudinem, & morsum percipit. Quū sic habuerit, multa calida lauato, & allia plurima edenda dato, & lac conuenienter bibendū. deinde vinū meracū. & totā foueto, & pharmacū sursum purgās exhibeto. Si verò debilior fuerit, infra. Si verò curata fuerit, vteros cū fceniculo foueto, & absinthium ammisceto. Postquam autē recēs fota fuerit, os vterorum sensim, cū digito ad sanā coxam detrahito, ita vt & ipsum os, & partes circumcirca affectas leniter mollias, & mollitorium quoddam apponas, & postea plumbeos penicillos, & mox scillā. deinde narcissinū vna die interposita. Quum verò pura esse visa fuerit, netopū apponat in lana. & postridie oleū rosaceum. At mensibus prodeuntibus, melius est nō apponere. Si verò nō prodeant, cantharidas quatuor sine alis, sine pedibus, & sine capite. & pronia grana nigra quinq; & sepiæ oua, & apij semen modicū in vino bibat. Et si dolor affuerit, & vrinx stillicidiū vexarit, in aqua calida desideat. & aquam mulsam aquosam bibat. Si verò non purgetur, rursus pharmacū bibat. Si autē purgatio prodeat,

Cum morbus ex partu cōtrahitur.

Medela.

Cum vteri cox edicem petunt.

Curatio.

Hippocratis Liber I I.

ieiuna cum viro coeat. Si verò nō prodeat, dato quod detra-
 hat ipsam, respectu ad vires mulieris habito. & tunc tutum
 est vt ad virū accedat. Si enim in ventre habuerit, sana eua-
 dit. In purgatione verò si multa prodeat, mercurialē edat,
 & polypos teneros coctos. & cibis mollibus vtatur. Si puer-
 peræ vteri in coxā incubuerint, aut ad lateris mollitudinem,
 ad alterā coxam oleum Aegyptiū album, aut rosaceum ap-
 ponito. Sed & in sanā coxā decumbere melius est. Bibat au-
 tem pæoniæ grana nigra quinq; & sambuci fructus in tadis
 conchæ testā maiorē, & castorium magnitudine fabæ. Et ci-
 bis vtatur mollibus. Conuenerit autem mercurialis ante ci-
 bum, cocta velut brassica. Sorbeat autem & ipsam decocti
 aquam. & acria comedat, exceptis raphano & cepis ac nastur-
 tio. Optima est & lactuca. Quot verò morbos ex vteris
 fieri contingit? Dico autem quum vteri ex loco moti fue-
 rint, aliò aliās allabūtur. Ad quencunq; verò locū allapsi fue-
 rint, dolores ingētes incumbunt. Et si quis vesicam contin-
 gat, dolorē exhibent, & vrinā nō suscipiunt, neq; geniturā in
 seipso trahunt, & ambo dolent. & si non celeres solutiones
 fiant, vteri postea suppurantur iuxta eosdem locos, si ad ipsos
 decurrerint. Cōtingit autem hoc & in laterū mollitudine, &
 in inguinibus, & super pectine. Caterū in principiis quum
 dolor habuerit, sic curare oportet, & tepefactoria adhibere,
 & in aqua calida sedere. Bonum enim & hoc est: aut spongiis
 ex calida aqua expressis fouere. & pharmaca vteris cōmoda
 bibere. Si verò ad hæc non solvatur, pharmaco sursum aut
 deorsum purgare, vtro tandē opus fuerit, cognosces autem
 id hoc modo. Si enim ad inguina, & pectinē, & vesicā irrue-
 rint, hæc purgatione sursum opus habent. Si verò ad laterum
 mollitudinem, & præcordia, hæc pharmaco deorsum purgan-
 te indigent. At verò huiusmodi morbi omnes senioribus
 magis quàm iunioribus fiunt, ad mēses suppressos, fiunt etiā
 iuueniculis, vbi multo tempore viduæ māserint. Si verò ad
 sedem cōuertantur vteri, secessus recrementa impediuntur,
 & dolores occupāt lumbos, & imum ventrē, & intestinū re-
 ctum ac podicem. Quum sic habuerit, calida ipsam lauare
 oportet, & lumbis fomentū adhibere, & postea graueolentia
 subter suffire, & apponere quæ purgant & impellunt vteros.
 & bibēda dare quæcunq; libēter admiserit ex maximè con-
 ferentibus.

Cum coxē-
 dicem ve-
 xant.

Medela.

Vterorum
 morbi.

Curatio.

Cum vteri
 sedem pe-
 tunt.

Aferentibus. Si verò incumbant in inguina, & vrinae meatus, dolores fiunt fortes, & torpor in cruribus. & vrinae meatus obturatur, & vrinam non emittit. Curare verò oportet hoc modo. Ad nares quidem odorata apponito, & vnguenta. Ad vteros verò graueolentia suffito. Porro omnis occasio vteros propellere potest, si quid mali habeant. Nam & à frigore pedum ac lumborū, & à saltatione, & terrore, & lignorū secretionē, & cursu ad accliuem ac decliuē locū, & ab aliis multis propelluntur. Proinde hæc considerare oportet. ad totum corpus respectu habito, quū præsentēs morbi affuerint. propter talia enim omnia necesse est plus aut minus agrotare. & postquam hæc reluxerint, maximè hac parte repentinè morbi manifesti fiunt. Quū igitur hæc aduenerint, penitus ex tota homine deprehendere oportet. Nā quæcunq; perfrigerationes crurū, aut stupefactiones ex frigore fiunt, hæc omnes etiā in vterorū morbis vteros eleuāt. In talibus itaq; aquam calidam affundere oportet vteris & circumscitis locis. & ipsos ac crura excalefacere, quum allapsi fuerint. Si circunuersi fuerint vteri ex partu ad dextrā partem, & puerperij purgamenta nō fiāt, & dolor imum ventrē habet, & lumbos, & laterum mollitudinē. & dextrū crus grauatur, & torpor occupat. & nō tremit, & osculum vterorum cōtingere non potest, sed ipsos leues ac fortiter planos deprehendet. Quum sic habuerit, pharmacum bibendū dato, à quo sursum ac deorsum purgetur. magis verò deorsum. & totū corpus foueto, & præfertim vteros leniter. & calida bis in die lauato. & ex potibus quencunq; libēter admiserit, experimento facto præbeto. & viro frequenter cōdormiat, & brassicā edat. Si vteri ad sinistram partē, aut coxam declinauerint, dolor acutus ac vehemens habet lumbos, & laterū mollitudines, ac ipsum crus. & claudicat. Quum sic habuerit, pharmacū infra purgās bibendum dare oportet, & postera die suffire hoc modo. Ordei chœnices duas, & oleæ folia parum cōfringito. & gallā contundito ac cribrato, & hyoscyami tertiā chœnices partē. Hęc mixta & olei hemina dimidia subacta in olla noua, per dies quatuor suffito. Nocte verò lac bubulum, & mel, & aquam bibat. & calida lauetur. Si vteri transuersim situm habeāt, & obliqui fuerint, itēmq; os ipsorū menses ipsi partim occultantur, partim prius conspicui euanescent, & non similes fiunt, quantur.

Curatio.

Quam facile vteri moueantur.

Cum post partum ad dextrā declinant.

Medela.

Sin sinistrū petant.

Medela.

Cum obli-

N 5

sed

sed deteriores & pauciores quam antea. & genitura non fit **D**
 hoc tēpore. & dolor habet imum ventrē, & lūbos, & coxā, &
Medela. ipsa attrahitur. Quū sic habuerit, phar macū infra purgās bi-
 bendū dare oportet. & calida lauare, ac fouere. Vbi verò re-
 cens fota & lota fuerit, digito immisso os vterorum corrigat
 ac dirigat. & odoratorū suffitū admittat. & ex potibus dato
 iuxta experimentū, quem libēter susceperit. Cibis autē vta-
 tur mollibus, & allia edat cruda ac cocta. & cū viro dormiat.
 & in sanā coxam decumbat. Alteri verò fomentū adhibeat.
 Morbus autē hic agrē cedit. Si verò propinquissimi fuerint
 vteri frequēter vomat. Vteros autē graucolētibus suffiat, do-
 nec in locū suū firmati fuerint. Diēta verò ventrē nō emol-
 liente vtatur. Si vteri extra naturā progressi fuerint, febri- **E**
 lis calor habet pudendū & imum ventrē. & vrina frequenter
 ac paulatim destillat. & pudendū vehemēter mordetur. Pa-
Cum vteri
extra natu-
ram pro-
grediūtur.
 titur autē hac si recens ex partu viro cōdormierit. Quū igitur
 sic habuerit, mirti baccas, & loti ramēta, in aqua coquito,
 & aquam per noctē sub dio exponito, atq; sic frigidissimam
 pudēdo affundito, & leuiter trita hac apponito. Postea aquā
 lentium cū melle & aceto bibēs vomat, donec vteri fuerint
 retracts. Sed & lectum à pedibus altiore facere oportet. &
 pudendū graucolētibus suffire, nares autē odoratis. Cibis ve-
 rò vtatur mollissimis ac frigidis. & vinū aquosum albū bi-
 bat. & ne lauetur, neq; cum viro coeat. Si penitus ex pudēdo
 exciderint vteri, depēdent velut scrotū. & dolor corripit imū
Morbi hu-
ius causā.
 ventrē, & lumbos, & inguina, & quum tēpus processerit, non **F**
 volunt in suū locū redire. Morbus autē hic corripit, quum re-
 cens ex partu laborarit, aut fatigata fuerit, vt vteros cōtactu
Curatio
 leserit: aut cū viro coiuerit in puerperiorū purgatione. Quū
 sic habuerit, frigefactorie mitigantia apponere oportet ad
 pudendū. & quod extra propendet depurgatū, malo punico
 in vino nigro cocto abluere, & intro protrudere. Deinde mel
 & resinā pari vtriusque portione colliquare, & in pudēdum
 infundere. Et decumbat supina pedes sursum extentos ha-
 bens. Postea spongas apponat. & ad lumbos deliget. Quādiu
 verò sic habuerit, à cibis quidē abstineat, potu verò parcissi-
 mē vtatur, donec septē praterierint dies. & si quidē sic obe-
 dire voluerint & redire, satis sit: Sin minus, summas vteri
 oras derasas & ablutas, picato cerato illinito. Deinde pedes
 ad

- A** ad scalam deligato, vt caput deorsum p̄deat, & manu intro detrudito. Postera lauato, & crura ipsius vicissim colligato, atq; sic per noctē ac diem finito. & modicū ptisanæ succū frigidū dato, aliud autē nihil. Postera verò die reclinato, & cucurbitā quam maximā ad coxā affigito, & multo tēpore trahere finito, & vbi ipsum detraxeris ne scarificato, sed reclinato finito, & nihil prāter succū ptisanæ exhibeto, donec septem prāterierint dies. Si verò sitis vexet, modicū aquæ bibat. Quū autē septē trāierint dies, cibus mollissimis ac paucissimis vtatur. Vbi verò ventrē exonerare voluerit, decumbens id faciat, donec quatuordecim prātereant dies. Deinde tepidis fomētis colluatur, melius autē est calida velut ex sole.
- B** le. & quam parcissime deambulet, & ne lauetur. Ventrē autē ne solueris. Cibus verò paucissimis vtatur, neq; acribus, neq; salis. & pudēdū graueolētibus suffiatur. & postquam obambulare inceperit, subligar gestet. Si verò extra pudendū os vterorū exciderit: vtpote ceruice vterorū propē pudendum sita, & ampla existente, sit autē hoc magis sterilibus, contingitq; maximē ex fatigatione, quum mulier laborarit, & vteri calefacti fuerint ac exudarint: tūc euertitur os ipsorū per ceruicem vt quod in humidiorē ac lubriciorē & calidiorē sit loco, quā in priori tempore. & vbi hoc cōtigerit, procedūt vteri foras ad frigus, & osculū ipsorum euersum prodit. Et si quidē breui curata fuerit, sana fit. Verū sterilis penitus relinquitur. Si verò non breui, osculū durū semper ipsi extra erit,
- C** & fluēt illic aliās atq; aliās saniosus humor viscosus ac graueolens. Et si mēses prodierint, si adhuc eius ætatis fuerit, in lecto decumbet. Tēporis autē progressu huiusmodi morbus incurabilis fit. & cōsenescunt vteros foris habentes. Si verò vteri extra prominuerint, ablutos ipsos aqua tepida, oleūque ac vino illitos rursus indito ac deligato, & graueolētia subter suffito. Sub nares autē odorata. Si verò multo tēpore vteri promineant, & stupidē perfrigerentur, multā calidā aquam affundito, quo refocillentur. Si verò iam infentur, etiā aceto ad aquā ammixto foueto: Sitq; hæc aqua aut lauri aut myrti decoctū, & leniter protrudito, & cerato vnguento illinito. & si paruerint, satis est: Sin minus, cum aqua abluito. & aceto modico tepesfacto profundito. Deinde illinito. Vbi verò cōsederint, ablutos velut dictū est indito, & alia prædicta facito.
- Oleum

Cum vteri
procidunt.

Medela.

Hippocratis Liber I I.

Cū os vte-
rorum tor-
quetur.

Curatio.

Vterorum
lccra.

um valde
rocidunt
& nusquā
stuntur.

sedela.

Oleū verò ne adhibeto, neq; aliud pingue, aut pinguitudinē D
habens. Si quid ex osculis vteri cōplicatū fuerit, menses non
fiunt, aut pauci & prauī ac dolorifici. & quū viro cōdormie-
rit, dolet. & quicquid vir immiserit ex coitu exit, & contingi
nō vult, neq; attrahit geniturā. Et dolor habet imum vētrem
ac lumbos. & os vterorū ad contactum non cōparet. Quum
igitur sic habuerit, vrina veteri foueto. deinde vomat à lētis
decocto, melle & aceto ammixto. Postea aqua calida lauetur.
Deinde oleo albo Aegyptio in phialā argenteam aut æneam
infuso, & sale addito cōtecta phialæ infideat, & si quidē odor
olei per os ipsi penetrarit, ipsam pariturā esse, & postera die
sanā fore pñūcia, ac cōfidere iube. & vbi dormire volet, oleū
Aegyptiū in lana apponat. Postridie verò cōsideret an os vte- E
rorum magis sit directū. & si esse dixerit, per triduū odoratis
foueto, & subdititia quæ nō mordeāt apponito, purgatoq; &
cū odoratis ac mollibus postea colluito, totidē diebus velut
prius. quū autē mēses p̄dierint, ieiuna, & illota, aromatis suf-
fita, ad virū accedat, Pleraq; verò ex hoc morbo steriles sūt,
si non curatus fuerit. Si vlcerati fuerint vteri, & extremē fo-
ras processerint, oleo illitis manibus indito. & myrrhæ puræ
pilulas tres deuorādas præbe. & laurū viridem tritā bibat vi-
no dilutam. & sic sana fiet. Si in arctum cōtracta fuerint pu-
denda, subdititium apponito. Anisi videlicet semen & apij
tritum pudendis subdito. Si vteri non in loco manserint, sed
modo huc, modo illuc transierint, vt dolores exhibeāt, & nūc
incōspicui fiant, nunc exeant velut sedes. & quū quidem supi- F
na fuerit, in loco maneant, quū verò surrexerit, aut ex som-
no expergiscatur, aut se inclinauerit, aut aliū quēdā motum
fecerit, exeūt. sæpe verò etiā dum quiescit. Hāc quā maximē
quiescere, & non moueri oportet. & lectū à pedibus sternere
altiore. & vomitibus vti. Oportet enim ipsos sursum reuel-
lere, & acerbis perfundere. & graueolētia subter suffire. Sub
nares autem odorata. & ex malis punicis quodcūq; maximē
cōuenerit & nihil impedierit, in medio per vmbilicū perfo-
ratum, in vino tepefactū quā penitissimē subdito. deinde la-
ta fascia deligato ac circūdato, vt ne elabatur, sed maneat, &
quod opus est, faciat. & de peplo, cū caseo, & polenta bibe-
ndum dato, quemadmodū supra in allapsu scriptum est. & de
portionibus experimento facto, quācūq; maximē admiserit,
biben

- A** bibendā præbeto. Cibis autē mollissimis vtatur, & cum viro ne dormiat, donec ad locum suum redierint. Si vteri exciderint, hederā siccissimam tritā, ac linteo alligatā apponito, & nihil pingue adhibeto. In potu autē exhibeto triticū recens, & peplum album, & saluiā, & cyperum, & anisum. Hęc trita vino diluta, cū furfuribus ordeï bis in die dato, pro vice heminam dimidiam. Si ad crura & pedes vteri conuertantur, cognosces sic. Magni pedū digiti cōuelluntur sub ungues, & dolor habet crura ac femora, & incūbit ac premit nervos circa femur. Quum sic habuerit, multa calida frequēter lauare oportet, & fomentū adhibere si ferre poterit, & graueolentia subter suffire. Et femora rosaceo oleo inungat. Si verò loqui
- B** nō poterit, crura derepēte frigida reperiis, & genua, & manus, & si vterū cōtigeris, nō in suo mūdo est, & cor vibratur, & dentibus frendit, & sudor est multus, & alia quæ à sacro morbo correpti patiūtur, & quæ ab aure exsudāt. His frigidā aquā multā affundere oportet super crura & manus, & alia facere velut prius dictum est. Si cōmoti vteri aliquò allapsi fuerint, & dolorē exhibuerint, oleæ scabiem, & lauri ac cupressi ramēta in aqua cocta, lana excepta subdito. Quū mulier recēs enixa, onus maius quā pro natura leuarit, aut timuerit, aut ligna secuerit, aut cucurrerit, aut alia quādā huiusmodi fecerit, vteri excidūt ob hęc maximè: aliquādo verò ad sternutationē. Non enim violatur, si per vim sternutās, nō apprehēderit nares. Proluere itaq; aqua tepida vteros oportet. Deinde betæ succo feruefacto similiter, postea vino nigro meraco. Si verò non obediat, mollitoria facere oportet. Verum hęc facere oportet priusquā perfrigerentur, & leniter intro indere. Deinde crura extēdere, ac subalternatim ponere, & molle quiddā ipsis supponere, à potu verò coërceri oportet tales quā maximè, & vētrē custodire, vt ne exturbetur. Naribus autē odorata adhibere. Huiusmodi verò postea si nō quieuerint, sed moueātur, veratro purgare oportet. Et si non satis fuerit, etiā vomitus facere, & nō lauari, tacerēq; ac quiescere. Si inflati fuerint vteri, venter attollitur, & inflatur, ac sonitū edit, & pedes & caux faciei partes intumescūt, & color iniucūdus fit. Et mēses occultātur, & genitura hoc tēpore nō manet intus, & anhelat, spumātq; ac anxia est, & quū expurgiscitur è somno, recta ceruice spiratio ipsam corripit, & quicquid

Procidētia
medela.

Quum vteri crura & pedes percutiunt.
Medela.

Quæ repēte obmutescunt.
Curatio.

Procidētia vuluæ.
Medela.

Quum inflati vteri sint.

Hippocratis Liber I I.

Curatio.

Vterorum
duricia.

Medela.

Duritia
alia.

Morbi hu-
ius causa.
Medela.

Quum vte-
ri obdure-
sunt.

Curatio.

quicquid ederit aut biberit, ipsam molestat, & suspirat, ac tri-
statur magis quā priusquā edit, & suffocatur, & nervi cōtra-
hantur. Et vteri ac velicæ dolēt, & manus cōtractū nō admit-
tunt. Neq; lotiū emittūt, neq; geniturā suscipiunt. Quū sic ha-
buerit pharmacū deorsum purgās bibendū dato, & calida la-
uet, ac frequēter insideat toto corpore. Quandoq; etiā vsq; ad
vmbilicū fomētū adhibeto, & interpolito tēpore ea apponi-
to à quibus purgetur, & nō mordeatur. Suffumiget autē odo-
rata subter pudenda: sub nares verò graueolētia. Et potiones
dato quæ vteros purgāt, & ad locū impellunt. Et mercuriale
edat, & postea lac bibat, velut de latere scriptum est. Morbus
autē hic non est diuturnus. Si velut in callū indurati fuerint
vteri, & osculum exasperatur, & menses occultātur. Quū au-
tem prodierint, asperi apparēt velut arena. Si verò etiā digi-
to contigerit, os vteri asperū cōperiet, & semper velut callus
accrescit. Quum sic habuerit, cyclaminū terere oportet, & sa-
lem ac ficum simul miscere, & cum melle glandulā efforma-
re ac subdere, & fomento adhibito, purgantibus eluere. Edat
autē mercurialem & brassicā coctā, & succū sorbeat. Itēq;
porrum, & calida lauetur. Si verò velut in callum indurati
fuerint, & mēses obtorquentur, & osculū ipsorum clauditur,
& nō concipit, & velut aliud quid est, & si cōtigeris, velut la-
pis illic esse videtur, & est os asperū ac multis radicibus præ-
ditum, & nō leue aspectu, & qui ipsum considerat, digitū in-
tromittere nō potest, & febris circūfrigerans corripit, & fre-
mitus, & dolor vteros habet, & imum ventrē, & laterū mol-
litudinē, ac lumbos. Patitur autē hæc, si ipsi corrupti menses
cōputruerint. Quādoq; verò etiā ex partu, & frigore, aut ma-
la diæta, & aliter. Medicamentū igitur bibendū dare opor-
ret, & multa calida aqua lauare. Oleo item vtere, & fomentū
adhibe. Quum autem recēs lota aut fota fuerit, specillo im-
misso aperito, & os ipsorū dilatato, idēq; cum digito simi-
liter efficito, & mollitoria velut dictū est apponito, & potio-
nes similiter bibendas dato, & eodem modo curato. Si verò
obduruerint vteri, osculum ipsorū durum fit, & clauditur, &
menses nō prodeunt, sed pauciores & deteriores, & dolor in-
cidit, & febris & rigor corripit circa imū ventrē, & lumbos,
& laterum mollitudinem. Quum sic habuerit, multa calida
lauato, & tepefactoria adhibero, si dolor habuerit, & vteros
multo

A multotēpore cū aqua decocti cucumeris syluestris fouero. deinde mollitoria apponito. Atq; hæc per triduum facito: & si ex cōtactu osculum vterorū molle apparuerit, ex crudo lino tres peniculos suppuratorios indito, primū tenuem, secundum paulò crassiorē. Crassissimus aut sit magnitudine digiti parui, lōgitudine verò quinq; digitorū ita vt hos adipe anserino illito subdas. Sed & vbi fomentū adhibueris ex odoratis, glādem mollitoriā apponito: Aut nitrū tali magnitudine illitū, vt ne sauciet. Nō enim pungere oportet: & appositum sit ad duos dies. Decedit autē velut cortex & pellicula crassa. Intermisis verò tribus diebus, cyclaminū, cum narcissino subdito. Si verò hæc nō purgarint, cum multa cōsideratione

B apponito id quod cū bupresti paratur, & appositum maneat per diem: & vbi fortiter momorderit, glandē extrahat, & pudentū colluat cū aqua calida, & in oleo infideat: postridie verò lota. ceruinū adipē liquatū, & molli lana exceptum apponat. & si tibi adhuc purgatione opus habere videatur, tribus interpositis diebus, id quod cum narcissino paratur subdito. postridie autē netopū. Deinde rursus tribus diebus interpositis, vteros odoratis & pinguib. colluito. postridie verò pulegium per vnū diē apponito: & sequēti die cū aromatis suffito ac foueto. Vtatur autē cibus acrib⁹, marinis, aut carnib. In mēib⁹ verò castoriū bibat: & ieiuna illita suffita, & cyceonē bibēs ad virū accedat. Si verò inter os vterorū nō suscipiat

C geniturā, sed durū fuerit, ac cōclusum, plumbeū penicillū apponat, velut dictū est per triduum, vbi calida lota est. & mollitoriis vtatur, & supina decubat: & in aquā calidā infideat: & lanā vnguento imbutā apponat. Verū noctu magis apponere oportet. Iuxta coxas verò vestes laneas aut lineas molles supponat, vt ne corpus in alterutrā partem dilabatur. Vtatur & subdititiis mollib⁹, ex myrrha pinguisima, pice, cera, & adipe anserino. Sit autē myrrhæ dimidiū, reliquorum verò duplum, & in lana subdat: duo verò sint subdititia quorū alterū lota per diē subdet, alterū per noctē, donec molle factū fuerit: & vbi hoc detraxerit, aqua odorata colluatur. Aut granacnidia decorticata quindecim, & Indici medicamēti aliquātulum, si ita visum fuerit, in lacte mulieris masculū lactātis terito & cerui medullam, & alia quæ dicta sunt, ac modicum mellis ammiscero. Sit autē lana qua hæc excipiuntur mollis

& pura

Cum semē
non admis-
titur.
Medela.

Hippocratis Liber 11.

& pura, & ad diem subdat. Si verò fortius facere voles, myrrhæ parū quid ammisceto. Optimū autē est oui candidum, & adeps caprinus, & mel, & oleū rosaceū: his ammiscere farinā, & tepescere ad ignem oportet, & quod destillat lana colligere ac apponere. Aut adipē rubrum anseris aromatibus cōditum, & vnguentū rosaceū, permixta & lana excepta apponito. Præstat autem anseris adipem, & adipē ouillum, cerā albam, resinā, netopum, oleum rosac. hæc simul liquare ac miscere. Vbi verò lota est, hæc tepida intrò ad vterorum osculū apponat. Aut cerui medullam, & anseris adipem liquato, & rosaceo aut irino oleo ammixto, in valde molli lana apponito. Cū mulier i vteri duri facti fuerint, & ad pudenda exierint, dura sūt inguina, & ardor in inguinib⁹ est, & omnia cācerātur. Cū igitur sic habuerit, cucumeris sylvestris internam partem, & fauum terito, & aquæ hemina affusa in sedē infundito, & purgatur. Si os vterorum durum fiat, & ceruix, præ siccitate, & morbus leuiter hæserit, ex digiti cōtactu cognosces. & si ad coxā deuoluantur, nihil acre adhibeto. Si em̄ exulceretur aut inflāmetur, periculum est ne penitus sterilis fiat. Verū apponito ea quæ non mordent, à quibus purgetur. Quū verò duri fuerint vteri, & sic doluerint, subdititia apponito, velut est cerui medulla, aut anserinus vel suillus adeps. & vnguentū irinum cum melle: & oui luteum, ac cerā albā, velut cataplasma emollito, & ordeaceā aut triticeam farinā, cum aqua & ruta coquito. Si vteri cōclusi fuerint, oscula ipso rum dura fiunt, & geniturā nō amplius suscipiūt, sed statim F vbi cum viro cōdormierit, dum crura mouet, exit. & dolores imū ventrē, & lumbos, & inguina occupāt. & mēses omnino nō prodeūt. Si verò eant, pauci & prauī ac decolores prodeunt. Cū sic habuerit, multa calida lauato, post balneum verò castorium cum pæoniæ radice, in vino nigro odorato permixta bibenda dato. Cibis autē velut puerpera vtatur. & si manifesti fuerint mēses, diem vnā intermittito, & totā foueto, & pharmacū potādum dato, si adsuetæ fuerint, sursum purgīs, aut si egere visa fuerit, deorsum. Lac itaq; asininū, aut serum exhibeto, & leniter foueto, & mollitoria vtero apponito, & cyclaminū, & narcissinum. Cucumerū verò paruorū sylvestrium internā partem sumito, & ex diuulsis semen eximito, ac lacte mulieris masculū lactantis affuso terito, myrrha

Duritia v-
terorum.
Medela.

Cū os
vulvæ sic-
citate du-
rescit.

Medela.

Cū vul-
ua claudi-
tur.

Medela.

A rha pura & melle optimo ammixtis, oleoq; Aegyptio albo. & ne liquidum facito medicamentū, sed siccū, atq; hoc in lanam mollem purā infarciat. & in oleo Aegyp. albo tingat, & lota apponat. Subligetur autē & sub tecto maneat cū purgatur. Postquā autē sufficiēter habere tibi visa fuerit, quiescat. Sin minus, rursus aliud apponat. postea verò obuolutā lanā mollem, rotūdā faciat, & netopum immittat, & diem vnā subdat. postridie verò oleum rosaceum itidē in lana. Deinde rursus cerui adipē, etiā ipsum liquatū in lana. Lauetur autē calida aqua semper ante subditiorum appositionē. Et odoratis leniter foueatur multo tempore. Postea verò vna interposita die, colluito, si quidē pituitosa fuerit, eo quod cū grano cnidio paratur. Si vero biliosa, eo quod cum scāmonia, post hęc ambo, postridie etiā narcissino, cū vino dulci colluito. Si verò narcissinū nō fuerit, cum anthino aut irino quā optimo. Sit autē olei tertia vini pars: deinde interpositis duobus diebus, id quod cum pulegio pręparatur vnū diem apponat. Si verò prodierint menses, ieiuna per triduū bibat castoriū, cum vino odorato albo: vbi verò desierint menses, & stabiles fuerint, lauetur: & aqua frigida perluta, cyceonem bibat nō falsum. Cibum, autem ne contingat: & cum viro dormiat duobus aut tribus dieb. Quāto verò tempore purgatur, mercurialem in aqua coquēs, vbi cocta fuerit exprimat, & alliū ac cuminū, & salem subterat, & oleum his ammisceat, & modico succo affuso feruefaciat. Atq; hoc edulium ante cibos edat. Allium item coctū ac assatum quā plurimū accipiat.

C Si verò mercurialis non fuerit tenera, tritā cum brassica coquere oportet, & cōdire, & lenis erit: & si in ventre cōceperit, sana euadet, & omnia ipsi iuxta ornatum procedēt. Si os vterorum cōclusum fuerit, sit fortē velut grossus. & si digito cōtigeris, deprehendes durum ac cōuolutum, & digitum non admittit: & menses occultantur, & geniturā nō suscipit hoc tempore: & dolor habet inum vētrem, & lūbos ac laterum mollitudinē. Quandoq; verò etiam sursum ascendit & suffo

Pituitosa
& biliosa
purgatio.

Cū os vul-
uæ claud-
tur.

Medela.

O

præb

Cum vteri clauduntur. præbeas quodcunque aliud libenter susceperit. Brassicā au- D
tem edat, & succum sorbeat. Si vteri cōclufi fuerint, & men-
ses non apparuerint, colocynthidem syluestrem, & silphij se-
men, & cuminum Aethiopicum, & nitrum, & salem thebai-
cum, & adipem rhenalem, & farinam, & myrrhā, & resinam
omnia simul feruefacito, & trito mixta, & in glandem effor-
mata apponito. Si grumoli facti fuerint vteri, os ipsorum ve-
lut eruo plenum fit, & si contigeris, videbis ita habere, & mē-
ses non fiunt, neq; genitura intus manet. Quandiu sic habue-
rit, cyclaminum cortice detracto, & allium, & salem, & ficū,
ac modicum mellis, terito, miscero, ac glandem formato, &
ad os vterorum apponito. Itēmq; alia subdititia, quæ acria
sunt ac corrodunt, & à quibus sanguis purgatur, & de potio- E
nibus dato eas quæ vteros purgant. Si vteri præter naturam
hiarint, menses plures prodeunt & viscosi, & frequēter, & ge-
nitura intus non manet, & osculum hians est: & fieri non po-
test vt genituram attrahat, & febris ac rigor corripit infer-
num ventrem, & lumbos. Morbus autem corripit ex fluxu
sanguineo, fit & quum menses suppressi derepētē eruperint.
Diætæ itaque ratio prius relata est. Oportet autem subditi-
tiis curare, in principio quidem purgatoriis simulq; molli-
bus. Deinde leniter adstringentibus, & partes infra umbili-
cum per spongiās fouere, cum myrti aut rubi aqua, aut ex
oleæ aut rosarum, aut cœnanthes, aut vitis foliorum decocto.

**Cum gru-
moli fiunt
vteri.
Medela.**

**Cum vteri
hiarint.**

**Morbi cau-
sa.
Medela.**

**Quum per
menstrua
hiarint.**

Medela.

Si os vterorū hiarit amplius quā in mensibus solet, mē-
ses ita fiunt plures & deteriores omnes & liquidiores, & per F
longius tempus, & genitura nō attingit, neq; manet, sed rur-
sus exit, & si permanferit, osculum comperies disparatum, &
impotentia præ mensibus obtinet: & levis est ac debilis vte-
rus, & vltius procedit: & vires laxātur, & febris debilis, ac
rigor, & dolor habet inum ventrem, & laterum mollitudi-
nem ac lumbos: patitur autē hæc maximè, si quid in ipsa cor-
ruptum computruerit ac compactum fuerit. Quædam verò
etiam ex partu patiuntur, aliæ etiam aliter. Quum itaq; sic
habuerit, pharmacum bibendum dare oportet, & facilius iu-
dicabitur, & si dolor habuerit, tepefactoria adhibeto, & fri-
gida lauato, ac intermissione facta colluito: & ex portio-
nibus dato quacunque maximè libenter admiserit: & suffito
ea quæ resiccant: & polypos edat ac mercurialem. Si verò
non

A non conclusi fuerint vteri velut oportet, in aqua desideat in qua cocta sit myrtus, aut lentiscus, aut vitis aut oleæ folia, aut iofarum. Diara verò sit quæ relata est in rubro fluxu. Optimum verò ipsi auxilium est sitis, frequentes vomitus, & prohibitiones balneorum. Quum vteri magis quàm conuenit, fuerint aperti, & non conclusi, & purgatione opus habent, & collutionibus, & suffimentis. Si verò menses effluerint, plures fiunt & deteriores, & liquidiores, & frequentes. Et genitura non manet intus, sed quando illi prodierint, perit. Et si os cõtingas digito, comperies ipsum leue. Et impotentia ipsam præ mensibus corripit. Et febris ac rigor obtinet, & dolor imum ventrem, & lumbos, & laterũ mollitudinem corripit, maximè si quid in ipsa corruptum computruerit, itémque ex partu, & aliter. Quum igitur sic habuerit, curare oportet, ybicumque tandem dolor fuerit, velut in superioribus scriptum est. Si vteri inflammati fuerint, menses

Cum vteri non satis clauduntur vel nimis patent.

B obtorquetur, & ceruix multis tenuibus venulis, ad telarum araneæ similitudinem variegatur. Et febris est acuta, & mētem percellens, & menses prauī ac pauci ipsi comparent. Et quum ieiuna fuerit, vomitus quidam ipsi superuenit. Quum verò quid comederit, reuomit. Et dolor occupat imum ventrem & lumbos, & animo linquitur, & per totũ corpus perfrigeratur. Venter autem nunc durus, nunc mollis est, & incenditur & attollitur, & putat se in vētre habere. Quandoq; verò ventris moles vacua apparet, & alius aqua impletur, &

Cum vteri inflammantur.

C umbilicus prominet, & osculum gracile fit, & derepente apparent menses stridentes, & pauci ac prauī & attenuatur circa clauiculas & collum, & pedes intumescunt, & præsertim pedum extremitates. Quum sic habuerit, pharmacum infra purgans bibendũ dato, & subdititiis vtatur, & fomentis vteri foueantur odoratis. Per diem verò plũbeis penicillis vtatur, & ante appositionẽ, aqua calida nõ mordēti colluito, & post appositionem hoc infuso colluito. Cnestri duas portiones in aquæ hemina coquito, & aquam excolato ac infundito, oleo narcissino aut anthino ammixto. Post hæc tres dies intermitto, deinde cũ eo quod cũ aceto paratũ colluito, & ante cibũ, mercuriale cũ aliquātulo vino coquens edat velut brassicã, & succũ sorbeat. Si verò permãserit, pharmaca bibēda dato à quibus aqua de vteris purgatũ. Cibis autẽ vtatur panibus,

Medela.

O 2

& ole

Hippocratis Liber I L

& oleribus coctis, flaccidis. Marinis autē potius quā carnibus. Aut extremis partibus coctis, flaccidis, & laboret quā plurimū, & ante & post cibū & quā minimū lauetur frigida, & a dulcibus ac pinguibus omnis generis arceatur. Diebus autē purgationū intermediis, adiatū bibat ieiuna in vino diluto. At morbus hic lethalis est, & paucē effugere possunt, si nō in vētre cōceperint. In vterorū inflammatione menses obtorquentur, & quum ieiuna est, vomit. Vbi verō comedit, dolor habet imum ventrē & lumbos. Et totus vēter modo durior, modo mollis fit, & nō valde cōlidet. Alius magna fit, & non purgatur, & sibi prāgnans esse videtur, & patitur quaecunq; prāgnātes perpeti solent. Et si ventrem cōtigeris, leuem cōperies tumorem velut in vtre, & quum partus tempus esse visum fuerit, vteri cōcidunt, & menses pauci ac deteriores fiunt. Huic pharmacū deorsum purgans bibendū dare oportet, & purgatoria apponere. Purgata verō sana euadit. Si inflammatus fuerit vterus, vellicatur. Si verō quid corruptum fuerit ac vitiatū recruduerit, febris corripit acuta & magna, & horror durus, partes circa pudenda, & horribiliter afficitur, & mordetur, & cōcitur, & si quis digito contingat, rursus peius habet, & pungitur, & caput dolet ac sineut, & caligo adest, & sudor frontis. Extremæ partes perfri-
guntur ac tremunt, & sopor profundus aliquādo occupat, & audire non potest. Neque reliquus sensus operatur, fastidium cibi est multum, & stomachus & venter omnino non continet cibum, & vociferatur, & exilit, & pestinem dolet, & inguina, & lumbos, & occultos pudendi locos, & cito moriuntur. Si verō dolores ad extremam debilitatem deduxerint, spōgiis calidis ex aqua & oleo expressis foueto, & subditicia mollia apponito, medullā cerui, apidem anserinum, & cerā albam, & oui luteum. Aut ceratū picatū cum resina subdito. Vino verō aut lacte caprino purgato, aut volucris iusculo. Vinum autē ne bibat, & ptisanæ succū sorbeat.

Quum do-
lor vteros
molestat.

Medela.

Ad dolorem vterorum medicamentum infusile. Si dolor solum fuerit vehemens & violentus, caligo in vteris inest, & flatus non exit, sed isthic manet malum. Oportet igitur sic curare. Atriplicis sylvestris semen, & betas simul trita ac tepesacta, in vteros infundito. Aliud dolores vterorum sedans. Vini suauissimi pari aqua temperati tres semicongios Atti-

cos

A cos sumito, & fœniculi radices ac seminis eiusdem trientem, & olei rosacei heminam dimidiam. Hac in ollam nouam immittito, & vinum superfundito. deinde foueto. Apponito autem & scillam donec osculum molle factum fuerit & ad lationem idoneum ac apertum. Et quum in purgatione pustulæ circa osculum vteri exortæ fuerint, sic curato. Carnem bubulam, cum butyro aut adipe anserino & aniso tritis illine, & ipsam carnem in pudendum inde. Si ignis facer habuerit vteros, intumescunt pedes, & mammae, & corpus. & dolor ipsam corripit. & recta ceruice spiratio fit, & dolet laterum mollitudinem, & partes sub vêtre, & pectora, & caput, & tremor occupat, & torpor manus, & inguina, & poplites tremunt. Quandoque verò & in poplitibus liuidæ fiunt, & modico tempore melius habent ex hoc colore. Maxime verò mammae attolluntur iuxta gentilitatis cognationem. Attamen non valde dolet, & febris ac rigor corripit, & facies rubicunda fit, & sitis fortis est, & hepar resiccatur. Hac si prægnanti acciderint, moritur, & non poterit effugere. Si ignis facer in vteris fiat, tumores fiunt liuidissimi, à pedibus exorsusque ad crura tota, & ad lumbos. Quanto verò tempus amplius progressum fuerit, etiâ pectus percipit & intumescit, & tota perfrigeratur. & febris habet magna, & rigor superuenit. & spiritus densus, & animi deliquium, & debilitas, & dolor totius corporis, & tristatur, & mente variatur. Et affectio ascendit ex inferno ventre ad lumbos, & ad dorsum, & præcordia, & pectora, & collum, & caput, & stomachum, & mortua esse videtur. Quum autem dolor solutus fuerit, torpor habet lumbos, & inguinâ, & crura, & in poplitibus liuores fiunt, & modico tempore melius habere sibi videtur, deinde rursus affligitur, & corpus pustulis cõpletur, & rubores cõspicui ac manifesti faciem occupant, & guttur siccū est, & lingua aspera. Hic morbus si prægnatē inuaserit, occidit. Sin minus, medelâ adhibere oportet, & lac alatinum bibendum dare ac purgare. Si verò sic non soluatur, ventrem mollibus frigefactoriis perfrigerare, & subditiis non molestis & leuibus paulatim purgare. Itémq; vomere. Ad hoc cõmodum est sambuci folia sumere cocta cum origano, aut thymo, aut ruta. Si verò febris dimiserit, etiâ vinū ac cibos dulces dato. Aqua inter
Veruntamē paucae curantur. Aqua intercus si in vteris fiat.

Erysipelas
vterorum.

Medela.

Hippocratis Liber I I.

Medela. menses prodeunt arenosi & aquosi, & nō valde cruenti. Intu- D
 mescit & uterus, & venæ, & propinquissimæ partes. & præ-
 gnans sit, deinde suffocatur. & mammae fluunt, & imus ven-
 ter durus est, ac intumescit, & omnis circuncirca locus, & do-
 let si quis ipsum attingat. Et febris ac stridor dentiū corri-
 pit, & dolor vehemens laterū mollitudinē ac lumbos, & se-
 men in somnis effundit, & peius habet. Hanc calida lauare
 oportet ac tepefacere. pharmacum autē bibendū dare, & cū
 debilibus fouere, & cyclamini obolos tres in linteo deliget
 ac apponat. Et cupressi succum in aqua madefaciat, ac can-
 tharidas eadē terat, & modico tempore apponat, & per mul-
 tum tēporis interuallum. Efficax est. Subdititiū. Cuminum
 chema mensura, vna passa alba. Aliud. Vrticæ semen, ari E
 radix. Horū quodcunq; voles leuiter apponito, vbi verō ex-
 purgaueris colluatur, ita vt detrahas & cum infuso pudenda
 colluas. & simul cū viro dormiat. & si fœtum ad partus tem-
 pus gestarit, tota expurgatur, & sana fit. Alia aqua intercus
 vterorum. Subcruentū quiddā fuit saniosum, & purgatur,
 & mordet valde, & vlcerat pudenda velut muria, & circumsi-
 tas partes. & quocunq; destillarit, vlcerat, & color est morbi
 arcuati. De cætero verō purgatur copia velut in aliis fluxio-
 nibus. Morbus autē hic & debilior est, & aliquando lethalis
 fit. si vteri egressi fuerint. Hāc curato velut eam quæ à fluxu
 albo vexatur. & lac asininum bibendū dato, & extenuato, &
 prædictis pharmacis curato. Eclegma. Quod delingitur ad
Ventus vte- aquam intercutē. Si aqua ex vteris fluat, sulphur & anseris F
torum. adipem delingat. Si vêtus in vteris fuerit, flatus exit. & stri-
 det, & tota intumescit, & febris habet & ardor, & ad hæc val-
 de exilit præ dolore. & virum non admittit, & valde agre
 fert coitum, & erigi nō potest, & velut onus graue ipsi in vte-
 ris iacet, & caput dolet. & anxia est, & loqui non potest. Si ve-
 rō dolor accesserit, clamat, & dolet omnia, & lumbos, & pu-
 bem, & sedem. & vrina supprimitur, & venter suffocatur. &
 mori cupit. & præcordia distenduntur, & stomachus morde-
Medela- tur, & os amarum est. & vomit acida & pura ac meraca. &
quæ. frequenter ructat, & melius habet. Sin minus, intumescit. &
 si attigeris, renititur & dolet. Proinde vterū cum aqua mul-
 sa, & aceto mulso ac oleo colluere oportet. Et cuminum aut
 anisum tritum sumere, & lini folia terere, & volucrinum
 adipem

A adipem cum ovis in aqua infundere. Subdititiis verò ac portionibus vtere, quæ ego describā. Desideat autē in oleo calido, & aromata in ipsum immittito, iunci odorati florē. Aut in aqua lauri, aut marina desideat. Optimū autem est molli- **Ventris fa-**
bus infulis ventrē purgare, aut glādem apponere quē admc- **cilis solu-**
dum puero vter soluitur, lanam illotā cū melle. Si verò an- **tio.**
tiquior fuerit, cepam in oleum aut mel tinctā apponito. Aut taurinum fel, aut nitrū cum melle. Aut mali punici acidi nucleum, cū melle & ordeacea farina. Si mola ipsa innascitur **Mola quā**
à crassa genitura intus retenta, thymbram tritā in aceto & **fiat, & dis-**
aqua, liquidā bibendā prabeto. Aut hyoscyami semen tritū. **cutiatur.**
& cum muria ac silphij succo & aceto colluito. Aut si opus **Cum ven-**
B fuerit cū aqua. Optimum verò est aquam mulsam infunde- **tosa sit vul-**
re, cum aqua lentiū, aut erui, aut floris violæ. Si verò purga- **ua.**
ta fuerit à talibus quæ sunt velut igne ambusta, myrtum co- **Medela,**
quito ac perluito, & myrrhā ac neropum cū lana apponito. **Cum semē**
Si ventus in vteris fuerit, ac momorderit, & qua trālit dolo- **reiiicit.**
rem facit, & præ ardore intumescit, & dolet, & virū auersa- **Suffimes-**
tur, & coitum valde agrè fert, & tenditur ac intumescit pe- **tum.**
cten, & erigi nō potest, nec dirigi. Quum sic inueneris, scito **reiiicit.**
quod ventus & genitura in vteris est, & propterea nūc agrotet. Accipe itaq; mel, ceram, lini folia trita, & adipē volucri- **Suffimes-**
num, & hæc in vino odorato tepefacta per clysterē in vteros **tum.**
infunde. Apponat autem folia lini. Aut semē lini terito, & in **reiiicit.**
lanam inuoluito, & ad os vteri apponito. Sin minus, efficacio **Suffimes-**
C re vtere. Irinum & crocū, & lini folia, & adipem volucrium **tum.**
terito, & lacte muliebri diluta, rasura de tenuibus linteolis **reiiicit.**
derasa excipito ac illigato, & ad vteri osculum apponito. Et **Suffimes-**
si pinguitudo carnosior enascatur, quod consumat indito, & **tum.**
mediocriter attenuato. Quæ enim valde attenuantur, raræ **reiiicit.**
fiunt & abortiunt. Si verò geniturā nō suscipit vterus, sed di- **Suffimes-**
mitit, & calorem in seipso nō habet instrumentum parare **tum.**
oportet, cui insidens vaporē intra vterū recipiat, ita vt vestes **reiiicit.**
circumcirca ponātur. Suffire autem oportet casiam, cinamō- **Suffimes-**
mum, myrrham, singulis pari portione vino sirao siue sapa **tum.**
subactis, & super prunas cōiectis. Modicè verò lauetur, & mo- **reiiicit.**
dicè cibū sumat. Opitulatur & subdititiū huiusmodi. Myr- **Suffimes-**
rham mollem cum melle efformato. Sit autē ob longa velut **tum.**
glans. & sæpe hæc facito viriū respectu habito. Profunt & pe- **reiiicit.**
lecini

Hippocratis Liber I I.

lecini in frumento nascentes, cū myrrha triti. Mel quoq; co- D
quito, & cum tridis agitatum permisceto, & fabæ Aegyptiæ
magnitudinem apponito. fel item taurinū, & rhoem rubrū
pari portione. Conyza herba est similis apio crispo, nascitur
autem prope mare in locis arenosis, odor verò eius agrè to-
lerari potest. Hæc cum melle & vino apponito. Aut bulbion,
conspicitur autem in tritico, maximè Aegypto, acre simile
cumino Aethiopico: hoc & allium & nitiū simul apponito.

**Capitis do-
lor.**

Verū antea lauetur. Quum mulier caput dolet, & inci-
put ac collum, & vertigo præ oculis obuersatur, & timet, &
tristis fuerit, & vrine nigræ, & similia etiā per vterū prodeūt,
& anxietas ac mœror ipsam tenuerit: atra bilis in vteris in- E
est. Curetur autē sic. Cucumeris syluestris anniculi internā

Medela.

**Dolor vul-
uæ.**

formato, & pharmacū bibendū dato, ac lauato. Quum verò
mulier vteros mordetur, & dolet, lancinaturq; & bilē flauā
mingit, & vterus hiarit, & oculi fuerint velut morbo regio
affectorū: scito quod bilis in vteris est. Quapropter optimū
est expurgare totū corpus, & ipsos vteros subdititiis, quæ bi-

**Vulua fri-
geicens.**

Medela.

**Oris malus
odor.**

lem educunt. Quū verò perfrigeratur vterus, & onus insitū
esse videtur, & color non est clarus, & compactus est vterus.
Quum sic habuerit, purgare oportet cū eo quod pituitā du-
cit, & attenuare, ac frequenter vomere. Quum mulieri male
oluerit ex ore, & gingiua nigræ fuerint ac prauæ, caput lepo-
ris, & mures tres seorsim exure, & ex duobus muribus ven-
trem exime, hepar autē & rhenes nō, & in pila lapidea mar- F
mor, aut lapidē album tere ac cribra, deinde singulorū pares
portiones miscere, ac dētes cōfricare oportet & locos in ore.
& postea lana succidissima fricet, & cum aqua colluat. Tin-
gat autē lanam succidā in melle, & cōfricet dentes ac gingi-
uas, & internas ac externas partes. Terat itē anisum, & ane-
thi semen, & myrrhā pondere duorum obolorū, atq; hæc in
vini albi meraci hemina dimidia diluat, & cum his os col-
luat, & multo tēpore in ore cōtineat. Hoc autem frequenter
faciat, & ieiuna gargarisset, & post cibum. Optimū verò est
modico cibo vti, & optima quoque ingerere oportet. Hoc
pharmacum dētes purgat, & bene olentes facit. Vocatur au-

**Mammæ
asperitas.**

tem Indicum medicamentū. Quum mulieri māmā aspera
facta fuerit, stœbes aut rubi fructū, cum aqua & oleo coqui-
ro, &

A to, & cataplasmate facto mammas integito, & beta folia superponito. Deinde ex linteo velut pileum cōsuito, & magnitudine vt mammā capiat, atq; sic mammam indito. Si verò suppuretur, secato, & ex lana succida linamentū siue penicillum immittito, & eadē superponito. Postea verò ex lēticula cocta cū polenta permixta, cataplasma adhibeto. Si in puerulo. **Ascaridum**
B colluere oportet Ad faciē ornandā. Hepar tauri terito cum oleo: illinito autem cū vino meraco. Fel autē fursures ex-
 terit. Sed & ptisanæ succus similiter illustrat, & ouorū candidum, & farina lupinorū, & erui cum ficis in cataplasmate adhibita. Et brassicæ radix ac semen. Hæc etiam lentigines tollunt. Itēq; alcyonium. Et si puluis faciē laeserit, ceratū liquidum ex rosaceo preparatū sublinito, & aquam frigidā affundito. Et rugas leuigat hoc. In pila lapidea plumbaginē terito, & menstrua ex situ aqua affusa pastillos formato, qui vbi resiccati fuerint, oleo dilutos rugosæ faciei illinito. At si capilli defluant, ladanū cum rosaceo aut anthino vnguento terito, & cum vino illinat. Aut terrā cimoliā cum vino, aut rosaceo, aut omphacino, aut acacia. Si verò calua facta fuerit, cuminum impone, aut stercus columbinū, aut raphanum tritum. Aut cū cepa cōfricet, aut cum beta, aut vrtica. Cate-
 rum solares appellatas maculas tollit, erui decoctum, beta succus, ouorum candidū, ptisana, cucumeris syluestris radix sicca, cum vini fæce trita, ac illita. Aut fici folia adhibita. Itē sesamo trito fricari, aut amygdalis amaris, & vrticæ semen, & allij cortex superligatus, & lepidium. Impetigines omnes extrahit. Acetum, māna thuris, pumex sulphur cum aceto, nasturtium syluestre vstum & in cinerē redactū, viperæ exuium, rumicis syluestris radix. Teratur autem cū aceto vino-
 so. Si verò pustulæ emergant, etiā spuma argēti vtere. Potio ad fluxum rubrum cōmoda. Cornu cerui vstum, ad du-
 plum crudæ ordeacæ farine ammisceto, atq; hæc in vinum pramniū inspersa bibat, & sistitur. Alia. Adianti radicem
 O s tritam,

Ascaridum
 eitatio.

Quæ faciē
 ornent.

Quæ eru-
 gent.

Quæ capil-
 lum flu-
 tem sistant.

Quæ na-
 uos & simi
 liter tol-

Impetigi-
 nes quæ cu-
 rent.

poëula ru-
 bri proflu-

uij.

Hippocratis Liber I I.

tritum, & cicer torrefactū, & lētiū farinā ex melle bibat, aut D
velut potum exhibeto. Aut farina tritici recentis acetabulū,
gummi albi dimidiā, mannae thuris tertiā partem, & iunci
odorati parum. Aut de pinu, vel cupressō aqua dilue, & bi-
bendum præbe. Bibat autē in die. Aut cornu cerui cōburito
ac terito, & crudā ordeaceā farinā cum cedri baccis quinq;
& vinum austerū nigrum cū tēdis ammisceto. Aut mali pu-
nici dulcis assati succum, cum vino nigro bibat. Aut cupressi
baccas tres aut quatuor, & myrti baccas nigras, & simul, &
ipfas per seipsas, ad robur corporis mulieris respectu habito.
Cum vino verò potio fiat. Aut castorij obolum in vino nigro

Potio ad o-
mnia vul-
uarum ma-
la.

Sanguinis
narium se-
datio.

Coagulum
asininum.

Sanguinis
sistentia.

Quæ fluo-
res sistant
& dolores
sedent.

Emplastrum
fomentaq;.

austero terat, ac bibat. Potio ad fluxum, & omnes morbos E
qui ab vteris fiunt. Pæoniæ semē & radices, cum inū Aethio-
picum, & melantium in vino albo exhibeto. Aut ferulae rafa
acetabulum, & porri succū, in vino albo diluto. Hoc etiā ex
naribus manantē sanguinē sistit. Aut malum puniū in vino
nigro coquito, ac decorticato, & interna in vino nigro teri-
to, & cū polentæ farina exhibeto. Aut linum vel erysimū to-
stum, & oleæ folia viridis, & radicē nigrā aspalathi, & peplū
plenum, hæc trita in eodē vino diluto bibēda dato. Aut coa-
gulum asininū & mali punici dulcis radicē, & gallā omnia
æquis portionibus, & mali punici dulcis succum, cū vino bi-
bat. Aut rumicis semē, cū galle parte externa circumrafa. Hæc
simul terito, & postea cyceonē facito ac exhibeto. Si sanguis
largus ex vteris fluat, viticis folia cū vino nigro dato. Acerba
item omnia fluxū sistant, vino nigro ammixto. Ad fluxū & F
dolorem. Cancryos radicē in vino nigro bibat. Si verò am-
plior fuerit, terebinthi fructus tritus prodest. Oportet autem
vino & aqua diluere ac bibere. Si fluxus fiat, caneros fluui-
riles in vino suffocato, & de tali vino cum aqua bibendū da-
to. Si verò adhuc feratur fluxus promalon siue myricā torre-
to, & tritā in vino dato. Aut porri succum. Si verò multus de-
fertur fluxus, muli stercus cōburito, terito & cū vino dato.
Si autē diuturnus fiat fluxus, sponsia cōbusta auxiliatur. Te-
renda est autē spōgia, & cū vino odorato exhibēda. Catapla-
sma ad fluxum. Allium & portulacā, & apium, & loti ac cedri
ramēta trita simul misceto. & cū aqua mulsa diluito, & cata-
plasma facito. Aut rubi, & rhāni, & oleæ folia trita simul mi-
sceto, & in aqua mulsa diluito, & cū polenta in cataplasmate
adhibeto

A adhibeto. Aut sambuci & myrti folia in cataplasmate adhibeto. Aut loti ramēta, & mori folia, ac rosæ folia, cū vua passa ad cataplasma redigito. Fomēta ad fluxus. Loliaceā farinā torrefactā in posca meraciore coquito, & linteo illitā pro fomēto adhibeto. Aut lētes torrefactas ac decorticatas in crassiorē instar alicæ farinā redigito, & in aqua coquito, ac similiter adhibeto. Aut eruum eodē modo. cōmoda est & saluia. Aut paleas ordeī in saluiæ & hyperici decocto coquito, & imposito. Aut loti ramēta & cupressi, in vuc passæ cremore cocta, linteo inducito, ac pro fomento adhibeto. Aut oleæ folia, aut hederæ, aut myrti, in aqua coquito, & cū his etiā ordeī paleas coquito. Aut furfures triticeos in aromatū aqua coquito. Aut furfures triticeos in vuc passæ cremore coquito. Aut violæ albæ semē, vel radices coquito, & ad aquā decocti furfures triticeos iniicito, ac foueto. Aut cū eo decocto furfures triticeos subigat, & panē faciat, eōq; calido lanæ inuoluto foueatur. Aut in serpilli decoctū furfures triticeos iniicito, & eodē modo foueto. Sed & fomentū adhibendū est cū spongiis calidis, & cū mollibus lanis, si dolore vexetur. & cū vasis testaceis aqua infusa, & cū vesicis oleo calido plenis. Collutiones ad fluxus. Myrti folia, & lauri, & hederæ in aqua coquito, & cū hac tepida colluito. Sambuci & lētisci folia in aqua coquito, & cū excolata leuiter tepida colluito. Aut cōnāthen, & cyperū, & vuas passas in aqua mulsæ coquito, ac colluito. Aut cū fœnogræci aqua, aut rubi decocto, aut oleæ viridis, aut cupressi, aut serpilli, aut mali punicæ, aut radices violæ albæ, aut lentisci decocto leuiter tepido colluito. Aut medicamentum ex butyro, & resina, & adipe anserino infundito. Aut id quod ex medulla & adipe suillo præparatur. Suffitus ad fluxus. Ordeum tostū prunis inspersum suffito. Aut cerui cornu cū olis immaturis. Aut rhoē rubrū, & polentā torrefactā, cū oleo & vino duplo. Aut paleas ordeī, & stercus bubulū similiter. Aut loti ramēta, aut rhoem, aut cupressum siccam, cum vino nigro austero suffito. Aut galbanū, aut mannam thuris, aut resinā vino subactam. Aut capræ cornu, & gallam. & sistetur fluxus. Alij suffitus. Effodere oportet scrobem, & vinaceorum vuc duarum chœnicū Atticarum mensurā torrefacere & de cinere in scrobem mittere, & vinum odoratū irrorare. Mulier autē circuminsidēs, ac seipsam cōtegēs ac cōuoluens, suffit

Diuersa fomenta.

Collutiones.

Sicca suffimenta.

Hippocratis Liber I I.

suffitum admittit. Aut sordes pilorum circa sedē capre siccas D
tundito, & torreto, atque cum ordeo fracto, & oleo subactas
suffito prunis insperfas. Aut ordeī paleas iisdē prunis iniici-
to. Aut cupressi ramenta vnguento subacta suffito. Aut cicu-
tā, aut myrrhā, aut thus, vnguento affuso suffito. Aut bitumē
& ordeī paleas similiter. Aut cupressi radicem rosaceo oleo
perfusam suffito. Aut ad calamū, iuncum odoratū, cyperum,
apij semen, anisum, oleo rosaceo affuso suffito. Similiter autē
& resinā, prunis iniicito. Et cinamonū, & myrrhā, cum rubi
foliis, aut rosarū foliis aut mēta, addito modico croco & sty-
race. Hæc omnia simul terito ac suffito, oboli Attici pōdere,
in cinere sarmentorū vitis, aut in stercore bubulo instar ace-
tabuli formato. Sit autē ignis ex sarmentis vitis. Mulierē ve E
rō imposito prius, vt ne odorē percipiat. Nā si odorem sensce-
rit, melius est non suffire. Subdititia ad rubrū fluxum, Myr-
rha & bulbion cū melle tritū optimū præstant subdititium.
Aut rosæ in aqua coctæ, quas sanē cum rosaceo vnguento tri-
tas, ac lanæ inuolutas apponito. Aut loti florē in aqua coqui-
to, & deinde cum rosaceo vnguento terito, & in lana ad vteri
os adhibeto. Aut cyperū, & irim, & anisum, singula pari por-
tione, cū rosaceo vnguento trita, intro in vteri osculū detru-
dito. Aut myrti nigræ folia in vino albo terito, & pini corti-
cem ammisceto, & similiter facito. Aut cupressi fructum, &
thus, pari portione simul ambo in vnguento terito, & apponi-
to. Si resiccare fluxū opus fuerit, calaminthā in vino nigro co-
quito, & linteo inuolutā apponito. Aut hyoscyami folia, & ci F
cutā simul coquito: Similiter porrū, & maluā: & cerā ac anse-
ris adipē ammisceto. Deinde repida ad pudenda subdito. Aut
vinū meracū, cum resina & malicorio cocto terito, ac simili-
ter apponito. Aut enicum cū vino tritū subdito. Aut loti ra-
menta similiter. Aut lentisci folia. Aut rhoē melle cocto am-
mixto apponito. Si verò nō cesset, Sulinū, aut blitum herbā,
quæ velut lingua est, in lana ad subdititium efformato. Ad
fluxum aquæ subdititium & infusile. Si mulieri aqua fluat ex
pudendis, resinā siccam, & myricæ folia, & lini semen, in vino
terito, & volucrinū adipē ammisceto, & per clysterē in pudē-
da infundito. Aut farinæ purissimæ chemā, siue conchæ te-
stam cauiorē, aut amyliū in lana ad vteri stomachū apponat.
Alud similiter infusile. Quum aqua ex pudendo fluxerit,
myricæ

**Fluorem
quæ siccēt.**

**Flueris a-
quosā me-
delæ.**

- A myricæ folia, & thus, & resinā, cum anserino adipe terito, & per clysterē in pudenda infundito. Si pecten præ fluxu aquo- Pecten si
 so doleat, viticis semen cum melle terito, & in cataplasmate doleat.
 pectini probè adhibeto. Si fluxus sanguinolētus, aut albus,
 aut qualiscunq; fuerit, Sulphur & mādragorā in vino mera-
 co terito, & lana excepta apponito. Et supina dormiat, & in-
 mota maneat. Aut malicoriū siccū in vino pramnio terito, ac
 bibendum dato. Ad fluxū albū potus. Hederae albæ semen, Si albus
 & pini corticē, in vino austero exhibeto, Aut cornu cerui vsti fluor de-
 partē vnā, crudæ ordeaceæ farinae partes duas, & cedri bac- fluat.
 cas quinque, aqua terat ac bibat. Quū ab vteris strāgulatur,
 castoriū & conyzā in vino, & seorsum, & simul vtrāq; bibat.
- B Aut bituminis obolos tres. Aut phocæ adipis quantū duobus Vulue strā
 digitis apprehendi potest. Aut radicis præonię dimidiā potio- gulationis.
 nem, in vino odorato bibendam dato. Quū verò vteri suffo-
 carint, & simul tussierit, sandaraches obolū, & sulphuris viui
 tātundē, & amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor,
 misceto & in vino odorato exhibeto. Si verò adhæserint vte-
 ri, ordeū terito, & vnā cū paleis, & cornu cerui, oleo subigito,
 & suffito. Quū autē sursum ascēderint, & cor ac stomachus
 prematur, & substiterint, myrrhā aut resinā, aut netopū, aut
 castoriū, aut silphij succū bibendū dato. Quum vterus stran Vulue strā
 gularit, spiritus autem aceruatim sursum cōmotus fuerit, & gulationis
 grauitas incubuerit, & mens perculsa fuerit, & loqui non po- vexatio.
 tuerit, & perfrigeratio adest, ac spiritus offendens, & oculi Medela.
 obscurantur; caput quā citissimē radito, & per fasciā supra
 vmbilicū, si opus fuerit, deligatā detrudito. Dato autē casto-
 rium, & conyzā, & rutæ aquā, cum inū Aethiopicū, raphani se-
 men, sulphur, myrrhā. Ad nares graueolentia, ad vteros bene-
 olentia adhibeto. Si verò sustinuerit, etiā grani cnidij inter-
 nam partē, albā illā, melle subactā ac mixtā, naribus illinito.
 Aut schinū scillæ speciē quæ mordeat. Quū autem dolor ha-
 buerit ac suffocatur, malue radicē, aut acetū mulsū, aut fœ-
 nicali corticē, aut crethmū in aqua bibendū dato. Optimum
 verò est eructare, & sedentē collocare, & sternutationē face-
 re, aut veratrū naribus admouere. Si verò sub septo trāsuer- Quū vteri
 so ac præcordiis vteri sedere videantur, derepente voce desti superiora
 tuitur, & præcordia dura fiunt, & strangulatur, & dentes con petunt.
 serit, & vocata nō audit. Oporter igitur sub nares suffiri lanā Medela.
 accen

Hippocratis Liber II.

accensam, bitumen in ignem coniectum, & castorium, & sulphur, & picē. Inguina verò & femora vngueto odoratissimo intus inungere. Aut stellas marinas nigras, & brassicam vino odorato misceat, ac bibat. Aut myrrhæ obolos tres, coriandri parū, resinā, præniæ radicē, cuminū Aethiopicū, hæc in vino albo & aqua trita, aut cum aqua mulsa diluta, leuiter tepida bibat. Auxiliatur & peucedanū, aristolochia, cepæ lachryma, panaces in vino aut aqua leuiter tepida datū. Vteros ad locum suū reducit, crotonis radix pota, aut cuminū Aethiopicum, aut apiū, aut fœniculi & anisi semen, aut piper, aut myrrha, & papaueris succus potus. Si cor strangulatur, ab vtero reprimitur, & spiritus habet, & anhelatio: Viticis, & præniæ semen in vino bibere oportet. Aut abrotonum, & panaces, & ammoniacum. Aut rutā, aut somnificū papaueris succū. Rursum igitur si similiter habet, melanthiū terito, & melle subigito, & velut glandulā efformato, ac pennæ circūdato, & apponito. Aut philistion similiter subdito. Aut telephiū, aut anemones folia trita, in linteam indito, & modica myrrha ammixta apponito. Si in lumbos vteri incubuerint, suffocatio verò caput nō cōtigerit, polypos coctos edat, & vinū nigrum odoratū meracum quā plurimū bibat. Quū verò velut ad viscera cōuerſi strāgularint, vinū cedrinū, & vinū Aethiopicū bibat, & calida lauetur, & odoratis fomētis vtatur. Si ventoinflati fuerint vteri, aromata omnia in vnguentū immittuntur, & laurus, & myrtus, & saluia, & cedri ac cupressi ramenta. Hæc contundito, & trita cribrato, & in vinum odoratum inspergito, & oleum rosaceū superfundito. Quum verò transmoventur. transmoti vteri presserint, ordeū vnā cum paleis, & myricā, & cerui cornu, vino subigito, ac suffito. Quū assistētes strangularint, funiculum lucernariū accendito, & præ naribus extinguito, quo fuligo & nidor ipsas ingrediatur, & picē, & castorium, & peucedanū, & myrrhā, vnguento irino diluito, & subacta apponat. Bibat autē resinam oleo dilutam. Si valde strangularint, Aut testudinis iuxta mare natæ obolos tres, in vini albi hemina, vel cyathis tribus tritos, bibēdos dato. Aut cedro in lucernā infuso, lucernā accēdito. & vbi extincta fuerit, ad nares adhibeto. Aut cœnū fœtidissimū similiter. Aut lanā incēsam sub nares mulieris suffito. Aut bituminis parū tritū in vino albo bibat. Aut erysimi cōchæ testā, & castoriū in vino

Cum cor
vulua ve-
xatur.

Cum lum-
bi vexan-
tur.
Si intesti-
na mole-
stant.

Cum infla-
ti sunt.

Cum tran-
smouentur.
Cum stran-
gulant.

Medela va-
ria.

- A** in vino albo bibenda dato, & lauato. Si verò etiā tussiat, sandarachæ obolū, sulphuris viui obolos duos, amygdalas amaras depurgatas tres aut quatuor, & castorij obolū, cū vino odorato misceto, & bibenda dato. Si verò strāgularint vteri, & strāgulatio cor cōtigerit, & os cōclusum fuerit, acetū calidū sorbendū dato, & os paxillo aut radio aperito, & vinū in odorū similiter exhibeto, & cū aceto mulso. Si verò valde strāgularint, & voce destituta fuerit, cepā in vino tepido tritā, in nares instillato & excitato. Si verò vsq; ad hepar ascēderint, & suffocatur, voce destituitur, & nihil videt, & dentes cōferit, & dura fit, & nihil sentit, & frequēter respirat, & non audit. Hāc sub præcordiis manibus cōprehensam frequenter
- B** inungito. Et dētibus cū paxillo diductis. vinū meracū tepidū infundito, si nihil prohibuerit. Et plerunq; statim melius habet. Si ad inguina incūbant ac innitantur, caprini stercoris pilulas, & leporis pilos phocæ adipe subigito ac suffito. Aut hederæ fructum, aut folia, aut corticē siccato, & quercus folia ac resinā ammisceto, oleoq; subigito ac suffito. Aut coaguli phocæ pellē cōterito, & spongiā ac muscū, cum phocæ adipe ammisceto ac suffito. Aut stercoris caprini pilulas, & phocæ pulmonē, ac cedri ramenta suffito. Sed & bubulū stercus suffito. Aut cornuū bouis ramenta, & bitumē. Aut spinæ Aegyptiæ fructū, & cedri ramenta, & myrti folia sicca. Hæc molli vnguento subacta suffito. Multa vero aronata in vnguentū iniicito. Aut vinacea tusa trita, & cedri baccas, & resinam pineā, simul mixta & passo cocto subacta suffito. Fomenta aut quibus discedūt. Stercus bubulum contusum, aceti dimidia mēsurā, & decocti erui ex aqua marina aut dulci similiter dimidia adiecta, pro fomēto adhibeto, foueto autem leuiter & lenticulæ decoctū bibendū dato, ac reuomendū. Et farinā sorbendā, & insuper vinū. Postridie verò granū cnidiū dato. Sed & quod vrinā ciet. Ciceris partes duas tritas, vix passæ optimæ tertiā partē, affuso aquæ cōgio coquito, deinde excolatā aquā per noctē sub dio exponito, & postridie bibendā dato. & de cætero saluiā & linisemē, & polētā, bis per diem in vini diluti heminis quatuor dato. Aut olei heminas dimidias tres foliorū sambuci manus plenę mēsurā, hæc coquito, & cū calidis foueto, aut testis calidis immisis fomentū facito, muliere in sella collocata, & vestimentis cooperta. Aut sambuci

Strangulatio vuluæ

Medela.

Diuersa fomenta.

folia

folia cū myrto coquito, & in excolata aqua paleas ordeī co-
quito, & fomētum facito, si calorē sufferre poterit. Aut acetū,
oleum, mel, aquā. Hæc permixta ac valde seruefacta, in vei-
cū infundito. Aut pini corticē, & rhois folia in aquā iniicito,
& fortiter coquito, & in excolatā aquā etiā ordeī paleas im-
mittito ac coquito, & affuso oleo foueto. Aut loti & cupressi
ramēta, aqua & oleo affuso, probē coquito, ac foueto. Aut cū
aromatis vnguentū infundito, & gallam iniicito, & rhamni

Quum vte
ri proci-
dunt.

Lenimēta
varia.

corticem, & polentā triticeā cum aqua. Si vero vteri extra
prominuerint, & dependēt velut serotū: myrti baccas, loti ra-
menta, rubi & oleæ folia, simul coquito, & leuiter tepidē fo-
ueto. Aut cū vino vnā cum illis & cū graueolentib. similiter.
Externas autem partes cum oui candido oblinito. Cū verò
pe. frigerātur, & liuidæ factæ fuerint, cum aqua calida. Mol-
litoria vteri. Adipēs ouil. ouorum vitellum, mel, oleum rosa-
ceum sumito, & cū his farinā subigito, & ad lentū ignē tepe
facito, & quod destillat lana exceptum emollito ac apponito.
Aut adipem ouil. aromatis cōditum & nitrum rubrū, anseris
adipem, & oleum rosac. colliquata & lana excepta apponat.
Aut Anseris adipē, ouillum adipē, cerā albam, netopum, rosa-
ceū oleū. Hæc quā optimē permisceto, & tenuibus linteis
excipito, & statim vbi lota est, apponat tepida osculo vtero-
rum. Aut cerui medullā, & anseris adipem, in rosaceo oleo li-
quefaciat, & molli lana excepta subdat. Molliā subdititia,
quæ aquam ducunt, & mucos, & pelliculas, & non exulcerāt.
Myrrhā quā optimā, & salis granū, & picē aromatis imbu-
tam, terito & apponito. Aliud. Grana cnidia decorticata tri-
ginta. Indicum quod Persæ piper vocāt, & in hoc inest rotun-
dum, quod appellant myrtidanum, cū lacte muliebri simul
terito, & melle diluito. Deinde lana molli ac pura excepta, &
pennæ obuoluta subdito, & per diē finito. Si verò fortius fa-
cere viles modicū myrrhæ ammisceto, tertiā videlicet par-
tem siue trientē: & lanā mollē purā semisuccidā. Ex vteris
elucūt, & osculū molliūt, narcissus, cuminum, myrrha, thus,
absinthiū, cyperis. Hæc ipsa per se ipsa, & cū oleo rosaceo, aut
albo, aut Aegyptio. Apponātur autē vbi lota est. Aliud quod
sanem cruentā educere potest. Cum tædis misceto myrrhā,
salein, fel taurinum, cuminum, mel, & in lana subdito. Aut
cumini folia similiter in vino trita. Aut sulphij succū ad ficū
ammi

Dammisceto, & glandulā inde factam subdito. Idē facit & mori radix cū melle. & postea rosaceo illinito. Efficax est & allij caput integrū, & nitrum rubrū, & ficus pinguis, pari portione. misceto autē & gallā parvā, & glandē facito, eāmq; liquore aliquo tinctam subdito. Et postea lota cerui adipē in lana subditum habeat. Aliud quod cruenta omnia magis prioribus ducere potest, & mollire. Piper, elateriū, & lac muliebre misceto, & cū his terito etiā mel, & oleum albū, & cerui adipem, & linteo excepta subdat. Vehemēter verò ducit omni-gena hoc. sici pingue, elaterij portiones duas, nitrum rubrum quātum elaterij, mellis parum, cū linteo aut cū lana glādem facito. Aliud. Netopum, fel tauri, nitrum, cyclaminum, gal-lam, cum melle terat. Postea verò lota adipem cerui subditū habeat. aut pulegium & fel tauri tritum pēnæ obducit, & in oleum Aegyptium tinctum subdat. Aut cyclaminum magnitudine tali cum aris flore. Aut anemones caput cum farina tritum pennæ obducito, & in oleo albo tingito. Aliud quod omnia ducit. Cucumeris sylvestris oblongi internā partem, exempto semine, cū lacte terito, & myrrham purā vna cū ip-sis, adiectoq; modico melle, & oleo Aegyptio, molli lana excipito. Aut cucumeris sylvestris internā partē siccato, & melle affuso terito, ac glādem formato. Postquā autē lota fuerit, adipem subdat. Aut elaterij portiones tres cum aqua. Mollito-
ria. Ovi candidum, farinam, mel, ceram albā. hęc simul tepe-
Facito, & quod destillat lana exceptum apponito. Aut adipem anseris, cerā albam, resinā, vnguentum rosaceum, cerui medul-lā liquefacito. Aut ouillū vel caprinū adipē, ovi candidū, vnguentum rosaceū. Ex his aut glādem facito, aut lana excipito.

Fomenta per quæ vteri purgantur, si duri fuerint. Vinum suauissimū pari aqua tēperare oportet, triū semicongiorum Atticorū mensura & fœniculi radices ac seminis eiusdē quadrantē, & olei rosacei heminā dimidiam, in ollā mittere, cuius operculū foramē habet, & vinum superfundere, & arundine indita fomentum facere, & postea scillam apponere. Si dolores repētini irruerint, & animi deliquia affuerint. Rosarum folia, cinamomū, myrrhā purā, netopū, papaueris succū, hęc in pastillos drachmales efformato, & sup frusto amphoræ cādenti ponito, & pro suffimento vtitor. Aut styracis modicū in oleum mittito, ac vtitor velut priore. Omnia quæ in

P

vnguen

Hippocratis Liber I I.

vnguenta iniiciuntur tundito ac cribrato, & super stercus bu-
 bulum mittito, itémq; styracē, & netopum, rosaceum oleum
 quàm optimū, & Aegyptiū albū affundito, & post purgatio-
 nes suffito. Aut lauri & myrti folia tundito, & cyperi fructū,
 cū vnguento albo Aegyptio subigito, addito etiam netopo, &
 super stercore bubulo suffito. Auxiliatur & manna thuris, &
 cupressi ramenta, & cyperi radix tusa. Sed & iuncū odoratū
 aromaticum, & cardamomum, & iridē tundito ac cribrato,
 atq; hæc omnia misceto, & rosaceū oleum ac netopum ipsis
 affundito, & vtor in crassiore tritici farina. Aut resinam in
 recens formato fictili suffito, castorio, aut aliquo ex aromatis
 adiecto. Caput verò oleo rosaceo tingito, in aures autem
 myrteum, aut melinū oleum infundito. Et cicer albū, & vuas
 passas coquito, ac decoctū bibendum dato, & in aqua calida
 desideat. Et oliuas albas priusquā oleum remittūt lancinato
 ac siccato, & in vino odorato terito, & acetabulum Atticum
 præbeto. Aut cātharidum ventres, aut adiantum, & nitrū ru-
 brum Aegyptium, & ferulæ radicem, & apij semen tritū, hæc
 exhibeto. Si verò vrinæ stillicidium corripiat, in aqua desi-
 deat, & vinū dulce bibat. Si maximè strangulatur in vterorū
 dolore, vinū suauissimū pari aqua tēperatū, trium semicon-
 giorum Atticorū mēsurā, & fœniculi radices, & seminis eius-
 dem trientem, & olei rosacei heminā dimidiā. Hæc in nouā
 ollā mittito, & vino superfuso foueto. Et scillam apponat, do-
 nec osculū molle & amplū esse dixerit, & si exulceratum fue-
 rit, ac pustulæ ubiq; in ipsis fuerint, præstat adipe anserino cū
 thure curare. Ad vterorum dolorem. Peucedanum, aristo-
 lochiā, panaces, hæc simul in vino dulci misceto, & tepesacta
 bibenda dato. Et peplum albū sorbeat, & vrticæ semē. Aliud
 fomentum siue suffimentum. Si dolor habuerit, malicorium
 punici dulcis, loti ramēta, oleæ folia sicca tusa. Hæc cum oleo
 subigere oportet, & super ignitū stercus bubulū mittere. Aut
 galbanum, myrrhā, thus, oleum album Aegyptium, super vi-
 tis sarmēta. Aliud fomentum fortius ex bitumine. Bitumē,
 radicem xanthij, pilos leporis, rutā, coriādrum siccum, hæc o-
 mnia terito, & formatas inde placētulas siue pastillos suffito.
 Aut ad picē, & sandarachā tusalā tritā, cupressi ramenta am-
 misceto, & vnguento affuso placētulas formato, & in ignē
 missas suffito. Aut cornu capræ in ramenta cōsectū oleo sub-
 igito,

Stranguriæ
 medela.

vterorū do-
 lor quī se-
 detur,

A igitō, & in ignem missum suffito. Aut effossa scrobe, vinacea vix torreto, & cinerem in scrobem mittito, & vino odorato insperso, mulieri circūinsidenti fomētum facito. Sint autem vinaceorum chœnices duæ, atq; hæc ipsa quàm maximè sicca. Si verò vterus doleat vsq; ad velicam, porri semen cū aqua tritum bibat. Aut cyclamini radicem, in vino albo ieiunæ bibēdam dato, & calida lauetur, & subcalidam ieiuna bibat, & tepefactoria apponat. Aut allij caput integrum, & nitrum tostum, & cuminum, trita ac melle subacta apponito, & calida lauetur, & subcalidā bibat. Ad omnē vterorū morbum curandum. Lini scissi vnā cum stipula pugillum tenuiter tusum, in vino albo quàm suauissimo per noctem madefacito, deinde excolatum in ollula tepefacito, & in eo lanam

Morbi cuiusque vterorum sedatio.

B mollissimā tinctā apponito, & vicissim priore detracta alia subdito. Opitulatur autem & crocus, & myrrha, & ponticæ nuces, alba & pura lana excepta, & cū adipe anserino ac vnguento irino apposita. Si dolor vexarit ex subdititiis purgatam, myrrhæ acetabulum, thuris tantundē, melanthium, cyperum, seseli, anisum, apij semen, netopum, mel, resinam, adipem anserinū, oui candidum, vnguētum Aegyptium, singula paribus portionibus in vino albo dulci, duarum heminarum mensura terito, & tepidis infusis colluito. Si dolor vehemens habuerit, cantharides, cyperus, calamus, iuncus odoratus, & iris profunt. Hæc in vino nigro coquito, ac vtitor.

Doloris sedatio.

Alia collutio. Si dolor & vrinæ stillicidium vexarit, porri succū, sambuci fructū, seselli, anisum, thus, myrrhā, vinum, in succū redigito, misceto, ac infundito. Aut myrrhæ acetabulū, thuris tantundē, melanthij & cyperi tātundē, seseli, anisum, apij semen, netopū, mel, resinā, anseris adipem, oui candidū, vnguentū Aegyptiū, singula paribus portionibus in vino albo dulci diluito, ac infundito. Aut mercurialis aquā decoctā cum myrrha, thure, netopo. Aut saluiā, & hypericū, in aqua coquito ac infundito. Aut apij semen, anisum, melanthium, seseli, myrrham, casix fructum, in vino coquito ac colluito.

Collutiones variae.

Alia collutio. Si dolor fuerit vehemens post purgationem. Sambuci fructum, & lauri baccas, in vino nigro coquito ac colluito. Aut sambucū in aqua coquito, & aquā excolaro, & vino dulci affuso colluito. Si post collutionem infusam dolor oboriatur, aromata quæ in vnguēta iniiciuntur coqui-

P 2 to,

Doloris &
vicerū vte-
rorum me-
dela.

Stranguria
Vetus Vte-
ri.

columella
vulvæ.

Tussis pue-
ri quā dis-
curiatur.
Venter quā
moueatur.

ro, & de aqua duas heminas excolato, misceto autē adipē an- D
seris, & oleum rosaceū, & tepida infundito. Amplius autē in-
fusum nulli, vt semel dicā, cōpetit quā duarū heminarū. Aut
mercurialē in aqua coquito, ad succū, myrrhā ammisceto,
aut thus, & netopū pari mensura, & tepidū infundito. Si ve-
rò vteros doleat cyclamini radicē in vino albo ieiunā biben-
dam dato. Et calida lauetur, & subcalidam bibat, Si ex ferui-
do & superficiali vlcere pudenda fuerint exulcerata, myr-
ri baccis in vino coctis colluat, & melilorū apponat, Et mali
punici dulcis putamina in vino coquito, & myrrhā ac resinā
simul mixta vino diluito, & intinctū in his linteum subdito.
Et si vrinę stillicidiū corripiat, fomentū adhibeto, & pectinē
illinito. Desideat autē in decocto rosarū, aut rubi, aut myrti, E
aut oleæ, aut pampinorū vitis, aut iuniperorū baccarum, aut
saluæ. Si ventus in vtero obortus fuerit, & dolor vehemens,
& flatus nō exit, cuminū apponat. Et saluiam ac cyperū tula
mafacito per noctē, & mane excolato, & lucidū ac clarum
cremorē in vas infundito, & crassiorē tritici farinā cū vino
albo ammisceto, & silphij succū magnitudine fabæ, cum fa-
rina coquito, & crudius sorbenda dato. Si columella in pu-
dendis nascatur, dolor obtinet. Et doloris quidē medela est
apij semen. Columellam verò resicare oportet. Si vlcera
in pudendis oboriantur, & pruritus corripiat, oleæ folia, &
hederæ, & rubi, & mali punici dulcistrata, & vino veteri di-
luta, cum recenti carne apponito, ita vt folia carni oblinas. F
Et habeat subditam per totam noctem. Mane verò eximens
& myrtum in vino coquens, cum vino pudenda colluat.

Notha ad finem primi libri De morbis muliebribus adiecta.

Ad tussim pueri. Thapsiam in polenta edendā dato. Aliud.
Ex ouo aſſato vitellū acceptū terito, & sesamū albū tostū.
& ſalem, cū melle delingenda dato. Ad aluū pueri soluēdam.
Lanam illotā melle tinctā indito. Si verò antiquior fuerit
puer, ceparum internas partes tritas cum melle indito. Si lac
nō fuerit. Recentis tritici farinam elorā, melle ac oleo am-
mixto, tepidam sorbendam dato. Ad anhelitum pueri facit.
Thus in vino dulci, & illuies. Purgatorium. Glādulas fa-
cito ex mellis hemina, anisi acetabulo, bituminis drachmis
duabus, felle bouis, myrrhę drachmistibus, elaterij portione
Hæc

- A** Hæc in vase æneo coquito, & anseris adipē ammisceto, & vbi vti voles, glādulis anserino aut ouillo adipe illinito, lana autem vtere molli. Vomitus soluit. Ocymi succus in vino albo. Aliud, Farinæ tritici recentis exsuccaræ aqua. Aut de malis puniceis dulcibus & acidis succū exprimito, & deinde mel ammisceto. Corrosiuum sic paratur. Veratrum nigrum, sandaracham, squamā aris, singula paribus portionibus seorsim terito. Quum autē trita fuerint, ad vnā partē, duplā calcem ammisceto, & cedrinę subacta illinito. Aliud corrosiuū pharmacum sic paratur. Florem eris purē cōbustum donec ruber fiat, terito ac vitor. Pharmacū nigrum. Squamam aris, & florem aris, seorsim ambo terito. Vbi verò cōtriueris, ita misceto. Duas aut tres pharmaci species facito. Vnam fortissimam quæ habet ad squamā, tertiā floris partē. Alterā, quæ quartā. Tertiā, quæ quintam. Hoc pharmacū ad omnia cōueniēs est.
- Illitio ad anginam. Roris marini semen, staphis syluestris, absinthium, elaterium, mel. In doloribus podagricis. Abscessus nitro trito aqua diluto, cataplasmatibus modo integito, & tribus diebus non lauato. Vbi verò laueris, rursus nitrum rubrū crudū cum modico melle terito, & hoc semper vitor.
- Inflammata illine portulaca cum farinæ massa, & lactuce rubræ drachma, ex aqua dissoluta. Medicamenta oculatoria. Aes vstum, ærugo, fel capræ, mirra, hæc dissoluuntur, & omnia simul trita vino albo diluuntur, postea in arundinem coniecta, sicca in vsum veniant. Puluillus. Misy præparatum in pila terito, & spumæ argenti chrysididis appellatæ cinerē lotū ammisceto, Sint autē cineris, partes tres, misyos vna. At misy in maza cōburito vitans ne diffuat. Nam dum torretur liquefit, vbi verò probè tostum fuerit, puniceū sit.
- Alius puluillus. Cerusa eodem modo cum misy tosto miscetur, velut chrysididis cinis. Alius puluillus fortior prior. Spodium cyprium ex fuligine lota, & cerusa, & misy torrefactum. Sunt autem duæ partes cerusæ de spodio, vna verò misyos. In hæc anemonæ folia contusa exprimito, & in æris rubri vase ad solem exponito, & vt nihil illabatur contegito. Quū verò crassa facta fuerint, pastillos formato, deinde siccatos, & siccatos quàm maximè fieri potest cōburito, & postea perfrigeratos leuiter terito, & de spodio ex fuligine loto parē portionem misceto, deinde netopon instillato, & parum
- P 3
- terito,

Vomitionis
remedium.Anginæ &
Podagræ
medela.Inflamma-
ta.

Notha

terito, deinde melle diluito, & reficcata in vase aereo asserua- D
to, ac vtitor. Puluillus mollis. Spodium cyprium, chalcitis nō
lota leuiter trita, flos æris. Hæc paribus portionibus misceto
ac terito. Alius. Spodium cyprium, chalcitis leuiter trita, &
cinis chrysitidis illotus. Hæc inter se terito. Alius. Spodium
lotū, chrysitidis, & æris flos, paribus partibus trita. Alius. Vuæ
acerbæ succus, & spodiū cyprium. Vuam immaturā in vigo-
re cōstitutā fume, & succū per linteū, in vas æris rubri expri-
me, & aceti albi acerrimi tertiā partē ammisce, atq; sic in so-
le coque, & quinquies in die agita ac cōturba. Et vbi crassus
factus fuerit succus, spodium cyprium tritū adice ac permi-
sce, ita vt vbi sex aut septē dies in sole positus steterit, ad he-
minā succi Atticā, spodij drach. octo immittas. Si verò acrius E
efficere medicamentum voles, minus de spodio: sin mollius,
plus. Postea verò siccato hæc, donec in pastillos formari pos-
sunt. Deinde domi siccato, rursus in fumū suspensa, atq; hoc
tandiu, donec testacea fiant, vt inter terendum nō adhæreāt,
postea sic vttere. Reponito autē in loco humiditatē nullā ha-
bente. Alius. Spodium, chalcitidē, aceto albo subigito, dein-
de factos inde pastillos siccato, & vbi oculum sublinire vo-
les, quā optimè terito, & vino veteri dulci cōcalefacito. Ad
argemon oculi vlcus. Populi nigræ lachrymā, lac muliebre,
misce ac vttere. Si oculus lachrymetur, & dolor vexet. Mali
punici dulcis succum expressum in aereo vase coquito, vt ni-
ger fiat instar picis. Si verò æstas fuerit, ad solē exponito, de-
inde liquidū sublinito. Si verò dulci lachryma fluat oculus,
quum vuæ fuerit alba, valde matura, & gracilis in vite, decer F
ptam exprimito ac excolato, deinde in sole siccato, & vbi fic-
cus factus fuerit succus deradito, & æruginis dimidiū obolū
attici ponderis ammisce. Deinde hoc sublinito. Puluillus
inspersilis. Plumbum & spodiū, æquis partibus, myrrhæ deci-
mam partē, succi papaueris parum, vinū vetus, arida tere ac
vttere. Alius. Accipitur scoria siue recrementum plumbi, &
spodij tertia pars, & cerusæ tertia, & chartæ vstæ tertia, &
myrrhæ pars decima. Si pilos ex corpore extirpare voles, vi-
tis lachrymā cū oleo illinito. Si verò etiā circa oculū tollere
velis, euellito & illinito, & cū tenui cuticula discedet. & locus
rubicūdus ac boni coloris erit. Ad intestinorū leuitatē. Len-
tes ac triticū recens duarū choenicū mensura aqua macera-
to,

Lachryma
tio.

Deglabra-
tio.

Lienteria.

A to, & vbi mollia facta fuerint, in pila aut mortario fortiter cōterito, deinde aquæ heminis sex affundito, ac fortiter commoueto, & vbi purgamenta discesserint, in ollâ infundito, & modico melle affusō coquito, & valde cocta torrefacito, ac edēda præbeto. Si verò sitierit, vinū vetustissimū bibat, atque hoc vtatur donec sanus fiat. Ad grauedinē. Si quis grauedinē habeat, myrrhā tritā ammixto melle: linteo excipiat, & nares cōfricet. Infusum sedis pituitā ducēs. Thapsiæ potionē, & vuas passas quadraginta: aut grani cnidij, aut cnestri potionē sumito, & mellis dimidiā heminā, ac olei tātundē ammisceto, & aqua marina diluito, in aqua furfures cocti sunt, aut ptisana donec pinguis facta fuerit. Aut adipē betæ succo ammisceto, & nitri drach. decē. Aut salis heminā plenā aquæ marinæ ammisceto. Si verò bilē deducere voles, succi sulphij potionē, elaterij drach. vnā & dimidiā, colocynthidis drach. terito & iisdem quibus prius diluito. Si autem vehemētius ducere velis, cucumeris syluestris internā partem quarta drach. parte in dimidia aquæ hemina macerato, & per sedē infundito, & si in egressu mordeat, ptisanæ succum postea infundito. Aliud. In lacte asinino cocto, aut in betæ succi heminis tribus, internā cucumeris syluestris partē macerato, & salē, mel ac oleū ammisceto, & postea ptisanæ succū infundito. Aliud. Colocynthidis drach. terito, & in lacte asinino macerato, eadēmq; misceto. Aliud. Cucumeris syluestris interioris drach. elaterij potionem, salis quantum tribus digitis apprehendi potest, mel, oleum, aqua marina diluito. At si stercus educere voles, nullum pharmacum bibito, sed aliis vtare. Infusum ad dysenterīā. Punici dulcis malicoriū in vino ad dimidias coquito, & olei, quartā heminæ partem ammisceto, & thuris quartā drach. partem. Aliud. Vnguēti rosacei dimidia hemina. ptisanæ succus, aqua marina cocta. Aliud. Veratri potiones duas tritas, in aquæ dimidia hemina diluito, & olei tantundē affundito. Potio. Mala cotonea dissecato, & in aqua macerato, & vbi aqua odorē acceperit, bibēdam dato. Alia. Ptisanæ farinā in congiū aquæ missam, coquito donec pinguis fiat. Alia. Mala cōcisa siccata, & fauū mellis, in aqua macerato, ac simul terito, & vbi subdulcis facta fuerit excolato, & apij folia iniicito. Alia. Vuā passā albā, & calaminthē, & fauū mellis, in aquam mittito ac terito, donec aqua subdulcis fiat.


HIP.

Grauedo.

Pituitę eductio.

Bilis educio.

Dysenteria.



AHIPPOCRATIS

COI LIBER DE STE-

RILIBVS, IANO COR-

NARIO MEDICO

PHYSICO IN-

TERPRETE.

301

B



E his quidem quæ accidunt mulieribus in singulis affectionibus, prius dictum est. Nunc autem ostendam ob quas causas mulieres omnino steriles fiunt, & cur non pariunt an tequam sanentur. Causam verò hanc esse di-

Cur quædã non ferunt cõceptum.

co: si os vterorum omnino auersum fuerit à pudendo, non concipiunt. Non enim suscipiunt vteri genitu ram, sed statim foras exit. contigit autem hoc etiam si parum distortum fuerit os vterorum præter naturam à pudendo.

Et si omnino conclusum fuerit os vterorum, neque sic susci piunt. Neque si recens conclusum fuerit magis quàm oportet. Singula verò relata manifesta sunt. Etenim si omnino, auersum fuerit, aut conclusum, menses nõ prodeunt omni-

Cur quædã non cõcipiant.

C

no, aut prodeunt violenter cum morbo, si sanguis coëgerit vteros pro more conuerti. Et si purgata fuerit mulier, ali quando os vterorum ipsi à pudendo auertitur. Si verò parum distortum, aut recens cõclusum fuerit, prodeunt quidẽ men ses, prodeunt autem violenter, & paulatim per multos dies.

Hæc autem omnia manifesta fiunt, si sic habent, contingen ti mulieri. & si horum aliquid fuerit, curata mulier fœcunda fit. Quandoq; verò etiam sua sponte. Hæc autem singula cur fiant, dicetur. Dictum autem est & in muliebribus morbis.

Si leues fuerint vteri. Cõtingit autem hoc & ex natura qui busdam, & si vlcera innata magnas cicatrices reliquerint. Si leues igitur vteri fuerint, mulier in ventre non concipit. Nã genituram suscipiunt quidem vteri, si non alia aliqua causa obstiterit, non autem concipiunt, sed semen foras emittunt.

Hoc autem maximè clarum fit contingenti, & si interroge tur an aliquãdo vlcera in vteros ipsi oborta fuerint. Menses verò sano quidem modo prodeunt in hoc morbo. Verum ta-

Q

lis

Cur vlcus vuluarum cito curandum fit. D
 lis plerunque incurabilis est. & hæc causa est, vt in ventre ne concipiat. Si vlcus in vteris factum fuerit ab affectione quadam ex relatis, & non statim sanatum, sed impurum factum fuerit, permanet vlcus ad multum tempus, quemadmodum & id quod in aure existit. & malè olet mulier, & quandoque sanies malè olens ipsi ex pudendo fuit, & quandiu sanè vlcus habuerit in ventre non concipit. Non enim concipiunt vteri genitura. Huic autem menses sano modo procedunt. Verum ex contactu, & interrogatione, maximè clarum fit de relatis. Curata verò fœcunda fit, exigua tamen spes est. Si quid ex mentibus in vteris remanens scissuram ac segmentum habeat, quod circa osculū aut paulò penitrus caleseat, & rursus frigescat, neque sic in ventre concipit. Impedimentum enim hoc incumbens, geniturā quò oportet trāsire non permittit. Et si quidem in principio curetur, sanescit, & fœcunda fit. Si verò tempus accesserit, sterilis manet. Manifesta est autem affectio maximè ad contactum. Durū enim quiddam intus est. Et si magis quàm conuenit vteri hiarint, neque sic prægnañs fit. Non enim concipiunt vteri semen genitale. Sed & hoc ad contactum clarum fiet, & menses aceruatim prodeunt, & per paucos dies. Fit autem & natura hæc affectio, & a relatis morbis. Et si quidem à natura fuerit, incurabilis est morbus: Sin minus, non sani prodeunt menses, vt-pote muliere non existente sana, neq; sic prægnañs fit. Non enim compingitur semen à sanguine morbofo. Sed sanguis qui à corpore morbofus descendit, genituram serosam facit. Serosa verò facta genitura, tempore modico aut multo, foras progreditur vnā cum sanie. Atque hoc ex corpore mulieris, & ex mensibus manifestum fit. Prodibunt enim ipsi menses velut dictū est, siue biliosa, siue pituitosa, siue aquosa fuerit. At breui curata fœcunda fit: Sin minus, non. Si verò mulieri menses non prodeant omnino, aut ab omnibus relatis, etiam sic nō concipit. Venæ enim sanguine plenæ, geniturā nō suscipiunt: & in vteris aliquid inueterati sanguinis inesse necesse est, quod geniturā nutriti prohibet. Si verò pauciores quàm debeant menses prodeant, neque sic prægnañs fit, causa verò in priore morbo relata sunt, fit autem hoc manifestum ex interrogatione, & si quidem à natura pauci menses prodeunt, incurabilis est, Si verò ab affectione aliqua ex relatis

Sterilitatis
causæ.Sterilitas
naturalis.

Cur nō concipiant.

A. lmc

A latis, breui curata, fecunda erit. Et si plures quàm debent menses mulieri prodeant, neque sic in ventre concipit. Vteri enim sanguine euacuato, genituram non cōcipiunt, prae debilitate. Si verò etiam conceperint, sanguis multus derepente in vteros mulieris descendens, genituram suffocat. Manifestum autem & hoc est ex mensibus qui multi prodibūt. Et si quidem natura mulier multos menses demittit, sterilis fit. Si verò non natura, sed ab aliqua ex relatis affectione, breui curata fecunda erit. Et si os vterorum ex pudendo exciderit, neque sic concipit, Nam os durum fit, & genituram non suscipit, & intumescit, & propterea in totum infecunda fit. Manifesta est autem hac affectio, ex eo quod contingit. Et si non prodeant menses velut debent, sed deorsum processerint in sedem, neque sic in ventre concipit. Manifestum est enim, quòd os vterorum à pudendo auersum est, aut conclusum, & si quidem ad sedem auersum fuerit osculum, aut conclusum, curata fecunda fit. Vtrunque verò ex interrogatione ac responsione manifestum fit. Si enim menses semper sic prodierint, clarum est quòd his morbus caussa est. Atque tot ac talia mulieribus contingunt, propter quæ non pariūt antequàm curētur, & propter quæ omnino steriles fiunt. Quare mirari mulieres non oportet, quando coeunt quidem non autem saepe pariunt. Experimenta per quæ indicatur an pragnans fiet mulier. Si cognoscere voles an mulier pragnans fiet, Butyrū & lac mulieris masculum alentis bibendum dato, & si eructauerit, cōcipiet, Sin minus, non. Aliud. Nectopum modicum lana exceptum subdat, & postea manē, an quod subditum est per os oleat, cōsideret, & si quidem oleat, concipiet. Sin minus, non. Aliud. Cuicunque mulieri à subititiis non valde fortibus, dolores ad articulos processerint, & stridor dētium ipsam habuerit, & vertigine affecta fuerit, & oscitarit. Huic maior spes est vt pragnans fiat, quàm ei quæ nihil horum patitur. Aliud. Caput allij integrum depurgatum ac derasum, ad vterū apponat, & postridie videat an per os oleat, & si oluerit, concipiet. Sin minus, non. Aliud. Si cognoscere voles an mulier concipiet, anisum in aqua tenuissimè tritū bibat, ac dormiat, & si quidem pruritus ipsam circa vmbilicum corripuerit, cōcipiet. Sin minus, non. Pragnantem mulierem si non ex alio cognosc

vuy

+ vuy

Conceptura signa.

Pragnantis signa.

Q 2

gnosce

Conceptus
signa,

Signa ma-
ris vel fœ-
mellam

Stomachus
vuluz.

Menses cur
inueni à na-
tura.

Medela
quæ conce-
ptum repa-
ret.

gnoscas, ex hoc cognosces. Oculi videntur distracti ac caui-
res, & candidum in oculis, albedinis naturam non habet, sed
liuidius apparet. Quæ in ventre habent, maculam solarem
in facie habent, & postquam conceperunt, vinum odio ha-
bent, & cibos auersantur, & oris ventris morfu, ac saliuæ ple-
næ fiunt. Mel & anisum tenuissimè terito, deinde in aqua
diluito, ac exhibero, & dormire finito, & si quidem tormen-
ti ipsi fiat circa vmbilicum, prægnans est: Sin minus, non est.
Post hæc autem omnia, farinam bibat, & mel, & organum, in
vino & oleo. Quæcunque in vtero habentes, maculam so-
larem in facie habet, fœ mellam gestant. Quæ verò bene co-
loratæ permanent, masculum plerunque gestant. Si papillæ
sursum conuersæ fuerint, masculum gestat. Si deorsum, fœ
mellam. Accipe de lacte, & farinam misce, & pastillum for-
ma, & ad lentum ignem assa. Et si quidem comburatur, ma-
rem gestat. Si verò diffundatur, fœ mellam. Aut idē hoc lac
super folia emulctum contemplare. Et si quidem condensa-
tur, masculum gestat. Si verò diffusum fuerit, fœ mellam.

Curationes ad conceptionē experimento cognitæ. Si qua
liberorum generationem expetat, quæ sine liberis sit, & si
qua iam antea prægnans fuerit, nunc autem non pariat.

Quum stomachus vteri durus fuerit totus, aut summa
parte, & conclusus ac non rectus fuerit, sed ad alteram coxam
auersus, aut ad intestinum rectum inclinatus, aut in seipsum
contractus, aut labium stomachi sibi ipsi incubuerit. Unde-
cunq; igitur aut asper fuerit, aut callosus, sit autem durus &
à conclusionē, & à callositate. His menses non apparent, aut
multò pauciores aut peiores quàm oportet apparent, & per
longius tempus, Et menses quidem iuxta sanitatem corporis
& vterorum exitum inueniunt. Itemque iuxta naturalē ac
iustum modum, & à calore & humiditate mensium, & sto-
macho non valde leso. At genituram rursus nō suscipit, pro-
pter læsionem, quæcunque tandem impedierit susceptionem

à stomacho non bene habente. Huius post fomentū toto cor-
pori adhibitum, pharmacum bibendum dare oportet, & cor-
poris purgationem primū facere, siue sursum & deorsum,
siue deorsum solum. Et si quidem sursum purgas pharmacū
dederis, ante purgationem fomentum ne adhibeto, sed po-
stea. At fomento prius facto, pharmacum deorsum purgans
biben

- A** bibendum dato. Si verò sursum purgante nō opus habere videatur, præmisso fomento, deorsum purgans bibendum dato. Quum autē corpus probè habere visum fuerit, postea fomentum adhibeto, ita vt vteros frequenter incidere facias, in fomento quod maximè cōferre visum fuerit. Iniicito autē in fontenta, cupressi ramenta, & lauri folia cōtusa, & multa calida sepe lauato. Quum verò recens lota & fota fuerit, vteri osculum dilatato, simulque dirigitō si opus fuerit, cum specillo stanneo aut plumbeo, à tenui auspicatus. Deinde cū crassiore si admiserit, donec probè habere videtur. Tingito autem specillum in mollitorio diluto, quodcunq; liquidum factum conferre videbitur. Specilla verò retro lata facito.
- B** Deinde lignis longis adaptato, ac sic vñtor. At verò hoc tempore, in vino albo dulci quā suauissimo, tadā pinguisimā in tenuia frustra concisam coquens bibat, & apij semen contusum, & cumini Aethiopici semē, & thus quā optimū. De hoc ieiuna bibat moderata copia, per quot dies bene habere visa fuerit, & edat catulos pingues percoctos, & polypū in vino dulcissimo coctum, & de iusculo bibat, & brassicā coctam, & vinum album insuper bibat, & ne cœnet, & bis in die lauetur. A cibis verò hoc tempore abstineat. Postea verò si processerit secundum stomachum, & purgationem aliquam foras ostenderit, de portione aliquid bibat, per vnum atque alterum diem, & à specillorū vsu cesset, & conetur vteros purgare subdititiis, & medicamentis. Cuicunque verò stomacho recto, & molli & sano, & probè habente, & in debito loco sito, menses omnino nō apparuerint, aut pauciores, & per amplius tempus, & non sani: morbum perscrutatus quē vteri habent, & an corpus etiam aliquid conferat, cōperies causam à qua prægnaus non fit, & quum quidē sic habet, curationem facito adhibens id quod conuenit, si admiserit, curationem incipiens à fortibus, prout tempestiuum esse videbitur, desinens autem in molliora, donec vterus probè purgatus esse visus fuerit, & stomachus consistere rectè habēs in sufficiente loco situs. Si verò à pharmaco & à portione non processerit, neque vbi ipsum bibit moderato tempore, à portione quidem hac cesset. Quum verò probè habuerit, per vsum specillorū os stomachi mollito, & vt hiet facito, ad viā subdititio præstandam, tum à medicamentis suffumigabilibus.

Hippocratis Liber

bus, tum à mollitoriis, Postquam autem probè mollitum ac D
suffitū esse videbitur, appolitis pharmacis vteri purgationē
facito, donec probè habere visum fuerit, incipiens à molli-
bus ad fortiora, desinēs autem rursus in mollia odorata. ple-
raque verò ex fortibus medicamentis stomachū exulcerant,

Cum mu-
lier pinguis
nō cōcipit.
Vinum ni-
grū ad con-
ceptum fa-
cit.

ra susceptionem, & vterum siccum faciunt. Si verò mulier
à pinguedine vteros sibi laesos esse putet ad conceptionem,
attenuato ipsam quā maximè, & ad reliqua gracilem faci-
to. Vnum autem tempus optimum est ad cōceptum. At vir
non sit ebrius, neque vinum album bibat, sed fortius ac me-
racius, & cibos edat fortissimos, & calida ne lauetur, & robu-
stus sit ac sanus, & à cibis abstineat qui ad rem non condu- E

ut. pro
A. m
f. p. n.

cunt. Quum autē mulier purgata visa fuerit, & stomachus
vteri rectè habere, lauetur, & caput fricetur, & nihil omnino
illinatur. Postea linteo inodoro loto capillis circumdato, reti-
culo loto nihil olēre deliget, linteo primū supposito. Dein-
de vbi galbanum ad ignem aut solem calefactum, ac probe
mollitum subdidit, quiescat. Postea mane exoluto reticulo
ac linteo, caput suum alicui olfaciendum exhibeat, & si pro-
bè fuerit purgata, olet. Sin minus, non olet. Verū hāc à ci-
bis abstinens faciat. Si verò non fœcunda apposueris, nun-
quam olet, neque purgata, neque aliās, & si prāgnanti appo-
sueris, neque sic olebit. Quæ verò sæpe concipit, & fœcunda
est ac sana, ei si apposueris, etiam si nō purgaris, olebit ipsius
vertex: alibi verò nō. Quum verò cognoueris ipsam rectè ha-
bere, ad virum accedere iubeto. & mulier quidem à cibis ab-
stineat. Vir autem non sit ebrius. Verū frigida lotus, & ci-
bis paucis conducentibus pastus, & si mulier geniturā se con-
cepisse cognouerit, primo tempore non amplius ad virum
accedat, sed quiescat. Cognoscet autem si quidem vir dixe-
rit se emisisse, Mulier autem prā siccitate ignorat. Si verò v-
terus rursus reddiderit genituram eadem die, humidus erit,
& si humidus factus fuerit, rursus cū viro misceatur, donec
concipiat. Alia curatio. Vbi fomentum toti corpori ad-
hibueris, medicamentū bibendū dato sursum ac deorsum
purgans. Deinde lacte asinino postea in potu exhibito, vteros
per fistulam duobus diebus foueto, cum vrina muliebri pu-
trida, nitro iniecto. Tertia verò die, cū vrina bubula. Quarta
autem

Curatio
alia.

A autem & quinta, feniculi semen tritum, & sambuci folia ac lauri, & cupressi ramēta. Hæc coquito aqua affusa. Oportet autem post fomentū, multa calida loti, apponere adipē aromatis imbutū, statim à fomento, & ad noctē. Postea verò hoc præparato. Myrrhā staten, butyrum, adipem anserinū, medullam cerui, resinā, & netopum. Horum singulorū æquales portiones permixtas ac liquefactas apponat in lana Milesia molli quā optima. Deinde plumbeis penicillis quinq; ad octo digitorū longitudinem fabricatis, vterum aperito. Primus ex his sit tenuis, alter crassior, & reliqui alius alio crassior sit. Aperiuntur autē per dies quinq; & semper lota apponat, & ex lumbis deliget, vt ne excidāt, & semper vltius intrudat. Postremum verò quam penitissimē. Postquam autē aperueris, purgatorium appone, cantharidas tritas quinq; & colocynthidis longæ internā spongiosam partē, & myrrhā, Hæc melle cocto subacta, & in glandē efformata, lana inuoluito, excepta summa parte. Deinde in oleum suauissimum tingito ac apponito. Vtere autē & hoc purgatorio, felle tauri, & flore aris assato, & nitro, & myrrha modico melle dilutis, ac linteo tenui deligatis, & linteo supernè pharmaco obducto apponito. Vtere & buprestis cum myrrha. & elaterio cum melle cocto. & cantharidibus cum elaterio & myrrha. Postquam autē purgata fuerit, postridie vbi lauit vterū colluito. Cuminū Aethiopicum tritum, & melanthiū, & resinā, C & oleum, & mel, ac vinum dulce. Hæc mixta & reperfata infundito. Postquam verò infuderis, erectā obambulare iubero, quo collutio infusa cōcutiatur. Subdito autem crocum, & myrrham, & thus, singula paribus portionibus sicca linteo illigata, ita vt anserinū adipem ammisceas ac linteo oblinas.

Atque hæc apponito per dies septē. Octauo verò suffitum facito, cū myrrha, bitumine, & ordeo oleo odorato subactis: his lento igni iniectis, ac suffitu per fistulam facto. Postquam autem suffitum feceris, postridie castoris testem terito, vino albo affuso, & ipsum melle oblitū, & lanæ inuolutum, apponat in noctem. Mane verò eo sublato, ac emollito, ad virum accedat, & vbi condormiit, quiescat. & si nō prima vice cōceperit, eodem rursus appposito, virū adeat. Cæterū hunc medicationis ductū incipere oportet vbi menses prodierint. Desinentibus autē mensibus, cōceptorio medicamento appposito

condormire. Priore verò tēpore neq; mulier ad virum acce- D
dat, neq; vir ad mulierē. Quum autē mulier nō conceperit,
Cūm am- prius cōcipere solita, vteri verò viri geniturā in seipfos sus-
plus nō cō cipit.

Pus si in
vulua est se
mē perdit.
Medela.

Quandoq; enim in vteris pus innascitur. pus autē in vteris à
tuberculis fit. Et sanè ob hoc genitura viri, quādo cum viro
coit, vteros nō contingit, quo videlicet ipsa viri genitura cō-
pingatur. Nā pus ipsam dissipat, vt ne afferatur. Mortificat
enim pus, & putrefacit geniturā. proinde & pus ex vteris ex-
purgare oportet. & tuberculum in vtero sedare, quo de cāte-
ro ne impediatur geniturā cōpingi ac afferri. Festinare itaq;
oportet ad expurgandū, priusquam pus in vteris in callum
concreascit. & vteros colluere hoc modo. Lac equinum co E
ctum exactē colato, vt tenuissimū & purissimum euadat, &
hoc infundito, clysteris instrumento idoneo facto. Et summa
quidem clysteris pars leuis sit, argentea velut specilli, & sta-
tim modico intercedēte spacio foramē perforetur. Sint au-
tem & alia foramina, nō magna, sed angusta, hinc atq; hinc,
ex transuerso clysteris æquali interstitio distātia. & clysteris
quidem apex solidus sit. Reliquum verò totū cauum sit, ve-
lut fistula. Alligare autē oportet vesicā suis fœminæ, atque
hanc probè radere cōfricare. postquam autē alligaris, lac in
vesicā infundito, foramina verò tenui linteo obstruito, ne
lac effluat. Vbi verò obturaueris, vesicā deligato, & ipsi
mulieri dato, cui collutionē infundere paras. Illa verò exem-
ptis obturamentis, in vterū indat. Ipsa enim sciet vbi indere F
oportet. Postea autem tu vesicā manu premito, quādiu pus
foras effluerit. Manifestum autē hoc erit, vbi non amplius
pus simul cū lacte exierit. palām enim clarum est, quod non
amplius inest. Atq; tunc cessare oportet, & post hoc vbi pau-
lulum recreata fuerit, ad modicum tempus, cucurbitæ siccæ
fundum resecato, itēmq; apicis summā partem, quo perfora-
ta sit, ita vt similē efficias in reliquis, excepto apice, velut cly-
sterem: crassitudine verò paulò tenuior sit quā virile pu-
dendum. Hāc cucurbitā sic formatā vasi circumponito, vase
vino impleto. Sit autē vinum odorū fragrantissimū & siccis-
simum ac vetustissimū, deinde lapidē nigrum pellucidum
in vinum iniicito. deinde cucurbitam ex ære albo factā cir-
cumponito, & mulier circuminsideat, pudendū circum cu-
cubitæ

A curbitæ glandē adhibens qualiter oportet, quo cucurbita vera super æream emineat, duorum digitorū intra pudendum mensura. Quum mulier geniturā suscipere non poterit, necesse est membranā superexcreuisse in osculo vterorū. Oportet igitur æruginē aris, & fel tauri, & serpētis adipem, simul miscere, deinde pharmaco hoc lanā imbuere, & in byssinum linteam inuoluere, linteo melle sublito, & facere subdititiū magnitudine maximæ oliuæ, & apponere ad pudendum per totam noctem. Supina autē iaceat, & in die auferat, & calida aqua lauetur quā plurima ex myrti decocto. Apponat autem & postea singulis noctibus, & deinde cū viro coeat. Alia curatio. Marrubij foliorum manus plenæ mensurā, in vas Atticum iniicito, & aquæ potabilis heminas Atticas quatuor affundito, & ybi per nouē dies præmacerauit, per alios nouē dies ieiuna, lota, duos cyathos de hoc bibat, pari mēsurā passi albi ammixta. Quum autē tertiā diem potādo trāsegerit, fomentum adhibeatur, cicutæ foliis in ignem missis, per nouem dies, & post fomentū lauetur. Atq; sic rursus de hoc bibat. Quum verō per triduū fomentū adhibuerit, marrubiū ipsum tritum in die apponat per triduū, & mercurialem tritam in melle Attico bis in die, præmaceretur autem in vini albi congio, hippomarathri & fœniculi radix, & tædæ pinguisimæ ramuli, & rubiæ quarta pars, & fœniculi semen, & verbenacæ radices multæ, præmacerenturq; diebus non minus quā nouē, & postea lota capite, in balneo heminā per diem de meri cremore bibat, & postea reclinata seipsam calefaciat. Atque hinc post potum, alternis diebus id quod ex felle paratur, per diem ad dies sex apponat. Quum autē iam virum accedere vult probè purgata, hyoscyami folia ac radices in aqua feruefaciat, & ex his quā calidissimis per triduum ad noctē fomentū adhibeat, & lota virū accedat, post hoc verō fomētum, etiā cerui pudendū siccum sufficit, & de hoc in vinum albū dilutum deradēs, per triduum bibēdum, & quum partus dolor institerit, bibendū dato. Nā hoc partum accelerat. Alia curatio. Fel tauri feruefacito, & alumē melium, & cornu cerui vstum terito, & permixtis ac in glandulas efformatis vtor. Aliud curatiuum. Cuminum in vino nigro coctū tritum, in glādem efformato & ad noctē apponito, post hæc verō facem vini albi tenuissimā videlicet facis

Quum genitura non suscipitur.
Medela.

Q 5

partem,

partem, cōburito, & combustā in penna auferas, linteōq; illi- D
gata, ad noctē subdas. & porrum costū edat. post hoc tra-
gium terat, & melle dilutum in noctē apparet. & deinde tra-
gij fructū tritum, in vino albo dilutū, tādē ramentis adiectis

Qui conce-
ptus pare-
tur.

Cognitio
biliosa &
pituitosa.

bibendū dato. & postea origanū alternis suffito. & sic ad virū
accedat. Alia curatio ad mulierē parere nequeuntē. Si mu-
lierem parere nequeuntē, puerpurā facere velis, in mensibus

cōsiderare oportet, an biliosa sit, siue pituitosa. cognosces au-
tem utrū horum magis sit, si vbi menses prodeunt, arenā re-
nuem & siccā in sole substraueris, & de sanguine infunderis,
& si quidē biliosa fuerit, sanguis in arena siccatus, luteus fit.

Si vero pituitosa, velut mucus. Vtrū igitur horū fuerit ven- E
trem purgabis, siue sursum siue deorsum opus habere vide-
tur. Deinde intermissis tribus diebus, vteros purgato. & si hu-
midius vterorū osculum fuerit, acria apponito, quo cōmor-
sum & inflammatū os vterorū durum euadat. Si verò mu-
lier internis partibus non febriat, neq; prae vteris concipiat,

Si quæ alia
conceptum
impediant.

neq; viro misceri queat, sed dormiat, & cibū auerferetur, vinū
melle ammixto pudendis infundatur. & myrrhā suffito. In
sedem verò glādes indat. & vinum adipe anserino ammixto,

in pudendū infundat. Deinde etiā oleum pari melle mixtū
infundat. Si mulieri vteri gracilescant, & osculum ipsorum
exasperetur, & cōcludatur, & menses ipsi nō appareant, neq;
conciat. Sed febris corripit lenta, & dolores incidunt ei in

Medela.

lumbos, & imum ventrem: Morbus autem hic maximē fit, F
quū quid in ipsa fuerit corruptū. fit autē & ex partu. Hanc
calida lauare oportet, & fouere. Quū autē lota ac forā fue-
rit, os vterorū dilatare cum specillo. & myrrhā tritā cū pari

netopo apponat. Aut vnguentū, aut oleum rosaceū in linteo,
& plumbū instar glandis formatū apponat. felle bubulo illi-
tum. Et in quatuor diebus infœcundas cognosces. & fomen-
tum adhibeto, & pharmacum bibendū dato. Si verò præter

Cum pin-
guedo con-
ceptum im-
edit.

7m
cum os vul-
uæ durum
est.

naturā mulier fuerit crassefacta, in ventre nō concipit. Nam
omentum crassum ac multū incumbēs os vterorū deprimit,
& geniturā non suscipiunt. Hanc attenuare oportet, & phar-
macum deorsum purgas bibendū dare. & ad vteros appone-
re quod purgat, ac flatum inducit. Si os vterorū durum fiat,

aut ceruix, ex digiti contactu cognoscer. Itēmq; si ad coxam
auerſi vteri fuerint. Quū sic habuerit, nihil acre adhibeto.

Si enim

- A Si enim os uterorum exulceraueris, quum inflāmatum fuerit, omnino periculum est ne sterilis fiat. Verū apponito quæ nō mordent, à quibus pituita purgatur. Quum mēses mulieri prodierint, & præterierint, primū quidē caput purgare oportet. Deinde veratrū exhibere, siue semel siue bis opus fuerit. Postea verò fomentum adhibere, fomentatorio ex cucurbita cōstructo, sic autē facto. Aquam marinā in vas infundito, & porro immisso, fistulam cucurbitis imposito, & cum luto quā optimo illinito, vt ne transpiret. Deinde per sellā erectam quadrangulārē, trāsmittito ipsam fistulā, quo duorum digitorū mensura emineat vltra sectionē. deinde prunas subaccendito. & in desessu caueat, & quum desidet, & quum surgit, vt ne cōburatur. Sed desideat dum adhuc frigidum est fomentatoriū, & surgat dum fistula est perfrigerata. In hoc verò fomento plurimā diei partem cōsumat, & in huiusmodi fomēti vsu ad quinq; dies perseueret. Per decem verò dies pro porro, allium in fomentū immittito, & huius fasciculum cōtusum in aquam marinā iniicito. Postea verò reliquis diebus, ipsa sola aqua marina foueatur, vt vltra ne procedat per totā curationē. Cæterū postremū fomētum quum à curatione desistere voles sic facito. Catulū recentissimum refecato, & aromatum omnis generis odoratissimorum ac siccissimorum species cōtundito, & interaneis catuli exemptis, aromata indito ac expleto. Subiectis autem lignis, & catulo in vas misso vinum odoratissimū affundito, & fomentum per fistulam facito. & si vires permittunt, totā diem cum hoc fomento ipsam foueto, ac interrogato, an odor aromaticum per os olere videatur. nō enim exiguum hoc signum est ei quæ curatur, ad conceptionem. Subdititiis verò vtere, croci quantū voles, & myrrhæ magnitudinem fabarū duarum, & salem sufficientē permisce illorum respectu, & fellis taurini fabarum duarum magnitudinē. Si verò mitiore vti voles, minus fellis ammisce: Si fortiore, plus. Hac trita melle instillato tere, donec id quod teritur, fiat tale, vt digito efformare possis. Quāto autem magis triueris, tanto siccus, & viscosus, ac melius erit. Vbi autem efformaris crassius quam glandem, & summam partem acutam, & medium, crassius, & deinde consequenter quo ad vterum apponatur, in hoc ipsum surculos origani duos leuigatos infigito. Sint autem

Cum menses plus iusto defluunt.

Hippocratis Liber

autem longitudinis sex digitorum. Deinde lana mollissima **D**
 furculos inuoluito & filo tenui superne deligato, & præmi-
 neat filum quatuor digitorum longitudine præ furculis infi-
 xis, postquam autem perfudit & puram seipsam fecit, ipsum
 ad vteri os apponat, linteum sub coxas subiiciens, & per no-
 ctē appositum sinat. Erit autē ipsi purgatio aquosa. postri-
 die vbi surrexit, lauetur & ea die super fomentū ne insideat.
 Quum autem fomentum adhibuerit, & de fomento surrexe-
 rit, ceratum sit quā optimum prima illa die factum, & in
 ipsum cerui maximē medullam cōmisceto: Sin minus, adipē
 anserinum, & quum à fomēto surrexerit, quotidie vbi se per-
 fudit, & puram circa ventrem fecit, cerato vterum inungat.
 Aut reliqua quidē omnia superioribus ammisceto, excepto **E**
 felle, origanum verò leuissimē tritū in glandem permisce,
 & apponat. Aliud. Reliqua quidem omnia ad eundē mo-
 dum facta, verū pro origano ablinthium ammisceto, & eo-
 dem modo efformata apponat. Aliud. Ex tritico melan-
 thium deligito, & probē terito, mellēq; ammixto in pilæ for-
 mā redactum apponat. Verū febres inducit, & articulum
 tumefacit, & vehementer mordax hoc est. Aliud. Mel, &
 veratrum nigrum tenue non multum, coquito. Vehementer
 enim mordax euadet. Sed & hoc febrificū est. Eodem mo-
 do mel coctum, & elaterij potionem coquito, & factam inde
 glandem subdendā dato, & hoc febrificum est. Ducit autem
 & sanguinem. Quædam verò ex his etiam pelliculas. Si ve-
 rò voles, etiam dracontium derade (Est autem lene) & hoc **F**
 cum melle cocto aut crudo, in pilæ figuram velut magnam
 gallam efforma. Cæterum conare, vt physicus sis, ad hominis
habitum ac robur respiciens. Ex his enim nullus est qui non
 omnia ad amussim faciat. Proinde ex his ipsis coniecturā fa-
 ciens, totius corporis, & capitis purgationibus, medicamētis,
 & vteri fomentis, ac appolititis vti conare. Hæc autem ele-
 menta tibi sunt. Verū medela horum vnicuique particula-
 ris est. Et vbi horum quid nō feceris semper in fomento per-
 seueret. Hoc enim est quod mollit, & ducit serosos ac sanio-
 sos humores. Postquam verò ab hac curatione desineris, his
 quæ secundū naturam sunt desinentibus, sanguinē de manu
 detrahē oportet, si quidem fortis fuerit, de ambobus bra-
 chiis, si verò debilior, de altero sufficit. At verò diata qua in
 his

A his curationibus uti oportet, alibi à me indicata est. Si verò suffire voles, lolium ex tritico deligito, & molito, factoque igne pharmaceutico lentissimo, in catinum mittito, & mulierem super sellam imposita, mollibus linteis instratam, sedere iubeto, cruribus quàm maximè diductis. Atque hæc curatio si quidem sufficiens tibi fiat in quatuor mēlibus, bene est; Sin minus, ad hæc præcipe etià ut ad virum ne accedat, eo tempore quo curatur. Inter curandum autē, tædam in aqua macerato, & ieiunæ cyathū bibendum dato, & penicillum stanneum assidue subditum habeat, & cotyledonas siue umbilicos veneris, unā cum sale & cumino, in aqua coquito, & tepidam sorbendam exhibeto. Et latæ quidem cotyledones foemellas gignere videntur: paræ verò & conclusæ, masculos.

Cotyledonis natura.

B Conceptorium summum. Melanthium mulieri in vino nigro acerbo bibendum dato. Mulierem iuenculam fluxus ruber infestabat, & medicamentis datis, & capite purgato, ac vena secta, nihil melius habebat. Videbatur autem hæc causa ipsi esse, ut ne conciperet. Dabam itaque ipsi vinum album, in quo aspalathi radices efferbuerant, manè & antè coenam, & fluxus sedatus est, & non longè post concepit, & peperit masculum, Erat autem corpore coloris candicantis, & probè carnosæ. De mola. Mola porro conceptus causa hæc est, Quum multi menses, modicū & morbosum semen conceperint, neq; fœtus rectus sit, & venter plenus est velut prægrantis. Nihil autem in ventre mouetur, neque lac in mammis generatur. Mammæ autem turgidæ sunt. Hæc itaque & ad duos annos, sæpe etiam tres sic habet. Et si quidem una caro fiat, mulier perit. Neq; enim fieri potest ut superstes maneat. Si verò plures, erumpit ipsi per pudendum sanguis multus ac carnosus. Et si hoc moderatè fiat, servatur. Sin minus, à fluxu correpta perit, & morbus quidem talis est. Iudicare verò oportet ex plenitudinis mole, & quòd in ventre nō mouetur. Nam mas trimestris, fœmina quadrimestris motū habet. Postquam igitur tempore hoc prætergresso non mouetur, nimirum hic morbus est. Est autem hoc magnū signum, quòd lac in mammis nō generatur. Hæc igitur maximè quidem ne curato, aut certè cum prædictione. Et primum quidem totum corpus foueto. Deinde per sedem clysterem adhibeto, quo sanguis multus erumpat. Fortassis enim quod

Molæ conceptus.

Quæ hoc dignoscas.

Curatio quæ.

comp

Vteri pur-
gationes.

Quæ vul-
uæ os ape-
riant.

compactum est cōmoueris, id quod fœtus esse putatur, mu- **D**
liere à pharmaco cōcalefacta. Sed & vteros colluito, quo san-
guinē educas: Sin min⁹, subdititiis vtatur è buprestī, & di-
ctamnū creticū in vino bibat: Sin minus, castoris testem,
& retro cucurbitam ipsi ad laterum mollitudinem affigito,
& plurimum sanguinem detrahito, atque hoc maximē con-
iectura virium ipsius facta. Ad vteri purgationes, quum nō
fiunt, siue ex partu, siue etiam aliās. Tādā pinguisimam
contusam in vino albo coquito, & trium cyathorum mensu-
ra vtatur. Aut pæoniæ grana quatuor, cumini Aethiopici
parum, & seselis paulò plus. Aut cedri baccas. Si verò
suffocationes affuerint, castorij parum. Si verò purgatio-
ne moderata ex partu facta, venter maneat, aut etiam hatus **E**
conclusus, & dolore vexetur, siue cum febre, siue citra febrē,
succī scammoniæ quintam potionis partem, aut seseli, aut
aliud quoddam ex odoratis, & rutam in vino albo bibendam
dato. Si autem bibere nolit, illitionem ad sedem facito, velut
verbi causa, ex felle taurino, & melle, ac litro. Si verò ex
purgationis corruptione dolore vexetur, & odoratis exhibi-
tis nihil cedat, & febris adsit, lactis caprini heminas duas de-
coquito, deinde eo perfrigerato pinguedinē detrahito, exco-
latōque, & aque mulsæ tertiam partem ammisceto, quo dul-
cius fiat. Bibat autē hoc ter ieiuna. Si verò dolor nō quies-
cat, neque venter subeat, ad vespērā in calidam aquam in so-
lio insideat. Quum autem perfota fuerit, vbi inde surrexit,
cum vino nigro austero aqua diluto, olei dimidia parte ad- **F**
dita, tepidè colluito, & inde dormiat. Subdititium vtero-
rum. Si conclusum fuerit, aut durum osculum vterorum,
Ficum albam expurgato, & nitrum Aegyptiū purissimum
tritum ammisceto, & subdititium facito magnitudine gallæ
non magnæ, quod in lana molli in vnguētum irinū tinctum
apponat, per tres aut quatuor dies, prout visum fuerit. Post
hoc conducit fomentum odoratum. Postea verò molli quo-
dam opus est subdititio, quod saniosa maximē ducat. Deinde
mercurialem, si tenera fuerit, cum vnguento rosaceo, in lin-
teo ad diem ac noctem subdat. Ad idem. Fel taurinum
& salem feruefacito, & sulphure trito ammixto, in oblōgam
spiram ac tractum efformato, & ad duos dies ac noctes nu-
dam, ad ipsos vteros apponito. Et deinde rursus mercurialē.
Post

A Post hoc myrrham puram inspergito, & rosaceo ac irino vnguento ammixto diluito, indēq; vteri osculum quā penitissimē illinat. Ad idem. Iridem odoratam contusam ac cribratam seorsim, & cyperi tantundem, & crocomagna magnitudine massæ manum implentis, vino odorato diluito, & ad vnguenti formam redigito, & splenis palmi longitudine inducta ac illita, in paruam pixidem reconde, vt ne transpirent, & apponat. Si verò vlcerati fuerint vteri, aut osculum **Vuluz vl-**
exasperatum fuerit, aut ab aliquo subditio commorū fuerint, adipē in lana illinito: & rosaceum ac cera parum inungito. Quum prāgnās corruerit fœtum menstruum, & ad finem perferre non poterit, & tenuis præter naturā fiat, hu- **Quæ ante**
tempus fœ-
tus perdūt.

B ius vteros purgare oportet, & ipsam medicamētis curare, & crassefacere. Non enim ad perfectionem gestare poterit, donec se ipsam refecerit, & vteri robusti facti fuerint. Si verò concipiat quidem, corrumpt autem fœtus bimestres, exactē eodem tempore, & neque prius neque posterius, & hoc perpeffa fuerit bis aut ter eodem modo. Aut etiam ad amplius tēpus progressum corrumpt eodem modo. Huius vteri nō amplius extenduntur, fœtu in ipsis augescēte, & ex bimestri aut trimestri, ad ampliorem modum excedente. Verū fœtus quidem augescit. Vteri verò non crescunt, & propterea multē eodem tempore corrumpunt. Huius vterum colluere oportet, & subdititiis quā maximē inflare, aut hisce medicamentis. Colocynthidis internam partē rusam cribrato, & **Medela.**
Contra
lib. q
cent
All.

C silphij parum, cum paulō ampliore melle cocto ammisceto, & hæc circum specillum obducito, ea crassitudine quantam stomachus ad vteri os suscipere potest, & semper vltra protrudito, donec ad internā vteri partem penetrarit. Quum autem pharmacū colliquerit, specillum eximito, & rursus eodem modo paratum elaterium, & colocynthidē, syluestrem, similiter velut prius medicamentum apponito. Edat autem hoc tempore allium multū, & silphij caulem, & reliqua dia- **Contra**
lib. q
cent
All.
rata

Cur quæ
semen reti-
nent non
concipiūt.

Curatio.

Cum abor-
tus non e-
mittitur.

rata, ubi iam sicca fuerit, cum viro coeat. Quum autem fla-
tum in vterū inducere voles, alij caput integrum, & silphij
succum, ad subditiia ammisceto. Quod si qua prægnans de-
cem menses perficere non possit, sed corrumpit, & hoc sæpe
patitur, ex huius vtero aquam purgato, & ipsam medicamē-
tis curato, quo aqua purgetur. Si vero geniturā continens,
non prægnans fiat, id quod multis contingit, stomacho vteri
præter naturam hiante: menses plures quam conuenit, & hu-
midiores prodeunt, ut & id quod à fœmina prodit semen, ad
fœtificationem non concipiatur, & viri genitura insuper ac-
cedens corrumpatur. Contingunt autem hæc, & corpore, &
vteris ægrotantibus. Verū oportet huic medicamenta de-
orsum purgantia dare, & interposito aliquo tempore, totum
corpus fovere, & vteros cum aceto & aqua marina, specillis
ac ferramentis ignitis immisis. Coniiciantur autem in fo-
mentū cupressi ramenta, & lauri viridis folia contusa, & po-
lycnemi folia, faciendum est hoc fomentum tempore oppor-
tuno. post hoc verò lauetur, & fomentum adhibeatur ex loti
ramētis, & rosīs, ac polycnemi foliis aceto incoctis. Ad finem
autem suffitus fiat, ex verbasci foliis contusis ac loti ramen-
tis. Verū ante lotionem suffito myrrham & thus, utraq; æ-
quis partibus trita, & myrti ac lauri folia. His permixtis &
in lentum ignē coniectis, recens adhibito fomēto suffito, bis
in die, fomentum autem adhibeatur recens lotæ. Sed & post
suffitum lauet, & vteri stomachum ad pristinam naturā re-
ducatur. Et si vires sufficiant, ante hæc omnia venam in manu
sinistra secato, atque ita reliqua facito. Si verò stomachus sic
habeat, menses autem non prodeant, aut vitiosè, aut minus,
ad reliqua omnia ampliorem purgationē adhibeto, & sic cu-
rato, subditiis etiam utēs si opus habeat, & ex prioribus la-
uans, & suffitum faciens, ac siccans. Si mulier inuita abor-
tum faciat, nec ita eiicere velit, triticum torrefactum & mo-
litum & vuam passam albā contusam, aqua malsa dulci dilu-
ta, modico oleo affuso, ieiunæ bibenda dato, postea raphani
semen tritum, & acetum ac adipem anserinum, permixta bi-
bat, & lauri folia trita apponat. Deinde bibat origanum, &
pulegium, & polentā ex aqua, ita ut lauri folia tusa ac trita
ammixto gūmi, aquæ inspergat, diluat, ac bibat. Aut adipē
ouillum, & anserinū, & mel simul mixta ac trita delingenda
præb

A præbeto. Aut pastinacæ semē leuissimè terito, & lacti superstantem concretionem ammisceto, & adipem anserinum eliquatum. Hæc feruefacta sorbenda dato. Aut origani folia viridia, si haberi possunt, sin minus, sicca leuissimè trita, ex aqua bibenda dato. Aut lauri baccas leuissimè terito, & suis feminæ adipem liquatū, & mel ammisceto, & simul omnia trita delingenda præbeto. Aut pastinacæ semen leuissimè tritum ex vino diluto bibendum. Si vteri genituram non contineat, plumbum, & lapidem qui ferrum ad se rapit, leuiter terito, & linteo illigato, quo in muliebri lacte tincto, subditio vtatur. Aut aris florem tritum ac melle dilutum subdat. Quum vteri genituram viri eructant tertia die, necesse est mulieris, quæ hæc patitur, vteros callo repletos esse, & nō potest viri genitura intus in vtero manere, sed excluditur, & propterea concipere non potest, quandiu callus in vtero fuerit. At calli expulsio sic fit, Pennas sumito minutissimas ac mollissimas, hisque simul colligatis vteros illinito, quemadmodum oculos illinire solent, ita vt pennas exaques, ipsarūq; summas partes tenuissimo filo deliges, & multo roseo illinas. Sic autem facito. Supinā reclinato, & sub medios lumbos puluinar subiicito, & specillū immittito, ita vt cruribus mulieris extentis, & hinc atque illinc diductis, specillum sursum ac deorsum vertas donec promineat: postquam autem videris in osculo vteri callum, optimum quidem hoc fuerit, si non adhæreat in coxa, sed vltro sequatur. Si itaque in osculo vteri inhæret, vossella tenuissima præhensum extrahere conare, prouidus vt placidè hoc fiat, & nō violenter. Et postea viro condormiet. Si prægnanti menses compareat, stercus asininum siccum, & rubricam, & sepia testam terito. & linteo alligata apponito. Aut pœoniae semina nigra, in vino diluto trita bibenda dato. Si verò à coitu, imum ventrem dolet, & sanguis recens ipsi appareat, lini semen tusum & muscum mollem, & adipem anserinum, mixta ac molli lana excepta imponito. Si vteri extra naturam progressi fuerint, calor habet maximè pudenda, & sedem: & vrina paulatim destillat & pudendū mordet. patitur autē hæc si recens ex partu viro condormierit. Quum sic habuerit, myrti baccas & loti ramenta in aqua coquito. & aquam per noctē sub dio exponito, atque sic frigidissimam pudendis affundito, &

Quum semen non retinetur.

Quum vulua proci- dit. Medela.

R. trita

trita hæc apponito. Postea aquam lentium bibens, melle & D
aceto ammixtis, vomat donec vteri fuerint retracti. & lectus
à pedibus altior sit: & graueolentia sub pudenda suffito, odo-
rata verò sub nares. Cibus vtatur quàm mollissimis, ac frigidis
& vinum aquosum album bibat, & nō lauetur, neq; cum vi-

Quum vul
ua penitus
propendet,
Curatio.

ro dormiat. Si verò omnino ex pudendis exciderint, depen-
dent velut scrotum, & dolor corripit, Hoc autem contingit,
quum ex partu laborarit, vt vteros concusserit, & cum viro
dormierit in puerperij purgatione. Cùm sic habuerit, frige-
factoria apponat, & quod foris est depurgatum, ac cum vino
nigro vinoso, in quo malum punicum coctum est ablutum,
intrò detrudat. Deinde mel & resina, pari mensura eliqua-
ra, & pudenda infundantur: & decumbat supina pedes sur- E
sum extensos habens: postea spongas apponat, & ad lumbos
deliget. Quàdiu verò sic habuerit, à cibus abstinere oportet.
Potu verò quàm paucissimo vti, donec septem dies præter-
eant: & si quidē sic redire voluerint, bene est: sin minus, sum-
mas vteri partes deradito, lauato, & cerato picato illinito.
Deinde pedes ad scalam deligato, scalamque iuxta caput pul-
sato, & cum manu intrudito. Postea crura ipsius alternatim
colligato, & diem ac noctem finito in quiete, & modicū pti-
sanæ succum frigidum dato, aliud autem nihil. Postera die
ipsam reclinato, & cucurbitam quàm maximam ad coxam
affigito, & multo tempore trahere finito: & cùm detraxeris,
reclinatam iacere finito, & nihil aliud præter ptisanæ succū
exhibeto, donec septem præterierint dies. Cibus autem tunc F
mollissimis ac paucissimis vtatur. Si verò ventrem exonera-
re voluerit, decumbens id faciat, donec quatuordecim
dies prætereant, postea surgat, & quàm parcissi-
mè deambulet, & non lauetur, & cibus mo-
dicis vtatur, sub pudenda verò suffi-
tus per graueolentia fiat. Et
postquam obambula-
re inceperit, sub-
ligar ge-
stet,

HIPPO

AHIPPOCRATIS

310

COI DE MORBIS PO-

PVLARIBVS LIBER PRI-

MVS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETI.

*

B SECTIO PRIM A.

Constitutio temporis prima.



N Thaso autumnni tempore, circa aquino-
ctium & sub pleiadas, aquæ multæ, assidue,
molles, velut in austrinis, hyems austrina,
parui venti aquilonares, squalores, & omni-
no hyems quale ver fieri solet. Ver autem
austrinum, frigidum, pluuia parua. Aestas
plerunq; nubila, aquarum inopia. Etesia parua, modicè, spar-
sim spirarunt. Quum autem totus hic aëris status ad austri-
na vergeret, ac cum siccitatibus fieret, ante ver quidem ex
priori statu, subcontrario & aquilonio fiente, paucis oborta
sunt febres ardentes, atq; his omnino boni status, & paucis
sanguis erupit, neque ex his moriebantur, Tubercula verò
circa aurem alteram multis erant, plurimis ex vtrisque, ci-
tra febrem erectè obambulātibus. Quibusdam verò etiam
parum incalecebant. Extincta sunt omnibus absque nocu-
mento. Neque cuiquam suppurarunt, quemadmodū ea quæ
ex aliis causis sunt oborta. Erat autem natura ipsorum hæc,
laxa erant, magna, diffusa, non cum inflammatione, doloris
exortia, omnibus obscurè euauerunt. Fiebant autem hæc
adolescentibus, iuuenibus, in vigore constitutis, & ex his plu-
rimis qui circa palæstram & gymnasia exercebantur. Mu-
lieribus verò paucis fiebant. Plurimis verò tusses sicca, qui
bussiebant & nihil reieciabant, & voces nō longè postea rau-

Vergilia
Thasos.
Temporū
varietates.

Causos.
Tubercula
secundum
aures.

Quibus
hæc fieret.

R 2

cofæ

Hippocratis Liber I.

cosq. Quibusdam verò etiā interpolito tēpore inflāationes D
cum dolore, in altero testiculo, quibusdā in utroque. Et alii
quidem febres, aliis non. Hæc autem plurimis laboriose ne-
bant. De cetero verò, quantū ad ea quæ in officina medica ad
chirurgiam pertinentia fiunt, sine morbo debebant. At verò
ante ætatis initiū, & per æstatem ac hyemē, multi ex his qui
longo iam tempore subcorrupti erant, tabidi decubuerunt.
Nam & multis qui ambigui erant, tūc tabes confirmata est.
Quibusdā vero primū cœpit. Et his natura ad tabem verge-
bat. Moriebantur autē multi, & plurimi ex his. Et de his qui
decubuerūt haud scio an quis etiā modico tēpore superuixe-
rit. Moriebātur autē citiūs quā tales morbi trāſigere solent.
Nam alios & lōgiōres, & cū febribus coniunctos facile fere- E
bant, & nō moriebantur. De quibus paulò post scribetur. So-
lus enim & maximus ex his qui tum vigeabant, tabidus mor-
bus multos occidit. Erāt autem plurimis ipsorū affectiones
huiusmodi: febres horridæ, continuæ, acutæ, in totum nō in-
intermittentes. Modus autem erat semitercianus, vna die le-
uior, altera ampliūs exacerbescentes, & in summa acutior-
res increbescētes. Sudores vero semper, nō per totū, frigiditas
extremitatū multa, & quæ vix recalesceret. Alui turbata,
biliosa, ex paucis, puris, tenuibus, mordacibus, frequēter ad
exonerandos se surgebant. Urinæ tenues, & crudæ, & decolor-
res, & paucæ: Aut crassitudinem habētes, & subsidentiā par-
uam, non probè desidentes, sed cū cruda quadā ac intēpesti-
ua subsidentiā. Tussiebant autem, pauca, condensata, conco- F
cta, paulatim vix educentes. Quibus vero violentissima acci-
dissent, his neque modicè concoctio aderat: sed cruda spueri
perseuerabāt. Fauces autē plurimis horum ab initio, & per-
petuò dolebant, ruborem habentes cum inflammatione, flu-
xiones parvæ, tenues, acres. Breui colliquescebant, & affrige-
bantur. omnes cibos perpetuò fastidiētes, sitis exortes, & ple-
rique circa mortem deliri, Et circa tabidos quidem hæc. Cæ-
terū æstate iam & autumno, febres, multæ, continuæ, non
violentæ, diu quidem agrotātibus, non autem aliās ita ma-
lè habētibus oboriebātur. Plurimis alii turbata, ita ut val-
de tolerāter ferrēt, & nihil, memorabile lædebāt. Urinæ itē
plurimis boni quidem coloris & puræ. Verū tenues, & post
tempus circa iudicationem cōcoctæ. Tussiebant autem non
valde

Hemiri-
tao.

Urinæ qua-
les.

Mala au-
tumnalia

A valde, neque ea quæ per tussim reieciuntur difficultatē exhibebant, neq; cibum fastidiebāt, sed etiam valde licebat ipsis offerre. In summa subagi otabāt tabidi, nō tabido modo febribus horridis parum insudantes, aliās alij, vt qui erroneo modo exacerbarentur, febribus quidē in totū non intermittētib; sed quæ iuxta naturæ febris tertianæ morē exacerbarentur. Iudicabantur autem quibus inter os breuissimæ essent, circa vigesimū diem plurimis circa quadragesimum. Multis circa octuagesimum. Quibusdam neque sic, sed vago modo & circa iudicationē deficiebant. horum autē plurimis febres rursus nō multū tempus intermittētes reuersæ sunt. Ex recidiuis autē in iisdem circuitibus iudicabantur. Multis

Tabes hæc
quæ.

B vero ipsorum producebātur, vt sub hyemem agrotarent. Ex omnibus porro in hac temporis constitutione descriptis, solis tabidis lethalia acciderunt. In aliis autem febribus, non.

SECTIO SECUNDA.

(Constitutio temporis secunda.)

IN Thaso ante autumnū tempestates non tēpestiuæ, sed de-
repente in aquiloniis & austrinis multis, humidæ & præ-
erumpentes. Huiusmodi verò durabāt vsq; ad pleiada, & sub
pleiade. Hyems autē aquilonia. Aquæ multæ, laigæ, magnæ.
Niuēs. Plerunq; mixta aeris serenitas. & hæc quidem fiebant
omnia frigora verò non admodum intēpestiua. Iam verò

Thasus.

C posterior hyēs magna erat. aquilonia multa. Niuēs & aquæ
assiduæ multæ, & cælum procellosum ac nubilū. Hæc autem
durabant & nō remittebāt vsq; ad æquinoctium. Ver autem
frigidum, aquilonium, aquosum, nubilum. Aestas nō valde
æstuosa fiebat. Etesia assiduæ spirarunt. Mox circa arcturū
in aquiloniis, aquæ valde multæ. Quum autē annus totus
humidus & frigidus & aquilonius esset, per hyemē sano mo-
do plerunq; habebant. Ante ver autē multi quidā & plurimi
morbidē degebant. Primum igitur cœperunt lippitudines
fluidæ, dolorosæ, humidæ, crudæ. Lemæ parux & multis dif-
ficulter erumpentes, plurimis reuertebātur. defecerunt sero
ad autumnum. Aestate iam & autumnō, lenteria, & dysen-
teria, & tenesmi, & alui profluvia ex biliosis, tenuibus mul-
tis, crudis, & mordacibus: quibusdā verò etiam aquosis. Mul-

Solstitium
hybernū.

Ver.
Aestas.
Etesia.
Arcturus.

Ophthal-
mia.

Vētris fluo-
res diuersi.

R 3 ris

Hippocratis Liber I.

Stranguria
Vomitio.
Sudor.

Febres di-
uersæ.
Quartana
erratica.
 tis autem & vrinæ fluxiones cum dolore biliosæ, aquosæ, ra- **D**
 mentosæ, purulentæ, cum stillicidio, nō rhinales. sed his alia
 pro aliis. Vomitus pituitosi, biliosi, & ciborum crudorum re-
 iectiones. Sudores. Omnibus vndiquaque multa humiditas.
 Fiebant autē hæc multis erectē obambulantibus, non febriē
 tibus. Multis item febrientibus, de quibus paulo pōst scribe-
 tur. In quibus autem omnia hæc præscripta apparebāt cum
 dolore, tabidi fiebant. Iam verò autumno & sub hyemem, fe-
 bres continuæ, & quibusdam ipsorum paucis ardentes, diur-
 næ, nocturnæ, semitertianæ, tertianæ, exactæ, quartanæ, erro-
 næ. Singulæ verò prædictæ febres multis fiebant. At arden-
 tes & paucissimis obortæ sunt, & ex agrotis hi minimum la-
 borauerunt. Neque enim sanguis erupit, nisi valde parum, & **E**
 paucis. Neq; delirabant, aliæque omnia tolerabilia erant. Iu-
 dicabantur autē plurimis valde bono ordine, cum intermit-
 tentibus in septem ac decem diebus. Neque mortuū aliquē
 tunc in febre ardente noui, neque phrenitim tunc cuiquam
 factam scio. At verò tertianæ plures quidem quā arden-
 tes febres erāt ac grauiore, verū ordinatē in his omnibus à
 prima accessione quatuor circuitus habebāt, in septem autē
 perfectē iudicabantur, neque vlli horū reuersæ sunt. Quar-
 tanæ verò multis quidem ab initio ex ordine quartanæ cœ-
 perunt. Quibusdam autē nō paucis, ex aliis febribus ac mor-
 bis abscessus ad quartanas fiebant, atque hos diu, quemadmo-
 dum solent, & adhuc diutius tenebant. Diurnæ verò quo-
 tidianæ, & nocturnæ, & erroneæ multæ, multis & multo tem- **F**
 pore permanebant, & erectē obambulantibus, & decumben-
 tibus. Plurimos horum sub pleiada, & vsque ad hyemem, fe-
 bres consequebantur. Multos conuulsiones, magis autē pue-
 ros ab initio, & febriebant, & in febribus conuulsiones fie-
 bant. & erant hæc plerisque diuturna, verū innocua, nisi ad
 hæc, etiam ex aliis omnibus pernicies adesset. At continuæ
 quidem in totum, & nihil intermittentes, exacerbescentes au-
 tem omnibus ad naturæ tertianæ modum, vna die subleuan-
 tes, & vnā exacerbescentes, omnium quæ tunc fiebāt violen-
 tissimæ erant, & longissimæ, ac cū maximis doloribus, leni-
 ter auspicantes, & in totū semper augescentes, & in iudicato-
 riis diebus exacerbescentes, & in peius procedentes, parū al-
 leuantes, & statim rursus ex intermissione violentius exacerbe-
 scentes

Ascentes, in iudicatoriis plerunque diebus peiores fientes. Rigores verò omnibus quidem inordinate & erroneo modo fiebant, parcissimè autem & minimè his. Verùm in aliis febribus maiores. Sudores multi, his minimi, nihil alleuantes, sed sub cōtrario modo damna inferentes. Frigiditas extrematum his multa, & vix recalescēs. Neq; somni in totum, maximè verò hi etiā rursus soporosi. Ventres autem omnibus turbati & mali, his autē longè pessimi. Vrinæ verò plurimis horum aut tenues, & crudæ, & decolores, & post tēpus parum cōcoctæ iudicatorio modo. Aut crassitudinē quidem habentes, verū turbatæ, neque cōsistentes, neque subsidentes neque cōcoctæ. Aut paucæ, & crudæ, ac malæ, & subsidentes.

B Pessimæ autem hæ omnes. Et tussies quidem ad febres comitabantur. Verùm nō habeo quod scribam, an detrimentum aut utilitas tunc ex tussi cōtigerit. Diuturna igitur & molesta, & valde inordinate ac erroneo more, & citra iudicationem, plurima horum perseverabant, tum his qui perniciosè habebant, tum his qui non. Si enim aliquos ipsorum paululum relinquerent, statim rursus reuertebantur. Quibusdam verò paucis ipsorū iudicabātur, quibus brevissimè adessent, circa octogesiā diem & horum aliquibus reuersa sunt, ut plurimi ipsorum per hyemē adhuc ægrotarint. plurimis autem citra iudicationē defecerunt. Hæc verò pariter acciderunt, & his qui superstites manserunt, & qui non. Quum autem multa & varia fieret iudicationis impeditio ex morbis,

C maximum etiam ac pessimum signum perpetuò comitabatur, quòd plerique omnes cibos fastidiret, & ex his maximè hi, quibus etiam alia exitialia erant. Siticulosi verò nō adeo intempestivè in his febribus erāt. Quum verò tēpus produceretur, & dolores essent multi, ac colliquatio mala, his abscessus succedebant, aut maiores quàm ut ferre possent, aut minores quàm ut quicquam prodesse: sed statim recurrent & ad peius courgerent. Erāt autem quæ his fiebāt hæc: dysenteria, tencsmi, lienteria & alui profuua. Quibusdam etiam hydropes, partim cū his, & partim absq; his. Quicquid autem ex his violēter accedebat, statim vires deiciebat: aut rursus nihil proderat. Papulæ parvæ, & non pro dignitate rationis excretionis morborum, & statim rursus evanescerent. Aut iuxta aures tumores, qui non soluebantur, & nullam

Tussis cum febre.

Ventris mala.

Hippocratis Liber I.

de se significationem præbebant. Quibusdam in articulos, D
maxime verò in coxendicem, paucis iudicatorio modo ces-
santes, & statim rursus ad habitum ab initio inualescentes.
Moriebantur autem ex omnibus, & plurimi ex his pueri iam
ablactati, & maiores natu, octennes ac decennes, & nondum
puberes. Fiebant autē hæc his, non sine prius scriptis. Priora
verò multis, sine his. Solum verò bonum & maximū inter
ea quæ fiebant signum, & quod plurimos in maximis pericu-
lis cōstitutos liberauit, quibus ad vrinæ stillicidium conuer-
tebantur, & ad hoc abscessus fiebant. Accidit autē plerisque
vrinæ stillicidium, maximè his ætatibus. Fiebat & aliis mul-
tis, tum erectè obambulātibus, tum in morbis. Statim verò
etiam magna quædā mutatio omnium, his fiebat. Alui enim E
etiam si humectæ essent, maligno modo mox sistebantur, ci-
bōsque omnes libenter sumebant. Et febres postea mites
erant. Verūm vrinæ stillicidium his diuturnum & laborio-
sum erat. Vrinæ verò his erant multæ, crassæ, variæ, rubræ,
purulentæ cum dolore. Atq; hi omnes superstites māsērunt,
& nullum ex his mortuum noui. Quæcunque verò non pe-
riculosæ fiunt, concoctiones excrementorum omnes vindi-
quaue tempestiuas aut bonas, & iudicatorios abscessus, con-
siderare oportet. Concoctiones celeritatem iudicationis, &
securitatem sanitatis significant. Cruda verò & inconcocta,
& in malos abscessus conuersa, aut iudicationis sublationē,
aut dolores, aut diuturnitatē, aut mortem, aut eorundē reci-
diuas. Quod verò ex his potissimum futurū sit, ex aliis con- F
siderandum est. Præterita dicito, præsentia cognoscito, futu-
ra prædicito. Hæc tractato. Exerceto circa morbos duo, vt
iuues, aut non noceas. Ars ex tribus cōstat morbo, agroto, &
medico artis ministro. Aegrotū cum medico aduersari mor-
bo oportet. Capitis & colli dolores ac grauitates cum do-
lore, cum febribus, & sine febribus, Phreniticis quidem con-
uulsiones, Sed & virosa vomunt, & quidam ex his subito mo-
riuntur. In ardentibus autem & aliis febribus, quibus colli
dolor, & temporū grauitas, & caligo vertiginosa circa ocu-
los, aut etiā præcordiorum distentio, non cum dolore sit, his
sanguis per nares erumpit. Quibus autem grauitates quidē
rotius capitis, oris autē ventriculi morsus adsunt, & nausea-
bundi sunt, hi biliosa & pituitosa vomunt. Plerunque verò
pueris

Digesta
crudæque
quid por-
tendant.

Medici mu-
nus.

Medica ars
quibus con-
sistat.

A pueris in talibus afflictionibus conuulsiones fiunt. Mulieribus autem tum eadē, tum ab vteris dolores. Senioribus autem & quibus iam calor superatur, paraplegiæ vocatæ, leues fiderationes, aut insanix, aut oculorum priuationes.

Constitutio temporis tertia.

IN Thaso paulò ante arcturum, & sub arcturo, aquæ multæ, magnæ, in aquiloniis. Circa æquinoctium autē & vsq; ad pleiadas, austrinæ pluuiæ pauca, hyems aquilonia. siccitates, frigidi venti, magnæ niues. Circa æquinoctium hyemes maximæ. Ver aquilonium, siccitates, pluuiæ pauca frigida. Circa solstitium æstiuum aquæ pauca, magna frigora vsque
B ad canem. Post canē vsq; ad arcturum, æstas calida, æstus magni non ex accessione augescences, sed continui ac violenti. Aqua nō delapsa est. Etesix spirarunt. Circa arcturū pluuiæ austrinæ vsque ad æquinoctiū. In hac autē cōstitutione, per hyemem quidem receperunt resolutiones ex fideratione, & multos inuaserunt. & quidā ex ipsis subito moriebantur. Nā hic morbus satis popularis erat. Cætera incolumes degebāt.
 Ante ver autē cœperunt febres ardentes, & vsque ad æquinoctium, & ad æstatem durabant. Quicunque igitur vere & æstate ineunte statim ægrotare cœperunt, plurimi seruabantur. pauci verò quidā moriebātur. In autumno iam & quum pluuiæ fierent, lethales erant, & plures peribant. Erāt autem febrium ardentium affectiones. Quibus quidem bene ac largē
C sanguis per nares erupit, per hoc maximè seruabantur. & nullum noui qui in hac constitutione mortuus esset, si rectē ipsi sanguis profluxisset. In Philisco enim & Epaminone ac Sileno, quarta & quinta die parum de naribus stillauit, & moriebantur. Plerique igitur ægroti circa iudicationē rigebant, maximè hi quibus sanguis non erupisset. Idem verò etiam postea insuper riguerunt, & exsudarunt. Quibusdam morbus regius accidit sexta die. Verum his purgatio per vesicā, aut aluius exturbata profuit, aut larga sanguinis eruptio. Velut Heraclides qui decumbebat apud Aristocydam. nam huic & naribus sanguis erupit, & aluius turbata est. & per vesicā purgatus est. Vigesima die iudicatus est. non velut Phanagoræ seruus, cui nihil tale factum est, & mortuus est. Sanguis autē plurimis erupit, maximè adolescentibus & in
 R 5 vigore

Qualis tertia cōstitutio in Thaso.

Ver quale. Aestas.

Etesia.

Autumnus semper malus.

Philiscus. Epaminon. Silenus.

Heraclides. Aristocydes. Phanagoras.

Hippocratis Liber I.

Bion.
Silenus.

Eraton.
Mylus.

Tubercula.

Antiphon.
Critobu-
lus.

Mulieres
quæ pate-
rentur.
Telebulus.

Dæthar-
seus.

Xenopha-
nes.
Critias.
Bion.
Cratia.

Arcturus.

vigore cōstitutis, & talium pleriq; perierunt, quibus sanguis D
non erupit. Senioribus verò ad morbū regium res deuenit,
aut alui ipsis turbatae sunt, aut dysenterici facti sunt. Velut
Bioni apud Silenū decumbenti cōrigit. Populariter grassa-
bantur etiā dysenteriae per æstatem & quibusdā qui agrota-
runt, quibūsq; etiā sanguis erupit, ad dysenteriam transitus
factus est velut Eratonis filio & Mylo, qui multa sanguinis
eruptione facta, in dysentericum statum delapsi superstitēs
manferunt. Multis igitur maximè hic humor redundauit.
Nam & quibusdā circa iudicationem sanguis non erupit, sed
tubercula iuxta aures excitata euauerunt. Quæ ubi eua-
nuissent, iuxta sinistri lateris mollitudinē, & ad summā co-
xam grauitas fuit. Quum autem dolores post iudicationem E
fierent, & vrinae tenues prodissent, parum sanguinis profun-
dere cœperunt. Verū circa quartā & vigesimā. abscessus
ad sanguinis eruptionē fiebant Antiphonti Critobuli filio,
quæ sedata est, & perfectè iudicatus est circa quadragesimā.
Mulieres porrò multæ quidem agrotarūt, pauciores autē
quā viri, & pauciores etiam mortuæ sunt. Plurimæ verò
grauiter ex partu laborarunt, & post partus insuper agrota-
runt, & hæ maximè perierunt. Velut Telebuli filia, quæ sex-
ta à partu die mortua est. Plurimis itaq; in febribus menses
apparebant. Quibusdam verò ex naribus sanguis erupit, &
virginibus multis id primū factū est. Quibusdā & ex na-
ribus sanguis, & menses proruperunt. Velut Dætharsei filia F
virgini apparuerunt tunc primū, & sanguis largus ē nari-
bus fluxit. Neq; vllam mortuam noui, ex his quibus aliquid
horum probè factū esset. quibus autem prægnātibus conti-
git agrotare, omnes foetus perdiderunt, quas ego noui. Vri-
nae verò plurimis boni quidem coloris, verū tenues & sub-
sidentias modicas habentes, ex recrementis tenuibus ac bi-
liosus. Multis autē aliis iudicatis ad dysenterias res deuenit.
Velut Xenophani & Critiæ. Vrinae aquosæ, multæ puræ, te-
nues post iudicationē, & subsidentia bona facta, & aliis pro-
bè iudicatis. Mentionē faciam eorū quibus facta sunt, Bioni
qui apud Silenum decumbebat. Cratiæ quæ apud Xenopha-
nem. Aretonis filia vxori Mnesistrati. Postea verò omnes hi
dysenterici facti sunt. Quod vrinas minxerunt aquosas, con-
siderandum est. Circa arcturū autem multis vndecima die
iudicatio

A iudicatio facta est, & his recidiuæ non pro ratione fientes reuerſæ sunt. Erant autē soporosi circa tēpus hoc, plures autem pueri, & hi omnium minimè moriebātur. At verò circa æquinoctium, & vsq; ad pleiada, & sub hyemem, comitabantur quidē febres ardentes. Sed & phrenitici plurimi tūc fiebant, & pleriq; horum moriebantur. fiebant autem & per æstatem pauci. Quum igitur febres ardētes inciperent, significationem de se præbebāt quibus pernicies immineret. Statim enim ab initio febris acuta, parum insuper rigeabant, vigiles erant, siticulosi, anxij, parum exudantes, circa frontem & clauiculas, nullus per totum, multum delirabāt, tumores, tristitia, extremitates subfrigidæ, pedes summi & maximè **B** manuū summæ partes. Exacerbationes in diebus partibus. Plurimis autem quarta die dolores maximi, & sudores plerunque subfrigidi, & extremitates non amplius recalescentes, sed liuidæ, subfrigidæ, & neque sitiebant. Ad hæc vrinæ his nigræ, pauca, tenues, & alui sistebantur, neque sanguis è naribus erupit vlli ex his quibus hæc accidissent, sed parum stillauit. Neque ad recidiuam vlli horum res deuenit. Sed sexta die mortui sunt cum sudore. Phreniticis autem acciderunt præscripta nō omnia. Iudicabantur autem his plerunq; die vndecima, quibusdam vigesima. Quibus non statim ab initio phrenitis cœpit circa tertiam aut quartam diem, sed moderatè habebant primo tempore, his circa septimā morbus ad acumen transiit. Magna itaque erat morborū multitud. **C** Ex agris autem maximè moriebantur adolescentes, iuuenes, in vigore ætatis constituti, leues, subalbicante cute, rectos itēque nigros capillos habentes, & oculos nigros, & qui in quiete & ocio vixerāt, & alta voce, aut gracili, aut aspera præditi, balbi, iracundi, & mulieres plurimæ ex hac specie moriebantur. At in hac constitutione ex quatuor signis maximè seruabantur. Quibus videlicet sanguis è naribus probè erupisset. Aut vrinæ multæ, & multā subsidētiam habentes per vesicā prodiissent. Aut per ventrē turbata, biliosa tempestiuè processissent. Aut qui dysenterici facti essent. Acciditq; multis vt nō ex vno præscriptorū signorum iudicarentur, sed per omnia percurrerent, & grauius quidē habere videbantur, conseruabantur autē omnes quibus hæc accidissent. Mulieribus autē & virginibus accidebāt item præscripta

Æquino-
ctium.

Postrema
qualia in
his.

Qui hoc
morbo pe-
rissent.

Quatuor
hæc lan-
guentes ser-
uabant.

Hippocratis Liber I.

Philonis fili-
lia cur pe-
rierit.

Lachrymae
non sponte
defluentes.

Tubercula
iuxta aures

Iudicationes
variae.

Theatrum
Epigenis.

Euagon.

Aglaidæ fili-
lia.

Epaminon-
das.

Silenus
Philiscus.

scripta signa omnia. Quibus autem vel horum quippiam be-
ne accideret, aut menses large apparerent, per hæc seruaban-
tur ac iudicabantur, neque ullam interitum noui, cui ex his
aliquid accidisset. Philonis enim filiae sanguis ex naribus lar-
ge fluebat. Septima autem die intempestiuus cœnauit &
mortua est. Quibus in febribus acutis, magis ardentibus, la-
chrymae inuitæ defluunt, his sanguinis à naribus eruptionem
expectare oportet, si etiam alia perniciose nō habeant. Nam
his qui male habent, nō sanguinis eruptionem, sed mortem
significant. Tubercula iuxta aures in febrientibus cum do-
lore oborta, quibusdam febre iudicatorio modo deficiente,
neque sedantur, neque suppurantur: hæc biliosum alui pro-
fluuium, aut dysenteria, aut crassarum urinarum subiden-
tia soluit. Velut Hermippo Clazomenio. Iudicationes au-
tem ex quibus cognoscimus, aut similes sunt, aut dissimiles.
Velut duo fratres qui simul eadem hora agrotare cœperunt
Decumbebant autem iuxta theatrum Epigenis fratres. Ho-
rum seniori sexta die iudicatio facta est, iuniori verò septi-
ma. Recidua facta est utrisque simul eadem hora. Inter-
misit dies quinque. Ex recidua iudicatio facta est utrisque si-
mul in totū, die decima septima. Plurimis autē sexta die iudi-
catio facta est, intermisit sex. Ex reciduiis autem iudicatio fa-
cta est quinta die. Quibusdam verò septima iudicatus est
morbus, & septem diebus intermisit. Ex recidua verò iudi-
catus est tertia. Quibusdam autem iudicatus est quinta, in-
termisit septem, rediit per tres, intermisit unam, insuperque
unam rursus occupauit. Aliquibus verò iudicatus est sexta,
intermisit sex, rediit per tres, intermisit unam, & una iudi-
catus est: Velut Euagonti Daiphantis filio. Quibusdam au-
tem iudicatus est sexta, intermisit septem: ex recidua verò
iudicatus est quarta. Velut filiae Aglaidæ, plerique igitur
ex his qui agrotarunt in hac constitutione, hoc modo agro-
tarunt, & nullum noui ex his qui superstites manserunt: cui
non rediissent reciduae secundum rationem fientes, & ser-
uati sunt omnes quos ego noui, quibus hoc genus reciduae
factæ sunt. Neque agrotantium hoc modo vllum aliquem
noui, quem recidua iterum repetiisset. Moriebantur au-
tem in morbis his plurimi sexta die: velut Epaminondas, &
Silenus, & Philiscus Antagoræ filius. Quibus autem tu-
berc

Abercula iuxta aures facta essent, his iudicatio facta est vigesima die. Restincta autē ac sedata sunt omnibus, & non suppurata sunt, sed ad venicam conuersa. Cratistonaecti qui apud Heracleiam habitabat, & Scymni fullonis ancillæ suppura-
uerunt, & mortui sunt. Quibus autem iudicatus est septima die, intermisit nouem, reuersus est morbus. Iudicatus est ex recidua quarta die. Quibus autē iudicatus est septima die, intermisit sex, deinde rediit, & iudicatus est septima velut Phanocrito, qui decumbebat apud Gnathonem pictorem.

Tubercula
post aures
Cratisto-
nax.

Heracleius
Scymnus.

Phanocri-
tos.

Gnatho.

Sub hyemem circa solstitium hybernum, & vsque ad æquinoctium, perseuerabant quidem & febres ardentes, & phrenitides, & multi moriebantur. Iudicationes tamen transmutate sunt, & iudicatio facta est plurimis ab initio die quinta, intermisit quarta, recidua facta est, ex recidua vero iudicatio facta est quinta die. In summa quatuordecim diebus. Sic autem facta est iudicatio pueris plurimis, imo etiam senioribus. Quibusdam verò morbus iudicabatur die vndecima. Reuertebatur decimaquarta, iudicabatur perfectē vigesima. Si verò aliqui insuper rignissent circa vigesimam his iudicabatur quadragesima. Superriguerunt autem plurimi circa iudicationem ab initio. Qui verò circa iudicationem ab initio rignerunt, etiam in recidiuis vnā cum iudicatione rignerunt. Rignerunt autem paucissimi vere, æstate plures, autumno adhuc plures, hyeme longē plurimi. At sanguinis eruptiones cessabant.

C

SECTIO TERTIA.

Morbos dinoscimus edocti, ex communi omnium natura, & ex vniuscuiusq; propria, ex morbo, ex ægroto, ex his quæ offeruntur, ex eo qui offert. Ex his enim & breuioribus, & grauioribus redduntur: ex tota ac partiali constitutione celestium, & vniuscuiusq; regionis, ex victu, ex vitæ studiis, ex ætate cuiusq; sermonibus, moribus, taciturnitate, cogitationibus, somnis, vigiliis, insomniis quibusdam & quando, vellicationibus, pruritibus, lachrymis, exacerbationibus, secessibus, vrinis, sputis, vomitibus, & quæ ex quibus, in quos, successiones morborum: & qui abscessus ad perniciem, & ad iudicationem: Sudor, rigor, frigiditas, tussis, sternutationes, singultus, spiritus, ructus, flatus silentes, strepentes, sanguinis erup

Morborū
cognitio &
obseruatio
varia.

Hippocratis Liber I.

eruptiones, hæmorrhoides, ex his autē, & quæ per hæc fiunt. **D**
Febriū spe considerandum. Febres quædam continuæ sunt, quædam in-
cies. terdiu tenent, noctu intermittunt. Aut nocte tenent, die in-
 termittunt. Semitertiana, tertianæ, quartanæ, quintanæ, se-
 ptimanæ, nonanæ. Sunt autem acutissimi, & maximi ac gra-
 uissimi morbi, & maximè lethales, in continua febre. Secu-
 rissima verò omnium, & facillima ac longissima est quarta-
Quartana. na. Non enim solum ipsa à seipsa talis est, sed etiam ab aliis
Semitertia magnis morbis liberat. At in semitertiana appellata, con-
na. tingit quidem & acutos morbos fieri, & est hæc præ cæteris
 maximè lethalis. Sed & tabidi, & quicumque ex aliis longis
 morbis ægrotant, ex hac maximè ægrotant. Nocturna non
Nocturna. admodum lethalis est, verum longa. Diurna longior. Qui- **E**
Diurna. busdam autem & ad tabem vergit. Septimana longa est,
Septimana. verum non lethalis. Nonana adhuc longior, & non letha-
Nonana. lis. Tertianæ exacta cito iudicatur, & non est lethalis.
Tertiana. Quintana pessima omnium est. Nam & ante tabem, & iam
Quintana. tabidis superueniens, occidit. Sunt autem modi, & consti-
Continua. tutiones, & exacerbationes singularum harum febrium, æquæ
 continuarum ac intermittentium. Velut verbi causa, Conti-
 nua quibusdam ab initio floret, & viget maximè, & ad dete-
 rius procedit. Circa iudicationem verò & unā cum iudicatio-
Continuæ ne imminuitur. Quibusdam verò molliter incipit & sub-
febris va- misse, augetur autem & exacerbatur quotidie, Circa iudica-
rietas. tionem verò & unā cum iudicatione, acruatim elucet. Qui-
 busdam leniter auspiciata augetur & exacerbatur, & ubi ali- **F**
 quando in vigore fuit, rursus remittit usque ad iudicationem,
 & circa iudicationem. Atque hæc contingere solent in omni
 febre, & in omni morbo. Oportet autem victus rationem ex
 horum consideratione offerre. Multa verò etiam alia signa
 his sunt cognata, de quibus partim scriptum est, partim scri-
 betur. Ad quæ ratiocinari oportet, examinareque ac consi-
 derare, cui horum acutus ac lethalis sit morbus, aut à quo su-
 perstes sit futurus, & cui offerendum sit, aut non, & quando,
 & quantum, & quid offerendum erit. Quæ verò paribus
 diebus exacerbantur, paribus iudicantur. Quorum autem ex-
 acerbationes in imparibus fiunt, ea in imparibus iudicantur.
Decreto- Est autem primus iudicatorius, ex circuitibus diebus pari-
ria paria bus iudicantibus, quartus dies. Deinde sextus, decimus, de-
vel non pa- cimūsq
ria.

A cimus quartus, decimus octauus, vigesimus, vigesimus quartus, vigesimus octauus, trigesimus, trigesimus quartus, quadragessimus, sexagesimus, octogessimus, & centesimus vigesimus. Ex circuitibus verò in imparibus diebus iudicantibus, primus est dies tertius: deinde quintus, septimus, nonus, vndecimus, decimus septimus, vigesimus primus, vigesimus septimus, & trigesimus primus. At verò nosse expedit, si aliter iudicatio fiat, extra præscriptos dies, recidiuas fore significat, & fuerit sanè perniciofa. Oportet autem animaduertere nosse, in his temporibus iudicationes futuras esse, ad salutem, aut **Iudicatio-** perniciem, aut inclinationes ad melius, aut deterius. Erroneæ **nes bonæ** porro febres, & quartanæ, & quintanæ, & septimanæ, & non **vel contra,** **quæ.**

B nanæ, in quibus circuitibus iudicentur considerandum est.

AEGROTI QVATVORDECIM I.

Philiscus prope mauros habitabat, decubuit. Primo die febris acuta, sudauit, noctem laboriosam habuit. Secundo die omnia exacerbatæ sunt. Vesperī ab infuso per clysterem adhibito bene habuit, noctem quietam. Tertio mane vsque ad meridiem, visus est à febre liber esse. Ad vesperam febris acuta cum sudore, siticulosus erat, lingua reliccabatur, nigra minxit, noctem molestam habuit, nō dormiuit, omnino delirauit. Quarto omnia exacerbatæ sunt, vrinæ nigra, nox tolerabilior, vrinæ melioris coloris. Quinto circa meridiem parum de naribus stillauit non mixtum. Vrinæ varia, quæ habebant innatantia quædam rotunda, genituræ similia, dispersa, non subsidebant. Subdita glande, flatuosa pauca prodierunt, noctem habuit laboriosam, somni parui, sermones, deliramenta, extremitates vndique frigida, & non amplius recalescentes, minxit nigra, dormiuit parum, ad diem voce destitutus est, frigidum sudauit, extremitates liuida. Circa **Philisci** meridiem sexta die mortuus est. Huic spiritus ad finem vsq; **mors.** velut reuocanti, rarus & magnus. Splen eleuatus est orbiculari gibbositate. Sudores frigidi perpetuò. Exacerbationes diebus paribus.

AEGROTVS II.

Silenus habitabat in Platamone, prope filios Eualcidis. Hunc ex lassitudinibus, & potationibus, ac exercitiis in- **Silenus.** tempestiuus febris corripuit. Cœpit autē agrotare ex lūbis, & cap

Hippocratis Liber I.

Quarta va-
rietates vide
re.

Sileni
mors.

& caput grauitas tenebat, & colli distentio erat. Ab aluo pri-
ma die biliosa, mera, spumosa, abunde colorata, multa pro-
dierunt. Vrina nigre nigra subsidentiâ habentes, siticulosus
lingua resiccata, nocte nihil dormiuit. Secunda die febris a-
cuta, secessus plures, tenuiores, spumosi, Vrina nigre, nox mo-
lesta, parum delirauit. Tertia omnia exacerbata sunt, præ-
cordij distentio vtrinque oblonga, ad vmbilicum submollis.
Secessus tenues, subnigri. Vrina turbata, subnigra. Nocte
nihil dormiuit, sermones multi, risus, cantus, continere se non
potuit. Quarta per eadem. Quinta secessus meri, biliosi, le-
ues pingues. Vrina tenues, pellucidæ, parum resipiscebant.
Sexta circa caput parum sudauit, extremitates frigida, liui-
dæ. Iactatio multa, ab aluo nihil prodit. Vrina suppressæ
sunt, febris acuta. Septima die voce destitutus est, extremita-
tes non amplius recalescebant, nihil minxit. Octaua sudauit
frigidum per totum sudorem: papulae cum sudore rubrae, ro-
tundæ, parua, velut vari permanebant, non abscedebant. Ab
aluo vero cum parua irritatione, stercora tenuia velut incô-
cocta, multa prodibant cum dolore. Vrinam reddebat cum
dolore mordacem. Extremitates parum recalescebant. Somni
tenues, soporosi. Vox intercepta. Vrina tenues, pellucidæ.
Nonna per eadem. Decima potum non suscipiebat, Soporosus
erat. Somni autem tenues. Ab aluo similia. Minxit acervatim
subcrassum, depositum subsidens, subsidentiâ crassæ farinae
similis, alba. Extremitates rursus frigida. Undecima mor-
tuus est. Ab initio huic & ad finem usque spiritus magnus ra-
rus: præcordij palpitatio assidua. Aetas erat circa annos vi-
ginti.

ÆGROTUS III.

Herophon.

Herophonti febris acuta. Ab aluo pauca ab initio velut
in tenesmo. Postea vero tenuia prodibant biliosa, fre-
quentiora. Somni non aderant. Vrina nigra, tenues. Quinta
mane surditas. Exacerbata sunt omnia. Splen eleuatus est.
præcordij distentio. Ab aluo pauca, nigra prodierunt, delira-
uit. Sexta delirabat, ad noctem sudor, frigiditas, delirus per-
manebat. Septima perfrigerabatur. Siticulosus, delirabat
noctu resipiscebant, obdormiuit. Octaua febricitauit, splen
minuebatur, intelligebat omnia, doluit iuxta inguē, tumor
primum è directo splenis. Deinde dolebat utraq; tibias,
noct

Anox tolerabilis. urinae coloris melioris paruum subneque siti-
habebant. Nona sudauit, iudicatus est morbus, inter urinae te-
Quinta reuersus est. Statim autem splen eleuatus est, rubra,
acuta, surditas rursus. post recidiuam tertia die splen miris est,
batur, surditas minor erat: crura dolebant, noctu sudauit. Ibe-
dicatus est die septimadecima. Neque delirauit in recidiua.

A E G R O T V S I I I I.

IN Thaso Philini uxorem, quam filiam pepererat, quam pur-
gatio secundum naturam facta esset, & alias leuiter dege-
ret, decimaquarta à partu die febris vehemens corripuit cum
rigore. Ab initio verò cor dolebat, & circa praecordium dex-
terum: muliebrium partium dolores. purgatio cessauit. Vbi
Bverò glandem subdidisset. haec quidem leuiora facta sunt.
Capitis autem, colli & lumborum dolores permanebant.
Somni non aderant. Extremitates frigidae. Siticulosa erat.
alius combusta: pauca egerebat. Urinae tenues, ab initio de-
colores. Sexta die ad noctem multum delirauit, & rursus re-
sipiscebat. Septima siticulosa: secessus biliosi, abundè colora-
ti. Octaua superriguit. febris acuta: conuulsiones multae cum
dolore, multum delirabat. Glande subdita exurgebat, mul-
taeque cum fluxione biliosa prodibant. Somni non aderant.
Nona conuulsiones. Decima parum resipiscebat. Undecima
dormiuit, omnium recordata est. Statim autem rursus deli-
rauit. Urinam autem reddebat cum conuulsionibus, acerua-
tam, multam: illis autem parum admonentibus, crassam al-
Cbam: qualis est ex his quae subsiderunt, ubi multo tempore
sita, fuerint conturbata: non subsidebat, color & crassitudo
talis, qualis est in urinis iumentorum. Talia mingebat, quae
& ego vidi. Circa decimumquartum diem palpitationes
per totum corpus, sermones multi, parum resipiscebat. Ve-
rùm statim rursus delirabat. Circa decimumseptimum vo-
ce destituebatur. Vigesima mortua est.

Philini
iunx puer-
pera.
Thasus.

Morshuius

A E G R O T V S V.

EPicratis uxorem, quae decumbebat apud Archegetem,
partui iam propinquam, rigor fortiter corripuit: non in-
caluit, velut dicebant. Et postridie eadem erant. Tertia die
peperit filiam, & alia omnia iuxta rationem venerunt. Po-
stridie à partu febris acuta eam inuasit, cordis dolor & mu-
liebrium partium. Vbi verò glandem subdidisset, haec quidē
S leuio

Epicrates.
Archege-
tes.

Quarta va-
rietas vid-
te.

Lateris do-
lor.

Non perit.

Cleanasti-
des.

& caput g^{ra}ta sunt. Capitis autē & colli ac lumborum dolor. D
ma die non aderāt. Ab aluo modica biliosa, tenuia, pura pro-
dierunt. Vrinæ tenues, subnigræ. Sexta die à quo febris ipsam
ling^g puit, ad noctem delirauit. Septima omnia exacerbata
c^uit, vigilās delirauit, siticulosa, secessus omnes biliosi abun-
dē colorati. Octaua superriguit, plus dormiuit. Nona per ea-
dem. Decima crura laboriosē dolebat. Cordis dolor rursus;
capitis grauitas: nō delirauit. magis dormiuit: aluus restitit.
Vndecima sudauit: minxit melius colorata, multam subside-
tiam habentia: leuius degebat. Decimaquarta superriguit.
febris acuta. Decimaquinta vomuit biliosa, flaua, satis mul-
ta. Sudauit sine febre. Ad noctem febris acuta. Vrinæ crassæ
subsidentiam albam habentes. Decimasexta ad noctem exa-
cerbata est, & cum molestia nō dormiuit, delirauit. Decima
o^octaua siticulosa, lingua combusta est: nō dormiuit, multum
delirauit: crura dolebat. Circa vigesimam mane parum ri-
guit, soporosa, quietē dormiuit, vomuit biliosa, pauca, nigra.
Ad noctem surditas. Circa vigesimam primam lateris fini-
stri grauitas, per totum cum dolore, parum insuper tussit.
Vrinæ crassæ, turbatæ, subrubræ, quæ depositæ non subside-
bant, cetera leuiora: non sine febre. Statim ab initio fauces
dolebat, rubor aderat, columella reuulsa, fluxio acris, mor-
dax, salsa, perpetuō perseuerabat. Circa vigesimā septimam
febri libera, in vrinis subsidentia: latus dolebat. Circa primā
& trigesimā febris corripiebat, aluus ex biliosis turbata est.
Quadragesima die vomuit pauca biliosa: Iudicata est perfe-
ctē libera à febris die octogesima.

AEGROTVS VI.

Cleanastiden qui supra Heracleum decumbebat, febris
corripuit erroneo modo. Dolebat autem caput ab ini-
tios & latus sinistrum: & aliarum partium dolores aderant,
lassatorum modo: febres exacerbantur aliās aliter inordina-
tē. Sudores quandoq; quandoq; non. Exacerbationes vt plu-
rimū in iudicatoriis diebus magis accedebant. Circa vige-
simam quartam summas manus dolebat. Vomuit biliosa,
flaua, sitis multa. Paulò post autem æruginosa. At omnibus
alleuatus est. Circa trigesimam sanguis ex vtrisque naribus
erumpere cœpit, atque hoc erroneo modo paulatim vsque
ad

A ad iudicationem. Non autem fastidiebat cibum, neque siticulosus erat per totum tempus, neque insomnis. Urinae tenues, non decolores. Circa quadragesimā minxit subrubra, subsidentiam multam valde rubram habētia, alleuatus est, post hæc autem urinae variae, quandoque subsidentiam habebant, quandoque non. Sexagesima urinis subsidentia multa, & alba, & levis. Remiserunt omnia, febres intermittebant. Urinae tenues quidem, verū boni coloris. Septuagesima à febre liber permansit diebus decem. Octogesima riguit, febris acuta corripuit, multum sudavit. Urinis subsidentia rubra, levis, perfectè iudicatus est. Non moritur.

B AEGROTUS VII.

Meronem febris vehemens corripuit, lumborum graui- Meron.
tas dolorosa. Postridie ubi aquā bibisset satis multam, ab alio probè prodiit. Tertia capitis grauitas. Secellus tenues, biliosi, subrubri. Quarta omnia exacerbat sunt. Fluebat à dextra nare bis sanguis modicus. Noctem molestè tulit. Secellus similes tertiæ diei. Urinae subnigræ, habebant quiddam in medio innatans, subnigrum, diuulsum, non subsidebant. Quinta effluxit ex sinistra nare sanguis largus, merus. Sudavit, iudicatus est. Post iudicationem insomnis, delirabat. Urinae tenues, subnigræ. Capitis lotionibus usus est, dormiuit, resipiscebat. Huic recidiua facta non est. Sed sanguis erupit sæpe etiam post iudicationem.

C AEGROTUS VIII.

Erasinum qui habitabat circa Bootæ torrentem, febris Erasinus.
vehemens corripuit post cœnam, nocte turbatus fuit, Bootes.
diem primam quietē, noctem laboriosè transegit. Secunda omnia exacerbat sunt, ad noctem delirauit. Tertia dolorosè, multum delirauit. Quarta molestissimè, ad noctem nihil dormiuit. Insomnia & ratiocinationes, deinde peiora, & magna, & periculosa, timor, molestia. Quinta manè resipiscebat ac intelligebat omnia. Verū ad meridiem multum insaniit, continere se non potuit. Extremitates frigidæ subliuidæ. Urinae inconcoctæ. Circa solis occalum mortuus est. Huic febres perpetuò cum sudore, præcordia sublimia, distentio cum dolore. Urinae nigræ habentes quædam Mortuus.

Hippocratis Liber I.

dam in medio suspensa innatantia rotunda, non subsidebāt. **D**
Ab aluo stercora prodibant. Sitis perpetuo non valde. Con-
uulsiones multæ cum sudore, circa mortem.

A E G R O T V S I X.

Critonis ca-
sum video **C**ritoni in Thaso erectè obumbulanti, pedis dolor for-
tis à magno digito cæpit. Decubuit eadem die, horri-
dus, anxius, parum subcalescens, nocte desipuit. Secunda die
tumor laxus per totum pedem, & circa malleolum subru-
bens cum distentione. Pustulæ nigræ, febris acuta, insaniit.
Ab aluo verò mera, biliosa, satis multa prodibant. Mortuus
est altera ab initio die.

A E G R O T V S X.

Clazomeni-
nius. **C**lazomenium qui ad Phrynichidæ puteum decumbe-
bat, febris vehemens corripuit. Dolebat autem caput,
collum, lumbos ab initio. Statim autem surditas. Somni non
aderant. Febris acuta inuasit. Præcordium eleuabatur cum
tumore, distentio non valde, lingua sicca. Quarta ad noctem
desipuit. Quinta laboriosè omnia exacerbatæ sunt. Circa vn-
decimam parum remiserūt. Ab aluo verò ab initio & vsque
ad decimam quartam, tenuia multa aquei coloris prodibāt.
Toleranter ea quæ ad secessum pertinent, ferebat. Postea
alius resistit. Vrinæ perpetuò tenues quidem, verum boni
coloris, & multa in medio suspensa habebant diuulsa, non
subsidebant. Circa decimam sextam minxit paulò crassiora,
habebant subsidentiam parua, paululum alleuarunt, resi-
piscabat magis. Decima septima rursus tenuia. Circa vtrâsq; **F**
aures tubercula extiterunt cum dolore. Somni non aderant,
delirabat. Circa crura dolebat. Vigesima à febre liber iudi-
catus est, non sudauit, omnia intelligebat. Circa vigesimam
septimam coxæ dextræ dolor fortis, cito quieuit. Tubercula
verò iuxta aures neque sedata sunt, neque suppurata, verum
dolebant. Circa trigessimam primam profluuiū alui ex mul-
tis aquosis, cum eiusmodi quæ in dysenteria prodire solent.
Vrinas crassas mingebat. Tubercula circa aures sedata sunt.
Circa quadragesimum oculum dextrum dolebat, obscurius
videbat. Restitutus est.

A E G R O T V S XI.

Dromea-
des. **D**romeade vxorem quæ filiam pepererat, & aliis om-
nibus secundum rationem factis, secunda die rigor
corri-

A corripuit, febris acuta. Cœpit autem prima die dolere circa præcordia fastidiosa ac nauseabunda, horrida, anxia, & sequentibus non dormiuit, Spiritus rarus, magnus, statim reuulsus. Altera à rigore die, stercora ab aluo bene prodibant. Vrinæ crassæ, albæ, turbatæ: qualis sit ex his quæ subsiderūt, vbi multo tempore sita, fuerit conturbata: non subsidebant, nocte non dormiuit. Tertia circa meridiem superriguit. Febris acuta. Vrinæ similes, præcordij dolor, fastidiosa ac nauseabunda, nox molesta, nō dormiuit. Sudauit per totum subfrigida. Statim autē rursus recalefacta est. Quarta die circa soporē incidit, parū de naribus stillauit. lingua sicca, siticulosa. Vrinæ tenues, oleosæ. parū dormiuit: Quinta siticulosa, fastidiosa. Vrinæ similes, nihil ab aluo. Circa meridiē multum delirauit, & statim rursus parum resipiscebat. exurgens in soporem incidit, frigiditas parua, nocte dormiuit, delirauit. Sexta mane superriguit. Statim autem recalefacta est. Sudauit per totum. Extremitates frigida, delirauit. Spiritus magnus, rarus. Paulo post conuulsiones à capite cœperunt. Statim mortua est. Moritur hæc.

AEGROTVS XII.

Homo quidam calefactus cœnauit, & bibit amplius. Vomuit omnia noctu, febris acuta. Præcordij dextri dolor. Inflammatio submollis ex interna parte, noctem moleste tulit. Vrinæ ab initio rubræ, crassæ, depositæ non subsidebant. Lingua sicca, non valde siticulosus. Quarta febris acuta Dolores omnium. Quinta minxit leue, oleosum, multum, febris acuta. Sexta vesperi multum delirauit. Nec nocte dormiuit. Septima omnia exacerbata sunt. Vrinæ similes, sermones multi, continere se non potuit. Ab aluo cum irritatione prodierunt liquida turbata, cum lumbricis. Nox laboriosa. Mane riguit, febris acuta. Sudauit calidum. A febre liber esse visus est, non multum dormiuit. A somno frigiditas, sputatio. Vesperi multum delirauit. Paulo post vomuit nigra, pauca, biliosa. Nona frigiditas, multum delirabat, non dormiuit. Decima crura dolebat. Omnia exacerbata sunt delira. Hic periit. Undecima mortuus est.

Hippocratis Liber I.

AEGROTVS

XIII.

D

Mulierem quæ decumbebat in littore, trimestri fortu-
gravidam febris vehemens corripuit, statimque lum-
bos dolere cœpit. Tertia dolor colli, capitis, iuxta clauicu-
lam, & manum dexteram. Statim lingua voce destituta est
dextra manus resoluta est cum cōuulsione, velut his qui ali-
qua siderantur parte contingere solet. Delirabat penitus: no-
ctem molestè tulit, non dormiuit. alius turbata est, ex bilio-
sis, meris, paucis. Quarta die lingua voce soluta est. Conuul-
siones eorundem. dolores omnium permanebāt. Iuxta præ-
cordia tumor cum dolore. non dormiebat penitus delirabat,
alius turbata. Vrinæ tenues, non boni coloris. Quinta fe-
bris acuta. præcordij dolor. planè delirabat. secessus biliosi. **E**
ad noctē sudauit, à febre libera. Sexta resipiscebat. Ab omni-
bus alleuata est. Verùm circa sinistram clauiculam dolor
permanebat. siticulosa. Vrinæ tenues. non dormiuit. Septi-
ma tremor. in soporē incidit, parum delirauit. dolores iuxta
clauiculam, & sinistrum brachium permanserunt. Reliqua
alleuata sunt. Omnia intelligebat. Tres dies à febre libera
mansit. Vndecima reuersa est, superriguit, febris vehemens
corripuit. Circa decimam quartam vomit biliosa, flaua, satis
multa. sudauit. A febre libera iudicata est.

Non mori-
tur hæc.

AEGROTVS

XIIII.

Melidia.
Iunonis tē-
plum.

Melidia, quæ decumbebat iuxta Iunonis templum, ca-
pitis & colli, & pectoris dolor fortis cœpit. Statim au-
tem febris acuta corripuit. Menses pauci apparebant. Dolo- **F**
res omnium horum cōtinui. Sexta die soporosa, anxia,
horrida. rubor in maxilla. parum delirauit. Septi-
ma sudauit. febris dimisit. Dolores permane-
bant. Rediit. somni, pauci. Vrinæ perpetuò
boni coloris, verùm tenues. Secessus te-
nues, biliosi, mordaces, valde pauci,
nigri, graucolentes prodibant. In
vrinis subsidentia alba, le-
uis. Sudauit. Iudica-
ta est perfectè vn-
decima
die.

HIPP.

320
A H I P P O C R A T I S

COI DE MORBIS PO.

PVLARIBVS LIBER SE-

CVNDVS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER

PRETE.

*

SECTIO PRIM A.

B



ARBVNCVLI in Cranone aestiui, pluebat in ardoribus aqua larga. Contingebat hoc per totum, & maxime ab austro. & subnascebantur quidem in cute sanies. dum autem intro concipiebantur, calescebant, & pruritus inducebant. Deinde pustulae velut ab igne inustae erant, & sub cutem vni sibi videbantur, in ardoribus siccitatis. Febres plerunque citra sudorem. In his verò si minutae imbris guttae deciderint, magis sudatoriae fiunt ab initio. At haec difficiliora iudicatu manent, quam aliter: Attamen minus, si non propter haec fuerint, sed propter morbi modum. Febres ardentes in aestiuis magis fiunt, & in aliis temporibus. Resiccantur autem magis aestate. Autumno maxime ferinum, & oris ventriculi dolor, quanquam & ipse minus maleficus fuerit, ipso morbo tali existente. Ascarides vesperi similiter huic, & illae tunc infestant in die plerunque, non solum ideo quod magis affligunt, sed etiam ipsae per seipsas. In autumno acutissimi morbi & maxime lethales: & omnino similitudinem habet, eo quod vesperi exacerbantur: tanquam annus ipse habeat circuitum morborum. Quale est dies morbi, quale est vespertinum tempus ad exacerbationem. Tale est morbi, & vniuscuiusque constitutionis inter se, ubi non quid in superiori specie fuerit innouatum. Sin minus, alia sane constitutione haec imperium obtinuerint. Quare etiam annus ad seipsum hoc modo se habet. In quietis ac constantibus temporibus & annis tempestiue tempestiua praebentibus,

Carbunculus.
Cranon.

Ascarides
quando magis vexant

Perinthus

bentibus, boni status & iudicatu facillimi morbi fiunt. In D
inconstantibus verò, inconstantes & qui difficulter iudican-
tur: quum sanè in Perintho defecerit aut abundauerit quid,
ut aut venti sint, aut nò venti: aut aqua, aut siccitates, aut ar-
dores, aut frigora. Ver autem omnino saluberrimum, ac mi-
nimè lethale. Circa principia morborum considerandum an
statim florent. Clarum autè hoc sit ex incremèto. Incremen-
ta verò ex circuitibus, & iudicationes quoque hinc magis
statim fiunt, itémque ex acerbationibus in circuitibus, si
accedant, aut nò: & si diutius durent, aut nò: & si magis affi-
gant, aut non. Ex omnibus autem continuis aut intermit-
tentibus, & diuturnis, & vulneribus, & sputis, & doloribus.

Quæ re-
deant.

Itémque tuberculorum inflammationes, & quæcunq; alia E
posterius apparent, fortassis autè & ex aliis communibus re-
bus, quæ quidem citius fiunt, breuiora sunt. Quæ verò tar-
dius, longiora: quum etià in circuitibus exteriorem recursum,
ac reliquum augmentum, morbus neget. Nā & eorum qui
statim pereunt, velociore sunt iudicationes, quoniam & do-
lores, & continui ac fortes. Quæ verò ad melius iudicant, non
statim apparent. Iudicatoria nò iudicantia, partim lethalia
sunt, partim difficilis iudicationis. Quæ præiudicata sunt, si
crude iudicata fuerint, recidiunt: Sin minus, iudicatio-
nis impeditioes aut malæ iudicationes. Possunt etiam fieri
perniciosa, ea quæ nò parua sunt. Quæcunque iudicatoria si-
gna fiunt, eadem hæc si non fiunt, difficilis sunt iudicationis.
Quæ verò contraria significant, malum: non solum si recur- F
rant: sed etià primariæ naturæ contraria repentia. Quem-
admodum etià malorū signum, ea quæ ad contraria repunt.
Cōsiderare verò sic oportet, in cibis, compressionibus vena-
rum, tumoribus præcordiorum, sursum vergentibus, deor-
sum vergentibus. Sed & multa sunt eiusmodi, velut aborti-
entium mammæ graciles fiunt, neque enim cōtrarium est:
Neque tusses diuturnæ, quoniā ubi testis intumuit, cessant:
& testis tumor a tussi cessat & alleuatur: quæ res commone-
facit nos cōmunionis pectorum, mammarū, genituræ, vocis.
abscessus aut per venas, aut per ossa, aut nervos, aut cutē, aut
alias emotiones. Boni autem sunt qui infra morbum fiunt,
velut varices, lumborū grauitates ex supernis. Optimi ve-
rò potissimum sunt inferni, & longissimè infra ventrem, &

Tussis fe-
dario: testiū
umor, &
contrà.

Abscessus
boni.

A remotissimi à morbo : & qui per effluxionē fiunt, velut sanguis è naribus, pus ex aure, sputum, vrina, quæ per effluxionem fiunt. At abscessus quibus hæc non fiunt, sunt velut dentes, oculi, nasus, sudor. Sed & quæ sub cutem abscedūt foras tubercula, velut putrescentia, & quæ suppurantur, aut vlcus, aut eiusmodi pustulæ, aut squamæ, aut defluuium capillorū, viriliginēs, lepræ, aut eiusmodi quæ abscessus sunt aceruarim fluentes, & non semirepentes, & quæcunque alia dicta sunt. & si non pro rationis excretionis morbi dignitate fiant, velut Temeni nepti, ex morbo fortī ad digitū decubuit, qui quum non sufficeret ad suscipiendum morbu, recurrit. Mortua est. Abscessus aut per venas, aut per aluum, aut per nervos, aut per cutem, aut iuxta ossa, aut secundum spinalē medullam, aut secundum alias effluxiones, os, pudendum, aures, nares, ex vtero menses. Iudicationes postridie fiunt, velut ad lumbos, aut ad femur, & ad testes, Quandoque ex tussi, & testis ipse à seipso. Tussiculosi abscessus, qui supra ventrem sunt, non similiter perfectē liberant. Sanguinis eruptiones largæ ex naribus plerunque liberant, velut Heragoræ, quod medici non animaduenterunt. Qui voces asperas natura habent, his etiam linguæ subasperæ sunt, & quæcunque asperitates à morbis similiter. Quæ igitur duræ sunt linguæ à natura, etiam sine morbo hoc habent. Molles verò tardiores sunt, & ad peccatum, & ad bonum, quàm prior natura. Consideranda sunt etiam longa capita, ex viuēdi ratione, & ceruices longæ, ab inclinationibus, & venarum amplitudo & crassitudo, ab eadem, & angustia, ac latitudines, & breuitates, ac tenuitates, ex cōtrariis. Quorum venæ amplæ, & venæ, & ossa ampla, hi sunt qui tenues sunt. Pingues verò his contraria habet. & in his qui fame macerantur, mediocritates. Ac his cōsideranda ea sunt quæ præpropera incrementa unicuique detrahunt, & quæ diminutiones adaugent. & ea quæ incrementa coadugēt, & quæ corroborant. Et quæ sint communes venarum dissectiones. Pectinum ruptiones quæ obseruantur. Quidem circa pubē fiunt, vt plurimum statim sunt innoxie. Quæ verò paululum supra vmbilicum in dextera parte, hæc dolorosæ sunt & anxiosæ & stercoris vomitum inducunt, velut etiā Pittaco accidit. Fiunt autē hæc, aut à plaga, aut vultu ra aut alterius insultu. Quibus id quod medium est inter

Temeni neptis.

Heragoras. Lingua vocisque diuersitas. Caput oblongum & ceruix. Macri. Pingues.

Quæ in his obseruantur.

Pittacus.

S S

abdomen

Quia icter
affectu &
lien creant.

abdomen & cutem inflatur, & non sedatur. Color est velut R
qui multum pallidus est, & qui ex candicante paller: quonia
omne huiusmodi ab hepate est, & ex hoc sunt hepatici in his
morbi. & morbi regij ab hepate, ad subalbidum colorem
vergunt. & qui ex aqua inter cutem, & ex pituita alba labo-
rant. Qui verò à splene sunt, tum hydropes, tum morbi re-
gij, nigriores sunt. Sed & vlcera quæ agrè perfanantur ex al-
bidorum sunt, qui ferè lentis colorem referunt: & cutis dif-
fringitur ac labia, velut Antilochus habuit & Aleuas, ab hu-
moribus & corpore caliginoso, quod sub cute maximè, & à
capite contingit, quum à pulmone fuerit calefactum. Occa-
siones vnde quis agrotare cœpit, & considerare oportet, siue
capitis sit dolor, siue auris, siue lateris. Signum autem sunt E
in quibusdam dentes, & in quibusdam inguinum tumores.

Antilochus.

Antilochus.

Milium
quid tol-
lat.

Vlcera fientia ac iudicantia febres, & tubercula. Quibus
hæc non fiunt, iudicatio sublata est. Quibus intus relinquin-
tur, certissimæ recidiuæ ac celerrimæ. Crudos ac liquidos
secessus, milium solidum in oleo coctum sistit. Exemplo est
nautæ puer, & Myriochoaune.

SECTIO SECUNDA.

Cordis do-
loris mede-
la.

Mulier cor, hoc est os ventriculi dolebat, & nihil remit-
tebat dolor. Huic polentæ pollen in mali punici suc-
cum inspersus, & semel in die acceptus in cibo satis fuit, &
non reuomebat, velut Charioni contigit. Mutationes pro-
sunt, si non ad praua mutantur, velut his qui à medicamen- F
tis vomunt febrium gratia. Fines in meraciore desinen-
res, putrefactionem significant, velut Dexippo. Serapis ex
liquida alio intumuit. Pruritus autem haud scio quot die-
bus, non ultra. Habebat autem & abscessum quendam in la-
teris mollitudine, qui nigrefactus occidit. Et Stymargi
vixor ex ventris per paucos dies turbatione, vbi multum in-
sistendo laborasset, & post pueri sexus fœminæi quadrime-
stris ex corruptione discessum sana facta esset, intumuit.

Dexippus.
Serapis.

Stymargus.

Moschus.

Moscho è calculo laboranti fortiter, in superna palpebra
ordeolum obortu est magis ad aurem. Deinde intro exulce-
ratum est. Quinta & sexta die ex internis pus erupit. In-
fernas affectiones soluit. Glandularum tumor ac inflam-
matio circa aurem erat, itémque infernè in collo, è directo
superni

A superni tumoris. Aristæi vxoris frater fatigatus in via in- **Aristæus**
 calefcebat. Deinde in tibia tumores fiebant terebinthi fru-
 ctui similes. Postea febris continua fiebat, & postridiè sudor
 factus est, & aliis paribus diebus semper idem fiebat. Adhuc
 autem febris tenebat. Erat autē sublienofus. Ex sinistra na-
 re sanguis erumpebat frequenter & paulatim. Iudicatus est.
 Postridie iuxta sinistram aurem tumor. Sequenti die etiam
 circa dextram, sed hic minor, & insuper repescebat. Hi eua-
 nuerunt, & non suppurati sunt. Qui ab Alcibiade venit, ei ex
 febribus modicis ante iudicationem testis sinister intumuit.
 Habebat autem splenem magnum, & sanè tunc iudicata est
 febris vigesima die. Deinde aliàs atque aliàs subincalesce-
 bat, & subfloridum spuebat. Cuidam manus dextra, & crus
 sinistrum quum ex tussi parū & nihil memorabile eiecisset,
 siderationis modo resoluta sunt: alia verò nulla re alterata
 est, neque facie, neque mente: Nec verò adeò fortiter illis par-
 tibus. Cœpit ad melius procedere circa vigesimam diem.
 Factum autem hoc est illi ferè circa mensium eruptionem, **Apemantus.**
 & fortassis tunc primum apparebant. Erat enim virgo Apem- **Nicostratus.**
 mantus & pater fabri illius qui caput fregit, & Nicostratus
 non extusiebat quicquam. Erant autem alibi circa rhenes
 dolores. Interrogationes factæ sunt, dicebant ipsos semper
 repleti potu aut cibo. Dolores fortissimos quo modo di-
 nouerit quis conspicatus, fuga, tolerantia, experientia, &
 timiditates indicant. Aqua quæ cito calefcit, & cito fri- **Aquæ co-**
 gescit, semper leuior est. Cibi & potus experientia opus **gnitio.**
 habent, an ad æqualitatem maneat. Dicendum quòd vbi
 sanguis effluxit, excalefcunt, & quæcunque alia huiusce-
 modi. Abortus masculus sexaginta dierum, in partium
 suppressionibus salubris. Hercules intumescebat mali **Hercules.**
 ipsius die octaua. Magis ex dysenteria laborat, quisquis sa-
 nè etiam è tenesmo vexatur. Quædam lactans pustulas per **Quæ lac**
 corpus vbique habebat. Postquam autem lactare cessauit, se- **præbebat.**
 data sunt per æstatem. Coriarij illius qui coriacea præ- **Coriarij**
 parabat, vxori, quum peperisset & perfectè exoluta esset, vi- **vxor.**
 sum est de secunda membranosum quiddam remanere: dis-
 cessit autem quarta die malè. Nam vrinæ stillicidio ve-
 xabatur. Statim concipiens peperit masculum. Habebat au-
 tem iam multos annos, & postremum neque menses produ-
 bant.

bant. Quādo autem peperisset, vrinae stillicidium paululum **D** intermittebat. Quādam priusquam conciperet, coxam dolebat. Postquam autem concepit, non amplius dolebat. Vbi verò peperit, vigesima die rursus doluit. Peperit igitur masculum. Prægnanti tibia infernè dextera, tertio aut quarto mense pustulæ, ad quas manna thuris vtimur, itémque in manu dextera iuxta magnum digitum: haud scio an peperit, reliqui enim ipsam semestrem, habitabat autē velut ego puto, in ædibus Archelai ad rupem. Antigenis vxor habitabat iuxta Nicomachum, peperit puerum carnosum quidem, verum qui haberet maximas partes discretas, magnitudine verò esset quatuor digitorum, & sine ousibus, deinde crassus ac rotundus. Hæc autem anhelosa erat ante partum. Deinde **E** simul cum partu pus reuomuit modicum, velut ex furunculo vocato tuberculo. Quæ filias peperit gemellas, & difficulter peperit, & non valde purgata est, tota intumuit. Deinde venter ipsi magnus fiebat. Reliqua verò reprimebantur, & rubicunda prodibant vsque ad sextum mensem. Deinde alba valde per omne iam tempus. Atque hæc fluxiones veneri officiebant, & mera rubicunda ipsi profluebant. In diuturnis intestinorum leuitatibus ructus acidus fiens, antea nunquam factus, signum bonum, velut Demaneta contigit. Fortassis autem licet etiam arte parare. Nam turbationes eiusmodi alterant. Fortassis autem & ructus acidi intestinorum leuitatem soluunt. Sanata est veratri potione Lycia postremum splen magnus, & dolores & febris, & ad humerum dolores. Et vena quæ in splene est, in cubito secabatur, & saliebat quidem sæpe, Aliquando verò etiam non est secta, sed vnà cum sudore sanguis penetravit, aut sua sponte. Ex quo autē prodibat, Splen dextera parte intendebatur, spiritus intus duplicabatur, non tamen magnus, mente mouebatur, contegebatur, flatus inerat, non prodibat infernè quicquam, neque mingebat. Mortua est ante partum. Quæ circa fauces ad alterutram partē repentina processerunt, exulcerata nō sunt, ad sinistra transiuerunt, ad splenem dolor venit citra iudicationem. Hieroni iudicatio facta est decimaquinta die. **F** Coi sorori hepar eleuatum est splenico modo. Mortua est secunda die. Bion simul multū mingebat quod non subsidebat, & sanguis ex sinistra nare manabat. Erat enim & splen sursum

Archelaus
Antigenis
vxor.
Nicomachus.

Partus gemellarum.

Intestinorum
leuitas.
Demane-
tas.

Lycia.

Hieron.

Bion.

A sursum in gibbum eleuatus, ac durus, superstes mansit, recidua. Erant autē anginosorum affectiones hæ. Colli verticula intro vergebāt, quibusdam ampliùs, quibusdam prope. Qualis angina. Et collum forinsecus conspicuam cauitatem intro habebat, & hac parte ad cōtactum dolebat. Erat autem & cuidam infra os dentis appellatum, quod non similiter acutum est: quibusdam verò etiam valde rotundum, maiore circumferētia.

Si non cum dente appellato, fauces non inflammatae, verū iacētes. Partes sub maxilla tumida, nō inflammatis similes. Neque glandulæ vlli intumuerunt. Sed magis secūdam naturam, linguam non facilē vertebant, ipsiſque & maior esse videbatur, & prominentior, & sub lingua venæ colpicuæ, deglutire non poterant, aut valde difficulter. Imò ad nares fugiebat, si valde cogerent, & per nares loquebantur. Spiritus autem his nō valde sublimis. Quibusdam verò venæ in temporibus, & in capitibus ac ceruice eleuata. At recrudescētibz, ex his, parū quiddam tempora calida, etiam si aliās nō febricitarent. Non suffocabantur plurimi, nisi quū deglutire cupiebant, aut saliuam, aut aliud quiddam. Neque oculi intus desidebant. Quibus igitur tumor erat rectus, nec in alteram partem vergebat, hi neque leuiter sideratorum modo resoluebantur. An verò aliquem periisse viderim, in memoriam reuocabo. Quos autem nunc noui, superstes manserunt. Erant autē partim celerrimē alleuantia. Plurima verò ad quadraginta dies deueniebant, & in hoc pleriq; etiam sine febre. Multi verò etiā ad valde longum tempus, partem anquam tumoris habebant. Et deglutitio, & vox indicabat, & columellæ liqueſcētes significationem quandam prauam exhibebant, quāuis nullum grauius malum habere videbātur. Qui verò tumores ad alteram partem vergentes habebant, hi vnde verticula inclinata fuerunt, isthic resoluebantur. Atque inde ad alteram partem distrahebantur. Erant autem hæc in facie maximē conspicua, & in ore & intersepto iuxta gurgulionem. Sed & maximē infernē pro ratione immutabantur. Cæterum resolutiones leuiter sideratorū modo, non per totum corpus fiebant veluti ex aliis, sed vsq; ad manum, ab anginosa affectione. Atque hi & matura expuebant, eaque pauca ac difficulter. Quibus autem in rectum tumor tendebat, itidem expuebant. Quibus verò etiam cum febre,

febre, hi multò magis & difficulter spirabant, & aliena lo-
quebantur, & venæ his magis eleuatæ. Et pedes omnibus
quidem frigidissimi erant, maximè autem his. Et hi ad ere-
ctè standum impotentiores erant. Et quidam nō statim mor-
iebantur. Quos autem ego noui, omnes mortui sunt.

SECTIO TERTIA.

Constitutio temporis.

Perinthus.

Etesia.

Quæ
vires
vige-
nt.Aspretudi-
nes culicū
morsibus
similes.

IN Perinthum circa solstitium ferè æstium venimus, fa-
cta autem est hyems clementi cœlo, austrina. Ver & æstas
valde sine aquis vsque ad pleiadum occalum. Nam si etiam
quid aquæ cecidisset, id erat velut minutæ roris guttæ. Et
Etesia non valde spirarunt. Et qui spirarunt, diuulse id fece-
runt. Aestate febres ardentes populariter grassatæ sunt
multæ. Erant autē sine vomitu, & alui turbatæ ex tenuibus,
æquolis, non biliosis, spumosis, multis, quæ aliquando depōsi-
ta etiam subsidientiam habebant, ex quibus sanè etiam id
quod sub dio noctu exponebatur, simile erat. Aequales specie
alui secessus semper, malum. In his multi soporosi erant, &
mente moti, hi verò ex somnis tales fiebant. Quum autem
suscitati essent, omnia intelligebant. Spiritus sublimes, non
tamen valde. Urinæ tenues quidem plurimis & paucæ, aliàs
autem non decolores. Sanguinis eruptiones è naribus non
fiebant, nisi paucis: neq; parotides iuxta aures, de quibus po-
steà scribam: neq; splenes attollebantur, neq; dextrum præ-
cordium, neque dolorosum valde, neque fortiter intentum
erat. Erat tamen quid quod iudicationem faciebat. Et maxi-
mè iudicabantur omnia plerunque circa decimam quartam
diem, pauca cum sudore, pauca cum rigore, & valde paucis
recidiuæ fiebant. At verò sub minutas velut roris guttas quæ
in æstate fiebant, apparebat sudor. In febricitantibus etiam
quidam sudores statim ab initio fiebant, non tamen mali-
gno modo, & quibusdam sub hoc tempus etiam iudicatio fa-
cta est cum sudore. Fiebant autem in febribus æstiuis, circa
septimam, octauam & nonam diem, aspretudines in cute mi-
liaceæ, culicum morsibus maximè similes, non valde pruri-
ginosæ. Hæ perseverabant vsque ad iudicationē. Nulli equi-
dem masculo tales erupisse vidi. Mulier autem nulla mor-
tua est, cui hæ fiebant. Et graui auditu præditæ & soporosæ
erant.

A erant. Prius autem non valde soporosa erant hæ, quibus illæ affutura essent. Non tamen in totum durabant, verum soporosa & somnolenta erant per æstatem, & usque ad pleiadum occasum. Postea verò magis vigiliæ aderant. Sed neque in totum ab hac constitutione moriebantur. Alium igitur per cibos susterere non dabatur, imò præter rationem putasset quis mederi conducere, etiam si minus multa quibusdam prodiret, per hoc quod in frigore quis iaceret strato supposito. Nam ulcerat quidem frigidum, calefacit autem eiusmodi species sensim progrediendo adhuc magis, etiam si nulla afflictio naturæ accedat: & in quibus, & qualia signa, & plura aut pauciora sentiant, oscitatio, tussis, sternutatio, distictio cum oscitatione, eructatio, flatu: omnia talia corrumpunt. Quibus in febribus anxiosis, horridis, rubescunt facies, lassitudines, oculorum dolores, capitis gravitates, resolutiones leuiter siderantur. Quibus perituri fuerant.

B torum modo, & menses si apparuerint, maximè quibus primum, sed & virginibus & mulieribus, quibus per tempus. Sed & quibus non in quo solet tempore, aut velut oportet apparent. Deinde pallida fiunt. Magnum autem in omnibus, id quod & consequenter fit, & in quo tempore, & in quibus. Valde biliosis, in febribus maximè, omnino quibusdam ad crura purgatio. Medicamentorum modos scimus, ex quibus qualia, & quæ fiunt. Non enim omnes similiter, sed alij aliter componuntur. Et alibi citius, aut serius, in manum tractationes assumuntur, velut est aut siccare, aut tundere, aut coquere, & eiusmodi. Omitto plurima, quæ unicuique, & in quibus morbis, & quo tempore morbi, ætatem, speciem, victum, qualis hora anni, & quæ, & qualiter procedat, & huiusmodi. Zoilo iuxta murum exussis matura, febris acuta, & faciei rubor & alius intercepta, præterquam ad necessitatem coactè, lateris sinistri dolor, & auris è directo valde dolorosa, & caput non usque adeò. Spuens semper suppuratum agrotabat. Sed alia iudicata sunt, & iuxta aurem pus multum erupit, circa octauam aut nonam diem. Principia verò non nisi diei ex dolore auris. Haud scio quomodo sine rigore iudicatio facta est. Sudauit caput valde. Et hic sudor firmus erat, quod quidem ardor etiam sinistri lateris esset. Supernè una cum aure dolor sedatus, maximè circa scapulas. Sed & ante sputa multa, ab initio florida reiecta, & circa septimam aut octauam diem.

Deinde

Quæ obseruanda.

Zoilus.

Deinde laboriosa. Alius restitit vsq; ad nonam & decimam diem. Dolore extinctus est. Tumor remittebat, & sudores fiebant parui, non autem iudicabant. Manifesta autē erant hæc tum ex aliis, tum ex secessu. Nam incipiente auris dolore, etiam venter turbatus est. Erupit autem ex aure nona die, & iudicatus est morbus decimaquarta sine rigore eadem die.

Sed & sputum largius ibat, & maturius, postquā auris erupit. Sudores autem, & serpentina vlcuscula ad multum tempus, in capite fiebant. Resiccata sunt tertia die. Quæcunq; sine signo iudicationis iudicatorio disparent, malè iudicata sunt, velut Erysipelas ancillæ Polemarchi. In glandularum tumoribus febres, malum, exceptis diariis. Et in febribus glandularum tumores, deteriores, qui in acutis ab initio vigorem remiserunt. Spiritus, præcordiis eleuatio mollis, & intentio neutra, in ipsis superne rotundum, in dextris velut circumferentia suppuratoria, aliud longius magis, aliud diffusum, aliud deorsum repens, & hinc atq; hinc distentio vsq; ad vmbilicum. In omni sursum versus è directo latione, si reuocetur, & in rotunditatem cōcludatur, quatenus quidem spiritus fuerit, citra iudicationem calore attenuatur. Si verò hunc effugerit, ad suppurationem procedit. Spiritus densi, parui, magni, rari, parui, rari: extra magnus, intra paruus, alius quidem extendens, alius verò vrgens, dupla intro reuocatio, velut superinspirantibus, calidus, frigidus. Medela assiduarum oscitationum spiratio longa. Non potantibus & vix, spiratio breuis. E directo etiam laterum intentio dolorosa, & præcordiorum intentiones, & splenis eleuationes, è naribus eruptiones. Quæ relinquuntur post iudicationem, recidivas facere solent. Primum itaque lienis eleuationes, si non ad articulos finierint, sanguinis è naribus eruptio fit, aut præcordij dextri intentio, si non penetrauerint vrinæ. Hæc enim est interceptio vtrorunque, & recidivæ horum meritò fiunt. Accessus igitur horum facere oportet si non fiant, eos verò qui fiunt, declinare. Eos autem excipere, si prodierint iam, & qualia oportet, & qua parte oportet.

Qui verò non valde, eos coadiuuare. Eos verò auertere, si omnino incommodi fuerint, maximè si hi affuturi sunt: sin minus, si iam veniunt. Quarta die fientes sanguinis è naribus eruptiones egrè iudicabant. Febres quæ vna die inter-

mit

A mittentes, altera superrigent, vnà cum iudicatione, ad septimum circuitum durant. Scopo ex mucosis, biliosis, & faucium inflammatione, malo victu vso aluus suppressa est, & febris acuta facta, & lingua florida, & vigil sine somno. Pectinis intentio fortiter, æqualiter, paulatim ad infernam partem in dextris. Spiritus subdensus, præcordia dolebat, & respirans, & quum verteretur. Sine tussi verò exerebat subcrassa. Pectus ipsi data, à præcordio quidem depulit, transiit autem nihil. Postridie glandes duæ appolitæ non apparuerunt. Vrina crassa & turbata. Subsidentia leuis & plana: & restitit aluus in turbulentia, ventérque mollior erat. Et splen eleuatus, & deorsum vergēs factus est. Potu utebatur aceto mulso dulci, aut fauorum cremore cocto. Decima sanguis ex sinistra nare aquosus paucus venit: non autē valde infirmus erat ob hoc ipsum: & vrina subsidentiam habens. In subsidentia verò subalbum quiddam adhærens vasi, tenue, neque genituræ simile, neque dissimile. Defluxit hoc breui. Postridie iudicatus est, à febre liber, & subiit subuiscosum vndecima die. Hoc verò circa defluxum erat quid biliosum. Vrinæ verò purgatio multa, tum copia, tum subsidentia, & priusquam vinum bibere inciperet, ferè pituitæ similis. Penetrauit autem vndecima die, vt quæ non esset multa. Viscosa verò erāt stercora & turbata. Huiusmodi autem iudicatorio modo fiebat. Nam & Antigenis in Perintho tale erat. Quæ circa linguas eleuantur collectiones, & humiles calculi, & quæ podagricis fiunt, circa debiles illorum articulos sunt. Nam ossium natura caussa est, vt hæc & indurentur, & distendantur. Collectio Hippostrati vxori ex quartana annua ad fastigium eleuata est, quum subfrigida palam esse videretur, impetus in totum corpus factus est, & sudor: iudicata est hoc modo: & postea menses plures copia & tempore. Tunc enim suppressi fuerant. Abscessus non consistere visus est. In pulsantibus sanguinem fundentibus figura ampla, & in totum si ex omnino decliui accline fiat. Quapropter etiam deligationes in venarum sectionibus impetum faciunt: fortes verò sanguinem impediunt. Sanguineum & subbiliosum, ructum acidum facit. Fortassis autem ad atræ bilis morbum his desinet. Rigores incipiunt mulieribus quidem magis à lumbis, per dorsum ad caput. Sed & viris posteriore corporis parte magis horrores.

Scopus.

Antigenes.

Principiū

T

quā

quàm anteriore, velut cubitis, femoribus. Sed & cutis rara. D
 Indicat autem pilus animantium. Quibus nihil intra con-
 stitutum tempus accidit, singulis partus vitales fiunt. Ap-
 parentia in quibus mensibus fiunt. Labores in circuitibus.
 Quicquid in septuaginta mouetur, in triplicitatibus perfici-
 tur. Post menses, dextera & sinistra hiant. Humiditas per pro-
 deuntia: requirit diætam siccissimam. Quod citius motum
 est ac discretum, rursus augetur etiam tardius, & ad longius
 tempus. Labores, circa quinquagesimum tertium diem, &
 circa centesimum sextum, labores tertio quinto, septimo, no-
 no mense, & secundo ac quarto. Quæ nosse oportet ad septi-
 mum mensem, aut à mensium fluxu numerandi sunt nouem
 menses, aut à conceptione: & ad septuaginta ac ducetos die-
 E Græci menses fiunt: & si quid amplius ultra hos est, & aut ma-
 sculis, aut etiam fœmellis, hæc fiunt, aut contraria. A cibis &
 potibus humeri ac mammae inflantur: & impotentia, & in-
 flationes in capite, incrementa faciunt, donec ossa fuerint so-
 lida facta. Menstruarum purgationum circuitus est. Quæ
 ante has fiunt grauitates, similes sunt laboribus octimestri-
 bus. Primipararum lac, alimento quidem transmutationem
 accipiente, octimestri verò perficiente. Si in vulneribus for-
 tibus, tumor non appareat magnus, malum. Laxi bonum: sur-
 sum pascentes, peius Menstruæ purgationes similes octime-
 stribus, in tendentibus ad decimum mensem fiætes, malum.
 Quibus tumores in vulneribus, non valde conuelluntur, ne-
 que insaniunt, His autem derepentè dissipatis, quibus quidē F
 ad posteriores partes, conuulsiones cum doloribus, quibus
 autem ad interiores, aut insania, aut dolores lateris acuti, &
 Androni- dysenteria rubra. Tumores præter rationē alleuantes, præ-
 cus. uum: velut Andronici filio Erysipelas recurrit: si non ad eun-
 dem locum rediens, bonum quid significet. Hoc ex natiuita-
 te circa aurem ad pubem distributum est. Alteri tertia ex
 natiuitate die factum, suppuratum est nona. Hic septima die
 sanus euasit. Maligniora sunt quæ derepentè disparent.

S E C T I O Q U A R T A.

De venis.

Hepatis ve-
 na, **H**epatitis in lumbis vsque ad magnum verticulum, in-
 fernè etiam verticulis se ingerit: hinc subleuata per
 hepar

A hepar, & per septum transversum ad cor, & quæ quidem recta est, ad claviculas: hinc alia quidem ad collum, alia verò ad scapulas, alia deorsum deflecentes, ad verticula & costas declinant. Et ex sinistris quidem, una propè claviculas. Ex dextris verò ad quendam ipsarum locū. Alia verò utrinque deflexa, Alia paulò inferius deflexa, ubi quidem illa deficit, costis se ingerit, donec ad venam ipsum cor accesserit, ad sinistras deflexa. Infra autem decurata ad vertebrae descendit donec perueniat, & inde incipit eleuari ingerens se costis reliquis omnibus, hinc atque hinc singulis ramulos præbens, quum sit una: à corde quidem ad locū quendā à sinistris magis procedens. Deinde infra arteriam, donec consumpta fuerit, & venerit eo unde hepatitis subleuata est. Priusquam autem eo venit, circa extremas duas costas diuisa est, & partim ab hac, partim ab illa verticulorū parte progressa consumitur. Quæ verò recta à corde ad claviculam tendit, supra arteriam est: & ab hac, velut etiam iuxta lūbos infra arteriam, ad hepar insilit, partim in portas & pinnas, partim in reliquum deinceps procedit paulò infra septum transversum. Septum autem transversum adhæret hepati, neque facile est ipsum separare. Duplices porrò venæ à claviculis, alteræ hinc alteræ isthinc, sub pectus ad pectinem procedunt: quo verò hinc, nondum scio. At Septum transversum infra iuxta verticulum quod est infra costas, quæ rhenes ex arteria, ea parte cōsurgunt: Verūm arteriæ ex ipso rhene oriūtur, hinc atque hinc ab arteria neruum habentes. Atque hac parte alicubi in recurrente à corde Hepatitis desinit. Cæterum ab hepaticide per septum transversum maximæ duæ, altera hinc, altera isthinc, sublimes feruntur, multifidæque per septum sunt, & circa ipsum consistunt in superna parte, atque hæc magis sunt conspicuæ. Duo verò nerui à cerebro sub os magni verticuli, ex supernis & ad gulam magis, ab utraque arteriæ parte descendunt, & uterque in seipsum incidēs, vni similis, ubi verticula & septum sunt, ibi desinunt. & quidam ambigui, ex hac societate ad hepar & splenē ipsos tendere putauerunt. Alius nervus ab utraque verticulorum parte iuxta claviculam ad spinam procedit, ex obliquo verticulorum, & ad costas distribuitur, & quemadmodum venæ, sic hi per septum, ac mesenterium mihi tendere videntur.

Dux alia venæ.

Duo nerui

Nervus alius.

T 2

Vbi

Hippocratis Liber I I.

Nervorum
discursus.
Sacrum os

Vbi autem hæ deficiunt, rursus hinc vbi septum exoritur, ab D
eo coherentes ac continui existentes, iuxta mediū infra arte-
riam, deinceps ad verticula distribuuntur, quemadmodum
venæ, donec ad sacrum os progressi consumuntur. In Aeno
ex assiduo leguminū esu, fœminæ & masculi, crurum impo-
tentes facti sunt, ac vitam degerunt. Sed & his qui eruo ve-
scuntur, genua dolent. Diligentia adhibenda est vt excande-
scentia inducatur, & coloris reparandi, & sanguinis in vasa
subter cuticulam colligendi gratia: itémq; lætitia, & timor,
& huiusmodi, & si quidē reliquum corpus simul agrotarit,
simul curare: Sin minus, satis est. Sty margi famula Idumæa
erat, quæ vbi filiā peperisset, conuersum est ei vteri osculum,
& dolor ad coxam & crus. Iuxta malleolū secta vena libera- E
ta est, & quidem quum etiā tremores totū corpus detinerēt.
Verū ad causam deuenire oportet, & ad causæ principiū.

SECTIO QUINTA.

Natura indiciorum notio.

Physiognomia.

Varix testem quid possit.

Puerperæ spasmos.

Capitis os dolens fractumve.

Q Vicūque fului, naso acuto, oculis paruis, mali. Quicun-
que fului, limi, oculis magnis, boni. Hydropici
rauos oculos habent, & calui sunt. Vocis gracilitatem soluit
varix, ad sinistrum & dextrum testem, absque horum alte-
ro fieri non potest vt soluatur, Magni, calui, balbi, gracili
voce præditi, boni. Morbos autem habent, balbus, aut cal-
uus, aut gracili voce præditus, aut hirsutus, fortiter atrabi-
liarios. Qui lingua offendunt, & labiorum non sunt poten- F
tes, eos necesse est dum illa solvuntur, suppuratos fieri. Do-
lorem in locis infernis fortem, surditas soluit, itémque san-
guis multus ex naribus erumpens. Insania magni morbi ex
more fientis solutio. Si puerperis conuulsio fiat, febrem
excitato: & cerato multo tepido in vesicam immisso, ac per
clysterem infuso colluito. Si capitis os confractum fuerit,
lac, & vinum ammixta aquæ pari mensura, bibenda dato.
Si verò vlcus fuerit, internas venas secato, si non febrici-
tet. Si autem desipiat, caput irrigato, si non præcordia fue-
rint eleuata. Si caput doluerit, ad pectus descendit, deinde
ad præcordia, postea ad coxam, Omnia verò vt doleant fieri
non potest. Ventositatem flatuosam venæ sectione, fluxio-
nem pharmaco illito sistito. Fluxus enim ex vena magna est. Si

Si autem desipiat, caput irrigato, si non præcordia fuerint eleuata. Si caput doluerit, ad pectus descendit, deinde ad coxam. Omnia verò ut doleant fieri non potest. Ventositatem flatuosam venæ sectione, fluxionem pharmaco illito sistito. Fluxus enim ex vena magna est.

De Morbis Popularibus.

327

A Si verò sua sponte multum fluat, ieiunet: aut aquæ partes duas, lactis quatuor bibat. Infœcundas fomentis ac medicamentis curato. Quicumque derepente voce destituuntur, si sine febre fuerint, ipsis venam secato.

Pituitæ fluxiones ex mammis trahunt oculi, & eructant per nares ad pulmo-

nem. Quibus tussis sicca est, his non soluitur, nisi dolor for-

tis ad coxas, aut ad crura, aut ad testem irruat. Si hydro-

picum tussis corripiat, siquidem statim animo linquatur, ca-

lidis omnibus vtatur: Sin minus, inebriato, ac cibus ipsum

impleto. Venas autē internas secato, dum morbus magnus

in intentione est. Solutio coxarum doloris, oculorum di-

stortiones, cæcitas: testium tumoris mammarum eleuatio.

Si febre tenente, partes circa faciem graciles fuerint, in die

impari sequenti die soluetur. Hydropicus si tumorē in cru-

ribus habens tussiat, malum. Si auris doleat, lacte vtatur,

Si non in die impari febris dimittat, recidiuare necesse est.

Cui vena in cubito pulsarit, insanus & iracundus est: cui

verò quieuerit, stupidus. Vulnus si sanguinem fundat, vlcus

ne madefacito, verum caput calida rigato. Si os ventricu-

li doleat, panem calidum cum vino meraco exhibeto. Vo-

mitus solutio, aquam calidam bibendam dato, & vomat.

Quicumque corrupta torpescunt, euulsa vena vlcerato,

ac sanato. In conuulsione digitorum manus citra febre,

venam secato, si nō caput doleat: Sin minus, aquam calidam

affundito. Ad oculos. Spodij partem duodecimam, croci

quintā, nuclei oliuæ vnā, cerusæ vnā, myrrhæ vnā. Aquā

frigidam super caput fundito, & allia cū maza edenda dato.

Varices caluorum si non magni fuerint, furiosi sunt. Ad

vitiliginem & lepram. Calcem in aqua adhibeto, vt ne exul-

ceres. Secundarum purgatio si non discedant. Sternutato-

rium ad nares apponito, vt sternutet, & sternutantis nares ac

os apprehendito.

SECTIO SEXTA.

Natura indiciorum notio.

C Aput magnum, oculi parui, balbi, iracundi sunt. Qui longæ vitæ sunt, plures dentes habent. Balbi celeri lin-

gua præditi, atræ bilis humori obnoxij, biliōsique sunt, ocu-

lis non nictantes, iracundi. Magnum caput, oculi nigri &

Vuln. Ca
x. v. par

Vocis repa
ratio.

Tussis sic
ca.

legi. C.

capit. 4
Vulnus

quando nō
lauandum.

Vomitio
quā pare-
tur.

Diuersæ
medelæ.

Varices.

Diuersa
per aspectū
cognatio.

T 3

magni

Hippocratis Liber I I.

Pueri natu-
ra.

Morbi na-
tura.

Mors quo-
ta.

Medela
anginae, lip-
pitudinis-
que & per-
cussu intesti-
ni.

Mas dex-
tris hæret.

magni, nasum crassum & simum habentes, boni. Oculi rari & magni, caput magnū, ceruix tenuis, pectora angusta, cōgrue adaptati hominis sunt. Caput paruum habens, neque balbus esse poterit, neque caluus, nisi fuerit glaucus. In conuulsionibus si vox in die impari soluitur, a magno morbo liberat. Puerperæ febricitanti & dolenti aquam affundito, & ptisanam crassam ter in die calidam dato. Puer nutritur septimo mense, aut nono, aut decimo, & voce firmatur, & robur sequitur, & manibus validas fit: dū vox soluitur, omnia soluantur. Solutio enim similis est voci. Soluitur autē in die impari. Si venæ pulsauerint in manibus, & facies sana ac robusta fuerit, & præcordia non fuerint mollia, diuturnus fit morbus, qui sine conuulsione nō soluitur, aut sanguinis multæ & naribus eruptione, aut dolore ad coxas. In gutturi dolore, aquam calidam super caput fundito, si non frigus fuerit: Sin minus, farinam quā calidissimā dato, & vinum meracum. in turbatione ventris, fabas coctas dato, si non super partes abunde fuerint biliosæ. Aut cuminum cum fabis edendum dato. At interceptio morbi fieri non poterit, nisi in die impari. Neque principium fieri poterit, nisi in die pari, itemque mense ac anno pari. Nitrum autem Aegyptium & coriandrum, ac cuminum cum oleo terito, & ventri illinito. Qui moriuntur eos necesse est die impari, & mense impari, & anno impari mori. Bonum autem fuerit prædicere mortem, aut dolores fortes. Quorum oculi robusti non sunt, his mors breui imminet. Si verò in impari anno fiat, ab utroque impari fieri necesse est. Si autē in anno pari & die pari, necessarium est in impari die mori. Ex numero tertia fortissima est. Anginam & lippitudinē soluit vene sectio. Vulnerato intestino, respiratio prodit infernē incōspicua iuxta vulnus, & euacuatur pectora. Dato igitur lac & vinū, pari aquæ mēsurā ammixta. Quorum pectora bilē generāt halbi, furiosi, & calui sunt. Quicūq; horū ex natiuitate etiā strabones, hi imprudētes sunt, aut calculosi aut insanientes. Quibus autē nō, alterius mali solutio fit. Circa naturā plurimam vim habet, mām dexterā, oculus dexter & quæ infrā sunt hac parte. Nā & malculi dextris inhæret. Mulieribus mēses ut sistas, cucurbitam maximam ad mammam affigas. Trimestris puer omnia præ se fert, & lac tunc habet. Si multum fluat lac, necesse est fore

A est fixum debilem esse. Si solidiores fuerint mammae, sanior est fixus. Vena crassa est in vtraque mamma: quapropter maximam habent prudentiae partem. Vrinae stillicidium soluit venae sectio. Si superni loci turgent qui sunt circa caput, viceru purgatio, vomitus, hydrops. A ventris turbatione, aut à tussi, si cancer fiat, os annarescit. Dato autem elaterium bibendum bis aut ter, si non balbus fuerit. Deligare verò oportet florem aris vstum, donec fuluus euaserit, & spongiam, si non balbus fuerit. In anxietate, horrore, oscitatione, dato vinum pari aquae mensura ammixta.

B Ad auris dolorem cucurbitam affigito. Quicquid supernarum partium doluerit, dolor ad coxas, aut ad genua, & anhelatio fiens, omnia haec soluit. In voluulo molli, frigidum vinum multum meracum pro ratione dato, donec somnus, aut crurum dolor fiat. Soluit autem & febris, & dysenteria citra dolorem. Si praecordia distenta fuerint, manu comprimito ac lauato. Ad paronychiam vnguium abscessum, galla nigra cum melle. Aqua secedente, lactis heminas octo bibendas dato. Si verò vomat, & non bibat, alij aut ceparum intritum dato. Vt mulier in vtero concipiat, polypos paruos super flamma calidissima assatos, & ferè semiambugtos, edendos dato. Et nitrum Aegyptium tritum, coriandrūque ac cuminum, in pastillos efformato, in pudendūque subdito. Si ex crapula caput doleat, vini meraci heminam bibat. Si verò aliter caput doleat, panem

C quam calidissimum cum vino meraco edat. Si hominem calor corripit, non à bile, neque à pituita, sed aut à lassitudine, aut aliàs febriat, aquam multam calefacito, deinde ea superinfusa caput rigato, donec pedes sudarint: & farinam crassissimā coquito. Postquam autem pedes sudarint, farinam plurimam & calidissimam edens, ac vinum meracum insuper bibens, vestimentis coniectus facile quiescat. Aut narcissi duo aut tria capita in coena edat. Qui insaniam corripietur, ei hoc signum praesagit, sanguis colligitur ipsi ad mammas.

Capitis dolor qui discutitur.

Signa furoris.

HIPPOCRATIS^D
 COI. DE MORBIS PO-
 PVLARIBVS LIBER TER-
 TIVS, IANO CORNA-
 RIO MEDICO PHY-
 SICO INTER-
 PRETE.

*

SECTIO PRIM A. E
 AEGROTVS I.

Pythion.



Pythion qui habitabat iuxta Telluris tē-
 plum. Ccepit tremor à manibus prima die,
 febris acuta, delirium. Secūda omnia ex-
 acerbata sunt. Tertia eadem. Quarta ab aluo
 pauca, mera, biliola prodierunt. Quinta o-
 mnia exacerbata sunt, tremores perseuera-
 bant, somni tenues, aluus restitit. Sexta sputa varia, subru-
 bra. Septima os distractum est. Octaua omnia exacerbata
 sunt. Tremores perseuerabant. Vrinæ ab initio quidem, &
 vsque ad octauam tenues, decolores, in medio pendens nubi-
 losum quiddam habebant. Decima sudauit. Sputa aliquan-
 tulum matura, iudicatus est. & urinae subtenuēs circa iudi-
 cationem. Post iudicationem verò, quadraginta diebus
 postea suppuratio circa sedem, & abscessus factus est cū vri-
 næ stillicidio. P. M. V. Q. S. hoc est, probabile multitudine
 urinae quadragesima sanatum.

AEGROTVS II.

Hermocra-
 tes perit.

Hermocraten qui ad Nouum murū decumbebat, febris
 vehemens corripuit. Ccepit autem dolere caput, lum-
 bos. Præcordij distentio molliter. Lingua ab initio adusta
 est. Surditas statim, somni non aderant. Siticulosus nō valde,
 Vrinæ crassæ rubræ, depositæ non subsidebant. Ab aluo ve-
 rò non pauca combusta prodibant. Quinta minxit urinas
 tenues, habebant quid in medio pendens, non subsidebāt. Ad
 noctem mente motus est. Sexta morbo regio correptus est.
 omnia

A omnia exacerbata sunt. non resipiscebant. Septima molesta fuit. Urinae tenues similes, similiter etiam sequentibus diebus. Circa undecimam omnia visa sunt allevata esse. Sopor coepit. Urinae crassae subrubrae, infra tenues, non subsidebant. Placide resipiscebant. Decimaquarta à febre liber, non sudavit, dormiuit, intelligebat omnia. Urinae consimiles.

Circa decimam septimam rediit, calefactus est, sequentibus diebus febris acuta. Urinae tenues. Rursus autem vigesima die iudicatus est, à febre liber, non sudavit. Cibus fastidiebat per totum tempus. resipiscebant, loqui non poterat, lingua arida. non sitiebat. dormiebat soporosus. Circa vigesimam quartam calefactus est. aluus lubrica multis tenuibus fluens. & sequentibus diebus febris acuta. lingua combusta est. Septima & vigesima mortuus est. Huic surditas perpetuo perseverabat. Urinae crassae & rubrae non subsidentes. Aut tenues decolores, & in medio quid pendens habentes. gustare autem non poterat. P. S. S. V. S. M. hoc est probabile secessibus suppressis vigesima septima mortuum.

A E G R O T V S I I I.

Qui in Dealcis horto decumbebat, capitis gravitatem, Deales.
& tempus dextrum dolorosum habebat multo tempore.

Cum occasione verò febris corripuit, decubuit. Secunda die ex sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Ab aluo stercora probe prodierunt. Urinae tenues, variae, in medio pendens quiddam habentes minutim dispersum. velut farinae crassiores, & geniturae similes. Tertia febris acuta. Seccessus nigri, tenues, spumosi, subsidentia secessibus liuida. somno graviore aliquantulum premebatur, moleste surgebat. Urinis subsidentia liuida, subviscosa. Quarta vomuit biliosa, flava, pauca, paulo post æruginosa. De sinistra nare modicus merus sanguis fluxit. Seccessus similes. Urinae similes. sudavit circa caput & claviculam, splen elevatus est. femoris dolor è directo. Præcordij dextri distentio submollis, nocte non dormiuit. parum mente motus est. Quinta seccessus plures, nigri, spumosi, subsidentia secessibus nigra. nocte non dormiuit, mente motus est. Sexta die seccessus nigri, pingues, viscosi, graueolentes, dormiuit, intelligebat magis. Septima lingua sicca, siticulosus, non dormiuit, mente motus est. Urinae tenues, non boni coloris. Octava seccessus nigri, pauci.

T s

compacti.

Hippocratis Liber III.

compacti. dormiuit. intelligebat. siticulosus nō valde. Nona **D**
riguit. febris acuta. sudauit. frigiditas. mente motus est. Dextro oculo distortus est. lingua arida, siticulosus, insomnis.

Decima circa eadem. Vndecima intelligebat per totum omnia, à febre liber. sudauit. vrinæ tenues circa iudicationē. Duobus diebus à febre liber fuit, decimaquarta rediit. Statim autem nocte nō dormiuit, penitus mente motus est. Decimaquinta vrina turbata, qualis ex his quæ subsiderunt fit, quum fuerint agitata. febris acuta. penitus mente motus est. non dormiuit. genua & tibiae dolorosa habebat. ab aluo subdita glande, stercora nigra prodierunt. Decimasexta vrinæ tenues, habebant quid in medio vehens nubilosum. mente motus est. Decimasextima mane extremitates frigidae, con- **E**
tegebatur, febris acuta. sudauit per totum. alleuatus est. intelligebat magis. non à febre liber, siticulosus. vomuit biliosa, flaua, pauca. Ab aluo stercora prodierunt paulò post nigra, pauca, tenuia. vrinæ tenues, non boni coloris. Decima-octaua nō resipiscebat. soporosus. Decimanona per eadem.

Vigesima dormiuit, omnia intelligebat. sudauit. à febre liber. non sitiebat. Vigesima prima parum mente motus est. paululum sitiebat. præcordij dolor, & circa vmbilicum palpitatio perpetuò. Vigesima quarta vrinis subsidentia. intelligebat omnia. Vigesima septima coxæ dextræ dolor vrinæ tenues, & subsidentiam habebat. in reliquis commodissime habebat. Circa vigesimam nonam oculi dextri dolor. vrinæ tenues. Quadragesima egegit pituitosa, alba, aliquāto plu- **F**
ra, multum sudauit per totum. perfecte iudicatus est.

S E C T I O S E C U N D A.

A E G R O T V S I I I I.

Philistes ci-
rō perit.

IN Thaso Philistes caput multo tempore dolebat. & quan-
doque etiam aliquāto grauiore somno pressus decubuit.
Quum autē ex potationibus febres continuæ obortæ essent,
dolor exacerbat. nocte excalefactus est primū. Prima
die vomuit biliosa, pauca, flaua primū. postea verò plus
æru ginosa. Ab aluo autem stercora prodibant. noctem ha-
buit molestam. Secunda die surditas. febris acuta. præcor-
dium dextrum distentum est, declinauit ad internas partes,
vrinæ tenues, pellucida, habebant quiddam in medio pen-
dens

A dens genituræ simile. Parum infaniuit circa meridiem. Tertiam diem molestam habuit. Quarta convulsiones. exacerbata sunt omnia. Quinta mane mortuus est.

A E G R O T V S V.

C Hætionem qui decumbebat apud Demanetum, ex po- Chætion
non perit.
tu febris corripuit. Statim autē capitis grauitas dolorosa. nō dormiuit. alius turbata ex tenuibus biliosis. Tertia die febris acuta capitis tremor, maximè autē labij inferni. paulo post rigor, convulsiones, penitus mente motus est. Noctem molestè tulit. Quarta per quietē, parum dormiuit, parum delirauit. Quinta laboriose omnia exacerbata sunt. delirium. noctē molestè tulit. nō dormiuit. Sexta per eadem. B septima superriguit. febris acuta. sudauit per totum. iudicatus est. Huic perpetuò ab aluo secessus biliosi, pauci, meri.

Vrinæ tenues boni coloris, in medio nubilosum quiddam pendens habētes. Circa octauam minxit urinas melioris coloris, habentes subsidentia albam, paucam. resipiscebat. febris intermisit. Nona rediit. Circa decimam quartam febris acuta, sudauit. Decima sexta vomuit biliosa, flaua, satis multa. Decima septima superriguit. febris acuta. sudauit à febre liber, iudicatus est. Vrinæ post recidiuam & iudicationē, melioris coloris, subsidentiam habētes. Neque mente motus est in recidiua. Decima octaua parum calefcebat. in super sitiebat. Vrinæ tenues, quod in medio pendeat nubilosum erat. parum mente motus est. Circa decimam nonam à febre liber, collum dolorosum habebat. Vrinis subsidentia. perfectè iudicatus est vigesima. P. M. B. V. V. S. hoc est, probabile multitudinem biliosarum vrinarum vigesima sanatum.

A E G R O T V S V I.

E Vryanactis filiam virginem febris corripuit. Erat autem sine siti perpetuò, nihil ad gustandum admittebat. Ab aluo pauca prodibant. Vrinæ tenues, pauca, non boni coloris. Incipiente autem febre circa sedem dolebat. Sexta die à febre libera, non sudauit. iudicata est. Quod verò circa sedem erat, parum suppuratum est. erupit vnà cum iudicatione. Post iudicationem septima die riguit, parum incaluit, sudauit. post iudicationem octaua die, riguit non multū. postea verò extremitates frigidae semper. Circa decimam post factum sudorem, mente mota est. & rursus breui resipiscebat. Euryanax.

Hippocratis Liber III.

Hæc periiit.

ſcebat. Dicebant autem ex guſtato botro ipſam hæc pati. Die D
verò vna intermiſſa, rurfus duodecima multū delirabat, al-
uus turbata eſt ex bilioſis, paucis, meris, tenuibus, mordaci-
bus, frequenter ſurgebat. Die ſeptima ab ea qua mente mota
fuit, mortua eſt. Hæc incipiente morbo fauces dolebat &
perpetuo ruborem habebat, & gurgulio reuulſus, ſuxiones
multæ, parvæ, tenues, acres. Tuſſiebat, maturum nihil edu-
cebat. Omnes cibos per totum tempus ſaſtidiebat, neque vl-
lum aliquem appetiuit, ſine ſiti erat, neq; quicquam memo-
rabile bibit. Tacēs nihil loquebatur. Triftitia deſperata rur-
ſus corripiebat. Erat autem & innata quædam tabes.

A E G R O T V S VII.

Biton.

A Nginofa illa quæ apud Bitonem erat, primum à lingua **E**
cœpit. Vox nō clara, lingua rubra reſiccata fuit. Prima
die horrida, incaluit, tertia rigor, febris acuta, tumor ſubru-
ber, durus, colli & peſtoris ex vtraq; parte, extremitates fri-
gidæ, liuidæ. Spiritus ſublimis, potus per nares fundebatur.
deglutire non poterat, alui ſeceſſus & vrinæ ſuppreſſa erant.
Quarta omnia exacerbata ſunt. Mortua eſt anginoſa. P.S.S.
Q.M. hoc eſt, probabile ſeceſſibus ſuppreſſis quinta mortuā.

A E G R O T V S VIII.

**Forū Men-
dadium.**

A Doleſcentem qui decumbebat in Mendacium foro, fe-
bris corripuit, ex laſſitudinibus, & laboribus, ac curſib.
inſolitis. Prima die aluus turbata ex bilioſis, tenuib. multis,
Vrinæ tenues ſubnigræ, nō dormiuit, ſiticolofus. Secunda o-
mnia exacerbata ſunt. Seceſſus plures, intēpeſtiniiores: nō dor-
miuit. Mens turbata, parū ſudauit. Tertia moleſte habuit, ſi-
ticuloſus, anxius, multa iactatio, deſperatio, mēte motus eſt.
Extremitates liuidæ ac frigidæ, præcordij intenſio ſub mollis
vtrinque. Quarta nō dormiuit. Malum in peius procedebat.
Septima mortuus eſt. Aetate circa vigefimū annum erat. P.
N.S.M. hoc eſt, probabile nouationibus ſeptima mortuum.

A E G R O T V S IX.

Tiſamenuſ

Q Væ apud Tiſamenum decumbebat mulier, ei voluulo-
ſa moleſtè procedebant. vomitus multi, potum conti-
nere non poterat. Dolores circa præcordia. Et in infernis
partibus iuxta ventrem dolores, tormina continua, non ſiti-
culoſa, incaleſcebat. Extremitates frigidæ perpetuò, anxia,
inſomnis. Vrinæ paucæ, tenues, ſeceſſus crudi, tenues, pauci,
prod

A prodesse non ampliùs quicquàm poterat. Mortua est.

A E G R O T V S X.

Mulierem ex his quæ apud Pantimedem degebant, ex abortu infantis, prima die febris corripuit. Lingua arida, siticulosa, anxia, insomnis. Aluus turbata ex tenuibus, multis, crudis. Secunda die superriguit, febris acuta, ab aluo prodire multa, non dormiuit. Tertia die dolores maiores. Quarta mente mota est. Septima mortua est. Aluus semper lubrica, ex secessibus multis, tenuibus, crudis. Vrinæ pauca, renues, febris ardens.

Pantime-
des abortu
perit.

A E G R O T V S X I.

B Alteram ex abortu circa quintum mensem, febris corripuit. Ab initio soporosa erat, & rursus insomnis, lumborum dolor, capitis grauitas. Secunda aluus turbata est paucis, tenuibus, meracis primùm. Tertia plura, deteriora, nocte non dormiuit. Quarta mente mota est. Timores. Tristitia, dexter oculus distortus est, sudauit circa caput sudorẽ modicum, frigidum, extremitates frigida. Quinta omnia exacerbata sunt, multum delirabat, & rursus breui resipiscebat. Sitis, insomnis. Ab aluo multa, intempestiua, perpetuò prodiebant. Vrinæ pauca, renues, subnigræ. Extremitates frigida, subliuida. Sexta per eadem. Septima mortua est phrenitide.

Mortua est
delira.

A E G R O T V S X I I.

C Mulierem quæ decumbebat in Mendaciũ foro, primùm tunc enixam dolorosè masculum, febris corripuit. Statim ab initio siticulosa, anxia, cor dolebat, lingua arida, venter turbatus est tenuibus, paucis, non dormiuit. Secunda die parum riguit, febris acuta, parũ circa caput sudauit frigidũ. Tertia laboriosè ab aluo cruda, tenuia, multa prodierunt. Quarta riguit. Omnia exacerbata sunt. Insomnis. Quintam laboriosè tulit. Sexta per eadem. Ab aluo verò prodierunt liquida, multa. Septima riguit, febris acuta, sitis multa, iactatio. Circa vespërã frigidum sudorẽ per totũ sudauit, frigiditas, extremitates frigida, nõ ampliùs recalescebant, & rursus ad noctem riguit. Extremæ partes nõ recalescebant, non dormiuit, parum mente mota est, & rursus breui resipuit. Octaua circa meridiẽ recalesfacta est. Siticulosa, soporosa, fastidiosa ac nauseabunda. Vomuit biliosa, pauca, subflaua. Noctem molestè tulit, nõ dormiuit. Vrinam minxit multã acernatam.

Primipara
perit.

uatam inscia. Nona remiserunt omnia, soporosa. Ad vespēā D parū riguit. Vomuit Pauca, biliosa. Decima rigor, febris exacerbata est, nihil dormiuit. Manē multam vrinam subidentiam habentem minxit, extremitates recalescētes sunt. Undecima vomuit virosa, biliosa. Non ita longē postea superriguit, & rursus extremitates frigida. Ad vespēā sudor, rigor. Vomuit multum, noctem laboriosē transēgit. Duodecima vomuit multa, nigra, graecolentia, singultus multus, sitis laboriosa. Decimatertia nigra, graecolentia, multa vomuit. rigor. Circa meridiē voce destituta. Decimaquarta sanguis per nares. Mortua est. Huic perpetuo alius lubrica, horrida. Aetas circa annum decimumseptimum.

S E C T I O T E R T I A.

Constitutio temporis pestilens.

E

Tempestatis & anni pestilentis descriptio.

A Nnus austrinus, pluuius. Venti perpetuō quiescentes, Quū squalores fuissent superioribus tēporibus ad annū, in austrinis circa arcturū aquae multae. Autūnus vmbrosus, nubilus, aquarū copia. Hyems austrina, humida, mollis. Post solstitiū longē postea, propē æquinoctiū serae hyemes. Et iam circa æquinoctiū aquilonares venti niuosi nō multo tēpore. Ver rursus austrinū, sine ventis. Aquae multae perpetuō vsq; ad canem. Aestas serena, calida, estus magni. Etesiae parū dispersum spirarūt. Rursus circa arcturum in aquilonaribus aquae multae. Quum autē esset annus austrinus, humidus, & mollis, per hyemē quidem sani degebāt, exceptis tabidis, de quibus scriberetur. Ante ver autē simul cū fientibus frigidibus, sacri ignes multi, quibusdā cum occasione, quibusdā nō, atq; hi maligni multos peremerūt. Multi fauces doluerunt. Voces vitiatæ, febres ardentes, phrenitici, ora vlcere feruido affecta, in pudēdis tubercula. Lippitudines. Carbunculi. Alui turbata. Ciborū fastidia. Aliqui siticulosi, aliqui non. Vrinæ turbatae, multae male. Diu soporosi, & rursus insomnes. Multae iudicationes penitus interceptae. Quaedā agrē fientes, Hydropes, tabidi multi. Atq; hi quidē erāt populares morbi. In singulis autē relatis speciebus ægroti, & moriebātur multi. Acciderūt autē singulis horū hoc modo. Multis equidē ignis facer cum occasione ex vulgarib. & valde paruis vulnusculis; in toto corpore, maximē sexagenarij, circa caput si vel parū neglecta

Qui morbi vigerēt.

A glecta essent. Multis verò etiā in ipsa curatione, inflāmatio-
nes magnæ fiebant: & sacer ignis multus, breui, vndique de-
pascebatur. Plurimis igitur ipsorum abscessus ad suppara-
tiones contigerunt: carniū & neruorum ac ossium elapsus
magni. Erat autem & fluxio collecta nō puri similis. Sed alia
quædā putredo, & fluxio multa ac varia. Quibus igitur cir-
ca caput horum quid fieri cōtigit, his glabrics totius capi-
tis ac mēti fiebat: & ossium denudationes ac elapsus: & mul-
ta fluxiones, & hæc in febribus, & sine febribus. Erant autem
hæc horrenda magis quā mala. Quibus enim ad suppuratio-
nem talium maturatio peruenit, horum pleriq; seruabātur.

Similia
hæc sunt
morbo gal-
lico qui
nūc viget.

B lem autē nullum abscessum fecit, horum multi perierūt. Si-
militer autē & si alicubi in alia corporis parte horum quid
oberraret, hæc acciderūt. Multis enim brachiū, & totus cubi-
tus defluxit. Quibusdā verò hæc affligebāt latera, aut ante-
riorem aut posteriorem aliquā partem. Quibusdam autem to-
tum femur, vel tibie denudabantur, & totus pes. Erat autem
ex talibus omnium grauissimum, vbi circa pubem & puden-
da accidisset: & circa vlcera quidem, & cum occasione, huius-
cemodi erāt. Multis autem in febribus, & ante febrem, & ex
febribus ignes sacri inciderūt: & qui quidem horum absces-
sum fecissent per suppurationē, aut per aluum turbatio que-
dam tempestiua, aut vrinarū bonarum excretio contigisset,
per hæc soluebantur. Quibus autem nihil horum accidisset,
C verūm obscure disparuisset, hi lethales erāt. Plerunq; igitur
plurimis accidit sacer ignis verè, consequebantur autem &
per æstatem, & sub autumnum. Multa verò turbatio quibus-
dam, & circa fauces tubercula, & linguæ inflammationes, &
abscessus circa dentes. Vocēsq; multis significationem de se
præbebant, quòd essent vitiata ac impedita & inuoluta, pri-
mū quidem, tabidis incipientibus, imò etiam ardenti fe-
bre correptis & phreniticis. Cœperunt igitur febres ardētes
ante ver, itēmq; phrenitis, post facta frigora: & plurimi tunc
ægrotarunt. Acuta verò & lethalia symptomata his aderāt.

Erat autem constitutio febrium ardentium hoc modò. Ab
initio soporosi, anxij, horridi: febris acuta: nō valde siticulosi: **Febris ar-**
non deliri. De naribus parū stillauit. Exacerbationes ple- **dentis mo-**
risq; diebus paribus. Circa exacerbationes obliuio, exolutio, **du-**
& voc

& vocis priuatio. Extremitates manuum ac pedum semper **D**
his frigidiores, præsertim circa exacerbationes: & rursus tar-
dè ac non bene recalescebant, rursumq; & intelligebāt & lo-
quebantur. Detinebat etiam ipsos sopor continuus, non som-
nulosus. Aut vigiliæ cum doloribus: plurimis horū alui tur-
bulentæ, secessibus crudis tenuibus, multis. Vrinæ multæ, te-
nues, nihil neque iudicatorij, neque boni habentes. Nec verò
aliud aliquod iudicarium ita habētibus fiebat. Neq; enim
sanguis bene erumpebat, neq; alius aliquis abscessus iudica-
torius fiebat. Moriebatúrq; vnusquisq; prout contigit erro-
neo modo, plerunq; circa iudicationes. Quidam verò diu vo-
ce priuati. Multi sudantes: & his quidem qui perniciosè ha-
bebant, hæc accidebant. Conſimilia verò etiam phreneticis. **E**
Sine siti autem hi erant. Neq; quisquam phreneticus insani-
uit, velut ex aliis, sed alia quadā mala ac lenta in somnū de-
latione grauitè peribant. Erant insuper etiam aliæ febres,
de quibus scribetur. Ora multis vlcerè feruido affecta, vlce-
rosa. Fluxiones circa pudenda multæ, vlcerationes. Tubercu-
la foris, intus, circa inguina. Lippitudines humidæ, longæ,
diurnæ, cum doloribus. Eruptiones palpebrarum foris, in-
tus, multorū oculos corrumpentes, quas ficos vocant. Erum-
pebant etiam in aliis vlceribus multa, & in pudendis. Car-
bunculi per æstatem multi, & aliæ quæ seps vocātur, pustulæ
magnæ. Herpetes multi magni. At verò circa aluum mul-
tis multæ & nociuæ acciderūt. Primū quidem tenesmi mul-
tis dolorosè: plurimis autē pueris, & omnibus qui erant ante **F**
pubertatem, & plurimi horum peribant. Lienterici multi,
dysenterici, neq; hi valde dolorosè. Secessus autem biliosi,
& pingues, & tenues, & aquosi. Et multis quidem ipse mor-
bus ad hoc decubuit: & sine febribus, & in febribus; cū dolo-
ribus, tormina, & voluuli maligni, multorū quæ in corpore
erant, & suppressa erāt exitus; & exeuntia progressa dolores
non soluentia, & his quæ offerebantur difficulter cedentia.
Nam purgatione plurimos amplius lædebant. Ex his autem
qui sic habebāt, multi quidem citò peribant. Multi verò lon-
gius vitam debebant: & in summa, omnes & qui longis mor-
bū hos oēs bis ægrotabant, & qui ex acutis, maximè ex his quæ per aluū
secedebant, mortui sunt. Omnes enim aluus sustulit. Cibum
autem fastidiebant omnes, ob cūctos præscriptos morbos, in
quos

Mala va-
ria.

Palpebra-
rum ficos.

vētris ma-
lū hos oēs
necabat.

A quos sanè ego incidi. Multi verò & maximè hi ipsi, & qui tales erāt, sed & alij, perniciosè habebāt: & siticulosi alij erant, alij non. Ex his qui febribus alijsq; laborabant, nullus siticulosus intempestiuè. Sed licebat circa potum victus rationem constituere, prout velles. Vrinæ autem prodeuntes multæ quidem erant, nō pro potus ingesti ratione, sed multum excedentes. Verū multa quædam malitia vrinarum eiectionum erat. Neque enim crassitudinem, neque concoctiones, neque purgationes bonas habebant. Nam in multis morbis purgationes per vesicam fientes bonæ sunt. significabant autem plurimis colliquationem, & turbationem, & dolores, & nullam iudicationem. Soporosi verò maximè phrenitici, & febre ardente laborantes erant. Sed & in aliis morbis omnibus maximis, qui cum febre fiebant. In totum autem plurimos aut grauis sopor comitabatur, aut paruos ac tenues somnos habebant. Multa præterea alia febrium genera populariter grassata sunt tertianarum, quartanarum, nocturnarum, continuarum, longarum, erronearum, anxiarum, inconstantium. Omnes autem hæc cum multa turbatione fiebant. Nam alui plurimis turbata: horrores, sudores non iudicatorij: & urinæ velut præscriptum est. Atque hæc plerisque horum longa erant. Neque enim abscessus his fientes iudicabant, velut in aliis. Et omnia quidem omnibus difficulter iudicabantur, & nullæ iudicationes fiebant, & diuturnæ, maximè verò his: paucis autem horum iudicatio circa octogesimum diem fiebat. Plurimis prout contigit defecerunt. Moriebantur autem horum pauci ex hydrope erectè obambulantes. Multos verò etiam in aliis morbis tumores infestabant, maximè verò tabidos. Maxima autem & grauissima erat tabes, & plures occidit. Nam multi per hyemem incipientes, partim decumbebant, partim erectè obambulabāt. Ante ver autem plerique ex decumbentibus moriebantur. Aliorum verò tusses nihil defecerunt. Verū æstate remiserunt. Aut sub autumnum omnes decubuerunt, & multi mortui sunt, plurimi verò horum diu ægotauerunt. Cœpit igitur plurimis horum derepentè ex his afflictio, frequentes horrores erant, sæpe febres continuæ, acutæ: sudores intempestiui, multi, frigidi perpetuò. Multa frigiditas, & vix rursus recalescebant. Alui variè adstrictæ, & rursus breui humescen

Quæ febres vigerent.

Tabes grauissima fuit

scientes. Et quæ circa pulmonē erant omnia, infra distribue-
bantur. Multitudo vrinarum non bonarum, colliquationes
malæ. Tusses autem aderant quidē perpetuò multæ, & mul-
ta educentes matura ac liquida. non autem valde cum dolo-
ribus. Sed etsi aliquantulum dolerent, valde tamen leniter
omnibus purgatio à pulmone fiebat: fauces non valde mor-
daces: neque falsugines quicquam infestabant. Viscosa tamē
& alba, & liquida ac spumosa multa de capite descendebāt.
Magnum autem malum & hos, & alios comitabatur cibo-
rum fastidium, velut præscriptū est. Nam neque potū cum
cibo libenter sumebant, sed valde sine siti degebant. Graui-
tas corporis. Soporosi. Plurimis ipsorum tumor, & ad hydro-
pem deueniebāt. Horridi, deliri circa mortem. Forma tabi-
dorum erat levis, subalbida, lentis colorem referens subru-
bra, raua. Pituita alba referti. Scapulas alarum modo eminē-
tes habentes: & mulieres sic. Atræ bilis item forma, & sub-
sanguinea, febres ardentes, & phrenitides, ac dysenteria hos
tentabant. Tenesmi iuuenibus pituitosis: longa alui proflu-
uia, acrésque secessus & pingues, biliosis. Erat autem omni-
bus præscriptis grauissimū quidem ver, & multos occidit.
Aestas autem facilima, & paucissimi perierunt. Autūno ve-
rò & sub pleiada rursus multi moriebantur quartanarij.

AEGROTI SEDECIM. PRIMVS.

Parijs. **I**N Thaso Parium quendam, qui decūbebat supra Artemi-
sij ædes, febris corripuit acuta: ab initio continua, ardens,
siticulosa, principio soporosus, & rursus insomnis. Aluus tur-
bata in principio. Vrinæ albæ. Sexta die minxit urinā oleo-
sam, mente motus est. Septima exacerbata sunt omnia: nihil
dormiuit. Sed & urinæ similes, & mēs turbata. Ab aluo verò
biliosa, pingui prodierūt. Deinde octaua parū de naribus
stillauit. Vomuit virosa pauca, parū dormiuit. Nona per ea-
dem. Decima omnia remiserunt. Vndecima sudauit, nō per
totum. Circumfriguit quidem, verū breui rursus incaluit.
Duodecima febris acuta. Secessus biliosi, tenues, multi. In v-
rinis quiddam in medio vehabatur: mente motus est. Deci-
ma septima laboriosè transmissa est. Neq; enim somni, neq;
febris augescebat. Vigesima sudauit per totum, insomnis: se-
cessus biliosi, cibum fastidians, soporosus. Vigesima quarta
recidua facta est. Trigesima quarta à febre liber, aluus non
suppress

Quæ tabi-
dis species
hos vexa-
bat.

A suppressa est. Et rursus inclinavit. Quadragesima à febre liber, aluus nō multo tempore suppressa fuit. Cibū fastidians, parum rursus febricitavit, & semper erroneo modo, partim sine febre, partim non. Nam etsi reliquisset & alleuata esset, rursus reuertebatur. Eduliis quoque multis & vitiosis utebatur. Somni mali circa recidiuas, mēte motus est. Vrinæ crassitudinem quidem habentes tunc mingebat, verū turbatas & prauas. & aluus iam adstricta erat, & rursus soluta, febricula continua: secessus multi, tenues. Centesima vigesima die mortuus est. Huic aluus assidue à prima die lubrica erat, ex biliosis, liquidis, multis. Aut adstricta ex feruidis ac crudis. Vrinæ verò perpetuò malæ. Sopores plerunque cum doloribus, insomnis, cibum fastidians, febris ardens continenter.

A E G R O T V S I I.

IN Thaso decubentem apud frigidā, à partu ubi filiam peperisset, & purgatio facta non esset, febris acuta horrida, Puerpera
quæ passa
sit. tertia die corripuit. Multo autem tempore ante partū febriculosa erat, decumbēs, cibum fastidians. Postquam autem ringuisset, febres cōtinuæ, acutæ, horridæ. Octaua multū mente mora est, & sequētibz diebus, & breui rursus resipiscebatur. Aluus turbata, ex multis tenuibus, aquosis, bile permixtis: sine siti erāt. Vndecima resipiscebatur, verū soporosa erat. Vrinæ multæ, tenues, & nigræ, insomnis. Vigesima parū circumfrigit, & breui rursus incaluit, parū deliravit, insomnis. Alui secessus iisdē. Vrinæ aquosæ, multæ. Vigesima septima à febre libera, aluus adstricta est. Non multo tēpore postea coxæ dextræ dolor fortis multo tēpore. Febres rursus comitabantur, & urina aquosæ. Quadragesima dolores circa coxam alleuati sunt. Tussis autem assiduæ, humidæ, multæ: aluus substitit. Cibum fastidians. Vrinæ in iisdem. febres autem in totum quidem non deficientes, erroneo verò modo exacerbescētes, partim ita, partim nō ita. Sexagesima tussis quidem obscure defecerunt. Neque enim aliqua sputorum cōcoctio fiebat, neque alius consuetus abscessus. Maxilla verò ex dextris diuulsa est: soporosa, rursus delirabat, & breui resipiscebatur. Cæterum à cibis auersum animum habebat, & maxilla quidem ad locum suum rediit. Aluus autem biliosa, pauca egebat. febricitavit acutius, horrida, & sequētibz diebus voce destituta est, & rursus resipiscebatur ac loquebatur. Octoge-

Hippocratis Liber I I I.

suma mortua est. Vrina huic perpetuò erāt nigra, & tenues, & aquosa, & sopor comitabatur. Cibum auersans. Tristis in-
somnia: ira, molestia. Mens melancholica.

A E G R O T V S I I I.

Pythion
Herculis
templum.

IN Thaso Pythionem qui supra Herculeum templum de-
cumbat ex laboribus, & lassitudinibus, & neglecta vi-
ctus ratione, rigor magnus, & febris acuta corripuit, lingua
arida, siticulosus, biliosus, non dormiuit. Vrina subnigra,
quod in medio ipsarum pendebat, sublime erat. Secunda die
circa meridiem frigiditas extremarum partium, & magis
circa manus & caput, loquela & voce destitutus. Breuispirus
ad multum tempus, rursus incaluit. Sitis. Nox quieta. Suda-
uit parum circa caput. Tertia dies quieta. Vespero verò sub
solis occasus parum frigit. Turbatio nocte dolorosè, nihil
dormiuit. Ab aluo pauca cōpacta stercora prodierunt. Quar-
ta manè quietus, Circa vesperā omnia exacerbata sunt, frigi-
ditas, loquela, & voce destitutus, in deterius recalefactus est
post tempus. Vrinam minxit nigras in medio quid pendens
habentes. Nocte quietè dormiuit. Quinta visus est alleuatus
esse. Verum iuxta aluum grauitas cum dolore: siticulosus.
Noctē laboriosè tulit. Sexta manè quietus. Vespero dolores
maiores, exacerbatus est. Vespero clystere adhibito, ab aluo
probè egegit. Nocte dormiuit. Septima die anxius, submo-
lestè ferebat. Vrinam minxit oleosam, noctu turbatio mul-
ta, delirabat, nihil dormiebat. Octaua manè parum dormi-
uit. Mox autem frigiditas. Vocis interceptio. Spiritus tenuis
imminutus. Vespero rursus excalefactus est, mēte motus est.
Iam autem ad diem parum alleuatus est. Secessus meri, pau-
ci, biliosi. Nona soporosus, anxius, quum excitaretur, non val-
de siticulosus. Circa solis occasus molestè ferebat, delirabat,
noctem malā habuit. Decima manè voce destitutus, frigi-
ditas multa, febris acuta. Sudor multus: mortuus est, dolores
huic in diebus paribus.

A E G R O T V S I I I I.

Phreniti-
cus mori-
tur.

PHreniticus prima die decubēs vomuit aruginosa, multa
tenuia, febris horrida, sudor multus, continuus per to-
tum. Capitis & colli grauitas cum dolore. Vrina tenues, in
medio ipsarū pendentia, parua, diuulsa: nō sudauit. Ab aluo
stercora acervatim egegit, multū mēte motus est, nihil dor-
miuit

De Morbis Popularibus.

335

A miuit. Secunda mane voce destitutus, febris acuta, sudauit: non intermisit. Palpitationes per totū corpus. Nocte conuulsiones. Tertia exacerbata sunt omnia. Quarta mortuus est.

A E G R O T V S V.

IN Larissa caluus, femur dextrum doluit derepente. ex his quæ offerebantur nihil proderat. Prima die febris acuta, ardens, quietè tenebat. dolores autem cōsequebantur. Secunda femoris quidem remiserunt dolores. febris autem acuta est. submoles tē ferebat. nō dormiebat. extremitates frigida. Vrinarum non bonarum copia prodibat. Tertia femoris dolor quieuit. Mentis emotio, & turbatio, & multa iactatio. Quarta circa meridiē mortuus est celerrimē & acutissimē.

Caluus ci-
to moritur.
Larissa.

A E G R O T V S V I.

B **I**N Abderis Periclem morbus corripuit acutus, continuus, cum dolore. Sitis multa anxietas. potum cōtinere non poterat. Erat autem sublienofus, & capite grauatus. primo die sanguis ē sinistra nare erupit, multa tamē febris augescebat. Vrinam minxit multā, turbatam, albam, deposita nō subsidebat. Secunda omnia exacerbata sunt. vrinæ tamen crassæ quidem erant, verū magis subsidebant, & anxietas leuata est. dormiuit. Tertia febris emollita est. Vrinarū copia: quæ concoctæ multā subsidentiā habebant. Nox quieta. Quarta circa meridiem, multū calidum sudorem per totum exclusit. A febre liber iudicatus est. non rediit. morbus acutus.

pericles.
Abdera.

A E G R O T V S V I I.

C **I**N Abderis virginem quæ decumbebat in sacra via, febris ardens corripuit. Erat autem siticulosa & insomnis. Menses autem primū ipsi descendebant. Sexta anxietas multa. rubor. horrida. mœsta. Septima per eadē. Vrinæ tenues quidem, verū boni coloris. venter non vexabat. Octaua surditas, febris acuta. insomnis. anxia. horrida. intelligebat. Vrinæ similes. Nona per eadem, itēque sequentibus sic surditas perseuerabat. decimaquarta mēs turbata. febris remisit. Decima septima sanguis per nares fluxit multus. Surditas parum remisit. & sequētibus anxietas. surditas aderat. & delira erat. Vigesima pedum dolor. surditas, delirium intermisit. sanguis, paucus per nares erupit. sudauit. à febre libera. Vigesima quarta febris rediit. surditas rursus. pedum dolor permanfit. mētis emotio. Vigesima septima sudauit mul-

Virgo Ab-
deritana.

V 3

rum

Hippocratis Liber I I I.

tum à febre libera. Surditas defecit, pedum dolor restabat. De cætero perfectè iudicata est.

AEGROTVS VIII.

Anaxion.
Thraciæ
portæ.

IN Abderis Anaxionem, qui decumbebat ad Thracias portas, febris acuta corripuit, lateris dexteri dolor assiduus. Siccam tussim habebat, neque expuebat primis diebus. Siticulosus. Insomnis. Vrinæ boni coloris, multæ, tenues. Sexta delirus. Ad calefactoria nihil remisit. Septima dolorose agebat. Nam & febris augescebat, & dolores non remittebant, & tussēs vexabant, difficultérque spirabat. Octaua cubitum secui, effluebat sanguis multus, velut debebat. Remiserūt quidem dolores, tussēs tamen siccae comitabantur. Vndecima remiserunt febres, parum circa caput sudauit. Tussēs adhuc, & quæ à pulmone prodibant, liquidiora erant. Decima-septima incæpit pauca matura spuere, alleuatus est. Vigesima sudauit, à febre liber post iudicationem, alleuatus est. Erat autem siticulosus, & à pulmone prodeuntium purgationes non bonæ. Vigesima-septima febris rediit. Tussiit, eduxit matura multa. Vrinis subsidencia multa, alba. Sine siti erat, bene spirans. Trigesima-quarta sudauit per totum, à febre liber, penitus iudicatus est.

AEGROTVS IX.

Heropy-
thus.

IN Abderis Heropythus erectè obambulās caput dolebat. Non multo autem tēpore postea decubuit, habitabat prope superiorem viam, febris ipsum corripuit ardēs, acuta. Vomitus ab initio multorum biliosorū, siticulosus, multa molestia. Vrinæ tenues, nigrae, id quod in medio ipsarum pende-
bat, sublimè erat aliquando, quādoque non, noctem dolorose transegit. Febris aliàs aliter exacerbescebat, plerūque inordinatè. Circa decimam-quartam surditas, febres augescebant. Vrinæ per eadem. Vigesima multum mente motus est. itémq; sequētibus. Quadragesima multus sanguis ex naribus erupit, & magis intelligebat. Surditas aderat quidē, sed minor, febres remiserūt. Sequentibus diebus sanguis erūpebat frequenter & paulatim. Circa sexagesimā sanguinis eruptiones cessarunt. Coxæ autem dextræ dolor fortis, & febres augescebāt. Non longo tempore postea dolores omniū infernarum partium. Contigitque aut febres esse maiores, & surditatē multā: aut hæc quidē remittere & leuiora fieri, infernarum

A fernarum autem partium circa coxas, dolores esse maiores. Iam verò circa octogesimam omnia remiserunt. Nihil tamen defecit. Vrinæ enim boni coloris, & plures subsidentias habentes prodibant, & deliria minora erant. Circa centesimam alius multis biliosis turbata est, & tempore non modico multa talia prodibāt, & rursus dysenterica cum dolore. Reliquorum verò quies erat. In summa, & febres defecerūt, & surditas cessauit. In centesima vigesima perfectè iudicatus est. febris ardens.

A E G R O T V S X.

IN Abderis Nicodemum ex venere & potu, febris corripuit. Initio autem erat anxius, & cordis dolore vexabatur. siticulosus. lingua combusta fuit. Vrinæ tenues, nigrae. Secunda febris exacerbata est. horridus. anxius. non dormiuit. Vomuit biliosa, flaua. Vrinæ similes. Nox quieta. dormiuit. Tertia die remiserunt omnia & quies erat. circa solis occasus rursus molestè ferebat. noctem laboriosè tulit. Quarta rigor. febris multa. dolores omniū. Vrinæ tenues, & quid in medio ipsarum pendens. Sexta mente multum motus est. Septima quies. Octaua alia remiserunt omnia. Decima & sequentibus diebus aderant quidem dolores, verum omnes minores. Exacerbationes autem & dolores huic ad finē vsq; in diebus paribus magis erant. Vigesima minxit vrinam albam, quæ crassitudinem habebat, & deposita non subsidebat. Sudauit multum. visus est sibi à febre liber esse. Vespero verò rursus incaluit. & dolores iidem. horror sitis. parum mente motus est. Vigesima quarta multam vrinam albam, multam subsidentiam habentem minxit. Sudorem multum calidum per totum exudauit. à febre liber. iudicatus est.

A E G R O T V S X I.

IN Thaso mulier morosa, ex mœrore cum occasione, cretè obambulās. insomnis facta est, & cibi fastidians. & erat siticulosa, & anxiosa. habitabat autem prope Pyladæ ades in Leio. Prima die sub initium noctis timores, sermones multi, tristitia febricula tenuis. Mane cōuulsiones multæ. Quum autem intermisissent conuulsiones illæ multæ, delirabat. turpia loquebatur. Dolores multi, magni, continui. Secunda per eadem. nihil dormiebat. febris acutior. Tertia conuulsiones defecerunt. Sopor autem & in somnum grauiorem

delatio aderat, & rursus vigiliæ. exiliit. continere se non potuit. multum deliravit. febris acuta. Ad hanc noctem multum sudorem calidum per totum corpus exclusit. à febre libera. dormiuit. Penitus resipuit. iudicata est. Circa tertiam autem diem vrinæ nigræ, tenues. quod in medio ipsarum pendebat aliquandiu rotundum, non subsidebat. Circa iudicationem menses multi prodierunt.

AEGROTVS XII.

Virgo Larissa.

IN Larissa virginem febris corripuit ardens, acuta. in somnis. siticulosa. lingua fuliginosa, arida. Vrinæ boni quidem coloris, sed tenues. Secunda die laboriosè degebat. non dormiuit. Tertia ab aluo multa prodierunt aquosa cum virore pallida. itidémque sequētibus diebus prodierunt eiusmodi tolerabiliter. Quarta vrinā egeffit tenuem, paucam: habebat in medio pendens illud sublime, non subsidebat. mente mota est ad noctem. Sexta per nares sanguis multus largè fluxit. quūque inhorruisset, sudorem multū calidum per totum effudit. à febre libera. iudicata est. In febribus autem, & iam iudicatæ, menses tunc primū prodierunt. Erat enim virgo. Perpetuò verò anxiosa erat. horrida. faciei rubor. oculorum dolor, capitis grauitas. Huic non rediit, sed iudicata est. Dolores diebus paribus.

AEGROTVS XIII.

Apollonius Abderitanus.

Cur hic adeo laborauit.

APollonius in Abderis erectè titubans obambulabat multo tempore. Erat autē magnis visceribus præditus. & circa hepar dolor multo tempore familiaris ipsum comitabatur. & sanè tunc etiam morbo regio tenebatur. flatuosus. coloris subalbi. Quum autē edisset ac bibisset intempestiuius carnem bubulam, incaluit parum primum. decubuit. Lacte verò vsus cocto & crudo. multo, caprino ac ouillo, & victu malo, omnium læsiones magnæ sequutæ sunt.

Nam & febres exacerbatae sunt, & aluus nihil memorabile de ingestis egeffit. Vrinæ tenues & paucae prodibāt. Somni non aderant. inflatio mala. sitis multa. soporosa. præcordij dextri eleuatio cū dolore. extremitates vndique subfrigidae. parum delirabat. Obliuio omnium quæ loquebatur. mente mouebatur. Circa decimā quartā ex qua quum riguisset incaluit, decubuit, & insaniit. clamor. turbatio. sermones multi. & rursus quies. & tūc sopor accessit, postea verò aluus turbata,

A bata, multis, biliosis, meris, crudis. Urinae nigrae, paucae, tenues. Multa molestia. Secellus variè habebant. Aut enim nigri, & pauci, ac æruginosi erant: aut pingues, crudi. & mordaces. Per tempora verò videbatur etiã lactosa egerere. Circa vigesimam quartã lenitas erat. & reliqua quidem in iisdem perseverabant, parum autem resipiscebat: ex quo verò decubuit, nullius meminit: Rursus autẽ breui desipiebat. Omnia in peius procedebant. Circa trigesimã febris acuta. Secellus multi, tenues. delirus. extremitates frigida. voce destitutus.

Trigesima quarta mortuus est. Huic perpetuò ex quo ego novi, alius turbata. Urinae tenues, nigrae. soporosus. insomnis. extremitates frigida. delirus perpetuò. phreniticus.

B A E G R O T V S X I I I I.

I N Cyzico mulierem, quæ gemellas filias magna difficultate peperit, & non valde purgata est, primum inuasit febris horrida, acuta. Capitis & colli grauitas cum dolore. Insomnis ab initio, taciturna ac tetrica, & non obsecundans, Urinae tenues & decolores. siticulosa. anxia plerunque. alius erroneo modo turbata. & rursus adstricta. Sexta ad noctem multum delirabat. nihil dormiuit. Circa vndecimam insaniit. & rursus resipuit. urinae nigrae tenues. Et rursus tempore interposito oleosa. Et alius multis tenuibus turbata. Decima quarta cõuulsiones multae. extremæ partes frigida. nihil amplius intelligebat. urinae suppressae sunt. Decima sexta voce destituta est. Decima septima mortua est. phrenitis.

Puerpera
Cyzicena
gemellas
peperit, &
mortua est.

C A E G R O T V S X V.

I N Thaso Dealcis vxorem, quæ decumbebat in Leio, febris horrida, acuta, ex mœrore corripuit. Ab initio contegebatur, & ad finem perpetuò, semper tacita manibus palpat, vellebat, scalpebat, pilos legebat. Lachrymae, & rursus. non dormiebat. ab alio irrationes. nihil prodibat, parum commonita bibebat. urinae paucae, tenues. Febres ad manum tenues. extremarũ partium frigiditas. Nona multum delirabat. Et rursus sedata est. tacita. Decima quarta spiritus rarus, magnus, per tempus. Et rursus breuispira. Decima septima ab alio irritatio turbulenta. postea verò ipsi potus percurrerant, neque cõsistebant. omnino nihil sentiebat. Cutis arida circumtensio. Vigesima sermones multi, & rursus sedata est. voce destituta. breuispira. Vigesima prima mortua.

Dealcis
vxo Thas-
sia.

Hippocratis Liber III.

mortua. Huic perpetuò ad finem vsque erat spiritus rarus & magnus. Omnino nihil sentiebat. semper contegebatur. Aut sermones multi, aut tacita perpetuò. phrenitis.

AEGROTVS

XVI.

Adolescens
in Meli-
bœa.

Adolescens in Melibœa, ex potationibus & venere multo tempore calefactus decubuit. Horridus autem & anxius erat. insomnis. & non siticulosus. Ab aluo prima die stercora multa prodibant, cum multa defluxione. & sequentibus multa aquosa cum virore pallida prodibant. Vrinæ tenues, paucae, decolores. Spiritus rarus, magnus, per tēpus. Præcordij intentio submollis, oblonga ex vtrisque. Cordis **E** palpitatio perpetuò continua. Vrinam minxit oleosam. decima sensim mēte motus est. moderatūque erat ac quietus. Cutis arida & circundistenta. Secessus multi & tenues, aut biliosi & pingues. Decima quarta omnia exacerbata sunt. mentē motus est. multum delirauit. Vigesima insaniit. iactatio. nihil mingeat. paucos potus continebat. Vigesima quarta mortuus est. phrenitis. Videtur porrò mihi æstas illa quæ tunc fuit. iuxta rationem commoditatem attulisse. Nā æstiuos morbos hyems succedens soluit. Et hyemales æstas succedens transmutat. Quanquam ipsa in seipsa quæ tunc erat æstas, nō stabilis erat: sed derepente calida, & austrina, & sine ventis. Attamē ad aliam tempestatem transmutata profuit. Magnam verò artis partem esse arbitror, etiam de his quæ **F**

Quæ & in
anni tem-
poribus &
in morbis
obseruan-
tur.

scripta sunt recte, posse considerationem facere, ac iudicare. Qui enim hoc nouit, & his vitur, non videtur mihi in arte multum falli posse. Oportet autem exactè perdiscere vnamquamque temporum constitutionem, & ipsum morbum. Et quid boni cōmunis sit in constitutione, aut in morbo. & quid mali cōmunis sit in statu, aut morbo. & qui morbus longus sit & lethalis. & qui longus. & non perniciosus ad vitam. & qui acutus, ac letalis. & qui acutus, & superesse sinens. Ex his enim ordinem dierum iudicatoriorum considerandi, ac prædicendi facultas datur. Et harum rerum gnaros scire contingit, quibus & quando, & quomodo victum præscribere oportet.

HIPPOCRATES

A H I P P O C R A T I S

338

COI DE MORBIS PO-
PVLARIBVS LIBER QVAR-
T V S. I A N O C O R N A-
R I O M E D I C O P H Y-

S I C O I N T E R-
P R E T E.



B

O S T æquinoctium & post pleiada qualia
sunt erodētia & mucosa, quæ caput aperue-
runt, suprà aurem prodierunt. Ei qui apud
Leocydis ædes habitabat, in pede. Phano-
dico digiti in pede, in pectore. Qui tibiam
sectus est, hac parte etiam nigrefactus est.

Erat vlcus magnum in externa tibiæ parte, & retro prodi-
bat. Quum purū factū esset, lateris dolor & pectoris sinistri ē
directo, & febres. Mortuus est à febre. Biliosum restiario
abundē coloratū. Et vstoria adhibenti circa æquinoctiū, san-
guis multus deorsum prodiit. Seni valde vehemēter abscef-
sit, non vltra quatuordecim dies. Vulnerato ab Antiphilo,
vsto iudicatio facta est die septima, bilioso, stupido. Tertia
post iudicationē sanguinem sput, superstes manebat, & re-
cidiua facta est postea. Iudicatus est velut par erat, circa ple-
iadum occasum primū. Post pleiadū autē occasum, bilio-
sus ad insaniā vsque iudicatio facta est, superuixit, circa nonā
diem, absq; sudore. Circa æquinoctiū Chalcidonus à portis
delatus ad forum, ex ruptione circa mammā dextrā dolens,
spuebat aliàs atq; aliàs pallens subuiride. Venter egerebat.

Sudor auspicatus septima, tenuit plerunq; vsq; ad octauā.
iudicatus est decimaquarta. Circa quadragesimā tubercula
exorta ipsi circa vtrasque aures, haud immeritò putabatur
suppuratus fore, nō factū est. Pectus Aristodemo vstum est.

Philidis filio quum abscessus factus esset ex casu, & ipsi pe-
ctus vstum est. Erat autē dolor quidā etiā antea, post æquino-
ctium autūnale recidiuæ, & aliàs vsq; ad solstitiū hyemale.
& cū sole æstiuo. Acheloi vxor sexta die abortiuit, quū esset
sanguinea,

Antiphilus.

Chalcido-
nius.

Aristode-
mus.

Philidis fi-
lius.

Achelous.

Hippocratis Liber IIII.

**Morbus re-
gius.**

**Diuerſi
morborum
affectus.**

Spongiæ.

**Virgini
morbus.**

**Meandri
vxoꝝ.**

**Theſtoꝝis
famula.**

sanguinea, & horrida, & sudores. Iudicatio facta est decima-
quarta, quot mēſium fuerit fœtus, haud ſcio. Maſculum autē
etiā alium ad dies viginti ſe abortuiſſe dixit, an vera dixe-
rit non ſcio. Circa ſolſtitium hybernum aquilonares venti
erant. Morbo regio corripiebatur abunde colorati, & par-
tim horridi, partim nō. Linguae combuſtæ tertia die. Et tur-
bationes circa ſextam & ſeptimam, atque hæ diu durantes.
Decimaquarta ventres reſiſtentes, & in medicationibus non
obedientes. Pro ratione febrium etiam nulli ſudores. Sple-
nes quibuſdam parui ad præcordia dextra extenſi, & ad ma-
nū ſubmurmurantes. Sanguinis fluxiones, & vrinis purgatio
ac iudicatio. Multo autem magis infrā nitebantur. Nam &
hoc ſub illud tempus corripiebat. Quibus nō ſicerat, ſplenes
verò etiam eleuati, his ſanguis ex ſiniſtra nare. Solſtitium
præterierat. hyberna hyberno modo in Aquilonaribus, pau-
lo verò poſt auſtrina erant, ad quindecim dies. Poſtea verò
niues quatuordecim diebus. Circa hanc anni conſtitutionē,
morbi regij abunde colorati vigeabant, qui non ſincerè iudi-
cabantur, recidiuabant. Poſt niues, auſtrina ſuccedebant, &
pluuie, grauedines eruperunt, & cum febribus, & ſine febri-
bus. Cuidam verò etiam, ad dentes, qui antea ex medio do-
luerat: ad dextra, ſupercilium, & oculos. Erant autem & rau-
coſi, & fauces inflammatae, & glandulae iſthic ſpongiæ appel-
latae intumeſcebant, & tubercula circa aures, & maxillā mol-
lia, & cū febre ſedabantur. Incipientibus febricitare fiebant
ſuperne, & in vtraſq; partes pleraque horū, & Spongiæ qui-
buſdā ſub autumnū & hyemem. Sed & porrigines. Et mul-
tae omnibus modis abortiebant, & difficulter pariebant.
Sexta die virgini iudicata, ſexta reuerterunt, iudicata verò
ſunt per ſextam. Omnia in his temporibus ſexta & octaua
iudicabatur, circa pleiadum occaſus. Meandri cæci vxor ſta-
tim cum pallore viride, & ſtatim purulentū ſpuit circa ſex-
tam, & hepatis feruor, & deorſum ſeceſſus modicus, carno-
purulenta ſurſum pauca, alba, lata expuebat, cibum faſti-
diens. Mortua eſt propè vigeliſimam diem. Ex vicinis
Theſtoꝝis famula, ex vſtoꝝis: ſeceſſu bilioſo, multo: præcor-
dio intenſo: Sexta die ex ſuppreſſione alui ipſi tenuia, mul-
ta, vna vice egeſſit, & ſtatim ſudauit, & iudicata eſt, & alui
ſubſtitit, eadem autem hora quum riguiſſet febricitauit, &
rurſus

A rursus eadē hora. Therсандri vxor quum pituita alba prædita nō valde esset, lactans acuta febre correpta est. Huic lingua combusta est, dum alia comburerentur, sub hoc tempus: linguāque exasperabatur, velut grandine multa. Et lumbrici per os. Circa vigesimam autem non perfectē iudicata est.

Circa pleiadum occasus Metrophanti filius, caput percussus ab alio puero, per testam: quum peruenisset ad duodecimam diem febricitauit. Occasio autem erat quod quum dextergeret partes circa vlcus perfricuit, & perfrigeratus est, & labia statim sunt eleuata. Attenuata est autem cutis, multis locis vlterius ab vlcere, quum autem sectus esset non tardē, neque pus effluxit, neque alleuatus est. Iuxta aurem verò videbatur suppurari, in maxilla ad dextram. Hac enim parte etiam vlcus erat. Postea & hoc non suppuratum est, & humerus dexter suppuratus est cito. Mortuus est circa vigesimam quartam. Post pleiadum occasum is qui aurem doluit, circa vigesimam diem postea voce destitutus est, & dextrarum partium impotens, sine febre sudauit, dextra auris, dexter oculus, consistebat non valde, & attrahebat quid ex inferna parte. A sinistris autem distortus est oculus grauiter dolens, collum durum factū est, tertia hora posteaquā doluit.

Post pleiadum occasum, seruus Attici à quartana correptus, stupidus sedatus est. Alius eodem tempore vera stupida insania, ex phrenitide ac lethargo mixta, correptus est. Ad coxas & crura venit dolor, quieuit, quoto die haud scio.

C Eodem tempore horridi, vomentes, & post iudicationem cibum auersantes, & biliosi, & splenes magni, duri, dolorosi, & sanguinis eruptiones. Quibusdam verò eodem tempore, post pleiadum occasum, ex naribus sanguis biliosus ob splenes. In Cranone vxorem Nicostrati correptā decimaquarta die, statim occupauit impotentia colli, & aliarū partium, & cibus inclusus fuit vsq; ad decimam. Spiritus densus paruus, impotentia, palrans digitis, delirans, sudores, distracta sunt ad dexterā partem collum, os, oculus, nasus. Vrinarum subsidencia alba, eruum referēs, alia alba, alia ramentosa, cū pallore subuiridis, farinam lentium referens. Huic quādoq; velut adiposum quiddam superstabat, atque hoc aceruatum, non multū dispersum, velut quod in medio ipsarū pendere solet disparatū, velut extrinsecus ex ouicula, postea verò etiā non

Thersan-
dri vxor.

Metrophā
ti filius.

Attici ser-
uus.

Nicostra-
tus.

V rinarum
varietas.

Hippocratis Liber IIII.

non subsidens mingeatur, & alia quidē talis erat, alia subsi- **D**
dens, alia talis modicē ad latitudinem dispersa, alia contur-
bata, alia talis. Quod in medio vehi solet, nubecula subni-
græ simile, quæ putaretur crassitudinem habere. Laxum au-
tem aliud tenue, aliud tenue tale, aliud velut equi, aliud ve-
lut sunt caliginosa. Qui primus delatus est adolescens, huic
vrina pura tenuis. Omnium secessus tenuis, multus sine bile,
lingua valde aspera. Febris adurēs, insomnis, aluus gibbosa.
Hic mente motus est octaua arbitror die, proteruum in mo-
dum, exurgebat pugnabat, turpia fortiter loquebatur, quum
talis non esset. Huic quū vrinæ multæ tenues prodiissent ex
suppressione, somnus obortus est continuus, & sudor, qui iu- **E**
dicatorius esse putabatur, ex quo talis erat forte circa deci-
mam diem. Verū postea rursus insaniit, & breui mortuus
est vndecima die. Occasionē fuisse puto quod meracum mul-
tū bibisset, priusquam insaniret. Paucos habebat annos, pro-
pemodum viginti. Eumenis vxor autumno vomuit bilem
atrā. Sed & odores manifesti erant, & febres horridæ, & cor-
dis siue osculi vētris dolores, biliosa pauca vomebat, & lum-
bricum. Secessus tenues per omne tēpus. Ante pleiadum oc-
casum delinebant statim sanguinis eruptiones, & breuiore
erant febres ac statim reuertentes breuib; recidiuis, & ci-
bum auersantes, & velut excocti, & anxij, & cor dolentes, &
ferini in iudicationibus, & rigore affecti, & biliosi. Adoles-
cens peregrinus erat, cui tertia die sanguis ex naribus mul- **F**
tus fluxit, itēque quarta ac quinta. Sexta compositē confi-
stebat, mente motus est. Septima die aluus substitit, soporo-
sus erat. Recidiua tertia die, aluus eniti cessauit. Vrinam non
vidi. Circa iudicationē velut debebat. At verò circa pleia-
dum occasum austrina, & pluuiæ erant, & tunc Adolescens
mucosa, subbiliosa, viscosa, multa recremēta egerebat, febris
vehemens continua, lingua arida. Sexta iudicatus est. Septi-
ma rursus inuasit, dimisit eadem die cum tremore, auris fi-
nistre fluxio viscosa, crassa, die sexta. Puero ab vlcere pha-
gedæna eroso, dentes inferni, & ex supernis ac infernis ante-
riores, emergebant, cauitatem habebant. Quibus os ex pa-
lato discedit, his medius confidet nasus. Quibus verò super-
ni dentes anteriores, his latus est summus nasus. Qui quin-
tus dens ab anterioribus numeratur, quatuor radices habet,
sing

Eumenis
vxor.

Iuuenis al-
ter.

Puer pha-
gedænosus
quid tulerit.

- A** singulis paribus ad vtrunque vicinum dentem connexis, extremitatibus omnibus ad internam partem reflexis. Circa tertium dentem suppurationes plures quàm iuxta alios omnes. Et ex naribus fluxiones crassæ, & à temporibus dolores, ex hoc maximè fiunt. Corroditur hic, maximè quintus, ex medio quidem nodum habebat vnum, duos autem antè. Paruus primus intrinsecus iuxta duos corrodebatur. **Se-**ptimus radicem vnâ crassam, acutam habebat. **Athena-**da puero masculo doluit à sinistra parte infernus dens, à dextra supernus. Huius auris dextra suppurata est, dum non amplius doleret. Post pleiada clemens cœlum, nubilosum, & caligines: iudicationes quintanæ, & sextanæ ac septimanæ. **Iam verò etiam diuturniores: febres recidivantes, & quandoque erroneæ, & cibum auersantes, & biliosæ: & dysentericæ cibum fastidientes, febriculosæ.** Circa pleiadum **Quæ pate-**occasum, austrina fortiter erant, sanguinis eruptiones: & fe-
B bres tertianæ naturam referentes, & lenes. **Qui in sutrina** decumbebat, sanguinem abundè biliosum è naribus effudit. **Se-**cessus modicus: iudicatus est septima cum rigore. **Seruus** in extrema caupona, quarta die sanguinè è naribus effudit. multa statim nugabatur: alius renitebatur. **Præcordium** dolorosum, durum. Ad subditam glandem sexta die subierunt mala, cū pallore viridia. Septima mane iactatio: clamor multus: venarum pulsiones circa umbilicum. In acutissimis febribus pulsus densissimi, & maximi. **Quale est ad vesperam** exacerbat, tale erat in omni morbo. **Cæterum ad princi-** **Quæ confi-**
C pia, considerandæ sunt etiam exacerbationes, & an citius redeant, & continuas, & anni tempus. Post pleiadum occasum, austrina. **Quæ quinta die iudicabantur, intermissa vna** repetebant. At verò laxa, pustulosa erant, velut **Acanthio** **Lapyto.** **Lapito.** Circa pleiadum occasum, subscabra, & aspera erant pruriginosa, nullas lachrymas emittentia: & magis quidem hoc tempore. Sed & impetiginosa turgentia. **Hæc erant in** Pythodori vxore, & Capelio, cum febre, sub cuius initium **Pythodo-**ferè Pythodori vxori coxæ impotentes. Post pleiadum oc-
casum horrores: sanguinis è naribus eruptiones. **Sutor qui-** **Sutor** **Glaucius,** **nomine.** **Moschus.** **Largus**
dam septima iudicatus est, vna intermissa, altera rediit. **Rursus quarta iudicatus est. Alius ex his qui à Leocyde ve-** nerant, septima iudicatus est. Alius quarta.

Hippocratis Liber IIII.

Tubercu-
lum auris.

Equo lap-
sus quid tu-
lerit.

Tenedia.

Terræmo-
tus.

Antigenis
vxor.

Apeman-
tus.

Largus sanguis ex sinistra, modicus è dextra nare. Ad deci- D
mam quartam ad iudicationem, si quatenus debebant ab ini-
tio exacerbarentur. Delinquentes circa edulia decima septi-
ma fiebant. Circa aurem in dextra parte tuberculum, paruum
intus durum, foris paruum laxum, dolorosum, nihil remit-
tens, decimanona noctu factum est. Valde biliosis suppara-
tis, purgatio sepiæ atramento maximè similis. Qui cucur-
bitam affixit, cum in coxa esset dolor, huic ad crus deorsum
venit, & melius habuit. Qui in ceramico ab equo lapsus est
cui non statim cucurbita affixa est: vltus est intrò, & vigesi-
ma die recrudit malum: sanguinis eruptiones faculentæ,
& erodentes. Tenedia quarta die abortiuit, masculum tri-
ginta dierum: aluus liquida, tenuia, egeffit: lingua combusta E
fuit: iudicatio quarta die. Post pleiadum occasum lienosa,
vsque ad quintum diem fluebant: iudicata sunt. Cuidam se-
ptia die vrina velut erui lotura, similis ipsa sibi ipsi, postea pu-
ra recidiua. Intermisit etiam Megasis filio, verum sanguis
non fluxit. Vrina velut Antigenis alba, crassa, similis. Cir-
ca solstitium hybernum, sydus non paruum, quinta & sexta
postea terræmotus. Quæ in Perintho morabatur anhelosa,
Antigenis vxor, quæ non sciebat an prægnans esset, men-
ses comparentes rubri. Venter aliàs atque aliàs paruus, aliàs
magnus. Tusiens semper, velut si celerius iter perfecisset.
Mensis erat octauus, sedata est prius febricitans. Apeman-
ti fratris vxor, septima die abortiuit foemellam velut dixit
sexaginta dierum. Circa nonam turbata est, post iudicatio- F
nem, dexteram partes dolebat, velut à recidiua. Hæc & concipiebat citò, & perdebat. Alia quædam in albis mensibus fi-
liam peperit. Alia in rubris, velut conueniebat. Horridi, an-
xij. cibum auersantes, recidiuantes, biliosi, sanguine manan-
tes, subsplenici, doloroso modo plurimi ex sinistris affecti.

Apemanti vxori hac parte oculus distortus est dexter, ad
alteram verò partem lateris mollitudo, Aristophontis fi-
lia tertia & quinta febricitauit: sicca plerunque perseuera-
uit. Venter tamen huic turbatus: agrè iudicatio fiebat, vl-
tra triginta dies cessauit. Pustulæ ex lassitudinibus non
valde fortibus, perueniunt ad septimam liuidæ. Rigor an-
cillæ retrò Heroum obortus est. At verò albæ magnæ, ne-
que ipsæ valde bonæ, graui sopore pressorum, & somnolen-
torum

A torum:& non confidentium,& bile renitente:& siue lubrica, siue dura fuerit aluus,non confidentes. Zoili fabri pulsus tre muli tardi. Vrina & alui secessus moderatè decolor:pectinis distentio vtrinque in directum,vsque ad vmbilicum,cum febre acuta:cibum auersans,siticulosus. Filia adilis apud Te-comæum,quum obscurum esset ipsi quòd vterum gestaret, secundi mensis initio erupit vomitus pituitosus, aliquando verò biliosus:difficulter peperit:perfectè purgata est. Vomitus similiter vsque ad trigessimam diem perseuerauit:postea venter turbatus est,& vomitus cessauit. Lienteria, menses non prodibāt per duos annos hyeme habuit hæmorrhoidas.

Zoilus.

Tecomæus

B Duo fratres Cecropis familiares, quibus nigra ab initio prodibant,subfæculenta,edulia ex sanguine confecta calore referentia,ea ex spumosis bile abundè coloratis viridia erāt. Qui alinum ex pacto eleuauit,statim febricitauit. Tertia & quarta,& quinta,& septima,& octaua sanguis erupit:iudicatus est:aluus lubrica. Vir metallicus,præcordium dextrum intentum,splen magnus:aluus intenta,subdura,spirituosus,decolor. Huic ad genu sinistrum:recidiua,per totum iudicatus est. Temenæ filius habebat quid spiritus, vt viridantis palloris esset, ad dorsum: ad manus viridantis palloris.

Cecrops.

Temenæ filius.

Maritus Lechus puerperæ apud Sitodochū,arquato morbo infestatus,ad quem septima die ingressus sum,octaua moriebatur,neque mingens,neque egerens. Præcordia magna & dura,& spiritus densus. Hic moriens ne frontem quidem sudore humectauit præ dolore. Huius vxor eiecit fœmellam septimestrem, septima die. Apparuit autem quarta die. Hanc à principio quidem pedum dolor tenebat. Desinēte verò febre,spiritus non est solutus,sed intus relictus: dolor ad manus & brachium. Recidiua per longissimum tempus corripuit eos quibus vrinæ ante iudicationem suppressæ fuerant. Quæ erat apud Temenen ipsius soror,cum rigore iudicata est. Quum autem viridās pallor citò desineret, manus & humeri doluerunt:horum autem cessante dolore, caput:oculorum palpebræ supernæ eleuatae sunt,& lachrymæ profuebant:reliqua non noui. Iudicata est primū septima die. Menandri vinitor similiter,verū aluus ab initio tenuia egerebat:postea suppressa est, itēque vrina iudicata est,nō riguit,septima die:quoniam aluus antea turbata fuit.

Menander.

X

Potamo

Hippocratis Liber IIII.

Potamonis filius. Potamonis filio alius non egerebat septima die: duobus diebus ante iudicationem riguit, quapropter neque viri-
Hegelistratius. na suppressibatur. Dens Hegelistratio, cui suppuratio iuxta oculum, suppuratus est iuxta extremum: & rursus sanatus est oculus: & secundum nares pus descendit crassum. Iuxta gingivam carunculæ parvæ rotundæ abscesserunt. Huic circa tertiam diem suppuratio affutura putabatur: postea auerrebatur. Derepente verò intumuit maxilla, & oculi. Quibus abscessus ad oculos in febribus ardentibus, hi maxillas rubent, & sanguinem ex naribus fundunt. Sed & quibus ad aures fiunt. Fortassis autem & abscessus ad articulos magis, non tamen clarè novi. Rigores tremulis, præcordij intentio. Menses apparuerunt decima septima, iudicatio fiebat ita perpetuò. Si tamen non sic intus permansissent, iudicabantur tertia: quædam quinta: quædam septima. Hegelistratio postremi duo dentes parte inter se contigua corrodebantur: postremus habebat supra gingivam duos nodos, vnum iuxta cavernam, alterum ex altera parte. Qua verò parte duo nodi erant, ibi radices latæ similes singulis paribus coincidebant, ad alteram partem medietas vna rotunda. Mulier cui sanguis è naribus erupit quarta & sexta. Septima iudicata est, rubicunda erat. **Mulierum diuersimorbi:** Mulieri ex capite fortiter grauata, iudicatio facta est circa vigesimam. Vigesima præcordia æstuosa. Septima die non valde sanguis è naribus erupit. Secessus tenues: ad oculum dextrum circa octauam. Viro eadem, verum septima iudicatus est. Sublienosus è sinistra parte. Huic octogesima die, & diuturniores oculi affectiones: fortassis quoniam post iudicationem, & quia multæ. Vxor **Temenæ vxor.** spiritiuosa præcordia, & intenta. Menses per tempus apparuerunt. An verò etiam prægnans fuerit, haud scio, alius primùm suppressa, & tunc vomebat: postea non amplius. alius enim multa viscosa ac biliosa egerebat: præcordium non impediēbat. Vndecima ad magnum dextræ digitum inflammatio: alui egestio etiam penitus procedebat. Quibus cōtingentibus, melius habebat. Nam & in somnum delatio minor erat, & febris: & quodammodo facilius spirabat, quoniam supra malum vomitum, vomuerat. Decima sexta sensim factus est spiritus densus, & febris: mortua est. Hæc

A Hæc febricitauit ante abscessum. Septima post abscessum periiit. Erat & hæc rubicunda. Filius mulieris ipsius Apemanti ^{Apemanti} sororis, præcordia magna & splen, spiritus, secessus ^{sororis} amaræ bilis, aliquantulo stercore ammixto, lassus ex operibus. Vigesima die ad pedes, & iudicatio certè lassis ad articulos, non ad oculum, præcordia verò erant intenta, & sanè erat etiam tussicula quædam modicè sicca. Quæ relinquuntur post iudicationem recidiuam faciunt, & in ipsis morbis quæ excernuntur, sputum præmaturum, alui secessus, intemperies, & similia. Apemantus cui dolores in sede, in dextri lateris mollitudine, & iuxta vmbilicum paulò inferius, & è dextra parte: ante dolorem vrinam cruentam mingebant, desuit tertia die. Et faber in altera parte, ex eadem ^{vrina cruenta.} in directum, & hic quoque vrinam cruentam eiiciebat. Quæ ubi cessasset, ambo subidentias in vrinis habebant, & hoc tertia die. Apemantus autem plurimum fouebatur, Alter verò non sentiebat, nisi in dextra parte. Et Nicostrato accidit aliquid iuxta vltimas partes à dextris, inferius quàm quibus in sinistris, longè verò subter lateris mollitudinem, vsque ab vmbilicum vtrisque. Anicula apud Sofileum alba pituita referta: Tibiæ duris tumoribus, albis, laxis, itemque pedes, verum minus. Erant autè & in partibus infra femora, etiam si plerisque difficilis huc exitus pater: imo & in lumbis, & venter tenuis erat, præcordia submollia, spirituosas non valde. Erat autem desinentibus plurimis, etiam alia cura ubi glauci facti erant oculi. Atque oculorum quidem cura paulò moderatior erat. Coxæ verò ac cruris affectiones vterinæ erant, quum dolores esse putarentur. Apposito enim ac subditio medicamento odorato, ex farina & vnguento, contigit vt breui discuterentur ac desinerent. Tempus autem abscessus ad oculum, annus. Circumcirca durus fuit, cui etià pustulæ non perfectè contabuerunt. Sunt autem & à disquamatis talia. Seruus in Hippolochi villa, cui in præcordiis vtrinque quid collectum erat durum, & fulgorem aliquantulū habens infernè, qualis erat in fabri ferrarij vxore hydropica: Cui tenuia recrementa progressa partem aliquam euacuauerunt. Erat autem & hoc ipsum ad dextrū planum quiddam, supra ea quæ circumferentiā habent eleuatū. Huic vmbilicus ex natiuitate denigratus erat, & vlcus profundum

fundum fiebat, & vmbilicus non valde cicatricem contrahē-
bat, & pudendum summa parte denudatum erat, quum non
statim tale fuisset, neq; connatū, & adhuc magis fiebat. Hic
plurimum vomebat, febris, cibi fastidiū, sanatus est. Verū
circa septimam à decubitu diem (nam & antea agrotarat)
aquam multā bibens, & fortassis aliter contemnens, iactaba-
tur & aliquantulum conuellebatur. Desinente autē conuul-
sione, circa animaduersionem extinctus est. Antē hoc verò
vrinam aceruatam minxit, & flatus cum crepitu prodierūt,
& supernæ partes minimè sunt euacuatae. Quum autē mor-
tuus esset, statim etiam & illæ fortiter emollitæ sunt, & reli-
quæ rubefactæ sunt, velut à flagris per totū corpus, excepta
ea parte vbi tumor ille maxime eleuatus erat, & multū quo-
que calidus erat. Cuidam verò in Abderis deorsum eru-
pit. Cuidam autem anteriore parte intumescebat sine fe-
bre. Tumor ad contactum suppurato similis erat. Famulæ
anhelosæ, quum vasa menstruum sanguinem funderent, an-
helationes illæ cessabant: febris fiebat, mamma sinistra su-
perne suppurata est, & ab initio etiam auris. Olympiodori
famulæ sanguis ex sinistra nare, & iudicata est ad vigesimā,
quemadmodum etiam febricitantibus, & secessus quales
etiam æstate populariter grassati sunt, & quales Hippona-
tis. Hyle famula Aristidis, octaua die in pharmacorum pur-
gatione, infernè signa habuit, qualia facile ferunt, & si non
præter rationem debilitantur, & neque spumosa, neque sub-
sanguinolēta, sed qualia sunt oua, velut Heraclidæ vxor pur-
gata est multum, & facile tulit. Quæ in Bulagoræ villa de-
purgata erat, cœpit febricitare ex splene. (Qui verò dex-
trum præcordium habent, non quidem sublime, verū in-
tentum, hi etiam magis rubicundi fiunt) rubicunda quum
esset, aluum in principio turbatam habuit, expectabam ad
oculum decubitum. Huic septima die salsuginosa lachryma
mordax ex oculis prodiit, & secundum nasum, & fauces, &
aurem sinistram. Decima quinta sudauit cum rigore, non iu-
dicabatur ante rigorem, pallida facta est valde, & faciei cir-
cumtensio ac contractio. Aurem è directo splenis ac lateris
dolebat. Pueris ventres turbati, & tussis sicca: quando-
quæ ad humerū suppuratio fiebat in tussibus, posterioribus
diebus. Fullo collum, caput, septima manus torpida. Nona
crus

Famula an-
heloia.

Olympio-
dorus.

Hyle ancil-
la.

Heraclidæ
vxor.
Bulagoræ
villa.

Lachryma
salsa.

Puerorum
vitia.
Fullo quid
tulerit.

A crus torpidum, tussis cessauit, Cui maxilla distracta fuit, in quinto mense in ventre distracta erat ad sinistram partem.

In Cranone Lycino Grammatico, ex febre biliosa ex sple Lycinus
ne, capitis grauitas, stridebat secundum pulmonem, in labiis Grammaticus.
vtrisque vlcera, intus rotunda, parua, postea etiam sanguinis Famula
quid ex nare è directo manauit. Famulae quam recens em- quadam.
ptam vidi, cui duricies in dextris erat magna, non valde do-
lorosa, & venter magnus ac circumtensus, non similis hydro-
picae, & alia pinguis ac mollis, & non valde difficulter spi-
rans, verum decolor. Menses septem annis non prodierant,
facta est dysenteria, & non tenesmo tentata. Et sub hac duri-
cies in dextra dolorosa erat, & febres tenues, & non vltra se-

B ptem dies etiam aluus turbata est, secessus electrum referens,
subuiscosus, multus ad aliquot dies. Sanata est, & menses post
ea prodierunt, & partes secundum ventrem molles fiebant.
& corpus boni coloris ac crassum ipsi erat. Minois vxor Minois y-
ex sectione, pressa ab eam administrantibus durius, marco- xor.
rem ac corruptionem incidit, malo ad pulmonem deuenien-

te, breui significationem de se dedit quotquot diebus super-
erat, erat & aliud quiddam intrinsecus. Quae induntur in
nares si febricitarint, si quidem solutus fuerit dolor, crassa
per nares effluunt. Si verò neque dolor, neque febris, tenuia:

& fortassis feruida: Veluti tenue quidem Hegesippo, quum Hegesip-
ad noctem quid indidisset. Crassum verò illi in Corintho eu- pus.
nucho simili, Celeuris filio erat. Maturi in morbis absces- Celeuris fi-
sus an iudicent, signum est, si dum feruida sunt mala, non fe- lius.

C bricitarint: & dum molesta sunt, facile portarint: Velut quae
in sede acciderunt Charoni. Leambio verò quum intestinum
vlcerosum esse putaretur, in dysenteria pharmacis curato,
humerus & sedes vlcera sunt in sinistra parte, citra febre.

Charon.
Leambius.

Cui à flatibus laterum mollitudo eleuabatur, & aliquan-
tulum dolebat, huic quum lac vberius & meracius bibisset, &
insuper dormiisset, statim nausea & calor accedebat. Deinde
ignem incedenti, & pro cibis farinam crassiorem in craticula
coctam comedenti, aluus substitit, & purulentum tamen quic-
dam egeffit. Quum autem sedes esset inflammata, sine febre &
sine dolore sufficienter erat, hoc assero. Senex in lapideis Senis mor-
vestibulis, lumbos doluit, & ambo crura, & vtrique dolores bus.
descendebat ad femora, & quandoque tibias, & aliquando ad

Hippocratis Liber IIII.

**Quæ obser-
uentur.**

Aristeas.

genua. & quum diutissimè durarent, recursiones multæ fie-
bant. tumor in pedibus, lumbis, tibia. breues inguinū tumo-
res. venter durus. & totus pectus intensus ac dolorosus. Ple-
runque compertus est etiam vesicam durā habere ac doloro-
sam. & papularum eruptiones, & calores oculis, auribus, nari-
bus, manu. Iudicationes, & alia per quæ cognoscimus de ipso
ægro, an sudet, aut tangat, aut aliquid olfecerit, aut gustaue-
rit, itémque alia cognoscuntur. Pili, color, cutis, venæ, nerui,
musculi, carnes, ossa, medulla, cerebrum, & à sanguine visce-
ra, venter, bilis, alij humores, articuli, & postea an doluerit iux-
ta aurem, iuxta ipsam collectum tuberculum glandulā non
attingens. os non suppurans, & hoc disparuit, & tunc statim
febricitauit. Pulsus, tremores, cōuulsiones, singultus, circum-
spiratio, secessus, per quæ cognoscimus. Suppuratis oculis,
& dū erumpūt, vlcerata magna fiūt, & dū secantur, profunda.
& utroq; modo oculi vlcerātur. Aristeas ex pago Amphilo-
chi quarta die inēte motus est. aluus subuiri dia egerebat, &
somnia salubres. albicantis coloris. Quibusdā ab initio sub-
tremuli digiti, & labia ubi loquerētur, itidémq; aliæ partes:
& proteruē lingua citiore ac volubiliore præditi: his rubor
in facie maximè erat. Hi ebriosi erant, aut vomitu cōmodè
vsi intumescabant. Qui iuxta Medosadæ rades habitabat,
cui tenuia, nō biliosa, aquosa, multa, per secessum prodibant.
præcordium cedens & gibbosum. soporosus fiebat. Circa de-
cimam quartā ad iudicationē maximè progressio, rigor sine
tremore. dissolutio. resolutio. contractio secessus & egestio-
nes. soporosus. mēte motus. ex somno non insaniit. iudicatus
est circa decimam quartam. nihil è iudiciis contrarium.
Alius similiter in principiis secessus subuiscosi, ex quibus
quod crassum est iudicatum est. in somnis. postea subui-
scosi, subbiliosi, maturi, biliosi, non tenues: qui ubi compa-
cti fieri cōpissent. iudicationes celeres. Præcordium inten-
tum apparuit inflammanti, aut venarum intētarum modo.
circa sextam. Postea dormiuit septima. iudicatus est circa
nonam. albicantis colore ambo, non fului. Quum secessus
aquosi sub dio expositi essent, supernè leues, tenues, isatidi
valde similes fuerunt: infernè verò subsidentiam habebant,
Quibus in dextris distētio submollis, phrenitici sunt: si nō
soluatur febre desinente. Quibus autem à mollitudine ven-
tris in

Atris in hac ipsa febre, quiddā collectū aut durum, dolorosum fit, & valde malignum diffundi nō potest, ex talibus fortassis suppurantur. In dextris tumores eleuati, si quidē si quis plurimum ac maximē premat, submurmurant, nō valde maligni putandi sunt. Velut in dextris illi qui ex Amphilochi pago erat, & ei qui iuxta Medosade ædes habitabat. Hi soporosi erāt, & in somnis mente moti. Constitutiones quales in quibus tēporibus ac regionibus magis & minus fiunt. Vigores morborum, & ad iudicationē, & quotidie, & an citius fiant aut serius, tertia quarta, circuitu, & in quibus circuitibus iudicantia, tumētia, cruenta, & nō. Quibus abscessibus

B recidiuæ fiant, venæ temporū, & cōtractiones, & colorū mutationes ante iudicationes, ex rubro ad viridē ac pallidum, si nō iudicent, & cutis circuntēssiones absq; iudicatione, & oculorum cōtractio, corporis duritia sicca. Qui quidē volentes lachrymātur, nō malū est. Quibus autem inuitis lachrymæ profluunt, malum. Quibus in dentibus circuncirca viscosa fiunt, malū est subhiare ac fixis oculis intendere. Qui in tibia vlcus habebat, & Attico vsus est, huic pustulæ eleuatæ, rubræ magnæ, atque hoc protulsi quæ postea accessit, prius enim nō tulsiit. In Aeno quicunq; capite vulnerati horridi erant, maligni & suppurati ex tenesmo, ex peregrinatione ac itinere dolor pedū, & in turbationibus lassitudines. Clinia cibum auersans, colliquescens, purulentū, aliquando parum cruentū, purulentū tumidum eiecit. Hippæ vxor hi-

C dropica, quæ etiam per tres annos vere incipiēte tulsiit, amplius autē suppurata est, ad hyemem aquosa facta est, ab illis autem pharmacis curata melius habuit. Mortua est ancilla.

Ex tussientibus qui manibus laborabant, velut seruus ille qui sarmenta obtorquebat, & Amyntæ filius, ambo sola dextra resoluti cessauerunt, quando quidē perpepsi sunt hoc tussientes. Qui verò aut equitarunt, aut iter fecerunt, in lumbis ac femoribus resoluti sunt. Plurimæ verò tusses siccæ erāt: Sin minus violente sanē. Vxor Emmyris modo nō morbo-
so, absq; febre, stupida esse videbatur, postea ad tremorē totius corporis res ipsa deuenit, & ad colliuationem, & cibi fastidium ac sitim, & frigida erat. Nyctalopes qui plurimam minxissent postea parum quiddā mingebāt. Verūm tussientes & insuper febrientes tubercula ad aures habebāt, erum-

Hippæ vxor hi-
dropica.

Qui tussientes manus agitet.

Vxor Emmyris.

Nyctalopes.

Hippocratis Liber IIII.

Emmyris
filia.

pentia circa septimam aut octauā diem. Emmyris filia fe-
bricitabat, & ex aure purulētum fluebat, circa octauā, haud
pro cōperto habeo. Quibusdā verò etiā dens corrosus fuit,
tertius maximè ex supernis. Præ omnibus autē hic reperi-
tur corrosus, ad hunc dolor, & quibusdā etiā circumsuppu-
ratio. Quibus verò ad aures, hi magis tussiebant quā illi.

Demarati
coniux.
Senex cum
uxore.

Quibus autē cum febribus ad suppurationē, septima rece-
dit. Cuidā postquam exacerbatus fuit, præcordium solutum
non est. aluo autē emollita, inerant pauca subuiscosa, cōpa-
cta, nō bona vrina cruenti coloris. spuebat autē sputum spu-
mosum. Ille ad quem Cynicus me induxit, septima exacer-
batus est. circa decimā quartā iudicatus est. Disparētia, ma-
la sunt. purus fauces. pauca, lata, matura expuens. ex naribus
parum sanguinis stillauit. capite grauatus erat. Manuum ac
pedum dissolutio. aluus soluta profuit. pedes semper calidi.
somnia aderāt ipsi, & iuxta aurem nō extuberabat, quoniam
matura spuisset. Demarati vxor, pedes etiā in horroribus
calidi: siue ad suppurationē, siue non tendebat, periit. Senex
qui ē vita decessit, & grotabat simul cum vxore sua, furiosum
quiddam in se habebat. Postea verò vbi prodiisset, ab ipso
lumbricus subcrassus, & modicus cibus, statim sedatus, &
dormiuit, & sanus erat hic senex, & corporis cutis circūten-
sio. extremæ partes frigida, mollis, tremulus ab initio & la-
biis, & manibus, & voce, mente motus est. moderatè hiabat,
ac fixis oculis intendebat. non valde diffi- culter spirabat. die-
bus haud scio quorū ultra viginti mortuus est. Quibusdā præ-
cordia & aluus subegesserunt cōpressa, acruatim, non cum
murmuratione, velut in Abderis vermium speciem præ se
ferentia. Quicquid cōtingit priore iudicatorios dies præ-
cedente die, & mala & bona signa fiunt in diebus, quibus qui
exacerbantur diuturniores fiunt: & quibus desinentes remo-
rantur. Quædam non fideliter alleuabant, & quædā per se
ipsa exacerbabātur. Sputa peripneumonicis quibusdā bilio-
sa, quum desinere volunt. Valde flaua breuia fiunt. Si qualia
sunt quæ in principiis adsunt, talia postea appareant, hæc nō
valde cōcoqui puto: sed iudicare velut ei qui apud præcepto-
rem erat, & velut aliās quoque vidi. Nicippus in febribus
per somnum semen effudit: & nihil ad peius processit. & hoc
ipsum sæpe ipsi factum est, & nihil læsit. Prædictū est ipsi id
desitutum,

A desitutum, postquam febres iudicatæ forent. & sic factum est.

Critias in febribus ab insomniis vexabatur quæ nouimus, Critias.
& cessauit etiã ipse eadem somniare vnà cum iudicatione.

Alcippus quu haberet hæmorrhoidas, à curatione prohibebatur. Curatus insaniit. febre acuta succedente cessauit. Alcippus.

In febribus acutis siticulosi, à medicis potu interdicto, aut etiam à seipsis abstinētes, multum sibi bibere posse videtur: his aqua frigida data vt reuomāt, prodest. Biliosa enim aderunt. Quod nerui ipsi in seipsos trahunt, signū est. Si quidē enim nerui in supernis manus sauciati fuerint, manus deorsum nutabit. dum ab infernis neruis trahitur. Si verò cōtrā, vice versa. Tussient siccam tussim, qui testes affectos habent.

B & ex tussi vena secta, ad testem solutio fit, & inflammati tussunt. & in febribus ex inguinū tumoribus insuper tussunt.

H I P P O C R A T I S
C O I D E M O R B I S P O -
P V L A R I B V S L I B E R Q V I N -
T V S, I A N O C O R N A -
R I O M E D I C O P H Y -
S I C O I N T E R -
P R E T E .

C



N Helide Olitoris vxor, febris corripuit Olitoris v-
ipsam acuta. & medicamenta bibens nihil xor.
sentiebat opis. In ventre infra vmbilicum
erat quid durum, & altius altero, & dolores
exhibebat fortes. Huc enim manibus cum
oleo fortiter compressum ac emollitū est.
& postea sanguis frequens ipsi deorsum processit, & sanata
est, & vixit. In Helide Timocrates amplius bibit. Insaniens Timocra-
autem ab atra bile. bibit pharmacum. hic purgatus est. pur-
gatio multam pituitā ac bilem atram egerebat per diem. &
ad vespērā purgatio cessauit, & dolorem pertulit in purga-
tione multum. & quum polentā bibisset, somnus ipsum cor-
ripuit, &

X 5

Hippocratis Liber V.

ripuit, & tenuit per noctem, donec sol oriretur. In somno autem praesentibus nihil respirare videbatur, sed mortuus esse. & neque quid diceretur, neque quid fieret, sentiebat. Extentum autem fuit corpus & rigidum. Verum viuebat, & excitatus est. **Scomphus.** Scomphus in Oeniadis pleuritide correptus, mortuus est septima delirus. Pharmacum autem bibit infra purgans. **Phœnix.** priore ante potionem die mentis compos erat, & purgatus est non multum. quum autem purgaretur, delirauit. Phœnici in Oeniadis & Andreæ fratribus maxilla altera intumuit, & labium quod est ante maxillam & oculum, & neque intrinsecus quicquam spectari apparebat, neque forinsecus suppurabat. Sed tumens arida putredine putrescebat. Et alter eadem perpeffus est. Mortuus est autem alter septima die, & pharmacum bibit, & nihil profuit. Verum Phœnici circulus putridus exsectus est. & vlcus purgatum est magna ex parte priusquam moreretur. Mortuus est autem & hic, ubi diutius vixisset. **Euridamus.** Euridamus in Oeniadis, in peripneumonia decima die incœpit delirare. curatus ad mentem rediit, & sputa erant puriora, & morbus ad melius procedebat, & somno multo perfusus est. & oculi morbum regium contrahabant. & mortuus est ad viginti dies. In Oeniadis vir quidam morbo tenebatur, quum sine cibo esset, fortiter in ventre ipsius fugebat, & dolebat. & quum edisset ac cibi cōtriti essent, tempusque post cibi esum acceffisset, non longè postea idem hoc patiebatur. & tabescebat corpus ac consumebatur. & alimentum ipsi non contingebat à ciborum esu. & per aluum secedebat cibus prauus & cōbustus. Quum verò recens cibum acceffisset, eo ipso tempore minimè fugebat. neque dolor aderat. Hic omnis generis pharmaca bibens sursum ac deorsum purgicia, nihil opis sentiebat. Vbi verò vena ipsi secta esset, in vtraque manu, donec exanguis redleretur, postea vtilitatem percepit, & à malo liberatus est. **Eupolemus.** Eupolemus in Oeniadis, dolebat coxam dexteram, & inguen, & commissuram propinquam ad coxam, ab inguine & coxa in anteriore parte. Huic sanguis detractus est à talo, multus valde, & niger, ac crassus. & pharmacum bibit aluum deorsum purgans, & multum purgatus est. & melius quidē habebat, dolores autem non remittebāt. Sed suppuratam habebat, & coxam, & commissuram in ipsa ad sedem, & partem circa inguē, quibus locis etiā amplius dolebat. Pus autem ad os magis fiebat,

A bat, quā ad carnē, in profundo, & per tempus sic habens negligebat, donec valde debilis fiebat, postea crustæ ipsi inustæ sunt, valde multæ & magnæ, ac inter se propinquæ, & pus effluxit multū ac crassum, & mortuus est postea paucis diebus, cum præ magnitudine ac multitudine vlcerū, tum ex corporis debilitate. Huic si vna ampla sectio incisa fuisset, & per sectionē pus emissum esset, & si opus fuisset, etiā altera sectio facta esset: Hæc sanē in tēpore si facta fuissent, mihi quidē videtur quod sanatus esset. Lycon in Oeniadis, reliqua quidem eadem patiebatur, Verū dolores etiā ad crus non ita valde progrediebātur, & nō factus est suppuratus, sed sanus multo tempore. Bibebat autē pharmaca, & cucurbitas adhibebat. **Lycon.**

B & venam secabat. Atque his factis melius habere videbatur.

Homo quidā Athenis prurigine toto corpore vexabatur, maximē autē testibus ac fronte, vexabatur autē valde vehementer, & cutis crassa erat per totū corpus, & velut lepra aspectu, & ex nulla parte cutē apprehendere potuisset, præ crassitudine. Huic nemo opitulari potuit. Trāsgressus autē ad Melum, vbi sunt calidæ balneæ, à pruritu quidē & cutis crassitudine liberatus est, verū hydropicus factus mortuus est. Athenis virum cholera corripuit, vomebātque & deorsum egerebat, & dolebat: & neq; vomitus, neque per aluum secessus, fieri poterat, & vox ipsum destituebat: & ex lecto moueri non poterat: & oculi caliginosi ac caui erāt, & cōuulsiones tenebāt ab aluo, & intestino, & singultus. Verū secessus multo copiosior erat quā vomitus. Hic veratrū in lentium succo bibit, & alterum lentium succū insuper bibit, quātum potuit, & postea vomuit, & coacta sunt ac adstricta ipsi ambo. frigidus autem factus est, & lauabat infernē vsque ad pudenda, calida valde multa, donec etiam supernæ partes calefactæ sunt, & viuebat, postera verò die, volentam bibit ex aqua. In Larissa vxori Gorgiæ menses suppressi erant per annos quatuor, præter valde modicos. Verū in vtero, ad quācunq; partē se inclinasset, pullum exhibebāt ac grauitatem. Hæc mulier cōcepit & peperit, & puella viua nono mense edita est, vlcus habens in coxa, & secundæ consequentes, ac sanguinis fluxus valde multus, successerūt, postridiē, & tertia die, ac quarta, etiam grumi sanguinis cōcreti, & febris tenebat vsque ad decem primos dies, & de cætero prodit ipsi sanguis ruber, & fac

Atheniēsi quidam.

Melos infirma.

Atheniēsi alter.

Gorgiæ cōiunx.

Partus cōvulcere in coxendic nono mense editus.

Hippocratis Liber V.

& facies fortiter intumescibat, itémque tibiæ, ac pedes am- D
bo, & alterum femur, & cibos non admittebat. Sitim autem
habebat vehementem, & frigidissima aqua conferebat. Vi-
num autem nequaquam. At venter post primum puerū mo-
dicè emollitus est, valde autem non confidit, sed durior erat.
dolor autem non aderat. Quadragesima verò die à prima su-
perfectatio excidit, caruncula quædam, & venter confidit om-
nèq; tumores, & fluxio tenuis, ac sanguis olens prodiit, & E
fana euasit. Mulier in Pheris caput circumcirca dolebat
multo tempore, & nemo poterat illi quicquam opis confer-
re neque dum caput purgaretur. Melius autē habebat, quum
menses ipsi facilè prodibant. Hæc quū caput doleret, ex sub-
dititiis odoratis ad vterum appositis opem sentiebat, & mo-
dicè depurgata est, & quum concepisset, dolores caput relin-
quebāt. Mulier in Larissa prægnans erant. Huic decimo mē-
se sanguis prodiit multus per quatuordecim dies. Plurimus
autem tribus diebus ante pueri editionem. Decimaquarta
excidit ex vtero puer mortuus, habens dextrum brachium
lateri adnatum, & tertia die noctu eadē hora qua puer, pro-
diit secunda, & purgamenta alba, deinde post hæc per tres
dies ac noctes multa moderatè prodierūt. Postea febris cor-
ripuit, per duos dies rotidémque noctes, & dolebat omnem
pposthe ventrem, & coxas, maximè verò pectinē. In Larissa Hip-
posthenes peripneumonia apprehensus esse medicis videba-
tur, erat autem nequaquam. Verū principio luctans in du-
ro loco cecidit supinus, aduersario ipsi illapso, & lauatus est F
frigida, & cœnauit, & grauior factus esse sibi videbatur. Se-
quenti autē febricitauit, & tussis apprehendit sicciior, & spi-
ritus densus. Quinta die cruentum exscreauit, non multum:
& delirare incipiebat. Quando tussiebat, dolebat pectus &
dorsum. Sexta autem vbi sternutasset, sanguis fluxit è nari-
bus, quatuor heminarum mensura. Ad vespērā neque loque-
batur, neque sentiebat, neque quid fieret, neque quid diceret-
tur. Vndecima mortuus est. Per quinque verò dies, modò
sapiens erat, modò non. Erat & sine febre. Spiritum autē nul-
lum recipiebat, neque stertorē habebat. Non enim erat spu-
man- tum. Scamandrus in Larissa, & in coxa marcorem habuit;
15. & in osse diu disparato. Ipse verò sectus est sectione magna;
etiam ad os ipsum, & postea vstus est & tunc die duodecima
post

- A** post sectionem cœpit conuulsio, & valde obtinuit, conuellebatur autem crus hoc vsque ad costas, & ad aliam quoq; partem conuulsio progrediebatur, flectebatur autem crus, & extendebatur: & alia membra mouebat, & maxillæ compactæ riguerunt. Hic mortuus est conuulsus octaua die post cōuulsionis inuasionem. Curabatur autem tepesfactoriis vtriculis, & fomētis erui, per totum corpus, & infusum per clysterem immisum est, & tunc modicum stercoris prodiit, & pharmacum bilem abundè purgās bibit, ac insuper catapotium deglutiuit, & secessit quidem, nihil autem à catapotio opis sensit, & somnus modicus venit, & rursus pharmacū idem fortè ad vesperam bibit, ac sole emergēte mortuus est. Videbatur autem multò tempore morbu ferre potuisse, nisi ex pharmaci vi periisset. Equiso Palamedis in Larissa vndecim annorum, percussus est in frontem supra oculum dextrum, ab equiso. Palamed equiso.
- B** equo: & videbatur os non sanū esse, & exiliebat ex ipso modicus sanguis, & sectus est sectione magna vsq; ad secundam laminam, & curabatur sic habēs ipsum os, quòd etiam antea statim os peperit. Vigesima tumor cœpit circa aurem, & febris & rigor, & in die magis intumescebat ac dolebat tumor, & ab initio febricitauit ex rigore, & oculi intumuerūt, & frōs, & tota facies. Patiebatur autem hæc in dextra magis capitis parte. Progressus est autem tumor etiā ad sinistram, nihil tamen hic læsit. Demum febris continua corripiebat. Atque hæc minora erant, vsq; ad octauam diem. Vixit autem
- C** vltus, & per catapotium purgatus, & cataplasmate tumori imposito. At verò vlcus nullius mali causa erat. In Larissa Theophorbi filius vesicam scabiosam habebat, & viscosam Theophorbi filius. vrinam mingebat, & dolebat dum & inciperet mingere, & dum desineret, & confricabat pudendum. Hic quum bibisset pharmacum vrinam ciens acre, in vesicā quidem nihil processit, verum multum purulentū & bilem euomit, & deorsum alia huiusmodi egerebat, & ventrē dolebat, & intrinsecus ardebat. Reliquum verò corpus frigidum erat, & totus resolutus est, & nihil assumere volebat. Huic exulceratus est venter fortiter valde, à vi medicamēti, & mortuus est tertia post portionem die. Vxor Antimachi in Larissa, prægnans Antimach vxor. erat diebus circiter quinquaginta, & reliquo tēpore præ fastidio à cibo abstinebat, & per septem dies vterum dolebat, & cor

Hippocratis Liber V.

& cor, & febris corripiebat, eo tempore nihil per aluum ege-
 rebat, huic datum est catapotium deorsum purgans fortius,
 quàm cōueniebat, & euomuit bilem cōbustam præ cibi ab-
 stinentia & febre. Nam neque vlllo potu vtebatur, euomuit
 autem paucā violenter, & grumosa, & vbi cōcitata fuisset, ac
 ipsam emilisset, debilis esse videbatur, & nō volebat aquam
 bibens euomere. Postea verò dolor fortis tenebat infernum
 ventrem: exulceratus enim erat à medicamento, & prodibat
 ipsi statim post stercus, subcruentū ramentosum. Semper au-
 tem amplior fiebat & debilitas, & cibi fastidiū: & purgamen-
 ti erant heminē quinque. Siscebatur autem aluus, aqua mul-
 ta super ventrē affusa, aliud autē nihil potuit admittere. Mor-
 tua est circa mediam noctem. Videbatur viuere potuisse, si
 aquā bibere potuisset, ac statim vomere priusquam degluti-
 uisset. Famula Onesidemi in Larissa, vlcera est aluum &
 intestinum, à bile sponte cōmota, & prodibat sursum ac de-
 orsum bilis & sanguis, & febris tenebat. Huic debili datum
 est pharmacū deorsum purgans in potu, debile, aquosum, ac
 modicū, & vomuit ab ipso multum, & infrā ampliū subiit,
 & vesperi rediit. Postridie febris erat, sed debilis. Aluus autē
 vlcerabatur, & adhuc eadem egerebat. Tertia die ad vesperā
 mortua est, quā febris valde fortis ipsam corripuisset. Qua-
 propter omnino moritura esse videbatur. Minime verò ideo
 quòd aquam frigidam biberat, donec vomitus tenebat. Post-
 quàm autem perfrigeratus est supernus venter, depurgatus
 per aquam, succo frigido postea poto, sic postea infusum per
 clysterem immissum est. Eudemus in Larissa, hæmorrhoi-
 das habēs fortes, ac diuturnas, quum exanguis esset, bilis cō-
 mota est, sed leniter in corpore, & aluus turbata deorsum bi-
 liosa egerebat, & hæmorrhoides intumescebant. Pharmaco
 deorsum purgante poto, probè depurgatus est, & rursus bibit
 succum, & ampliū aluus turbata est, & dolor ad præcordia
 consistebat. Huic quum venter non probè haberet, sed adhuc
 curatione indigeret, manus hæmorrhoidibus admotæ sunt.
 & vomuit. Postea quum cancer successisset, febris irruit, &
 non dimisit antequàm occideret. Quandoque etiam quum
 rigor subrepēs dimisisset febris venit: & prodiit ipsis bilis &
 flatus, & partim prodibat, partim intus erat, & dolor in ven-
 tre. Hæmorrhoides autem extra intestinū rectum erant, re-
 liquo

Oneside-
 ni famula.

ademus.

- A** liquo tempore à purgationibus auspicate : & flatus per ipsas prodibat, & ad sternutationem principium fiebat. In La- Percussus
hasta mori
tur.
rissa vir quidam sauciatus est cominus ex manu per hastam
latam à tergo, & summum eius penetrauit infra vmbilicum
per multū spatium, quod liuidum erat & tumidum : postquā
autem vulneratus fuit, dolor obtinebat primū fortis, & vē
ter intumescerebat. Huic postridie datum est pharmacum de-
orsum purgās, & egeffit modicum cruētum, & mortuus est.
Videbantur intestina huius non esse sana, & venter sanguine
plenus esse. Apellæus Larissæus ætatem habebat annorum Apellæus.
circiter triginta, aut parum aberat. Corripiebatur autem
morbo, à quo vexabatur noctu magis in somno, quā in inter-
diu. Aegrotabat autem ad duos annos ante mortem. Vome-
bat bilem fuluam aliquando vbi excitatus esset. Vomebat
etiam nigrā. Hic purgatione à capite forti valde ad multum
tempus purgabatur : & cum pharmacum bis bibisset, sex mē-
ses ipsum penetrauit. Erat valde vorax multi cibi : & cū cor-
pus haberet biliosum, multū luctatus, valde riguit : & fe-
bris corripuit, ac morbus ad noctē : postridie sanus esse sibi vi-
debat, & rursus altera die. Sequēti verò nocte morbus in-
uasit cœnatum à primo somno, & per noctē ac diem, & vsque
ad cœnam tenebat. Mortuus est priusquam resipisceret.
Conuellebatur primū circa dextras partes, faciemq; ac
reliquum corpus : postea in sinistris : & quum videretur quie-
tus esse, soporem habebat ac stertebat : & rursus succedebat
C morbus. Eumelus Larissæus rigida habuit crura, & manus, Eumelus.
& maxillas, & non poterat neque extendere, neque flectere, si
non alius flecteret ac extenderet. Et neque maxillas didu-
cere poterat, si non alius diduceret. Aliud verò nihil neque
dolebat, neque edebat, nisi mazam, & aquam mulsam bibe-
bat. Vigesima die sedens caput supinus, & caput ad lapidem
vehementer offendit, & vertigo ipsi caliginosa offusa est, &
paulò post surgens, sanus erat : & soluta erant omnia, præter-
quam post somnum vbi excitaretur, articuli modicè ligati
erant. Erat autem duodecim aut tredecim iam annorum, &
ægrotauit mēlibus tribus aut quatuor. In Larissa virgo quæ Virgo La-
rissa.
sanguinem vomuit non multum, suppurata facta, febribus
corripientibus, non liberabatur priusquam moreretur. Mor-
tua est tertio mense. Ante mortem verò obsurduerunt ei au-
res,

Hippocratis Liber V.

**Dyseridis
ferua.**

**Maliensis
quidā cal-
catus cur-
ru.**

**Autono-
mus capi-
tis vulnere
moritur.**

**Famula si
militer.**

res & non audiebat, nisi quis valde exclamasset. Verum ante **D**
sanguinis vomitum debilis erat. Famula Dyseridis in La-
rissa, quum iuencula esset, vbi venere vteretur, fortiter cir-
cumcirca dolebat. Aliàs autem sine dolore erat. Concepit au-
tem nunquam. Et quum sexaginta esset annorum dolebat à
meridie, velut ex partu vehementer laboraret. Hæc cū ante
meridiem porrum edisset multum, postquā dolor ipsam cor-
ripuit vehemētissimus: & priores omnes excedens, exurgens
asperum quiddam in ore vteri deprehendit: postea cū ipsa
animi deliquium incideret, alia mulier immisā manu, ex-
pressit lapidem asperū, magnitudine verticilli fusi: Et sana
tunc statim, & postea erat. **E**
Maliensi currus onustus indu-
ctus est supra costas, & costas confregit: & per tempus substi-
tit ipsi pus infra costas. Vstus sub splenem penicillis ac lina-
mentis vtebatur, & peruenit ad decem menses. Resecta verò
cute, cauerna apparuit ad tenue intestinum vtrinque proce-
dens, & ad rhenem, & ad ossa procedebat putrida. In hoc non
animaduersum est, quod & corporis habitus biliosus erat, &
in corpore putredo sicca tenuis intestini multa: & aliarum
carnium, quas statim eiicere oportebat, si quis potuisset, sic-
co pharmaco, dum robur aliquod homo habebat. Nā ab hu-
midis nihil remittebant, sed putrescebant. A linamentis ve-
rò inditis quū humor sisteretur, rigor corripiebat & febris,
& magis putrescebat: affluebat autem isthic putridum quid-
dam, subnigrum, graueolens. Priusquam verò curationis ag-
gressio fieret, quotidie multum foras penetrabat. **F**
Erat autē
nō probè fluidum. Cognitum est naturam morbi esse magis
remotam, quā subter cutem. Quòd si verò etiam omnia re-
ctè facta essent, tamen non videbatur seruari posse, etiamsi
ventris profluuium ipsum corripuisset. Autonomus in O-
milo, ex capitis vulnere mortuus est die decimasexta, in me-
dia æstate lapide ex manu ictus, in futuras in medio sincipi-
te. Quare non animaduerti ipsum secari opus habere: dece-
perunt enim me futurae habentes in seipsis iaculi læsionem,
postea enim conspicuum id fiebat. Primū quidem ad clau-
culam, postea ad latus dolor fortis valde: & euulsio ad ambas
manus venit. In medio enim capitis ac sincipitis vlcus habe-
bat. Sectus est autē die decimaquinta, & pus prodiit nō mul-
tum. Membrana verò cerebri imputrefacta apparebat. Fa-
mula

A mula in Omilo ex capitis vulnere, duodecim annos nata, moritur in media ætate, decima quarta die. Ianuā quidam ipsi impegerat, & os contuderat ac ruperat. Suturae verò in vlcere erant. Quare cognitū est rectè sectione opus habere. Secta est autem non velut oportebat, sed quantum relictū est, pus in ipso factum est. Octaua, rigor, febris inualit: habebat autem non velut oportebat, sed quantum etiam prioribus diebus quando febris non tenebat. Nona verò die reliquum resectum est: & valde modicum pus cum sanguine subtus apparuit: & mēbrana cerebri pura erat: & somnus quidem occupabat: febris autem non dimittebat. Cōuulsio verò manū sinistram inuadebat. Nam in dextris magis vlcus habebat.

B Cyrenius in Omilo suppuratus factus, infernum ventrem vltus est, triginta diebus serius quā oportebat: & mansuetē se habebat: & resiccatum est pus in ventre. Verū in calidissimo tempore cedens fructus pomorum, & alios cibos non conferētes, à febre correptus est, & à vētris profluuiio: & mortuus est. Hecason in Omilo, velut etiā alter serius vltus est, attamen resiccatus est venter, modico excepto. Dysenteria verò arripiebat ipsum, quā vbi effugisset, omnia edebat donec totus intumuit, & erupit ipsi pus deorsum, & vētris profluuiio mortuus est. Hecason in Omilo, ab immunditia nō purgata, & à praua purgatione, dolorem acutum in coxa habebat: & hic quidem discessit, successerunt autē ipsi febres, & multo tempore in lecto decumbebat, neque bibens quicquam, neque sitiens: & debilis, & horridus. Huic commodē quidem ablatus est morbus velut conueniebat. Opem autē percipiebat ex his quæ offerebantur. Tandem verò erupit morbus deorsum, & totus secessit præ multa bile: & mente motus est, & mortuus. Videbatur autē morbū euasurus esse.

C Qui in Salamine in anchoram incidit, in ventrem fauciarus est, & circumcirca dolebat. Bibit autem pharmacum, & non egeffit deorsum, neque remouit. Mulier quæ iugulauit seipsam, suffocabatur: & datum est ipsi longē postea pharmacum deorsum purgans, & per secessum ipsi exiit. Qui ex Eubœa venit adolescens, quum multum esset deorsum purgatus, intermissione facta quietus febricitauit. Deinde quum putaret se purgatione sursum versus opus habere, non validam radicem veratri bibit, & post potionem quarta die

Cyrenius
purulentus

Hecason.

Salami-
nius ancho-
ra vulnera-
rus.
Mulier per
se iugulata
Adolescens
moritur.

Y

mortuus

Hippocratis Liber V.

mortuus est. nihil expurgatus. Verū seminus ipsum tenebat, D
 & litis sedari non poterat. Serua illa cui à catapotio sui sum
 quidem pauca prodibant, ac suffocabant: deorsum verò mul
 ta, nocte mortua est. Erat autem barbara. Quidam homo
 Eubæus potio pharmaco deorsum purgāte, per tres dies pur
 gabatur, & mortuus est. Habebat autem manum suppuria
 tam usque ad cubitum. Symmachi filius à bile suffocaba
 tur, noctu quum dormiret, & febris eum tenebat. Pharmacū
 autem ubi bibisset, non continuit, neque purgatus est diebus
 sex antequam moreretur. Qui iuxta curriculum habitabat
 quum noctu sanguinē vomuisset, postridie mortuus est, san
 guinem vomens multum, & strangulatus. Ad splenem verò,
 & deorsum multus sanguis ipsi prodibat. Puer à mulo per
 cussus ventrem & hepar, mortuus est quarta die. Spiritū au
 tem densum habebat, & non intelligebat quicquā: & febris
 tenebat. Hermophili filius agrotabat diebus undecim. Fe
 bris autem tenebat, & cibi non deorsum prodibant: & pri
 mum quidem delirauit, nocte verò cessauit. Sequenti autem
 die voce destitutus iacebat stertens, distortos habens oculos,
 febricitans. Penna verò immissa vomuit bilem atram, &
 quum infusum per clysterem immissum esset, stercus pro
 diit multum. Seruæ Aristionis pes sua sponte marcore cor
 ruptus obtorpuisset, iuxta medium pedis intrinsecus ex obli
 quo: & ossa putrida fracta abscesserunt: & prodibant paula
 tim fistulosa: & ventris profuuium succedebat, & mortua
 est. Mulier sana, crassa, à catapotio conceptus gratia acce
 pto, dolorem habebat ventris, & tormen in intestino, & in
 tumuit. Spiritus autem sistebatur: & desperatio erat cum do
 lore: & sanguinem vomuit non multum: & emortua est quin
 quies, ut vita decessisse putaretur: & neque vomitu facto
 ab aqua frigida laxabatur, neque dolor præsens, neque spi
 ratio. Superfusæ verò sunt ipsi aquæ frigidæ amphoræ circi
 ter triginta super corpus: & sanè hoc solum prodesse videba
 tur: & postea deorsum processit bilis multa. Quum autem
 dolor obtineret, nihil poterat succedere: & vixit. Antander
 à catapotio accepto, cætera sanus erat. Verum circa ve
 sicam dolorem habere videbatur: purgauit ipsam celeriter
 multo purgamento: & à meridie dolor tenebat fortis val
 de: & in posteram diem strangulatio, & desperatio, & ia
 ctatio

A Etatio, & vomebat, & nihil per secesum egerebat, & noctu pariebatur, & somnus non accedebat, postridie verò egerebat multum, & postea sanguinem & mortuus est. Athenadæ puerο masculo à Phagedena vlcere corroso, doluit à sinistra parte dens infernus, à dextra supernus. Huius auris dextera suppurata est, dum non amplius doleret. Sutor in Pityo dum soleas veteramentarias fueret pupugit seipsum supra genu in femur, & ferme longum digitum immerfit. Huic sanguis quidem nullus effluxit. Vulnus autem cito clausum est, femur autem totum in tumorem eleuabatur, & procedebat hic tumor vsque ad inguen & lateris mollitudinem. Hic tertia die mortuus est. Quidam iuxta inguen

Athenadæ
puer.

Sutor sub
la latus pe
riit.

B Sagitta percussus, quem nos vidimus, maximè præter omnem opinionem seruatus est. Neque enim cuspis exempta est, erat enim valde in profundo: neque sanguinis eruptio vlla memorabilis fiebat: neque inflammatio: neque claudicauit. Cæterum cuspidem inuenimus nos, ipsamque eximus, quum sex iam essent anni, ex quo sauciatus erat. Suspicio autem erat hæc, inter medios nervos cuspidem occultam fuisse, nullamque venam aut arteriam disiectam esse.

Sagitta per
cussus eua
sit.

Qui percussus est spiculo acuto retrorsum paulò infra col lum, vulnus quidem habebat non memorabile aspectu, ne-

Contrà al
ter.

que enim in altum ferebatur, verum nō multo tēpore postea exempto spiculo, distendebatur in posteriorem partem tractus, velut opisthotonici, & maxillæ ligatæ erant, & si liquorem aliquem in os sumeret, cumque deglutire conaretur, rursus relidebatur ad nares. Cæteraque statim peiora fiebāt,

C & secunda die mortuus est. Adolescens per asperam viam cursu facto, dolebat pernam, maximè inferna parte. Abscessum autem locus accepit nullum, velut qui colligeret humorem. Verum tertia die totus locus nigrescebat, vsque ad talum, astragalum appellatum, & vsque ad cauitatem quæ est ad pectus pedis, & quod denigratum erat, non diffringebatur, sed prius moriebatur. Viginti verò dies ex toto cursu vixit. Qui ad oculum percussus est, percussus quidem est in palpebram, descenderat autem cuspis altè satis, barbæ verò summum supereminebat. Secta palpebra, sublata sunt omnia. Nihil erat mali. Oculus enim permanfit, & compendio sanus factus est. Sanguis autē effluxit largè, & multa copia.

Calce sub
atrato cur
su hic perit

Supercilio
percussus
sine oculi
læsione sa
natur.

Hippocratis Liber V.

Virgo ma-
nu aperta
verticē per-
cussa pe-
riit.

Virgo illa pulchra Nerij filia, erat quidem annorum vigin-
ti, verū à muliercula amica ludente, lata manu percussa est
in sinciput, & tunc quidē vertigine capta est, & sine spiritu
erat. & quum ad domū venisset, statim febris vehemens cor-
ripiebat, & caput dolebat, & rubor circa faciem erat. Septi-
ma die circa aurem dextram pus processit graueolens, sub-
rubrum, ampliū cyathō & videbatur sibi meliū habere, &
alleuata est. Rursus augebatur febris, & in soporē defereba-
tur, & loqui non poterat, & faciei pars dextera trahebatur, &
difficulter spirabat, & conuulsio ac tremor aderat, & lingua
detinebatur, & oculus stupidus erat. Nona mortua est.

Cleomenis
filius
Cocus gib-
berosus.

Cleomenis filius hyeme initio facto cibum auersabatur,
& eius fastidio citra febrem vexabatur, & vomebat cibos ac
pituitam, & per duos menses cibi fastidium durabat. Coco
in spina gibbositas facta est ex phrenitide. Huic nulla medi-
camenti potio conferebat. Verum vinum nigrum, & panis
esus, & balneorū abstinencia, & frictio, & lenis fons nō cum
multo fomento, sed placidē. Cuidam quæ circa vigesimum
ætatis annum, biberat pharmacum ad foetum perdendum,
accidit dolor, vomitus biliosorum, multorū, pallidorum ac
prasinatorum. Quum bibisset, cōuulsio tenebat, linguam com-
midebat. Ad quartam diem ad ipsam ingressus sum, & erat
ei lingua magna, nigra. Oculorum autem alba, erant rubra,
insomnis. Quarta mortua est ad noctem. Origanum po-

Cur hæc
mortua sit
videto.

Quæ ex al-
to decide-
rat non pe-
rit.

tum, oculis, & dentibus malum est. Puella quæ de rupe ce-
cidit, voce destituta, iactatio aderat, & vomuit ad noctē san-
guinem multum, quum ad sinistram aurem impegisset, am-
pliū inde fluebat. Aquam mulsam difficulter deglutiebat,
stertor, spiritus densus, velut morientium. Venæ circa faciē
distentæ, decubitus supinus, pedes tepidi. febris debilis, vocis
interceptio. Septima vocem rupit, calores tenuiores tene-
bant, superstes mansit. Pythocles ægrotantibus aquam, &
lac multa aqua ammixta dabat. Perniones pertundendi,
& calefaciendi sunt pedes sic vt maximē excalefacias igne
& aqua. Oculis incommoda sunt, lenticula, fructus pomor-
um dulces, & olera. Doloribus circa lumbos, & crura, &
coxam, ex laboribus obortis, aquæ marinæ, acetiq; calidum
fomentum confert, ita vt vel aspergas, vel spongiam his im-
butam adhibeas. Deligare verò oportet lanis succidis, & pel-
libus

Pythoclis
medela.

De Morbis Popularibus.

351

A libus agnitis. Fullonibus inguina extuberabant dura, & sine dolore, & circa pubem, & in collo, similia erant tubercula magna, febris ante decimum diem. Tussi vexabantur à ruptionibus. Tertio mense autem quarto venter colliquiuit. Calores successerunt, lingua sicca, sitis, egestionis deorsum malignæ, mortui sunt. Qui lapide in caput percussus est à Macedone, & corruit. Tertia die voce destitutus erat, anxietas, febris tenuis, pulsus non valde in temporibus.

Fullo cur
moritur-

Caput la-
pide per-
cussus pe-
riit.

Nihil omnino audiebat, neque sapiebat, non quietus, sed quarta mouebatur, humiditas circa frontem, & sub nasum, & vsque ad mentum, & mortuus est. Eniates in Delo iaculo ictus retro in latus, in sinistra parte, vlcus quidem sine dolore habuit. Tertia verò ventris dolor vehemens, non egerebat. Infuso verò per clysterem immisso, stercus prodiit ad noctem, afflictio intermittebat. Sedes ad scrotum extabat. Quarta & ad puberem, & ventrem, dolor irruerat, quiescere non poterat, biliosa vomuit abundè colorata.

Eniates.

Oculi quales animi deliquium incidentium. Post quintum diem mortuus est. Calor quidam tenuis inerat. Et qui hepar percussus est iaculo, statim calor qualis est mortuorum per corpus diffusus est, oculi caui, anxietas, molestia. Mortuus est priusquam concio solueretur, quum sub diei exordium percussus fuisset. Polemarchi vxori hyeme anginosæ, tumor sub guttur, febris multa, vena secta est, cessauit suffocatio ex faucibus, febris comitabatur. Circa quintam genu dolor ac tumor sinistri, & circa cor videbatur ipsi aliquid colligi, & respirabat velut hi qui submersi fuerunt, respirant, & ex pectore substrepebat, velut qui concluso ore loquuntur, Engastrimythi quasi ex ventre loquentes Græcis appellati. Tale quiddam contingebat. Circa septimam aut nonam ad noctem aluus deorsum prorupit, & multa liquida quæ mala putantur egressit. Ipsa verò voce intercepta mortua est. Ventres subpurgare oportet in morbis, quum matura fuerint, infra quidem, vbi confidisse videris. Signum habes, si neque anxij, aut capite grauati fuerint: & quum calores mitissimi fuerint, aut quum post exacerbationes cessarint. Sursum verò, in exacerbationibus. Tunc enim etiam sua sponte eleuantur, quum anxij, & capite grauati fuerint, ac se iactarint. Ex casu vulnerato cubito

Quidā he-
par iaculo
percussus
statim mor-
ritur.
Polemar-
chus.

Cubiti la-
pio.

Y 3

bite

Hippocratis Liber V.

bito, ob corruptionem cubitus suppuratur. Quum autem D
 Cleogeni- iam maturus est, viscosa sanies exprimitur. Velut etiã Cleo-
 scus. genisco, & Demarcho Aglaorelis filio. Similiter autem
 Demar- & valde ex iisdem pus nullum. Velut Aeschylli filio conti-
 chus. git. Suppuratis autem plurimis horror & febris succede-
 Aglaotelis bat. Parmenisci filio surditas accidit. Contulit clyste-
 filius. rem auricularium non adhibere. Verum lana solum indi-
 Parmeni- ta perpurgare, & oleum infundere, aut netopum. Præci-
 scus. pere verò ut deambulet, mane surgeret, & vinum bibe-
 Aspasius. ret album. Aspasij uxori dolor dentis vehemens, & ma-
 xillæ in tumorem eleuatae sunt. Quum verò castorium &
 Callime- piper collueret, opem sentiebat. Callimedontis puero
 don. contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, & E
 magnum, & crudum ac dolorosum, sectio venæ brachij:
 & lini torrefacti cataplasma imponere subactum vino albo,
 & oleo imbutum, ita ut deligetur neque calidum, neque
 valde coctum. Aut cum aqua mulsa coquatur fœnigræci,
 Melissan- aut ordeï, aut tritici farina. Melissandro quum gingiua
 der. dolore corriperetur, & vehementer intumesceret, sectio ve-
 næ brachij, & alumen Aegyptium in principio sedabat.
 Hydropis Hydronicum laboribus fatigari oportet, sudare, panem
 Medela. edere calidum, in oleo bibere, non multum lauari, & ca-
 put tepidè. Vinum autem album & tenue, & somnus au-
 xiliatur. Bianti pugili quum natura vorax esset, contigit
 ut in affectiones cholericas, bilis sursum ac deorsum exeun- F
 Bias pugil. tis, delaberetur, ex carnis esu. Maximè verò ex porcinis
 carnibus crudioribus, & ex ebrietate vini odorati, & pla-
 centis ac dulciariis ex melle, & cucumere, pepone, & lacte,
 & polenta recenti. In æstate verò affectiones cholericæ,
 Timochia - & febres intermittentes. Timochari hyeme destillatio,
 res. maximè in nares, quum venere usus esset, resiccata sunt om-
 nia, lassitudo, calor successit, caput graue, sudor à capite mul-
 tus, defluebat autem & per totum corpus. Erat autem etiam
 Canis sy- sanus sudare aduetus. Tertia die euasit sanus. Post canem
 dus. febres fiebant sudorosa: & nō perfrigerabantur omnino post
 sudorē, sed rursus amplius incalescebant: & longa, & leniter
 sine iudicatione, & non valde siticulosa, paucis in septem &
 nouem diebus cessabant. Vndecima & decimaquarta, &
 Polycrates. decima septima, & vigesima iudicabantur. Polycratem fe-
 bris

Abris inuadebat, & sudor qualis præscriptus est. Purgatio à pharmaco deorsum facta est, & febris erat lenis. Rursus in temporibus sudores parui, & circa collum, ad vesperam. Deinde in totum. & rursus incaluit. Circa duodecimā & decimam quartam diem febris augescebat, & secessus pauci. post purgationem sorbitionibus vsus est. Circa decimam quintam ventris dolor circa splenem, & lateris mollitudinem sinistram. Calidorum adhibitiones minus profuerunt, quàm frigidorum. Quum autē leni ac molli per clysterem infuso vsus esset, dolor cessauit. Magnæ nauis gubernatori anchora digitum indicem, & infernum os dextræ manus confregit. inflammatio successit, & marcor, & febris, Subpurgatus est moderatè. Calores lenes, & dolores. de digito quid decidit. Post septimum diem, sanies exibat lenis. postea per linguam dixit se non omnia posse enunciare. Prædictum est opisthotonum aduentare. Ad hoc conferebant maxillæ consertæ, & ad collum rigidæ. Tertia verò die totus conuellebatur in posteriorem partem cum sudore. Sexta à prædictione mortuus est. Harpali filius ex libera Telephane, luxationem infra in pede magni digiti accepit. inflammatus est, & dolorosus erat. & vbi repositus est, & dolor remisit proficiscebatur ad agrum. rediens lumbos doluit, lauit, maxillæ ad noctem conferebantur, & opisthotonus aderat. Salua spumosa vix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus est. Thrinon Damonis filius, habebat circa tibiæ malleolum vlcus, iuxta neruum sanè iam purum. huic à pharmaco corroso contigit, vt opisthotono moreretur. Profectò in omnibus suppurationibus, & his quæ circa oculum sunt, dolores ad noctem. Tusses hyeme, maximè in austrinis, crassa & multa alba exscreantibus. & febres succedebant leniter, & quinta die cessabant, Tusses autem circa quadraginta, velut Hegesipoli. Euty- chydes ex cholericis affectionibus, in cruribus ad neruorum distentionem desinit, vnà cum secessu deorsum. Bilem multam abundè coloratam vomuit ad tres dies ac noctes, valdeque rubram. & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat, neque ex potibus, neque ex cibis. & vrinæ ac transitus deorsum supressio multa, per vomitum faex molis prodiit, & deorsum quoque erupit, Androphani

Harpali filius.

Thrinon.

Euty- chydes.

Androphani.

Y 4

votis

Hippocratis Liber V.

vocis interceptio. ignorantia, delirium. His solutis super-
 erat adhuc diu multis annis, & recidiuæ fiebāt. Lingua verò
 per totum tempus permanebat sicca. & si non collutione ute-
 retur, loqui non poterat, & plerunq; erat valde amara. Ali-
 quando etiam dolor ad cor, quem venæ sectio soluit. Huic
 aquæ potus, aut aqua mulsa contulit. Veratrum nigrum
 bibit. neque biliosum prodibat, sed modicum. Tandem
 hyeme decubuit, & mente motus est. & linguæ affectiones
 similes. calor tenuis sine dolore. lingua decolor. Vox peri-
 pneumonica. de pectore stragula reiiciebat, & se educi iu-
 bebat. Nihil autem poterat clarè loqui. Ad noctem mor-
 tuus est. **Nicanor.** Nicanoris affectio erat, quum ad conuiuium
 progredieretur timor tibicinæ: quum sub initium vocis ti-
 biæ, in conuiuium tibia canere audiuiſſet, præ timoribus
 turbationes. Vix se sufferre posse dixit, quum nox esset.
 Interdiu verò audiens, nihil commouebatur. Talia comi-
 tabantur ipsum multo tempore. **Damocles** qui cum illo
 erat, cæcutire, & corpore exoluto esse sibi videbatur: & non
 accessisset sanè ad præruptum locum, neque trans pontem,
 neque minimi scrobis altitudinem transgredi poterat, sed
 per ipsum scrobem. Hæc per tempus aliquod ipsi assuerunt.
Phœnis. Phœnicis affectio ex oculo dextro talis quadam erat, ple-
 runque velut fulgur elucere putabat. Quum autem non
 diu ipsum continuiſſet, dolor ad tempus dextrum instabat,
 & per totum caput ac collum. Caput intumescerebāt retro
 ad verticula. & distentio, & duricies circum tendines. & **F**
 vbi caput commouere, aut dentes diducere conabatur, non
 poterat, vt qui valde distendebatur. Vomitus vbi facti fuiſ-
 sent, prædictos dolores auertebant, & leniores faciebant.
 Sed & venæ sectio proderat, & veratri potio. eduxit autem
 varia & omnigena, maximè verò prasina. **Parmeni-**
scus. etiam prius incidebant tristitiæ, & decedendi è vita cupidi-
 tas. **Conon.** Quandoque verò rursus lætitiæ. Cononis serua ex
 capitis dolore incipiente, mente mota est. clamor. querelæ
 multæ. raro quies. Circa quadragesimum diem mortua est.
Adolescēs, Decem autem diebus ante mortem voce destituta, & con-
 uulsa fuit. Adolescens quidam multo meraco poto, supi-
 nus in habitaculo quodam dormiebat. Huic serpens Arges
 appellatus in os ingressus est. & sanè quum sensisset, & loqui
 non

- A** non posset, dentibus stridit, & serpentem deuorauit. & dolore magno tenebatur. & manus prætensas adhibebat, velut qui strangularetur. & iactabat seipsum. & conuulsus mortuus est. Timocharis seruus, ex atrabiliariis esse putatus, à talibus ac tot viris, similiter mortuus est circa easdem dies. Nicolai filius circa solstitium hybernum ex potationibus horruit. ad noctem febres. postridie vomitus biliosus, merus, modicus. Tertia die quum concio fori adhuc plena esset, sudor totius corporis cessauit. Diopithis forori in semitertiana, circa accessionem etiam cor grauitè dolens, & concomitabatur etiam is dolor tota die. & huiusmodi cordis dolor etià aliis similiter aderat. Verumtamen sub pleiadis occasum, viris talia rariora fiebant. Epicharmi uxori antequam pareret, dysenteria erat. dolor vehemens. secessus recrementa, subcruenta, mucosa. Vbi peperisset, statim sanata est. Polemarchi uxori in morbo articulari, coxæ dolor quidam vehemens. causa erat quòd menses non prodierunt. Vox interceptabatur, per totam noctem vsque ad meridiem. Audiebat autem & sapiebat, & per manum significabat, quòd circa coxam esset dolor. Epicharmo circa pleiadum occasum, dolor humeri, & grauitas in brachium. anxietas. vomitus multi. aquæ potus. Euphranoris filio pustulæ velut culicum morsus, verum modico tempore. postridie febricitauit. Siccitates multæ post Fauonium factæ sunt, vsque ad æquinoctium autumnale. Sub canem æstus magni. calidi venti. Febres sudorificæ. Tubercula iuxta aurem multis oborta sunt. Tychon in obsidione circa Datum, à catapulta percussus in pectus. & paulo post risus erat circa ipsum tumultuosus. Videbatur autem mihi medicus eximens lignum, reliquissè aliquid de spiculo in septo transuerso. Et quum ipsi videretur, ad vesperam infusum per clysterem adhibuit, & pharmacum deorsum purgans dedit. Noctem primam transegit molestè. Statim verò vbi dies illuxisset, & medico, & aliis, melius haberi videbatur. Erat enim quietus. prædictio facta est, quòd vbi conuulsio fieret, breui esset moriturus. Sequenti itaque nocte molestè habens, in somnis, plerunque in ventrem decumbens, tertia exoriente die cõuellebatur, & tunc mortuus est. Billo percusso in deorsum, spiritus multus per vulnus

Timocha-
ris seruus.
Nicolaus.

Diopithes.

Epichar-
mus.

Polemar-
chus.

Euphra-
nor.

Tychon.

Billus.

Y 5

cum

Hippocratis Liber VI.

Phile.
Phanias.
Euergetes.

Aristippus

Neapolis.

Metrodo-
rus.

Carcino-
ma pecto-
ris cur hæc
necauit.

Anginosa
cur mori-
tur.

cum strepitu processit sanguis erumpebat. Vbi vero medi-
camentum cruentis vulneribus destinatum adhibitum ac
deligatum esset, sanatus est. Contigit & infelicissimo Phi-
les filio, denudatione in fronte facta. nona die febris. deinde
os liuefactum est. mortuus est. Et Phanias & Euergetes fi-
lio, liuefactis ossibus, & febricitantibus, cutis ab osse disces-
sit, & pus non comparuit. Aristippus in supernum ventrem
violenter ac grauiter sagittæ ictu petitus est. ventris dolor
vehemens, & breui ardebat. deorsum verò non egerebat.
anxius erat. biliosa abundè colorata quum vomuisset, me-
lius habere videbatur. paulò post rursus dolores vehemen-
tes, & venter velut in voluulis. calores. sitis. & in septem die-
bus mortuus est. Neapolis similiter percussus, eadem pas-
sus est: acri infuso per clysterem immisso, aluus deorsum
erupit. color per corpus diffusus est, tenuis, pallidus. niger.
oculi sicci, stupore rigidi, intus conuersi, intuentes in corde.
Metrodori filio ex dentis dolore, maxillæ marcor, & gin-
giuarum carnis superexcrecentia. Moderatè suppuratus
est. exciderunt dentes molares, & ipsa maxilla. Mulieri in
Abderis, carcinoma obortum est circa pectus. & per mam-
mam fluebat sanies subcruenta. obturata verò fluxione, mor-
tua est. Plerique ex destillatione secundum dimidiam ca-
pitis partem dolebant. & humore secundum nares proce-
dente febricitabant leniter. & in quinque diebus perfrige-
rabantur. Et quæ in partu concussa fuit, dolor circa pectus
& latus factus est. excreationes purulentæ. Tabes constitit. F
febres per sex dies. Rursus alui profluuium. quies. febris.
aluus adstricta est: & circa septimam diem mortua est.
Anginosa quædam dextram manum & crus doluit. febris
tenebat debilis. strangulatio tertia die remisit. quarta con-
uulsa, voce destituta, stertor, dentium contritio, maxillarum
rubor. Mortua est quinta aut sexta die. Signum circa ma-
num subliuidum. Alia quoque in palato stertorosa. lingua
sicca, peripneumonica. non desipiens. mortua est. Et in
Olyntho hydropicus, derepente voce destitutus, desipiens
per noctem ac diem, mortuus est.

HIPPO

AHIPPOCRATIS

COI DE MORBIS PO-
PVLARIBVS LIBER SEX-
TVS, IANO CORNA-
RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-
PRETE.



Quibusque ex abortu circa uterum, & tu-
moribus, ad capitis grauitatem cōuertitur
& iuxta sinciput maximè dolores, & qui-
cunque alijs ab utero: his in octo aut decem
mensibus ad coxā morbus desinit. Acu-
tum habentes caput, qui quidem validam
habent ceruicem, robusti sunt tum alijs, tum ossibus. Qui
verò caput dolent, & aures fluentes habent: his palatum ca-
num est, & dentes inter se non è directo respondentes. Qui-
buscunque os de palato discessit, his medius confidet nasus.
Quibus verò inde vnde dentes prodeunt, his summus nasus
simus fit. Puerorum elucescentiæ simul cum pubertate, in
quibusdam mutationes habent etiam alias. In rhenum do-
lor grauis, quum implentur cibo, vomunt pituitam. Quum
verò redundarint dolores, æruginosa, & melius quidem ha-
bent. Soluuntur autem, quum cibus euacuati fuerint, arenu-
læque fuluæ subsident, & cruentum mingunt, torpor femo-
ris è directo, quiescere non conducit. Sed exercitia, nō imple-
ri, iuuenes verò purgare, poplitem secare, vrinam cienti-
bus purgare, attenuare, & mollire. Menses aquosis diu per-
manent. Quum verò non breui prodierint, intumescunt.
In Cranone antiqui dolores frigidi, recentes autem ca-
lidi, ex sanguine verò plurimi, & quæ ex coxa, frigida sunt.
Quæ ad rigores fortes progressa sunt, non valde miti-
gantur, nisi prope vigorem. Ante rigorem vrinarum
suppressiones, si ex bonis fuerint, & aluus egerat, & somni
ad sint, fortassis autem & febris modus, fortassis etiam quæ
ex lassitudinibus Abscessus non valde, quibus rigores.

Cranon

Plinius hinc
plurima
sumpsit.

Menses, scē
minarum.
Cranon.

Lotium cū
retinetur.

Hippocratis Liber V I.

Crurum effœminationes, veluti si aut ante morbū iter fe- **D**
 cisset, aut statim ex morbo: eo quòd fortassis ex lassitudinib.
 in articulos abscessit ex quo crurum effœminationes. Tu-
Tubercu-bercula extra extuberantia, & acuta, & fastigiata, & æquali-
la quæ bo-ter maturefcentia, & non obdura, & deorsum vergentia, &
na, quæ nō non bifida, meliora: contraria verò, mala: & quanto plus con-
 traria, pessima. Perinum autumno, & oris ventriculi dolo-
 res, & horrores, & atra bilis. Circa initia exacerbationes
 considera, & in omni morbo, quale est ad vesperam exacer-
 bari, & annus ad vesperam, & ascarides. Infantibus tussicu-
 la cum ventris turbatione, ac febre continua, significat post
 iudicationem bimestri, in totum vigesima die, etiam tumo-
Tumor ar-res ad articulos. Si quidem infrà vmbilicum constiterint, **E**
ticulorum. in infernis articulis superna, bonum: si verò suprà, non simi-
 liter morbum solvunt, nisi suppurata fuerint. Quæ verò in
 humeris suppuratur tantillis, mustellæ cubito præditos, par-
 uūmque ac macilentum brachium habentes faciunt. Sol-
 uerit autem & vlcusculorum infernè eruptio, si non rotunda
 & profunda fuerint. Talia enim perniciofa etiam aliàs sunt
 pueris. Soluerit itidem sanguis fluens. Magis autē in perfe-
 ctioribus is apparet. Lachrymę in acutis male habentibus,
Lachryma vltronæ quidem bonæ. Inuoluntariæ verò defluentes, ma-
sponte ma-læ. Quibus circumtenditur palpebra malum. Malus est
nans vel cō-etiam oculus inarescens, velut spuma, & obscuratio oculorū
tra. mala est. Et squalliditas mala, & qui intrinsecus corrigatur,
Oculorum & rigentes, & qui vix couertuntur, & qui intus conuersi sunt, **F**
signa. & quæcunque alia omittuntur. Febres aliæ quidem mor-
Febriū dif-daces sunt manui, aliæ lenes. Aliæ verò non quidem morda-
ferentia. ces, verūm augescentes. Aliæ autem acutę quidem, sed quæ à
 manu vincantur. Aliæ statim adurentes, aliæ semper debiles,
 siccæ. Aliæ falsuginosæ. Aliæ inflatæ horrendi aspectus. Aliæ
 ad manū humectæ. Aliæ rubicundæ valde. Aliæ valde pal-
 lidæ. Aliæ liuidæ, & alia id genus. Distentiones corporis,
 & articulorum duriciæ, malum, & ipse dissolutus, & confra-
 ctiones articulorum, malum. Oculi audacia delirij signū
 est, & oculorum deiectiones ac peruersiones malum.

S E C T I O S E C V N D A.

Dilatare, constringere, alia quidem, alia verò non. Hu-
 mores alios quidem expellere, alios verò siccare, alios
 autem

- A** autem indere, & alia quidem parte, alia verò non. Attenuare, crassificare, corpus, cutē carnes, & alia, & aliqua quidem, aliqua verò non. Leuigare, exasperare, indurare, mollire, alia quidem, alia non. Excitare, torpescere, & quęcunque alia huiusmodi. Deriuare, subcedentia statim reuellere, renitentibus concedere. Alium humorem nō prodeuntem ducere, prodeuntem verò simul effundere, operari simile, velut dolor dolorem sedat. Dissimilia, si vergant sursum eleuata, infernē soluere, & contraria per eadem: velut est capitis purgatio, venę sectio, quando non temerē detrahitur. Abscessus velut glandularum tumores, signum quidem sunt eorum partium quę germina habent, sed & aliarum. Maximē
- B** verò circa viscera. Maligni autem hi sunt. Spiritus parui densi, magni rari, parui rari, magni densi: extra magni, intus parui: intus magni, extra parui: alius extendēs, alius vrgens: dupla intro reuocatio, velut superinspirationibus, calidus, frigidus. Medela assiduarum oscitationum, spiratio longa. In non potantibus, & vix, spiratio brevis. E directo & laterum & pręcordiorū intentiones, & splenis eleuationes, & ē naribus eruptiones, & aures ē directo. Horum plurima etiam ad oculos. Vtrum igitur omnia? aut quę quidem ex infernis sursum, ē directo: qualia sunt quę iuxta maxillas, aut circa oculū aut aurē? quę verò ex supernis deorsum, non ē directo? Atqui & anginosi rubores, & laterū dolores ē directo. Aut etiā quę infra hepar sunt ex supernis distributa, velut in testes ac
- C** varices? Considerada sunt hæc quò, & vnde, & propter quid. Venę temporum non confidentes, neq; viriditas splendenda, si spiritus intus relinquatur, aut tussis sicca, non ferina: vt in articulos decumbat expectare oportet, ē directo distentionum secundum ventrem vt plurimum. Habent autem horū plurimi, & facies rubicūdas, & ex natura sunt modi albidioris & de naribus sanguis non erumpit, aut parum erumpit. & si quidē ex affusis intus relinquatur, paratus est abscessus. Sitis intus relicta, & oris resiccatio, & iniucunditas, & cibi fastidium, eodem modo. Febrēs autem non acutę, eiusmodi sunt, verū reuertentes. Quę relinquuntur post iudicationem, recidiuas facere solent. Primum itaque splenis eleuationes, si non ad articulos finierint, aut sanguinis ē naribus eruptio fit, aut dextra pręcordij intensio: si non penetrauerint

Tumores
quid por-
tendant.
Spiritus va-
rietatis.

Hippocratis Liber VI.

rint vrinx. Hæc enim est interceptio vtrorunq; , & recidiuæ D
 horum merito fiunt. Abscessus igitur horum facere oportet, si non fiant, Eos verò qui iam fiunt declinare. Eos autem excipere, si prodierint iam, & qualia oportet, & qua parte oportet. Qui verò non valde eos coadiuuare. Eos vero auertere, si omnino incòmodi fuerint, maximè si hi affuturi sunt: Quartanae sin minus, si iam incipiunt. Quartana sanguinis è naribus diurnæ. eruptiones agrè iudicant. Febres quæ vna die intermittentes, altera superrigēt vnā cum iudicatione, ex quinque ad septem circuitus durant. Quæcunque tertianæ naturam habent, his nox molesta ante exacerbationem: Quæ verò sequitur: tolerabilior plerunque est. Tussis sicca parum irritantes à febre adurente, non pro ratione siticulosa, neque linguæ E
 ca. torrefactæ, non feritate, sed spiritu. Constat id inde. Quum enim loquuntur, aut hiant, tunc tussiunt: quum verò nō, minimè. Hoc autem in febribus ex lassitudinibus obortis maximè contingit. Nihil temere affirmandum, nihil contemnendum. Contraria paulatim facta accessione adhibenda sunt, & interquiescendum. Dolenti capitis partem posteriorem, recta vena in fronte secta profuit. Successione præcordiorum ex qualibus qualia alterant, & viscerum inflammationū qualia possunt, siue ex hepate spleni, & vice versa: & quæcunque huiusmodi. Reuellere oportet, si non qua oportet repunt. Si verò qua oportet, his oscula aperire oportet, qualiter singula repunt. Latæ pustulæ non valde pruriginosæ sunt: Quale Simon habebat hyemè, qui vbi ad ignē F
 Simon. mingeretur, aut calida lauaretur, opem sentiebat. Vomitus non proderant. Arbitror si quis calida fomenta adhibuisset, openi ferre potuisse. Quæcunque concoqui oportet, conclusa esse conuenit. Contraria verò siccare, & aperta esse. Oculorum fluxiones. Oculorum fluxiones, si aliàs conducere videtur, reuellere ad fauces conuenit. Et vbi eructatio conducit, & quæcunque alia huiusmodi. Transitus apertos esse oportet, veluti nares, & alia quibus opus est, & velut opus est, & qualia, & qua parte, & quando, & quantum opus est, velut sudores, & alia sanè omnia. In magnis malis facies si fuerit bona, bonum signum est. In paruis autem, contraria significans bonæ significationi, malum. Apud magnum Theatrum vbi mulier retrò heroum, morbo regio superueniente permāsit ipsi. Apud

A Apud Temenæ neptim ille nigricantis erat coloris. In **Temenes.**
 Perintho genituræ similis vrina talis, quæ esset iudicatoria, **Lorum ge-**
 etiam peccinis affectionum. Nam huiusmodi vrinæ talia sa- **nitali tenui**
 nant: quoniam neq; flatu multo, neq; stercore multo egresso **ni tale.**
 euacuabantur. Non enim profectò magnum erat præcor-
 dium. Brasicam septima die quis comedit, quum adhuc dif-
 ficulter spiraret, postquam pectus emollitus est, rectè spirans
 factus est: alius ipsi expulit. De sanguine seroso, quoniam **Sanguis se-**
 in pavidis talis, aut in his qui vigilarunt: & siue malus, siue bo- **rosus in q-**
 nus. Quibus splen deorsum vergit, pedes & manus, & ge- **bus sit.**
 nua calida sunt: nasus & aures semper frigida. Num propter **Lienosora**
 hoc quòd tenuis sanguis? Num & natura talem hi habent? **signa.**

B Suppurationibus vmbilicus terminus, quibus suppuratu-
 ris ventres turbantur. Splen durus non supernè, infernè,
 rotundus, latus, crassus longus, tenuis longus. Minus capitis
 grauedine laborantibus. Circa ægotantem administra- **Quid me-**
 tio, & de morbo interrogatio: quæ narrat qualia, quomodo **dico agen-**
 accipiendi sermones: quæ ad ægotantem, quæ ad præsentem, **dum eiga**
 quæ ad externos. Quod in calidiore, solidiore, in dextris: **languetis.**
 & nigri propterea, & venæ extrinsecus, & multò biliosiores.
 Concretum est, compactum est citius: vbi motum est, desi-
 nit, & tardius augetur, & ad amplius tempus. Quòd soli-
 dum factum est, & biliosius, & sanguinolentius est: Hic cali-
 dior est locus animali.

S E C T I O T E R T I A.

C Utis raritas; ventris densitas: cutis constrictio, carnum **Caluities**
 incrementum: ventris torpor, vniuersorum confusio: va **caussa.**
 forum immundicia, cerebri consumptio. Quapropter & cal-
 uities, instrumentorum attritio. Detractio cursibus, luctis,
 quiete, multis celeribus deambulationibus, carne ouilla, ma-
 za cocta plerunque, panis modicus. Detractionis signum,
 eandem horam diei seruire, de repente enim trahitur. Re-
 mittito labores, aut desuet. Similiter enim totum concidit.
 Quum verò iam cōciderint carnes suillas allatas exhibe-
 ro. Quum autem implentur, signum est, quòd corpus rursus
 floridum sit. In exercitationibus signum, sudor fluens gut-
 tatim, qui exit velut ex canalibus: aut collapsio ex eleuatio-
 ne. Mulier quam primùm curavi in Cranone, splen ipsi ma- **Mulier lie-**
 gnus natura, febris ardens, rubicunda, spiritus, decima sudor **nosa.**
 pler

Hippocratis Liber VI.

**Damago-
ra & Arce-
silao quid
in Venere
passi sunt.
Frigus ve-
hemens
quid fa-
ciat.**

**Rigores
unde inci-
pant.**

**Sanguis de
narib⁹ qui
bus manet,
& pueris
quando in-
cipit.**

plerunq; supernè. Sed & infernè, decimaquarta. Minus his **D**
qui ex capite grauedine ac rauedine laborāt, vbi febre cor-
repti fuerint, recidiuæ velut puto fiunt. Quicquid suppura-
tur, non reuertitur. Ipsa enim maturatio, & iudicatio simul,
& abscessus. Quibusdam vbi venere vtuntur, venter infla-
tur, velut Damagoræ. Quibusdam verò in hoc strepitus, Ar-
cesilao verò etiam intumescebat. Flatuositas simul caussa
est in his qui scapulas alarum modo eminentes habent. Sunt
enim flatuosi. Frigidum valde, venas rumpit, & tussim mo-
uet, velut nix, glacies & constringit, velut sunt eminentiæ
oblongæ & rotundæ, Pherea & Gongronæ, à satyrorum cir-
ca aures eminentiis, & arborum quarundam tuberculis ap-
pellatæ. Simul caussa sunt etiam durities. Post mictionē con- **E**
cretio, pueris magis, num quòd calidiores? Figuræ magis
alleuantes, velut qui sarmenta manu necabat & obtorque-
bat, præ doloribus decubens, arrepta paxilli summa parte su-
pra seipsum infixæ, inharebat, & melius habuit. Quæ ex mō-
tano labore circa pontem ego vidi crura iactantem, altera ti-
bia minimè extenuabatur, femoribus autem valde. Vrinæ &
genitura non supprimebantur. Quæcunq; laterum natu-
ræ scapulas alarum modo eminentes habent, propter causæ
debilitatem in destillationibus malignis, siue excretio fiat,
siue non fiat, malum. Rigores incipiunt mulieribus quidē
magis à lumbis, & per dorsum, & tunc ad caput. Sed & viris
posteriore corporis parte magis quàm anteriore. Horremus
enim magis exterioribus quàm interioribus corporis parti- **F**
bus, velut cubitis, femoribus. Sed & cutis rarior: Indicat autē
pilus. A quibus autem aliis rigent, fortassis vlceribus, inci-
piunt à vasis. Summa, ex natiuitate, & caussa, & plurimis
rationibus, & paulatim in cognitionem veniētib⁹ colligen-
tem & addiscentem, an similia sint inter se, & an non similia
sint inter se: quo ex dissimilitudinibus similitudo fiat vna.
Sic sanè fuerit via. Sic etiam eorum quæ rectè se habent pro-
batio, & non rectè se habentiū redargutio. Sanguinis ex na-
rib⁹ eruptio, aut subpallidè nigricatibus, aut rubicundè pal-
lentibus, aut subpallidis. Parum demittentem crassescere
oportet sicco. Aliis verò minus crassificatione opus est. Sic-
co autem opus est albo, velut galla, alumen. Postquam ve-
nere vti inciperint, aut hircire, sanguis ipsi⁹ è naribus erum-
pit.

A pit. In accessibus alij quidem strepitum edunt: velut Arce Arcefilaus.
 tilaus. Alij verò accessuri, horridi fiunt ac rugosi. Alij post-
 quam accesserint, ventre inflantur, velut Damnagoras. Mu- **Damnago**
 tationes cauendæ. Cibus modicus, non delassari, non sitire. **ras.**
 Omnis attenuatio laxat cutem, deinde circumtenditur. Re-
 nutritio vice versa. Cutis confidentis corrugatio, renutritæ
 extensio. Rugosum, leue, vtriusq; signum: itémq; subbiliosum
 & subrubrum: Sic etiam detractas esse mammas, graciles au-
 tem sursum tractas esse & circumtensas, etiam si quis non
 propterea putauerit id fieri, sed in carnosiss. Clauiculæ con-
 spiciæ, venæ pellucidæ. Herodicus febricitantes interficie- **Herodicus.**
 bat circuitibus, luctis, multis fomentis, mala est febriculosi-
 tas, inimica fami, luctis, circuitibus, cursibus, frictioni: labo-
B rem labore. Iplis venarum rubor, liuor, pallor, laterum do-
 lores molles. Non sitire faciunt, continere os, tacere, ven-
 rum cum potu frigidum inducere. Occasiones vnde agrotat-
 re cœperint, considerare oportet, siue capitis fuerit dolor, si-
 ue auris, siue lateris. Signum sunt dētes, & in quibusdam in-
 guinum tumores, Vlcera fientia ac tubercula iudicantia fe-
 bres. Quibus hæc non fiunt, iudicatio sublata est: Quibus in-
 tus relinquuntur, certissima, recidiua, ac celerrima. Sputa **Hæmor-**
 rotunda delirium significant, velut in Pleno. Qui Hæmor- **rhoidas pa-**
 rhoidas habent, neque pleuritide, neque peripneumonia, ne- **tiētes à qui-**
 que phagædena, neque furunculis, neque tuberculis terebin **bus tuti.**
C thi figuram habentibus corripiuntur, fortassis autem ne-
 que lepris, fortassis neque vitiliginibus. Multi tamen intem-
 pestiue curati, talibus non tardè correpti sunt, & sic pernicio-
 se fuerunt: & quicunq; alij abscessus, velut fistulæ, aliorum
 medela sunt. Decubitus humorum ad aliquem locum, in
 quibus factos affectus liberat, in his prius ipse factus, illos
 impedit. Alterius loci morbos loca excipientia, aut ob do-
 lorem, aut ob grauitatem, aut propter aliud quiddam libe-
 rant, aut quòd aliis sunt communicationes. Propter incli-
 nationem non amplius sanguis prodit, sed iuxta humoris co-
 gnationem talia spuent. Conuenit quibusdam sanguinem
 detrudere, tempestiue in talibus. In aliis autem velut in his,
 non conuenit. Impedimentum in spuentibus cruenta, tem-
pus anni, pleuritis, bilis.

Archige-
nes.

Agas.

Capitis tu-
mor.Quæ medi-
cus erga læ-
guentes a-
gat.Legumina
in Aeno.

Tubercula circa aurem quibus circa iudicationem ex-
orta non suppurata fuerint, his disparentibus recidiua
fit, pro ratione recidiuarum. Recidiua verò fiente, rursus in-
tumescent, & permanent, velut febrium recidiua in simili
circuitu: his spes est ad articulos abscedere. Vrina crassa, al-
ba, qualis Archigenis familia erat, in lassitudinis febribus
quarta die aliquando prodit, & liberat ab abscessu. Si verò
vltia hoc, etiam sanguis è naribus largè eruperit, etià valde.
Cui intestinum in dextra parte dolebat, & articulari morbo
correptus est: erat quietior. Postquam autē hic curatus fuit,
magis dolebat. Agas filia quum esset puella, densum spiri-
tum habebat. Mulier autem facta, à partu nō diu dolore cor-
repta leuiter, magnum onus sustulit, & statim quidem in pe-
ctore aliquid crepuisse visum fuit. Postera die & anhelatio-
nem habebat, & coxam dexteram dolebat: & cum hac dole-
ret, tunc etiam anhelatio habebat: coxæ verò dolore cessan-
te, etiam anhelatio cessabat. Spuebat spumosa, ab initio verò
florida: Vbi verò confidisset sputum, vomitu bilioso tenui si-
mile erat. Dolores maximè erant quum manu laboraret.
Hanc ab alio arcere visum fuit, porroque ac ouicula, & bo-
ue. In rebus autem agendis à clamore, & excādescencia. Cui
in capite tumor depascendo proserpebat, ei primū alu-
men vsum profuit. Habuit alium abscessum, fortè quod os
abscessurum esset, Abscessit sexagesima die supra aurem, sur-
sum ad verticem vulnus erat. Intestina crassa habet, qualia
sunt canis, verū maiora. Dependunt autem ex medianis
membranis, Mesocolis hac parte appellatis. Hæ verò ex ner-
uis, de spina sub ventrem. Aegrotantibus gratificationes, ve-
lut est purè præparare potus ac cibos, & ea quæ videt: molli-
ter ea quæ contingit. Aliæ gratificationes, quæ non magno-
pere ledunt, aut facillè reparari possunt, velut frigida, vbi hac
opus est. Aliæ gratificationes sunt, introitus, sermones, ha-
bitus, vestitus aegrotanti, tonsura, vngues, odores. Aqua de-
cocta partim vt aërem admittat, partim vt vas non plenum
sit, & operculum habeat. Quod ex sanguinis eruptioni-
bus, aqua inter cutem corripuntur. Si qualia oportet pur-
gari, purgentur, facillè ferunt. In Aeno legumina comeden-
tes assidua, fœminæ, mares crurum impotentes facti sunt, &
perman-

A permanferunt. Sed & eruum comedentes, genuum dolores habebant. Palam vigilans calidior, externis partibus, frigidior autem internis. Dormiens vice versa. Calidæ naturæ frigiditas, potus, aqua, quiescere, somnus in frigore, cōteſto. somnus ſedentium, erectorum niſtatio. Debiles victus, frigidi: robusti verò calidi. Aquarum arte nō præparatarum, quæ quidem ab æthere excreta eſt, aut cum tonitruo, æſtiua: procelloſa verò mala. Aqua vorax, vigilia vorax. Per calidam naturam calido tēpore, in frigore cubile craſſefacit: in calido attenuat. Exercitatio ſanitatis eſt veſci citra ſaturitatem, non refugere laborem. Inter vigilandum ſiti
B leui ſomnus medela eſt. Siti verò ex ſomno, vigilia in quibusdam. Quibus plurimus calor eſt, maxima voce præditi ſunt. Nam & plurimus eſt frigidus aer. Ex duobus autē magnis magna etiam quæ generantur exiſtunt. Ventriculo calidi, carne frigidi & tenues, hi eminentes venas habent, & iracundiores ſunt. Terra ſiccitatibus ſquallida, volucrum genus abundat. Hircire incipiens, vter teſtis extra appa-
C ruerit, ſiquidem dexter, maſculū: ſi verò ſiniſter, fœmellam protendit. Oculi prout validi fuerint, ita etiam corpus: Sed & color in peius aut melius vergit. Luſtum eſt autem, prout ſe habuerit alimentum, ita & quod forinſecus eſt ſequi. Si
 gna lethalia, per cutem, nares, calidus vapor: vbi prius nares frigidum ſpiritum emiſerunt. Signa verò vitalia, contraria ſunt. Labores cibos præcedant.

S E C T I O Q V I N T A.

Morborum naturæ medici. Inuenit natura ipſa ſibi ipſi aggreſſiones, non ex præmeditato, partim velut & niſtare, partim verò & ea quæ lingua ſubminiſtrat, & quæcunque alia huiuscemodi, non edocta natura, & nullo magiſtro uſa, ea quibus opus eſt facit. Lachrymæ, narium humiditas, ſternutationes, auris ſordes, oris ſaliuæ eductio, ſpiritus introitus, exitus, oſcitatio, tuſſis, ſingultus, non eiſdem omnino modi. Vrinæ ſeceſſus, & flatus, & huius alterius, alimenti, & tranſpirationis, & ea quæ fœminis ſolis adſunt, & in reliquo corpore ſudores pruritus, corporis diſtentiones cum oſcitate, & quæcunque huiuscemodi. Hominis anima ſemper producitur uſque ad mortem. Si verò efferbuerit, vnâ cum morbo etiam ani-

Z 2 ma

Qualitas
borum &
aquarum.Sanitas.
Somnus.Volucrum
abundantia

Oculi.

Mortis &
vitæ ſigna.Maſculi
fœminæ
ſeu Arteriae

Mortis

Hippocratis Liber V I.

ma corpus depascitur. Morbi connutriti, in senecta, & D per concoctionem, & per solutionem, & per rarefactionem desinunt. Sanatio, contra sententiam non consentire affectioni. Frigidum & auxiliatur, & occidit, quæcunque ex calido sunt. Excandescencia retrahit cor & pulmonem in seipsa: & ad caput calida ac humidum. Letitia vero relaxat cor. Labor articulis & carnibus: cibus, somnus, visceribus. Animæ deambulatio est cura hominibus. In vulneribus sanguis concurrit, opitulandum igitur ut vacuum

Dolor auris qui leue
tur.

Lingua no
ta varia.

expleatur. Si auris doleat, lana digito obuoluta oleum ca-
lidum instillato. Deinde lanam intus in volam manus po-
sitam, sub aurem subdito, ut aliquid ipsi exiisse videatur.
postea in ignem immittito, Dolus. Lingua urinam signi- E
ficat. Lingua virides cum palore biliosa. Biliosum autem à
pingui; Rubicundæ verò à sanguine. Nigræ ab atra bi-
le. Sicca à fuliginoso ardore, & vterina parte. Albæ ve-
rò à pituita. Urina concolor cibo, & potui, & qualis in-
tus est humidi colliquatio. Lingua concolor attingenti-
bus ipsam humoribus; quapropter per hanc humores co-
gnoscamus. Si salsæ carnes gustanti, redundantia signum.

Sordes au-
ris quid
portendat.

Cibaria
qualia.

Defectio
nis reme-
dium.

Coitus qui
bus pro-
fertur pur-
gatio.

Sanguis
per somnū
intro fugit.
Cibi frigi-
dissimi.

Cucumis
genuis.

Si mammarum papillæ, & rubor pallidus fuerit, mor-
bosum vteri vas est. Hominibus sordes in auribus, dul-
cis quidem lethalis, amara verò non. Terram mutare
commodum est in longis morbis. Debiliores cibi breuem
vitam habent. In fluxionibus ad coxam, venas retro au-
res secato. Coitus morbis ex pituita commodus. Calido F
ventriculo præditos, fortes potus ac cibi perturbant. Atra
bilis velut similis est hæmorrhoids. Augescentes morbos
coitus. Frigiditas ea quæ in ventre sunt indurat. Coi-
tus ea quæ in ventre sunt indurat. Eum qui veratrum bi-
bit, si citius purgare volueris, lauare oportet aut comedere.
Sanguis in somno intro magis fugit. Rigor à supe-
riore ventre, febris ab inferiore magis. Attractio, pul-
mo, siccus ardor; Supervacuatum siccatur & somnus multus.
Frigidissimus cibus, lentes, milium, cucurbitæ. Ulcera ex-
oriuntur si quis dum impurgatus est laborauerit. Mulier,
capra, elaterium aut cucumerem sylvestrem comedentes,
pueris purgatio. Calido corpori, id quod comedit, intrinse-
cus frigiditas est, forinsecus autem dolor à sole, igne, vestitu, in
tempo

A tempore æstiuo. Contrario verò contrario modo. Cibi partim celeriter superantur, partim tardè.

Ciborum
varietas.

S E C T I O S E X T A.

CArnes attractices, & ex ventre, & extrinsecus. Indicium est sensus ipse, quòd expirabile ac inspirabile est totum corpus. Calidissima venula sanguinis multitudine, id quod fuliginosum est, exerit, & statim secernit. Et quibus quidem pingue, bilis flaua: quibus autem sanguis, atra.

Mentis, memoriæ, olfactus, aliorum etiam famis instrumentorum exercitatio. Labores, cibi, potus, somnus, res venereæ, omnia mediocria. Frigidior in frigido tempore ac regione calidior erit. In doloribus proximum ventrem purgato, sanguinis autem ventrem secato. Vitiatio, sectio, calefactio, perfrigeratio, sternutationes, plantarum succi, in quibus vim habent, & cyceonis mixtura. Maleficorum autem lac, allium, vinum feruefactum, acetum, sal. Homo ex lassitudinibus ex itinere, imbecillus, grauatus, expuit. Tussit enim ex vertice. febris acuta, ad manum submordēs. Secunda die capitis grauitas, lingua combusta fuit, naris vnguibuscalscalpta sanguinem non effudit. Sinister splen magnus & durus dolebat. A quartana correpti, à magno morbo non corripuntur. Si verò corripiantur prius, & succedat quartana, liberantur. Pro qualibus qui morbi. Bilis fit, quibus im-
velut de vulneribus dixi, quòd sint biliosæ. Caliditas acrimones præ-
monia signum est. Turbationes, transitus. Nā mente motis dolores laterum desinunt: quibusdā febres, quibusdā non. Deliratio
Sed cum sudoribus. quibusdā autem cum turbatione, quibus pro-
busdam verò cutis arida & circumtensa ac salsuginosa. fit.

Torpefactiones quales ex qualibus, & quales illi cui coxa.

Per aures, ex auribus, plerunque tertio die moriuntur. Dolor an-

Quibus cutes circumtēduntur aridæ ac duræ, sine sudore: rium ma-
quibus laxæ sunt ac raræ, cum sudore moriuntur. In recidi- gnus tertio
uis mutationes profunt. His transmutare oportet ad ea quæ die plerun-
conueniunt, antea quàm male afficiantur, velut Cherioni. que tollit.
Locorū mu-

Quæ irritantur ex qualibus, stridulæ faciūt asperitates tertatio quos
minum præscribunt. Quibus quidē id quod sanum est, re- iuuet.
linquitur, causa deorsum submissa, eos aut purgato, aut deli-
gato, aut eiicito, aut rescato, aut exurito. Quibus verò nō,

Hippocratis Liber V I.

non. Quibus sanguis multus fluit ex naribus, qui quidem **D**
 Sanguis de decolores mero modo sunt, his parum prodest. Quibus ve
 naribus flu rò colores rubicundi, nō similiter. Et quibus capita sunt quæ
 ens quibus facile tolerant, prodest. Quibus secus, non. Quibus nares na
 profit. tura humidiores, & genitura humidior ac copiosior, hi mor
 Quales sint tura humidiores, & genitura humidior ac copiosior, hi mor
 qui nares bolus sani sunt. Plurimis autem quibus ex morbo, vice
 humidasha versa. Sputa rotunda, mentem emouent, veluti illi in Plin
 bent. thio. Huic sanguis ex sinistra nare erupit, & solutus est
 Rotunda quinto die. Vrina multam subsidentiam habens, à men
 sputa. tis emotione liberat, qualis erat Dexippi. Post pilorum
 Dexippus. defluuium, quartana febris non ultra annum. Aurium eru
 ptiones æstate quinta die fiunt. Quandoque verò etiam
 diutius durant. Ita & circa ginginas, & circa nares suppura- **E**
 Piper den- tiones. Quibus in dentium dolore, de supercilio tenuia
 tes iuuat. descendunt, his à pipere probe affricto post die crassiora
 descendunt, si etiam alia non obtinuerint. Nam Hegeſi
 po soporiferum inditum non obtinuit, sed magis & vio
 lentius insuper prouocauit. Ossium naturam ex capite
 colligere oportet, deinde neruorum, & venarum, & car
 Naturæ of- nium, & aliorum humorum, & supernorum ac inferno
 sium, ner- rum ventriculorum, & mentis, & morum, & eorum quæ
 uorum, ve- per annum fiunt, tempore quodam anni præcociore, velut
 narum car- pustula & huiusmodi. Simile enim est his quæ quotidie
 nis, & cate citius aut serius accipiuntur. Similiter & biliosum, & san
 rorum qui guineum corpus atrabiliarium fit, si non habet euacuatio
 cognosca- nes. Lycino postremum splen magnus dolorosus, in quar- **F**
 tur. ta aut quinta.

S E C T I O S E P T I M A.

Tuſis. **T**uſſes cœperunt circa solstitia hyberna, decimaquinta
 aut vigesima die, ex frequenti australium & aquilona
 rium ac niuoforum transmutatione. Ex his aliæ breuiiores,
 aliæ diuturniores fiebant, & post has multæ peripneumoni
 cæ affectiones. Ante æquinoctium rursus plerisque reuer
 tebatur, quadragesima vt plurimum ab initio die: & aliqui
 bus sanè valde breues ac iudicatu faciles erant, aliquibus au
 tem fauces inflammatae sunt, quibusdam Anginæ oborta,
 quibusdam leues syderationes, aliis Nyctalopes, atq; hi ma
 Anginosi, gis pueris. Verum peripneumonicae affectiones valde breues
 Luciosi. erant. Faucium verò inflammationes post tuſsim, aut omnino
 Syderati. parum

A parum pro tussi fiebant, atque hæc breues, magis autem Nyctalopes. Anginæ vero & leues syderationes, aut duræ & siccæ, aut parvæ & raro matura educentes: quibusdam vero etiam valde. Qui igitur aut vocibus amplius se fatigaverunt, aut riguerunt, in anginas magis desierunt. Qui verò manibus laborarunt, manibus tantum syderati ac resoluti sunt. Qui verò equitauerunt, aut amplius iter fecerunt, aut alios labores cruribus perfecerunt, his ad lumbos aut crura impotentia resolutoria oborta sunt, & ad femora ac tibias lassitudo ac dolor. Durissimæ autem & violentissimæ tusses erant quæ ad leuem syderationem ac resolutionem perducebant. Verum omnia hæc in recidiuis fiebant. In principiis vero non ita valde. Plurimæ autem tusses in recidiuis remiserunt, sed perfecte non defecerunt, verum cum recidiua affuerunt. Quibus voces frangebantur ad tussim, horum plurimi ne febricitarunt quidem, Quidam verò parum. Sed neque peripneumonica affectiones ulli horum fiebant, neque leues syderationes, neque ullus alius morbus de se significationem præbuit, sed in sola voce iudicabantur. At verò Nyctalopica affectiones firmabantur, ut quæ etiam ex aliis causis fiebant. Fiebant autem pueris maximè. Oculorum autem nigræ partes aliquantum variegabantur, quæ pupillas parvas habebant. In summa oculus niger ut plurimum erat. Et magnos magis quam paruos oculos habebant, & plurimi rectos capillos ac nigros. Cæterum mulieres non similiter à tussi afflictæ sunt. Verum paucae febricitarunt, & ex his valde paucae ad peripneumonica affectionem deveniunt, atque hæc seniores, & omnes superstites evaserunt. Causabar autem hoc fieri, eo quod non similiter velut viri prodiret, & quod nequaquam similiter ut viri morbis corripuntur. At Anginæ liberis duabus oboriebantur, atque hæc mansuetissimi moris erant: abundantius autem famulas corripiebant, quibus & violentissimæ fiebant, ipsasque celerrimè perimebant. Viris verò multis fiebant, qui partim evaserunt, partim perierunt. In summa, qui solum deglutire non poterant, his valde mites ac toleratu faciles erant. Qui verò etiam insuper obferre loquebantur, his molestiores ac diuturniores. Quibus verò etiam venæ circa tempora & ceruicem atrollebantur, his aliquantum malæ erant. Pessimè verò his

Vocis labor & cæterorum quæ ferat.

Tussis varietas.

Lusciosis pueri quæ fierent.

Mulieres aliter vexabantur.

Anginæ vexatio.

Hippocratis Liber VI.

verò his quibus & spiritus sublimis coeleuabatur. Hi enim **D** etiam incalescebant. Nam sicut scriptum est, ita consortia affectionum habebant. Et quæ quidē primū scripta sunt, etiam sine posterioribus fiebant. Quæ verò posterius, non sine prioribus. Celerrimè autem moriebantur, vbi febrili rigore insuper riguissent. His ita pressis nihil memorabile proderat, non ventris turbatio, non venæ sectio, neq; quæcunque alia tentauit. Secui etiam venam sub lingua, quosdā & sursum purgavi. Hæc igitur omnino in æstate fiebant, sicut etiam eruptiones omnino multæ, & potissimum in scitibus lippitudines dolorosæ populariter grassabantur.

Sanguinis venarū suppressiones faciunt animi deliquium. figura alterata, interceptio, linamētum intortum, appositio, E deligatio. Inguinū glandularūque tumores plurimi fiebant, eo quòd hepatitis affecta esset. Erat autem & ab arteria male affecta malum signum, veluti Posidonix.

Posidonix. Quibus sanguis erumpebat, morientes fronte non exudarunt, sed velut contracti præ siccitate erant. Et anhelosi, ac cum sudoribus pereuntes, male habebant. Ventriū abundantia turbationē ferunt, velut Posidonix: & quæ animalcula in aluo inducunt. In attenuatione circūtentio ante obitum, & vmbilicus oblongus ipsi protractus est: & gingivarum dentes ambientium exulcerationes. Multa de vnoquoque rectè præcipi possunt, quæ partim eadem possunt, partim non: velut est talia diffundi, exolui, & educi, & indurari, & maturari, & vbi mutatione opus est, de lecto propellere timidos, & torpentes excitare ad ea quæ relinquunt.

Hydropicos citius secare oportet, tabelcentes statim vire, caput secare, & huiusmodi. Hydropicorū pectinem ne contingito, neque internas partes. Simile est enim multigenibus. ~~Affectiones circa cor & venter~~ ventriculo osculum

Xenarchus Xenarcho, & calidum aceruatim exspirare, & vlcus per euacuationem ab initio fouere. Vox qualis est irascentibus, si talis fuerit non irato, ex natura fuerit. & oculi tales fuerint ex natura turbulenti, quales sunt vbi irascuntur hi qui tales non sunt. Et alia iuxta morborum rationem, velut verbi causa, Morbus tabidam speciem inducit, si talis ex natura **Tabes.** ager fuerit, ex tali morbo superstes euadet: & alia eodē modo. **Tussis fiet.** Tusses laboriosæ contingunt locos læsos, & ~~maximè~~ articulos.

A articulos. Sed & in febribus lassitudinem inducentibus, tussis sicca ad articulos decumbunt cum febre, si intus relinquuntur. Spiritus tabescentibus obscuro mali, & non patientibus, & quicumque alij tales ab eadem constitutione.

Tabescentibus autumnus malus. Malum item ver, quum
sci folia cornicis pedibus similia fuerint. In Perintho ve- **Perinthus.**
re plurimi agrotarunt. Simul causa fuit tussis per hyemem populariter vagata, & aliis quicumque diurni sunt morbi. Nam & in ambiguis confirmati sunt. Quibusdam verò diurni non sunt oborti, velut his qui dolores rhinales habent. Sed & aliis, velut homo ille ad quem Cyniscus me adduxit.

Dolorum in lateribus, & pectore, & aliis partibus, tem- **Cyniscus.**
Bpora an multum differant considerandum est. Nam quum melius habuerint, rursus deterius habebunt, non delinquentes. In longis dysenteriis cibi fastidia mala, tum alias, tum si insuper febrierint. Ulcera circumglabra maligna sunt.

Lumbos dolenti recursus ad latus, & pustulae quae seps vocantur. Rhenum affectiones non vidi sanatas supra quinquagesimum annum. Quae in somnis exacerbatur, & quibus extremae partes perfrigerantur, & mens turbatur, & alia quae circa somnum fiunt eiusmodi: & quibus contraria.

Quibus nihil intra constitutum tempus accidit, singulis partus vitales fiunt. Apparentia in quibus mensibus fiunt.

Labores in circuitibus, quicquid in septuaginta mouetur, in triplicitate perficitur: & quicquid in nonaginta mouetur, **C**in triplicitate perficitur. Post menses, dextera & sinistra hiant. Humiditas per prodeuntia, diata sicca opus habet.

Quod citius discretum ac motum est, rursus augetur tardius, & ad longius tempus. Labores tertio, quinto, septimo, nono mense: & secundo ac quarto.

Hec ex parua tabula consideranda sunt.

Victus ratio sit repletionem, vacuationem, ciborum, potuum. Mutationes horum qualia ex qualibus, prout se habent.

Odores delectantes, offendentes, implentes, placantes. Mutationes ex qualibus, prout se habent. Illabentes ingressos aut egressos spiritus, aut etiam corpora. Sermones qui audiuntur, alij meliores, alij offendentes. Et à lingua ex qualibus qualia alliciuntur. Spiritus tanta calidi-

Z s tas,

Hippocratis Liber V I.

tas, frigiditas, crassities, tenuitas, siccitas, humiditas, plenus, D
imminutus & copiosior, à quibus mutationes, quales ex qua-
libus, prout se habent. Continentia, aut contenta, aut in-
tus permeantia corpora. Sermonibus, silentio, dicere quæ
~~aut sermonibus~~ quibus dicit, an magni aut multi, veri aut
conficti. Prodeuntia & egressa ~~non oportet~~
runt: aut ubi desuerunt, aut quantum diuulsa sunt, itémque
colores, in quibus aut caliditatem, aut falsuginem, aut dulce
dinem, aut tenuitatem, aut crassitiem, æqualiter aut inæqua-
liter, corpus, tempus: Mutationes quales ex qualibus habent.

Incepit eruptionem, non obtinuit, Lachrymæ volen-
ti, nolenti, multæ, paucæ, calidæ, frigidæ, crassities, sapor.

Sputum an per se excreet, aut tussiendo reiiciat, itémque E
vomitum. Solis calor, frigus, humectatio, siccitas: Mutatio
per qualia, ex qualibus, ad qualia se habet. Labores, ocia,
somnia, vigilia. Quæ in somno fiunt, insomnia, cubilia, &
in quibus, & ex quibus. Mentis intelligentia ipsa per se-
ipsam, citra instrumenta ac negotia, tristatur, lætatur, timet,
confidit, sperat, velut Hippothoi domestica famula mentis
sux per seipsam gnara erat: & quæ in morbo acciderat scie-
bat. Aetatem ab ætate discernere, oportet, & an prius aut
posterior quàm cōuenit, quid fiat veluti si resolutus est hye-
me, & seni ætate, aut infanti, & ætate aut prius, aut posterior
quàm conuenit. Dentium emissiones, pilorum productio-
nes, genitura magis & minus, pilorum augmentum, crassi-
tudo, robur, imminutio, quod cognatum est, & quod per se F
ipsum, quanto magis & minus. Anni tempus, in quo & ci-
tius aut serius. Tempus in quo factum est, pluuiosum aut
siccum, frigidum aut calidum, sine ventis aut cum ventis, &
qualibus ventis. Temporis in principio, aut medio, aut fine,
aut semper, præterito aut præsentē. Morbi tempus & ho-
ra, accidentia, circuitus, & ex circuitibus maiores, & per am-
plius tempus: incrementa, & totius morbi incrementum, re-
missio, vigor, & magis & minus perficiens, & quādo, & qua-
liter, & in quali hora ac ætate. Populariter grassantium
morborum modi, & si quis ex incipientibus incepit sine
vomitu, veluti aut ubi biberunt quid cōtinentes, aut parum
purgati. Febriculosi fortassis valde candidi, quorum etiam
labia, qualis modus, tempora. * Corpus, actio, in considera-
tionem

Hippo-
thous.
Quæ obser-
uanda.

A tionem ducatur. Visus, auditus, nasus, tactus, lingua, cogi-
 tatio consideretur. Tumores in supernis palpebris relictī,
 dum alia circumcirca gracilesunt, recidiuas faciunt: In ex-
 tremirate verò subrubicundi, duri, & valde viscosi, & insur-
 gentes ac inhærentes in his sunt, velut Pharsalio Polyme-
 di. Erumpentes tumores aut liuores, in lippitudinibus aut **Polyme-**
 vlceribus: Sed & quæ deferuntur ex tuberculis ac suppura-
 tionibus, quia signa sunt. Circa mensē tormina circa
 vmbilicum, & dolores, quādoque à porro: Sed & ab alio his
 postea. Sacri ignes quibusdam à collo, & circa has partes,
 in facie iudicabuntur: Nigri etiam quibus à collo, mali
 erant: & si pustulæ essent, malæ erant: & quibus alius turba-
 ta esset. Adamantus atrabiliarius à peplis pluribus vo- **Adaman-**
 mui aliquando nigra, quandoque à cepis. Febres in qui-
 bus vlcerantur labia, fortassis intermittentes: & tertianis
 perfrigerationes. At amburètes statim ad manum soluun-
 tur semper. Quale inest in articulis considerandum, an **Quāta ob-**
 non suppurantur. Consuetudo autem, ex qualibus sani **seruatiome**
 degimus, victus modis, tegumentis, laboribus, somnis, re- **dicorū de-**
 bus venereis, mentis affectionibus. Quomodo morbos fe- **beat esse.**
 rant, à quibus quæ figuræ, ad quos locos conuersi sunt,
 quando cœperunt, affuerunt, desuerunt. In quibus in-
 temperans horrendus. Contrariæ in morbo victus ratio-
 nes, qui facile, qui agrè toleratur. Victus rationes quan-
 tum fieri potest cognoscendæ. Nam non nosse, multarum
 calamitatum res est. Bonis autem medicis similitudines
 pariunt errores ac difficultates. Verum contraria facit
 causa & occasio. Scio quod difficile est ratiocinari ac co-
 gnoscere vias, veluti si sit acuto capite, simus, subaridus, bi-
 liosus, agrè vomens, facile vomens, niger, iuuenis qui tene-
 re vitam degit: Hæc simul inter se consentire difficile est.
 Cui fistula refringebatur, tussiculæ permanere impedi-
 bant. Cui apex hepatis complicatus erat, eum concussi,
 derepente dolor sedatus est. Satyrus in Thaso cognomen- **Satyrus**
 to, Grypalovex vocabatur, hic quum annorum viginti- **pollutione**
 quinque esset, sæpe per somnum semen effudit: & interdum **mortuus**
 quoque frequenter ipsi prodibat. Quum autem ad an- **est.**
 num trigesimum peruenisset, tabidus fiebat, & mortuus est.
 In Abderis palæstræ custos, qui Stheneus dicebatur, mul-
 tum

Hippocratis Liber VI.

Palæstræ tum luſtatus aduerſus fortiorem, & in caput lapſus, digreſ-
cuſtos. ſus multam bibit frigidam aquam. Poſtea illa nocte vigiliæ
obortæ ſunt, anguſtiæ, & extremarum partium frigiditates.
Poſtridie ingreſſus ad domum, & glandula aluo ſubdita, non
ſubiit, verum parum minxit, prius autem niſiſil minxerat: ad
noctem lauit, nihilo minus vigiliæ & anguſtiæ aderant, de-
lirauit. Tertia die frigiditas extremarum partium, excalefa-
ctus ſudauit, pota autem aqua mulſa tertia die mortuus eſt.

Melancholi Atrabiliarij, etiam comitiali morbo corripī plerunque ſo-
ci comitia lent, & viciffim comitiales fieri ſolent atrabiliarij. Vterque
leſque cō- verò morbus magis fit, prout ad alteram partem inclinari-
municant. Si quidem enim ad corpus inclinari, comitiales ſunt. Si ve-
Phaethuſa rò ad animum, atrabiliarij Melancholici dicti. In Abderis
Pytheas. Phaethuſa Pytheæ vxor, priore quidem tempore fœcunda
erat: quum autem maritus ipſius in exilium abiſſet, menſes
multo tempore ſuppreſſi ſunt, poſtea dolores & rubores ad
articulos oborti ſunt. Hæc autem vbi contigiffent, & corpus
virile factum eſt, & hirsuta penitus euafiſit, & barbam produ-

Menſiū de xit, & vox aſpera facta eſt. Et quum nos omnia tentaffemus,
fectu mo- quæ ad menſes detrahendos conferre viſa eſſent, non prodie-
ritur. runt, ſed mortua eſt, quum non ita multo tempore poſtea vi-
xiſſet. Idem hoc contingit etiam Namyſiæ Gorgippi vxori
in Thafſo. Viſum eſt autem omnibus medicis, in quos ſanè
Namyſia ego incidi, vnā ſpem eſſe, ſi menſes ſecundum naturam
Gorgippus prodirent, Verum & huic prolici non potuerunt omnia no-
bis molientibus, ſed paulo poſtea mortua eſt.

H I P P O C R A T I S C O I D E M O R B I S P O - P V L A R I B V S L I B E R S E P T I - M V S , I A N O C O R N A - R I O M E D I C O P H Y - S I C O I N T E R - P R E T E .

Post

A



Ost canem febres fiebant sudorificæ, & non perfrigerabantur penitus ^{Canis sy-} ^{cus.} post sudorem, sed rursus incalescebant: & leniter longæ, & iudicatu- ^{tes.} difficiles, & non valde siticulose, paucis in septimo & nono desinebant, aliis vndecimo, & decimoquarto, & decimosextimo. Polycrati fe-

br̃is, & sudor, qualis descriptus est, à medicamento purgatio deorsum vehementer, & febris adeò lenis facta est, vt obscura consisteret, præterquam in tempo-ribus, & sudores ad vesperam, circa caput, collum, pectus.

B Deinde rursus etiam per totum ventrem, & rursus incalescebat. At circa duodecimum & decimumquartum febris aucta est, & modicæ alui subegestiones, post purgationem vsus est sorbitionibus. Circa decimumquintum dolores ventris iuxta splenem, & sinistram lateris mollitudinem. Calidorum appositio minus profuit quàm frigidorum. Quum infuso per clysterem molli vsus esset, cessauit dolor. Idem quoque Cleocydi profuit, ad dolorem similiter habentem, itémque febrem. Circa decimasextam calores leniores esse videbantur, & egestiones bilis meracæ, & animus audacior, spiritus autem moderatus. Quandoque verò aceruatim attractum, rursus aceruatim expirabant, velut præ animi deliquio, aut velut in vmbra desidens respirare solet, is qui per æstum iter fecit. Decimasextima itaque die desidens in sellam, animi deliquium incidit, & multo tempore sine voce ac sensu iacebat, & vix aquam mulsam suscipiebat, fibras in collo distendens, vtpote faucibus resiccatis, ac omni virium exolutione præsentē. Vix itaque intra seipsum erat, & calores leniores fiebant. Postea verò desuit morbus vigesima secunda die. Pythodoro eodem ^{Pithodor.} tempore febris continua, octauo die sudor obortus est, & rursus incalescebat. Decima rursus sudor, duodecima sorbuit succum, & vsque ad decimamquartam obscura erat, in temporibus autem comparebat, & sine siti erat, & ipse sibip̃s sanus esse videbatur. Sudores fiebant omni die. Decimaquinta iusculum pulli sorbens vomuit bilem, & aluus infra exturbata est, & febris exacerbata est, rursus desuit, & sudores

fiebat

fiebant multi, & corpus totum perfrigeratum erat, exceptis **D**
 temporibus. Pulsus non defecit. Videbatur quiescere modico
 tempore ut incalescere se putaret. Vigesimaquarta quum
 iam gustaret cibos multis diebus, & pransus esset, multa erat
 febris, & ad vesperam delirium, accedente simul etiam som-
 no. Detinebat itaque iam continua & vehemens, & quando-
 que vnam, quandoque duas noctes vigilabat: reliquo verò
 tempore somnus abundè contingebat, ut operosum esset ex-
 citare, & delirium in somno, & si quando ex somno excitatus
 esset, vix ipse sui ipsius erat. Sitis exors. Spiritus moderatus,
 talis aliquando, qualis Polycrati. Lingua non decolor. Post
 septimam recidiua succi exhibebantur, post decimanquar-
 tam cibus. Circa primos septem eructabat, ac remouebat: **E**
 quandoque cum potu subbiliosum, citra anxietatem, donec
 aluus deorsum soluta est. Sudores post recidiuam defecerunt,
 nisi quis circa frontem esset tantillus ut vix significationem
 de se præberet, lingua ex somno si non collueretur, subalba
 præ siccitate, & ruptiones vlcerum circa ipsam, & in labio
 inferno, & circa dentes, alui egestionis pauca. Circa decimā-
 quintam ut recidiua facta est, frequentiores & viscosæ. De-
 coctum malicorij sedauit ipsas. Urinae quales sunt diuturnæ.
 Sub vltimum tempus dolor pectoris deglutienti potum, &
 manus in pectore. Cuminum & ouum absorbenti sedatus est.
 lingue raritas profuit. Quinquagesima à prima circa arctur-
 rum, sudores breues iuxta lumbos & pectus, & corpus perfri-
 gerabatur, exceptis temporibus, valde modico tempore. Pri- **F**
 ma & quinquagesima remisit, nec iterum apprehendit. Era-
 tolaus. Eratolai filius circa æquinoctiū autumnale dysentericus fiebat,
 & febris tenebat. Egestionis alui erant biliosæ, tenues, mul-
 tæ, & moderate subcruentæ. Dolor autem ventris vehemens.
 Vbi serum & lac bibisset, silice candefacta immissa, dolores
 & subcruentæ egestionis moderatiores fiebant, sed biliosæ
 comitabantur: & sæpe ad exonerandam aluum surgebat, sed
 minore dolore. Febricula verò & agroto, & multis, omnino
 nō adesse videbatur per omne tempus, post primos sex dies,
 adeò obscura erat. Verum iuxta tēpora pulsus erat, & lingua
 præ siccitate subalba, & moderate siticulosus, & sine somno.
 Sorbitionibus autem iam utebatur & vinis. Quum iam ad
 decimumquartum diem peruenisset, tubercula circa aurem
 oborta

Eratolaus.

Tubercula
aurium.

A oborta sunt, tum alteram, tum vtranq; dura ac cruda: omnia disparuerunt, moderate autem dolorosa erāt. Quum autem non desinerent egestionēs, & semper biliosa essent, absorberi herbam in farina, biliosa egestionēs & dolores ad tempus aliquod mitiores facti sunt: liquidas verò multas saepe egerbat, & cibos valde auersabatur, & omni necessitate coactus admittebat. Calor autē, & lingua, & sitis tales sequebantur quales dicti sunt: & sudores nulli. Obliuio verò huiusmodi quædā. Vbi interrogasset de eo quod paulò antea audiisset, modico interposito tempore rursus interrogabat: & rursus repetebat, velut qui non dixisset: & se desiderare obliuiscabatur, nisi quis ipsum commonefecisset: & ipse sibiipsi conscius erat huius affectionis, neq; ignorabat. Spiritus qualis sano. Ultra trigesimum verò vsq; ad quadragesimum diem, & dolor vētris multum augescebat, & supinus decumbebat, & se conuertere ne tantillum quidem poterat: & quia dolor vehemens erat, aliis qui cibum exhiberēt opus habebat. Alui egestio erat multa, & discreta, tenuis, & colores vinosi, quacunq; tandem ingessisset, & quandoque subcruenti, & corporis dolor: colliquatio extrema, & impotentia: & ne alio quidem subleuante surgere amplius poterat. In medio verò vmbilici ac ossis pectoris, circa hanc sedem adhibita manu, talis palpitio erat, qualis neque à cursu, neque à timore circa cor generari possit. Bibenti lac asininum coctum, nouem heminarum Atticarum mensura ad duos dies, biliosa purgatio vehemens oborta est, & cessauerunt dolores, & ciborum appetentia accessit. Postea verò bubuli lactis crudi quatuor heminas Atticas bibit, pro vice vna cyathos duos, in diem, primum sextam aquæ partē ammiscens, & vini nigri austeri parum. Semel autem in die cibum capiebat ad vespērā. Panis erat ad mensurā dimidiæ chœnicis subcineritius, & pisciculus petrosus simplex, aut caruncula capræ aut ouiculæ. Potus lactis post primos decē dies, ad quadraginta vsque line aqua, cum vini nigri modica parte. Post septuagesimum iam à primo diē, à balneo ad noctem, sudor exiguus obortus est. Vtebatur autem modico potu, & post cibum potu austeriore. Crescit lac in farinā magis quàm serum caprinum con-
Ctescit-
 tulit, quum dolor esset circa totum ventrem, & dolores cum
 multa ad egerendum surrectione, ac subcruenta egestionē,
 & tum

Obliuio
huius quæ.

Adrianus.
Caneas.
Cydes.

& tumor circa pedes, ferè iam ad dies viginti quinque esset. D
Et Adriano eadem contulerunt. Verùm Caneas filio lac
aslinum coctum. Cydis filio circa solstitium hybernum
rigor & febris, & auris dextræ dolor, & capitis dolor. Talis
autè auris dolor statim à paruo puero ipsum comitabatur,
fluidus, fistulosus, & grauis odoris. Quum autem ita se habe-
ret, plerunque doloris exors erat. Tunc autem dolor erat ve-
hemens, & capitis dolor, secunda aut tertia die bilis vomit-
tus: desidenti exonerandi ventris gratia, prodiit excremen-
tum subbiliosum viscosum, velut ex ovo subpallidum. Quar-
ta & quinta ad noctem aliquantum delirabat: & dolor capi-
tis ac auris vehemens, & febris. Sexta alui egestio à mercuri-
ali: & calor, & dolor cessasse videbatur. Septima velut san-
nus. In temporibus autè dolor non defecit, sudor nullus ob-
ortus est. Octaua succum sorbuit, ad vesperam autè betæ suc-
cum, & in noctem somnus: & valde doloris exors: & nona la-
rabatur ad solis occasum. Verùm ad noctem capitis & auris
vehemens dolor. Contigit quoque aurem pure manare cir-
ca hoc tempus quum maximè doleret statim à principio. To-
tam verò noctem nonam, & sequentem diem, ac noctis ma-
gnam partem, neminem noscebat. Verù suspirans perseuera-
bat, in die verò intra seipsum erat: & dolores cessabant, & ca-
lor moderatior erat. Quum autè sorbuisset mercurialem,
vndecima egeffit per aluum pituitosa, mucosa, maleolentia,
duodecima & decimatertia moderatè habebat. Decima-
quarta initio mane facto, vsq; ad meridiè per totum corpus F
sudabat cū somno & sopore multo, vt operosum esset ipsum
excitare: ad vesperam expectatus est, & corpus quidem mo-
deratè perfrigeratum est, in temporibus autem pulsus perse-
uerabat: decima quinta & decima sexta succis vsus est. Deci-
ma septima venit rursus dolor eorundem ad noctem, & deli-
rium: & pus fluabat. Decima octaua & decima nona ac vige-
sima, insani modo degebat. Vociferabatur autem attollere se-
ipsum nitens, sed capiti dominari non potens, manibus pro-
tentis semper aliquid frustra venabatur. Prima & vigesima
sudor exiguus circa latus dexterum, & pectus, & caput. Vige-
sima secunda sudor circa faciem plurimus erat. Voce autem
hoc tempore, si quidem valde conaretur, quæ volebat perfe-
ctè loquebatur. Si verò ex tempore citra conatum semiper-
fecta

A fecta, & os exolutum, & maxillæ & labia semper in motu, velut qui loqui vellet, & oculorum frequens motus ac intuitus, & color in dextro oculo velut dictum est, subcruentus, & palpebra superna intumuit, & iuxta maxillam rubor in fine, & venæ omnes in facie manifestæ adeoque contractæ, & oculis non amplius niſtabat, sed intentè intuebatur, & palpebras diducebat ad supernam partem, velut fieri solet ubi quid in oculum incidit, & quum biberet, descendens potus in pectora & ventrem strepitus audiebatur, qualis & Charadi. Spiritus leniter semper moderatus, lingua qualis est peripneumonice cum pallore albicans, ab initio & semper capitis dolor. Collum semper immobile ut vnâ cum capite circummageretur opus habebat, & pars secundum spinam ex collo recta ac inflexibilis, decubitus quales dicti sunt, & non semper supinus decumbebat. At pus iam serosum album, multum negotij ad detegendum cum spongiis exhibebat, odor eius valde excellens, circa postremum tempus pedum contactum non valde percipiebat. Harpalidæ sorori prægnanti circa Harpalidæ quartum aut quintum mensem, tumores circa pedes aquosi *soror.* fiebant, & oculorum cavæ partes intumescabant, & totum corpus in tumorem eleuatum erat, velut in pituita alba affectis, tussis sicca, rectæ cervicis spiratio, & eiusmodi anhelatio, & quandoque strangulationes à spiritu, ut sedens in lecto perseveraret, decumbere autem non poterat, sed etiam si qua somni expectatio esset, desidebat. Sine febre erat leniter, & fœtus ad plurimum tempus immobilis erat, veluti corruptus, & translabeatur. Comitabatur autem anhelatio ferè ad duos menses. At quum fabis melle ammixto, & eclegmate mellis vsa esset, & Aethiopicum cuminum in vino bibisset, melius habuit. Postea tussiendo eduxit multa, matura, pituitosa, alba, & spiratio illa cessauit, peperit autem fœmellam. Polycratis vxori æstate circa caniculæ sydus *Polycrates* febris. Spiritus matutinus minor, à meridie magis & paulò densior spiritus. Tussis & excreatio statim ab initio, similis purulentis. Intus circa arteriam & fauces subsibilabat stridula asperitate, facies boni coloris, in maxillis rubor, non abundè coloratus, sed leniter floridus. Progressu verò temporis & vox rauca, & corporis colliquatio, & circa lumbos eruptiones, & alius circa postremum tempus liquidior. Septuage

Hippocratis Liber V I I.

ptuagesima die febris extrinsecus valde friguit, in tempori- **D**
bus autē quies. Spiritus verò frequentior fiebat. Verum post
hanc quietem spiritus densior, adeo ut sedens perseveraret,
donec mortua est. In arteria strepitus multus inerat, sudores
pravi, intuitus valde modesti, usque ad extremum tempus.
Dies accesserunt ipsi perfrigeratæ plures quam quinque.

Vetula lan-
guens eua-
sit.

Post primos autem purulentum exscreare perseverabat.
Mulieri supra portas habitanti iam seniori febricula obor-
ta est: quæ quum iam desineret, colli dolor usque ad spi-
nam & lumbos, & harum partium non valde potens erat.
Maxillæ erant compactæ, & dentes in seipsos, plus quam
ut specillum admitterent, & vox balbutiens, eo quod reso-
lutum, & immobile ac debile esset corpus, prudens tamen **E**
erat. Calefactoriis & aqua mulsa tepida, tertia ferè die
Vnctor. hæc laxavit, & postea succis & iusculis sana euasit, id quod
ad finem autumnalis temporis contigit. Apud Harpalidem
vnctor, crurū ac manuum impotētior circa autumnum fa-
ctus, bibit temerè medicamentum sursum ac deorsum pur-
gans, ex purgatione febris, & ad arteriam defluebat suor,
qui loquentem impediret, & faceret ut inter loquendum an-
helaret, similiter ut anginosus raucosus. Strangulatio deglu-
tienti, & alia quæ in angina. Verum tumor non erat. Febris
autem & tussis angelcebat, & excreatio liquida ac multa
pituitæ. Progressu temporis & dolor circa pectus ac mam-
mam sinistram. Quum autem exurgeret, aut cōmoueretur,
anhelatio multa, & sudor à fronte & capite, & faucium affe- **F**
ctio mollior erat, dolore ad pectus descendente. Ab initio
igitur fabis melle ammixto utebatur. Postquam autem fe-
bres detinebant, magis aceto mulso calido, & mellis delin-
ctu multo. Vbi præteriiissent dies quatuordecim omnia desi-
uerunt, & manuum ac crurum non longè postea potens fa-
ctus erat. Chartadi febris ardens, vomitus bilis multus, &
infra alui egestio, vigiliæ, & iuxta splenem tumor rotundus.
Tertia die mane surrexit, strepitu circa ventrem citra do-
lorem percepto. Vbi verò aluum exoneraret, sanguinis re-
centis plus quam congi mensura subiit, & vbi iterum atque
iterum cohibuisset, grumi concreti, anxietas circa cor & os
ventriculi & sudor per totum ferè corpus, & febricula frige-
scere videbatur, & primū prudens erat, progrediēte verò
die, &

A die, & inquietudo maior, & anxietas, & spiritus paulò densior, & confidentius ac benignius quàm pro tempore homines compellabat, ac excipiebat, & quædam animi deliquia accedere videbantur. Quum autem exhiberent aliqui succos, & aquam de farina crassa in ipsa macerata, non cessauit: sed spiritus, ad vespërâ valde multus erat, & iactatio multa, & ad dexterâ, & ad sinistra transmouens seipsum nullo tempore quiescere poterat, pedes frigidi. In temporibus & capite calor magis propinqua iam morte, & sudores multi, & bibenti strepitus audiebatur, circa pectus & ventrè descendens potus. Quod verò pessimum erat, vbi dixisset sibi aliquid infra subire velle, & oculis intente intutus esset, non diu se cohibens mortuus est. Hermoptolemi uxori hyemis tempore febris, & capitis dolores, & quum hibilset, vt quæ diffusculter deglutiret, surrexit, & cor se sanasse dixit, lingua liuida ab initio. Occasio videbatur ex horrore post balneû facta esse. Vigilabat & nocte & die. Post primos dies interrogata, non adhuc solum caput, sed & totum corpus se dolere dixit. Sitis quandoque vehemens, quâdoque moderata. Quinta & sexta & vsque ad nonam fermè deliryiû, & rursus ad seipsam loquebatur semiperfecta cum sopore, & aliquândo manum ad dealbatum parietem protendebat, & puluinum quædam frigidum ad caput situm, etiam pectoribus adhibebat, & stragula quandoque reiciebat, & in oculo dextro subcruentum quiderat, & lachrymabatur. Urina autem erat quæ in pueris semper pessima est. Ex aluo egerebat ab initio quidem subfulua, postea verò aquosa valde, & huiusmodi coloris. Vndecima moderatius calida esse videbatur, & quandoque sitis exors fiebat, adeò vt nisi quis dedisset, non peteret. Somni post primum tempus contingebant moderatè interdum, ad noctem vigil erat, & ad noctem magis dolebat. Nona venter exturbatus est aquosis excrementis. Similiter etiam vndecima. Sequentibus verò moderatè multum ad egerendum surgebat, & talis egestio erat. Erant autè in prioribus diebus indignationes & ciulationes, velut pueri. & vociferatio, & timores, & circumspectiones, vbi sopore excitata esset. Verùm decimaquarta operosum erat ipsam continere exilientem ac clamantem derepente & pertinaciter, velut ex plaga, & vehementi dolore ac timore, velut si quis ipsam

Hermoptolemos.

Hippocratis Liber V I I.

apprehensam modico tēpore detineret. Deinde rursus quie- **D**
tem habebat, & sopore pressa dormiens perseverabat omni-
no non videns, quandoque neque audiens, & totam hanc
diem ad utrumque, modo ad tumultus, modo ad quietem
transmutabat. Sequenti nocte per alium subit quid cruen-
ti, velut mucosum; & rursus velut limosum: postea pralina
valde ac nigra. Decimaquinta repentina iactationes, & ti-
mores, & vociferatio lenis fiebat. Sequebatur autem effera-
tio, & indignatio, & eiulatio, nisi ipsi cito quod vellet porre-
ctum esset, & cognoscebat quidem omnes & omnia statim
iam post primos dies, & oculi subtruentū illud sedatum est.
Verū infania iuxta temporis occasionem, & vociferatio,
& mutatio prædicta sequebatur ad soporem, audiebat inæ- **E**
qualiter, aliqua valde, & si submisit quis loqueretur: aliqua
verò clarius eloqui oportebat. Pedes semper æqualiter cum
reliquo corpore calidi, usque ad extremos dies. Verū deci-
ma sexta minus. Decima septima moderatius quā aliis die-
bus habens, ad noctem horrore ipsi oborto, se contrahens ma-
gis febricitabat, & sitis multa erat, reliqua similia sequeban-
tur. Tremores autem circa manus fiebant, & aliquantum cō-
cutiebat caput, & oculorū intuitus pravi, & sitis vehemens,
ubi bibisset rursus postulabat, & rapiebat ac large bibebat.
neque auellere ipsi poterant, lingua sicca, valde rubicunda,
& os totum ac labia ulcerata erant ac sicca, & ambas manus
ad os admouens manducabat quum tremula esset, & si quis
aliquid ad manducandum aut sorbendum obtulisset, large ac **F**
furiosè deglutiebat ac sorbebat, & signa circa oculos mala.
Diebus autem tribus aut quatuor ante obitum, horrores
quandoque incidebant ipsi, adeo ut contraheret corpus, &
contereretur, & anhelaret, crura distendebantur, & pedes
frigidi erant. Sitis similis, & mentis affectiones similes, &
surrectiones ad egerendum aut inanes, aut paucis & tenui-
bus prodeuntibus, cum modica quadam tensione. Postrema
tertia & vigesima, oculus magnus mane erat, & circumspe-
ctio brevis, & quietem agebat, quandoque etiam absq; con-
tentione ac sopore. Ad vespeream verò dextri oculi motus,
qualis videntis, aut aliquid volētis, ab externo angulo ad na-
sum cognoscebatque & interroganti respondebat. Vox post
multa subblaxa, & præ vociferatione fracta ac raucofa.

Amph

- A** Amphiphradis filio æstate lateris sinistri dolor & tussis. *Amphiphrades*
& alui egestionibus multæ, aquosæ, & subbiliosæ, & febris cessasse videbatur circa septimam. Tussis aderat. Color subalbidus ac subpallidus. Circa duodecimam cum virore subpallidum spuebat. Spiritus progressu morbi semper deterior, & anhelatio, & stridula asperitas circa pectus & arteriam. Sorbitionibus utebatur, prudens per omne tempus, circa vigesimam octavam mortuus est. Sudores quandoque fiebant foras.
- Caupo peripneumonicus, alius statim subibat. Circa quartam sudor multus, febricula cessasse videbatur, tussicula nulla, ut ita dicam. Quinta, sexta & septima detinebat febris, sudor octava. Nona excreavit pallidum, decima subibat alius acervatim non sepe circa undecimam mitius habebat.
- B** Decimaquarta sanus. *Hermoptolemus*
Hermoptolemo post pleiadis occasum febris accessit. Tussis non valde, lingua peripneumonica, nona excreavit, totus frigidus factus est, velut videbatur, obtrulerunt ipsi succum circa meridiem calcescebat. Undecima sudor, & alius erupit biliosis egestionibus. Tussicula accessit. Decimaquarta pallidum excreavit, & stertebat. Decimaquinta quum per totum tempus prudens mansisset, mortuus est. Alius quidam in palato stertens, lingua sicca, peripneumonica, prudens mortuus est. Et *Posidonius* adhuc æstate instante, iuxta pectus, & præcordia, & latus, multo tempore dolebat, citra febres. Multis autem annis antea suppuratus fuerat, hyeme verò quum inhorruisset, dolor augescebat, & febricula tenuis, & excreatio purulenta, tussis cum stridula asperitate circa fauces, & stertens, quum prudens esset mortuus est.
- C** Balis filius quum ex monte penitus aberrasset, sexta lingua prava, subrubra, & vocem laeserat inter aberrandum, oculi colorati, natantes velut dormitantium, color reliqui corporis non valde velut in morbo regio, sed subpallidum, lividum. vox prava. lingua obscura, peripneumonica, non prudens. Spiritus ad manum malus, non densus neque magnus, frigidi pedes lapidosi. Circa nonam mortuus est. *Anginosus*
Quædam apud Metronem anginosa, dextra manum ac crus doluit. Febricula tenebat debilis suffocatio die tertia remansit. Septima convulsa. vox intercepta. Stertor, detrium collisio ac cõsertio, maxillarum rubor. Hæc non longè vitam protraxit, quinta aut sexta mortua est. *Signum*

Hippocratis Liber VII.

- Bion hydropicus.** gnum circa manum subliuidum. Bion ex hydropico diu-
turno cibum auersabatur ad multos dies. & vrine stillici
dio vexabatur. In sinistro genu abscessus fiebat. suppuratus
est. mortuus est.
- Ctesiphon.** Ctesiphon hydropicus ex febre ardente
multa, & prius hydropicus ac splenicus, valde repletus est &
scrotum, & crura, & peritonæum membranâ aluum ac inte-
stina ambientem. Ad finē tussis & suffocationes fiebant ad
noctem, magis à pulmone, velut pulmonicis ac tabescenti-
bus. Tribus aut quatuor diebus ante diem obitus, rigor, fe-
bris. circa femur dextrum intus ad venâ mediam ab ingui-
ne collectio velut ignis feri, subliuidum habens ruborem. ad
noctem cordis ac oris ventriculi dolor. & non longè postea
vocis interceptio strangulatio cum stertore. & mortuus est. E
- Prodromus.** Et in Olyntho hydropicus, derepente voce priuatus, no-
ctem & diem desipiens, mortuus est. Prodromi filius, æsta-
te subblæsus. æstuosus. lingua ipsi subarida. obscura. egestio
alui deorsum multa. Superstes euasit.
- Leophorbidæ.** Leophorbida febris
acuta post solstitium hybernum. præcordiorū & ventris do-
lor alui egestionēs liquidæ, biliosæ, multæ. & interdium sopor-
osus. lingua peripneumonica. tussis non inerat. Duodeci-
ma nigra pauca & prasina egesit. Decimaquarta febricula
cessasse videbatur. Postea verò sorbitionibus utebatur. De-
cimasexta os valde saluginosum siccum fiebat. ad summam
vesperam horror febris. Vigesima prima circa meridiem
rigor, & sudor. febris desinit, verum calor adhuc suberat te-
nuis. ad noctem rursus sudor. & vigesima secunda ad noctem F
sudor. & calor remittit. At prioribus diebus omnibus sine su-
dore erat. Aluus autem humecta fuit etiam in putata postea
recidua.
- Theocles.** Quæ supernè habitabat Theoclis cognata, sub
pleiadas febris acuta. sexta videbatur cessasse. lauit velut fe-
bre sedata. septima mane maxilla valde rubicunda, vtra non
memini. In vespera febris venit multa. & animi deliquiū,
& vocis interceptio erat. non longè verò postea sudor. &
quies cessante morbo septima die.
- Theodorus.** Theodori vxori in fe-
bre vehemēti sanguinis eruptio facta est, hyeme, vbi febris
desisset circa nonam: non longè postea, lateris dextri velut
ab vtero grauitas. Sed & primum, & sequentibus diebus,
obortus est dolor vehemens iuxta pectus. & fomento ad la-
tus dextrum adhibito, remiserūt dolores quarta die spiritus
densior

A densior.arteria vix respirans subleuabat.& supina difficulter se vertere poterat.ad noctem febris acutior , & delyrium breue fiebat. Quinta mane mitior esse videbatur.sudor de facie diffundebatur primū modicus:deinde multo tēpore per totum corpus ac pedes. Postea verò videbatur ipsi febris remisisse.Erat autē ad manum frigidius corpus arteriarum.

Quæ verò in temporibus sunt etiā magis saliebant,& spiritū densior.& aliās atque aliās delyrabat.& omnia ad deterius:lingua perpetuò alba valde:& tussis non inerat.nisi tertia ac quinta die ad breue tempus. Siris non erat. Sputatio erat. Præcordium dextrū valde eleuabatur circa quintā. verum postea mollius.egestio tertia die à balneo stercoris modici.Quinta rursus liquidi modici. Venter autē mollis.Vrinæ acerbæ,cineris speciem referentes.oculi velut delassatæ difficulter suspiciebat ac circumferebat oculos. Quinta ad noctem agrè affecta fuit,& delyrium sequebatur.Sexta rursus eadē hora qua plenū solet esse forum , multus sudor diffundebatur,incipiebat à fronte ad totum corpus.ad multum tempus prudenter res suas disponebat.ad meridiē verò valde delyrabat.& perfrigeratio similis erat,omnia verò circa corpus grauiora.Ad vespērā tibia ipsius ex cubili decidit,& puero præter rationem minabatur , & rursus silebat,& ad quietem cōuertebatur. Circa primū somnum sitis multa.& insania,& erecta sedebat , & præsentibus conuiciabatur,& rursus cōticuit.ac in quiete erat.& videbatur reliquum noctis sopore pressa esse.Verū oculos non clausit.Ad diē iudicabat pleraque nutibus.corpore quiescens , & moderatè intelligens.Sudor rursus eadē hora.similiter oculi demissi.ad infernam palpebram magis incumbentes.rigidè ac stupidè intuentes.albæ oculorū partes pallidæ & mortiferæ.& totū corpus pallidum ac nigrum.manū plerunque ad parietē,aut ad stragula habebat.strepitus autem habēti magni fiebant, respuebat.& sursum ad nasum absorbebat.& floccos legebat.& faciem obuelabat.Post sudorem manus velut in glaciem cōgelatæ sudor sequebatur frigidus.corpus ad manum frigidum exsilebat.vociferabatur.insaniebat.spiritus multus.manus tremulæ fiebant,sub mortē progressæ iam etiam cōmulsæ.septima die mortua est. Sexta die in nocte stratum modicè perminxit,quod minxerat de festucis detrahebatur

Hippocratis Liber VII.

Antipha-
nes.

viscosum, genituræ simile. Vigilabat per omnes dies, post sextam vrina subcruenta. Antiphanis filio hyeme, lateris dexteri dolor, tussis, febris, edebat, deambulabat etiam febriens. Videbatur ruptio facta esse. nona remisit. febris non reliquit. tussis multa. & crassa ac spumosa spuebat. latus dolebat. Circa decimam quartam & rursus vigesimam febres de linere videbatur, & rursus corripiebant. erat autem calor tenuis, & parum quid relinquebat. Tussis quandoque deficiebat, quandoque abundabat, cum multa suffocatione. Tunc verò remittebat. & excreatio post hos dies multa, cum strangulatoria tussi. & purulenta supra vas efferuentia ac spumantia prodibant. & in faucibus plerunque stridula asperitas subbilabat. anhelatio semper detinebat, & spiritus densior. raro bene spirabat. Ultra quadragesimum diem, prope sexagesimum opinor, oculus sinister excacatus est. cum tumore, sine dolore: nec longe postea etiam dexter. & pupillæ valde albæ ac siccæ fiebant. & mortuus est post excacationem. non progressus ultra septem dies, cum stercore ac multa delyratione.

Thessalio
Polemarchos.

Similia & ex similibus eodem tempore contigerunt etiam Thessalioni, feruentia, & spumantia, & purulenta, & tusses, & stridulæ asperitates. Polemarchi vxori hyeme anginosæ tumor sub gutture. febris multa. vena secta est. cessauit strangulatio ex faucibus, febris comitabatur. Circa quintam genu dolor & tumor sinistri, & circa cor dixit sibi videri aliquid colligi. & respirabat velut respirant, hi qui sub aquammersi fuerunt. & ex pectore substrepebat. velut qui concluso ore loquuntur, engastrimythi, quasi ex ventre loquentes appellati. Tale quid contingebat. Circa octauam aut nonam ad noctem alius prorupit, ac liquida multa, aceruata

Aristippus. & graueolentia egeffit. vox interceptiebatur. Mortua est.

Aristippus in supernum ventrem violenter ac grauiter fagittæ ictu petitus est. ventris dolor vehemens. & breui ardebat. deorsum verò nihil egerebat. anxius erat. biliosa abunde colorata quum vomuisset, melius habere videbatur. Paulò post dolores rursus vehementes. & venter similiter ardebat. velut in voluulis. calores & sitis. in septem diebus mor-

Neapolis. tuus est. Neapolis percussus similiter, eadem passus est. acri infuso per clysterem immisso, alius deorsum erupit. color per corpus diffusus est tenuis, pallidus, niger. oculi squallidi, stupore

A pore rigidi, intus conuersi, intente intuentes. Et qui in hep-
par percussus est iaculo, statim color qualis est mortuorum
per corpus diffusus est. oculi caui, anxietas, molestia. Mor-
tuus est prius quàm concio solueretur, in qua die percussus
est. Qui caput percussus est lapide à Macedone supra tem-
pus dextrum, ita vt fissura saltē facta dissectio cōtigisset, ver-
rigine affectus est & cecidit. Tertia die voce destitutus erat.
anxietas. febris nō valde vehemēs. pulsus in temporibus ve-
lut tenuis caloris. nihil audiebat, neq; sapiebat, neq; quiesce-
bat. humiditas circa frontem, & sub nasum, vsque ad men-
tum. Quarta mortuus est. Eniates in Delo iaculo percus- Eniates.
sus est retrosum in latus, iuxta sinistram partem. vlcus qui-

B dem sine dolore. Verum tertia die ventris dolor parvus. nō
egerebat. infuso per clysterem immisso, stercus prodibat, &
dolor deficiebat. sedes extra ad scrotum extabat. quarta die
etiam ad pubem, & totū ventrem, dolor vehementer irru-
bat. quiescere non poterat. biliosa vomuit abunde colorata.
oculi cum virore pallidi, quales in animi deliquiis. Post quin-
tam mortuus est. Erat autem calor quidam tenuis in ipso.

Billo percusso in dorsum, spiritus multus per vulnus cum Billus.
strepitu prodibat, & sanguinem fundebat. Verum deligatus
emplastro cruentis vulneribus cōmodo, sanus euasit. Con-
tigit & infelicissimo Philes filio, denudatione in fronte fa-
cta. nona die febris. Deinde liuefactum est os. mortuus est. Phanias.

Et Phaniae & Euergetæ filio, liuefactis ossibus, & febrici- Euergetes.
C tantibus, cutis ab osse discessit. & pus subtus depascebatur.

His dum perforarentur, ex ipso osse egressa est sanies te-
nuis, serosa, subpallida. graueolens, lethalis. Cōtingit autem
talibus etiā vomitus accedere, & ad finem conuulsionēs: & vt
clangorosam vocem edant, ac impotētes fiant, & si in dextris
fuerit vulnus, in sinistra parte: si verò in sinistris, in dextra.

Theodori filio nona die in sole versato, febris accessit de- Theodo-
rus.
cima die, ex denudatione iuxta os nullius momenti. In fe-
bre verò denudatum est. discessit cutis. multum clangorosus
erat. Vigesima secunda venter eleuatus est maxime circa
præcordia. Vigesima tertia mortuus est. Quibus ossa fracta
fuerint, his septima die febres. Si verò calidus fuerit tem-
pus, etiam citius. At si magis fracta fuerint, etiam euestigio. Exarmo-

Et Exarmodi famulus similiter dolorem habebat ad fe- dus.
mur,

Posidoneon. **Isagoræ.** **Navis rector.** mur, non è directo vulneris. & factus est clangorosus. & colli D erat dolor. Et Posidocreon tertia conuulsio. calor non relinquebat. mortuus est die decimo octauo. Isagoræ filius percussus est retro in caput, confuso osse ac nigrefacto quinta die superstes euasit. os autem non discessit. Magnæ nauis gubernatori anchora digitum medium, & os dextræ manus cōfregit. inflammatio successit. & marcor. & febris. subpurgatus est. quinta calores moderatè remiserunt. itémque dolores. de digito quid decedit. Post septimum diem fanies exhibat leniter. Postea per linguam dixit se non omnia posse enunciare. Prædictio facta est opisthotonum aduentare.

Ad hoc conferebant maxillæ confertæ, & ad collum rigida. Tertia die totus conuellebatur in posteriorem partem, E cum sudore. Sed à prædictione mortuus est. Harpali filius ex liberta Telephane, luxationem infra in pede magni digiti accepti, inflammatus est, & valde dolorosus erat. & ubi repositus est, & dolor remisit, proficiscebatur ad agrum. rediens lumbos doluit. lauit. maxillæ ad noctem conferebantur. & opisthotonus aderat. saliuæ spumosa vix per dentes foras prodibat. Tertia die mortuus est. Thrinon Damonis filius, habebat circa tibiā aut malleo ū vlcus, iuxta neruum iam purum. Huic à pharmaco corrosio cōtigit, vt opisthotono moreretur. Menoni sub arcturum & prius, ex febre æstiuæ, & alui profusio ægrè affecto, & ex itinere de lassato. dolor lateris sinistri & tussis quæ ex destillatione quidē etiam prius aderat, verum tunc valde intenta erat, & vigilabat. & F febrem statim ab initio ægrè ferebat. & erectus sedens tertia die spuebat pallidum. arteria ex stertore subsibilabat. Circa quintam spiritus moderatè densus. pedestibz, extremæ partes plerunque frigida, & extra stragula. alui egestio ab initio fiebat biliosa, neque valde modica, neque multa. septima, octaua, & nona, leuius ferre videbatur, & somni aliquid contingebant. & quæ excreabat crudiora erant. decima, & vsque ad decimam tertiam, alba & pura. & præcordium mollius fiebat. sinistrum tamen distentum. & melius spirabat. Subdita glande moderatè alius subiit. Decima tertia rursus pallidum spuebat. Decima quarta magis. Decima quinta prasinum. Alius autem maleolentia, biliosa, liquida, multa demisit. sinistrum præcordium eleuabatur. Decima

- A** cima sexta autem etiam valde intumuit, & spiritus iam stertorofus, sudor circa frontem & cervicem, raro ad pectus, extremæ partes, & frons, leniter permanebant frigida. Saltatio vero venarum circa tempora detinebat. Somni soporosi noctem ac diem postremo tempore. Urina, ab initio cruda, cineris speciem referens. Circa decimā, & usque ad decimam tertiam tenues, & nō decolores. Verū à decimatertia quales ab initio. Cleochus lateris dolor & febris, remisit febris, Cleochus sudavit per totum corpus. In urina multa erant quæ ferebantur ac innatabant, postea turbata est. Circa Pleiadum occasum Olympiadæ uxorem, foetum octimestrem gestantem, ex casu febris acuta corripuit, lingua aestuosa: sicca, aspera, pallida, oculi pallidi, & corpus mortiferū, foetus corruptus, quinta die facile liberata est, & somnus ut videbatur soporofus, vesperti excitantes non sensit, sternutatorium adhibitum percepit, potionem suscepit & succum, deglutiens potionem aliquantum tussivit, vox non soluebatur, neque ipsa quicquam alleuabatur ex morbo, oculi tristes ac submissi, spiritus sublimis per nasum trahebatur, color praeus, sudor circa pedes, & crura, ubi iam morti propinqua esset, mortua est. Nicolai concubinæ ex febre ardenti, abscessus iuxta horam fiebant ab utraque parte, paulo postea alter, quum iam febris remittere videretur, velut tumor laxus. Circa decimum quartum magni citra signa sedati sunt, recidiva facta est. Color qualis mortuorum, lingua aspera, valde dēsa, subalbida. Siticulosa, alui egestio deorsum multa, liquida, male olens per omne tēpus. Ante finem corruptum est corpus præ multitudine egestionis. Mortua est circa vigesimum diem. Andreæ ante pleiadem horror, febris, vomitus. Ab initio semitertiana apparebat. Verū tertiana erat. Quū rursus in foro versaretur, inhorruit, febris acuta, vomitus bilis meraca, delirium ad noctē quarta rursus melius habebat. Quinta difficulter. Sexta à mercuriali probe egecit alui. Septima difficiliter & sequētibz iam diebus febris magis cōtinēter affigebat, & sine sudore ab initio, & siticulosus. Maximè verò os resicabatur, & potionē nullam libenter admittebat, quum multa iniucūditas circa os esset, lingua sicca, inarticulata, asperitas efflorescebat, cum pallore albicans. Vigil, anxius exolutus, fractus, lingua præ siccitate quādoq; subblasa, donec maderescit

Hippocratis Liber VII.

defecisset, succū maximè admittebat. Nona aut decima cir- D
ca aurem sinistram, atq; etiam alteram, tumores parui citra
signa apparuerunt. Urinæ semper non decolores, verū sine
subidentia. Decimaquarta sudor circa supernas partes non
multus, sed moderatior. Color circa decimā septimam eua-
nuit. Aluus post decimam sicca, citra glandem subditam non
egerens. Circa vigesimā quintā pustulæ per totum corpus
pruriginosæ calidæ, velut igne ambusta. Dolor autē erat cir-
ca locos sub alis, & latera: trāsiuit ad crura citra signa, & de-
siuit. Balneum proderat & vnguenti illitio cum aceto. Mēse
verò secundo aut tertio fortassis, ad ihenes dolor, qui etiam
antea quandoque fuerat, sedatus est. Aristocrati circa sol-
stitium hybernum lassitudo, & horror, & calor. Postea tertia E
die incepit lateris dolor itēmque lumborum, & tumor sub
alis initium sumēs, per totum dextrum latus durus, iubicun-
dus, liuidus, velut ab igne calefactus & iniustus, anxius, omnia
molestè ferens, valde siticulosus, lingua subalbida. Urinæ
non procedebant, crura subfrigida, alui egestio à mercuriali
modica, liquida, subalbida spumosa, ad noctem spiritus ele-
uabatur, sudor circa frontem, partes infernæ frigidæ. collum
inflabatur, tussis non inerat, mortuus est prudens. Onesia-
nacti circa autumnum lippitudo, postea verò febris quarta-
na. Incipiente quartana cibos valde auersabatur, in progres-
su verò libenter accipiebat. Sed & Polichari in quartana,
Polychares
Mnesianax
similia circa cibum accidebant. Mnesianacti alui egestio
ante febrem, & postea, ad multū tempus sequebatur multis
albis mucosis prodeuntibus: & quandoque paucō sanguine,
citra dolorem. Strepitus autem in vētre. Post febrem absces-
sit citra sedem tuberculum durum, quod multo tempore in-
concoctum comitabatur, erupit ad intestinum, & foris fistu-
losum fiebat. Deambulare verò ipso in foro, splendores præ-
oculis obuersabantur, & solem non valde videbat, Quum au-
tem parum discessisset, extra seipsum erat, & collum conuul-
sum est. Postquā autem domum deportatus est, vix suspe-
xit, & ipse vix sui ipsius erat. Primū autem collustrabat cir-
cunstantes, & corpus perfrigeratum est, vix verò recalfectus
est vtriculis & fomentis adhibitis. Postquā autem ipse intra
seipsum esset, & exurgeret, non volebat exire, sed timere di-
xit. Si verò quis de grauibus morbis differeret, subducebat
se præ

- A** sepre timore. Quandoq; etiam caliditatem sibi ad præcordia allabi dixit, & oculorū splendores comitari, & alui egestio multa, & sepe, & similis hyeme cōtingit, facta est venæ sectio, datum est veratrum, bibit lac bubulum, prius autem alininum contulit, & alui egestionem sedauit. Aquæ potus ab initio, deambulationes quoq; & capitis purgationes. **Anecheros.**
- B** ficabat. Quinta loqui nō poterat, sed in principiis nominum hærebat lingua valde, & conuulsio fiebat, & extra sese erat. Quum verò hæc remitterent, lingua vix in suum statum restituebatur. Sexta abstinere ab omnibus, & sorbitione, & potu, & à nulla amplius affectione corripiebatur. **Cleocho.**
- C** nus liuescebat. In tumoribus circa genua ac pedes velut supurationes erant. Tandem verò fieri non poterat, ut staret, aut calcaneis insisteret, sed in lecto decumbebat. Calores manifesti, quandoque cibum auersabatur, non valde siticulosus, neque ad sedem surgebat, anxius, & quandoque etiam pusillanimitas tenebat, veratrum exhibitum est, & capitis purgationes. Ad os pharmacum ex manna thuris, cum aliis ammixtis profuit. Ad vlcera in ore, sorbitio lenticulæ commodata erat. Circa sexagesimam sedati sunt tumores à secundo veratro, dolores tantum ad genua decumbenti venerunt. Humor autem & bilis abscessit ad genua, etiam pluribus diebus ante veratrum. Pisistrato humeri dolor, & grauitas diuturna deambulanti & alias sano, hyeme verò incidit multus lateris dolor, & calor, & tussis, & excreatio sanguinis spumosi, & in

Hippocratis Liber VII.

Simon.

Euxenus.

Polemar-
chus.

Hegesipo-
lis.

& in faucibus stertebat. Verū facile ferebat, & apud seipsum **D**
erat, & calor remisit, simulque & excreatio, & stridula aspe-
ritas, & circa quartam aut quintā diem sanus. Simonis vx-
ri in partu concussæ dolor circa pectus & latus, tussis, febres,
excreationes purulentæ, tabes, ad sex menses febres, & alui
profluvia semper. Ad finem febres cessauerunt, post cessatio-
nem substitit aluus, & post septem dies mortua est. Euxeni
vxo-
rem ex fomentis vt videbatur, calores nullo tempore re-
linquebant, magis tamen ad vesperam augeſcebant, sudores
fiebat per totum corpus. Febre ad augmentū tendente fri-
giditas pedum, quandoq; etiam tibiæ & genuum fiebat,
tussicula sicca ad modicū tempus, febre exacerbata incipien-
te, deinde cessabat. per multum autem tempus etiam totius
corporis rigor fiebat. Sitis exors semper. Vbi medicamētum **E**
bibisset, & serum, magis laſa est. Ab initio omnino sine do-
lore erat, & bene spirabat. Medio verò tēpore lateris dextrī
dolor fiebat, & tussis cōmota est, & anhelatio, & excreatio-
nes parvæ albæ ac subtenues, & horror non ampliùs ex pedi-
bus, sed de collo & dorso, & aluus liquidior, remisit febris cū
multo sudore, & perfrigerata est. Anhelatio verò erat va-
ria, mortua est post remissionē septima die quum esset men-
te prudens. Polemarchi vxor æstate incepit febrire, dimi-
sit autē ipsam febris sexta die, titubans obambulabat, ad no-
ctem calores. Rursus interposito tempore corripuit febris, &
non dimisit tribus ferè mensibus, tussis multa, excreatio pi-
tuitæ. Postquā verò viginti durasset diebus, spiritus sem- **F**
per densus, in pectore strepitus, plerunque sudor, mane febris
mitior, & horrores quandoq; corripiebant, somni fiebant, &
aluus aliquando humectabatur, & rursus restitabat, modera-
tè cibum gustabat. At medio tēpore ad genua & tibias do-
lor, & ad deſcendū ac extendendū alio opus habebat. Per-
seuerabant crurum affectiones vsque ad finem iam propin-
quum & intumuerunt pedes vsq; ad tibias, & ad contactum
dolebat, & sudores ac rigores desierunt. Febris autē semper
intendebatur. Ante obitum aluus erupit, prudens permane-
bat. Tribus ante obitum diebus, in faucibus stertebat, & spi-
ritus reuertebatur. Mortua est. Hegesipolis filiolus quatuor
ferè mensibus dolorem circa vmbilicū corrodentem habe-
bat. Progreſſu tēporis augebatur dolor. Percutiebat ventrē,
vellicab

A vellicabat, calores corripiebant, contabescebat, ossa reliqua erant, pedes tuebant. Testes, venter, partes circa vmbilicū indurata. Num & quibus futurū est vt alius exturbetur? cibū auersabatur, lac solum admittebat recens, & alius liquida erat, & subcruenta sanies subibat, male olens: alius ardebat, mortuus est vbi vomuisset modicū pituitosum, adeo vt quis genituram putasset. Platea filio vbi mortuus esset futura

Plateas.

B res sub obitum contigerunt. Hippia soror hyeme Phrenitica, mente aberrans, manibus negotiū exhibens, lancinans seipsam. Quinta & sexta ad noctem voce destituta, soporosa. inflans in maxillas & labia, velut dormientes, septima mortua est. Osander vbi inhorruit, lateris dolor, & ad genua dolor, itēq; ad femur, vbi comedisset delyrabat, breui mortuus est. Cleotimo futuri aluo liquefacta multo tempore, & calore oborto, iuxta hepar tumor tuberculofus ad inum ventrē descendit, & alius liquida fiebat, & aliud ipsi tuberculum iuxta hepar sursum ad praeordiū, mortuus est. Quibusdam capitis dolor vehemens cum calore: quibusdam quidem ad dimidiam capitis partem, & secundum nares humor quidam detedit tenuis, aut maturus: aut ad aures: aut ad fauces ex capite securius. Quibusdam vero haec sicca. At marcor

Hegectorides.

Hippias.

Osander.

Cleotimus

Similia
hæc aphorismis.

vehemens periculosus est. Si verò affuerit anxiosus, aut biliosus vomitus, aut stupor oculorum, aut vocis interceptio, & raro quid loquitur, aut delyrium, lethalia hæc sunt & conuulsoria. Quicunq; verò ex destillatione dimidiā capitis partē dolent, & humore secundum nares decedente insuper febrierint leniter, in quinta aut sexta perfrigerantur. Eche crates

Eche crates

caco capitis dolor vehemens magis ad posteriorem partem, & colli quo loco connexio est, & ad verticem procedebat. Progrediente tempore & ad aurem sinistram, & dimidia capitis pars dolorosa erat, mucosa semper procedebant leniter combusta, & calor comitabatur tenuia, & cibum auersabatur, in die melius habebat, ad noctem verò dolebat. Postquam autem pus per aurem erupit, cessauerunt omnia, erupit

pit

Hippocratis Liber VII.

pit autē circa hyemem. Num & omnibus suppurationibus, D
& affectionibus circa oculum, dolores ad noctem? Quibus
tusses hyeme maximē austro spirāte crassa & multa excrea-
tibus, febres accedunt: leuiter autem quinta die sedantur.
Tusses verò circa quadragesimā, velut Hegesipoli. Quibus
calores multi quandoq; sedantur, hi non per totum corpus,
sed aut circa cernicem, aut sub alis, aut capite sudantes libe-

Charites.

rantur. Chariti hyeme ex tussicula populariter grassante
febris aduentās, acuta corripuit, stragula reiciebat: sopor cū
dolore. Urinæ erant rubræ velut erui lotura: subsidētia sta-
tim ab initio multa, alba: postea etiam subrubra. Septima à
glande subdita pauca prodierunt: sopor detinuit sine dolore:
humiditas in fronte: somnus ad noctem, & calor mitior, octa E
ua succum admisit: soporosus permāsit vsq; ad vndecimam.

Hac autem die etiam calor maximē cessauit. Postquā verò
tussis erat, excreatio perseuerabat semper multa, facilis, pri-
mū viscosa, alba, crassa, postquam autem concocta esset: si-
milis purulentis. Urinæ ab vndecima die puriores: subsidē-
tia aspera, decimatertia dolor ad dextera, vsq; ad lateris mol-
litudinem, ad imū ventrem. Urina supprimebatur. Potus cal-
lyphylli cōtulit. Decimaquinta rursus dolor, decimasexta ad
noctem magis dolor præcordij incipiebat ad ventrem. Mer-
curialis aqua subduxit. Calor intra vigesimū euauit, & ex-
creationes secutæ sunt crassæ. Melius habuit ad quadragesi-
mum. Subpurgandi sunt ventres in morbis, vbi purganda

matura fuerint: Inferni quidem, vbi confidisse videris, signū E
habes si non anxij fuerint, neque capite grauati: & quum ca-
lores mitissimi, & quum post exacerbationes cessarint. Su-
perni verò, in ipsis exacerbationibus. Tunc enim & hi ele-
uantur, quū anxij, & grauati supernis partibus fuerint, pro-
pterea verò in principiis purgandum non est, quoniam sua
sponte in his temporibus expurgantur. In cubiti processu

Cleogenis
eus.

Demar-
chus.

Aglaote-
les Aesch-
ylus.

Alcmanus.

ex casu fauciato, cubitus marcore corruptus suppuratur, ma-
turatione verò fiēte, viscosa sanies ac glutinosa exprimitur
& breui supprimitur: velut & Cleogenisco, & Demarcho A-
glaotelis filio. Similiter autem & valde ex iisdem pus nullū:
velut Aeschyli filio contigit. At vbi suppuratur plurimis hor-
rores & febres accedunt. Alcmani ex rhenum affectioni-
bus se recolligenti, & sanguine deorsum detracto, sursum ad
hepar

A hepar conuersus est morbus, & ad cor dolor vehemens, & spiritus præ dolore detinebatur, & alius difficulter egerebat parua caprini stercoreis pilulis similia, anxietas non inerat. Verum rigor quandoq; & febris corripiebat, & sudor. & vomitus, & in dolore non conferebat aqua marina per clysterem infusa. Verum furfurum decoctum infusum contulit, A cibo abstinuit ad dies septem, aquam mulsam meraciorem bibit: postea lentis succum, quandoq; verò ex lenticula fresa decoctum. Inde bibit aquam: postea catulum coctum: & mase parum, quæ potissimum diu antea confecta esset, progressu verò temporis, aut ceruices bubulas, aut extremas partes suillas coctas, vnà cum priore aqua potu: quies, tegmen, ad rhenum affectionem infusum per clysterem ex cucumere syluestri.

B *Parmenisci filio* surditas, contulit clysterem auricularium non adhibere. Verum lana expurgare, & solum oleum aut netopum infundere, deambulare, mane surgere, vinum album bibere, oleribus abstinere, pane & piscibus petrositis nutrir. *Aspasij* vxori dentis & maxillæ dolor vehemens. Castorium & piper colluēs, ac in ore tenens, remisit. Et stillicidij vrinæ affectionem ipsi sedauit farina cum rosaceo. *Castorium* pitis dolores ex vtero sedat castorium. Plurimas vteri affectiones flatus faciunt. Signum sunt ructus, & strepitus circa ventrem, & lumborum tumores, & dolores circa rhenes ac coxas. Ad hoc autem confert, aromatum tertiam partē, farinæ duas, in vino odorato albo coquere, & linteolo illita cataplasmatibus modo imponere, qua parte ventris dolores ab vtero affligunt. *Callimedontis* filio contulit ad tuberculum, quod habebat in collo durum, & magnum, & crudum ac dolorosum, venæ brachij sectio: & seminis lini torrefacti cataplasma, vino albo ac oleo subactum ac imbutum, ita vt neq; calidum, neq; valde coctum deligatur, Aut cum aqua mulsâ coquatur fœni Græci, aut ordeï, aut tritici farina. *Melissæ* dro quum gingiua dolore corriperebatur, & vehementer intumesceret, sectio venæ brachij, & alumē Aegyptium in principio sedabat. *Eutychedi* ex cholericiis affectionibus, ad neruorum in cruribus distentionem desinit, vnà cum secessu deorsum. Bilem multam abundè coloratā vomuit ad tres dies ac noctes valde subrubram, sub vomitum bibit, & impotens erat, & anxius. Nihil autem continere poterat. neque ex potibus

Parmeniscus.

Surditatis medela.

Aspasius.

Castorium

Callimedō

Melissæ

Eutychedes.

Bb

tibus

Hippocratis Liber V I I.

Arcuati
morbi me-
dela.
Calligenes

tibus, neq; ex cibis: & vrinae ac transitus deorsum suppressio: D
per vomitus faex mollis prodiit. & deorsum quoq; erupit. Re
gio morbo correpto prodest laborare, sudare, panem edere,
bibere non multum, lauare caput calida multa, sed potius te
pida, vinum album, somno nō multo vti. Calligeni circa vi-
gesimū quintum ætatis annum destillatio, tussis multa, quod
defluebat per vim educebat: nihil infrā persistebat, annos
quatuor perseuerabat. Ab initio calores tenues fiebāt. Vera-
trū non profuit, sed modicus cibus, & cōprimi corpus, edere
panē, bibere vinū nigrum, obsoniorum quorūcunq; esus, ab-
stinentia ab acribus, salis, pinguibus, succo silphij, oleribus
crudis, multa deambulatio. Lactis potus nō contulit, sed sesa-
mū purū, crudū, acetabuli mensura bibere, cum vino molli. E

Timocha-
res.

Timochari hyeme destillatio, maximè in nares, Quū ve-
nere vsus esset, resiccata sunt omnia, lassitudo, calor successit
caput graue, sudor à capite multus, defluebat autē & per to-
tum corpus. Erat autē etiā sanus sudare aduetus: tertia die

Cleomenes

sanatus est. Cleomenis filius hyeme initio facto cibū auer-
sabat, & eius fastidio citra febrem vexabatur: & vomebat
cibos ac pituitam. Duobus autem mensibus cibi fastidium

Cocus.

durabat. Coco in spina gibbositas facta est ex phrenitide.
Huic nulla medicamenti potio contulit, verū vinum ni-
grum, & panis esus, & balneorū abstinentia, & vnctio, & fri-
ctio ab vnctione, & fouere non valde, neque multo fomento,
sed leni. Quibus fluxiones in oculis tenues ac diuturnæ, si
maturæ in nares processerint, profunt. Quibus pregnantibus
ex casu, aut cōuulsione, aut plaga, aut dolores leniter fiūt,
his in tribus diebus manifestum sit, an fœtum corrumpet. F

Pythocles.

Cuidam quæ circa vigesimum ætatis annū biberat vltro
pharmacum adfœtum perdēdum, accidit dolor: vomitus bi-
liosorum, multorum, pallidorum, prasinorum, nigrorum. Quum
bibisset, tertia die conuulsio corripiebat: linguam cōmande-
bat. Ad quartā diē ad ipsam ingressus sum: lingua nigra, ma-
gna, ocolorū albæ partes, erant rubræ: vigilabat: quarta mor-
tua est ad noctem. Pythocles ægrotantibus aquā, & lac mul-
ta aqua ammixta dabat, & renutriebat. Perniones pertun-
dere oportet, & calefacere, ita vt quā maximè excalefacias
igne & aqua. Oculis incōmoda sunt lenticula, fructus po-
morum dulces, & olera. Doloribus circa lumbos, aut coxa,
aut

Aut crura, ex laboribus obortis, aquæ marinæ aceti que calidum fomentum confert, ita ut vel aspergas, vel spōgram his imbutam adhibeas. Deligare verò lanis oportet. Origanum potum, oculis & dentibus malum est. Puella quæ de rupe cecidit, voce destituta, iactatio ipsam tenebat, vomuit ad noctem sanguinem. Quum ad sinistram aurem impegisset, amplius inde fluebat, & aquā mulsam difficulter deglutiebat, stertor habebat. Spiritus densus velut morientium. Venæ circa frōtem intentæ, decubitus supinus, pedes tepidi, febris multa, aliquādo acuta, maximè expauescebat, septima vocem ruit, calores tenuiores erant, superstes euasit. Nisantides humeri dolorem habebat, in æstate obortum ex abscessu, profuit ipsi corpus & humerum in aqua marina madefacere, ad multum tempus, & per tres dies vinum album aquosum bibere, simul ut in aqua marina decumberet, ita ut & in ipsa urina eiiceret. Fullo in Syro phreniticus, quum moueretur cruribus tremulis, corpus velut à culicibus cōpunctum. oculus magnus, motus brevis, vox fracta, sed clara tamen, urina pura subsidentiā non habens. Num propter alui ex thapsia egestionē, decima octaua die morbus remisit, euanescebat citra sudorem? Nicoxenus in Olyntho similiter septima die videbatur à morbo liber esse cū sudore. Sorbitiones assumebat, vinū, botrum ex sole. Decima septima die ingressus sum ad ipsum, lingua ardebat, calor forinsecus non valde fortis, exolutio corporis vehemens, vox fracta, ut operosum esset exaudire, clara tamen, tēpora collapsa, oculi caui, pedes molles ac tepidi iuxta splenem distentio. Infusum per clysterem nō valde suscipiebat, sed resiliebat, prodiit stercus compactum modicū, & aliquid sanguinis, arbitror ab infuso. Urina clara, pura, decubitus supinus, crura diducta ac disparata ob exolutionē, penitus vigil. Intra viginti dies calor euauit. Potus erat aqua de farina crassa in ipsa macerata. Sed & de pomis simulq; mali punici succus, & lentis torrefactæ, & farinæ lotura cocta, frigida, tenuis sorbitio. Superstes euasit.

Fullonum inguina extuberant dura & sine dolore, & circa pubem ac collum similia erant tubercula magna, febris ante diem decimū. Tussi vexabantur à ruptionibus. Tertio mense aut quarto venter colliquiuit. Calores successerunt. lingua sicca, fitis, egestionēs deorsum malignæ mortui sunt.

Hippocratis Liber V I I.

**Cholerica
bilis malū
quī fiat.**

**Phereci-
des.**

Cholerica bilis sursum ac deorsum eruptiones, ex carnis **D**
 esu, maximè suillæ crudioris, & ex cicere, & ebrietate vini
 odorati veteris, & insolatione, & ex sepiis, & locustis, & gam-
 maris: & ex olerum esu, maximè porri & ceparum: Insuper
 & à lactucis coctis, & bralsica, & rumicibus crudioribus: & à
 placentis ac dulciariis & mellitis libis, & à fructibus pomo-
 rū, & cucumere pepone, & vino lactei teporis, & cruo, & po-
 lenta recenti. Cholerica affectiones magis in æstate sunt,
 & febres intermittentes, & quibus horrores accedunt. Hæ
 quandoque malignæ fiunt, & ad morbos acutos perueniunt.
 Verum cauere oportet. Iudicat autē tales morbos maximè
 quinta & septima & nona dies. Melius tamen est cauere vsq;
 ad decimamquartam. Pherecydæ post solstitiū hybernum, **E**
 noctu lateris dextri dolor etiam prius fieri solitus cessauit.
 pransus est, & egressus horruit, febris ad noctem, doloris ex-
 ors, tussicula quædā sicca. Vrina non multa, subidentia mul-
 ta. Ab initio ramentosa, glabra, diuulsa: post dies quatuor tur-
 bulenta, subsidebant, & vrina non decolor, subidentiam ha-
 bens, & collectio nō apparebat in matula, vbi perfriguisset.
 Tertia die alius sua sponte egeffit. Quarta subdita glande
 stercoracea & biliosa prodierunt, fluxus erat liquidus. Som-
 nus ad noctem non valde. Verum interdiu aliquantum dor-
 miebat. Sitis non vehemens. Quarta ad noctem maximè cu-
 tis circa frontem, & reliquum corpus mollis, semper super-
 excedens, febris vincebatur ad manū, & sub ea humescebat,
 pulsus in fronte valde obscurus, venarum grauitas in cōuer- **F**
 sionibus, & in omnibus egestionibus ad modicum tempus
 semper doloris exors, ab initio anxius, & paulatim vomebat.
 Septima à glande subdita, egeffit ter biliosum ac stercora-
 ceum, liquidum valde ac pallidum & iam aliquantū delyra-
 bat, & humiditas modicè quandoq; circa frontē, stragula in
 faciem ducebat, oculos frustra velut si quis videret contrahe-
 bat, & rursus nictabat, & stragula reiciebat. Nona die sudor
 mane obortus ad pectus perseuerabat donec moreretur, &
 febris, & delyratio augescebat. Circa frontem sudor pluri-
 mus graucolens, color valde albus, cutis sub pilis interpun-
 cta, præcordium dextrum eleuatum, demisit à seipso biliosa.
 Octaua apparebant velut culicū morsus, ante mortē tussien-
 do reiecit velut ex mucō fungos, cōpacta quædā, alba pituita
 circun

A circundata. Excrearat autē & antea parua, alba, lactea, post
cenā in somno horruit, mane surrexit, capite grauatus hor-
ruit, vomuit, capite grauabatur, ad noctem remisit, vsque ad
meridiem leniter horruit, rursus noctem grauiter tulit. Se-
quenti die febris acuta, capitis torpor, vomitus multæ bilis,
quæ plurima prasina erat, cessauerunt omnia, somnus ad no-
ctē, mane perfrigerabatur, sudor & humiditas per plurimā
corporis partem, iuxta splenem manu indicabat ad modicū
tempus collectionē doloris exortem, statim euauit, ad no-
ctem vigil. circa fori tempus exacerbabatur febris. anxietas,
vertigo, tormen, capitis dolor, vomitus prasinus, leuis, visco-
sus velut pituita, circa solis occasum cessauerunt omnia, su-
B dor capitis, colli, post vomitum egeffit per aluum stercora-
cea, liquida, biliosa, neque nigra, neque inconuenientia. No-
ctem moderatē habebat, itēque sequentē diem, ad noctem
rursus vigil. Vomitus mane similiter & sequenti die, citra an-
xietatē, dolores capitis post sudorē cessarunt, ad vespērā om-
nia remiserūt. Nona non amplius vomuit, magis calefactus
est. Reliquis nō videbatur febrire. Venæ in tēporibus salie-
bāt, doloris omnino exors, sitis semper erat. Nona quū ad sel-
lā surrexisset valde animo linquebatur, à glāde subdita egef-
sit ramenta nigra & biliosa colore, quātū stercoracei destil-
labat, vox fracta, in cōuersionib. grauis, oculi caui, cutis fron-
tis circumtensa, alioqui bene spirabat, moderatus erat, ad pa-
rietem plerunq; conuersus, flexibilis in decubitu, incuruatus
C quiescens, lingua alba, leuis. Circa decimā & postea, urinae ru-
bræ in circuitu, in medio exiguū quid albū. Duodecima ad
glandē subditā, similia destillabāt biliosa & ramentosa, post
glādē animi deliquit, postea os resiccabatur. Colluebat sem-
per, & si non valde frigida esset aqua, calidā esse dicebat, ni-
uē leniter gustabat, sitis nō inerat, stragula semper de pecto-
re repellebat. Chlamydem calefieri nō sinebat, ignis procul,
isq; paruus, vtriusq; maxillæ rubor, postea lingua inarticula-
ta, recalescebat vnum aut duos dies, cessauit. Androphani **Androphana**
voci interceptio, ignorātia, delyrium. His sedatis supererat **nes.**
multis annis, & recidiuæ fiebāt, lingua permanebat per totū
tempus sicca, & si collutione non vteretur, loqui nō poterat,
& plerunque erat valde amara. Aliquando etiā dolor ad cor.
Venæ sectio soluit hæc, aquæ potus, aqua mulsa. Veratrū quo-
que

Hippocratis Liber V I I.

que bibit nigrū, biliosum nō prodibat, sed modicum. Tandē **D**
hyeme decubuit, & extra se positus mente motus est, & lin-
guæ affectiōes similes, calor tenuis, lingua decolor. Vox pe-
ripneumonica, de pectore stragula reiiciebat, & se educi iu-
hebat. velut micturū, quum nihil clare loqui posset, neq; a-
pud seipsum esset, educebāt ipsum, ad noctē mortu' est, duo-
bus aut tribus diebus decubuit. Nicanoris affectio erat, quū
Nicanor. ad cōuiuium progredetur timor tibicinæ: quū sub initiū
vocis tibicæ, in conuiuiο tibia canere audiuisset, præ timori-
bus turbationes, vix se sufferre posse dixit, quū nox esset. In-
terdiu verò audiens nihil cōmouebatur, & hæc multo tem-
pore ipsum comitabantur. Damocles qui cū illo erat, cacu-
Damocles. tire, & corpore exoluto esse sibi videbatur, & sanè præruptū
locum non accessisset, neq; trans pontē, aut minimæ altitu-
dinis scrobem, ausus fuisset trāsgredi, præ timore ne caderet
sed per ipsum scrobem ibat. hoc ad tempus quoddā ipsi ade-
rat. Phœnicis affectio erat, ex oculo dextro plerunq; velut
Phœnix. fulgur elucere putabat. Vbi verò nō diu ipsum clausisset, do-
lor ad tempus dextrū vehemens oriebatur, postea etiā ad to-
rū caput, & collū, caput intumescibat retro ad verticula, &
distentio ac duritia erat circum tendines. Si itaq; conaretur
cōmouere caput, aut aperire dentes, nō poterat, vtpote valde
distentus. Vomitus si quādo oborti essent, relatos dolores a-
uertebāt, ac mitiores faciebāt, & venæ sectio profuit, & vera-
trum duxit omnigena, & nō minimè prasina. Parmenisco
Parmeniscus. etiā prius incidebāt tristitia, & desiderium excedendi ē vita. **P**
Olynthus. quādoq; verò rursus latus erat. At in Olyntho aliquādo au-
tumni tempore, vocē priuatus decumbebat, quietē agens, ita
vt parū saltē loqui conaretur, ac inciperet. Immo etiā si quid
loquutus esset, rursus voce destituebatur, somni aderāt, quā-
doq; verò vigiliæ: & iactatio cum silentio, & anxietas, & ma-
nus ad præcordia velut dolenti. Aliquando auersus iacebat
quietē agēs, febris perpetuò, & facilè spirabat. Postea dixit se
cognoscere ingressos. Bibere quādoq; tota die ac nocte, etiā
si potus exhiberetur, nō volebat: quādoq; verò vrina derepen-
te correpta, omnem aquā ebibebat. Vrina crassa velut iumē-
Conon. ti. Circa decimam quartam remisit. Cononis seruā ex dolore
capitis incipiēte, extra se mēte mota erat, & clamor, & que-
relæ multæ, rarò autem quies. Circa quadragesimum diem
mortua

- A** mortua est. Decem verò diebus ante mortem, voce destituta & cōuulsa fuit. Timocharis seruus ex atrabiliariis esse quū **Timochares.** putaretur à tot ac talibus viris, mortuus est similiter circa eosdem dies. Nicolai filius circa solstitiū hybernū ex potationibus horruit. ad noctem febres. postridie vomitus biliosus, merus, modicus. Tertia die quum cōcio adhuc fori plena esset, sudor totius corporis cessauit. & statim rursus calefactus est. vomitus similis. Quarta ab aqua mercurialis egestit stercoracea & liquida. Vrina cineris specie, qualis est aqua mercurialis, nō dissimilis. subsidētia non erat, neq; vrina multa, pauca quādā in medio vehebantur innatātia. dolores præcordij sinistri & lumborū. Putabat se ex vomitu in-
- B** super respirare, & insuper respirabat, quandoq; dupla respiratione. lingua alba, habens ex dextra parte cōcretionē adnatam instar lupini. Parum siticulosus erat. vigil. prudēs. Sexta dexter oculus maior dum videret. Septima mortuus est. Verum alius ante mortem eleuata fuit. & mortuo posteriores **Meton.** partes rubefactæ sunt. Metoni circa pleiadum occasum febris. lateris sinistri dolor vsq; ad clauiculā, atq; is adeò vehemens vt quiescere non posset. & inflāmatio tenebat. alui egestio multa, biliosa. In tribus ferè diebus cessauit dolor. Calor autē circa septimum aut nonū. Tussis inerat. excreationes neq; biliosæ, neq; multæ fiebant, verum pituitosæ. tussis comitabantur. cibos gustabat. quādoque velut sanus exhibat. Corripiebant autē aliquando calores tenues modico tēpore.
- C** sudores fiebant ad noctē. Spiritus in calore densior. maxillarum rubor. circa latus grauitas, & sub alas, & ad humerum, tussis tenebant. medicamentum per superna eduxit biliosa. Tertia à medicamento erupit pus, verū ab initio morbi quadragesima. repurgabatur circa trigintaquinq; alios dies, & sanus euasit. Vxori Theotimi in semitertiana anxietas, **Theotimi, vxor.** & vomitus, & simul horror incipiente febre. & sitis. progrediente tēpore incipiēte febre calor ingens. Vbi aquam multam bibisset, & vomuisset, & horror, & anxietas sedata sunt. & mali punici succum postea accepit. Diopithis sorori in **Diopithes.** semitertiana, cordis dolor grauis circa accessiōē, & comitabatur is totā diem. & huiusmodi cordis siue oris ventriculi dolor etiā aliis similiter aderat. Veruntamen sub pleiadis **Apomorus.** occasum viristalia rariora fiebant. Vxori Apomoti in se-

Hippocratis Liber VII.

**Terpidas.
Doriscus.**

mitertiana circa arcturum, vehemens cordis dolor circa ac- D
cessione. & vomitus. & strangulationes ab utero simul in-
stabant, & ad dorsum dolores iuxta spinā. Quum autē huc
ipfi peruenirent, cordis dolores cessabant. Terpida matri à
Dorisco, quum abortus factus esset mense quinto gemello-
rum, ex casu, ab altero quidē statim, velut in tunica quadā li-
berata est. ab altero vero prius aut posterius quadraginta
diebus. Postea autē concepit in ventre. At anno dolores ve-
hementes circa ventrē ad multū tempus, quandoq; incipie-
bant ex collo ac spina, confidebant autē ad imum ventrem
& inguina: quandoq; ex genu dextro, confidebant autem ad
eundem locū. Et quum quidē iuxta ventrem dolores essent,

Cleomenes.

alius eleuabatur, quum verò sedarentur, cordis dolor coin- E
cidebat. Verum strangulationes nō aderant. Sed frigiditas
corporis, velut in aqua iacētis. Tempore quo dolor fiebat,
per totum corpus dolores spargebantur, mitiores his qui ab
initio erāt. allium, silphiū, acria omnia nō cōferebant, neque
dulcia, neq; acida: neque vina alba. Verū nigra, & balnea
rara. Ab initio quoq; vomitus vehemētes fiebant, & ciborum
exclusiones. & circa dolores menses non apparebant. Cleo-
menis vxori circa fauonij flatus, ex nausea & lassitudine, la-
teris sinistri dolor, ex collo ac humero auspicatus. febris &
horror, & sudor. Inccepit autem febris, & non desit, sed au-
gescebat. & dolor vehemēs. tussis. excreatio subcruenta, pal-
lida, multa. lingua alba. alui egestionēs moderatæ, liquidæ.
vrinæ biliosæ. Quarta ad noctē menses prodierunt multi. ces- F

**Epichar-
mus.**

**Polemar-
chus.**

fauit & tussis, & excreatio, & dolor. calor autem tenuis. Epi-
charmi vxori ante partum dysenteria. dolor. alui egestionēs
subcruentæ, mucosæ. Vbi peperisset, statim sana erat. Pole-
marchi vxori in morbo articulari coxæ dolor derepente,
mensibus nō prodeuntibus. Vbi betæ succū bibisset, vox sup-
primebatur per noctem, & vsq; ad meridiem. attamē audie-
bat, & sapiebat, & manu significabat, dolorē esse circa coxā.

Clinias.

Cliniæ sorori seniori vomitus, quicquid acceperat per qua-
tuordecim dies, citra febrem. cruentorū vomitionum reie-
ctiones. & cōtracta strangulatio ad cor procedebat. Castoriū,
feseli, mali punici succus. sedauerunt omnia, abscessit autem
dolor moderatus ad lateris mollitudinem bulbi succus, &
vinum lactei teporis, austerū. & panes quā paucissimi cum
oleo.

- A** oleo. Pausaniae filiam ex fungi crudi esu, anxietas. strangu- **Pausanias.**
latio. dolor vētris. Aquam mulsam calidā bibere ac vomere
profuit. & balneum. In balneo fungum euomit. & vbi illa
cessatura essent, exsudauit. Epicharmo circa pleiadum oc- **Epichar-**
casum, humeri dolor, & grauitas vehemēs ad brachium. an- **mus.**
xietas. vomitus multi. aquae potus. Euphranoris filio pustu- **Euphra-**
lae velut à culicum morfu. Post fauonium siccitates fiebāt, **nor.**
vsque ad æquinoctiū autumnale. Sub canem, æstus vehemen-
tes, & venti calidi, & febres sudorificæ. & statim aliquantum
recalescebant. Tubercula verò iuxta aurem multis fiebant.
Aniculæ à tussi vexatæ circa nonā diem. Adolescenti spleni-
co ancillæ filio, aluo liquefacta, circa idē tempus. Ctesiphon- **Ctesiphon-**
B ti sub arcturum, ferè circa septimā. Adolescenti solū suppu-
rata sunt. Eratylli filio euauerunt. Circa vtraque tempora, nullæ exudationes. lingua præ siccitate blæsi. Recti venti **Eratyllus.**
spirauerunt multi ac frigidi. & niues ex clemēti cœlo quan-
doque fiebant, & post æquinoctium, austrina aquilonaribus
permixta. aquae multæ. populariter grassatæ sunt tussiles mul-
tæ, magis autem in pueros. Circa aures multis talia, qualia
Satyri habēt. Quandoq; verò ante hoc tempus hyems valde
hyberna erat, cū niue & pluuiis aquilonaribus. Timonactis **Timonax.**
filio fermè bimestri pustulæ in cruribus, & in coxis, & lum-
bis ac imo ventre. & tumores valde rubicundi. His autē se-
datis, conuulsiones & comitiales fiebant, sine febribus, mul-
tis diebus. & mortuus est. Polemarchi filio contigit qui- **Polemarchus.**
C dem vt priore tempore suppuratus esset, & exscrearet. post-
ea vero calores ipsi erant. & hydropicus erat, & splenicus, &
anhelosus. ad locum accliuem si quādo accederet, impotēs, &
siticulosus. quādoq; etiam cibum leniter auersabatur, & sic-
cæ tussiculæ ad multū tempus ita fiebant, titubans obambu-
labat. & si nō facile solubilis esset aluus deorsum, plena red-
debatur. & anhelatio ac strangulatio magis fiebāt. Tandem
autem defluxus & exscreatio superuenit, ac tussis. Exscrea-
tio crassa, pallida, purulenta, & febris vehemens cessasse vi-
debatur. & tussis mitior. & exscreatio pura. Rediit rursus fe-
bris acuta. spiritus densus. mortuus est. Verū antea rigue-
runt pedes, & postea perfrigeratus est. Spiritus magis inter-
clusus est. Vrina substitit. extreme partes perfrigeratæ sunt.
prudens mortuus est, tertia die à recidiua. Thyni filio in **Thynus.**
Febre

Hippocratis Liber VII.

febre ardente inedia macerato, alui egestio multa. Verum cum bile, & animi deliquio. & sudore multo fiebat. perfrigeratus est valde. voce destitutus erat totam diem ac noctem. Instillatum ptisanæ succum continuit. sapiebat. bene spirabat.

Epicharmus.

Epicharmi filio accidit ex via & potu cruditas. Postridie mane anxietate oborta, ubi aquam, acetum, salem bibisset, euomuit pituitam. Postea rigor apprehendit. lauit febricitans.

Ariston.

Pectus dolebat. Tertia mane statim sopor modico tempore tenebat, & delirabat. & febris acuta. grauiter morbum tulit.

Polyphantus.

Quarta vigil. mortuus est. Aristoni ulcerato pedis digito, cum febre loquelæ obscuritas. Carcinoma ascendit usque ad genu. periit. Erat autem nigrum, subaridum, graueolens. Cui carcinoma in faucibus visum est, sanus euasit à nobis. Polyphantus in Abderis caput dolebat in febre vehementi. Urinæ tenues, multæ. Subsidentia densæ & conturbata. Quum autem non cessaret dolor capitis, sternutatoria decima die adhibita sunt. Postea ad collum dolor vehemens. Urina prodiiit rubicunda conturbata velut iumentum. mente motus est phrenitico modo. Mortuus est in vehementibus conuulsionibus.

Eualcides.

Consimiliter etiam Eualcidæ famula, quum multo tempore densæ urinæ prodiiissent, & capitis dolores adessent, phrenitica facta mortua est, eodem modo ex vehementibus doloribus. Nam urinæ densæ ac conturbata, certum signum sunt doloris capitis, & conuulsionis, ac mortis.

Halicarnassensis.

Halicarnassensis qui in domo Xanthippi diuersabatur, aurem hyeme dolebat, & caput non mediocriter. Erat autem annorum circiter quin-

Metrodorus.

quaginta. Vena secta est iuxta Mnesimachum. læsum est caput euacuatum, ac perfrigeratum. Non enim facta est suppuration. Phreniticus factus est, & mortuus. Urinæ erant & huic densæ. In Cardia Metrodori filio ex dentium dolore corruptio maxillæ, & gingiuarum vehemens carnis excrecentia.

Anaxenor.

mediocriter suppuration facta est. exciderunt dentes molares, & maxilla. Anaxenor in Abderis, erat quidem splenicus, & viciati coloris. Contigit autem ipsi ut tumor circa femur sinistrum obortus, derepente euanesceret. Non multis vero postea diebus oborta est ipsi circa splenem velut pustula nocturna ab initio, insuperque tumor ac rubor durus. Post diem quartum febris ardens oborta est. & liuefacta sunt omnia circumcirca, & putrida videbantur. mortuus est. Verum prius

- A** prius subpurgatus est, & intelligentiam habebat. Clonigus in Abderis, erat quidem nephriticus, mingebat autē sanguinem paulatim plerunq; difficulter. Vexabat etiam aluus dysenterica. Huic mane quidē dabatur lac caprinum, & aquæ quinta pars, ita ut ex ambobus compositum totū essent heminae tres. Ad vesperam autem, panis valde assatus, obsonia, beta aut cucumis. Vinum nigrum tenue. Dabatur etiā cucumis pepo. Hac verò victus ratione quum vteretur, & aluus substitit, & vrinae purae prodibāt. Bibit autem lac donec vrinae restitutae sunt. Mulieri in Abderis carcinoma factū est circa pectus, erat autem tale, per papillam sanies subcruenta fluebat. intercepta autem fluxione, mortua est. Dinij filio in Abderis vmbilicum mediocriter sauciato, fistula parua relicta est. & quandoq; etiam lumbricus per seipsum satis crassus penetrauit. & quum febriret, vomebat biliosa, quādoque verò & hæc ipsa per fistulā prodibant. Allapsum est & intestinum ipsi ad fistulam, & velut fistula corrodebatur, & rursus refringebatur. & tusses permanere prohibebant. Pythonis filio in Pella febris statim incēpit multa. & in somnum collapsio. & cum vocis interceptione somni fiebant. & aluus dura per omne tempus. At glāde ex felle subdita, multa egerebat, & statim remittebat. Verū breui aluus rursus eleuabatur. & febris exacerbabatur. & collapsio in somnum per eadem. Quum autē idem ductus esset, datum est medicamentum quoddā ex his quæ cnico, & cucumere syluestri, & peplo constant. & biliosa egestio erupit. & statim sopor sedatus est. & febris mitigabatur. & omnia leuiora facta sunt. & iudicatus est in die decimaquarta. Eudemus splenem vehementer dolebat. imperarunt ipsi medici ut multum ederet, & vinum biberet modicum, tenue, & multum deambulare. nō mutatum est quicquam. Vena secta est, cibos ac potus parçē sumpsit, deambulationes fecit sensim augmēto facto. Vinum bibit nigrū, tenue. sanatus est. Philistidi Heraclidæ vxori cōepit febris acuta. rubor. faciei, ex nulla manifesta causa. paulo post in die rigorem habuit. quum non recalesceret, conuulsio facta est in digitis manuum ac pedū. paulo post recalescēta est. minxit vrinas compactis quibusdā innatātibus, nubeculosas, diuulsas. noctē dormiuit. Secūda die rursus riguit. paulo magis calefacta est. & rubor minor. & conuul

Clonigus.

Mulier
Abderita-
na.
Dinius.Python.
Pella.

Eudemus.

Philistides.

cōuulsiones fiebāt moderatiores. Vrinæ cōsimiles, noctē dor-
 miuit, parū vigilauit, quū nulla molestia premeretur. Tertia
 die minxit coloratiora, modicā subsidentiā habentia, eadem
 hora rigor apprehēdit. Febris acuta, sudor ad noctē per totū
 corpus. Verūm vesperi color ad morbi regij modū permuta-
 tus est, noctu dormiuit, ac per totum corpus sudauit. Quarta
 sanguis ex sinistra nare probè fluxit, & mēses pauci cōparue-
 runt ordinatē. Rursus autē eadē hora febris exacerbatā est.
 Vrinæ compactis quibusdā innatantibus paucae. Alius natu-
 ra quidem dura, verū multo magis substitit, neq; quicquam
 prodibat, si non glandem subdidisset, noctē dormiuit. Quin-
 ta febris mitior, & ad vesperam per totū corpus sudabat, &
 mēses prodierūt, & noctē dormiuit. Sexta minxit acernatam
 multam vrinā, compactis quibusdam innatātibus, modicam
 subsidentiā habentem, concolorē. Circa meridiem verò pa-
 rum rigore tenebatur, aliquantum incaluit, sudauit per to-
 tum, noctem dormiuit. Supina parum calefacta est, facilē tu-
 lit, sudauit per totum, vrinæ boni coloris. Iudicata sunt om-
 nia. Tychon in obsidione circa Datum, iētus est catapulta
 in pectus, & paulo post risus erat circa ipsum tumultuosus.
 Videbatur autē mihi medicus eximens lignū, reliquisse fer-
 rum in septo trāsuerso, & quū ipsi ita videretur, ad vesperam
 infusum per clysterē adhibuit, & pharmacū deorsum purgās
 dedit. Noctē primā transegit. Statim verò vbi dies illuxisset,
 & medico, & aliis melius habere videbatur, erat enim quie-
 tus. Prædictio facta est, quòd vbi conuulsio fieret, non tardè
 moriturus esset. Sequentē noctem molestē ferens, in somnis
 plerunq; in ventrem decūbens. Tertia mane conuellebatur.
 Circa meridiem mortuus est. Eunuchus ex venatione & di-
 scursu hydropicus factus est. Quidam circa Elealcis fontē, ad
 sex annos habuit ex equitatione inguinū tumorem, varices,
 & coxendicū dolores. Qui lateris mollitudine tabuit, septi-
 ma die mortuus est. Præpotent crudi salsa cum melle. Scor-
 ratio turpis, dysenteria medela est. Leonidæ filia natura
 concitata, auersa est: auersa, in iram excanduit: vbi ira excan-
 duit, reconciliata est. Medicus non intellexit, puella mortua
 est. Philotimi filius puber venit, ad me in Iechina, caluariæ
 os habens medicina destitutum: in quo videbam occultas ra-
 tiocinationes non esse constantes.

Tychon.
 Cur hic re-
 petatur, nō
 video.

Eunuchus.
 Elealcis
 fons.

Leonides.

Philoti-
 mus.

HIPP.

AHIPPOCRATIS

COI LIBER DE VICTVS

RATIONE IN MORBIS ACV-

TIS, IANO CORNA-

RIOMEDICOPHY-

SICO INTER-

PRETE.

B Priscorum medicorum tres fuisse familias ~~inquit~~ Galenus libro primo de Curandi via & ratione. Vna eorum fuit medicorum, qui Cum insulam incolebant, quorum fuit princeps Hippocrates. Alia Rhodiorum. Tertia secte auctores Cnidij vocabantur à Cnido insula, vna ex quinque Cycladibus. Horum placita Hippocrates, loco Cnidias sententias vocat.



Vi Cnidias appellatas sententias conscripserunt, rectè quidem scripserunt ea quæ patiuntur agroti in singulis morbis, & quomodo quædam ipsorum euenerunt: & hactenus quidem etiam qui medicus non sit, rectè conscribere possit, si probe ex singulis agròtis quæ patiuntur didicisset. Quæ verò medicum ante discere oportet, agrotò non referente, horum pleraque omissa sunt, alia in aliis, & quædam valde commoda ad coniecturam. Quum autem ad coniecturam dicatur, quomodo singula curare oporteat, in his multa aliter sentio quàm velut illi prodiderunt. Et non solum ob hoc non laudo. Verùm quòd etiam paucis numero vsi sunt medicamentis. Nam exceptis morbis acutis, plurima ab ipsis relata sunt pharmaca alium deorsum purgantia exhibenda, & serum ac lac pro tempore. Si quidem igitur hæc bona essent, & morbis conuenientia, in quibus exhibenda esse monuerunt: longè magis laudanda essent, eo quòd quum pauca sint sufficiunt. Nunc verò res non ita habet. Qui tamen postea eam tractationem repetiuerunt, magis sanè medico modo, de his quæ singulis exhibenda sunt, transegerunt. At neque veter

Hippocratis Liber De victus

veteres quicquam memorabile de victus ratione conscripse-
 runt, & quanquam magna hæc res sit, eam omiserunt: at-
 tamen multos in singulis morbis modos, multiplicemque ipso-
 rum diuisionem non ignorarunt aliqui. Caterum nume-
 ros singulorum morborum clarè pronuciare volentes, non
 rectè scripserunt. Non enim facile sit enumerare, si ex eo
 quis ægrotatium morbum æstimet, quod alter ab altero ali-
 qua re differt: & ideo non putet eundem morbum esse, si non
 idem nomen habeat. Mihi verò placet, vt in vniuersa arte
 mentem adhibeamus. Nam quæcunque opera bene ac rectè
 tractat, ea singula bene ac rectè facere oportet: & quæ cito,
 cito: & quæ purè, purè: & quæ citra dolorè tractare oportet,
 ita facere vt quàm minimus dolor sentiat: & alia omnia
 eiusmodi insigniter præ aliis ad meliorè modum transigere
 oportet. Maximè verò laudauerim medicum qui in acutis mor-
 bis, qui plurimos homines occidunt, præ aliis insigniter ad
 meliorem partem excellat. Sunt autem hi acuti, quos veteres
 nominauerunt pleuritidem, peripneumoniã, phrenitidem,
 & febrem ardentem, & alij morbi qui ex his hærent, quorū
 febres omnino continuæ sunt, & occidunt. Quum enim non
 pestilentis morbi modus quis cõmunis grassatus fuerit, sed
 sparsi fuerint morbi, & nō similes ab his morbis plures mo-
 riuntur, quàm ab aliis omnibus. Idioræ igitur non valde co-
 gnoscunt eos qui in his, aliis præstant: aliarumq; curationum
 magis aut laudatores, aut vituperatores existunt. Et profectò
 magnum signū hoc est, quòd populares minimè de his mor-
 bis intelligentiã habeant, veluti quos studio consequi oportet.
 Nam qui medici non sunt, medici esse videntur, maximè
 propter hos morbos. Facile est enim nomina ediscere, quæ
 proferri solent apud agros his morbis affectos, si enim quis
 ptisanæ succum nominarit, & vinum tale, aut tale, aut etiam
 aquam mulsam, omnia hæc eadem plebeiis hominibus, &
 meliores, & deteriores medici dicere videntur. At res hæc nō
 ita se habet, sed in his sanè vel maximè alij ab aliis differunt.
 Videntur autē mihi digna esse quæ scribantur maximè hæc
 quæ ignorantur à medicis, maximè scitu cõmoda, & quæ ma-
 gnas vtilitates, aut magna detrimenta afferunt. Quæ itaque
 ignorantur hæc sunt. Cur nam in acutis morbis, aliqui medi-
 ci omne æuum terunt, ptisanas non colatas exhibentes, & re-
 ctè se

Acuti mor-
 bi qui.

A cte se medicari putant. Aliqui verò plurimi faciunt, ut nullū ordeum ager deuoret. Magnum enim detrimentum afferre arbitrantur. Verum per linteum excolantes succū exhibent. Quidam verò ipsorum neque ptisanam crassam dederint. neque succum: atque hi partim donec ad septimū diem ager perueniat, partim verò perpetuò, donec iudicatus fuerit morbus. Sanè huiusmodi quæstiones ne proponere quidē medici consueuerunt: fortassis autem neque si proponantur, compariantur. Proinde calumniam incurrit tota ars apud vulgus adeò magnam, ut neque omnino medicinam esse putent. Nā in acutis morbis intantunt inter se differunt artifices, ut quæ alter exhibet optima esse putans: ea alter iam mala esse existimet: & ferè ob id artem vaticinationi similem esse dixerint. Quia vates eandem auem, si sinistra appareat, bonā esse ducunt: si dextra, malam. Et in aruspicina talia sunt, alia in aliis. Verum aliqui vates contraria his dicunt. Assero autem hanc speculationem pulcherrimam esse, & cognatā plurimis ac maximè cōmodis in arte. Nam agrotantibus omnibus plurimum ad sanitatē confert, & sanis ad securitatem, & his qui se exercent, ad bonum habitum, & ad quod quisque voluerit.

Ptisana igitur rectè omnibus frumentaceis eduliis prælata esse videtur, in morbis acutis, & laudo sanè eos qui ipsam prætulerunt. Nam viscolitas ipsius levis est, & continua, & iucunda, & lubrica, & moderatè humida, & sitim eximit, & facile eluitur: si fortè & hoc opus sit: & neque adstrictionem habet, neque malam turbationem, neque in ventre intumescit. Intumuit enim in coctura quā maximè tumesceri solet. Quicunque igitur ptisana in hisce morbis vtuntur, nulla die vasa vacua fieri permittant, ut ita dicam, leuantur, & non intermittant, si non aut ob medicamenti, aut infusi per clysterē vsum, intermittere oporteat. Et qui quidē bis in die cibum capere soliti sunt, eis bis dāda est: qui verò semel edere consueuerunt, his semel primo die danda est. Verum sensim progressu facto, si fieri poterit, etiam his bis detur, si sanè opus habere visum fuerit. At verò copia sufficit ab initio dare non multa, neq; minus crassam: sed ut consuetudinis gratia quid ingeratur, & ut ne multa vasorum vacuatio fiat. Ceterum quod ad augmentum copię sorbitionis attinet, si quidem sicciior fuerit morbus, quā m quis putarit, nō ita magna copia

Artificum
differentia.

Vnde Alii

Vtuntur

Ptisana
laus.Ptisana
quādo ex-
hibenda.

Hippocratis Liber De victus

copia dare oportet, sed ante sorbitionē, aut aquam mulsam, D
 aut vinum præbibendum exhibere, vtrum ex his conuenien-
 tius fuerit. Vtrum verò conueniat, in singulis modis refere-
 tur. Si verò os humectetur, & à pulmone prodeuntia qualia
 oportet fuerint, sorbitionis copiam, vt in summa dicam, au-
 gere oportet. Quæ enim citius & magis humectantur, cele-
 ritatem iudicationis significant. Quæ verò tardius & minus
 tardiozem iudicationem significant. Et hæc quidem per se ta-
 lia omnino existunt. Verum multa quoque alia commoda o-
 mittuntur, ex quibus coniecturas facere oportet, quæ postea
 referetur: & quanto copiosior purgatio fuerit, tanto plus da-
 re oportet, vsq; ad iudicationem, maximè duobus à iudica-
 tione diebus, quibus sanè quinta, aut septima, aut nona iudi- E
 care videtur: ita vt etià parium ac imparium dierum ratio-
 nem habeas. Postea verò sorbitione quidem mane vtendum
 est. Vesperè verò ad cibos transeundum. Conueniunt autem
 talia vt plurimum his qui statim tota ptisana vtuntur. Nam
 & dolores in pleuriticis statim sua spote cessant, vbi memo-
 rabile quid spueri ac expurgari cœperint: & purgationes to-
 ge perfectiores sunt, & minus suppurati fiunt, quàm si quis ali-
 ter victum suppeditet: & iudicationes simpliciores, & me-
 lius iudicantes, & minus reuertetes. Ptisanam porrò ex opti-
 mo hordeo factam esse oportet, & quàm optimè coctam, &
 præsertim si non solo succo vti velis. Nam vnà cum reliqua
 ptisanæ virtute, lubricitas facit, vt ordeum dum deglutitur
 non lædat. Nusquam enim adhæret, neque secundum thora F
 cis rectitudinē mora trahit. Lubricissima autem est, & ma-
 ximè sitim eximit, & facillimè concoquitur, & debilissima
 est, quæ optimè cocta est, quibus omnibus opus est. Si quidem
 igitur non opem tulerit quis quantum opus est, vt sufficiens
 uterummodi ptisanæ sorbitionis modus, multis modis læde-
 tur. Etenim verbi causa, quibus cibus intus conclusus est, si
 quis non facta deorsum euacuatione, sorbitionem dederit,
 dolorem si adest amplius exacerbauerit: & si nō adest, statim
 induxerit: & spiritus densior fiet. Hoc verò malum est. Pul-
 monem enim resiccat, & præcordium, & pectinem, ac septū
 transuersum dolore affligit. Quinetiam si lateris dolor assi-
 duus est, & ad calefactoria non remittit, & sputū non prodie
 sed circa putrefactionem ac concoctionē valde viscosum fit,
 si non

A si non soluerit quis dolorem: aut ventre mollito, aut vena se-
cta, utrum tandem horu conducat: ptisana autem ita habē
tibus dederit, cita mors talium cōtinget. Propter has igitur
causas, & alias huiusmodi adhuc magis, qui tota ptisana utū
tur, septima die & citius moriuntur, partim mente læti, par-
tim ab erectæ cervicis inspiratione, & stercore suffocati. Tales
verò veteres sydere ictos esse putauerūt, ob hoc quidē maxi
mē, nō minus autē quod & mortuis ipsis latus liuidum repe-
ritur, ut simile quid plagæ appareat. Causa verò huius est,
quod prius quā dolor solvatur, moriuntur. Citò enim an-
helosi fiunt. Præ multo autem ac denso spiritu, velut iam di-
ctum est, valde viscosum circa cōcoctionē fit sputū, & egres-
sum fieri prohibet. Imò stertorē inducit, chartilaginolis pul-
monis arteriarū partibus bronchiis appellatis impactum: &
vbi ad hoc deuenierit, lethale iam plerūq; existit. Nam & ip-
sū sputum impactum, prohibet quidem spiritū intus fer-
ri, cogit autem citò extra ferri. Atq; sic mutuā opem ad ma-
lum inter se cōferunt, dum & sputum impactū, densum spi-
ritum facit: & hic cū densus sit, sputū insuper viscosum fa-
cit, & lubrum fieri ac elabi impedit. Occupant autem hæc,
non solum si ptisana intempestivē utantur: verū multò ma-
gis, si quid aliud ederint, aut biberint, quod minus quā ptis-
ana idoneum sit, proinde plerūq; consimilia sunt auxilia,
& his qui tota ptisana utuntur, & his qui sicut insens: his ve-
rò qui neutro horum, sed solo potu, quandoq; etiam diuersi-
modè auxiliari oportet. At verò hoc modo omnino facere Quid ob-
oportet. Si cui à cibo recens accepto, & aluo nondū subeva- feruandū.
cuata, febris incēpit, siue cum dolore, siue sine dolore, inhi-
benda est sorbitionis exhibitio, donec putarit cibum ad in-
fernam intestini partem secessisse. Utendū autem est potu
aceti mulsi, si dolor affuerit, hyeme quidem calidi, æstate ve-
rò frigidi. Si verò multa fuerit sitis, etiam aqua mulsa & 2-
qua. Postea verò si dolor aliquis affuerit, aut periculosi ali-
quid apparuerit, danda est sorbitio neq; multa, neq; crassa,
atq; hæc post septimū, aut nonū diem, si validus æger fuerit.
Si verò non subiit vetustior cibis ei qui recens cibum acce-
pit, si quidem validus sit, & ætate vigeat, infusum per clyste-
rem adhibendum est. Si verò debiliior fuerit, glande utendū
est, si non sua sponte probe prodierit. Tempus porro exhiben-

Hippocratis Liber De Victus

de sorbitionis hoc maxime obseruare ab initio, & per omne morbum oportet. Quum quidem pedes frigidi fuerint, inhibere oportet sorbitionis exhibitione. Maxime vero & a potu abstinendum est. Vbi vero calor descenderit ad pedes, tunc exhibere conuenit, & putare in omnibus morbis, & non minime in acutis, & maxime in his qui magis febriles ac periculosissimi sunt, tempus hoc magnam vim habere. Utendum est autem primum quidem maxime testaceo. Deinde vero ptisana iuxta praedictas coniecturas diligenter facta consideratione. Ca-

Lateris doloribus qui bus subueniendum.

terum pleuritis, hoc est dolor lateris, siue ab initio fiat, siue postea, calefactoris quidem primum non alienum est retinere dissoluere. Ex calefactoriis vero optima est aqua calida in vtre, aut in velica, aut in vase aeneo, aut testaceo admota. Verum molle quid antea ad latus supponere oportet. Lenitatis ergo. Comode etiam spogia mollis, magna, ex aqua calida expressa apponitur. Cōtegere vero stragulis ipsum fomentum oportet. Nam & ampliore tempore sic sufficiet & durabit, & simul ut ne vapor ad agrotantis spiritum afferatur, nisi fortassis & hoc ad aliquid commodum esse visum fuerit. Aliquando enim ad aliquid commodat. Insuper autem & ordeum, & eruum in aceto diluto, ita ut paulo acidius sit quam ut quis bibere possit, dissoluta ac feruefacta, & in marsupia coniecta, apponere oportet, & furfur eodem modo. Siccum autem fomentum praebent sal & milium torrefactum, in laneis sacculis conuenientissimum. Nam & leue, & tene est milium. Soluit autem huiusmodi mollitorium fomentum, etiam dolores ad clauiculam pertingentes. Sectio autem venae non similiter soluit dolorem si non ad clauiculam pertingat dolor. Quod si ad calefactoria dolor non soluitur, non multo tempore calefacere oportet. Resiccat enim hoc pulmonem, & suppurationem facit.

Ad clauiculam dolore extenso medela.

At si quidem dolor ad clauiculam de se significationem praebet, aut grauitas ad brachium, aut circa mamma aut supra septum transversum: venam secare prodest in cubiti flexura internam, & non cunctari copiosum sanguinem detrahare donec multo rubicundior nuxerit, aut propuro & rubicundo liuidus. Vtrunque enim contingit. Si vero sub septo transverso fuerit dolor, ad clauiculam autem de se significationem non praebet, aluum mollire oportet, aut veratro nigro, aut poplio, ita ut veratro quidem daucum, aut leleli, aut cuminum, aut

A aut anisum, aut aliud quid ex odoratis ammisceas, peplio vero sulphur succum. Sed hæc inter se si misceantur, consimilis modi existunt. Ducit autem ~~nigrum~~ veratrum melius, & ad iudicationem commodius quam peplium. Peplium verò flatus magis erumpere facit. Ambo autem hæc dolorē sedant.

Sedant item alia multa aluū subducentia medicamenta. Verum hæc inter ea quæ ego noui optima sunt. Alioqui & ea quæ in sorbitionibus exhibentur aluū subducentia medicamenta opitulantur, quacūq; non valde iniucunda sunt, aut ob amaritudinem, aut propter aliam quādam iniucunditatē, aut ob copiā, aut colorē, aut aliquam suspensionem. Ptisana ~~tamen statim insuper sorbendam dare oportet, postquam medicamentu bibit, non memorabili copia pauciorē, quam quantā~~

B ~~sumere adfuerit.~~ Nam & rationi consentaneum est, in media purgatione sorbendam nō dare. Quum autem cesserit purgatio, tunc minus sorbeat de ea, quam adfuerit. Postea verò reducat semper ad maiorem copiam, si & dolor sedatus fuerit, & nihil aliud aduersetur. Idē mihi sermo est, si etiā ptisanæ succo uti opus fuerit. Melius enim esse assero, statim omnino incipere sorbere, quam præuacuatis iam vasibus sorbere auspicari, aut tertia, aut quarta, aut quinta, aut sexta, aut septima die, si sanē non iudicatus fuerit morbus ante hoc tempus. Præparationes autē & his consimiles faciendæ sunt, quales dictæ sunt. De sorbitionis igitur exhibitione ita sentio. Sed & de potu, qualemque tandem quis ex descri-

C bendis sumpturus est, eadē mihi penitus sermonis ratio est. Noui autem etiā medicos maximè contraria facere his quæ fieri oportebat. Omnes enim volunt, ubi sub morborum iniuria homines fame premacerarūt, duobus aut tribus, aut etiā pluribus diebus, sic sorbitiones exhibere, itēque potus: & fortassis etiam par ipsis esse videtur, ut magna corpori mutatione fiēte, etiam magnū quid valde contra obiciatur. Verum mutare quidem nō parum, bene habet. Recte tamē mutatio transferenda est, & ex mutatione adhuc magis exhibitio eorū quæ per os sumuntur. Maximè igitur lædi poterunt, si non rectè mutationem fecerint, hi qui tota ptisana utuntur. Poterūt etiam lædi qui solo succo utuntur, lædi quoque possunt qui solo potu utuntur. Minimè verò hi. Oportet autē & in sanorum adhuc hominum victu addiscere quæ conferūt:

Error medicorum.

Hippocratis Liber De Victus

Consuetudo multū
potest.

Si enim sanis tales aut tales victus multam differre videtur, D
tum in aliis quibusdam, tum in mutationibus: quomodo nō
etiam in morbis multum differant, & maxime in acutis? At-
qui facile est hoc addiscere, quod simplex victus cibi ac po-
tus, ipse sibi ipse semper similis, securior omnino est ad sani-
tatem, quam si quis derepente ad alium meliorem, magnam
mutationem faciat. Nam & his qui bis in die cibum sumunt,
& his qui semel, repentinæ mutationes noxas ac agridi-
nes inducunt, & eos sanè qui prandere non adfuerint, si
pransi fuerint, statim infirmos facit hoc, & toto corpore gra-
uatur debiles, & pigros. Si verò etiam insuper cœnauerint,
acidum ructantes. Quibusdam verò etiam alui liquida ege-
stio oboritur, quum præter consuetudinem ventriculus gra-
uetur, solitus resiccare, & non bis intumescere, neq; bis cibos
coquere. Auxiliatur igitur his, mutatione rursus adæquare,
domire enim oportet velut nocte reducta post cœnam, hye-
me quidem, absque frigore, æstate verò, absq; calore. Si verò
dormire nō queat, vbi multam lentam deambulatione non
stando oberrauit, nihil cœnet, aut pauca, eaque innoxia. Insu-
perq; minus bibat, & potum nō aquosum. Talis autē adhuc
magis affligetur, si ter in die ad facietatē cibum acceperit, &
adhuc magis si sæpius. Quanquā sanè multi sunt, qui facile
ferunt, si ter in die cibū copiosè accipiāt, qui ita sunt adfuerint.
Quin & hi qui bis in die cibū capere soliti sunt, si pransi no-
fuerint, debiles & infirmi sunt, & ad omne opus timidi, &
ventriculi osculum dolet. Viscera enim pendere ipsis viden-
tur: & calidā ac cum virore pallidam urinā mingūt, & alui
egestio comburitur. Quibusdam etiā os amarescit, & oculi
caui fiunt, & tempora palpitant, & extremæ partes perfrige-
rantur. Et plerique ex his qui pransi non sunt, cœnam edere
non possunt. Si verò cœnā sumperint, ventriculum grauāt,
& multo magis agrè in lecto degunt, quā si etiam pransi
fuiſſent. Quum igitur talia hæc sanis fiāt, ob victus dimidiæ
diei mutationem præter consuetudinem: apparet neque ap-
ponere, neque detrahere commodum esse. Si igitur hic qui
præter consuetudinem semel in die cibum accepit, vbi tota
die vasa vacua fecit, quantum consuevit cœnauerit, verisimi-
le est ipsum, si tūc quum impransus esset doluit ac ægrotarit,
& vbi cœnauit grauis fuit: multo magis grauari, Si verò etiā
long

A longiore tempore euacuatis vasis, postea derepente cœnauerit, adhuc magis grauiabitur. Qui igitur præter consuetudinem vasa vacua fecit, ei hac diem rursus adæquare sic cōducit absque frigore, & calore atque labore, siac enim omnia grauius tulerit. & cœna multo minor exhibenda est, quàm consuevit, eaq; non sicca, sed modi humectioris & postea bibat potum non aquosum, neque pauciorē quàm pro cibi ratione. Sed & postera die pauca prandeat, quo sensim progressu fiente ad consuetudinē reuertatur. Qui tamen supernas partes amara bile infestantur, talia molestius ferunt. Pituitoli autē supernis partibus, cibi præter morem abstinentiam omnino facilius ferunt. Quare etiā semel in die cibum præter

B ter morem capere, facilius utique iidem tulerint. Sufficiens igitur & hoc signum est, quod maximè mutationes eorum quæ circa naturas nostras ac habitus contingunt, maximè morbos faciunt. Non igitur licet intempestiue, neque vehementissimas vasorum vacationes facere, neque vigentibus morbis, & in inflammatione consistentibus, cibos exhibere, neque licet derepente in tota re quicquam, aut huc aut illuc mutare. Multa verò his cognata, ex his qui ventri contingunt, itémq; alia referre quis possit, quod facile quidam ferunt cibos, quibus adsueti sunt, etiamsi natura nō sint boni. Similiter etiā potus: agrè autem ferunt cibos, quibus adlucti nō sunt, etiamsi nō sint mali, similiter etiam potus, & quæ quidem multus carnis esus præter consuetudinē assumptus

C facit, aut allium, aut silphiū, aut succus ipsius, aut caulis, aut alia huiusmodi, magnas quasdam peculiare vires habentia, minus admiretur quis vbi talia dolores ventriculis magis quàm alia inducunt. At iusta fuerit admiratio, si didiceris quantam maza turbationē, & molē, & flatum, & tormē ventriculo inducat si præter morē ingesta fuerit, ab eo qui mazam edere nō est solitus: aut qualem sitim panis ipse calidus ingestus inducat, & repentinā repletionem, ob siccandi vim, & quod tardè transit: & quàm diuersas inter se affectiones faciant, & panes valde puri, & qui ex toto sunt collati, præter consuetudinē in cibo accepti, itémq; maza sicca præter morem, aut liquida, aut viscosa: & quale quid faciāt polenta recentes nō adsuetis, & aliæ his qui recentibus uti adsueti sunt itémq; vini & aquæ potus, præter morem derepente vicissim

Calidus panis sitim adfert.

Hippocratis Liber De Viſtus

permutatus, & aquoſum vinū, & meracū præter cōſuetudinē D
derepente potatū. Illud enim humiditatē in ſuperno ventre
inducit. & ſtatū in inferno. Hoc verò venarū palpitationem,
& capitis grauitate ac litim. Quin & album vinū, & nigrum
ſi quis præter cōſuetudinem permutet, etiā ſi ambo vinofa
+ fuerint, tamē multa in corpore alterarint, vt minus mirū ef-
ſe quis dixerit, dulce & vinofum vinum nō idem poſſe, ſi de-
repēte permutata fuerint. Porro huiusmodi aliquā partem
ſermoni contrario patrocinari oportet: quòd mutatio viſtus
his facta eſt, corpore non mutato, neq; ad robur, vt cibos ap-
ponere opus ſit, neq; ad debilitatē, vt detrahere oporteat. In-
ſuper autē & robur coniectandum eſt, & morbi vniuſcuiuſq;
modus, & hominis natura, & cōſuetudo viſtus agridi, non ci- E
borum ſolū, ſed etiā potuū. Multo autē minus ad additio-
nem procedendū eſt. Nam detractiōem omnino tollere ſe-
pe conducit: vbi ſuffecturus eſt ager, donec morbi vigor ma-
tureſcat. In quibus autem hoc faciendum ſit, ſcribetur. Mul-
ta verò etiā alia relatis cognata ſcribere quis poſſit. Hoc ta-
men melius teſtimonium eſt. Non enim cognatū eſt rei illi
de qua plurimus à me ſermo habitus eſt, ſed ipſa res oppor-
tuniſſimū eſt documentū. Nam ab acutorū morborū initio,
aliqui quādoq; eadem die qua morbus inceperat, cibos come-
derunt: aliqui poſtridie: quidā etiā ſorbuerunt quicquid obla-
tum eſſet, quidā etiā cyceonem. Omnia autē hæc deteriora
quidē ſunt, quā ſi quis alio modo viſtū inſtituiſſet. multo ta-
men minus detrimentū afferūt in hoc tēpore peccata, quā ſi F
quis primis duobus aut tribus diebus, penitus vaſa vacua fe-
ciſſet, & quarta aut quinta die, tali viſtu vſus eſſet. Deterius
tamen eſt, ſi omnibus his diebus vaſis euacuatis, in poſterio-
ribus diebus hoc modo viſtū inſtituat, prius quā cōcoctus
ac maturus ſit morbus. Etenim hoc modo mortē plurimis
manifeſtē affert, ſi nō omnino facilis fuerit morbus. Quæ ve-
rò ab initio cōmittuntur peccata, nō ſimiliter, vt illa medelā
omnem reſpuunt, ſed multò facilius correctionē admittunt.
Hoc igitur maximum documentum eſſe arbitror, quod pri-
mi dies ſorbitiōe tali vel tali, nō ſint priuadi, in his qui pau-
lo poſtea talibus, aut talibus ſorbitiōibus vſuri ſunt. Fundi-
tus igitur ignorāt, tum hi qui granofa ptifana vtuntur, quòd
ab ipſa lēdūtur, quū ſorbere inceperint, ſi duobus, aut tribus,

aut

Errores ab
initio com-
miſi facili-
ter corrigū-
tur.

Aut pluribus diebus antea vasa euacuauerint: tum hi qui succo vtuntur, quod sorbentes leduntur, vbi non recte sorbitionem inceperint. Tunc tamē cauent, & magnā noxam afferre cognoscunt, si priusquam maturus factus fuerit morbus granosam ptisanā sorbuerit ager, succo vti aduersus. Omnia igitur hæc magna testimonia sunt, quod medici ægros non recte ad victū perducunt. Sed in quibus morbis vasa vacua facere non oportet, his qui sorbitionibus vti debent, vasa vacua faciunt. In quibus verò ex vasorum vacuatione, ad sorbitiones mutationē facere non oportet. in his mutationē faciunt, & hoc plerunq; absolute. Aliquādo verò in his temporibus mutationē ad sorbitiones faciunt ex vasorum vacuatione, in quibus sæpe ex sorbitionibus ad vasorum vacuationem accedere expediebat, si ita morbum exacerbari contingat. Aliquādo autē & cruda attrahuntur de capite, & à thoracis regione, biliosa, & vigiliæ ipsis coincidunt, ob quas non coquitur morbus: & tristes ac amarulēti fiunt, & delirant, & splendores ipsis ob oculos obuersantur, & aures sonitu plenæ sunt, & extremæ partes perfrigeratæ, & vrinæ incoctæ, & sputa tenuia, & salsa, & meraco colore tincta, ac pauca, & sudores circa collum, & anxietudines, & spiritus in latione sursum versus ostendens, densus, aut etiā valde magnus, supercilia distēta ac grauata, deliquia animi praua, & stragulorum de pectore reiectiones, & manus tremulæ. Quādoque verò labium infernum cōcutitur. Hæc autē in principiis compa-

Brentia, vehementis delirii significationem præbent, & plerunq; ægri moriuntur. Qui verò effugiunt, aut cū abscessu, aut cū sanguinis è naribus fluxione, aut ex crassi puris sputo effugiunt: aliàs verò minimè. Neq; enim talium rerum peritos medicos esse video, quomodo debilitatos in morbis dignoscere oporteat, & quæ ex vasorum vacuatione efficiuntur, & quæ propter aliā aliquam irritationē, & quæ propter dolorem, & præ acumine morbi: itēmq; quot affectiones, & omnigenas species, natura nostra & habitus singulis pariat: & quidem quum talium cognitio, aut ignorantia, salutē aut mortem afferant. Maius enim malū est, si ob dolorē & morbi acumen debilitato, exhibet quis potum, aut sorbitionem copiosiore, aut cibū, ob vasorum vacuationē debilem esse existimans. Indecorum etiā est ob vasorum vacuationē de-

bilitatum nō cognoscere, & victu premere. Affert equidem **D** periculum aliquod & hoc peccatum, verū multo minus quā alterum. Multo autē magis risu dignū hoc peccatū est quā illud alterū. Si enim alius medicus, aut etiā idiota, ingressus cognouerit ea quæ cōtigerunt, & edenda ac bibenda dederit eā quæ alter prohibuit, palam auxilium tulisse putabitur. Talia verò faciunt, vt artifices maximē ab hominibus vituperentur. Videtur enim ipsi ille qui ingressus est medicus aut idiota, velut mortuū suscitasse. Scribentur autem de his quoq; signa, ex quibus singula dinoscere oportet.

Corporis labor.

Consimilia tamē illis quæ circa ventrē contingunt, & hæc sunt. Nā si totū corpus præter consuetudinē multū quiescat, non statim magis robustum fit. Si verò etiā vbi multo tempore quieuit, derepente ad labores prodierit, vitiosum quiddam palam operabitur. Ad eundē modum etiā singulæ corporis partes. Nā & pedes tale quiddā operabuntur, & alij articuli laborare non adfueri, si interposito tempore derepente ad laborandū p̄deant. Eadem etiā oculi & dentes perpetientur, & quæcunq; tandē pars. Nam & lectus præter morem mollis dōlōrē inducit, itemq; præter consuetudinē durus. Sed & si sub dio lectus præter morem sternatur, corpus indurat. Quin & talium omnium exempla scribere satius fuerit. Si quis enim accepto vlcere in tibia, neq; valde periculoso, neq; adeo contemnendo, ita vt nequē ipsi ita difficulter, aut adeo faciliē vlcera sanescant: statim prima ab initio die decumbens curetur, & nequaquam crūs eleuet, hic sanē **E** hoc modo citra inflammationē fuerit, & sanus multo citius sic fiet, quā si obambulans curetur. Attamen si quinta aut sexta die, aut etiā prius surrexerit, & progredi voluerit, magis utiq; affigetur ac dolebit, quā si statim ab initio obambulans curatus esset. Si verò etiā multum derepente se fatigauerit, multo magis dolebit, quā si illo modo curatus, in illis diebus ita se fatigasset. Perpetuū igitur hæc omnia inter se restimonium præbent, quod omnia quæ derepente multum supra modum huc & illuc mutantur, lædunt. Multiplex igitur in ventre læsio est, si ex multa vasorum vacuatione, plus moderato derepente ingeratur. Quin & in reliquo corpore, si ex multa quiete, ad ampliorem laborē derepente deueniat, multo magis lædetur, quā si ex multo cibo ad vasorum

- A** forum vacuationem transmutetur, & si ex multo labore de repente ad ocium ac segniciem exciderit. Oportet tamen & his corpus quiescere. Oportet item illis ventrē à ciborum copia quiescere. Sin minus, & dolorem in corpore inducet, & totius corporis grauitatem. Plurimus itaq; sermo de mutatione huc atq; illuc à me habitus est, eo quòd hæc nosse ad omnia cōmodum sit, & ad hoc præsertim de quo nobis sermo erat, quòd in acutis morbis ad sorbitiones mutationem faciunt ex vasorum vacuatione. Facienda enim est mutatio velut ego iam iubeo. deinde non est vtendum sorbitionibus priusquam morbus maturus factus fuerit, aut aliud quoddā signum apparuerit, vel vacuatorium, vel irritatorium, circa **B** intestinum, aut circa præcordia qualia scribentur signa. *Vigilia immodica.* Vigilia fortis, potus & cibos crudos & inconcoctiores facit. Et *Vinū dulce.* rursus in cōtrariam partem mutatio, dissoluit corpus, & excoctionem ac capitis grauitatem inducit. Vinum porrò dulce, & vinosum, & album, ac nigrum, & aquam mulsam, & aquam, & acetum mulsam, his notis distinguere oportet in morbis acutis. Vinum dulce minus caput grauat, quàm vinosum, & minus mentem ferit, & magis quàm alterū per aluum & intestinū subit. Viscera verò magna facit, splenem & hepar. Quare neq; his qui amara bile abundant commodum est. Nam & siticulosum in talibus est, & flatuosum in superno intestino: non tamen inferno intestino inimicū pro flatus ratione, & quidē quum nō valde penetret flatus à vino **C** dulci, sed circa præcordia moretur. Certè per vrinā hoc minus exit omnino quàm vinosum album. Sputū vero magis educit dulce quàm alterum, & quibus quidē siticulosum est dum bibitur, his minus quàm alterū vinum educit. Quibus verò siticulosum non est, his magis quàm alterum educit.
- At verò album vinosum vinum, plurima ac maxima ex parte iam & laudatum & vituperatū est, in dulcis vini enarratione. Ad vesicam autē magis penetrat quàm alterum: & quum vrinā cieat, ac semper perrumpat, multū in his morbis profuerit. Nam & si ad alia incommodius sit altero, attamen quæ in vesica sit ab ipso purgatio, liberat, si quale oportet propellatur. Bonæ verò hæ notæ sunt de vini vtilitate ac detrimento, quas seniores me non nouerunt. Fuluo verò vi- *Fuluum vinum.* no, & nigro austero, in his morbis ad hæc vti poteris, si capi-

Hippocratis Liber De Viçtus

**Aqua mul-
sa.**

ris grauitas non affuerit, neque mentis perculsio, neque spu- D
rum ab ascensu prohibeatur, neque vrina suppressa sit: alui
autem egestionem humectiores ac ramentosiores fuerint. In
talibus sanè, vel maximè conuenerit ex albo transmutatio-
nem facere, & si qua his similia existunt. Hoc verò insuper
intelligere oportet, quòd si aquosum fuerit vinum, supernas
partes omnes, & eas quæ circa vesicam sunt, minus lædet.
Verùm partibus circa intestinum magis proderit, si mera-
cius fuerit. Aqua verò mulsa si bibatur per totum morbum
in acutis morbis, in totum quidem his qui amara bile abun-
dant, ac magna viscera habent, minus cōmoda est quàm his
qui tales non sunt. Siticulosa tamen minus est dulci vino. E
Pulmonem enim mollit, & sputum moderatè educit, & tussim lenit. Habet enim vim quandam extersoriam, quæ magis moderatò sputum viscosum facit. Vrinæ etiā sufficien-
ter ciet aqua mulsa, si nō aliqua ex visceribus affectio prohi-
beat. Sed & biliosa per aluum magis egerit, quandoq; bona,
quandoque magis quàm cōuenit colore saturata, ac spumosa:
atque hoc biliosis & magna viscera habentibus magis
contingit. Sputi igitur eductionem, & pulmonis molliti-
onem, aquosior aqua mulsa magis facit. At spumosas alui eges-
tiones, & biliosa magis quàm conuenit colorata, ac magis cali-
da, meraca aqua mulsa magis ducit quàm aquosa. Talis au-
tem egestio habet quidem & alia magna nocumenta: Neq;
enim ex præcordiis ardorē extinguit, sed concitat, & anxiam
molestiam, ac membrorum iactationem facit: Verùm & in- F
testina & sedem exulcerat. Horum autem auxilia scribentur.
Qui igitur aqua mulsa utitur, absque sorbitionibus, pro alio
potu, in his morbis, hic multū successum percipiet, & non in
multis successu destituetur. Quibus autem danda sit, & qui-
bus non, & ob quas causas non danda, maxima ex parte di-
ctum est. Damnata verò est aqua mulsa ab hominibus, velu-
ti quæ bibentes ipsam extremè debilitet: & propterea mor-
tem accelerare putata est. Verùm hoc propter eos qui se-
ipsos fame conficere constituerunt, dictum est. Aliqui enim
aqua mulsa sola in potu utuntur: nimirū velut talis existat.
At hoc non omnino hoc modo se habet. Sed si sola bibatur,
multò quidem fortior est, quàm aqua, si nō aluum exturbet.
Sed & vino albo ac tenui, & parum aquæ ferente, & inodoro,
aliqua

- A** aliquatenus fortior est, aliquatenus debilior, Multum tamen differt & vini & mellis meracitas, ad vtriusque vires. Nam etiam si duplam mensuram vini meraci quis bibat, respectu mellis quod delingat, multo tamen fortior fuerit ex melle solo, si alium non turbarit. Nam & multo plus stercoris ipsi prodibit. Si tamen pitisanæ sorbitione utatur, insuper autem aquam multam bibat, valde ipsum replebit, ac flatu excitabit, & visceribus circa præcordia incommoda erit. At si ante sorbitionem aqua mulsa bibatur, non ita lædit velut si insuper bibatur, sed etiam aliquo modo proderit. Cæterum cocta aqua mulsa, aspectu quidem multo melior est quam cruda. Splendida enim & tenuis, albâque ac pellucida fit: Sed
- B** quam ipsi virtutem attribuam, qua crudâ præcellat, non habeo. Neque enim iucundior est quam cruda, si mel bonum esse contigerit, debilior tamen, & minus stercoris ducēs, quorum neutro ut castigetur aqua mulsa opus habet. Proximè verò utendum tali cocta, si mel prauum fuerit, & impurum, & nigrum, & non boni odoris. Coctura enim maiorem partem turpitudinis prauitatis ipsius detrahare poterit. At verò acetum mulsum appellatum si bibatur, sæpe quidem commodum esse in his morbis comperies. Nam & sputum educit, & facilem spirationem facit. Tempora verò huiusmodi habet. Etenim quod valde acre est, nihil moderati fecerit, ad sputa quæ non facile prodeunt. Si enim educeret ea quæ stridulam asperitatem faciunt, & lubricitatem induceret, & guttur velut dilataret, pulmonem utique leniret. Ipsum enim molli-
lit, & si quidem hæc contingerent, magnam sanè utilitatem afferret. Aliquando verò id quod valde acre est, educationem sputi non obtinet, sed insuper viscosum id facit, & lædit. Maxime autem hoc perpetiuntur hi qui etiam alias perniciosè habent, & qui neque tussire, neque exscreare inharètia possunt. Ad hoc igitur vires ægroti insuper coniectare oportet, & si spem de ipso habeas, exhibere. Exhibere autem oportet si dederis, summè tepidum: atque tale paulatim, & non largè. Quod verò parum acre est, humectat quidem os & fauces, sputum item educit, & sitim sedat, & præcordio & visceribus quæ sunt hac parte lene est, & detrimenta ex melle hac parte prohibet. Quod enim biliosum est in melle castigar. Flatus etiam erumpere facit, & ad mictionem proritat. Intestini
tamen

Aqua mulsa
quando
oblit & cō-
tra.

Oxymel.

Hippocratis Liber De Viētus

tamen infernā partem humectiorem facit, & ramenta indu- D
cit. Quādoq; verò etiā malum hoc fit in acutis morbis, maxi-
mē quidem, quod flatum penetrare, imò recurrere facit. In-
super autem & aliās debilitat, & extremas partes frigefacit.
Atque hanc solam læsionem ex aceto mulso cōringere noui,
quæ sanē digna sit vt scribatur. Parum autem de huiusmodi
potu, nocte & ieiuno ante sorbitionem præbibendum dare
commodum est. Sed & vbi multum temporis post sorbitionē
intercessit, bibere nihil prohibet. His verò qui solo potu de-
gunt absq; sorbitionibus, propterea non est cōmodum sem-
per & perpetuò hoc vti, maximē propter rasurā aut exaspera-
tionem intestini. Quum enim stercore vacuum sit, magis
vtique hæc induxerit: & quum vasorum vacuatio adsit, post- E
ea etiā aqua multa vires detraxerit. Si tamen opitulari appa-
ruerit ad totum morbum multus huius potus vsus, parum a-
ceti affundere oportet, vt saltem cognosci possit. Ita enim &
ea quæ lædere solet, minimē læserit: & his quæ auxilio opus
habent, opem tulerit. Cæterum vt in summa dicatur, acredi-
nes siue aciditates ex aceto, amara bile abundantibus magis
conferunt, quàm atrabiliariis. Amara enim dissoluuntur, & in
pituitam transeunt, dum ab ipso attolluntur. Nigra verò fer-
mentantur, & attolluntur ac multiplicātur. Acetum enim ni-
gra sursum ducit. Mulieribus autem omnino magis aduersa
tur acetum, quàm viris. Dolores enim vteri inducit. Aquæ
porrò potui in acutis morbis, nullum aliud opus habeo quod
attribuā. Neque enim lenit tussim in peripneumonicis, neq; F
sputum educit, sed minus quàm alia, si quis semper aquæ po-
tu vtatur. Si tamen inter acetum mulsum & aquam mulsam
parum aquæ absorbeatur, sputum educit, propter qualitatis
potuum transmutationem. Inundationem enim quandā in-
ducit, aliās autem neque sitim sedat, sed exacerbat. Est enim
naturæ biliosæ biliosa, & præcordio mala, imò pessima fit ac
biliosissima, & vires maximē prostermit, vbi in vacuitatē in-
gressa fuerit. Sed & splenem auget & hepar, vbi inflammatū
fuerit, & fluctuat ac superiunatat. Nam & tardi transitus est,
eo quod frigida est & cruda ac incoctilis, & neque per aluum
secedit, neque per vrinas transit. Insuper autem & propterea
læsionem inducit, quod à natura stercus non subducit. Si
verò etiam dum adhuc frigidi sunt pedes aliquando bibita
fuerit

Acetum.

Aqua.

A fuerit, hæc omnia multo plus laedit, ad quodcunque tandem ipsorum peruenierit. Vbi tamē in his morbis suspicatus fueris, aut capitis grauitatem vehementē, aut mētis percussionem, penitus à vino abstinendum est, & aqua in tali vtendum: aut vinum aquosum & albū penitus dandum, & penitus in odorum, & post ipsius potum aqua modica insuper bibenda. Ita enim robur vini caput & mētem minus percellit. In quibus autem potu ipsius maximē vtendum sit, & quādo valde multa, & quando moderata, & quando frigida, & quando calida, partim prius dictū est, partim pro temporis occasione dicitur. Cæterum de reliquis potibus, qualis est ordeaceus, & qui ex herbis fiunt, & qui ex vua passa, & vuarum expressarū retrimētis, & ex tritico: & cnico, & myrti baccis, & malo punico, & de aliis, vbi alicuius ipsorum vsus cōtigerit, scribetur circa ipsum morbum: quemadmodum etiā de aliis compositis medicamētis. **B**alneū verò in multis morbis opē tulerit eo vtentibus, ad aliquos quidem assiduē, ad aliquos nō item. Quandoq; verò minus eo vtendum est, propterea quòd homines ad hoc sūt imparati. In paucis enim hominibus præparata sunt necessaria instrumenta, & nec ministri velut opus est parati habētur. Si verò nō omnino bene quis lauetur, non modicam læsionē incurret. Nam & tugurio fumum non habente opus est, & aqua larga, & balneo multo, & nō valde largē affuso, si sanē non ita opus fuerit. Et defricatione quidem potius vtendum non est. Si verò defricetur, calido vtendum est ipso defricatorio medicamento, eoque multiplici magis quā alius receptū est, & insuper nō pauca aqua perfundendum, & citò perfundendū. Breui quoq; via ad solū opus est, & vt facilis sit insensus, & facilis item exitus, oportet autem eum qui lauatur esse moderatū ac taciturnū, & nihil ipsum operari, sed alios & perfundere, & defricare. Debet etiam postea multa aquæ mixtura parata esse, & celeres perfusiones fieri, & spongiis vtendum est pro strigili, & nō valde siccum inungendum est corpus. Caput tamen resiccatum esse oportet, quātum eius fieri potest maximē, ita vt sponsia extergatur, & neque perfrigerari caput oportet, neq; extremas partes, neque reliquum corpus, & neq; eum qui recens sorbitionem accepit, neque eum qui recens potum sumpsit, lauare oportet, & neque sorbere, neq; bibere cito post balneū. **Magnam**

Balneum

quam tamen partem agro tribuere conuenit. si sanus balnei **D**
 valde amans fuit, & lauari adfuetus. Tales enim magis appe-
 runt, & loti utilitatem sentiunt, & non loti læduntur. Conue-
 nit autem in totum magis peripneumoniis, quam febribus
 ardentibus. Nam dolorem lateris & pectoris ac dorsi balneū
 lenit, & sputum maturum facit ac educit: & facile spiratio-
 nem reddit, & lassitudinē eximit, articulos enim & cutis su-
 perficiem mollit. Sed & urinam ciet, & capitis grauitatē sol-
 uit, & nares humectat, tot igitur bona balneo adsunt, quibus
 omnibus opus est. Si verò apparatus penuria aliqua fuerit, in
 vna re vel pluribus, periculum est ne magis lædat balneum
 quàm profit. Singula enim ex ipsis magnū detrimentū affe-
 runt, si non à ministris velut cōuenit præparata fuerint. Mi-
 nimè verò tempestiuum est eos lauare, quibus alius in mor- **E**
 bis liquidior iusto est, itémque eos, quibus plus iusto adstri-
 cta est, & non prius subiit. Sed neq; debilitatos lauare oporteret,
 neq; ex ciborum fastidio nauseantes, aut vomentes, neq;
 eos qui biliosum eructant, neq; eos quibus sanguis ex nari-
 bus erupit, nisi minus quàm pro occasione cōuenit fluat. Oc-
 casiones autē nosti. Si verò minus quàm pro occasione fluat,
 lauare expedit, siue totum corpus ad reliqua inde opem sen-
 riat, siue caput solū. Si igitur præparationes cōmodæ fue-
 rint, & æger bene suscepturus est balneum, quotidie lauare
 conuenit. Eos verò qui balneo delectantur, etiam si bis in die
 laueris, nihil peccaueris. Cæterum balneis uti, multo magis
 licet his qui tota ptisana vtuntur, quàm his qui solo vtuntur **F**
 succo. Licet autem & his aliquādo. Minimè verò his qui po-
 tu solo vtuntur. Sunt tamen ex his quoq; quibus licet. Con-
 iectare verò ex præscriptis oportet, & quibus balneum in sin-
 gulis victus modis profuturum est, & quibus non. Quibus
 enim aliquid horum deest cōmodorum, quæ balneum facit,
 & quæ balneo commodant, lauare non oportet. Quibus verò
 nihil horum deest, & adsunt ipsis signa in quibus lauari con-
 ducit, lauare oportet. Febris autem ardens fit quum resic-
 catæ venulæ, hora æstiuæ acres ac biliosos serosos humores,
 in seipsas attraxerint: & febris multa detinet, & corpus velut
 ex ossium lassitudine detentū, delassatur ac dolet. Fit autem
 plerunque & ex longo itinere, & longa siti, quum resiccatæ
 venulæ acres ac calidas fluxiones in seipsas attraxerint. Fit
 autem

Febris ar-
 dens qui
 fiat.

A autem lingua aspera ac sicca, & valde nigra & dum circa vē-
 trem mordetur, dolet, & alui egestiones valde liquidæ ac pal-
 lidæ fiunt: & sitis vehemens inest, itémq; vigiliæ. Aliquando
 etiam mentis emotiones. Huic & aqua, & aquam mulsam a-
 quosam coctam, quantū voluerit, bibendam dato: & si amarū
 fuerit os, vomere conducit, & ventrem per clysterem sublu-
 re. Si verò ad hæc non solvatur, lacte alinipo cocto purgato.
 Salsum autem nihil, neq; acre exhibeto. Non enim iufferet.
 Sorbitionem verò donec extra iudicationes fuerit, ne dato.
 Et si sanguis ex narib; fluxerit, soluitur affectio, itémq; si su-
 dores accedat iudicatorij, genuini cū vrinis albis & crassis,
 ac subsidetiis leuibus: & si abscessus aliquis fiat. Si verò absq;

B his soluta fuerit, recidiua rursus ægritudinis contingit. **Aut** **Causas**
 coxæ, aut crurum dolor emerget: & crassa expuet, si sanus fu- **alius.**
 turus est. Febris ardentis genus aliud. Alui subit, siti
 plena est, lingua aspera, sicca, salsuginosa. Vrinæ interceptio,
 vigilia, extremitates frigefactæ. Tali si non sanguis ex na-
 ribus fluxerit, aut abscessus circa collum fiat, aut crurum do-
 lor, & sputa crassa spuerit (hæc autē suppressa alio fiunt) aut
 coxæ dolor, aut pudendi liuor, non iudicatur: & testis inten-
 sus iudicitorium signum est. Sorbitiones attractorias dato.
 Verum in acutis morbis venam secabis, si vehemens appa-
 reat morbus, & qui ipsum habeant in vigoris ætate fuerint,
 & robur ipsis affuerit. Siquidē igitur angina fuerit, siue ali-
 quis alius ex pleuriticis morbus, eclegniatis delinctu repur-
 gato. Si verò debiliores appareant, si plus de sanguine detra-
 xeris, infuso alui per clysterem tertio quoq; die vtere, donec
 in tuto fuerit æger, aut etiam fame opus habeat. Præcordia **Præcordio**
 inflāmata non ex flatuum interceptione: septi transversi in- **rū inflam-**
 tiones, aut spirituum protensiones: in rectæ cervicis spira **mationes**
 tione sicca, quibus pus non subest. Verum ex flatuum interce- **vnde.**
 ptione, affectiones hæc accedunt. Maximè autem & hepatis
 dolores, & splenis grauitates, & aliæ inflāmationes, & supra
 septum transversum dolores ac morborum collectiones, sol-
 ui non possunt, si quis prius medicamētis purgare aggredia-
 tur. Nam venæ sectio in talibus principalis est. Deinde infu-
 sa per clysteres, si non magnus & vehemens fuerit morbus.
 Sin minus, etiam postea medicamēto purgante opus est. Sed
 & post venę sectionem, purgans medicamētum securitate ac
 mode

Vocis inter-
ceptio.

Comitia-
les morbi
vnde.

Angina
quādo fit.

moderatione opus habet. Quicunq; verò ea quæ inflamma-
ta sunt, statim in principio morborum medicamēto soluere
aggrediuntur, hi de intento quidem ac inflammato nihil au-
ferunt: non enim remittit affectio quæ adhuc cruda est: quæ
verò morbo resistunt ac sana sunt, colliquefaciunt. Debili ve-
rò fiēte corpore, morbus inualefcit. Quum autem morbus
corpori præualuerit, tale iam incurabiliter affectum est. Vt
aliquis derepente voce priuatus fiat, venarum interceptiones
faciunt, si sano hoc contingat absque manifesta, aut alia forti
caussa. Venam igitur secare oportet, in brachio dextro in-
ternam & sanguinem detrahēre, iuxta habitum ac ætatem
rationem ineundo, an plus aut minus oporteat. Coincidunt
autem plurimis ipsorum hæc: rubores faciei, oculorum sta-
bilitates, digitorum in manibus distentiones, dentium stri-
dores, pulsationes, maxillarum contractiones, extremitatum
perfrigeratio, spirituum per venas interceptiones. Quum
dolores accesserint, atræ bilis & atrium fluxionum affluxus
fiunt. Dolent autem partes internæ dum mordentur. Cōuer-
sæ verò, & valde siccæ fiētes venæ intenduntur, & inflama-
tæ affluētia attrahunt. Vnde corrupto sanguine, & spiritibus
non potentibus naturales in ipso vias permeare, perfrigera-
tiones fiunt ex statione, & vertigines, & vocis interceptio, &
capitis grauitas, & conuulsiones, si iam ad cor, aut hepar, aut
ad venam deuenerint. Hinc morbi comitiales fiunt, aut semi-
syderati, si in ambientes locos fluxiones inciderint, & à spi-
ritibus pertransire non potentibus resiccata fuerint. Quare
talibus, fomentis prius adhibitis, venam secare oportet sta-
tim ab initio, dum adhuc eleuati sunt omnes affligentes spi-
ritus, ac fluxiones. Facilius enim auxilium admittunt, & refe-
ctis viribus, & consideratis iudicationibus, medicamentum
exhibere sursum purgans, si non alleuetur; ad infernam verò
aluum, si nō subeat, infusum per clysterem adhibere. Postea
verò lac asininum coctum dato, & non minus quàm duode-
cim heminas bibat. Si verò virium robur adsit, plures quàm
sedecim. Angina fit quum fluxio ex capite multa ac gluti-
nosa, tempore hyberno aut verno, ad venas iugulares influ-
xerit, & hæ fluxionem ampliorem, propter amplitudinem,
attraxerint. Cū autē frigida & glutinosa sit, spiritus transi-
tus obturabit, & sanguinis transitus obturans, propinquas
sang

A sanguinis partes congelat, ipsūq; immobilē ac stabilem facit: quū natura frigida sit, & obturandi vim habeat, & propterea suffocantur, lingua liuescente, & rotūda fiēte ac reflexa, propter venas quæ sunt sub lingua. Præcisa enim vna, quam aliqui columellam vocant, vena crassa ab vtraq; parte est. Cū igitur hæ plenæ sint, & in linguam initantur, quæ rara est ac spōgiōsa, propter siccitatem: cōtingit vt ipsa præ violentia humorem ex venis suscipiens, ex lata fiat rotunda: ex bene colorata, liuida: ex molli, dura: ex facile flexibili, inflexibilis: adeo vt ager cito suffocetur, si non quis cito auxilium ferat, venæ sectionem à brachiis faciens, & venas sub lingua secans, & eclegmatum delinctu curans, & calidos gargarismos exhibēs, & caput radens. Debet autem & ceratum collo ac capiti circumponere, & lanas obuoluere, & spongiis mollibus ex aqua calida expressis fouere. Bibat autem ager aquam, & aquam mulsam, nō frigidā. Succum verò ptisanæ tunc sumet, quum iam ex iudicatione in tuto fuerit. Quum verò æstiuo vel autumnali tempore, fluxio calida ac nigrosa, de capite defluerit, vt pote ex tempore acris ac calida facta: talis vbi est, mordet, & vlcerat, & spiritu implet, & ceruicis spiratio accedit, & siccitas multa, & quæ videntur gracilia apparēt: & tendines posteriores in collo distenduntur, & velut in tetano distenti esse videntur: & vox abrupta est, & spiritus paruus est, & retractio spiritus densa ac violenta accedit. Talibus arteria vlceratur, & pulmo ardet, quum nō possint extrinsecum spiritum inducere. Et si his affectio non vltronea ad externas colli partes deferatur, grauior ac ineuitabilior est, & propter tēpus, & quod à calidis & acris sit humoribus. Si febris corripiat, veteri stercore non subeunte, aut à cibo recens accepto, siue cum dolore lateris, siue absq; eo, quietem agere oportet, donec cibi descenderint prius ad infernam aluum: potu verò vri aceto mulso. Quum autē ad lumbos grauitas deuenerit, infuso per clysterem eluere, aut medicamento purgare oportet. Vbi verò purgatus fuerit, vitum præscribere ex sorbitione primū, & aquæ mulsæ potu, Deinde ex cibis ac piscibus coctis, & vino aquoso, modico, ad noctem. Interdiu autē, ex aqua mulsæ aquosa. Quum verò status graueolentes prodierint, glandula subdititia, aut infuso per clysterem vtendum erit. Sin minus, in aceti mulsi

D d

potu

quoniam
fiat h.

in lingu

lang.

ex lin

Aliud ang
na genus.uic
Angin

Hippocratis Liber De Viçtus

potu cohibere oportet, donec ad infernam aluum descende-
rint cibi, deinde sic per infusum clysteris subducere. At si
mollem ac vacuum ventrem habenti febris ardens accedat,
si tibi commodum esse visum fuerit medicamentis purga-
re, intra tres dies id ne feceris, sed quarto. Postquam verò
medicamentum exhibueris, sorbitionibus vttere, obseruans
februm exaceruationes, vt nunquam exhibeas quum sunt,
aut futurae expectantur, sed vbi desinunt, aut quieuerunt, &
quàm lōgissimè à principio. Quum verò frigidi sunt pedes
neque potum, neque sorbitionem, neque aliud quicquā eius-
modi dato, verum maximum hoc esse ducito, vt expectes do-
nec valde fuerint calfacti. Deinde sic id quod conducit exhi-
be. Plerumque enim futurae exaceruationis febris signum est

Pedum fri-
gus febrim
accessum
denotat.

pedum frigiditas. Si verò in tali tempore exhibueris, maxi-
mè per omnia peccaueris. Morbum enim non parum auge-
bis. Quum autem febris desinit, vice versa pedes reliquo
corpore calidiores fiunt. Augetur enim frigefaciens pedes,
accensa ex thorace, ad caput flammam remittens. Vniuerso
autem calore acervatim sursum concurrente, & ad caput ex-
halante, meritò pedes frigidi fiunt, vt qui excarnes & ner-
uosi natura existant. Insuper autem etiam quum longè
à calidissimis locis absint, perfrigerantur, calore ad tho-
racem coacervato. Et rursus iuxta proportionem, quum
febris soluitur, & in tenues partes dirimitur, ad pedes ca-
lor descendit. Hoc igitur tempore & caput, & thorax ipso-
rum perfrigeratur, qua de causa sorbitio exhibenda est. Nam

Pedum ca-
lor.

vbi pedes frigidi fuerint, necesse est venticulum calidum
esse, & multo fastidio plenum, & praeordium intentum, &
corporis iactationem, propter internam turbationem: &
mentis abalienationem, & dolores, & æger distrahitur,
ac vomere cupit, & si praua vomuerit, dolet. Postquam
verò calor ad pedes descendit, & vrina progressa est, etiam
si non sudarit, omnia desinunt. Hoc igitur tempore sor-
bitionem dare oportet: alioqui perniciosa est. Quibus

Alui solu-
ratio.

verò perpetuò alius in febribus liquida est, his præcipuè
pedes calefaciens, & ceratis integens, & fasciis obuoluens,
animum aduerte, vt ne sint reliquo corpore frigidiores. Si
verò calidi sunt, calefactorium nullum adhibe, sed con-
serua vt ne perfrigerentur: potu autem vtendum est quàm
paucissimè

A paucissimo, aqua frigida, aut aqua mulsa. Quibus autem in febribus aluus liquida est, & mens perturbata, & multi ex talibus floccos auferunt, & nares scalpunt, & paulatim quidem respondent si interrogentur, ipsi verò à seipsis nihil aptum dicunt: talia atrabiliaria esse mihi videntur. Talibus igitur ita se habentibus, si aluus liquida fuerit, ac colliquerit, videtur mihi sorbitiones frigidiores ac crassiores exhibere oportere, & potiones aluum listentes, & vinosiores magis quàm adstringentes. At quibus in febribus vertigines ab initio, & capitis pulsus fiunt, & vrinæ tenues, in his expectare oportet, vt ad iudicationes febris exacerbetur. Nec verò admirarer, si delirarent. Quibus in principio vrinæ nebulae, aut etiam crassae sunt, tales depurgare oportet, si etiam alia contulerint. Quibus verò in principio vrinæ tenues, tales ne purgato, sed si visum fuerit, infusum per clysterem adhibeto. Hos sic curare conducit. Aeger corpore quietem agat, vngaturque ac æqualiter contegatur. Potu vtatur aqua mulsa aquosa: & sorbitione succi ptisanæ ad vesperam. Aluum verò ab initio per clysteris infusum subducito. Medicamenta autem his ne exhibeto. Si enim quid circa ventrem commoueris, vrina non cōcoquitur, sed absque sudore ac iudicatione, febris ad multum tempus durabit. Sorbitiones autem vbi propè iudicationem fuerit, ne dato, si turbetur: verum quum remiserit turbatio, & ad melius procedet. Obseruare verò etiam omnium febrium iudicationes oportet, & in hoc tempore sorbitiones detrahete. Solent autem longæ fieri hæ febres, & impetuosos humorū de loco ad locum illapsus habere, si quidem infernæ partes frigidae fuerint, circa aures & collum. Si verò non fuerint frigidae, alias mutationes habent. Fluit autem sanguis ex naribus, & alui his exturbantur. Quibuscunque verò febres anxiosæ sunt, & quæ præcordia intendunt: & decumbētes in eodem loco decubitus non sustinent, & extremæ partes perfrigerantur, hi plurima omnino diligentia ac custodia opus habēt. Degant autem hi vt nihil ipsis exhibeas aliud, quàm acetū mulsum aquosum. Sorbitionem verò ne exhibe, donec febris desierit, & vrina concocta fuerit. Decumbere autem debet æger in domo obscura, & in stratis quàm mollissimis reclinatus esse, ita vt multo tempore decubitus in eodem loco toleret,

D d 2

& quàm

Hippocratis Liber De Viçtus

*Vrinarum
cognitio.*

*Primus dies
in agro ob-
seruandus.*

*Signa vale
tudinis.*

& quàm minimum se iacet. Hoc enim talibus maximè prodest. Super præcordium verò, lini semen linteo illitū imposito, obseruando vt ne horrescat æger dum apponitur. Sit autem summè tepidum, aqua & oleo coctum. Coniectare verò ex vrinis oportet id quod futurum est. Si enim crassiores ac pallidiores fuerint, meliores sunt. Si verò tenuiores ac nigriores, deteriores. Si autem mutationes habent, temporis diuturnitatem significant: & necesse est vt morbus & ad deterius, & ad melius, inæqualitatem permutet. Caterùm inconstantes febres finire oportet, donet constiterint. Quum verò constiterint, & viçtu, & curatione conuenienti occurrere, speculatione secundum naturam facta. Sunt autem aspectus ægrotorum multi. Quare animaduertendum est medico, vt ne aliqua manifesta causa ipsum lateat, neq; ex his quæ ratiocinatione cognoscuntur, neque ex his quæ ad numerū parem aut imparē apparere oportet. Maximè igitur numerum imparē vereri oportet. Nam hi dies in alterutrā partem ægrotos inclinare faciunt. Primum itaque diem obseruare oportet, quo æger debilis esse cœpit, cognito principio ex quo, & quādo. Præcipuum enim hoc est vt sciatur. Quum verò ægrum interrogaueris, etiam hæc omnia considerabis. Primum quidem quomodo caput habet, an doloris exors sit, nec grauitatem in seipso habeat. Deinde præcordia & latera an doloris exortia sint. Si enim præcordiū dolorosum fuerit aut eleuatum, aut obliquitatē aliquā habuerit, aut satietatem: aut lateris dolor affuerit, & vnā cum dolore, tussicula, aut tormē, aut ventris dolor. Quum horum quid affuerit in præcordio, aluū maximè infusis per clysterē soluere oportet. Bibet autem aquā mulsam calidam coctam. Considerandum verò est an dum exurgit, animi deliquium incidat, an bona spiritus tolerantia ipsum habeat: & inspicienda alui egestio, num vehementer nigro colore prodierit, aut pura, quales sani hominis sunt ægestiones: & an febris ad tertium diem exacerbetur. Vbi verò valde probè tales consideraue-
ris in his morbis tertia die, ad hæc iam etiam alia contemplare, & si quarta simile quid tertiæ habuerit ex iisdem illis, æger in periculo versatur. Et signis autem, nigra alui egestio, mortem significat. Quæ verò sani hominis egestioni similis est, si per omnes dies apparuerit, salutare signū est. At
si glan

A si glande subdita non obedierit, & spiritus bona tolerantia affuerit, si ubi ad sedem exurrexit. aut isthic in lecto, animi deliquium inciderit: Hæc ubi ægroto, aut ægrota, ab initio affuerint, delyrium futurum expecta. Intentus autē sis quoq; ad manus. Si enim tremulæ fuerint, tali sanguinis de naribus destillationem futuram expecta. Inspicere verò ipsas nares oportet, an spiritus æqualiter per vtrasque feratur, & si multus feratur è naribus, conuulsio fieri solet, Si verò conuulsio fiat, tali mors expectanda est: & bene habet si quis hoc prædicat. Si verò in febre hyberna, lingua aspera fiat. & animi deliquia adsint, tali remissio febris contingere solet: at tamen fame talem macerare oportet, & aquæ mulsæ potu, ac ptisanæ succo conseruare, ita ut fidem ne habeas febrium remissioni. Nam qui talia signa habent, de vita periclitantur. Vbi verò hæc cognoueris, ac probè contemplatus fueris, ita fore prædicere potes, si placuerit. Quum verò in febribus horrendum quid acciderit quinta die, aut alius de repente liquida deiecerit, & animi deliquium incidat: aut vocis priuatio contingat, aut conuulsio, aut singultus fiat: ex his anxiosus fieri æger solet, & sudores sub naso, & circa frōtem ac ceruicem à posteriore capitis parte oboriri. Qui verò hæc patiuntur, spirituosi facti non longè postea moriuntur. Quibus autem in febribus crura fiunt tuberculosa, atque hæc tubercula moram trahentia non maturantur, febribus perseverantibus, & strangulatio acciderit in faucibus, ita ut partes circa fauces graciles existant, & tubercula non matura facta, sed extincta fuerint: talibus sanguis è naribus fluere solet. Et si quidem multus fluxerit, solutionem morbi significat. Sin minus, morbum longum. Quanto autem minus fluxerit, tanto deterius est, & lōgitudo maior. Si verò reliqua facilima fiant, tali dolores ad pedes expectare oportet. Si autem contigerint pedem, & dolorosus esse perseveret æger, & calore affligatur, ac non solvatur, paulatim & ad ceruicem dolores perueniēt, & ad clauiculam, & humerum, & pectus, & articulum. Nam & hunc tuberculorum fieri oportebit. His autem extinctis, si manus contrahantur, aut tremulæ fiant, conuulsio talem corripit, & delyrium. Sed & pustulæ in supercilio oriuntur, & rubores habet, & palpebra altera ad alteram progerminat, & inflāmatio dura detinet, &

In ægro
quæ consi-
deranda.

Hippocratis Liber De Viſtus.

**Delirij ſi-
gna.**

oculus vehementer intumeſcit, & delyrium valde augeſcit. **D**
Noctes autem plus quàm dies delyrij ſignificationē prębent.
Multa verò ſigna ad imparē numerū magis ſunt, quàm ad
parem. Vtro autē horum numerorū fiant, lethalia exiſtunt.
Tales verò ſi quidē ab initio medicamentis purgare volue-
ris, ante quintū diem id facito, ſi venter murmurarit. Sin mi-
nus, impurgatos ſinito. Si verò murmurarit, & alui egeſtio-
nes bilioſę fuerint, ſcammonio dato moderatē purgato. In
reliquo verò viſtu potus ac ſorbitiones parciffimē exhibe-
to, quo melius æger habeat, ſi nō remiſſione facta decimum-
quartum diem tranſgreſſus fuerit. Quum febricitātī deci-
maquarta die vocis interceptio acceſſerit, non cita ſolutio
contingere ſolet, neque liberatio à morbo fieri, ſed temporis **E**
diuturnitatem tali ſignificat. Quum itaq; apparuerit in hac
die, longius protrahetur morbus. Quum febrienti quarta
die lingua conturbata loquitur, & aluus bilioſa liquida ege-
rit, talis delyrare ſolet. Sed obſeruare ac aſſequi euētus oportet.
Aeſtiuo ac autumnali tempore in morbis acutis, ſan-
guinis deſtillatio repentina, firmitatē ac multam inflamma-
tionem circa venas ſignificat, & in poſterum diem tenuium
vrinarū apparitiones, & ſi ætate viguerit, & corpus in exer-
citio, aut bene carnoſum habuerit, aut atrabiliarius fuerit,
aut ex potu manus tremulas habuerit, bene habet vt dely-
rium, aut conuulſionē prædicat. Et ſi quidem in diebus pari-
bus accedat, melius eſt. In iudicatione verò pernicioſum, ſi
non multus aceruatim cōcitatus ſanguis, redundantia exi- **F**
tus faciat per nares aut per ſedem: aut abſceſſus, aut præcor-
diorum dolores, aut ad teſtes, aut ad crura dolores inducat.
His autem cōcoctis, exitus ſunt ſputorum, craſſarum vrina-
rum, leuium, albarum. Febri ſingultuoſę ſilphij ſuccum,
acerum muſſum, daucum tritum, bibēda dato, & galbanum
in melle, & cuminum in eclegmate delingendum, & ptiſanæ
ſuccum poſt hæc ſorbendum. Talis autem effugere nō po-
teſt, ſi nō ſudores iudicatorij, & ſomni æquales acceſſerint: &
vrinæ craſſæ & acres decurrerint, aut ad abſceſſum morbus
decubuerit. Nux pinea, & myrrha, in eclegmate dentur.
Bibendum autem talibus acerum muſſum quàm mini-
mum dato. Si verò valde ſiticolos fuerint, aquam ordea-
ſectiones. ceam. Peripneumonicas ac pleuriticās affectiones ſic conſi-
derare

**Singultus
medela.**

**Peripneu-
monicæ af-
fectiones.**

Aderare oportet, an acuta sit febris, & dolores lateris alterius, aut vtriusque: & dum spiritus sursum fertur an doleat: & an ruffles adsint, & sputa prodeant fulua, aut liuida, aut etiam tenuia, & spumosa, & florida, & si quid aliud diuersum habeat, ab his quæ illis fieri solent. Hunc sic degere oportet. Si quidem dolor sursum tendat ad clauiculam aut circa mammā, & brachium, venā in brachio secare oportet internam, vtra tandem fuerit parte, in ea ipsa: detrahare verò sanguinem iuxta corporis habitū, & tempus, & ætatem, & colorem, plus & cōfidenter. & si acutus fuerit dolor, ducere vsque ad animi deliquium. Postea verò infusum per clysterē adhibere. Si verò sub thorace fuerit dolor, & valde distēdat, pleuritico medicamento aluum subpurgato, & interim dum purgatur, nihil dato. Post purgationē verò acetum mulsum. Medicamentum autē purgans exhibeto quarta die. Verum per tres ab initio, infusum per clysterem adhibeto: & si hinc nō alleuetur, sic subpurgato. Custodia autē fiat vsque ad febris quietem ad septimū diem. Deinde si in tuto esse videatur, succum modicum ac tenuem primū melle ammixto exhibeto. Si verò facilē educat sputum, & bene spiret, ac doloris exors sit circa latera, etiā paulo crassiorem ac ampliorē, & bis in die dabis. Si verò non facilē liberetur, potionem pauciorē, & modicam sorbitionem, succum tenuem, eūque semel, & in quo tempore melius degit, exhibeto. Cognosces autē hoc ex vrinis. Sorbitionem enim exhibere in his morbis non prius

Coportet, quā vrinas concoctas, aut sputa matura facta esse videris. Si verò is qui medicamentum accepit, frequenter & multum purgatus fuerit, necesse est dare, verū pauciorē ac tenuiorē. Nō enim poterit dormire, præ vasorū vacuatione: neque similiter coquere: neque iudicationes sustinere ac expectare. At vbi crudorum colliquationes factæ fuerint & ea quæ renituntur abiecerit, nihil obstabit. Matura verò sunt sputa quidē, quum similia fuerint puri. Vrinæ autē subsidentias habētes subrubras, velut est eruum. Nihil autē prohibet & ad alios laterum dolores tepesfactoria apponere & cerata. Inungere autē crura ac lumbos oleo calido, & pinguedinem illinere. præcordia verò ex lini semine integere vsq; ad mās. At vbi in vigore est peripneumonia, auxiliū nō admittit, si nō expurgetur: & malum est si æger difficulter spirauerit.

Hippocratis Liber De Viſtus

Peripneumoniae medicula.

rit: & vrinae tenues & acres, & sudores circa collum ac caput D
fiant. Tales enim sudores prauis sunt, praesuffocatione, & im-
petu ac violentia, superatibus morbis, si non vrinae multae ac
crassae prodierint, & sputa matura exierint. Vtrum autem ho-
rum sua sponte venerit, morbum soluit. Ad peripneumo-
niam medicamentum quod delingitur. Nux pinea & galba-
num in melle Attico. Abrotonum in aceto mulso. Piper, vera-
trum nigrum feruefacito, & pleuritico in principiis dum do-
lor vexat, bibenda dato. Bonum est & panacem in aceto mul-
so feruefacere, & excolare, ac bibendum dare, tum hepaticis,
tum in doloribus septi transversi. Et quaecumque ad ventrem,
aut ad mictionem impellere oportet, haec in vino & melle da-
bis, illa ad ventrem, cum aqua mulsa aquosa copiosiore biben- E
da dato. Dysenteria sedata abscessum, aut tumorem aliquem
faciet, si non ad febres, aut sudores, & vrinas crassas, & albas,
ac valde perspicuas, aut ad tertianas, aut ad varicem, aut ad
testem, aut ad crura, aut ad coxam dolor decubuerit. In fe-
bre biliosa ante septimum diem, cum rigore morbus regius
accedens, soluit febrem. Verum sine rigore si accedat, extra
temporis occasiones, perniciosus est. Tetanus lumborum in
anteriorem ac posteriorem partem distentio: & in atrabilia-
riis, ubi spirituum per venas interceptiones fuerint: venae se-
ctione solvuntur. Quum autem a tendinibus vehementer in
anteriorem partem reuellantur, & circa collum ac faciem su-
dores fiunt, dum praes dolore mordentur ac resiccantur ten-
dines usque ad sacri ossis finem experrecti, qui crassiores spi- F
nam continent qua parte maxima ligamenta exorta, deorsum
ad pedes usque desinunt: Tali si non febris & somnus accesserit,
& sequentes vrinae concoctionem habentes prodierint, &
sudores iudicatorii, vinum creticum vinosum bibendum da-
to, & farinam coctam edendam. Et cerato ungito ac illinito, &
integito crura usque ad pedes, ubi calida aqua prius in sca-
pha perfudisti: brachia quoque ad digitos usque integito: &
lumbos ac spinam a collo usque ad coxas pinguedine ince-
rata molli pelli illita circumdato, ita ut etiam anteriores par-
tes complectantur: & interposito tempore, per vtriculos calida
aqua infusa foueto, & circumtento linteo ipsum reclinato.
Alium verò ne valde soluas, nisi glandula subdititia, si mul-
tum tempus fuerit, quo absque egestionem permansit, & si qui-
dem

- A**dem in melius res tibi processerit, satis est. Sin minus, Mei radicem in vino odorato tritā, & Daucum bibenda dato, mane vbi ieiunus est ante calidæ perfusionem. & post hæc breui farinā coctā, tepidam, plurimā edat. & vinum vbi voluerit: bene temperatum insuper bibat. & si quidē in melius res tibi processerit, satis est. Sin minus, prædicere oportet. Morbi porro omnes soluuntur, aut per os, aut per aluum, aut per **Morborū solutio,** vesicam, aut alium aliquē eiusmodi articulum. Verum sudoris species omnibus cōmunis est. Veratrum dare his oportet, quibus à capite fluxio fertur. Quicunq; verò ex abscessibus, aut venæ ruptura, aut propter intemperantiam, aut ob **Veratro purgandi sunt quibus à capite destillatio fluit.** aliam quandā fortem causam, suppurati fiunt, talibus veratrum ne dato. Nihil enim profuerit, & si quid perpetietur
- B**ager, veratrum in causa esse videbitur. Si verò corpus dissoluatur, aut dolor in capite sit, aut aures obturatæ sint, aut nares, aut sputatio: aut genuum grauitas sit, aut corporis tumida moles præter consuetudinē, dato quicquid tandē horum contigerit, si non ex potibus, neque ex rebus venereis, neque ex tristitia, neque ex curis, neque vigiliis hæc fiant. & si quidem horum quid in causa fuerit, ad hoc ipsum curationē institutio. Dolores ex itinere, laterum, dorso, lumborum, coxarum, & quicunque respirantes dolent, causam manifestā habentes. Sæpe enim ex crapulis & cibis flatuosis, dolores pro **Crapula morborum parens.** cedere solent, & ad lumbos, & ad coxam. Quibus verò ipsorum talia fuerint, vrinæ difficultas ipsis accedit. Horū autem
- C** causa iter est, & grauedinum ac raucedinū. Quæcunq; ex victus ratione cōtingunt. Pleraque vnusquisque prout præter cōsuetudinem victu vsus fuerit maximè annotat. Nam qui non soliti sunt prandere, si pransi fuerint, multus ventris tumor ipsis accedit, & dormitatio ac repletio. Si verò insuper cœnauerint, aluus exturbatur. His vbi balneo vti sunt, dormire conducit. Vbi verò dormiuerunt, deambulare lenta ac multa circuitione. & si quidem aluus euacuata fuerit, cœnare, & bibere vinum paucum, meracius. Si verò euacuata non fuerit, corpus oleo calido illinere. & si sitierit, vinum aquosum album aut dulce bibere ac quiescere. Si verò nō obdormierit, amplius quiescere. Reliquus victus similiter vt his qui crapula grauantur, cōstituatur. Quod verò ad potus attinet, qui quidē aquosi sunt, tardioris trāsitus sunt, & intus **Medela.**

Hippocratis Liber De Victus

obuoluuntur, & circa præcordia redundât, & ad mictionem D
non decurrunt. Tali verò potu repletus, nullum opus celeriter perficere poterit, ex his quæ intento corpore per violentiam aut celeritatem perfici solent. Quiescat autem quàm maximè, donec vnà cum cibus concoctus fuerit. Quicunq; verò potus meraciores sunt, aut austeriores palpitacionē in corpore, & pulsationē in capite inducunt. His cōmodum est vt insuper dormiāt, & calidū quid sorbeant, ad quod maximè iucundè affecti sunt. At verò ieiunium ad capitis dolorem ac crapulam malum est. Cæterum qui semel in die cibum capiunt, hi & impotentes sunt, & calidā vrinam mingunt, præter consuetudinē vasa vacua habentes. sit autem & os salsum ac amarum, & in omni opere tremunt, & tēpora ipsis distenduntur, & cœnā concoquere nō possunt, velut si pransi essent. Hos autē minus bibere oportet quàm soliti fuerunt, & mazam liquidiorē pro pane sumere: & exoleribus, rumicem, aut maluā, aut ptisanā, aut betas. Bibere verò vinū inter cibum, moderatū & aquosius: & à cœna modicè deambulare, donec vrina descenderit, ac minxerint. Utantur autē & piscibus coctis. Edulia porrò maximè de se significationē præbent. Allium flatum, & dolorē circa thoracem facit, & capitis grauitatem, & anxietatē, & si quis alius dolor ante fieri consuevit, eum exacerbauerit. Vrinā autem ciet, & hoc bonum habet. Optimum verò est vt quis ipsum edat, si aut ebrius est, aut ad potationem ire volet. Cascus flatum, & adstrictionem, & ciborū accensionem facit, quum crudum & F incoctile sit edulium, pessimum autē est repletos ipsum inter potum edere. Legumina omnia flatuosa sunt, & cruda, & cocta, & fricta, & macerata, & virida. His autem vtendum non est nisi cū cibus. Vnumquodque verò ex ipsis sua peculiaris vitia habet. Cicer flatum, tum crudum, tum frictum, & dolorem inducit. Lens adstringit, & turbationē inducit, si cum cortice sumatur. Lupinus minimè inter hæc mala habet. Silphij caulis & succus, quibusdam quidē maximè, in expertis autē non transit per ventrem. Verū vocatur hoc malum cholera sicca. Fit autē maximè vbi cum multo caseo mixtus fuerit, aut cum carnis bubulæ esu. Nā & atrabiliaræ affectiones à bubularū carniū esu exacerbantur. Est enim insuperabilis ipsarum natura, & nō cuiusuis ventriculi est

Allij natura.

Casci operatio.
Legumina.

Cicer.
Lens.
Lupinus.
Silphium.

Ali est ipsas concoquere. Optimè tamen ipsas concoxerint, ac summouerint, qui percoctis & quàm vetustissimis vtantur. At caprinæ carnes quæcunq; in bubulis insunt mala, omnia habent, itémq; à concoctione alienitatē: & flatuosiores sunt ac ructus ampliores faciunt, & cholera generat. Sunt autem odoratissimæ, solidæ, ac iucundissimæ, optimæ, & percoctæ, & frigida. Verū iniucundissimæ & graueolentes ac duræ, pessimæ: imò etiam recentes. Optimæ verò sunt ætatis tēpore: pessimæ autumno. Porcinæ verò carnes prauæ sunt, quū fuerint crudiores aut ambustæ. Magis autē cholera generant, & turbationē faciunt, Suillæ autem optimæ sunt omniū car-

Caprinæ
carnes.

Porcinæ
carnes.
Suillæ.

Bsunt, neq; tenues, neq; veteris victimæ ætatē habent. Edere verò ipsas oportet absq; pelle, & subfrigidas. In cholera sicca venter inflatus est, & strepitus insunt, & dolor laterū ac lumborū. Secedit autē nihil deorsum, sed aluus adstricta est. Talem adseruato vt ne vomat, sed aluus subeat. Infusum itaque calidum ac pinguisimū quā citissimè per clysterē immittito: & oleo illitum in aquam plurimā calidā dimittito, in solium reclinās, & calidā paulatim affundēs. Et si calescētī ipsi aluus subierit, morbus solutus est. Domire quoq; tali conducit, & bibere vinū tenue, & vetus ac meracius, & oleum dato, vt & quiescat, & aluus subeat, & soluatur morbus. A cibis verò & aliis abstineat. Si verò nō remiserit dolor, asininū lac bibendū dato, donec purgatus fuerit. At si liquida fuerit aluus, & bilis subeat, & tormina sunt & vomitus, ac suffocationes: his optimū fuerit quiescere. Bibere verò aquā mulsam, & nō vomere. Hydropum duæ naturæ sunt: quorum alter sub carne si fieri aggreditur, ineuitabilis est. Qui verò cum inflationibus sit, multa bona fortuna opus habet, maximè autem ærumnis, & fomentis, ac temperantia. Edat autem sicca & acrida. Sic enim vel maximè vrina eiecerit, & plurimum viribus polluerit. Si verò difficulter spirauerit, & tempus verum fuerit, & simul ætas viguerit, & viriū robur adsit, de brachio sanguinem detrahare oportet. Deinde panes calidos ex vino nigro & oleo tinctos edat: & quàm minimum bibens quamplurimum laboreat, & carnes suillas carnosas edat cum aceto coctas, vt aduersus accliuēs deambulationes reniti possit. Quicunque infernum ventrem calidum habent, & alui

Aquæ inter
cutem duo
genera.

egestio

egestionem acres & inæquales ipsis prodeunt præ colliquatio
 ne: his si quidem potentes fuerint, veratro albo reuellere o-
 portet. Sin minus, succus tritici hornei crassus, frigidus dādus
 est, & lenticulæ fræ decoctum, & panes subcineritij, & pi-
 sces febrienti quidem cocti, non verò febrienti, assati: & vi-
 num nigrum non febrienti: sin minus, aquam à mespilis, aut
 myrti baccis, aut malis, aut sorbis, aut palmulis, aut vitium
 œnanthe. Si verò febris non habeat, & tormina adsint, lac
 asininum calidum modicum primum, deinde sensim fiente
 progressu amplius, & lini semen, & triticeā polentam, & fa-
 bas Aegyptias, exempto eo quod in ipsis amarum est, molita
 ac trita hæc inspergens bibat: aut oua semiconcreta assata
 edat, & similaginē & milium, & alicam coctam in lacte: hæc
 cocta frigida edat, & quæ his similia existant, tum pocula, tū
 edulia in cibo assumat. Maximi momenti circa victus ratio-
 nem, est obseruare ac cauere, tū in acutis, tum in longis mor-
 bis, & intēliones febrium, & remissiones, quo temporum oc-
 casiones scias, quando cibos exhibere non oportet, & quando
 tuto exhiberi possunt. Insupérque quando plurimum ab in-
 tentione absunt. Nossē porrò oportet eos quibus caput do-
 let ab exercitationibus, aut cursibus, aut profectiōibus, aut
 venationibus, aut ex alio quopiam intempestiuo labore, aut
 ex re venerea: decolores item, raucos splenicos, exangues,
 spirituosos, & siccam tussim habētes, ac siticulosos, & flatuo-
 sos, & venarū interceptiones: & eos qui intenta habent præ-
 cordia, & latera, & dorsum, & torpefactos, & obscurè viden-
 tes, & quibus aurium sonitus incidunt, & qui vrinariam fistu-
 lam vrinam non continentem habent, & morbo regio labo-
 rantes, & quorum alui cruda eiiciunt, & quibus ex naribus,
 aut per sedem sanguis vehementer erumpit, & qui tubercula
 habent, & quibus vehemens dolor incurrit, & non superaue-
 rint: ex talibus nullum medicamento purgandum esse. Peri-
 culum enim habebis, & nihil opis afferes, & spontaneas libe-
 rationes ac iudicationes tolles. At si sanguinem alicui de-
 trahere cōducit, solidam aluum facere oportet, atque sic de-
 trahere, & fame macerare, ac vinū auferre. Postea victu con-
 ueniente, & fomētis humidis, reliquam curationem perage.
 Si verò aluus densa ac adstricta esse videatur, molle infu-
 sum per clysterem immitte. Si verò medicamētum dare vi-
 su m

Sanguis
 quomodo
 mittendus.

A sum fuerit, per veratrum tuto sursum purga. Deorsum verò nullum talium. Optimum autem est ad mictionē, & ad sudores, & ad deambulationes perducere, & leni frictione vti, vt ne habitum densum efficias. Si verò in lecto decumbat, alij ipsum fricēt. Et si quidem in thorace supra septum transuersum, affectio ipsum infestari, plurimum resideat, & minimè ipsum reclinent, quandiu vires tolerant: & sedentem multo tempore multo oleo calido defricent. Si verò in inferna aluo sub septo transuerso dolores habeat, decumbere conducit, & nullo motu moueri tali corpori confert, extra defricionem. Qui verò ex inferna aluo soluuntur dolores, per vrinas & sudores, si moderatè delabuntur, sua sponte soluuntur, qui parui sunt, vehementes autē parui sunt. Tales enim aut per-eunt, aut absque aliis morbis sani non fiunt. Verum qui huiusmodi sunt incumbunt ac firmanantur. Potio hydropico.

Hydropici
potio.

Cantharidas tres, detracto capite vniuscuiusque, & pedibus, & alis, corpora videlicet ipsarum in tribus aquæ cyathis terito. Quum autē is qui bibit doluerit, calida aqua perfundatur. Bibat autē prius illitus, ieiunus: & edat panes calidos ex oleo. Medicamentum sanguinem sistens Fici succum lana exceptum intus ad venam appone. Aut coagulo intorto nares obturato. Aut chalcitidem digito prius efformatam apprime, & cartilagine extrinsecus vtrinque comprime: & aluum lacte asinino cocto solue, & caput rade, & perfrigeratiā adhibe, si calidum tempus fuerit. Sesamoides sursum pur-

Sanguine
sistentia.

C gat, potio eius est drachma dimidia in aceto mulso trita. Commiscetur etiam veratris tertia portionis pars, & minus suffocet. Ad trichiasin, id est pilos pungentes in palpebris erascentes. Immissum in acm foramen habentem filum, in summa supernæ palpebræ margine deorsum versus perpunctione facta trans mitte, & aliud itidem sub hoc infernè trahice: & extenta fila consue ac deliga, donec decidant. & si quidem satis habuerit, bene est. Sin minus, & quid defecerit, rursus eadem facito. Sed & hemorrhoidas eodē modo trans mites, filo lanæ succidæ crassissimo ac maximo in acum immisso, ac deligato. Securius enim fit curatio. Deinde cōpressionē facta medicamento erodente vtere, & ne proluet donec deciderint: semper vnā relinque. Postea verò refectionis viribus veratrum dato, deinde exerceatur & exudet, & ante

Trichiasis.

Hæmor-
rroides.

exercita

Hippocratis Liber De Vi&ctus

exercitationē mane frictio multa fiat. Verūm à cursu absti-
 neat, & ebrietate, & ab acribus, organo excepto. Vomat au-
 tem per interpositos dies septem, aut ter in mense. Sic enim
 quā optimē habuerit corpus. Vinum verò fuluū austerum,
 Suppurati. aquosum ac modicum bibat. At verò ad suppuratos, scillæ
 frustra rotunda secta in aqua coquito, & vbi valde bene effer-
 buerit, diffundito, & alia effusa coquito, donec ad contactum
 percocta ac mollia apparuerint. Deinde leuiter tritis cumi-
 num frictum ammisce, & sesama alba, & amygdalas recen-
 tes tritas, & hæc melle excepta delingenda præbe, & postea
 vinum dulce bibendum. Sorbitiones verò sumat, peplum,
 appellatum meconium album, tritum acetabuli parui men-
 sura, in aqua loturæ farinæ recentis dilutum ac coctum, mel-
 le affuso tepidum absorbens. Atque sic degat per diem. De-
 inde supputans ea quæ eueniunt cœnam dato. Fabarū item
 depuratarum quadrantem, & rubiæ sarmenta duodecim, te-
 rito, misceto, coquito, & pingui addito delingenda præbeto.
 Oculorum Ad oculos. Spodium lotum probè velut farinæ massam
 medelæ. subactum, nō liquidum, vix immaturæ acerbæ succo hume-
 ctatum leuiter terito, in sole resiccato, & vt ad illitionē com-
 modum sit humectato: quum verò siccum factum fuerit, le-
 uiter trito sicco oculos sublinito, & angulos conspergito. Ad
 eosdem. Ebeni drachmam, æris vsti obolos nouem, croci
 obolos tres. Hæc trita in coticula terito, & vini dulcis hemi-
 nam Atticam affundito. deinde ad solem obuelata exponi-
 to, & vbi cocta exaruerint, ipsis vtete. Ad dolores oculo-
 rum. Chalcitidis drachmam, vix expressæ vt duæ partes
 sint reliquæ, myrrham & crocū terito, & mustum admisce-
 to, & ad solem coquito, ac illinito. Sint autem in vase æneo.
 Strangula Earum quæ ab vtero strangulantur cognitio. Digitis duo-
 cio vuluæ. bus comprimito, & si senserit, vteri strangulatio est. Si non,
 Hydropi- conuulsio. Ad hydropicos. Pepli meconij appellati, aceta-
 corum cata- bulum paruum Atticum rotundum, potio vna, squamæ æris
 potia. specilla lota tria. Hæc leuiter trita, & cum farina recenti ag-
 glutinata, ac in catapotia efformata, deglutienda dato. Pur-
 Solutio vtrius. gant aquam deorsum. Aliud, quod stercora per aluum expel-
 lit. In caricæ succum tithymalli instilla, in singulas septies.
 deinde in nouum vas compositas reconde, ac exhibe ante ci-
 bum. Aliud. Peplum, quod & meconium appellatur, aqua af-
 fusa

A fusa trito ac excolato, & farinam placetarum torrefactarum amiscens, & mel coctum affundens, hydropicis edendum dato: & vinum dulce aquosum, & aquam mulsam aquosam insuper bibendam. At meconium, quod primum excrementum à pueris prodit, collectum recondito, ac curato. **Meconium**

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE IUDICA-
TIONIBVS, IANO CORNA-
RIO MEDICO PHY-

B SICO INTER-
PRETE.



De iudicationibus quæ cito ad melius tendunt plerumque eadem signa sunt, quæ etiã san- **Sudores qui boni.**
tatis. Sudores enim optimi sunt, & celerissime febrẽ fedant, qui in iudicatoriis diebus fiunt, & febrem perfecte summovent. Boni quoque sunt qui per totum corpus fientes, morbum facilius ferre faciunt. Qui verò nihil horum faciunt, incommodi sunt. Denfari verò oportet alui egestionẽ, mor- **Qletum.**
bo ad iudicationem tendente. Sit autem subfulua, & non
C valde graueolens. Cõmodum est & lumbricos exire ad iudicationem. Vrina autem optima est, quæ habet albissimam **Vrina.**
subsidentiam, & leuem ac æqualem, per totum tempus donec iudicatus fuerit morbus. Significat enim securum ac breuẽ fore morbum. Si sudore oborto morbus deficiat: & vrina fulua albam subsidentiam habens conspiciatur: his eadẽ die recidiua febris fiet, atque hæc quinta die citra periculum iudicatur. His qui in breuissimo tẽpore sani euadent, omnia maxima signa fiunt. Nam magis sine dolore degunt, & extra periculum, & noctu dormiunt, & alia signa secunda præ se ferunt. **Capitis dolor.**
Quibus in febre non lethali capitis dolor, & alia signa circunstant, in his bilis dominatur. Quibus inceperit dolor primis diebus, & quarta & quinta magis premuntur, hi septima à febre liberantur, Febres iudicantur in iisdẽ numero diebus, ex quib

Hippocratis Liber

Febres le-
nes.

Morbus re-
gius.

ex quibus & superstites euadunt homines, & ex quibus pe- D
reunt. Etenim placidissimæ febres, & signis securissimis fiē-
tes quarto die desinūt, aut prius. Lethalissimæ verò & signis
horredissimis fientes, quarto die aut prius occidunt. Primus
igitur ipsarum insultus sic desinit. Alter ad septimum dedu-
cit. Tertius ad vndecimum. Quartus ad decimum quartū.
Quintus ad decimum septimum. Sextus ad vigesimum. Atq;
hæ in acutissimis morbis, per quatuor ad viginti, appositio-
nes sunt. Non potest autem quicquam horū integris diebus
exactè numerari. Neq; enim anni ac menses totis diebus cō-
stant. In febribus ardentibus bona signa apparētia, qualia in
sanis scripta sunt, si quidem minora fuerint, ad tertiū diem E
remissionem indicant, crassiora verò, in crastinum crassa au-
tem, eadē die. In febribus ardētibus si posterius septimo die
morbus regius accedat, indicium est sublari sudoris. Nam mor-
bus nō solet exudare, neque vsquam alibi abscessum facere,
sed sanus fit. Necesse autem est vbi calor febris discessit, &
humorē in seipsum attraxit, feбри contingere iudicationem,
per vrinas prodeuntes, aut etiam alui egestionem, aut sangui-
nis ex naribus fluxum, aut mictionē multam, aut per multā
humiditatem, sudorem, aut vomitum. Mulieri verò etiā per
mensium viam. Maximè igitur hæc iudicationem faciūt, &
quicquid his propinquum contingit. Facit autem & alias iu-
dicationes, sed minus quā has. Si verò septimo die morbus
regius accedat, aut posterius, in febre ardente, & difficilis F
multi sputi secessus, tum in ardētibus, tum in aliis febribus
si nullo talium signorū fiēte dimiserit febris, necesse est ta-
les iudicationes pro illis fieri, aut magnorum tuberculorum
abscessum, aut dolores ex abscessu vehemētes, aut colliqua-
tiones humorū ex calore. Iudicationes & remissiones eorū
quæ febrem ardentem significant, longiorem morbū faciūt.
Si verò fortia fuerint, mors plerunque sequitur. Reliquæ ve-
rò ardentes secutæ desinunt septimo aut decimo quarto die.
Solet autem & ad lipyriam deuenire, & detinet maximè xl.
dies, & in Epialum transit, & lipyria eadem quoque die cor-
ripit ac dimittit. Fit autē & capitis dolor. Si verò lipyria non
dimiserit in xl. diebus, sed producta fuerit, & dolor habuerit
caput, & delyret æger, ipsum purgato. Desinente verò febre
ardente si accedat morbus regius, non solet amplius exuda-
re,

Are, neq; vſquam alibi abſceſſum facere, ſed ſanus fit. Tertia-
na in ſeptem circuitibus plerunque iudicatur. Quibuſcunq;
in febris intolerabilibus ſeptima, aut nona, aut decima-
quarta morbus regius accedit, bonum: ſi non dextrum præ-
cordium durum fiat. Sin minus, ambiguum. Acuti morbi in
quatuordecim diebus plerunque iudicantur. Sudores fe-
bricitanti ſi fiant tertia die, & v. & vij. & ix. & xj. & xiiij. &
xxj. & xxxj. hi ſudores morbos iudicant. Qui verò non ſic
fiunt, dolores ſignificant. Concoctiones vrinarum paula-
tim matureſcentes, ſi in iudicatoriis diebus concoctæ fue-
rint, morbum ſoluunt. Exemplum vrinarū vlcera facere o-
portet. Nam vlcera ſi repurgantur pure albo, celerem cura-
tionem indicant. Si verò in ſanioſos humores tranſmutetur,
maligna fiunt. Eodem modo & vrinæ ſignificant. Si ex dolo-
re tenues fiant, ex occasione ratiocinari oportet, ex qua mor-
bus acceſſit, & hanc inſpicere vbi ſedatur. Nam hac deficien-
te, aliis ſignis qualia conueniunt accedentibus, non putan-
dum eſt morbo liberationem contingere. Si doluerit ca-
put, & ex hoc febris accedat, & hinc non ſederur: dolore non
ceſſante febris nō iudicatur: & plurima talia iudicationis lō-
gæ ſunt ad melius, etiam in hiſ quæ ad ſanitatem tendunt,
In præcordiis tumores molles, & doloris exortes, & ad
contactum cedentes, diuturniores quidem iudicationes fa-
ciunt, minus autem horrendas tuberculis hiſ contrariis. Eo-
dem modo habet & de tuberculis in reliquo ventre. Ex vri-
nis ſi quidem id quod miſtum eſt, purum fuerit: ſubſiden-
tiam verò albam ac leuem habuerit, diuturnior fit morbus,
& minus quàm optima ſecura eſt hæc vrina. Si verò & vrina
ſubrubra fuerit, & ſubſidētia ſubrubra ac leuis: diuturniorē
quidem hæc morbum quàm prior ſignificat, ſed valde ſaluta-
rem. Quicunque podagrici morbi fiunt, hi in quadraginta
diebus ab inflammatione liberi ſedantur. Sed in hiſ pleraq;
longæ iudicationis ad melius ſunt. Quæ ad mortem ten-
dunt, in die ac nocte iudicantur, quæ videlicet debilitationis
ſigna ſunt, velut epti medicamenti, exturbationis alui &
ſurſum, & deorſum, anxietatis, & aliorum huiuſmodi. Si igi-
tur horum ſigna in die ac nocte ſubmoueantur, bene eſt. Sin
minus, lethalia eſſe putanda ſunt. Sudores peſſimi ſunt fri-
gidi, & circa ceruicem ſientes. Hi enim mortes, & morborū
Ee longitu

Acuti mor-
bi.
Sudor de-
cretorius.
Lotiorum
maturatio
digestio ve-
lucera.

Capitis do-
lor cum fe-
bre.

Præcordia
turgida.
Tubercula
Vrinæ.

Podagrici.

Debilitatis
ſigna.

Sudor fri-
gidus.

Vrina.

longitudinem præsignant. Alui egestionēs variæ, diuturniores quidem sunt nigris & aliis lethalibus egestionibus: nihilo verò minus perniciosæ. Sunt autem tales, ramentosæ, biliosæ, cruentæ, prasinae, nigrae; & aliquādo simul omnes prodeunt, aliquando singulae particulatim. Vrina si quandoque pura mixta fuerit, quandoque subsidentiā albam ac leuem habens, diuturnæ tales sunt, & minus securæ quàm optima vrina. Si verò fulua ac tenuis fuerit vrina multo tempore, periculum est ne sufficere homo possit, donec concocta fuerit vrina, & si aliàs superstitis futuri signa fuerint, his abscessum affore expecta ad locos infra septum transuersum. In febribus si mutationes habeat vrina, diuturnitatem temporis significat, & necesse est ægrotum mutari & ad deteriora, & ad alteram partem. Si vrinae ab initio non similes fuerint, sed ex tenuibus crassæ fiant, & penitus tenues, tales ægrè iudicant ac inconstantes sunt. Frigidi sudores cum acuta quidem febre, lethales sunt: cum mitiore verò, longitudinē morbi significant. Et ubi in corpore caliditas aut frigiditas, hic morbus est: & ubi in toto corpore mutationes repentinæ sūt, & si corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex alio transmutetur, morbi longitudinem significat. Si febricitanti sudor accedat, febre non deficiente, malū, prolongatur enim morbus, & humiditatem significat. Febricitanti frigidi sudores accedentes, longam febrem significant.

Sudor frigidus.

Sudor multus intemperatē siens sano, morbum significat, æstate minorem, hyeme maiorem. Alui egestionēs si in idem concedere ac consistere permiseris, velut ramenta subsident: si pauca, modicus est morbus: si multa, multus: his infusum per clysterē adhibere conducit. Quibus verò in egestionē infernē bilis atra subsidet, si copiosior, maior est morbus. Si paucior, minor. Si venæ pulsarint, & facies sana fuerit, & præcordia non mollia, sed in tumorem eleuata, diuturnus est morbus, & absque conuulsione non soluitur, aut multa sanguinis ex naribus fluxione, aut vehemēti dolore. Et palpitationes in manibus, diuturnæ febris signū sunt, aut brevis iudicatio nis in deterius: & in his pleraque quæ ad mortem tendunt.

Sudor sani

His qui breuissimo tempore perituri sunt, maxima signa ab initio fiunt. Nam & difficulter spirant, & noctu non dormiunt, & signa periculosa præ se ferunt. In febre continua si quis

Breui morituri signa
Febris continua.

si quis

A si quis quarta die & septima affligatur, & vndecima non iudicatus fuerit, plerunque perit. Quicunque à distentione antro- Tetanos.
 trorsum ac retrorsum corripuntur, in quatuor diebus per- Morbus re-
 eunt. Si verò hos effugerint, sani fiunt. In febribus arden- gius.
 tibus si accedat morbus regius, & singultus quinto die, le-
 thale est. Recidivæ fiunt in his, quibus desinentibus vigiliæ
 fortes accedunt, aut somni turbulenti, aut corporis robur, aut
 dolores vniuscuiusque mēbri: & quibus febres sedantur, ne-
 que signis solutoriis fientibus, neq; in iudicatoriis diebus: &
 si deficiente febre, & sudore accedente, urinam fulvā minxe-
 rint, albam subsidentiam habentem, his febris recidivam ea-
 dem die expecta. Hæc verò recidivæ quinto die iudicatur ex-

B tra periculum, & si ex iudicatione facta urinā rubicundam,
 rubram subsidentiam habentem minxerint, etiam his reci- Febris ar-
 diva febris fit eadem die: & pauci ex hac servantur. Quum dens.
 recidit febris ardens, plerunq; etiam exudat. Et si reuertens
 tot diebus detineat quòt prius, etiam tertio reciduat, si non
 impari die dimiserit reuerfa. Plerunque si crudæ sint urinæ, Urinæ cru-
 & alia signa non secundum rationē eveniant, morbus in die dæ.
 iudicatoria reciduat. Quandoq; verò etiā reuertitur in die
 iudicatoria, his talibus relictis. Abscessus circa aurem qui Abscessus
 bus circa iudicationem fientes non suppurantur, his submo- circa aurē.
 ris recidiva fit, iuxta recidivarum rationē, similis circuitui:
 in his spes est ad articulos abscessum fieri: aut urina crassa,
 qualis est alba in quartanis delassatoriis, liberat ab abscessu.

C Quibusdam verò horum etiā sanguinis è naribus eruptio-
 nes fiunt. Hæc autem sanguinis eruptio quartanas non sol-
 uit, neque morbos qui per alui egestionem sanari solent.

Atrabiliariis cum phrenitide occupatis, si hæmorrhoides Phrenitis,
 oboriantur, bonum est. Quicunque insaniunt sua sponte Insania.
 liberati ex morbis, his insaniā soluit dolor ad pedes progres-
 sus, aut ad pectus: aut tussis vehemens oborta. Si verò horum
 nihil fiat, insania soluta oculi priuatio contingit. Qui lin-
 gua offendunt, & labiorum non sunt potentes, si hæc sedata
 fuerint, suppurati fiunt. Dolorem in locis infernis fortem
 soluit aut surditas, aut sanguis multus è naribus erumpens.

Insania magni morbi ex more gentis solutio. Quibus in Causi solu-
 febribus ardentibus coxarum dolor, oculorum distortio, aut tio.
 cæcitas, aut testium tumores, aut mammarum eleuatio, febrē

Hippocratis Liber

Tremor.
Surditas.

Subiti do-
loris mede-
la.

Morbus
aquæ sub-
ter cutem.
Pituita al-
ba.

Alui pro-
fluuium.

Capitis do-
lor.

Lippitudo
Spasmos.

ardentem soluit, aut etiam sanguinis ex naribus fluxus. In D febre ardenti si insuper corripiat rigor, exudare solet. A febre ardente occupato, rigore accedente, solutio fit. Quibus in febribus ardentibus tremores oboriuntur, mentis emotio soluit. Quibus in febribus aures obsurduerunt, his non soluta febre, insanire necesse est. Soluit autem sanguis ex naribus erumpens, aut aluus biliosa egerens, aut dysenteria accedens, aut coxarum, aut genuum dolor. Quibus febribus rigor accedit, febris soluitur. Quibus dolores fiunt derepente, præcordium eleuatum est superne, & si circa spuriam costâ graues dolores fiunt, his solutio fit venæ sectio, & purgatio deorsum. Non enim corripit febris vehemens locis im- potentibus. In his qui ab hydropede detinentur, si aquositas E per ventrem ad vesicam aut ventrem fluat, solutio fit. Si à pituita alba occupato, alui profluuium vehemens accedat, solutio fit. Qui ab alui profluuiio multo tempore detinentur vnâ cum tussi, non liberantur, si non dolores vehementes in pedibus inciderint. Si verò vult commutatio ac correctio naturæ fieri, postquam non amplius aluus profuit, aut inanem omnem egestionem habuerit, flatus foras prodeuntes accidunt. Nullum itaque humorem manifestum habent. Quare ei qui ita habet secure exhibere scies ea quæ conueniunt, & si voluulus accedat, vinum frigidum multum mera cum paulatim bibendum dato, donec somnus, aut crurum dolor fiat. Soluit autem & febris, aut dysenteria. Caput F circuncirca dolenti ac agrotanti, si pus per aures, aut per nares fluxerit, soluit morbum. Quibuscunque sanis derepente dolores oboriuntur in capitibus, & statim voce priuantur, ac stertunt. hi in septem diebus pereunt, si non febris corripuerit. Caput circuncirca dolenti, quicunque ex supernis locus doluerit, cucurbitam affige. Soluit dolor ac coxas, & genua, & anhelatio, quicquid horum factum fuerit. Lippienti ab alui profluuiio corripì, bonum est. A conuulsione aut distentione neruorum vexato, febris accedens soluit morbum. Si à febre detentum conuulsio corripuit, se datur febris eadem die, aut postridie, aut tertia die.

HIPP

AHIPPOCRATIS


COI LIBER DE DIEBUS

IUDICATORIIS, IANO COR-
NARIO MEDICO

PHYSICO IN-

TERPRETE.

*

B  Agnam artis partē esse arbitror, de his quæ rectē scripta sunt posse considerationem facere ac iudicare. Qui enim hoc nouit, & his utitur, nō videtur mihi in arte multum falli posse. Oportet autem exactē perdiscere vnamquamque temporum cōstitutionem, & quenque morbum, & qui morbus sit bonus, & qui periculosus aut in constitutione, aut in morbo, & qui morbus longus sit & lethalis: & qui longus, & non perniciosus ad vitam, & qui acutus ac lethalis: & qui acutus, & superesse sinens. Ex his enim ordinem dierum iudicatoriorum considerandi ac prædicēdi facultas datur, & ex his cognoscere datur, quibus & quando & quomodo victum præscribere oportet. **C** maximum itaque signum in ægrotis qui victuri sunt, si nō præter naturam fuerit febris ardēs, & alij morbi eodē modo. Nihil enim horrendum, neque lethale fit in his quæ secundum naturam sunt. Secundum est, si non etiam ipsum tempus simul cum morbo impugnet. Plerunq; enim hominis natura, vniuersi potestatem non superat. Postea verò si partes circa faciem gracilescāt: & venæ in manibus, & in oculorum angulis, & superciliis quietem habeant, quum prius non quieuisent. Huic si vox fuerit debiliior, & sit leuior, & spiritus rariior ac tenuior, sequenti die remissio morbi contingit. Hæc igitur considerare oportet ad iudicationes: & an bifida linguæ pars velut saliuæ alba obducitur, & an in summa lingua hoc idem factum sit, verū minus. Si quidem igitur parua hæc fuerint, ad tertium diem remissio fit morbi. Si verò aliquan-

Potissima
huius artis
pars.
Mens quā-
do non fal-
litur.
Prima mor-
borum ob-
seruatio.

Secunda.

Tertia.

Lingua sa-
liuosa.

Ee 3

to cras

Hippocratis Liber

**Oculorum
notæ.**

**Morbi acu
ti vnde.**

**Cæcutien -
tis signum.
Præ oculis
quæ cursita
re videtur.**

**Somnia quæ
vexent.**

**Morbi hu -
ius causa**

**Tetanos
quoruplex.**

to crassior fit saliuæ, in crastinum. Si verò adhuc crassior, ea dem die. Quin & albas oculorum partes in principio morbi denigrari necesse est, si inualuerit morbus. Hæ igitur si puræ fiant, perfectam sanitatem indicant: leniter quidem, tardius: vehementer autem, citius. Cæterum acuti morbi fiunt à bile, vbi in hepar influxerit, & ad caput constiterit. Hæc igitur patitur hepar. Intumescit & expanditur ad septum transversum præ tumore, & statim ad caput dolor irruit, maximè verò ad tempora: & æger auribus non acutè audit. Sæpe etiam oculis non videt, & horror, & febris corripit. Atque hæc quidem ab initio morbi ipsi fiunt ex intervallo, quandoque vehementer, quandoque minus. Quanto autem morbi tempus magis progressum fecerit, tanto maior fit dolor in corpore: & pupille oculorum sparguntur, & obtuse vident: & si digitum admoueris ad oculos, non sentit, eo quòd nō videt. Quòd autem non videat, inde cognoueris. Non enim nictat dum digitus admouetur: & floccos aufert de stragulis, si quidem viderit, pediculos esse putans. Et quū hepar magis expansum fuerit ad septum transversum, delyrat: & ob oculos sibi aduersari putat reptilia, & alia omnigena animantia fera, & milites armatos pugnantes, & ipse aduersus ipsos pugnare sibi videtur: & talia dicit velut qui videat, & egreditur & minatur si quis ipsum egredi non permittat. Et vbi surrexerit, crura eleuare non potest, sed cadit. Pedes autē semper fiunt frigidi. Et quum dormierit, exilit à somno, & insomnia horrenda videt. Hoc autem cognoscimus quòd ab insomniis exilit ac perterretur, postquam ad sanam mētem rediit. Exponit enim insomnia hæc, qualiāq; & corpore fecit & lingua loquutus est. Atque hæc quidem sic patitur. Quādoque verò etiam voce priuatur, per totam diem ac noctem multū acerrimū spiritū respirās. Postquā verò delyrare cessauit, statim ad sanā mentē redit. Et si quis ipsum interroget, rectè respondet, & intelligit omnia quæ dicuntur. Deinde rursus paulò post in iisdem afflictionibus iacet. Hic morbus accidit maximè in peregrinatione, & si alicubi desertā viam iuerit, & timor ipsum ex spectro corripuerit. Corripit etiā aliis modis. Tetani tres. Si quidem ex vulnere tetanus, siue distentio neruorū antrorsum ac retrorsum fiat, æger hæc patitur. Maxillæ cōgelantur ac rigent, velut ligna: & os aperire non potest.

A potest, & oculi frequenter lachrymantur ac distrahuntur, & dorsum riget, & crura flectere non potest, neq; manus, neque spinam. Quum verò lethalis fuerit, potus & cibi quos prius accepit, per nares quandoque redeunt. At opisthotonos, re- **Opisthoto**
trorsum fiens distentio, reliqua quidem eadem agro inducit **nos.**
vt plurimum, fit autem quum in ceruice tendines retrorsum
agrotarit. Agrotat autē, ab angina, aut ab vna, aut locis cir-
ca tonsillas suppuratis. Aliquādo etiam à capite febribus ac-
cedentibus conuulsio succedit. Iam verò etiā à vulneribus.
Hic trahitur in posteriorem partem, & præ dolore dorsum ac
pectora rigent, & eiulat. Hic cōuellitur vehementer, vt vix
detineatur à presentibus, ne è lecto excidat. Alius, tetanus **Spasmus.**
B est minus lethalis prioribus. fit autem ab iisdem, & totū cor- **Causos.**
pus similiter conuellitur. Febris ardēs prædictis non simili-
ter fit. Vrit enim semel vt necesse sit febricitare. Sitis igitur
multa hominē tenet, & febris vehemens. lingua verò rum-
pitur exasperata, & sicca fit: & color ipsius primum quidem
pallidus est, velut solet. progressū verò tēporis nigrescit. Et
si quidē in principiis nigrescat, citiores iudicationes fiunt. Si
verò posterius, diuturniores. Coxendicum morbus ex his **Ischias.**
maximē causis fit in plerisque: si quis diutius in sole verse-
tur, & coxendices fuerint calfacti, & humor qui est in articu-
lis, à calore fuerit resiccatus. Quod autē id quod resiccatur
condensatur ac compingitur, hoc magnum signū est. Aeger
enim articulos vertere ac mouere nō potest, præ dolore arti-
culorum, & eo quod verticula sunt compacta. Dolet autem
magis lumbos & verticula ea quæ sunt ex obliquo coxarum,
& genua. Consistit autē dolor plurimo tēpore in inguinibus
simulque coxendicibus, acutus ac æstuosus. & si quis ipsum
erigat aut transmoueatur, eiulat præ dolore quā maximē po-
test. Quandoq; verò etiā conuulsio accedit, & rigor ac febris.
Fit autem à bile & pituita. fit etiam à sanguine: & dolores
conformes ab omnibus morbis: & rigor & febris aliquando
corripit debilis. Morbus regius acutus est, & celeriter occi-
dens. Color totus malicorij speciem refert, & est vehemen- **Morbus re**
ter cum virore pallidus, quemadmodum lacerti cum viro- **gius.**
re pallidiores. conformis autem est cutis. Et in vrina subsi-
det velut eruum fuluum & febris & horror debilis habet.

Quādoq; etiā stragula habere nō sustinet, sed mordetur ac

Ec 4

raditur

peripneu-
monia.

raditur matutino tempore, vbi nondum cibum accepit, in
ternis partibus. Deinde viscera plerunque sugunt. Et si quis
erigat ipsum aut alloquatur, non sustinet. Hic vt plurimum
moritur intra quatuordecim dies. Has autem vbi effugerit,
sanus fit. Petipneumonia talia facit. Febris vehemens tenet:
& spiritum densum ac calidum respirat: & anxietas adest, &
impotentia, & iactatio, & dolores circa scapulas, & clauicu-
las, & mammam: & grauitas in pectoribus, & delirium.

Quandoque verò doloris exors æger est, donec tussire in-
ceperit. Verum hic morbus diuturnior ac difficilior illo
est. Saluam autem albam & spumofam primum sputat. Lin-
gua flaua est, verum progressu temporis nigrescit. Si qui-
dem igitur in principio nigrescat, citius morbus finitur. Si
verò posterius, tardius. Tandem verò etiam rumpitur lin-
gua, & si digitum apponas, inhæret. At liberationem à mor-
bo significat lingua, similiter velut in pleuritide. Hæc au-
tem patitur æger minimum diebus quatuordecim, ad sum-
mum vnâ & viginti: & tussit hoc tempore vehementer: &
vnâ cum tussi purgatur, primum quidem salua multa ac
spumosa. Septima verò & octaua die, vbi febris in vigo-
re fuerit, & humida sit peripneumonia, crassior: sin minus,
non. Nona verò & decima, cum virore pallida ac subcruen-
ta. Duodecima autem vsque ad decimam quartam, multa &
purulenta. Atque hoc in his contingit, quorum naturæ & cor-
poris affectiones humidæ sunt, & morbus fortis est. Quo-
rum verò & natura, & morbi constitutio sicca est, in his mi-

Febrî de-
cretoria.

nus. Caterum de iudicatoriis diebus, etiam iam ante à me
dictum est. Iudicantur autem febres quarta die, septi-
ma, vndecima, decima quarta, decima septima, vi-
gesima prima. Et his autem acutis quædam
etiam trigesima. Deinde quadrage-
sima, postea sexagesima. Quum
verò hos numeros excels-
serint, diuturna iam
febrîum con-
stitutio.
fit.

HIPP

A H I P P O C R A T I S

C O I L I B E R P R A E N O -

T I O N V M , I A N O C O R N A -

R I O M E D I C O P H Y -

S I C O I N T E R -

P R E T E .



B

EDICVM prænotionē adhibere, optimum *Quæ medi*
 esse mihi videtur. Prænoscens enim & præ- *ci sunt.*
 dicens apud ægrotos, & præsentia, & præte-
 rita, & futura, & quæ ipsi ægroti relinquunt
 exponens, fidē utiq; fecerit, quòd ægrotorū
 res magis cognoscat, quare audebunt ho-
 mines seipsos medico cōmittere. At verò curationē optimē
 fecerit, ubi prænouerit futuras affectiones. Sanos equidē fa-
 cere omnes ægrotos impossibile est, hoc enim præstantius
 esset, quàm prænoscere in posterū euentura. Quandoquidē
 verò homines moriuntur, alij priusquam medicū vocēt, præ
 violentia morbi: alij verò accito etiā medico, derepentē vita
 decedunt, quidā ubi vnā vixerunt diē, quidam tēpore paulò
 diutius, anteaquam medicus per artem aduersus singulos
 morbos repugnet: itaq; nosse oportet talium affectionū natu-
 ras, quantū corporū vires excedunt. Simul verò & si quid di-
 uini in morbis inest, etiā huius prænotionē ediscere. Ita enim
 C meritò admirationi fuerit, & medicus bonus extiterit. Nā
 quos superstites manere possibile est, eos adhuc magis rectē
 conseruare poterit, ex multo tēpore antea consiliū adhibens
 ad singula. & tum morituros, tum seruandos, prænoscens ac
 prædicens, & culpa exors fuerit. Cōsiderare porrò hoc modo *Quæ medi*
 conuenit in morbis acutis, primū quidē faciem ægroti, an *co cogno*
 similis sit his quæ in sanis sunt, maximè verò an ipsa sibi ipsi. *scenda.*
 Ita enim optima fuerit. Si verò maximè cōtraria simili fue-
 rit, horrendissima est. Talis autē fuerit, nasus acutus, oculi
 caui, tēpora collapsa, aures frigida ac cōtractæ, & extrema
 tes auriū auersæ, & cutis circa frontē dura & circuntenta ac
 arida, & color totius faciei pallidus. aut etiā niger, & liuidus,
 aut plūbeus. Siquidē igit in principio morbi facies talis fue-
 rit, & nondū ex alijs signis cōiecturā facere licuerit, interro-
 gare

E c 5

gare

gare oportet, num vigilauerit homo, an alui excrementa valde liquida sint, aut fames aliqua ipsum teneat. Et si quidem horum aliquid consteatur, minus graue esse putandum est. Iudicantur autem & cognoscuntur talia in die ac nocte, si ob has causas facies talis fuerit. Si verò nihil horum esse dicat, neque in praedicto tempore consolidat, nosse conuenit morti proximum esse. At tu vetustiore existente morbo, aut triduo, aut quadriduo, talis fuerit facies, de his interrogare oportet, de quibus etiam prius iussit: itemque alia signa considerare, & in vniuersa facie, & in corpore, & in oculis. Si enim lucem fugiat, aut inuoluntarie lachrymetur, aut distorqueantur, aut alter altero minor fiat, aut albas partes rubentes habeant, aut venulas liuidas aut nigras in ipsis habeant, aut lemæ ac sordes circa oculos appareant, aut etiam instabiles, aut eminentes, aut caui vehementer facti, aut squalentes & obscuri fuerint: aut color totius faciei alteratus fuerit. Haec omnia mala & perniciose esse putandum est. Considerare verò conuenit etiam oculorum subapparitiones in somnis. Si enim albae quid partis subapparuerit, palpebris non commissis, si id non ex alui profluuiis, aut medicamenti potione fuerit, aut agrotus non ita dormire consueuerit, malum signum & valde lethale est. Si verò retorta, aut contracta fiat, aut liuida, aut pallida palpebra, aut labium, aut nasus, cum aliquo ex aliis signis, morti proximum esse sciendum est. Lethale est etiam habere labia resoluta, & pendetia, & frigida, & albicantia facta. Decubentem agrotum à medico deprehendi conuenit in latus dextrum aut sinistrum, & manus, & collum, & crura modice inflexa habentem, & totum corpus flexibile situm. Ita enim plurimi ex sanis decumbunt. Optimi autem sunt decubitus qui sanorum decubitibus similes existunt. At verò supinum iacere, & manus, & collum, & crura extensa habere, minus bonum est. Si verò etiam pronus fiat, & de lecto ad pedes delabatur, magis horrendum est. Si verò nudos quoque pedes habere coperiatur, nec admodum calidos: & manus, & collum, ac crura inaequaliter dissecta, ac nuda, malum est. Anxietatem enim significat. Lethale est & hiantem semper dormire: & crura supini iacentis valde incuruata esse ac complicata. At in ventrem decubere, si quis non sit adfuetus dum sanus fuit ita dormire, delirium significat, aut dolorem locorum circa ventrem. Caterum erectum sedere velle agrum in morbi vigore, in omnibus morbis

Oculorum
signa.

Dormien-
tium conie-
ctatio.

Cubatio
qualis.

Abis acutis malū est, pessimum autē in peripneumonicis pulmone inflāmato. Dentibus stridere in febribus, quibus nō familiare id est à pueris, furiosum aclethale est. Verū prædicere oportet ab vtrifq; periculum futurū. Si verò etiā delyrus hoc faciat, perniciosum valde iam existit. Vlcus autē siue prius factū fuerit, siue in morbo accesserit, considerare oportet. Si enim periturus est homo, ante mortē liuidum ac ficcum erit aut etiā pallidū & ficcū. At de manuum latione ita sentio. Quæ in febribus acutis, aut peripneumoniis, aut in phrenitide, aut capitis dolore, ante faciē feruntur, & frustra venantur, & festucas legunt, & floccos de vestibis euellunt, & de pariete paleas detrahūt, eas omnes malas & lethales esse. Spiritus densus dolorē significat, aut inflammationem, in locis supra septū transuersum. **B** Qui verò magnus expiratur, & per multū tēporis interuallum, delyriū indicat. Si verò frigidus ē naso & ore exspiretur, valde iam perniciosus est. Bonā autem spirationē valde magnā vim habere ad salutem, in omnibus acutis morbis putare cōuenit, qui cum febribus sunt, & in quadraginta diebus iudicātur. Sudores optimi sunt in omnibus acutis morbis, qui in diebus iudicatoriis fiunt, & febrē perfectē submouent. Boni verò sunt, qui per totū corpus fientes, hominē facilius morbū ferre faciunt.

Stridor dē-
tium quid
portendat.

Sudores
qui salu-
bres & cō-
trā.

Qui verò tale quid nō effecerint, incōmodi sunt. Pessimi autem sunt frigidi, & tantū circa caput & faciē fientes, & circa ceruicem. Hi enim cū acuta quidē febre, mortē præsignificant: cū mitiore verò, longitudinē morbi. Et qui per totum corpus fiunt, similiter significāt his qui circa caput. At verò milioformes, & solū circa collum fientes, mali sunt. Qui verò cū guttis fiunt, & euaporant, boni sunt. Cōsiderare porrò conuenit sudores in summa. fiunt enim aliqui propter corporum exolutionē, aliqui propter inflammationis vigorem. Præcordium optimum est doloris exors, & molle, & æquale, tum in dextra, tum in sinistra parte. At inflamatū, aut dolorem exhibēs, aut dextrę partes inæqualiter affectæ ad sinistras: hæc omnia obseruare oportet. Si verò etiā pulsus in-erit in præcordio, turbationē significat aut delyriū. Verū oculos taliū insuper intueri oportet. Si enim oculi frequenter moueantur, furiosos hos fore timor est. Tumor in præcordio durus existēs & dolorosus, pessimus quidem est si per totum

A præcor-
diis notæ.

Hippocratis Liber

totum fuerit præcordium. Si verò fuerit in altera parte, minus periculosus est in sinistra. Significat autem eiusmodi tumores, in principio quidem, mortem breui affuturam. Si verò viginti dies transgrediatur, tum febris detinens, tum tumor non confidens ad suppurationem conuertitur: Contingit autem his in primo circuitu, etiã sanguinis eruptio e naribus, & valde prodest. Verũ interrogare cõuenit, an caput doleat, aut hebetem visum habeant. Si enim horum quid fuerit, ad eum locum repit. Magis tamen in iunioribus quinque ac triginta annis, sanguinis eruptionem expectare cõuenit. At verò molles tumores, & doloris exortes, & qui digito cedunt, diuturniores iudicationes faciunt, & minus illis sunt horrendi. Si verò trãsgrediatur sexaginta dies febris detinens, & tumor non confidat, suppuratum fore significat & hunc, & eum qui in reliquo ventre est eodem modo. Quicunq; igitur tumores dolorosi sunt, & duri, & magni, periculũ mortis breui affore significat. Qui verò molles, & doloris exortes sunt, & digito compressi cedunt, diuturniores illis sunt. Cæterum tumores in ventre minus faciunt abscessus, quàm hi qui sunt in præcordiis. Minimè verò hi qui sub vmbilico consistunt, ad suppurationem conuertuntur. Sanguinis verò eruptionem, ex supernis locis maximè expectare oportet. Omnium autem tumorum diuturnorũ circa hos locos, suppurationes considerare conuenit. Sunt autem suppurationes hinc fientes hoc modo considerandæ. Quæcunque extra vertuntur, optimæ sunt, quæ paruæ sunt, & quàm maximè foras eminentes, & in acutum fastigiata. Quæ verò magnæ sunt, & lata, & minimè in acutum fastigiata, pessimæ sunt. Quæcunq; verò intro rumpuntur, optimæ sunt quæ nihil cum externo loco communicant, sed sunt contractæ, & doloris exortes, & totus externus locus concolor apparet. At verò pus optimũ est, si est album & æquale, & leue, & quã minimè graueolens. Quod verò huic contrarium est, pessimum est. Aquæ porò inter cutem, ex acutis morbis obortæ, omnes male sunt. Neque enim à febre liberat, & valde dolorosæ sunt, ac lethales. Incipiunt autẽ pleræq; à laterum mollitudine, & à lumbis: aliquæ verò etiam ab hepate. Quibus igitur à laterũ mollitudine & lumbis, principia fiunt, his & pedes intumescunt, & alui profluvia diuturna ipsos tenent, quæ neque dolores

Hydropis
origo.

cx

ex laterum mollitudine ac lumbis soluunt, neq; ventrē molliunt. Quibuscunq; verò ab hepate aquæ inter cutē oriuntur, his tussiles tussindique promptitudo accedit, & nihil memorabile expuunt, & pedes tument, & venter non egerit nisi dura, & coarctus, & circa aluū fiunt tumores, aliqui in dextra, aliqui in sinistra parte, tum consistentes, tum confidentes. Caput autem & manus, & pedes, si frigida sunt, malum est, ubi & venter, & latera calida sunt. Optimū verò est & totum corpus calidum esse, ac molle. Conuerti autem facile conuenit ægrotum, & in attollendo se leuem esse. Si verò grauis esse appareat, & reliquo corpore, & manibus, & pedibus, magis periculosum est. Si verò supra grauitatem, vngues & **B** digiti liuidi fiāt, mors euestigio expectanda est. At si digiti ac pedes penitus nigrescūt, minus perniciosi sunt quā liuidi. Verū & alia signa considerare oportet. Si enim facile ferre videatur malum, & aliud quoddam ex salutaribus ad hæc signa subindicet, morbum ad abscessum verti spes est, ita ut æger quidē superstes māsurus sit, corporis verò partes nigrae factæ casuræ. Testes & pudenda reuulsa, dolores fortes significant, & periculum lethale. Quòd verò ad somnos attinet, quemadmodum secundum naturam consuetum nobis est interdium vigilare oportet, noctu dormire. Si verò hoc fuerit transmutatum, peius est. Minimè verò lædi æger poterit, si dormiat manè ad tertiam partem diei. Qui verò ab hoc tempore fiunt somni, deteriores sunt. Pessimum autē est non dormire, neque noctu, neque interdium. Aut enim præ dolore ac afflictionibus vigiliæ adsunt: aut delirium aderit ab hoc signo. Egestio alui optima est, mollis & cohærens, & secundum horam, in qua etiā à sano egerebatur. Iuxta copiam verò, pro ratione ciborū ingestorū. Tali enim cōtingēte exitu, venter infernus sanus fuerit. Si verò liquida fuerit egestio, conducit neque stridere, neque frequentem esse, & paulatim secedere. Delassatur enim homo ex frequēti desessu, & vigilias utique cōtraxerit. Si verò sæpe aceruatim egerit, periculum est ne in animi deliquiū incidat. Quin & iuxta copiam ingestorū egerere oportet, bis aut ter in die, & noctu semel. Plura verò mane, quemadmodum in consuetudine est homini. Inspissari autem oportet egestionē, morbo ad iudicacionem tendente. Sit autem subfulua, & non valde graueolens.

Hydropis
diuersitas.

Somnus.

Alui excre-
menta.

Commod

Hippocratis Liber

Commodum est, & lumbricos rotundos cum egestionem prodi-
re, morbo ad iudicationem tendente. Oportet autem in
omni morbo mollem esse ventrem, & iusta mole præditum.

At verò aquosum valde, aut album, aut pallidum, aut viri-
de, aut vehementer rufum, aut spumofum stercus egerere:
Hæc omnia mala sunt. Malum insuper est & quod exiguum
est, & viscosum ac albū: & quod subpallidum aut subviride
ac leue. His verò magis lethalia fuerint stercorea nigra, aut
pinguia, aut liuida, aut æruginosa, & malè olētia. Quæ verò
varia sunt, diuturniora quidem his sunt, nihilominus autem
perniciosa. Sunt autē talia, ramentosa, & biliosa, & cruenta,
& prasina, & nigra, aliquādo simul inter se exeuntia, aliquan-
do particulatim. Flatum porro sine strepitu ac crepitu pro-
dire optimum est. Melius autem est & cum strepitu exire,
quàm isthic reuolui, & qui sic progressus est flatus, aut dole-
re quid hominē significat, aut delirare: nisi sua sponte homo
ita flatum emittat. Cæterum præcordiorum dolores ac tu-
mores, si fuerint recentes, & non cum inflammatione, soluit,
murmur in præcordio obortum, & maximè quidem si per-
transierit cum stercore, & vrina, ac flatu.

Vrinæ. Sin minus, etiam
ipsum per se si transierit, prodest. Prodest itē si subdescende-
rit ad infernos locos. Optima verò est vrina, quum fuerit
alba subsidentia, & leuis & equalis, per totum tempus, donec
iudicatus fuerit morbus. Significat enim & securitatem, &
morbum fore breuem. Si intermiserit, & aliquando quidem
pura mingatur, aliquando verò subsidet album ac leue, diu-
turnior fit morbus, & minus securus. Si verò fuerit & vri-
na subrubra, & subsidentia ipsius similis, & leuis, diuturnio-
rem quidem hæc morbum quàm prior significat, sed valde sa-
lutarem. At subsidentia in vrinis crassiores polentæ partes
referentes, prauæ sunt. His autē peiores sunt, laminosæ. Al-
bæ verò & tenues valde malæ sunt. Verū his deteriores sunt
furfuraceæ. Nubeculæ quæ feruntur in vrinis, albæ quidē
bonæ sunt, nigrae verò malæ. Quandiu verò fulua fuerit vri-
na & tenuis, morbum incōcoctum esse significat. Si verò &
diuturna fuerit talis existens, periculū est ne sufficere homo
possit, donec vrina fuerit concocta. Lethaliores autem sunt
vrinæ, & fetidæ, & aquosæ, & nigrae, & crassæ. At tum in vi-
ris, tum in mulieribus, nigrae vrinæ pessimæ sunt. In pueris
autem

A autē aquosæ. Quicunq; vrinas tenues & crudas mingūt multo tempore, si alia veluti superstitibus futuris signa fuerint, his abscessum expectare oportet ad locos infra septum trāsuersum. Sed & pinguedines supernè instantes, araneorum telis similes, damnare oportet. Sunt enim colliquationis signa. Considerare vero conuenit in vrinis in quibus nubesculæ sunt, an supernè aut infernè sint: & quales habeant colores. Et quæ quidem deorsum feruntur, cum coloribus relatis eas bonas esse putare, ac laudare. Quæ verò sursum feruntur, cum coloribus relatis, malas esse, & tales damnare. Nec verò decipiat te, si vesica morbum aliquem habēs, eiusmodi vrinas reddiderit. Non enim totius corporis signum est, sed

B ipsius per se vesicæ. Vomitus commodissimus est, ex pituita **Vomitus.** ac bile quàm maximè permixtus, & non crassus valde, neq; multus. Nam meraciores, deteriores sunt. Si verò id quod vomitu reiectum est prasini fuerit coloris, aut liuidum, aut nigrum: quicunque horum fuerit colorum, malum esse putandum est. Si verò omnes colores idē homo vomit, valde perniciosum hoc est. Celerrimam autem mortem significat liuidus vomitus, si graecolens fuerit. Omnes verò subputridi ac foetidi odores, in omnibus vomitibus mali sunt. Sputum vero **Sputum.** in omnibus doloribus, qui circa pulmonem & costas fiūt, citò ac facilè expui cōuenit, & flatum sputo valde permixtū apparere. Si enim longè postea post principium doloris, expuerit quod flauum est, aut fuluū, aut quod multam tussim inducit, & nō valde permixtum est, deterius est. Nam & flauum meracum, periculosum est: & album ac viscosum & rotundū, inutile est. Malum est & quod viride est valde, itēmq; pallidum, & quod spumofum. Si verò ita fuerit meracum, vt etiam nigrum appareat, hoc ipsum deterius est quàm illa.

Malum etiam est si nihil repurgetur, neque emittat pulmo, sed plenus ferueat in gutture. Grauedines & sternutationes in omnibus circa pulmonē morbis, & antecessisse, & **Pulmoquū non purgat malum est.** succedere, malū est. At in aliis morbis lethalissimis sternutationes profunt. Sputum autem flauum, sanguine permixtum non multo, si in pulmonis inflammatione in principio morbi reiciatur, salutare est, & valde prodest. Si verò septimo die, aut posterius, minus securum est. Omnia sputa mala **Sputa quæ descri** sunt, quæ dolorem nō sedant. Pessima verò sunt nigra, velut mala.

Suppura-
tiones.

Bonæ spei
signa.

Pus quādo
erumpit.

descriptum est. Quæ verò dolorem sedant, omnium optima D
existunt. Quicunq; dolores ex his locis non sedantur, neque
ad sputorum purgationem, neque ad stercoreum alui subdu-
ctionem, neque ad venæ sectiones, & victus rationem ac me-
dicamenta. eos ad suppurationem verti sciendum est. Ex sup-
purationibus quæcunque dum sputum adhuc biliosum est,
suppuratur, perniciose valde sunt, siue biliosum illud in par-
te, siue simul cum pure expuatur: & hoc potissimum si mor-
bo ad septimū diem progressso, suppuratio ab hoc sputo pro-
cedere incipiat. Timor autē est eum qui talia expuit, mori-
turum esse decimaquarta die, si non aliquod bonū signū ipsi
acciderit. Sunt autem bona hæc, facile ferre morbum, bene
spirare, à dolore liberatum esse, sputum facile tussiendo reij- E
cere, corpus æqualiter calidum ac molle apparere, sitim non
habere, vrinas & alui egestionem, & somnos, & sudores, velut
descriptum est: hæc singula nosse conuenit accidere vt quæ
bona sint. Nam omnibus his sic contingentibus, homo non
moriatur. Si verò aliqua ex his accesserint, aliqua non, non
ampliore tēpore vita producta, decimaquarta die homo pe-
ribit. Porro mala signa his contraria sunt: agrē ferre mor-
bum, spiritum magnum & densum esse, dolorem nō sedari,
sputum vix tussiendo reicere, valde sitire, corpus inæquali-
ter à febris teneri, ventrem quidem ac costas fortiter calidas
esse, frōtem verò & manus ac pedes frigidos. Vrinas autem
& alui egestionem, & somnos, & sudores, velut descriptum est:
hæc singula nosse oportet mala esse. Si enim ita accesserit F
horum aliquid ad sputum, peribit utiq; homo priusquam ad
decimumquartū diem peruenerit, aut nono die, aut vndeci-
mo. Sic igitur coniecturam facere oportet, quòd hoc sputum
lethale sit valde, & non perducatur ad decimumquartū diem.
Proinde & mala & bona signa expendentem ex his prædi-
ctiones facere oportet. Ita enim potissimum veritatē conse-
qui quis poterit. At verò aliæ suppurationes rumpuntur
plurimæ quidem vigesimo die, aliæ verò trigesimo, aliæ qua-
dragesimo, aliquæ verò ad sexaginta dies perueniunt. Con-
siderare verò futuræ suppurationis principium oportet, sup-
puratione facta ab ea die qua primū homo febricitauit, aut
si fortē ipsum primū rigor apprehēdit: & si pro dolore gra-
uitatem sibi factam esse dixerit, in eo loco in quo dolebat.

Hæc

- A** Hæc enim in principiis suppurationum fiunt. Ex his igitur temporibus eruptionem suppurationū fore expectare oportet ad prædicta tempora. Si verò suppuratio fuerit in altero latere solum, vertere & considerare oportet in his, num aliquem habeat dolorem in altero latere, & an alterum altero sit calidius: & reclinato ægro in latus sanum interrogare ipsum, an videatur ipsi graue quid ex superno latere incumbere. Si enim hoc fuerit, in altero est suppuratio, in quo grauitas affuerit. Cæterum omnes suppuratos ex his signis cognoscere oportet. Primum quidem si febris nō dimittit, sed per diem quidem tenuis est, noctu verò amplior: & sudores multi oboriuntur, tussēsque, ac tussendi promptitudo ipsis adest, & nihil memorabile expuūt: & oculi caui fiunt, & maxillæ ruborem contrahunt, & vngues quidem manuum curuantur, digiti verò calescunt, & potissimum summi: & in pedibus tumores fiunt, & cibos nō appetūt, & pustulæ per corpus enascuntur. Quæcunque igitur suppurationes diuturnæ sunt, hæc signa habent, & fidem ipsis valde habere oportet. Quæ verò breues sunt, ex his signis cognoscere oportet, si quid apparuerit ex his, qualia in principiis fiunt. Simul autem & si aliquanto difficiliter spirauerit homo. At verò quæ ex ipsis citius & tardius rumpuntur, his signis cognoscere oportet. Si quidē enim dolor in principiis fiat, & spirandi difficultas, & tussis, & sputatio perseverans, ad vigesimum diem pertingat, eruptionem tūc expectare oportet, aut etiā prius.
- C** Si verò quietior fuerit dolor, & alia omnia pro huius ratione, eruptio posterius expectanda est. Necesse verò est accedere & dolorem, & spirandi difficultatem, & sputationem, ante puris eruptionem. Ex his autem maximè superstites manent hi quos febris eodem post eruptionem die dimiserit: & qui cibos citò appetiuerint, & à siti liberati fuerint: & si vëter parua & compacta egresserit, & pus album & leue & eiusdem coloris fuerit, & à pituita liberum, & citra dolorem ac tussim fortem repurgetur. Ac optimè quidē sic ac celerimè liberātur. Sin minus, hi quibus proxima his cōtigerint. At verò intereunt hi quos febris non dimiserit, aut vbi ipsos dimisisse putata fuit, rursus recalescens apparuerit: & qui sitim quidem habuerint, cibos autem non appetiuerint, & si vëter liquidus fuerit, & pus pallidum siue viride, & liuidum

Suppurato
rū cognitio

Ff

expue

Hippocratis Liber

**Tubercula
aurium.**

expuerint, aut pituitosum & spumosum. Si hæc omnia conti-
gerint, pereunt. Quibus verò ex his quædã accesserint, quædã
non, horum aliqui intereunt, aliqui in multo tẽpore superstites
euadunt. Verũ ex omnibus signis quæ adsunt, tum in his, tũ
in aliis omnibus coniecturã facere oportet. Quibuscunque
ex inflammati pulmonis morbis, abscessus circa aures fiunt,
& suppuratur, aut ad infernas partes, ac fistulatur, hi supersti-
tes euadunt. Verũ huiusmodi sic cõsiderare oportet. Si & fe-
bris detinuerit, & dolor non sedatus fuerit, & sputũ pro ra-
tione nõ prodierit, neq; biliosa, neq; soluta faciles, & mera-
ca alui egestionis fuerint, neq; vrina valde multa, & multã
subsidentiam habēs: indicatur autẽ superstes futurus ab om-
nibus reliquis salutaribus signis, tũc abscessus huiusmodi fo-
re sperandũ est. Fiunt autẽ partim ad infernas partes, quibus
videlicet inflãmatio aliqua circa præcordia affuerit: partim
in supernis, quibus præcordiũ molle & doloris exors permã-
serit, & vbi spirandi difficultas, quæ per tẽpus aliquod affuit,
desierit citra aliã manifestã causã. Ceterũ abscessus ad cru-
ra, in pulmonis inflãmationibus fortibus ac periculosis, om-
nes quidẽ vtilis sunt, optimi verò sunt, qui dum sputũ iã in
mutatione est, fiunt. Si enim tumor & dolor fiat, sputo pro fla-
uo purulento fiẽte, & foras procedẽte: ita securissimẽ homo su-
perstes euaserit, & abscessus absq; dolore celerrimẽ sedabi-
tur. Si verò sputũ nõ bene processerit, neq; vrina subsidentiã
bonã habēs apparuerit, periculũ est claudum fore articulũ,
aut multum molestiarũ exhibitarũ. At si euanescat & recur-
rant abscessus, sputo non prodeũte, febrẽq; permanente hor-
rendum est. Periculũ enim est ne dellyret homo & moriatur.

Ex suppuratis à pulmonis inflammatione, seniores magis
intereunt. Ex aliis autẽ suppurationibus, iuniores magis mo-
riuntur. Dolores cum febre fientes circa lumbos & infernas
partes si septũ transuersum attigerint, infernas partes relin-
quẽtes, perniciosi valde sunt. Proinde aliis quoq; signis ani-
mũ aduertere oportet. Nam si quod etiã ex aliis signis malũ
apparuerit, desperatus est homo. Si verò afsiliẽte ad septum
trãsuersum morbo alia signa nõ mala accesserint, hũc suppu-
ratum fore multa spes est. Quicunq; verò suppurati vrũtur,
quibus quidem purum pus fuerit, & album, & nõ foetidum,
hi seruantur: quibus autem subcruentum, & cœnosum, hi pe-
reunt

A reunt. Porro vesicæ duræ & dolētes, penitus quidē horrendæ ac perniciosæ sunt, perniciosissimæ verò quæ cū febre conti- **Ex vesica**
 nua sunt. Etenim dolores ab ipsīs vesicis ad occidendū suffi- **notæ.**
 ciunt, & alui nō egerunt hoc tempore, nisi durū quiddam, &
 hoc coactæ. Soluit autē vrina purulēta micta, quæ albā ac le-
 uem subsidentiā habet. Si verò neq; ab vrina quicquā remi-
 serit dolor, neq; vesica molliatur, & febris continua fuerit, in
 primis circuitibus morbi ægrū moriturū esse timor est. At-
 que hic modus potissimū pūeros corripit septēnes, donec ad
 quintumdecimū annum peruenerint. Febres iudicantur in **Febriū de-**
 iisdem numero diebus, ex quibus & superstites euadunt ho- **cretoria.**
 mines, & ex quibus pereunt. Etenim placidissimæ febres, &
B signis securissimis nitētes, quarto die desinūt, aut prius. Ma-
 lignissimæ verò, & signis horredissimis fiētes, quarto die aut
 prius occidunt. Primus igitur ipsarū insultus sic desinit. Se-
 cundus autem, ad septimum producit. Tertius ad vndeci-
 mum. Quartus ad decimū quartum. Quintus ad decimū se-
 ptimum. Sextus ad vigesimum. Hi igitur imperus ex acutis-
 simis morbis, per quatuor ad viginti, ex additione desinunt.
 Non potest autem quicquam horum integris diebus exactē
 numerari. Neq; enim annus, & menses, integris diebus nu-
 merari possunt. Postea verò eodem modo iuxta eandem ad-
 ditionem, primus circuitus quatuor & triginta dierū est, se-
 cundus quadraginta dierum, tertius sexaginta dierum. At in
 horum principiis difficillimū est cognoscere eos qui in plu-
C rimo tēpore iudicabuntur. Simillima enim sunt ipsorū prin-
 cipia. Verū a primo die animaduersionem facere oportet,
 & prout singuli quaternarij adduntur considerare, & non la-
 rebit te quo verteretur morbus. Fit autem & quartanarum fe-
 brium cōstitutio ex huiusmodi ordine. Qui porro morbi in
 breuissimo tēpore iudicabuntur, faciliores cognitu sunt. Ma-
 ximæ enim differentiæ ab initio ipsīs sunt. Qui enim super-
 stites ab ipsīs euasuri sunt, facilē spirantes, & doloris exortes
 sunt, & noctu dormiunt, aliāque signa securissima habent.
 Qui verò morituri, ægrē spirātes fiunt, delirātes, vigilantes,
 aliāque signa pessima habentes. Vt igitur his ita contingen-
 tibus, cōiectare oportet, & iuxta hoc tempus, & iuxta vnā-
 quamq; additionem, tendentibus ad iudicationem morbis.
 Iuxta eandem rationē mulieribus quoq; iudicationes fiunt

Hippocratis Liber

ex partu. Capitis dolores fortes & continui cum febre, si D
 Capitis do- quidem lethaliū signorum quid accesserit, perniciosi val-
 lor assidu⁹ de sunt. Si verò absq; talibus signis, dolor viginti dies trāsmi-
 quādo ma- ferit, & febris tenuerit, sanguinis à naribus eruptionē, aut ab
 lus. scessum quen dā ad infernas partes expectare oportet. Sed &
 quā diu dolor recens fuerit, similiter sanguinis è naribus
 eruptionem, aut puris eruptionē sperare cōuenit, cum aliās
 tum si dolor circa tēpora & frontē fuerit. Verū sanguinis
 eruptio magis expectanda est iunioribus trigintaquinque
 Annis, senioribus verò puris eruptio. Auris dolor acutus cum
 Auris do- febre cōtinua ac forti, horrendus est. Periculum est enim de-
 lor. lyraturum esse hominē, ac periturū. Proinde quum hic mo-
 dus minimē tutus sit, cito mentem aduertere oportet etiam E
 aliis signis, à primo statim die. Pereunt autē iuniores homi-
 nes septimo die, & adhuc citiūs, ex hoc morbo. Senes verò
 longē tardius. Nam & febres & delyria minūs ipsis accidūt,
 & hac de causa aures antea suppurantur. Verū his quidem
 ætatibus recidiuæ morbi contingentes, plurimos occidunt.
 At verò iuniores priusquā suppuretur auris, pereūt. Nam
 si pus albū effluxerit ex aure, spes est iuuenē superstitem eua-
 surum esse, si sanē & aliud quoddam bonū signum ipsi acce-
 Fautiū ex- dat. Fauces exulceratæ cum febre, horrendæ sunt. Verū
 ulceratio. si quod aliud item signum accedat, ex his quæ antea mala ef-
 se iudicata sunt, in periculo hominem versari prædicendum
 est. Anginæ liorrendissimæ sunt, & citissimē accidunt, quæ F
 Anginæ neque in faucibus quicquam conspicuum faciunt, neque in
 varietas. ceruice: verū plurimum dolorem exhibent, & erecta cer-
 uice spirationem inducunt. Hæ enim eodem die suffocant,
 secundo item ac tertio & quarto. Quæ verò alioqui similiter
 dolorem exhibent, attollūtur autem, & in faucibus rubores
 faciunt, perniciosæ quidem valde sunt, verū prioribus ma-
 gis diuturnæ, si rubor fuerit magnus. Quibuscunq; verò fau-
 ces & ceruix simul rubuerint, hæ anginæ diuturniores sunt,
 & ex ipsis maximē euadunt, si & ceruix, & pectus ruborem
 Erysipelas habuerit, & erysipelas ignis sacri non intro recurrerit. Si ve-
 rò neque in diebus iudicatoriis dissipetur erysipelas, neque
 tuberculum ad externam partem conuertatur, neq; pus tuf-
 fiendo reiiciat, facilēq; ac sine dolore degere videatur, mor-
 tem significat, aut ruboris recidiuam. Securius est autem tu
 morem

- A** morē & ruborē quā maximē foras verti. Si verò ad pulmonē vertatur, & delirium inducit, & quidā ex ipsis suppurati plerunque fiunt. Gurguliones periculosi sunt ut & rescentur, & scarificentur, quā diu rubicundi fuerint & magni. Nam inflammationes ad hos succedunt, & sanguinis eruptiones. Quare tales aliis machinamentis attenuare conari oportet hoc tēpore. Quum verò totum iam fuerit secretum, quod sanē vuam appellāt, & fiat extrema gurgulionis pars maior & rotunda, superior autem tenuior, in hoc tempore tutum est rem aggredi. Præstat tamen & aluo subducta, chirurgia hac uti, si & tempus permittat, & homo non stranguletur. Quibus febres cessant, neque signis solutoriis apparentibus, neque in diebus iudicatoriis, his reuersuras esse expectandum est. Quæcunque febris longiorem moram traxerit homine alioqui ad salutem disposito, ita ut neque dolor teneat ob inflammationē, aut ob aliquam aliam manifestam causam: huic abscessum expectare oportet cum tumore ac dolore ad aliquem articulum. vel maximē infernum. Fiunt autem huiusmodi abscessus magis, & in breuiori tēpore, his qui iuniores sunt triginta annis. Expectare verò statim oportet abscessum si febris detinens viginti dies transmiserit. Senioribus autē minus fiunt, diuturniore etiam existente febre. At verò huiusmodi abscessum expectare oportet febre continua existente. Verum ad quartanam deducetur, si intermiserit, & erroneo modo apprehenderit, & si hæc faciens ad autumnū
- C** appropinquarit, Quemadmodū autem iunioribus triginta annis abscessus fiunt: Ita quartanæ magis his qui triginta sunt annorum, & senioribus. Cæterum hæc nosse expedit abscessus magis hyeme fieri, tardiūque cessare, & minus recurrere. Quicumque verò in febre non lethali, dixerit sibi caput dolere, aut etiam præ oculis obscurum quiddā apparere, si & osculi ventris morsus huic accesserit, ei biliosus vomitus aderit. Si verò etiam rigor accesserit, & partes infra præcordium frigidas habuerit, citius adhuc vomitus aderit. At si quid biberit aut ediderit sub hoc tempus valde cito vomet.
- Porrò quibus horum dolor fieri inceperit primo die, hi quarto magis quā quinto premuntur: septimo verò liberantur. Plerique tamē ipsorum tertio die dolere incipiunt, vexantur autem maximē quinto, liberantur nono, aut vndeci-

Hippocratis Liber

mo. Qui verò incoeperint quinto die dolere, aliâque iuxta D
ratione priorum ipsis fiant, his ad decimū quartum morbus
iudicatur. Fiunt autē hæc & viris, & mulieribus maximè in
tertianis. Iunioribus verò fiunt quidem & in his, verū ma-
gis in continuis febribus, & in sinceris tertianis. Quibus-
cunque verò in huiusmodi febre caput dolentibus, pro eo
quod obscurum quiddam præ oculis appareat, visus hebetu-
do contingit, aut splendores ob oculos obuersantur: & pro
osculi ventris morfu, in præcordiorū dextra aut sinistra par-
te aliquid tenditur, neque cum dolore, neque cum inflamma-
tione: sanguinem de naribus his, pro vomitu fluxurum esse
expectandum est. Magis tamē & hic in iuuenibus sanguinis
eruptionem expectare oportet, his autem qui triginta sunt E
annorum, & seniores adhuc, minus: verū vomitus in his ex-
pectari debent. At verò pueris conuulsiones fiunt, si febris
fuerit acuta, & venter non egresserit: & vigilarint, & terreantur,
& eiularint, & colore mutarint, & viridē siue pallidum
aut liuidū, aut rubrū cōtraxerint. Fiunt autē hæc promptis-
simè quidem pueris nuperrimè editis, vsq; ad septimum an-
num. Seniores autem pueri, & viri, non amplius in febribus
corripiuntur cōuulsionibus, si non quid ex signis fortissimis
ac pessimis accesserit, qualia sanè in phrenitide fieri solent.
Perituros porrò & superstites futuros, tum pueros, tū alios,
ex omnibus signis coniectare oportet, prout singula de singu-
lis perscripta sunt. Atque hæc & de acutis morbis, & de his
qui ex ipsis fiunt, dico. Qui verò rectè prænosceat, & F
superstites futuros, & morituros: & quibus per plures dies,
& quibus ad pauciores morbus duraturus est: eum signa om-
nia ediscere, & iudicare posse conuenit, ita vt vires ipsorum
inter se conferendo expendat, quemadmodum perscriptum
est: & de aliis, & de vrinis, & de sputis, vbi simul & pus & bilē
ærotus tussiendo reiecerit. Quin & impetus morborū sem-
per populariter grassantium cito animaduertere oportet, &
temporis cōstitutionem non ignorare. Probè tamen id nosse
expedit de coniecturis certis, & aliis signis, & non ignorare
quòd in omni anno, & omni tēpore, mala malū, bona bonū
significant. Nam & in Libya, & Delo, ac Scythia, præscripta
signa vera comperiuntur. Proinde sciendum est, minimè dif-
ficile esse, in iisdē regionibus posse aliquem pleraq; ex ipsis
assequi

Libya, De
los, Scy-
thia pro o-
mnibus po-
santur.

A assequi, si memoria tenens ipsa, iudicare ac rectè expendere sciat. Cæterum nullius morbi nomen desiderare oportet, quod hic non est adscriptum. Omnes enim qui in prædictis temporibus iudicantur, ex iisdem signis cognosces.

HIPPOCRATIS

COI PRÆDICTIONVM,


LIBER I. IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

B



Oporosi in principiis fientes, cum capitis, lumborum, præcordij, colli dolore, vigilantes, num phrenitici sunt? Nasus in his destillans perniciosus, tum alias, tum quarto ab initio die. Alui proluuium valde rubicundum, malum quidem est in omnibus morbis, non minimè verò in prædictis. Linguae asperæ & resiccatae, phreniticae. Inturbatis vigilantibus, urinae decolores, nigrae, innatantes, in sudoribus, phreniticae. Insomnia etiam in phreniticis manifesta sunt. Sreatio frequens, si sanè & aliud quoddam signum affuerit, phrenitica sunt. Qui relinquuntur in præcordio ardores, febre perfrigerata, mali sunt, tum alias, tum in sudoribus. Prædubitatorum desipientia pessima, velut etiam Thrasynonti. Phreniticae vehementes affectiones, tremulae desinunt. Vomitus. Vomitibus in capitis doloribus aruginosi, cum surditate & faucium dolor. Vigiliis, cito insaniam affore denuncient. Loci circa fauces in acutis morbis dolorosi, graciles, parui, suffocatorii, quando hiarit ager ut os claudere & aperire non facile possit, mentis emotionem portendunt. Ex talibus phrenitici fiunt, & perniciosè affecti. In phreniticis in principio mansuetudo. Verum frequenter transmutari, malum id est, & sputatio mala est. In phreniticis alba alui egestio malum: quemadmodum & Archecrati. Num & in his torpor fit? Riliu cace. gor in his pessimus. Quibus melancholico modo mente thes.

Ff 4

motis

Hippocratis Liber I.

**Pariale si-
gnum. . .
Hermozy-
gas.**

**Tinnitus
auris qua-
lis.**

**Linguae
spasmi.
Linguae
tremor.**

**Oletula
spumosa.**

**Singultus
quado ma-
lus.**

**Vocis in-
terceptio-
nes.**

**Aristago-
ras.**

**Vrinae clan-
destinae.**

**Hermip-
pus.**

**Surditas
malum in
his.**

**Didymar-
chus.**

motis, tremores accedunt, malignum hoc est. Mente moti D
acutè, vbi insuper febrierint, cum sudore phrenitici fiunt.
Phrenitici paucibili, strepitum valde percipientes, tremuli.

Ex vomitu nauseabundo oborta, clāgorosa vox, oculi puluil-
lim incumbentem habentes, insaniam portendunt: quem-
admodum etiam Hermozygæ vxor, insania acutè correpta,
voce destituta mortua est. In febre ardenti sonitibus auriū

accedentibus, cum visus hebetudine, & grauitate in naribus
accedente, melancholico modo mente mouentur. Mentis

perculsiones cum voce clangorosa, linguae conuulsiones tre-
mulae: & voces tremulae fientes, mortem alienāt. duricies in

his perniciosa est. Linguae tremulae signum sunt mentis non
firmæ. In biliolis meracis alui egestionibus, spumosa floru- E

lentia malum alias, tum si cui lumbi antea doluerint, &
mente motus fuerit. Rari circa latus in his dolores, desipien-
tiam significāt. Vocis interceptiones cum singultu pessimæ.

Vocis interceptiones cum exolutione pessimæ. In vocis
interceptione, spiritus veluti his qui stragulantur præ ma-
nibus expositus, malus est. Num & talis mentem emouet?

Modicè feroces mentis emotiones, ferinae sunt. Molestè
ferre morbum cum perfrigeratione, si non sine febre exsu-
dent partes supernæ, phrenitim portendit: quemadmodum
etiam Aristagoræ. Sed & perniciosum hoc est. Frequentes
in phreniticis permutationes, conuulsoriae. Vrinae quæ min-
guntur à non recordantibus, nec commonefactis, pernicio-
sæ. Num his minguntur velut si subsidentiam conturbasses? F

Palpitantes per totum, num voce destituti moriuntur? Spu-
tationes in phreniticis cum perfrigeratione, nigrae reuo-
muntur. Surditas, & vrinae non confidentes, valde rubicun-
dæ, innatantes, mentis emotionem portendunt. His morbo
regio corripī malum est. Mala est & ex morbo regio fatui-
tas. Hos voce quidē destitui, verū sentientes esse contingit.

Arbitror autem & aluos his perrūpere, velut contigit Her-
mippo, & mortuus est. Surditas in morbis acutis & turbu-

lensis consequens, mala. Mentis emotiones tremulae, obscu-
ræ, palpatoria, valde phreniticæ sunt. Velut & Didymarcho

in Co. Torpores ex rigore, non valde apud seipsos sunt. Do-
lores circum vmbilicum palpitantes, habēt quidem aliquid
quod mentem emouet. Verū circa iudicationem his spiri-
tus

Arus aceruatus cum prompta tēſione penetrat. Et dolores circa ſuram, in his mentis emotionem faciunt. Si innatarit quid in vrina, dolore circa femur diſſipato, mentis emotionem portendit. & qualia circa aurium ſonitus contingunt, talia exiſtunt. In aluo liquida, laſſato, caput dolēti, ſiticuloſo, vigilantī, obſcure loquenti, impotenti, quibus talia ſunt, hiſtimor eſt vt mente moueantur. Exudantes & maximē circa caput, in morbis acutis ſubmoleſtē ferentes, malū, tum alias, tum in vrinis nigris. & turbidis ſpiritus in his malus.

Impotentia præter vacuatorum vaſorum rationem cōtingentes, non exiſtente vaſorum vacuatione, malum. Alui interceptæ, ſed parua, nigra, velut caprarum ſtercora ad neceſſitatem coactē emittentes, naſus in his erumpens, malum.

B Quibus lumborum dolor diutinus, cum ardore ſtudioſo ac nauſeabundo, hi ſi exudent, malum eſt. Num hiſ tremores ſiunt? Sed & vox velut in rigore conſpicua? Extremitates ſi in vtranque partem cito tranſmutentur, malum eſt. Et ſiſtis huiuſmodi, mala eſt. Ex moderato ferox reſponſio, malum. Vox acuta, hiſ præcordia intro trahuntur. Oculus hebes, malus: & fixus accaliginofus, malus. Vox acuta clangoroſa, mala. Dentium ſtridor pernicioſus eſt, quibus non & ſanis familiaris eſt, Suffocatio in his valde mala. Faciei bonus color, & vehemens toruitas, malum. Egeſtiones alui deſinentes in ſpumofas meracas, exacerbatoria ſunt. Vrinarum in morbis acutis ex perfrigeratione interceptiones,

Vox acuta.
Dentium
ſtridor.

C peſſimæ. Pernicioſa ſi citra ſigna, leuia facta fuerint, mortem ſignificant. In morbis acutis bilioſis valdæ albæ, ſpumofæ, circumbilioſæ egeſtiones, malæ. Malæ item & vrinæ eiufmodi. Num hiſ hepar doloroſum eſt? Vocis interceptiones in febribus conuulſorio modo ſientes, ad mentis emotionem cum ſilentio deueniunt, pernicioſum. Vocis ex dolore interceptiones, doloroſam mortem inducunt. Febres ex præcordiorum doloribus malignæ. Siſtis præter rationem ſoluta in acutis morbis, mala eſt. Sudor multus cum febribus acutis ſiens, malus eſt. Et vrinæ doloroſæ, malæ ſunt.

Lotij interceptio.
Mortis ſignum.
Silentiū in febribus pernicioſum.

Siſtis.
Sudor.
Vrinæ mala.

Et rubicundæ ex hiſ florulentia detentæ, itémque æruginofæ, malæ ſunt: & paruas apparere veluti ſtillas. Et vomitus cum varietate, mali ſunt, tum aliàs, tum ſi propius inter ſe prodeant. Quæcunq; in diebus iudicatoriis, cum an-

Vomit.
malus.

Sopor.
Ignorantia.
Oblivio.

Oculi di-
stortio.

Qui cito
moriuntur.
Collidolor
pessimus.

Perfrigera
tio.

Pernicies
fœminarū.

xietudine, absque sudore perfrigerantur, malum est: Et quæ D
ex his insuper riguerint, mala sunt. Vomitus meraci, an-
xioli, mali. Sopor num vbique malus est. Ignorantia cum
rigore, malum. Malum item obliuio. Perfrigerationes ex
rigore non recalescentes, malæ sunt. Sudantes ex perfrige-
ratione recalescentes, malum. In his ardor dolorosus in late-
ribus, & insuper rigere, malum est. Aestuarii rigores aliqua-
tenus perniciosi: & flammea facies cum sudore in his mala
est: In his posteriorum partium frigiditas, conuulsionem ac-
cerfit. Exudantes vigilantes recalescentes, malum. Ex lum-
borum recurso, oculi distortio malum. Dolor in pectus fir-
matus cum torpore, malus. Hi si insuper febriant, acutè ardē
tes, moriuntur. Qui nigra reuomunt, cibos auersantur, de- E
liri sunt, iuxta pubem parum dolorosi, oculum ferocem aut
clausum habent, eos medicamentis purgare nō oportet. Per-
niciosum enim est: Neque intumescētes, vertiginosos, in le-
uiter vagando deficientes, cibos auersantes, decolores. Ne-
que in febre fractos, si soporosi fuerint. Perniciosum enim
est. Oris ventriculi dolor, cum præcordio distento, & ca-
pitis dolor, malignum, & quidpiam anhelosum. Num hi re-
pente moriuntur, velut in Dysode. Huic etiam vrinæ vehe-
menter fermentatæ, erant valde rubicundæ. Colli dolor
malum quidē in omni febre, pessimum autem his quibus ti-
mor est vt insaniant. Febres soporosa, lassatoria, caliginosa,
vigilias inducentes, exudantes, malignæ. Horrores frequen-
tes ex dorso, celeriter translabentes, molesti, vrinæ interce- F
ptionem dolorosam significant. Qui auxiē se iactantes, ci-
tra vomitum exacerbatur, male habent. Perfrigeratio cum
duricia signum malum. A ventre tenuia non sentienti pro-
dire, ei qui est apud seipsum, perniciosum: velut Hepatico.
Vomitiones exigua biliosa malæ, tum aliàs, tum si insu-
per vigilauerint ægri. Nasus in his destillans, perniciosum
est. Quibus ex partu alba detinentur cum febre, surditasque
adeft, & in latere dolor acutus, hæ perniciose mente mouen-
tur. In febribus ardentibus subperfrigerantibus, egestio-
nibusque alui biliosis aquosis frequentibus, oculorū distor-
tio signum malum est, tum aliàs, tum si stupore prehensi de-
tineantur. Siderationes repentinæ ei qui exolutè ac diu-
tinè insuper febriit, perniciose sunt: quale quiddā passus est
Numenij

A Numenij filius. Ex lumborum dolore ad os ventriculi recursiones, febriculosæ, horridæ, reuomentes aquosa tenuia multa, mente motæ, voce destitutæ, nigrorum vomitu facti moriuntur. Oculi confractio in morbo acuto mala. Num anxie se iactantibus citra vomitum, lumbos dolentibus, si ferociter mente moti fuerint, spes est ut nigra per aluum prodeant? Fauces dolorosæ, graciles, cum ægrè tolerabili molestia, strangulatoria, perniciosæ acutè. Quibus spiritus retrahitur, vox autem strangulatoria est, & vertebra intro consideret, his in fine velut contrahente quodam spiritus fit. Caput dolentes, & stupore detenti delirantes, alio intercepta, oculum ferocem præ se ferentes, florescentes, opisthotono posteriorum partium conuulsoria distentione corripiuntur.

Numenius.

Oculi confractio.

Dolor faucium.

Capitis dolor.

B In oculorum distortionem, febriculoso, lassato, rigor perniciosus. Et soporosi in his, malum. In febribus ad præcordiū dolores, sine voce, si sudore non soluantur, maligni sunt. His dolores ad coxas, vna cum febre ardente, & si aluus aceruatim eruperit, perniciosum. Quibus voces cum febribus deficientes post iudicationem, hi tremantes ac soporosi moriuntur. Quibus affectiones ardentes, fatuitatem inducentes, stuporis detentionem inferentes, præcordia variantia, & ventris tumor, cibis interceptis, in sudoribus: Num his turbidus spiritus, & genituræ simile quid superueniens, singultum indicat? Sed & aluus spumosa, biliosa, insuper egerit? Splendidum in his mictum prodest. Venter autem his insuper turbatur. Quibus sopor fit spumosis prodeuntibus, his febris exacerbatur acuta. Ex capitis dolore vocis interceptiones si sint, cum sudoribus febriculosi laxantur in seipso, fiuntque morbi reuertentes diutius durantes, His insuper rigere, non malum est. Manus tremulæ, caput dolentes, collum dolentes, subfurdi, mingentes nigra densata: quibus hæc sunt, his nigra ventura esse expectare oportet, perniciosum. Vocis interceptiones cum exolutione, stupore detinente, perniciosæ. Lateris dolor, ex sputis biliosis, citra rationem si euauerit, mente mouentur.

Oculorum distortio.

Præcordiorum dolor.

Manus tremulæ.

Lateris dolor.

Ex colli dolore, soporoso, sudanti, aluus inflata, si sanè ad necessitatem liquida demiserit, infuso immisso sublata: ex his ea quæ biliosa non sunt supprimuntur. Talia verò si seruentur retenta, longius ægrotat. Num itaque pro

Cervicis dolor cum sudore.

Hippocratis Liber I.

que proluuia quæ biliosa non sunt, meliora sunt? & flatuoso tumori profuerint? Alui circumtentio, ad necessitatem liquida demittens, cito intumescens, habet quid conuulsorium, velut etiam Aspasij filio. Superrigere his perniciosum. Ex his conuulsus factus ac inflatus, vbi diutius ægrotasset, ori putrefactio viridis superuenit. Quibus circa lumbos tenues diuturni dolores, ad præcordium se reuoluentes, & ciborum fastidium inducētes vnà cum febre: his ad caput dolor intentus progressus, repente conuulsorio modo occidit. Affectiones insuper rigentes, & quæ ad noctem aliquāto magis exacerbantur, cum vigiliis, & delirio in somnis, aliquando vrinas inuoluntariè emittentes, in conuulsiones soporosas desinunt. A principio exudantes vrinis coctis, ardentes qui citra iudicationem perfrigerantur, breui circum circa ardentes: Torpidi item, soporosi, conuulsi, perniciosè affecti sunt. Vrerum gerentibus capitis dolores, soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt. Fortassis autē his etiam conuulsorium quid pati contingit. In faucibus gracilibus dolores strangulatorij, habent quid conuulsorium, tum aliàs, tū à capite oborti, Velut etiam Thrasynontis consobrinæ. Tremores conuulsorij fientes in sudoribus, reueri solent. Iudicatio his fit vbi superriguerint. Superrigent hi ardore circa ventrem prouocati. Lumborum dolor, & capitis dolor, & oris ventriculi dolor, cum excreatione violenta, conuulsorium quid habet. A ventre subliuida, turbulenta: & lotia tenuia ac aquosa, suspecta. Fauces exasperatæ parum, & venter murmurans inanibus ad egerendum surrectionibus, & frontis dolores, & palpantes, delassati, in stragulis ac vestimentis dolorosi. Quæ ex his augentur, difficilia sunt. Somnus multus in his conuulsorius, & dolores in frontem graues, & mictio difficilis. Vrinæ suppressio quibus rigores, & in conuulsoriis affectionibus: velut & ipsa vbi inhorruit, sudauit. Meracæ desinentes purgationes, omnibus quidem exacerbatoriæ sunt. His verò etiā valde. Ex talibus etiam circa aurem abscessus exurgunt. Turbulentæ ferocissimæ è somno excitationes, cōuulsoriæ sunt tum aliàs tum cum sudore. Et colli, & dorsi perfrigerationes apparentes, sed & per totū corpus: In his etiā spumosa mictiones, vnà cum animi deliquio, & oculorum obscuratio, cōuulsionem

- A fionem propè adesse significant. Cubiti ac colli dolores conuulsorij. A facie autem hi. In faucibus sonitus frequentes, cū saluę sputatione. In his in somnis sudores, boni. Num & sudore leuari, plurimis non malum est? Dolores ad infernas partes, his toleratu faciles. In febribus exudantes caput dolentes, aluo intercepta, conuulsi fiunt. Subfriabiles liquidæ alui egestionēs, perfrigerātes non sine febre, malæ sunt. Rigores ex his vesicam & ventrem occupantes, dolorosi. Proinde soporem his habere aliquid conuulsorij, non sanè mirum apud me fuerit. Quæ in acutis vomitorio modo trahuntur, mala sunt. Et albæ alui egestionēs, difficiles, Non viscosa ex his progressa, cum multo ardore ad mentis emotionem perueniunt. Num ex his soporosi torpidi fiunt? Morbi ex talibus diutius durant. Num circa iudicationem hi arescentes difficile spirantes? Quæ ex lumbis ad collum ac caput progressa sunt, & leuis syderationis modo resolverunt, conuulsoria fiunt & mentem emouentia. Num & soluantur talia cōuulsione? Ex talibus variè agrotant, & per eadem progressi. Conuulsiones in his quæ ab vtero strangulantur sine febre, faciles sunt, velut etiam Dorcadi. Vesica intercepta tum aliàs, tum cū capitis dolore, habet quid conuulsorium. Quæ in his cum torpore exoluuntur, difficilia sunt, non tamen perniciofa. Num id quod tale est, etiam mentem emouet? Num & ossium circa tempora dissectiones, conuulsionem accersunt? aut si quis ebrius verberetur, aut sanguis multus effluat in principiis, non hoc facit conuulsionem? In sudore sputa defluentia febricitanti, leuia sunt. Num ad dies aliquot alui humectantur? arbitror. Num his ad articulos abscessus fiet? Quæ modicè ferociter mentem emouent, atrabiliaria sunt. Si verò à muliebrium purgationum retentione fuerint, ferina. Hæc verò sæpius accidunt. Num & cōuulsæ fiunt hæ? Num & vocis interceptiones cū sopore, conuulsoriæ sunt? velut coriarij filia, quæ muliebris purgationibus præsentibus affici cœpit. Quibus conuulsis oculi intentè relucēt, neque apud seipso sunt, & diutius agrotant. Sanguinis eruptiones ex contrario, malæ sunt: velut in splene magno si ex dextra nare fluat. Et circa præcordia eodem modo res se habet. Verum cum sudore hoc peius est. Ex naribus erumpente sanguine, cum exiguis sudoribus,

duobus, perfrigescentia maligna ac praua. Post sanguinis **D**
 eruptionē, nigrorum per aluum transi, us, malus. Prava sunt
 etiam valde rubra. Num verò quarto die hæc sanguinis eru-
 ptio contingit? Soporosi ex his conuulsione moriuntur.
 Num nigris prægressis, & ventre tumefacto? Vulnere san-
 guinem fundentia, exudantia, maligna. Sic affecti loquen-
 tes latenter moriuntur, Post modicam sanguinis eruptio-
 nem, & nigrorum egestionem, in acutis surditas malum.

Sanguinis egestio in his perniciofa. Verum surditatem
 soluit. Lumbis dolentibus oris ventriculi dolores acceden-
 tes, signa hæmorrhidum fluxionis futuræ sunt, Atbitror a u-
 tem & hos prægressæ hæmorrhoidum eruptionis signum
 esse. Sanguinis eiruptionem statis temporibus fientes, siticu- **E**
 losæ, difficiles ac exoluentes, si sanguinem non effuderint,
 in comitiales morbum finiunt. Morbi qui statim turbu-
 lenti sunt, insomnes, sanguinem de naribus stillantes, sexta
 die alleuati, noctu affligerunt, postridie exudarunt, in som-
 numque delati mentem emouerunt, hi largè sanguinē fun-
 dent. Num & aquosa vrina tale quid significat? Quibus san-
 guinis eruptiones plures, his temporis progressu alui malè
 afficiuntur, si non vrinæ concoctæ fuerint. In iudicato-
 riis perfrigerationibus, sanguinis eruptiones fortes pessimæ
 sunt. Capite grauati, iuxta sinciput dolentes, insom-
 nes sanguinē profundunt, tum aliàs, tum si quid ad collum
 contendat. Vigiliis infestati, derepente cum inquieta ia-
 ctatione, sanguinem fundunt, tum aliàs, tum si quid antea **F**
 perfluxerit. Num vbi inhorruerunt? Colli dolores, oculi
 valde rubicundi, sanguinis eruptionem significant. Qui-
 bus aluo suppressa sanguinis eruptio fit, & insuper rigent,
 Num aluus intestinorum leuitate corripitur, & obdura fit,
 aut ascarides insunt, aut vtrunque? Quibus ex lumbis re-
 cursus fit ad caput, & manus, hi stupidi, os ventriculi dolen-
 tes, saniosis ac serosis humoribus pleni, largè sanguinē pro-
 fundunt. Sed & aluus his turbulentis erumpit. Quibus ex
 sanguinis eruptione larga ac frequēti, nigrorum multorum
 sit egestio, hi suppressa aliud dolorosi sanguinē profundunt.
 Cum quadā verò fluxione, facillè ferunt. Numhi multos fri-
 gidos sudores excludunt? Conturbata in his vrina non ma-
 la, neque id quod genituræ simile in ipsa residet. Verum fre-
 quenter

A quenter hi aquosa mingunt. Quibus in surditate & torpore parua est à naribus destillatio, ea habet quid difficultatis. Vomitus his confert, & alui perturbatio. Quibus ex rigore febres cum lassitudine, his menses muliebres decurrunt. At collum in his dolorosum, sanguinis eruptionis è naribus signum est. Et per nares sanguinem effundere spes est, ea quæ caput concutiunt: Et quæ aurium sonitum faciunt, sanguinem profundunt, aut menses deducunt, tum aliàs, tum si iuxta spinam ardor consequetur. Fortassis autem & dysenteriam facient. Et circa ventrem palpitationes cum præcordij intentione sublonga ac tumentè, sanguinis eruptionem significant. Inhorrescunt autem hi. Quæ larga, violenta, multa ex naribus fluxerint, aliquando ad conuulsiones adducunt. Venæ sectio soluit. Frequentes & paulatim fientes ad egerendum surrectiones, subflauæ, viscosæ, modica stercoracea habentes, cum præcordiis ac lateris dolore, morbo regio participant. Num autem his suppressis hi exoluuntur? arbitror sanè, & sanguinem profundunt? His tensio lumborū, & dolores in his, sanguinis eruptionem significant. Præcordij tensio, cum capitis grauitate ac surditate, & quæ ad hæc consequenter diuexant, sanguinis eruptionem indicant. Undecimo die sanguinis stillicidia difficilia, tum aliàs, tum si superstillauerint. Qui in horroribus simul iudicatoriè exudarunt, postridie verò postquam inhorruerunt præter rationem vigilant, eos sanguinem effusuros esse arbitror. Quibus ab initio largæ sanguinis eruptiones, rigor fluxionem sistit. Ex sanguinis eruptione, rigores longi. Quibus capitis dolores, ac colli dolores, & totius corporis impotentia quædam, sanguinis eruptiones soluunt. Sed è tempore sic soluuntur. Vrinæ quæ in his qui iuxta aures abscessus habent, citò & modicè concoquuntur, malæ sunt. Et perfrigerari hoc modo malum est. Subsoporati, morbo regio affecti, non valde sentientes, quibus singultus, his aluus erumpit, fortassis & suppressa est. Hi exoluuntur. Num his etiam abscessus iuxta aures fiunt? Suppressæ cum rigore urinx malæ, tum aliàs, tum si antea sopor apprehenderit. Num iuxta aures abscessus parotides dictos, in his fore spes est? Ex terminoso subsidencia limosa subliuida, mala est. Num ex præcordiis dolet puto dexterum? & exoluitur? Num abscessus iuxta

Hippocratis Liber I.

iuxta aures talib⁹ parū dolorosi? Alius erūpens his in omni- **D**
 bus pernicioſa eſt. In anxioſis quibuſdā vigiliis abſceſſus cir-
 ca aures maximè. Ex voluulis graueolētibus, in febre acuta,
 præcordiis ſublimibus diutius permanētibus, abſceſſus cir-
 ca aures oborti occidūt. Ex ſurditate leniter abſceſſus circa
 aures fiūt, tum aliàs, tū ſi anxioſum quippiā ſuccedat, & ſopo-
 roſi: inter hos adhuc magis. Abſceſſus iuxta aures leniter ſy-
 deratis mali ſunt. Quæ cōuulſorio modo exacerbātur, cū ſtu-
 poris detētione, abſceſſus iuxta aures producūt. Cōuulſio, tre-
 mor, anxietas, cū ſtuporis detentione paruos circa aures abſ-
 ceſſus exacerbant. Num quibus abſceſſus ſunt iuxta aures, ca-
 pitis dolore affecti ſunt? Num & ſupernis partib⁹ exudāt, nū
 inſuper rigēt quoq; aliquo modo? Deinde & alius erūpit, & **E**
 ſoporofum quippiā habēt? Num & aquoſæ vrinæ alba inna-
 tantia habentes, & quæ variè exalbidæ ſunt, ac fœtidæ, abſ-
 ceſſus iuxta aures faciūt? Num quibus tales vrinæ, frequētes
 ſanguinis è naribus ſtillæ profluunt? num & lingua his leuis
 eſt? Quibus magnū & frequentem ſpiritū habentibus, mor-
 bus regius, & febres acutæ cum præcordiis duris perfrigera-
 tæ ſunt, num his abſceſſus magni ad aures conſiſtunt? So-
 poroſa, anxioſa, præcordia dolentia, vomitoria parua ſym-
 ptomata. In his abſceſſus iuxta aures oboriūtur. Antea verò
 & ea quæ circa faciem ſiunt. Aluo nigra ſtercorea egerente,
 ſopor inſuper apparēs, abſceſſum iuxta aures producit. Tuſ-
 ficulæ quæ ſunt cum ſputatione abſceſſum circa aurē ſubmo **F**
 uent. In capitis dolore ſopor & ſurditas, circa aurem abſceſ-
 ſum aliquem eructat. Præcordij diſtentio cum ſopore an-
 xioſo, ac capitis dolore, abſceſſus circa aurem attollit. Dolo-
 roſi aurium abſceſſus, citra iudicationē diſſipati, mali ſunt.

Tuſſicula
 aurium ab-
 ſceſſus mol-
 lit.

HIPPOCRATIS COI PRAEDITIONVM LIBER II. IANO CORNARIO MEDICO PHYSICO

interprete.

*

Medicor

Prædictionum.

413

A



Medicorum prædictiones narrantur multæ, Prædictio
& variæ, & admirandæ, quales ego quidem nes has do-
neque ipse prædixi, neque alium aliquem rider.
prædicere audiui. Sunt autem aliquæ ex ip-
fis huiusmodi. Hominem perniciose affe-
ctum esse, & medico ipsum curanti, & aliis
videri. Verùm medicum alterum superuenisse ac dixisse,
Non peribit hic homo, verùm cæcus euadet. Item ad alium
qui omnino malè habere videbatur, ingressum prædixisse,
hominem quidem euasurum esse, verùm manum claudam
habiturum, & ad alium quendam qu similiter superstes, fo-
re non putabatur, dixisse, ipsum quidem sanum fore, ve-
B rum pedum digitos nigrefactos putrefactione corruppen-
dos esse. Et aliæ huiusmodi prædictiones in tali prædi-
ctionis specie dicuntur. Alius autem prædictionis modus
est, ementibus ac negotiationes tractantibus prædicere,
aliis mortem, aliis insaniam, aliis alios morbos: & ad hæc
omnia, etiam ea quæ prioribus temporibus facta sunt, præ-
dicere, ac omnia vera narrare. Alia porrò adhuc forma
prædictionum est, athletas & eos qui morborum caussa
exercentur ac se fatigant cognoscere, si quid aut circa ci-
bum deliquerint, aut alteratum quippiam ederint, aut po-
tu vberiore vfi fuerint, aut deambulationem intermiserint,
aut res venereas quasdam exercuerint. Horum omnium
nihil illos latet, adeò vt etiam minima quæque, in quibus
C non paruerit homo, exactè cognoscant. Hi omnes prædi-
ctionum modi esse feruntur. Ego verò talia quidem non Quid præ-
vaticinabor, Verùm signa scribam, ex quibus & sanos fu dicendum
turos homines, & morituros coniectare oportet: & tum est.
breui tempore, tum longiore, sanos futuros, aut peritu-
ros. Scriptum est autem à me & de abscessibus, quomo-
do singulos considerare conueniat. Arbitror autem & eos
qui de claudicationibus prædixerunt, aliisque eiusmodi,
confirmato iam morbo prædixisse, & quum iam manife-
stum esset, quòd abscessus non esset recursurus, si modo in-
telligentiam habuerunt: multò sanè magis quàm prius-
quam abscessus fieri inciperet. Spero item & alia prædi-
xisse, magis humano more quàm refertur, quæ videlicet
ementibus & negotiationes tractantibus prædixisse dicun-
G g tur

Hippocratis Liber I I.

Per hæc e-
xēpla hæc
confirmat.

Prædictio
de mariscis

parcius
prædicto.

tur mortes, & morbos, & insanias. Atque hæc mihi videntur D
talia facta esse, & nulla mihi videtur esse difficultas prædi-
cendi, si quis circa talia studium ac curā adhibere velit. Pri-
mum etenim aqua inter cutem laborantes, & tabidos, quis
non cognouerit? Deinde deliraturi non diu latere possunt, si
quis nouerit quibus his morbus cognatus est, aut prius ali-
quando insanuerunt. Si enim hi homines ebriosi fuerint,
aut carnes vorauerint, aut vigilauerint, aut in frigore aut ca-
lore inconsideratè versati fuerint, multus timor est ex tali
victus ratione, ipsos deliraturos esse. Et eos qui hæmorrhoi-
das habent, si quis hyeme multo potu uti viderit, & bono
colore præditos, de his prædicere licet, quòd ad ver multa E
spes sit sanguinis eruptionis, ut & decolores & aquatici sub
æstatem fiant. Verum omnia hæc addiscere, ac prædicere
oportet, si quis in talibus studiis palmam ferre expetat. Li-
cet enim ex scriptis prædicere, & mortem, & insaniam, &
bonam habitudinem. Possem autem referre & alia mul-
ta huiusmodi, sed quæ facilima cognitu sunt, visum est mi-
hi scribere. Consulo autem ut quàm prudentissimè agant,
tum in reliqua arte, tum in huiusmodi prædictionibus, il-
lius probè memores, quòd si cui successerit prædictio, is a-
pud ægrotum intelligentia præditum in admiratione fue-
rit. Si verò quis aberrarit, supra hoc quod odio habetur,
fortasse etiam insanire videbitur. Quapropter iubeo ut tū
alias omnes, tum has prædictiones prudenter faciant: quan- F
quam sanè & audiam, & videam, neque iudicare rectè ho-
mines ea quæ dicuntur, ac fiunt in arte, neque narrare.

Ceterum de his quæ exercentur ac laboribus se fatigant,
cas asseuerationes quas afferunt hi qui ipsas asserunt, neque
esse puto, neque si quis putat, prohibeo. A nullo enim si-
gno, neque bono, neque malo, læduntur suspensiones, cui si-
gno fide habita quis sciat, an rectè pronunciatum sit, aut se-
cus: alioqui per me licet ut si quis velit credat. Non enim
ego impedimento sum. Arbitror autem si quid veri ab ipsis
dicitur, aut his qui de his qui exercentur, asseuerant, aut
illis cui prius scripti sunt: primum quidem hunc qui cogno-
uit, ex signis coniectasse. Deinde verò ambiguè & humano
more prædixisse: & simul eos qui id narrant, monstrosius
quàm factum fuit recensere. Nam neque in morbis facile est
peccata

A peccata cognoscere, etiam si decumbant homines, & victu pa- Diversitas
 rum nutriente utantur, ut non adeo multa intueri opus sit languentiâ
 eum qui hæc considerandi curam suscepit. Alij enim bibunt
 solum. Alij ad hoc quod bibunt, aut sorbitionem, aut cibum
 paucissimum assumunt. Necesse igitur est eos qui vberiore
 potu usi sunt, magis difficulter spirare, & plus urinae eiicere,
 Eos vero qui sorbitionem aut cibum auxerunt, magis & siti-
 re, & febrile. Si vero quis utrisque, & potu & cibo, immodi-
 cè usus fuerit, ad hoc quod febrit, & difficulter spirat, etiam
 ventrem circumtentum & maiorem habebit. Licet porro &
 hæc, & alia omnia experimentis optime explorare, quæ &
 habemus, & omnibus rectè utimur. Primum equidem & in-
 telligentia, & oculis cognoscere facile est, hominem in eo-
 dem loco decumbentem, & exacta victus ratione utentem, Varia ob-
 si non paruerit, aut obambulando, aut multa edendo. Dein- servatio.
 de qui manibus contrectavit ventrem ac venas, minus falli
 potest, quam qui non contrectavit. Et nares in febrienti-
 bus quidem, & multa & bene significant. Odores enim mul-
 tum inter se differunt. At vero insanis & recto victu uten-
 tibus, haud scio qua re vel in hoc experimento faciendo uti
 possim. Postea audiendo, vocem & spiritum auribus co-
 gnoscere datur, quæ in sanis non similiter sunt manifesta,
 sed qualiter etiam antea. Quod si etiam mores morbo- Quando
 rum ac ægrotorum didicerit medicus, non tamè quicquam non prædi-
 prædicere oportet. Non enim difficilius spirabit homo, cendum.
 morbo adhuc errante, & febriet acutiore febre, & venter
 intentus fuerit. Quare propter hæc non tutum est prædici-
 re priusquam statum accipiat morbus. Verum post hoc tem-
 pus, quicquid præter rationem acciderit, dicere oportet.
 Manifesta rerò sunt mala, quæ propter ægri inobedientiam
 sunt. Nam & spirandi difficultates, & alia huiusmodi po-
 stridie sedabuntur, si ob peccatum fiant. Si igitur quis hanc
 iudicationem considerans dixerit, non delinquet. Atque
 ego quidem hunc considerandi modum nunc consulo, tum Modus ob-
 de his qui domi manent, tum de his qui exercentur, itém- servationis
 que de aliis omnibus, qualia peccata committant. At exa- qua,
 etiam illam narrantes rationem & audio, & derideo. Quum
 enim parum inobedientes fuerint homines, haud scio quo-
 modo id deprehendere possim. Si vero maiora fuerint pec-
 cata,

Hippocratis Liber I I.

cata, quem in modum considerare oporteat, scribam. Oportet autem primum hominem, in quo quis per inobedientiam admissa cognoscere velit, per totum diem intueri, & in eodem loco, & eadem hora, sole praesertim recens orto, hoc enim tempore subeuacuatus fuerit, & adhuc ieiunus est, & nullo labore fatigatus est, praeterquam matutinis deambulationibus, in quibus minimè inobediens est, si sanè ubi de somno surrexit homo, ad deambulandum prodierit. Quare necesse est eum qui iusta victus ratione utitur, hac hora maximè aequaliter habere, & coloris, & totius corporis constitutionem.

Quae praeter ceteris obferuentur. Quapropter & is qui huius considerationis curam gerit, acutissimus fuerit & mente, & oculis, eo tempore. Contemplari praeterea oportet hominis mentem, & mores, & corporis vires. Alij enim alia facilius aut difficilius imperata faciunt. Primum igitur is cui inedia imperata est, si plura comederit & biberit, per haec manifestus fiet, & tumidius corpus ipsius apparebit, & plenius ac coloratius erit, si non excrementa alui malè ipsi processerint. Erit item animosior ad ferendum laborem. Considerandum etiam an ructum edat, aut à flatibus vrgeatur. Haec enim fieri solent his qui ita affecti sunt, propter hoc peccatum. Si verò dum edere multa cogitur, & fortiter laborare, aut cibum imperatum non ederit, aut ebrius factus fuerit, aut à cœna larga non obambulauerit, hoc modo explorare oportet. Si quidem cœnam non ederit, solito autem more deambulauerit, iucundiores aspectum praeseferet, & vegetior ac operosior in exercitiis erit. Verùm alui egestio modica & compacta maximè in hoc fuerit. Si verò cœna sumpta non deambulauerit, ructum utique edet, & flatuosus fuerit, & plenitudo non minor apparebit, & inter laborandum magis quàm antea sudabit, & difficulter spirabit, ac grauis erit, & transitus alui maiores, ac minus viscosi his fuerint. Quòd si neque cibum consumpserit, neque deambulauerit, pigrior utique fuerit ac tumidior. Si verò ebrius factus fuerit, sudabit magis quàm antea, & difficulter spirabit, & ipse seipso grauior erit ac humidior. Sed & laxior erit, si non caput ipsi affligatur. Quòd si vxore semel usus fuerit, vegetior utique erit, & magis solutus. Si verò saepius rem peregerit, durior euadet, & squallorem quendam habebit, & decoloratior ac magis lassa

Coitus
quid his fa-
ciat.

A lassatus erit. Porro egestionem alui procedere oportet his qui laboribus exercentur, quandiu parum ederint, ac parum potauerint, modicas & duras, atque hoc quotidie. Si verò tertio quoque die, aut quarto, aut ex longiore intervallo prodierint, periculum est aut febrim, aut alui profluvium corripiendos esse. Quæcumque verò egestionem liquidiores sunt, quàm ut in transitu conformentur, hæc sanè omnes peiores sunt. At vero his qui multum edunt, & multum laborant, egestionis transitum mollem, oportet esse liccum, & copiam ciborum ingestorum pro ratione laboris. Procedunt autem ab æquali ciborum copia, his quidem qui minimum laborant, plurimæ egestionem, his verò qui plurimum laborant, modicæ, si sani fuerint, & iuxta victus rationem utantur.

Oletum quale omnium esse debeat

B Nam ad hæc coniecturam facere oportet. Liquidiores autem egestionem, & sine febribus fientes, & quæ septima die, aut citius iudicantur, commodæ sunt, si semel una vice omnes fiant, & non reuertantur. Si verò insuper febrerint homines, aut alui profluvia redierint, si longa fuerint, penitus mala sunt, siue biliosa fuerint, siue pituitosa, siue cruda: & victus ratione propria, singula opus habent, itemque medicamentis alia aliis. Caterum urinam iuxta portionis copiam mingere oportet, & semper æqualem, & quæ maximè aceruatim, & momento paulo crassiorem, quàm id quod in potu acceptum fuit. Si verò fuerit aquosa, & copiosior quàm pro eo quod bibi imperatum est, significat hominem non obedire, sed copiosiore potu uti: Aut non posse renutrir, quàm diu talia urinam faciunt. Si verò paulatim stridat urina, aut medicamentis hominem opus habere significat, aut morbum aliquem circa vesicam habere. At sanguinem mingere, raro quidem & sine febre ac dolore, nihil mali significat, sed lassitudinum solutio sit. Si verò sæpius mingat, & aliquid ex his accesserit, malum est. Verum prædicere oportet, siue cum dolore mingatur, siue cum febre, fore ut insuper pus mingat, atque ita dolores ac afflictiones quiescant. Crassa verò urina albam subsidentiam habens, aut circa articulos dolorem aliquem, aut tumorem significat. Aliæ verò omnes subsidentiae in urinis eorum qui exercentur, à morbis circa vesicam sunt, id quod ipsi manifestum facient. Cum doloribus enim erunt, & tales ut difficulter quis ab ipsis liberari possit. Atque hæc

Lotium quale.

Sanguinis mistio.

Puris mistio.

Crassum lotium.

Hippocratis Liber I I.

Hydropi-
fis.
Phthisis.
podagra.
Morbus
sacer.

Qui Hy-
dropes sa-
nantur.

quidem de his scribo, & huiusmodi alia dico. Cæterum ex D
his qui exactam ac certam prædictionum rationem prædi-
cant, cum aliquibus ipse conuersatus sum, cum aliquorum
verò filiis ac discipulis rem contuli, quorūdam verò scripta
accepi. Quare quum probe sciam qualiter quisque ipsorum
sentiant, & exactas certitudines nusquam compererim, hæc
scribere aggressus sum. At verò de aqua inter cutem, &
tabidis, & podagris, & his qui à morbo sacro appellato cor-
ripiuntur: hæc dico, ex aliqua quidem parte de omnibus idē.
Nam qui hos morbos congenitos habet, is agrē ab ipsis li-
berari potest. Reliqua verò singulatim scribam de singulis.
Qui Hy- E
dropes sa-
nantur. Eum qui ab hydropē, siue aqua inter cutem correptus est, &
superstes esse volet, bonis visceribus præditum esse oportet,
ita ut natura se exerat, simulque facile cōcoquat, & bene spi-
ret, sitque sine dolore, & totum corpus æqualiter tepidū ha-
beat, & non circa extremas partes colliquatum. Melius est
autem ut tumores potius habeat in extremis partibus. Opti-
mum verò est neutrum horū habere. Nam molles ac graciles
esse conuenit extremas partes, itēque ventrē ad contactū
mollem. Tussim verò adesse non oportet, neque sitim, neque
linguam resiccare, tum reliquo tempore, tum post somnos,
quando hæc valde fieri solent. At cibos libenter accipere o-
portet, & ubi multum satis comedit, non affligi. Alium ve-
rò ad medicamenta quidem celerem habere, reliquo autem
tempore egerere recrementum molle efformatum. Vrinam F
autem apparere cōuenit, pro studiorum ratione, & vinorum
mutatione transeuntē. Laborem verò ferre oportet facile, &
lassitudinis exortem esse. At optimum quidē est hominē ita
per omnia dispositum esse, & sic securissimē sanus fieri pote-
rit. Sin minus, plurima ex his habeat. Nam spes erit ut super-
stes euadat. Qui verò nihil horum habuerit, sed contraria,
eum desperatum esse scito. Qui autem pauca horum habue-
rit, quæ bona esse dixi, si hydropē laboranti adsint, huic exi-
guæ spes restant. Cui verò multum sanguinis sursum ac
deorsum eruperit, & febris insuper accesserit, eum multa
aqua repletum iri timor est, atque hic hydrops breuissimi
temporis est, & ex quo paucissimi euadunt. Verū de hoc
alteri prius significare oportet. At quibus magni tumores
facti emarcescunt ac rursus attolluntur, hi magis cōualescūt
quām

Aquàm illi qui ex sanguinis eruptione implètur. Verùm fallunt hi hydropes ipsos ægrotos, faciuntq; vt ipsi à medicis discedant ac pereant. De tabescentibus quod ad sputum ac tussim attinet, eadem dico quæ de pectore suppuratis scripsi. Phthiſicorum bona signa.

Oportet enim eum qui probe liberari volet, facilè sputum per tussim reiicere, & id esse albū, & æquale, & eiusdem coloris, & ab inflammatione alienū. Quod verò à capite desluit ad nares conuerti, febrem autē non inuadere, vt ne à cœnis prohibeatur, neque sitiat. Venter autem egerat quotidie, & id quod egerit sit durum, copia pro ratione ciborum ingestorum. hominem verò quàm minimè tenuem esse oportet. Pectus autem laudare conuenit quadrangulum & hirsutum. & os ipsius paruum sit, & robustè carnosum. Quicumque enim hæc omnia habuerit, maximè superstes erit. Qui verò nihil horū habet, interitui proximus. Quicumq; verò pectore suppurati facti fuerint, dum iuuenes sunt, ex humorum illapsu, aut fistula, aut alio quopiā huiuscemodi, aut ex abscessus recursu, hi nō euadunt, nisi valde multa bona signa ipsis accesserint. Pereunt autem homines hi ad autumnum. Sed & ex aliis morbis longis pleriq; ad hoc tempus maximè moriuntur. Ceterum ex aliis minimè superstites manēt & virgines, & mulieres quibus ex suppressis mensibus tabes oborta est. Quo tēpo-
re hi pereūt

Si verò aliqua virgo, aut mulier euasura est, & aliorum signorum bonorum multa accedere oportet, & menses splendide ac purè apparere, aut nulla spes est. Phthiſis mulierum.

Qui verò ex sanguinis eruptione, pectore suppurati fiunt, & viri, & mulieres, & virgines, non minus euadūt. Verùm signis omnibus tum suppuratorum, tum tabescentium collectis, & superstite futurum, & perituum prædicere oportet. Maximè verò euadunt ex sanguinis eruptione, hi quibus dolores sunt atrabiliarii, & in dorso, & in pectore: & qui post eruptionem minus dolent. Suppurati.

Nam & tussēs non valde insuper accedunt, & febres pleraque perſeuerant, sitim facilè ferētes. At reuersiones eruptionis sanguinis maximè sūt his, si nō abscessus succedāt. Optimi verò sunt abscessus sanguinolentissimi. Quibus autem in pectoribus dolores insunt, & per tempus attenuantur, & tussis sunt, ac difficulter spirant, neque febribus insuper corripientibus, neque suppurationibus succedentibus, eos interrogare res. Qui absces-
sus melio-
res.

oportet, quum tussiant, & difficulter spirent, an & compa-

Hippocratis Liber I I.

podagra. Etum quiddam & modicum odorem habens rufsiendo reii- D
 ciant. Depodagricis hæc dico. Quicūque aut senes sunt, aut
 circa articulos callos tofaceos concretos habent, aut ærum
 nose viuunt, ac ficcā aluum habent: hi omnes sani fieri nō
 possunt humana arte, quantum ego noui. Sanāt quidam hos
 optimæ dysenterix si successerint. Sed & aliæ eliquationes
 valde profunt, quæ ad infernos locos repunt. Qui verò iuue-
 nis est, & circa articulos nondum tofaceos callos concretos
 habet, & accuratè viuit, & laboris amans est, & aluum bonā
 habet ad obediendū pro studiorū ratione, hic sanè medicum
 intelligentiam habentem nactus, sanus fieri poterit. Ex his
 porrò qui à sacro morbo corripuntur, difficillimè quidem
Sacer mor-
bus. liberantur hi quibus à puero contingit morbus, & simul ad E
 virilē ætatem peruenit. Deinde hi quibus corpore in vigore
 ætatis constituto factus est, & fuerit à viginti quinque annis,
 vsque ad annum quadragesimum quintum. Post hos autem,
 quibus factus fuerit morbus, nullam significatiouem præ-
 bēs ex qua corporis parte initium sumat. At quibus ex capi-
 te initium capere videtur, aut à latere, aut à manu, aut pede
 facilius curatur. Verūm differunt etiam hæc morbi genera.
 Qui enim à capite initium sumunt, ex his grauissimi sunt.
 Deinde qui à latere. Qui verò à manib⁹ ac pedibus, maximè
 sanari possunt. Ceterum horum curā aggredi oportet medi-
 cum, qui medēdi modum nouit, si homines fuerint iuuenes,
 & laboris amantes, nisi mens mali aliquid habuerit, aut quis
 stupore attonito sideratus fuerit. Nam hæc atrabiliarix men- F
 tis emotiones non sunt conducibiles. Alij verò qui ad infer-
 nas partes conuertuntur abscessus, boni sunt. Longè verò o-
 primi & hic sunt, qui sunt sanguinolentissimi. Quicunq; ve-
 rò senes apprehendi incipiunt, maximè moriuntur. Et si non
 pereāt, statim celerrimèq; per se liberantur, à medicis autē
Comitialis
senes tollit
ferē. minimè opem ferunt. At quibus pueris oculi repente dis-
 torti fuerunt, aut maius quoddam malum perpessi sunt, aut
 tubercula sub ceruicem oborta sunt, aut vocem graciliorem
 adepti sunt, aut tusses sicca diuturnæ adhærent, aut maiori-
 bus factis dolor procedit ad ventrem, & non exturbatur, aut
 in lateribus distortionem habent, aut venas crassas circa ven-
 trem varicosas, aut omentum descendit, aut testis magnus
 factus est, aut manus tenuis & impotēs, aut pes aut tibia tota
 clauda

A clauda facta est, citra aliam causam: his omnibus morbum antea factum fuisse, scire oportet, præ his vniuersis. Et plurimi qui pueros educant, si interrogentur confitebuntur: quosdam verò etiam res latet, negantque se scire quicquam tale factum esse. Qui porro de vlceribus cognoscere volet, quomodo singula finient, eum primum hominum species perscrutari oportet, tum eas quæ meliores sunt ad vlcera, tum quæ deteriores. Deinde ætates nosse, in quibus singula vlcera curatu difficilia existunt. Locos item in corporibus perspectos habere, quantum alij ab aliis differunt. Sed & alia qualia in singulis accedunt tum bona, tum mala, nosse oportet. Si quis enim omnia hæc nouerit, is sanè sciet etiā quomodo singulorum **Quæ hominum species & qui colores probi.**

B euentus continget. Qui verò non nouerit hæc non nosse poterit quales fines vlcerum erunt. Species equidem bonæ sunt hæ, Leues, & commodatæ, & bonis visceribus præditæ, & neque valde carnosæ, neque duræ. Iuxta colorem verò sit species alba aut nigra, aut rubens. Hæ enim omnes bonæ sunt, si puræ sunt. Si verò pallidus color ammixtus fuerit, aut color ipse pallidus aut liuidus fuerit, peius est. Species verò quæ præscriptis contrariæ sunt, eas deteriores esse scito. At verò quod ad ætates attinet, tubercula quidem suppurata fiunt, & strumosa hæc plurimos pueros occupant, & facillimè ex ipsis liberantur. Senioribus verò pueris & adolescentibus, minus quidem oriuntur, verum difficilior ab ipsis liberantur. Viris autem talia quidem tubercula non valde fiunt, verum, cæria **Strumæ.**

C Græcis dicta, ad modum faui cœcreta, horrenda: & cancri occulti submersi, & ex pustulis nocturnis herpes, donec sexaginta annos transmiserint. Senibus autem nihil talium tuberculorum accedit, verum cæcri & occulti, & summas partes occupantes, & cœmoriuntur. Cæterum ex locis subalares difficiliores curatu sunt, & laterum mollitudines, ac femora. Nam & **Loca fauicia curata difficilia.**

moræ in ipsis fiunt, & recidiunt. Ex articulis periculo maxime obnoxij sunt magni digiti, & præsertim pedum. Quibus autem in obliqua linguæ parte vlcus sit diuturnum, in his dentes considerare oportet, an quis iuxta illam vlceris partem acutior sit. Vulnera magis lethalia sunt, quæ in venas crassas in collo ac inguinibus infliguntur. Deinde quæ in cerebrum, & **Vulnera lethalia sunt**

in hepar. Postea quæ in intestinum & vesicam. Sunt autem hæc omnia perniciofa valde, non tamen ita ut nemo ex his

euadat, velut putatur. Nam & loci qui hæc nomina habent, D
multum inter se differunt, & iidem modi. Multū etiam dif-
fert corporis ipsius hominis structura. Aliquando enim neq;
febricitat, neque inflammatur sauciatus. Aliquando etiam
citra causam febricitat, & aliqua corporis pars omnino in-
flammat. At quādo is qui vlcus habet, delirat, & facile fert
vulnus, tunc vulnus aggredi oportet, velut iuxta medicinæ
& accedentium rationem, euentum habiturum. Moriuntur
enim homines ab omnis generis vulneribus. Multæ enim
venæ sunt & tenues, & crassæ, quæ sanguinem fundentes oc-
cidunt, si gliscere ac eo ferri ipsas contigerit, quas alia tem-
poris occasione si quis pertundat, corporibus prodesse sen-
tiant. Multa verò vulnera in locis vilibus ac non malis esse, & E
nulla re graua videntur, & tamē sic dolore affligit plaga, vt
respirare non possit. Alij verò præ vulneris dolore, quod sa-
nē graue nulla re erat, spiritū quidem duxerunt, verū de-
lirarunt, & febrientes mortui sunt. Quicunq; enim aut cor-
pus febricitans habent, aut mentem turbatam, talia patiun-
tur. Sed neq; hæc admirari oportet, neq; formidare, illud ex-
pendendo, quod & animæ & corpora hominum plurimum
differunt, & vim maximam habent. Quæcunque igitur vul-
nera tempus nanciscuntur, aut corpus & mētem huiusmodi
aut ita gliscentem sanguinē, aut magnitudine tanta fuerint,
vt homo ad curationem adduci ab eius contemptu non pos-
sit, ab his quidem discedere oportet, qualiacunq; tādē fue-
rint, diariis animi deliquiis exceptis: alia verò omnia ag- F
gredi, quæ recēs sunt incussa, quo & febres effugiāt homines,
& sanguinis eruptiones, & nomas vlcerum proserpentes, hi
qui euadent. Exactissimē verò & ad plurimum tempus, eo-
rum quæ grauissima sunt custodiam facere oportet. Nam ita
facere iustū est. At verò nomæ lethalissimæ sunt, quarū pu-
tredines profundissimæ & nigerrimæ ac siccissimæ existūt.
Prauæ etiam sunt ac periculosæ, quæ nigram saniem remit-
tunt. Albæ verò ac mucosæ putredines, minus quidem occi-
dunt, magis autē reuertuntur, & diuturniores sunt. Herpe-
tes autem minimē omnium vlcerum quæ depascendo pro-
serpūt, periculosi sunt, verū maximē difficulter submoueri
possunt, quemadmodū canceri occulti. In omnibus autem ta-
libus febrem superuenire vna die confert, & pus quā albi-
simum.

Quæ vulne-
ra curāda.

Nomæque
malæ sint.

Herpetes
quæ malæ
non fiat.

A limum ac crassissimū. Cōmodat & corruptio nerui, aut etiā
 ossis, aut etiā amborū, tum in profundis, tum in nigris putre-
 dinibus. Nam in corruptionibus pus multū fluit, & putredi-
 nes soluit. Porro ex capitis vulneribus lethalissima sunt **Capitis vul-**
 quæ ad cerebrum pertingunt. velut etiā antea scriptum est. **nera.**
 Grauiasunt & huiusmodi omnia, os nudum magnum, os in-
 farctum, os diffractum. Si verò etiā osculum vlcis paruum
 fuerit, fissura verò ossis aliquandiu permāserit periculosius **Quid in his**
 est. Hæc autē omnia grauiora sunt, si & iuxta futurā sunt, & **petendum.**
 ex locis semper periculosiores summi in capite existāt. Cæte-
 rū in omnibus memorabilibus vulneribus interrogare oportet, si
 adhuc recētes fuerint plagæ, aut etiā iactus fuerint, an
 conciderit homo, aut an in soporem altiorē collapsus sit. Si
 enim horum quippiā factum fuerit, amplius custodia opus
 habet, nimirum quum cerebrū vulnus tunc perceperit. Si ve-
 rò nō recens fauciatus fuerit, ad alia signa respicere oportet, **Quæ in his**
 ac consilium capere. Optimum quidē igitur est, neque feбри- **conferant**
 re eum qui vlcus in capite habet, neque sanguinem insuper **vel contra.**
 ipsi erupisse, neque inflammationem, neque simul vllum ali-
 quem dolorem accessisse. Si verò quid horum apparuerit, se-
 curissimum est vt in principio fiat, & modico tēpore perma-
 neat. Conducit autem in doloribus, etiam inflammatione ex
 vlceribus accedere. In sanguinis autem eruptionibus, pus in
 venis apparere. Quæ verò in acutis morbis cōferre febribus
 scripsi, ea etiam in his fieri conducit, & eadē hic quoq; bona
 esse assero, contraria verò mala. At incipere febrē in capitis
C vulnere quarta die aut septima, aut vndecima, valde lethale
 est. Iudicatur autem plerisque, si quidem quarta vulneris die
 febris inceperit ad vndecimā. Si verò septima die febris in-
 choarit, ad decimam quartam, aut decimam septimam. Si ve-
 rò vndecimo febrē inceperit, ad vigesimam, quemadmo-
 dum in febribus descriptum est, quæ absque manifestis cau-
 sis fiunt. Cæterum in principiis febrium, siue delirium ac-
 cesserit, siue alicuius membri sideratio, perituum hominē
 sciendū est, si nō omnino aut ex optimis signis aliquod acce-
 dat, aut corporis vires adsint. Verū considerabis modū. Nam
 homini adhuc spes salutis, sed claudū fieri articulū in quem **Clauda læ-**
 incubuit necesse est, etiam si superstes maneat homo. Por- **si ve quī**
 rò vulnera in articulis, quæ quidem magna sunt, & neruos **membra**
 coniu- **fiant.**

Hippocratis Liber I I.

Vulneris observatio. coniungentes penitus præsecant, clarum est quòd claudos effici-
 ficient. Si verò ambiguum fuerit de nervis, quomodo se ha-
 beant, si quidẽ fuerit acutum telum quod rectũ vulnus fecit,
 melius est obliquo. Si verò graue & obtusum fuerit id quod
 vulneravit, nihil refert. Sed plagæ profunditatẽ & alia signa
 considerare licebit. Sunt autem hæc. Pus si insuper accedat
 ad articulum, duriores fieri necesse est. Si verò etiam tumo-
 res simul permanserint, hunc locum ad multum tempus du-
 rum esse necesse est, & quum sanum iam est vlcus, tumorem
 permanere necessarium est, simulque flecti ac extendi, quæ-
 cunque dum articulus incuruus est, curantur. Quibus verò
 etiam nervus elapsurus esse videtur, securius de claudicatio-
 ne prædicere licet, tum aliàs, tum si inferiorũ neruorum ali-
 quis fuerit exolutus. Ex his autẽ cognosces neruum qui ex-
 cidet. Pus album & crassum, multo tẽpore defluit, dolorẽs-
 que ac inflammationes circa articulũ in principiis fiunt. Ea-
 dem fiunt etiam si os elabetur. At verò dissectiones in cu-
 biti gibbis, præsertim quæ sunt cum inflammatione, ad sup-
 purationem perueniunt, sectionesque ac vstiones. **Medulla**
tergi affe- verò spinæ si ægrotarit, siue ex lapsu, siue ex alia aliqua cau-
ctæ signa. sa, siue sua sponte, homo & cruribus impotens fit, vt neque si
 tangatur percipiat, & vêtre ac vesica, vt circa prima tempo-
 ra, neque stercus, neque vrinam egerat, nisi ad necessitatem.
 Quum autem vetustior factus fuerit morbus, nõ vrgente ho-
 mine, & stercus prodit, & vrina. Moritur autem postea, non
Fauces multo interpolito tempore. Quòd si verò cuipiam fauces
cruentæ. implentur sanguine sæpe singulis diebus ac noctibus, cui ne-
 que caput antea doluit, & qui neque tussim habuit, neque vo-
 mit, neque febre correptus fuit, neque dolorem habuit, nec
 pectoris, nec dorsi, huius considerandæ sunt nares, & fauces,
 an vlcus aliquod habere compareat in hoc loco, aut hirudi-
Lippitu nem. Oculi porro lippientes optime permutantur, si & la-
do. chryma, & sordes, & tumor, simul fieri inceperint. Si verò la-
 chryma sordi fuerit permixta, & non valde calida: Sordes au-
 tem alba fuerit & mollis, & tumor levis solutus: Si ita hæc se
 habuerint, oculus cõglutinabitur ad noctes, vt doloris exors
 sit, atque hoc modo res minimè periculosa fuerit, ac minimè
 diuturna. Si verò lachryma procedit multa & calida, cū pau-
 cissima sorde, ac paruo tumore, atq; hoc ex altero oculo tan-
 tum,

A tum, tunc diuturnum valde sit malum, verum non periculosum, & doloris exors est hic modus. Et iudicationem in his maximè expectare oportet, primam quidem ad vigesimam diem. Si verò hoc tempus transmittat, ad quadragesimam expectanda est. Si verò neque in his diebus sedetur, in sexaginta iudicatur. Per totum autem tempus hoc, sordem considerare oportet, an in digito misceatur, & alba ac mollis fiat, maximè sub iudicationis tēpus. Si enim desinet, hæc faciet. At si utriq; oculi hæc perpetiatur, in maiori periculo sunt, ne vlcerentur. Verum iudicatio breuioris temporis erit. Sordes autem siccae valde dolorosæ sunt, sed cito iudicantur, si non vulnus acceperit oculus. Si verò tumor magnus fuerit, dolorisque exors & siccus, periculo vacat. Si verò cum dolore fuerit, malus est si siccus sit, & periculū est ne vlceretur oculus ac cōcrescat. Sed & gravis est tumor: si lachrymā coniunctam habeat, itēque dolorem. Si enim lachryma procedit calida ac salsa, periculū est & pupillam exulcerari, & palpebras. Si verò tumor confederit, sed lachryma multa multo tempore effundatur, & sordes fuerint, viris quidē palpebrarū euerisionem prædicere oportet: mulieribus autem & pueris exulcerationē ac euerisionem palpebrarum. At si sordes pallidæ aut liuidæ fuerint, & lachryma multa ac calida, & in capite ardor fuerit, & de tempore dolores in oculum decubuerint, & vigilæ his accesserint, necesse est vlcus in oculo factū esse, & timor est quoque ut talis rumpatur. Prodest autem febris accedens, aut dolor ad lumbos innixus. Prædicere verò his futura oportet, ita ut respectus & ad tempus habeatur, & ad ea quæ ex oculo fluūt, & ad dolores itēque vigilias. Postquam verò & oculum cōtueri datum fuerit, si quidem compertus fuerit ruptus, & per fissuram prominuerit oculus, malum est & difficile ut sedetur. Si verò & putredo tali suberit, penitus inutilis oculus redditur. At verò alios vlcerum modos prædicere oportet, locos considerando, & putredines, & profunditates. Necessarium enim est iuxta vlcerū vehementiam cicatrices fieri. Quibus igitur rumpuntur oculi, & postea prominent, ut extra locum oculus sit, his & tempore, & arte, opem ferre non datur, ad hoc ut videant. Paruæ verò oculorū rransmotiones sedari possunt, si nihil mali accesserit, & homo iuuenis fuerit. At vlcerum cicatrices, quibus nihil

Cum acies
oculorum
extuberat
de visu a-
rum est.

hil

Pupillarū
color.

hil aliud mali affuerit, omnes & à temporibus, & ab arte, D
opem ferre posse putandum est, maximè recentissimas, & in
iuuenū corporibus. Cæterum ex locis maximè oculi lædun-
tur, si exulcerantur, deinde pars quæ est supra supercilia, po-
stea quicquid vicinissimum his locis fuerit. Pupillæ verò
flauescences, aut argenti speciem referentes, aut ceruleæ, non
bonæ sunt. His autem paulò meliores sunt, quæ aut minores
apparent, aut ampliores, aut angulos habentes, siue ex causis
tales factæ fuerint, siue sua sponte. Caligines & nubeculæ,
& cicatrices subalbicantes: leuigantur ac delentur, si nō vul-
nus aliquod in eo loco accesserit, aut prius cicatricē habue-
rit in hoc loco, aut vnguē pterygion dictum. Si verò splen-
dicans cicatrix in nigra oculorum parte fiat, partem aliquā E
nigredinis dealbat, adeò vt si multò tempore permaneat, &
aspera & crassa, etiam memoriam sui relinquat. Porro iudi-
cationes quemadmodum in febribus scripsi, ita & hic se ha-
bent. Verum signa edoctum, iuxta differētias lippitudinum
prædictionē facere oportet, quum pessima signa accesserint,
diuturnarum lippitudinum, velut de singulis perscriptū est:
quum verò apparuerint optima signa, breuium. Tunc enim
septima die desituras esse prædicendum est, aut propè hoc
tempus, & alioqui securas esse putandum est. Recidivas autē
expectare oportet his, quibus melius habere contingit, neq;

Præcipua
in his obser-
uatio.

Dysenteria
quæ mala.

in diebus iudicatoriis, neq; signis bonis cōspectis. Omnium
verò maximè vrinæ statim in oculorum affectionibus con- F
siderare oportet. Nam temporū occasiones repentinæ sunt.
Dysenteria si quidē cum febre inuaserint, aut variis alui
egestionibus, aut cum hepatis inflammatione, aut præcordij,
aut ventris: aut quæ dolorosæ fuerint, aut cibos intercipiūt,
sitimq; inducunt: hæ omnes malæ sunt. Et qui sanè plurima
horum malorū habuerit, citissimè peribit. Cui verò paucis-
sima talium affuerint, huic plurimæ spes sunt, Moriuntur au-
tem ex hoc morbo maximè pueri quinquennes, & seniores
adhuc, decennes. Reliquæ verò ætates minus. At quæ dy-
senteria commodæ sunt, hæ mala hæc nō inducunt. Verum
sanguine & ramentis egestis, desuerunt septima die, aut de-
cimaquarta, aut vigesima, aut quadragesima, aut intra hæc
tēpora. Huiusmodi enim egestionēs, etiā eos q̄ prius sunt in
corporibus, morbos sanant, antiquiores quidē diutius tem-
pore,

A pore, recētiore autem in paucis diebus submouere possunt. Nam & quæ vterum gestant, etiam ipsæ euadunt superstites magis ad partum, & ex partu, & fœtus conseruant, sanguine & ramētis egestis, etiam per multos menses: nisi dolor ipsis affuerit, aut aliud quoddam malum signū ex his quæ in dysenterijs fieri scripsi, accesserit. Si verò aliquod illorum apparuerit, & fœtui perniciem significat, & prægnanti periculum. si non post fœtus effugium, & secundæ exolutionem, ipsa dysenteria eadem die, aut post modicum tempus desinat.

Leuitates porro intestinorum, lienteria græcis appellatæ, hæ quidem sunt continuæ & diuturnæ, & per omnem horā, & cum strepitibus, & sine strepitibus exturbantur, & similiter noctu ac interdiu incumbentes, & egestione subeunte, aut valde cruda, aut nigra & leui ac graueolente: hæ omnes malæ sunt. Nam & sitim inducunt, & potum nō ad vesicam promouent, vt per vrinam eijciatur, & os exulcerant, & ruborem eleuatum in facie efficiunt, & maculas solares varios colores habentes. Simul autem & ventres emollitos, & sordidos ac rugosos reddunt. Ex talibus autem homines impotentes fiunt, ad cibum capiendum, ad deambulandum, ad faciendum alia quæ facere debent. Estq; morbus hic grauissimus senioribus. Vehemens est etiam viris. Reliquis autem ætatibus multò minor. Quisquis autem neq; in ætatibus his est, quas malè tractari ab hoc morbo dixi, & paucissima ex signis habet, quæ mala esse scripsi, hic securissimè dispositus est. Indiget autem curatione hic morbus, donec & vrina pro ratione eius quod in potu acceptum est, procedat, & corpus ab egestis cibis augmentum cupiat, & à malis coloribus liberatum fuerit. At verò alia profluuia alui, quæ sine febre sunt, & breui tempore durant, & mitia existunt. Aut enim eluta sedabuntur, aut sua sponte. Prædicere autem oportet excretionem subtus erumpentem desituram esse, quum tangenti ventrem manu nullus motus occurrerit, & in fine egestionis flatus penetrarit. Sedes autem euertuntur ac procidunt, viris quidē, quos vbi hæmorrhoidas habent, alui profluuium corripit: pueris autem calculo laborantibus, & in dysenterijs longis ac meracis: Senibus verò quibus muci agglutinati insunt. Porro ex muliebribus, quæ magis aut minus in vtero concipere solent, ita considerationem facere con-

Lienteria.

Medela
quæ.Alui pro
fluuia.Sedis proci
dentia.Mulierum
fæcundita-
tis cogni-
tio.

uenit

uenit, primum quidem specierum. Paruæ enim ad cōceptionem præstantiores sunt maioribus, tenues crassæ, albæ rubicundis, nigræ liuidis. Quæ item venas conspicuas habent, meliores sunt quàm quibus non apparent. Carnem autem vberio-
riorem habere, aniculæ malum est: mammas autem tumidas ac magnas, bonum. Atque hæc quidem ad visum exposita sunt. Verum interrogare oportet etiam de mens-
truis purgationibus, an omnibus mensibus compareant, & an copia satis magna, & an boni coloris sint, & æquales in singulis temporibus, & in iisdem mensium diebus. Sic enim has fieri optimū est.

Vteri qualitas.

Conceptus impedimentum.

Post vlcus qualis locus.
Cum vlcus in altera parte est quid pariat.

Locum verò in quo conceptio sit, quem sanè vterum nominamus, sanum esse oportet, & siccū, ac mollē. Sit item neque retractus, neque pronus, neque os ipsius sit auersum, neque conclusum, neque euersum. Fieri enim non potest ut cōceptio fiat, quodcumque tandem talium impedimentorum affuerit. Quæcumque igitur mulieres in vtero concipere non possunt, verum pallidæ apparent, neque febre, neque visceribus in causa existentibus, hæc capite se dolere docent, & menses sibi malè ac meracos prodire. Siue autem breui, siue longo tempore, ipsi sic affectis menses non comparuerint, vteri in his purgatione opus habent. Quæcumque verò bene coloratæ sunt, & carnem multam ac pinguem habent, & venulas occultatas, & dolore carent, & menses his aut omnino non apparēt, aut modici & meraci prodeunt: Hic modus difficilissimus est ad cogendum ut concipiant. Si verò mensibus comparentibus inculpatè, & mulier sic corpore dissipata fuerit, & non conceperit, locus in quo est vterus in causa est, ut foecunda foetus fieri non possit. Aut enim reuulsus est, aut euersus. Nam & alia quæ isthic fiunt cum doloribus decolorationeque ac colli-
quatione fiunt. Quibus porro vlcus factum fuerit in vtero, siue ex partu, siue ex tuberculo, siue ex alia quadam causa his febres & inguinum tumores, succedere necesse est, & dolores in his locis. Si verò & puerperij purgamenta simul fuerint intercepta, hæc mala si fuerint, omnino meraciora sunt & diuturniora. Et ad hæc præcordiorum ac capitis dolores. Vlcere autem facto & sanato, locum hunc leuiorem ac diuturniorem fieri necesse est, & minus concipere posse. Si verò solū in sinistra parte fiat vlcus, & mulier in vtero concipiat, siue dum adhuc habet vlcus, siue vbi iam sana est, masculum magis

A magis enixurā esse spes est. Si verò in dextra parte vlcus fiat, & mulier concipiat, foemineum magis fore foetum expectandum est. At si febres corripiant concipere non potentem, & attenuata sit muliercula, interrogare oportet, an vteri vlcus aliquod habeat, aut aliud quippiā ex malis de quibus scripsi. Si enim in hoc loco nihil mali subesse apparuerit, quod causa sit attenuationis, & quòd concipere nō possit, sanguinem vomituram esse mulierem expectandum est, menses autem tali necessariò euauerunt. Si verò febris soluta fuerit à sanguinis eruptione, & menses cōparuerint, in vtero concipiet. Si verò priusquam sanguis erūpat, alui excrementa liquida facta fuerint paruo modo, periculum est perituram esse mulierem antea quā sanguinem vomat. Quæcunque in vtero se concepisse putant, & non cōceperunt, & per multos menses falluntur, mēstruis purgationibus non apparentibus, & ventres augeri ac moueri vident; hæc & caput dolent, & colicū, & præcordia, & in mammis lac ipsis nō est, nisi modicū quiddam, atque id aquosum. Postquam verò ventris tumiditas exoluta fuerit, ac molles factæ fuerint, in vtero concipiet si non aliud quoddam impedimentum ipsi fiat. Nam hæc affectio bona est ad mutationem in vtero faciendum, vt post hoc tempus in vtero concipiant. At his quæ cōceperunt, dolores hi non sunt, nisi familiares his fuerint capitis dolores, & lac in māmīs gignitur. At verò eas quæ à diurnis fluxionibus vexantur, in terrogare oportet an caput doleant, & lumbos, & infernam ventris partem. Interrogandæ sunt etiā de dentium stupore, & visus hebetudine, & aurium sonitu. Quæcunq; autem dum ieiunæ sunt, subbiliosa vomunt per multos dies, quum neque vterum gestent, neque febricitent, eas interrogare oportet an lumbricos rotundos simul vomāt. Si enim hoc non confitentur, prædicendum est ipsis futurum esse. Fit autem hic morbus maximè quidem mulieribus: deinde verò etiam virginibus, aliis autem hominibus minus. Quibuscunque verò sine febribus dolores fiunt, mortē quidem non inducunt, verū plerique diurni sunt, & multas mutationes ac recidiuas habent. Modi autem hi sunt. Primū quidem ex capitis doloribus aliqui sunt leues, aliqui multò grauiore. Vtrosque verò hoc modo considerare oportet. Quicunque hebetem visum habet, & rubor quidam ipsis fit

Conceptus
fallacia.Quid ab
his peten-
dum.

H h

in oculo

Hippocratis Liber I I.

in oculis & pruritus frontem vexat, his sanguis sua sponte manans opitulatur. Atque hic modus necessario simplex est.

Quibus verò dolores circa caput & frontem, ex magnis ventis fiunt, & ex frigoribus quum vehementer calfacti fuerint, eos grauedines quidem maximè perfecte liberant, pro-

Quid his sunt autem & sternutationes, & muci in naribus fientes, magis quidem sua sponte, sin minus, coactè. Grauedines autem fiunt perfectè, adeò vt & tussiles succedant: & sternutationes succedentes si dolores non sedauerint, necesse est tubercula & decolorationes his succedere. Quibus autem dolores sine manifestis causis fiunt, & diurni, & in toto capite, suntque ipsi & graciles, & debiles. his prædicendum est morbum longè grauiorem priore esse. Si verò etiam ad collum, & ad dorsum dolor descendat, caput relinquens, & rursus ad caput recurrat, adhuc grauior fit. Verum omnium horum grauiissimus est, si ex capite ad collum ac dorsum tēdat. Vtilitates autem his ex abscessibus fore expectandum est: aut vbi pus per tussim reiecerint, aut hæmorrhoidas habēt, aut pustulas in corporibus enatas. Confert etiam caput furfures habens. Torpores & puncturæ pruriginosæ velut ab vrtica, quibus per caput discurrunt, aliquando per totum, aliquando per aliquam partem. Sæpe verò & frigiditas aliqua ab ipsis sentiri putatur, velut per caput discurrere, hos interrogare oportet, an etiam ad summam linguam punctura illa procedat. Si enim hoc fecerit, perfectus morbus fit, & qui difficilior submoueri possit. Verum absque hoc facilis est. Modi verò utilitatum consequendarum ex abscessibus cōtingent, veluti antea scriptum est. Sed tamen abscessus minus in his succedunt, quàm in illis. Quosunque verò vnà cum doloribus vertigines corripunt, malum agrè exolubile ac furiosum existit. Senibus autem maximè hic modus fit. At alij morbi circa caput, & viris, & mulieribus, cum securitate vehementissimi sunt, & diuturniores: fiunt autem & adolescentibus, & virginibus in ea pubertatis ætate, & maximè circa mēsum progressum. Mulieribus verò in capitis doloribus, alia quidē omnia fiunt, quæ & viris. Verum puncturæ illæ pruriginosæ & affectiones atrabiliarie, his minus quàm viris, si non menses, penitus aboliti fuerint. Quibus colores dum iuuenes sunt, prauis sunt ad multum tempus, & continenter, non tamen morbi regij

Torpor.

Quid his
prolit.

Vertigo.

Color.

Prædictionum.

422

A regij modo: hi siue viri sint, siue fœminæ, dolent caput, & lapides ac terram comedunt, & hæmorrhoidas habent. *Pal- Pallor.*
 lidi verò cū virore colores qui diurni sunt, & morbus re-
 gius vehemens non est, alia quidem eadem facere solent, ve-
 rum pro lapidum ac terræ esu, præcordia hos magis affigunt
 quàm alteros. Quicumque verò multo tempore pallidi ap-
 parent, & facies in tumorem eleuatas habent, eos caput do-
 lere sciendum est, aut circa viscera dolorem habere, aut in se-
 de malum aliquod in seipsis. Ex his autem apparëtibus, ple-
 risque non vnum aliquod horum malorum apparet, sed ple-
 runque multa, aut etiam omnia. Qui nocte vident, quos *Nyctalop-*
 sanè nyctalopas vocamus, hi morbo corripuntur iuuenes, *pes.*
 aut pueri, aut etiam adolescentes, & liberantur sua sponte,
B aliqui in quadraginta diebus, aliqui septimo mense, quibus-
 dam verò & per totum annum permanfit. Quapropter de
 tempore coniectare oportet, ita vt & ad morbi robur, & ad
 ægri ætatem respicias. Abscessus autem his profunt insuper
 apparentes, & ad infernas partes fluentes. Verum non valde
 accedunt, propter iuuentutem. At mulieres nō corripuntur
 ab hoc morbo, neque virgines quibus menses comparent. *Temporū*
 Quibus autem lachrymarum fluxiones diurnæ fuerint, & *dolor.*
 hi nyctalopes fiunt, eos interrogare oportet an caput dolue-
 rint antea quàm hæc reuelarunt. Quicumque dum neque
 febricitant, neque decolores sunt, sæpe & verticem & tem-
 pora dolent, si non alium manifestum habuerint abscessum
C in facie, aut grauitè loquantur, aut dentes doceant, his san-
 guinem per nares erupturum esse expectandum est. Quibus
 verò ex naribus sanguis fluit, hi alioqui sani esse videntur,
 hos autem vel splenem in tumorem eleuatum habere com-
 peries, vel caput dolere, & splendicās quiddam ipsis ob o-
 culos obuersatur. Plerisque verò horum simul & caput & splē, *Lien nō sa-*
 hoc modo se habere apparent. Gingiuarū vitiata, & ora gra- *nus quid fa-*
 ueolentia his sunt quibus splenes magni. Quicumque verò *rat.*
 habent splenes magnos, & neque sanguinis eruptiones ipsis
 contingunt, neque oris graueolentia, horum ribiæ vlcera
 praua habent, & cicatrices nigras. Quibus partes sub oculis
 vehementer attolluntur, eos magnos habere lienes compe-
 ries. Si verò etiam in pedibus tumores accesserint, aquam
 etiam habere videbuntur. Verum & ventrem, & lumbos in-
 Hh 2 spicere

Hippocratis Liber I I.

Distortio - spicere oportet. At verò distortionem in facie, si nulli alij cor-
des faciei, poris parti communicent, cito sedantur, aut sua sponte, aut

**Humerorū
dolor.**

ad necessitatem coacti: reliqui verò syderati fiunt. Quibus
 una cum hoc quod mouere non possunt, morbosa corporis
 pars attenuatur, hi in sanitatem restitui non possunt. Qui-
 bus autem colliquationes non accesserint, hi sani euadent.
 Ceterum de tempore quando sani erunt prædicendum est,
 respectu habito ad vim morbi, ad tempus, & ad ætatem ho-
 minis, & ad anni tempus, ita ut eius rei memor sis, quod ve-
 tustissimi morbi, & pessimi, & qui reuoluuntur, grauissimè
 obediunt: itémque hi qui sunt in vetustissimis corporibus.
 Sed & autumnus & hyems, ad tales morbos submouendos
 minorem commoditatem exhibent quàm ver & æstas. Do-
 lores porro in humeris fientes, qui quidem ad manus descen-
 dunt, torporésque ac dolores inducunt, his abscessus non suc-
 cedunt, verum nigram bilem vomentes sanantur. Qui verò
 isthic in humeris manent, aut etiam ad dorsum progrediun-
 tur, eos puris, aut atræ bilis vomitu effugiunt. Verum de his
 ita considerationem facere oportet. Si quidem enim facile
 spirauerint, ac graciles fuerint, atram bilem ipsos vomitu-
 ros esse spes est. Si verò difficilius spirauerint, & in faciem ip-
 sis color incurrit, qui prius non erat, siue rubicundus siue ni-
 ger, eos magis pus spuituros esse sperandum est. Ad hæc verò
 considerandum est etiam, an in pedibus tumores sint. Nam
 & hoc signum in his consentit. Atque hic morbus viris vehe-
 mentissimus esse solet, à quadragesimo anno vsque ad sexa-
 gesimum. Qua ætate etiam coxendicum morbus maximè
 affligit. Porro de coxendicum morbo sic cōsiderationem
 facere oportet. Quibuscunque senioribus & torpores vehe-
 mentissimi sunt, & perfrigerationes tum lumborum, tum
 crurum: & qui pudendum arrigere non possunt: & quibus al-
 uis non egerit, nisi ad necessitatē coacta, & prodit ipsis mul-
 tus stercoraceus mucus; his maximè diuturnus morbus erit,
 prædicendumque est annum ut minimum duraturum esse
 morbum ab eo tempore quo incepit, & opem ad ver & æsta-
 tem expectandam esse. At verò iuuenibus non quidem mi-
 nus doloris inducit coxendicum morbus, verum breuior est.
 Nam quadragesimo die liberantur. Sed neque torpores ve-
 hementes accedunt, neque perfrigerationes crurum ac lum-
 borum

A horum. Quibus autem hic morbus est quidem in lumbis ac cruribus, non autem affligit adeo ut decumbant, considerare oportet an alicubi sint collectiones in coxa, & interrogare an ad inguen dolor progrediatur. Si enim ambo hæc habet, diuturnus fit morbus. Interrogandum insuper est, an in femore torpores insint, & ad poplitum progrediantur, & si hoc confiteatur, rursus interrogandum, an & per tibiā ad summū pedem procedant. Quicumque enim pleraque horum confessi fuerint, his dicendum est, quod crura ipsis aliquādo calida, aliquando frigida fiant. Quod si morbus hic lumbos relinquens, aliquibus ad infernas partes vertatur, eos confidentes esse iube. Quibuscumque verò toxas & lumbos non relinquens, ad supernas partes conuertitur, malum id esse prædicendum est. At quibus circa articulos dolores fiunt, & tumores, & sedantur, non podagrico modo: in his comperies viscerum magna, & in vrina subsidentiam albam. Et talis si temporaria eleuarit, dicet se sæpe dolere, dicet etiam sudores sibi nocturnos oboriri. Si verò neque in vrina subsidet talis subsidentia, neque sudores fiunt, periculum est ne aut claudi fiant articuli, aut affectio abscessus humore melli similis, quem melicerida vocant, sub ipsis nascatur. Fit autem hic morbus his quibus in pueritia & iuuentute sanguis ex naribus fuerit solitus desit. Proinde interrogandum est de sanguinis eruptione, an in iuuentute facta fuerit: & an pruriginosæ velut ab urtica puncturæ, & in pectore, & in dorso insint; & quibus alui dolores fortes inducant, citra exturbationes: & quibus hæmorrhoides fiant. Hoc enim horum morborum principium est. Si verò etiam malo colore præditi sint hi homines, interrogandum est an caput doleant. Hoc enim fatebuntur. Quibus verò ex his alui dolores in dextris fuerint, dolores his vehementiores fiunt, & præsertim quum ad præcordium iuxta hepar reliquæ doloris fuerint. His autem doloribus prodest strepitus statim in aluo obortus. Postquam autem dolor quieuerit, vrinam crassam ac cum virore pallidam mingunt. Atque hic modus nequaquam lethalis est, verum valde diuturnus. Quum autem iam vetustus fuerit morbus, homines ab ipso excutiunt. At de sanguine interrogare oportet, an in iuuentute fluxerit, & de visus hebetudine, & de vrinæ euacuationis pallore, itémq; de strepitibus an insint, & succeden

Hippocratis

Impetigines cedentes profint. Hæc enim omnia fatebuntur. Impetigines D
& lepræ, & vitilignes albæ, leucæ appellatæ, quibus quidem
Leucæ. iuuenibus aut pueris aliquid horum factum est, aut paula-
tim conspectum in multo tempore augefcit: his non putare
oportet abscessum esse, eam papularum eruptionem, sed
Leucæ vn- morbum. Quibus verò horum aliquid factum est multum
de. & derepente, hoc sanè fuerit abscessus. Fiunt autem leucæ
Lepræ vn- quidem ex lethalissimis morbis, qualis est & morbus tabi-
de. dus appellatus. Lepræ verò & impetigines, ex morbis ab
attra bile factis. Ex his autem facilius sanantur ea quæ in ma-
ximè iuuenibus fiunt, & quæ recentissima sunt, & in mollis-
simis accarnosissimis corporis partibus producuntur.

HIPPOCRATIS^E

COI COACAE PRAENO-

TIONES, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

*

Qui pesti-
rigorem pe-
reant.



Perfrigera-
tio.

Pauor & timor,
& tristitia præter rationem, in conuulsionem finit.
tristitia si-
ne causa. Ex perfrigeratione vrinas intercipi pessimum est.
Ignorantia, Ignorantia cum rigore, malum. Malum item obliuio.
obliuio. Soporosi rigore aliquatenus perniciosi, & flammeus in

Rigores
soporosi.

VI ex rigore perfrigerantur, caput ac col-
lum dolentes, voce destituti, insuper exu-
dantes, postquam se recollegerint, moriun-
tur. Molestè ferre morbum cum perfrigera-
tione, pessimum est. Perfrigeratio cum du-
ricia perniciofa est. Ex perfrigeratione,
Pauor & timor, & tristitia præter rationem, in conuulsionem finit.
Ex perfrigeratione vrinas intercipi pessimum est.
Ignorantia cum rigore, malum. Malum item obliuio.
Soporosi rigore aliquatenus perniciosi, & flammeus in
facie color, cum sudore, in his malignus est. In his frigidi-
tas posteriorum partium conuulsionem accersit. Et in sum-
ma, posteriorum partium frigiditas, conuulsoria est. Ex
dorso horrores frequentes, & cito transeuntes, agrè tolerari
possunt. Vrinæ enim interceptionem dolorosam signi-
ficant

A ficiant. Insuper exudare, his pessimum est. Rigor continen- **Rigor continen-**
 ter vexans, corpore iam debili existente, lethalis est. Qui fre- **tinuus.**
 quenter exudant, ac insuper riget, perniciosum hoc est, & in
 fine suppurationem habere comperiuntur, ventresq; pertur-
 batos. Rigores ex dorso molestiores sunt. Qui vero decima
 septima die rigorem habuit, & quarta ac vicesima insuper
 riguerit, malignum hoc est. Horrore affecti, caput dolentes,
 exudantes, malignum id est. Horrore affecti, multum insu- **Horror qui**
 per exudantes, difficili malo implicantur. Rigores multi **malus.**
 torpidi, maligni sunt. Quibus sexta die rigores fiunt, hi æ- **Rigore s**
 grè iudicantur. Quibus sanis horrores frequentes sunt, hi **multi.**
 ex sanguinis fluxione suppurantur. Horror & spirandi di- **Horror &**
B fficultas in doloribus, signa tabis sunt. Ex pulmonis suppur- **dyspnæa.**
 atione, & circa ventrem aliquando ac claviculam dolores, &
 anxie stertere, sputi copiam in pulmone significat. Horrore **Horrentes**
 affecti, anxij, delassati, lumbos dolentes, aluos humectas ha- **quales.**
 bent. Affectiones insuper rigentes, & quæ ad noctem ali-
 quâto magis exacerbantur, cum vigiliis ac delirio in somnis,
 aliquando urinas inuoluntariè emittentes, in cōuulsione de-
 finunt. Continui rigores in acutis, prauis sunt. Ex rigore, cum **Rigor con-**
 capitis dolore exolutiones, perniciosæ. Cruentæ in his urinae **tinuus.**
 prauæ. Rigor cum distentione neruorum in posteriora occi- **Rigor opi-**
 dit. Qui in horruerunt & exudarunt iudicatorio modo, & **thotonon-**
 postridie præter rationem horruerunt, si quis non vigiliis infe- **des.**
 stetur, neq; cōcoxerit, ei sanguinem erupturum esse puto. Uri- **Lorium re-**
C næ cum rigore suppressæ, malæ & cōuulsoriæ, tum aliàs, tum **tentum ma-**
 si quis antea graui sopore pressus fuerit. Spes autem in his est **lum est.**
 abscessus retro aures fore. Rigores velut in febre tertiana, si
 in media inordinata febre exacerbentur, valde maligni sunt.
 Si verò contrario cōuellentibus modo exacerbentur, cum ri-
 gore & febre, perniciosum est. Vocis interceptiões ex rigore,
 soluuntur tremore. Et insuper rigentes tremores succeden-
 tes iudicant. Qui ex rigore cum capitis dolore exoluuntur,
 in periculo versantur. Cruenta urina his mala est. Quibus
 rigor, his urinae suppressio. Conuulsio in febre, manuum, ac
 pedum dolores, maligni sunt. Malignus est & doloris ex fe-
 more progressus. Neq; genuum dolor bonus est. Sed & sura-
 rum dolores maligni sunt, metumq; emouet, tum aliàs, tum
 si urinae subsidencia in medio innatet. Febres ex præcordio-

rum dolore maligna sunt, sopor in his pessimus est. Qui frequenter exudare cum praecordij intentione non cessant, plerumque maligne habent. & dolores in summum humerum ac claviculam incumbentes, in his pravi sunt. Febres tertianae naturam referentes, cum anxietudine, maligna sunt. Vocis interceptiones in febre male sunt. Lassati, caligantes, vigilantes, soporosi exudantes, recalescentes, male habent. Lassati cum horrore si exudarunt iudicatorio modo, recalsati in morbo acuto, male habent, tum alias, tum si circa haec sanguis de naribus stillarit. E regio morbo abunde colorati, moriuntur, alba vero alui egestio in his praecedit. Febres tertianae naturam referentes erroneae, in pares dies translapso, difficiles sunt. Anxietudines in diebus iudicatoriis, si in his sine sudore perfrigerentur, & omnes qui sine sudore perfrigerantur citra iudicationem, male habent. Et qui insuper riguerunt ex his, ubi vomuerunt meraca, anxij, tremuli in febre, malum. Qui ex rigoribus, parvis sudoribus, perfrigerantur, malum. Exudantes, vigilantes, recalescentes, malum. Qui insuper exudant in febre, maligne habent. Quibus biliosa est alui egestio, his circa petus morsus & amaritudo, malum est. In febribus inflata aluo, flatu non erumpere malum. Lassati, singultientes, stupore detenti, mali. Praeter consuetudinem quid facere, velut est, proponere sibi aliquid, & expectare aliquid, prius non consuetum, aut contrarium, malum est, & mentis emotioni proximum. Qui morbi in malis signis leuantur, & qui in bonis non remittunt, difficiles sunt. Qui exudant, & maxime capite, in febribus acutis submolestere ferentes, malum, tum alias, tum si urinae sunt nigrae & turbidus spiritus in his malus. Extremae partes si in utramque partem cito transmutentur, malum est. Sed & sitis huiusmodi mala est. Ex moderato ferox responsio, malum. Vox acuta, malum. Praecordia his intro trahuntur. Qui ex perfrigeratione sudorosa cito recalescunt, malum. Qui acutis exudant submolestere ferentes, malum. Qui praeter rationem nulla existente vasorum euacuatione, impotentes fiunt, malum. In febre tractus velut a vomitu, in screationem desinens, malum. Torpor in utramque partem cito translabens, malum. Sanguinis stillae pusillae, malae. In acuto morbo sitis praeter rationem soluta, malum. Qui ad manum exiliunt, male habent. Quibus cum febre ardente, tumores somnolenti, torpidi fiunt, his dolor in latu

A latus superueniens levis sideratiōis ac resolutionis modo occidit. Suffocatio in acutis aegris attenuatis, pernicioſa. In pernicioſis iam parui tremores, & vomitus æruginofus. Qui in potibus ſubſtrepunt, & ſubmurmurāt in ſiccis: & qui difficulter deglutiunt ſpiritu tuſſiēte, pernicioſe habēt in acutis perfrigeratis. Rubores in manibus ac pedibus, pernicioſi. Effuſantes & refracti, in ſomnis leuiter ſuſpicientes, morbo regio abundē colorati moriuntur, alba alui egeſtio in his præcedit. In febribus mentis emotiones taciturnæ, in eo qui voce priuatus non eſt, pernicioſæ ſunt. Liuioreſ ſientes in febre, breui mortem affore ſignificant. Quibus in febre dolore lateris ſiente, alui multa aquoſa ac bilioſa egerit, hi alleuantur. Quibus verò inedię conſequenter accedunt, ac ſudores, cū bono faciei colore, & aluo liquida, ita vt adſit etiā aliquis cordis, ſeu potius oris vētris dolor, hi vbi longius ægrotarunt, peripneumonicorum modo moriuntur. Febrienti ſi atrabilis in principio, ſurſum aut deorſum prodierit, lethale eſt. Qui cum perfrigerationibus, nō ſine febre, ſuperne exudant, moleſtē ferētes & phrenitici, in acuto morbo pernicioſe habent. Dolores modicē acuti, ad clauiculam ac ſurſum tranſeunt, pernicioſi. In longis pernicioſis morbis, ſedis dolor lethalis eſt. Si debilitate iam affecti, non videant, aut nō audiāt, aut labiū, aut oculus aut naſus iſtis diſtorqueatur, lethale eſt. In febribus inguinis dolor, morbum diuturnum ſignificat. In febribus iudicationes impeditæ ac ſublatæ, temporis quidē diuturnitatē inducunt, non autē pernicioſæ ſunt. Febres ex doloribus vehementibus diuturnæ. Mentis emotiones tremulæ, palpatoriæ, phrenitiæ ſunt, & dolores circa ſuram, in his mentem emouent. Quicunq; in febre cōtinua, voce deſtituti iacentes, oculis conuiētes niſtant, hi ſi poſtquam ſanguis iſtis ex naribus fluxit, & vbi vomuerūt loquātur, & ad ſeipſos redeant, ſeruantur. Si verò hæc nō fiant, difficulter ſpirantes facti breui moriuntur. Qui melius habuerunt, ſi poſtridie exacerbantur, malum eſt. Si tertia die cohibiti, quarta exacerbantur, malum eſt. Num & tales exacerbationes phrenitiæ ſunt? Quibuſcunq; deſinunt febres, non in diebus iudicatoriis, his recidiuæ fiunt. Qui in principio tenues, cum capitis pulſu, & vrina tenui, ad iudicationē acerbātur, his nihil miri eſt ſi & mētis emotio inſupérq; vigilia

Hippocratis

giliae accedant. In morbis acutis, motus, iactatio, somnus D
turbulentus, quibusdā cōuulsionem significat. Turbulentae
cum ferocia excitationes mentem emouentes, malae sunt,
itemq; conuulsoriae, tum aliās, tum cū sudoribus. Conuulso-
riae etiā videntur colli ac dorsi perfrigerationes, imò etiam
totius corporis. In his miſtiones sunt pelliculosae. Delyria
cum sopore, cōuulsoria. Mentis emotiones modicè feroces,
ferinae sunt, sed & conuulsiones significant. In morbis lon-
gis, ventris præter rationē tumores, conuulsorij. Affectiones
statim turbulentæ, vigilias inducentes, sanguinē de naribus
stillantes, sexta die alleuantes per noctem, verū post die
rursus affligentes, exudātes in somnum delatae, mentē emo-
uentes, largè sanguinē fundunt, & morbos soluunt. Aquosa E
vrina talia significat. Qui cum relatis, ab atra bile mente
moti, tremuli fiunt, malignè habent. Delyrium in spiritu &
sudore, lethale est. Lethale est & in spiritu ac singultu. In-
somnia in phrenitide euidentia bona sunt. In phrenitide
egestiones alui albæ, & torpor malum. Rigor his pessimus
est. In phreniticis in principiis affectiones māluctæ, ac fre-
quenter transmutationem habentes, malae sunt. Quibus ab
atra bile mēte motis, tremores fiunt, malum est. Qui ab atra
bile mente moti, tremuli fiunt, ac saliuam fundūt, num sanè
phrenitici sunt? Mēte moti, acutè insuper febriētes phreniti-
ci fiunt. Phrenitici parum bibētes, strepitū valde percipien-
tes, tremuli, aut conuulsi. In vehementer phreniticis, tremo-
res lethales sunt. Delyria circa necessaria, pessima. Quæ ex F
his exacerbantur lethalia sunt. Mentis percussiones, voces
clangorosae, linguæ conuulsiones tremulae, & voces tremulae
fientes, mentē alienant. Duricies in his perniciosa est. Præ-
debilitatorum delyria pessima. Affectiones in phreniticis
frequenter transmutationem habentes, cōuulsoriae, prauae.
Phrenitici cū perfrigeratione saliuā fundētes, vomitum ni-
grum indicant. Qui variè agrotant, & frequenter soporosi
mente mouentur, his nigrum vomitū expectandū esse dici-
to. Quæ conuulsorio morbo exacerbātur, stupefactoria sunt.

Tumores iuxta aurem in morbis longis prauis sunt: San-
guinis fluxiones ac vertigines insuper apparentes, pernicio-
se. Febres vertiginosae, & cum voluulis, & sine voluulis, per-
niciosae. Anhelosis febris postea acuta. Cum præcordio in-
rento

A tento perfrigeratis, magnus circa aurem tumor. Quibus in febre dolores circa lumbos & infernas partes fientes septum transuersum cōtingunt, infernas partes relinquentes, perniciosi sunt, tum aliàs, tum si aliud quoddā signum prauum accedat. Si verò alia signa non fuerint praua, suppuratum fore timor est. Pueris febris acuta, & alius supprella, cum vigiliis, & calcitrare, & colorem mutare, & ruborē habere, conuulsorium est. Affectiones statim turbulentæ, vigilias inducentes, & nigra compacta egerētes, partim sanguinē fundūt.

Affectiones cū vigiliis & anxietudine repentina, sanguinē fundunt, tum aliàs, tum si quid etiā antea profluxerit. Num & qui modicè perfrigerati postea horruerunt? At qui circa

B exacerbationes tussunt, & parum exudāt, malignè habent. Ad latus dolore ac suffocatione accedente, hi suppurantur.

Quibus in febribus cōtinuis pustulæ per totū corpus erumpunt, lethale, si nō purulentus abscessus fiat, maxime autem circa aurem his fieri solet. In morbo acuto externas partes perfrigerari, internas autem ardere, & sitire, malum est. Febres continuæ per tertiā diem augescētes, periculosæ. Quibus febris aliquādo intermittit, periculo vacat. In febribus longis, aut tubercula, aut dolores, in articulis fiunt: & si facti fuerint, non sunt inutiles. Capitis dolor in morbo acuto, præcordium reuulsum, non profluente ex naribus sanguine, ad phrenitidem deuenit. Febres lypiricæ, bilis fursum ac deorsum effusione nō accedente, nō soluuntur. Morbus regius ante septimum diem accedens, malū. Septimo verò ac nono, & vndecimo ac decimoquarto, iudicatorius est si non præcordia induret: sin minus, ambigua res est. Frequentes per eadem recidiuæ, circa iudicationē sanguinolentæ, nigrorum vomitū faciunt, fiunt autē & tremulæ. Dolores qui in tertianis febribus exacerbantur, tertianarum generis morbum faciunt, & grumosum sanguinē egerunt. In febribus secundum venā quæ est in collo, pulsus ac dolor, in dysenteriam desinit. Color qui sæpe in calore transmutatur, utilis est. In biliosis spiritus magnus, & febris acuta, cum præcordij intensiōe, iuxta aurem abscessum facit. Qui ex morbis longis se refocillantes bene cibum accipiunt, & nihil proficiunt, hi malignè recidiuā incidunt. Quibus in febribus venæ in tēporibus pulsant, & facies sana est, & præcordiū non molle,

Hippocratis

molle, diuturnū mobum significat, & non desinentem citra **D**
multi sanguinis ex naribus fluxum, aut singultū, aut conuul-
sionem, aut coxendicum dolorem. In febre ardente si al-
uus eruperit, mortale est. Ex alui dolore laborioso, febris
ardens, pernicioſa. In febribus ardentibus si aurium ſoni-
tus accedant, cum viſus hebetudine, & grauitate ſecundū na-
res, melancholico modo ab atra bile mente mouētur, ſangui-
ne iſtis non erumpente. Tremores in febribus ardentibus,
mentis percuſſio ſoluit. In febre ardente fluxio ſanguinis
ex naribus, quarta die, mala eſt, ſi nō aliud quid boni coinci-
derit. Verū quinta minus periculosa eſt. Qui ex febribus
ardentibus aliquātulum perfrigerantibus, cum egeſtionibus
alui aquoſis ac bilioſis laborant, oculis malum eſt, tum aliās **E**
tum ſi ſtupidi fiant. Febris ardens rigore ſuperaccedente
ſoluitur. Febres ardentes recidiuare ſolent, & vbi per dies
quatuor ſignificationem de ſe præbuerunt, poſtea exudant,
ſi minus, ſeptima die. Febres ardentes quatuordecim dies
diuidicant, aut alleuantes, aut perimentes. Ex febre arden-
te, abſceſſu purulento circa aurem non fiente, non valde ſer-
uāntur. Letargici, tremuli ex manibus, ſomnolenti, diſcolo-
res, tumidi, pulſibus, tardi ſunt, & partes ſub oculis eleuatas
habēt, & ſudores in ſuper accedunt, & aluos bilioſas, & intem-
peratas ſubtumidas habent. Si verò obaridas habuerint, vri-
næ & egeſtiones alui latenter iſtis progrediuntur, vrina ve-
lut iumentorum eſt, potum non expetunt, neque aliud quic-
quam. Poſtquam verò reſipuerint, collum doloroſum ſe ha- **F**
bere dicunt, & ſonitus per aures tranſire. Qui verò ex le-
thargicis ſeruantur, plerunq; pectore ſuppurati fiunt. Qui-
buſcunque in febribus tremores circa iudicationem ceſſant,
his temporis progreſſu abſceſſus doloroſus ſuppuratus in ar-
ticulos fit, & veſica doloroſa. Febrientibus quibus rubores
ſunt in facie, & dolor capitis fortis, & venarū pulſus, his ſan-
guinis fluxio plerunq; contingit. Quibus autem cibi faſti-
dia ſunt, & oris vētriculi morſus, & multum ſaliuæ, his vom-
itus fit. Quibus verò ructus adſunt, & flatuſ, ſtrepituſ ac ele-
uationes ventris, his fit alui exturbatio. Qui diutius ſe-
curè ex febre continua laborant, citra dolore aut inflam-
mationem, aut aliam cauſam, his abſceſſus expectandus eſt
cū dolore ac tumore, & magis in infernis partibus. Expecta-
re autem

- A** re autem oportet abscessus, his magis qui trigesimū annum egressi sunt, & tunc expectare abscessus oportet, ubi viginti dies febris trāsmiserit. Senioribus autem minus fiunt, & ubi multo tempore febres durant. At intermittentes & erroneo modo inuadentes, autumno maximè in quartanam leniter transeunt, & hoc magis his qui triginta annos excellerint. Abscessus autem hyeme magis fiunt, & tardiùs desinunt, & minùs recurrunt. Quibus verò sæpe recidiua contigit, his si semestre tempus trāsmiserint, tabes coxendicum leniter accedit. Quæcunque signa feбри se opponunt, & non abscessus significationem habent, maligna sunt. Febres quæ neque in diebus iudicatoriis, neque post solutorium signum decesserunt, recidiuant. Acuti morbi in diebus quatuordecim iudicantur. Tertianæ exquisitæ in quinque aut septem circuitibus, aut ad summū in nouem iudicatur. Quibus febrile incipientibus, sanguis de naribus sternutatione fiente distillat, & vrina subsidentia albam in quarta die habet, his in septima die solutionem significat. Morbi acuti iudicantur, sanguine de naribus fluente, in die iudicatorio: & sudore multo fiente, & vrina purulenta ac vitri formam referente, prodeunte & bonam subsidentiam habente, & aceruatim exeunte: Abscessu item memorabili fiente, & aluo mucosa & cruenta derepente egerente: & vomitibus non paruis fientibus circa iudicationem. Somni profundi, non turbulenti, firmam iudicationem significant. Turbulenti verò cum dolore corporis, inconstantes sunt. Septima die, aut nona, aut decima quarta, fluxiones sanguinis à naribus fientes, plerunque febres soluunt: Similiter & alui fluxio biliosa, & qualis in dysenteria fieri solet: & genuum ac coxendicum dolor: & vrina concocta ad iudicationem. In muliere verò etiā menstruæ purgationis fluxus, Quibus in febribus sanguis abundè vnde cūq; profluxit, his in refectionibus à morbo alui humectantur. Qui in febribus exudant, caput dolentes aluo suppressa, conuulsi fiunt. Mentis emotiones modicè feroces, & ferinum, & conuulsionem significant. Conuulsio in febre fiens, & eadem die desinens, bona est. Conuulsio in febre fiens, sedat febrē eadem die, aut postera, aut tertia. Si verò tempus in quo incepit, transgrediatur, & non desinat, malum est. Febres intermittētes, verū inæqualiter calescen-
- tes,

Hippocratis

res, aluo inflata, pauca egerente, in his post iudicationē lum- **D**
 borum dolore sequuto, alui erumpunt. At amburētes ad ma-
 num, torpide, siticulosæ, anxiosæ, in his aluo suppressa gra-
 uati excoluntur. Quandoque verò & rubicundæ in pedibus
 ambustiones, eadē significant. Hybernæ febres quartanæ,
 leniter in acutos morbos transeunt. Capitis dolor pertinax
 cum febre acuta, & alio signo maligno, lethale est. Ceterum
 sine signo malo, transgrediens vigelimū diem, sanguinis aut
 puris fluxū ē naribus, aut abscessus ad infernas partes signi-
 ficat: fluxiones quidē iunioribus trigintaquinque annis, se-
 nioribus verò, abscessus. Si verò circa frontē ac tempora fue-
 rit dolor ille pertinax, fluxiones. Quibus capitis sunt dolo-
 res, & sonitus aurium, citra febrem & vertigo, & vocis tardi- **E**
 tas, & manuum torpor, eos aut syderatos, aut comitiales, aut
 obliuiosos fore expecta. Qui caput dolent, stupore corre-
 pti, delirantes, aluo suppressa, oculo ferociente, florulenti, hi
 in posteriorem partem conuelluntur. Capitis successiones,
 oculi rubicundi, mente manifestē emouentes, perniciosæ
 sunt. Non commoriuntur hæc, sed circa aurem tumorem fa-
 ciunt. Capitis dolor, cum sedis & pudendorū dolore, & tor-
 pore, & impotentiā inducit, & vocem resoluit. Hæc hor-
 renda non sunt, verum somnolenti ac singultientes fiunt no-
 no mense: ex quibus soluta voce, in idem restituuntur. Qui
 in capitis dolore ascaridas habent, his surditas & sopor con-
 sequens, abscessus circa aurem ex suscitatur. Qui caput dolent, **F**
 stupore detenti, dolorosi, oculum rubicundum habentes, F
 sanguinem effundunt. Capitis concussiones, & aurium fo-
 nitus sanguinem effundunt: aut mulieri menses deducunt,
 tum aliàs, tum si iuxta spinā ardor consequatur: fortassis au-
 tem dysentericis fluxiones. Capite grauati, iuxta sinciput
 dolentes, vigiliis infestati, sanguinem effundunt, tum aliàs,
 tum si quid ad collum se extendat. Vomitus in capitis do-
 loribus æruginosi, cū surditate, vigilantibus, cito insaniā ex-
 citant. Quibus capitis ac colli dolor est, sed & totius corpo-
 ris tremula quadā impotētia, sanguinis eruptio soluit. Quin
 & tēpore hæc soluuntur. Verum vesicæ in hoc supprimuntur.
 In acutis capitis doloribus, & in torpidis cum grauitate,
 conuulsiones fieri solent. Capitis dolorem soluit pus per na-
 res, aut sputa crassa, & non olentia. Soluit item vlcerum eru-
 ptio

Aptio. Quandoq; & somnus, & alui fluxus. Capitis dolor moderatus, cum siti cibū capiente, aut cum sudore nō solvente febrem, abscessus in gingiuis, aut circa aurē significat, aluo non exturbata. Capitis dolor soporofus cum grauitate, conuulsorium quid facit. Caput dolentes, siticuloti, aliquatenus vigilantes, obscuri cognitu, impotentes, ex aluo liquida delassati, num mente mouentur? Caput dolentes, surda stri, manibus tremuli, collum dolentes, mingētes nigra condensata, vomentes nigra, perniciosē habent. Caput dolentes, exudantes, aluum suppressam habentes, conuulsioni obnoxij sunt.

Sopor vbique malus est. Soporosi in principiis fientes, cum capitis lumborum, colli præcordij dolore, vigilantes, num phrenetici sunt? Nasus in his destillans perniciosus, tū aliās, tum quarto ab initio die. Malum est etiam alui proluuium valde rubicundum. Soporosi ab initio exudantes, vrinis concoctis ardentes, verūm citra iudicationem perfrigescentes, & breui rursus ardente, torpidi, soporosi, conuulsi, perniciosē habent. Somni soporosi, & perfrigerationes, perniciosi sunt. Soporosis delassatis, surdis factis, aluo erūpente si rubicunda egesta fuerint circa iudicationem profunt. Soporosi, anxiosi, præcordium dolentes, parum vomentes, abscessus iuxta aurem habent. Antea verò circa faciem tumores cum sopore. Morbi derepentē mentem percellentes cum anxietudine, sanguinem profundunt. Soporosa, anxiosa, dolorosa præcordia, frequēter parū spuentia. Tumores circa aurem habent. Soporosi, num aliquid conuulsorij habent? Affectiones soporosa, fatuitatem inducentes, stuporis detentionem inferentes, præcordia variantia, & ventrem tumidum habentes, cibū fastidientes, aluo suppressa exudantes, nū his turbidus spiritus, & genituræ simile quid pertransiens, singultū significat? Nū & aluus biliosa insuper egerit? Splendidū in his mictum prodest. Ventres quoq; his insuper turbantur. Cerebro corrupto alij in tribus diebus, alij in septē moriuntur. Has verò si effugerint seruātur. Quibus autē ex his resectis os disparatū repertū fuerit, hi pereunt. Caput dolentibus ex posteriore parte ossa rupta habentibus, fluxio ē nare larga crassa, mala est: Hi vbi oculum antea doluerint, rigent. Num & iuxta tempora ossium diruptiones cōuulsoriae sunt? Auris dolor pertinax, cum febre acuta, & alio quodam

Hippocratis

dam signo aliquantū maligno, iuuenes quidem septima die **D**
occidit, & citius delirio correptos, si non multum pus effuxe-
rit ex aure, aut sanguis è naribus, neque aliud quoddam bo-
num signum compareat. Seniores autem tardius, & minus
tollit. Na & aures suppuratione præueniunt, & minus deli-
rant. Verū multi ex his recidiuant, atq; sic pereunt. Surditas
in acutis ac turbulentis consequens malum. Malū etiā in lon-
gis. In his autē dolores etiam ad coxas deducit. In febribus
surditas, aluum sistit. Aures frigide, & pellucide, & contra-
ctæ, perniciose. Tinnitus in acutis, & sonitus in auribus, le-
thale. Sonitus aurium, cum visus hebetudine, & narium gra-
uedine mentem emouet, & sanguinem profundit. Quibus **E**
surditas cum capitis grauitate, & præcordij intentione, & ad
splendorem turbatio, sanguinem profundit. In febre acuta
aures obsurdescere, furiosum est. Valde surdi, in accipien-
do tremuli, linguam resoluti, torpidi, malum. Accedente
ægritudine surditas, & vrina subrubicunda subsidentiam nō
habens, sed id quod in medio innatat, mentē emouet. Mor-
bo regio corripitur, in his malū est. Mala est & ex morbo regio
fatuitas. Hos voce priuari, sentientes tamē esse cōtingit. For-
tassis autem & alius malè his afficitur. Quæ circa aurē do-
lorose excitantur, perniciose sunt. Rubores circa aurem ex
progresso dolore, in febribus fientes, signum quidē sunt ery-
sipelatis in facie futuri. Sed & conuulsionēs ex talibus fiunt,
cum vocis interceptione ac exolutione. Tumores circa aurē **F**
ex plurimis graueolentibus cum febre acuta, & præcordio
intento, tardius excitati, occidunt. Tumores circa aurem
leuiter syderatis, mali. Tumores circa aurem in longis mor-
bis nō suppurantes, lethales. Alui verò his deorsum feruntur.
Num quibus abscessus sunt iuxta aures, caput dolent? Num
& supernis partibus exudant? Num & insuper rigent? Num
& alui erumpunt, & quid soporosum habent? Num & aquo-
sa est vrina, alba innatantia habens, & aliquantum varia,
exalbida, graueolentia. Abscessus iuxta aurem submouent
rusciculæ cum sputationibus fiētes. Vrinæ in abscessibus re-
trò aures citò & modicè maturescentes, malæ sunt, & sic
perfrigerari, malum est. Abscessus circa aurem in morbis
diuturnis suppurati non valde albo & inodoro pure, occi-
dunt, & maximè mulieres. Abscessus iuxta aurem, ex acu-
sis

- A** tis morbis maximè in febribus ardentibus fiunt: & si non iudicationem fecerint, & maturescant, aut ex naribus sanguis fluxerit, aut vrinæ subsidetiam crassam habuerint, agri pereunt. Pleriq; verò talium tumorum antea propulsantur. Verùm considerare oportet insuper etiam ipsas febres, siue augeant, siue remittant, atque sic pronunciare. Ex surditate ac torpore, de naribus aliquid destillare, difficultatis aliquid habet. Vomitus his conueniet, & alui turbatio. Ex surditate leniter abscessus iuxta aures fiunt, tum aliàs, tum si quid nausæ accedat. Sed & soporosis ex his, etiam magis abscessus ad aurem fiunt. Surditatem ex febribus, sanguinis è naribus fluxio soluit: itémque alui turbatio. Facies quæ
- B** ex tumida humiliatur, & vox leuior ac debilior fiens, & spiritus rarior ac leuior, remissionē in sequentem diem significat. Faciei corruptio, lethalis. Verùm minus, si propter vigilias, aut famem, aut alui exturbationem fiat: Et si id quod propter hæc corruptum est, sedetur per diem ac noctem. Talis autem fuerit, oculi caui, nasus acutus, tempora collapsa, aures frigide ac cōtractæ, cutis dura, color pallidus aut niger. Liuescens verò ex his palpebra, aut labium, aut nasus, breui lethale est. Faciei bonus color, & toruitas, in morbo acuto malum est. Frontis ex his contractio, phrenitidis signum est. Circa faciem color bonus, & sudores non febrientibus stercora vetusta subesse significat, aut victus rationem inordinatam. Rubores circa nasum, alui humescētis signa sunt.
- C** Dolores circa præcordia aut pulmonem si suppurentur, malum est. Oculorum puritas, & albas ipsorum partes ex nigris aut liuidis puras fieri, iudicatorium est. Si igitur citò purgentur, celerem iudicationem significat, Si tardè, tardiorē. Caligo oculorum, aut si alba ipsorum pars rubescat, aut liuescat, aut venulis nigris impleatur, bonum non est. Malum est etiam lucis splendorem fugere, aut lachrymari, aut distorqueri. Et alterum minorem fieri, malum est: & oculos frequēter agitare, ac iactare, aut paruas lemas ac fordes circa ipsos, aut concretionem tenuem albicantem habere: aut albam partem maiorem fieri, nigram verò minorem: aut nigram sub palpebram supernam occultari. Mala est etiam oculorum cavitās, & expressio valde foras, & splendoris restrictio, vt pupilla extendi non possit. Et extremitatum

Hippocratis

palpebrarū curuitas, & oculi fixi, & assiduè niſtare, & colo-
res permutare, & palpebras inter dormiendū non commit-
tere, pernicioſum eſt. Malus eſt & oculus peruerſus. Oculorū
rubor in febre ſiens, alui diuturnā malignam affectionē ſi-
gnificat. Circa oculos puſtularum eruptiones in virium re-
fectionibus, aluum prorumpere faciunt. In oculorum diſ-
tortione febriēti, laſſato, rigor pernicioſus: & ſoporōſi in his
malè habent. Viro lipienti, febre ſuperueniente, ſolutio.

— Sin minus, periculū eſt ne cæcus fiat, aut pereat, aut vtrunq;

— Quibus lipientibus capitis dolor accedit, & ad multum
tempus concomitatur, periculū eſt ne cæci fiant. Lippiēti
alui profluuium ſua ſponte prodiens vtile eſt. Oculorum **E**
obſcuratio, & oculus fixus, caliginofus, malum. Oculorum
obſcuratio, cum animi deliquiō, breui cōuulſionem inducit.

Oculorum reſtitudo in morbo acuto, & motus velox, &
ſomnus turbulentus, & vigiliæ, & quandoq; ſanguis è nari-
bus ſtillationes, nihil boni. Qui febres ad tactum non adu-
rentes habent, phrenitici fiunt: & magis ſi ſanguis fluxerit.

Lingua quæ in principio quidem inhorruit, in colore verò
permanet: progreſſu autem temporis exaſperatur, & liueſcit
& rumpitur, lethalis eſt. Si verò valde nigreſcat, in quartade-
cima die iudicationem fore ſignificat. Periculoſiſſima autē
eſt nigra, & cum virore pallida. Linguam circa biſidam ſui
partem, velut ſaliua alba obduci, febris remiſſionis ſignum
eſt, ſi quidem id quod ſuperinductum eſt, craſſum fuerit, ea- **F**
dem die. Si verò tenuius, poſtridie. Si verò adhuc tenuius, ter-
tia die. Eadem ſignificāt etiam huiusmodi, ſi circa ſummam
linguam fiant, verū minus. Lingua tremula cum rubore
iuxta naſum, & aluo liquida, ſi reliqua ſine ſignis ſint circa
pulmonē, malū eſt, & celeres purgationes, pernicioſas ſigni-
ficat. Lingua citra rationē tenera ſiens, & cum cibi ſaſtidio
nauſeabunda, cum frigido ſudore, ex aluo liquida, nigrorū
vomituum, ſignum eſt: laſſitudo in his mala eſt. Linguae tre-
mulæ quibuſdam etiam aluum liquidum quādoque faciunt.
Denigratæ verò in his, celerem mortem ſignificant. Num
— lingua tremula mentem non firmā ſignificat? Linguae aſpe-
— ræ & reſiccatae, phreniticae ſunt. Dentes collidere aut ſtride-
re, quibus non familiare id eſt à pueris, furioſum ac lethale
eſt: Iam verò delirans ſi hoc faciat, penitus lethale eſt. Per-
nicio

A niciosum autē est & resiccati dentes. Dentis corruptio abscissum circa gingiuā factum soluit. Ex dentis corruptione, vehemens febris superaccedens, & delyriū, lethale est. Si verò feruentur, vlcera suppurabunt, & ossa discedent. Quibus circa palatū humoris collectio fit, plerūque suppuratur.

Dolores vehementes circa maxillas, periculum est ne ad ossis educationē deueniant. Labium cōtractum, alui biliosæ eruptionem significat. Sanguis de gingiuis, ex aluo liquida perniciosus. Sputi excreationes in febre, liuidæ, nigra, biliosæ, si quidem supprimātur malæ sunt, secedentes verò pro ratione, vtiles. Quibus saluginosa sputa, ac tussis supprimuntur, his corpus velut à pustulis rubescit. Verū ante obitum exasperatur. Sreatio frequēs, si sanè & aliud quoddam signū affuerit, phrenitidē indicat. Vocis interceptiones cū exolutione, pessimæ. Modicè feroces mentis emotiones, malæ & ferinæ sunt. Quibus vox cum febre deficit, & cum iudicatione intercepta, tremuli moriuntur. Vocis interceptiones in febre cōuulsorio modo fientes, ad mentis emotionem cū silentio deueniūt, perniciosum. Vocis ex dolore interceptiones, dolorosam mortē inducunt. Vocis interceptiones cum exolutione stupefactorio modo, perniciosæ sunt.

Voces confractæ post medicamēti sumptionē, num prauæ sunt? Pleriq; horum exudant, & ventres humectos habent.

In vocis interceptione spiritus, velut his qui strāgulantur, præ manibus expositus, malus est. Num & mentem emouet?

C Ex capitis dolore vocis interceptiones si sint, febricitantes cum sudore laxantur in seipsos, fiuntque morbi reuertentes diutius durantes. his insuper rigere, malum non est. Mentis emotiones cū vocis interceptione, perniciosæ. Vocis interceptiones insuper rigentibus, lethales. Tales autē leniter caput dolēt. Vocis interceptiones cū exolutione, in febre acuta sine sudore, sunt quidem lethales, minus verò quàm cū sudore. Verū diuturnitatē temporis significāt. fortassis autē & qui ex recidiua tale quid patiūtur, tutissimi sunt. Perniciosissimi autē ex talibus habēt quibus sanguis ex naribus fluit, & quibus alui humectantur. Vox acuta, planctū referens, & oculorū obscuratio, conuulsoriū est. Dolores his ad infernas partes, toleratu faciles sunt. Cū voce tremula, solutio alui præter rationē, in his moram trahētibus diuturnis, perniciēs

est. Frequentes subfoporate vocis interceptionis consisten- **D**
 tes, tabem præsignant. Spiritus qui densus quidem & par-
 uus est, inflammationē & dolorē in locis principalibus signi-
 ficat. Magnus autē & per multū tempus delirium aut con-
 uulsionem. Et frigidus quidē lethalis est, lethalis autē est &
 febriculosus & fuliginosus. Verū minus quā frigidus, &
 qui magnus foras expiratur, paruus verò intro: & paruus fo-
 ras, magnus verò intro, pessimus sanē est, & morti propin-
 quus. Itēmq; extendēs, & vrgens, & obscurus, & dupla intro
 reuocatio, veluti super inspiratibus. Bona autem spiratio, in
 omnibus morbis qui cum febre acuta sunt, & in quadragin-
 ta diebus iudicantur, magnū momentum ad salutem habet.

Collum durum & dolorosum, & maxillarū colligatio, & **E**
 venarū iugularium palpitatio fortis, & tendinum distentio,
 perniciosum. Dolores in faucibus gracilibus strangulato-
 rij, à capitis dolore originē trahentes, conuulsorij sunt. Fri-
 giditates colli ac dorsi apparētes, Sed & totius corporis con-
 uulsoria, in his mictiones fiunt crassiorē farinam referentes.

Quibus circa fauces irritamēta sunt, his tumores circa au-
 rem leniter erumpunt. Fauces dolorosæ, graciles, cum agrē
 tolerabili molestia, perniciosæ acutæ sunt. Quibus spiritus
 retrahitur, & vox strangulatoria est, & vertebra intro confi-
 det, his in fine velut, cōtrahente quodam spiritus fit. Fauces
 modicē exasperatæ, & alius vanis conatibus nitens, frontis
 dolores, ægri palpando cōtrectantes, dolorosi: quæ ex his au-
 gescunt, difficilia sunt. Dolores fortes circa fauces, tumores **F**
 circa aurē, & conuulsiones efficiunt. Colli item ac dorsi dolo-
 res. Cum febre acuta cōuulsiones perniciosæ. Colli & cu-
 bitorum dolores, conuulsorij. A facie autem hi, & secundum
 fauces. Pallidi, graciles, saliuam sputantes, In his in somnis
 sudores boni sunt. Num & sudore leuari, plurimis non malū
 est? Dolores ad infernas partes his toleratu faciles sunt. In
 dorſi ac pectoris dolore, mictio cruēta suppressa, pernicioſa
 est dolorosē. Colli dolor malum quidē in omni febre, pes-
 simum autē his quibus timor est vt etiam insaniant. In pe-
 ctoris dolore febriculoso, alius turbata, torpida, nigrarum
 egestionū signa sunt. Dolores parui in acutis iuxta fauces
 graciles, in gracili vbi hiarit, nō facilē os contrahente, men-
 tem emouent. Ex his phrenitici perniciosē habent. Fauces
 exulcer

- A** exulceratæ in febre, cum alio signo ex his quæ difficilia sunt, periculosæ sunt. In febribus derepente suffocari, & deglutire nō posse, citra tumore, malum est. Collum cōvertere nō posse, neq; deglutire, ut plurimum lethale est. Præcordium molle esse conuenit, & doloris exors, & æquale. At inflammatum, aut inæqualiter se habens, aut dolens, signū est ægritudinis non leuis. Tumor verò in præcordiis durus & dolorosus, pessimus quidē est, si iuxta omnes partes fuerit. Ex his autem qui ab vna parte sunt, minus periculosus est qui à sinistris est. Significant autē in principio quidem tales, mortem citam. Si verò viginti dies transmittant, febre manente, suppurationem. Contingit autē his in primo circuitu, etiā sanguinis eruptio è naribus, & valde prodest. Plerunque enim hi caput dolent, & visus obscuratur. & magis in his sanguinis eruptionem affore expecta. In ætatibus autē annorum trigintaquinq; Senioribus verò minus. At verò molles & doloris exortes tumores, diuturniores iudicationes faciunt, & minus periculosi sunt. Sed & hi sexaginta dies transgredientes, febre manente, suppurantur. Consimilia verò significant & tumores circa ventrem, his qui sunt in præcordiis, Verum minus suppuratur hi quàm illi. Minimè verò qui sub vmbilico consistunt, & fiunt etiā hi quidem in tunica, illi verò sursum diffusi. Lethales autē sunt ex ipsis, quicunq; intro rupti fuerint. ex reliquis autem suppurationibus, quæ quidē foras rumpuntur, optimū est ut in breuissimā & acutissimam molem colligantur: quæ verò intro, ut neq; mole, neque dolore, neq; colore, foris se manifestas faciāt. Contrariū autē pessimum est. Quædā verò ex his propter puris crassitudinē, nullam de se significationē præbent. Porro recentes in præcordiis tumores, si nō cum inflammatione fuerint, & dolores ab ipsis soluit murmur in præcordio obortū, & maximè quidē si pertransierit per vrinas, & alui egestionem. Sin minus si etiam ipsum pertransierit. Prodest autē & si subdescenderit ad infernos locos. Pulsus in præcordio cum tumultu, mētis emotorius est, & magis si oculi frequēter moueantur. Oris ventriculi dolor, & pulsus præcordiorum, febre perfrigerata malum, tum aliàs, tum si insuper exudarint. Dolores ad præcordium irruentes, tū aliàs mali sunt, tum si aluos humectēt. Peiores autē sunt, si breui fiant. & tumores circa aurē ex his

Hippocratis

emergētes, maligni sunt, & aliæ suppurationes. Oris vētri- D
culi dolores cū tormine vētris animalcula erūpere faciunt.

Oris ventriculi dolor seniorē frequenter impetens, mor-
tem repentinā significat. Quibus præcordia eleuantur, aluo
suppressa, malū est, maximē autē in morbis tabidis, longis.
& quibus alui humectantur, in præcordio inflāmatio suppu-
ratoria est, quibus ante mortem nigra per aluum subeunt.

Præcordiorū distēctio cum sopore anxioso, in caput dolen-
te abscessus circa aurem attollit. Post præcordiorū tumo-
rem, biliosis spiritus magnus & febris acuta, abscessus circa
aurē attollit. In dolore præcordiorū submurmuranti, lum-
borum dolor superaccedēs in febribus, vētres vt plurimū
humectat, si non flatus eruperit, aut vrinæ copia prodierit. E

Ex præcordio diutinē afflicto, & aluo graecolenti, absces-
sus circa aurem, occidit. Quibus à præcordiorū doloribus,
aluus paulatim subuiscosa egerens, pauca stercoracea effun-
dit. num etiam sanguinē effundit? Quibus derepente dum
sine febre sunt, præcordij & oris vētriculi dolor, & circa cru-
ra, ac infernas partes, & aluus in tumorem eleuata est: soluit
venæ sectio, & alui fluxio. His febre nocuum est. Longæ
enim & vehemētes febres fiunt, & tusses, & spiritus & singul-
tus fiunt. His autem ad solutionem tendētibz, dolor fortis
coxarū, aut crurum, aut puris sputum, aut oculorum priua-
tio succedit. Quibus dolores præcordiorum, oris ventricu-
li, hepatis, partium circa vmbilicum, hi sanguine per aluum F
egesto, seruantur: non autē egesto, moriuntur. Quibus præ-
cordia non mollia, facies sana, non liberātur citra multi san-
guinis ex naribus fluxum, aut conuulsionē, aut coxendicum
dolorē. Dolores ad præcordia in febre voce intercepta, sine
sudore soluti, malum est. His ad coxendices dolores fiunt.

Iuxta ventrem in febre palpitationes, mentis emotiones
inducunt. Sanguinis autem fluxio horrorem efficit. Dolo-
res in febre ad præcordia exilientes, sine sudore soluti, mali-
gni sunt. His ad coxendices dolores fiunt, & ipsis vnā cum fe-
bre ardente, aluus deorsum erumpēs, perniciosum est. Do-
lores circa vmbilicum palpitatorij, habēt quidē & aliquid
mentis emotorium, verū circa iudicationem pituita his
aceruatim copioso cum dolore penetrat. Post aluum suppres-
sam, præcordia subleuata in tumorem, mala sunt, maximē
tabescen

A tabescentibus iam diu, & quibus alui humectantur. Anxietatem in præcordio sentientibus, tumores circa aurē oborti, ipsos occidunt. Duricies circa ventrem cum dolore, in febriculis cum horrore, cibum auersantibus, si aluo insuper parum humectata, purgationem non faciant, ad suppurationem peruenient. Dolor supra umbilicum, & lumborū dolor, si medicamentis nō soluantur, in hydropem siccum desinunt. Dolores ex lumbis diuturniores, qui febre tertianæ generis modo exacerbantur, grumofum sanguinem egerere faciunt. Dolores in lumbis sanguinis fluxionem inducunt.

Ex lumborum dolore sanguinis fluxiones largæ fiunt.

B Quibus ex lumborum dolore, recursus ad caput, & manus torpidæ, & oris ventriculi dolores, & aurium sonitus, his sanguis largè profluet. Sed & alui his deorsum erumpunt, & mens turbata est ut plurimum. Ex dorsi dolore ægritudinis principia difficilia sunt. In lumborum dolore pertinacis, & ampliore alui subductione, à veratro vomere spumosa multa prodest. Spinæ distortionē ac spirandi difficultatem, sanguinis fluxio soluit. In lumbis dolentibus oris ventriculi dolores insuper accedentes, signa sanguinis fluxionis sunt, etiā prægressæ. Affectiones ex lumbis ad collum & caput transeuntes levis siderationis modo resoluētes, conuulsoria, mentis emotoria sunt. Num tales etiā soluantur cōuulsionibus? Aut talium alui ægrotāt per eadē prodeuntia? Ex lumborum doloris recurso, oculorū distortio, malum. Dolor in pectus firmatus torpore, malus in febre est. Hi repente pereunt. Ex lumborum dolore recursiones ad os ventriculi febriculosæ, horrorem inducentes: Sic affecti reuomentes tenuia aquosa, mente moti, voce destituti, nigrorum vomitu facti moriuntur. Diuturni circa lumbos, & tenue intestinum dolores, & ad præcordia dolores, si ægri cibos auersentur vnā cum febre, his dolor intentus ad caput progressus, repente ipsos occidit conuulsorio modo. Quibus lumborum dolor est, hi male habent. Num his tremores fiunt, & circuli rubicundi in tibiis in rigore? Num lumbos dolentibus, cibos fastidientibus, non vomentibus, modicè ferociter mente motis, spes est nigra proçitura esse? Lumborum dolor in vetriculi os dolente, cum excreatione violenta, habet quid conuulsorium. Rigor vnā cum iudicatione ali-

quatenus horrendus est. Lumborum dolor sine causa manifesta sæpe impetens, maligni morbi signum est. Lumborum dolor cum sopore anxioso, malus est. Lumborum distentio ex muliebriū mensium multitudine, ad suppurationem tendit. & variè prodeuntes viscosi, graueolentes, strangulatorij menses ex prædictis, ad suppurationem tendunt. Arbitror autem tales etiā aliquantū delyrare. Quibus lumborum dolor, & lateris, sine causa manifesta, hi regiū morbum incurrunt. Perfrigerationes ex sanguinis eruptionibus in diebus iudicatoriis vehementes, pessimæ sunt. Vice versa sanguinem erumpere, malum est. velut in splene magno ex dextris. & circa præcordia eodem modo se res habet.

Vulnera sanguinem fundentia, insuper rigentia, maligna. E Sic affecti loquentes latenter moriuntur. Affectiones quæ quinta die sanguinem largè fundunt, sexta insuper riguerunt, septima perfrigeratæ fuerunt, & repentè recalescæ, in his alui malè afficiuntur. Post sanguinis eruptionē, nigrorum per aluum egestio, mala. Mala autem sunt & rubicunda valde & æruginosa. Quarta die tales fiunt sanguinis eruptiones. Soporosi ex talibus conuulsi moriuntur, nigris prægressis, & ventre tumefacto. Post sanguinis eruptiones, & nigrorum egestionem, in acuto surditas, malū. Sanguinis egestio his perniciofa. Surditas autem soluit. Quibus sanguinis eruptiones plures, his temporis progressu alui malè afficiuntur, si nō vrina concocta prodierit. Num & aquosa vrina tale quid significat? Quibus ex sanguinis eruptione F larga frequenti, multa sit alui cū nigris egestio, ea autē suppressa, sanguinis fluxiones: hi aluum dolent. vnā verò cum quibusdam flatibus. facilè tolerāt. Num tales multis frigidis sudoribus exudant? Conturbata in his vrina, mala non est: neq; id quod genituræ simile in ipsa residet, verū plerunq; hi aquosa mingunt. Quibus de naribus in surditate ac torpore pauca destillant, habent quid difficultatis. Vomitus his conducit, & alui perturbatio. Magnæ in principiis sanguinis eruptiones, circa resectionem aluos humectant. Fluxiones ex naribus largæ per vim suppressæ, quandoque conuulsionem prouocant. Venæ sectio soluit. Vndecima die fientes sanguinis stillationes, difficiles sunt, tum aliàs, tum si bis superstillauerint, & rursus stillauerint. In sanguinis fluxione

Axione multa, aut singultus, aut conuulsio, mala est. In his qui decolores vsq; ad septem annos vires recolligunt & spiritus in viis aceruatus, & terræ cōcupiscentia, sanguinis corruptionē ac exolutionē significat. In morbis longis parua comparentes sanguinis fluxiones, perniciose sunt. Vertigines ab initio sanguinis nariū fluxio soluit. Ex naribus erumpente sanguine, cū exiguis sudoribus perfrigescentia, maligna sunt. Sanguinis detractio in perfrigeratione torpida, mala est. Qui aluo suppressa sanguinem effundunt, & vnā cum sanguinis effusione insuper rigent, his aluum velut ex intestinorum leuore lubricā hac faciunt, itēque duram, & ascaridas, aut ambo. Sanguinis fluxiones statis temporibus

Bfientes, siticulosa, si sanguinem non effuderint, comitialis morbi mortem inducunt. Ex hæmorrhoidē parū apparente, vertigines oborta, paruam ac modicam siderationē significant, soluit venæ sectio. & quicquid hoc modo apparuerit, mali aliquid significat. Palpitantes per totum. num etiam voce intercepta moriuntur? Tremores conuulsorij fientes in sudoribus reuerti solent. Iudicatio his fit, vbi superriguerint. Superrigent autē hi ardore circa ventrem prouocati. Somnus multus in his conuulsorius, & ad frontē grauitates, & mictio difficilis. Conuulsiones antea nō cognitæ in strangulatis ab vtero, faciles sunt. Conuulsoria sine sudore spūta defluentia in febriente, leuia sunt, His insuper alui aliquantum humectatur. fortassis autē & ad articulos aliquid

Cabscedet. Quibus conuulsis oculi intente relucet, neque apud seipsos sunt, & diutius ægrotant. Quæ conuulsorio modo exacerbantur, cū stuporis detentione, abscessus iuxta aurem excitant. Tremulis, anxiosis, parui iuxta aurē tumores conuulsionē significant, aluo male affecta. Conuulsiones & tetanicas distentiones febris accedēs soluit. Conuulsio ex vulnere lethalis est. Conuulsio in febre fiens, perniciofa est. Minimè verò pueris. Seniores septem annis in febre non corripuntur conuulsione. Sin minus, perniciosum est. Conuulsionem soluit febris superueniens acuta, quæ prius non fuit. Si verò fuit prius, iam exacerbata. Prodest & vrinæ transitus vitri speciem referens, copiosus, & alui fluxus, & somni. At repentinas conuulsiones soluit febris, alui fluxus. In conuulsionibus vocis interceptio diu durans, mala est:

la est: parua autem, aut linguæ siderationem, aut brachij, aut **D** dextrarum partium significat. Soluitur autē vrinis multis aceruatis derepentē prodeuntibus. Sudores autem paulatim fientes profunt, Aceruati verò, itēque sanguinis detractio- nes aceruatae lædunt. In distentionibus & ante & retro fientibus, & intergum solū contingētibus, si maxillæ soluan- tur lethale est. Lethale est etiam sudare in distētionē in dor- sum fiente, & corpus dissolui, & in eadē affectione reuomere per nares, aut clamare, aut iugari, si ab initio vox intercepta fuit. In posteram enim diem mortem significat. Febriles in dorsum distentiones, vrinæ geniturae similes soluunt. Anginae quæ neque in collo, neque in faucibus, quicquam con- **E** spicuum faciunt, verū suffocationem vehementem ac spi- randi difficultatem inducunt, eadem die & tertia occidunt. Quæ verò tumores & ruborem in collo accipiunt, in cæteris quidem cōsimiles sunt, verū diuturniores. Quibuscunque verò & fauces, & ceruix, & pectus, simul rubuerint, diutur- niores sunt, & ex ipsis maximē seruantur, si non recurrerint rubores. Si verò dissipentur, neque tuberculo foras conuerso ac collecto, neque pure leniter ac sine dolore excreato, ne- que in diebus iudicatoriis, perniciose sunt. Num etiam sup- purati fiunt? Securissimum autem est ruborem & abscessus quā maximē foras verti. Erysipelas verò foris quidem ac- cedere, commodum est, intro autem conuerti, lethale. Con- uertitur autem intro, quum disparente rubore pectus grauatur, & difficilem spirationem habet. Quibus verò anginae ad **F** pulmonem vertuntur, partim in septē diebus pereunt, partim euadentes suppurati fiunt, si non educio pituitosa sur- sum ipsis fiat. Quibus per pulsationis venarum vehemen- tiam, stercus derepentē per aluum secedit, lethale est. In an- ginis sputa gracilium subarida malum. Anginosi in linguis tumores, circa signa disparentes, perniciosi: & dolores dispa- rentes citra manifestam causam, perniciosi sunt. In anginis qui non breui concocta exspuunt, perniciose habent. In angina dolores ad caput, citra notas, cum febre, perniciosi. In angina dolores ad crura, citra notas, cum febre, perni- ciosi. Ex anginis citra indicationem præcordij dolor, cum impotentia ac torpore fiens, occidit occultē, etiamsi valde mansuetē se habere putent. Ex anginosis citra notas at-
 nuatis,

Anuatis, dolor ad pectus & ad aluum progressus concitatus, pus egerere facit, aliàs autem eius qui exoluitur tale est. In anginis omnia perniciofa sunt, quæ non manifestū dolorem faciunt. Sed & ad crura dolores diurni procedunt, & difficulter suppurantur. Ex angina sputa viscosa, crassa, valde alba, quæ violēter educuntur, mala sunt. Et omnis eiusmodi maturatio, mala. Purgatio multa deorsum tales levis considerationis modo perimit. Ex angina, subarida frequentia sputa, cum tussi, lateris dolorē inducentia, perniciofa itēq; ea quæ inter potandū per tussim subemergunt: & deglutitio violenta, mala. Pleuritici quibus in principio sputationes penitus purulentæ sunt, tertia die moriuntur, aut quinta. Si **B** verò has effugerint, non multo melius habentes, septima, aut nona, aut vndecima suppurari incipiunt. Quibus supra aurem rubor, & similiter veluti pleuritici calescunt, & aluus biliosis ac graueolētibus exturbatur, hi vigesima ac quadragesima die periclitantur. Vbi verò has effugerint, seruantur.

Pleuritides sicæ ac sine sputo difficilimæ sunt. Horrēdæ quoq; hæ in quibus dolores supernè sunt. Pleuritides sine cōuulsionibus, grauiores sunt his quæ cū cōuulsionibus sūt.

Quibus pleuriticis in principio lingua biliosa fit, hi septima die iudicantur. Quibus autem tertia aut quarta die, circa nonam. Bulla subliuida fiēte in lingua, in principio, qualis est ferri tincti in oleum, difficilior solutio contingit, & iudicatio quidem ad decimum quartū diem peruenit, sanguinem autem plerunque spuunt. Sputum in pleuriticis tertia die maturari ac exspui incipiens, citiores solutiones facit: verū postērius, tardiores. In doloribus pleuritico-
Crum commodum est aluum molliri, sputa colorari, strepitus in pectore non fieri, urinam bene procedere. His autem contraria, difficilia sunt: itēque sputū dulce fieri. Biliosa simul & sanguineæ pleuritides, plerūque nona aut vndecima die iudicantur, & maximè sanantur. Quibus autem pleuriticis in principio quidem dolores molles sunt, quinta verò aut sexta die exacerbantur, hi magis ad duodecimā perueniunt, & non valde seruantur. periclitātur autem maximè septima die ac duodecima. Vbi verò bis septem dies effugerint, seruantur. Quibus pleuriticis strepitus sputi multus in pectore est, & facies tristis, & oculus morbi regij colore infectus, ac caligi

Hippocratis

caliginosus, hi pereunt. Qui ex pleuritide suppurati fiunt, **D**
in quadraginta à ruptione diebus expuunt. Sputum in omnibus pleuriticis ac peripneumonicis facile ac cito expui conuenit, & flauum sputo ammixtum esse. Quod verò longè post dolorem educitur flauum, aut non mixtum, & multam tussim inducens, malum est. Prauum autem penitus est flauum meracum, & viscosum, & album, & rotundū, & cum virore pallidum valde, & spumofum, & liuidum, & æruginosum. Peius autem aliquanto est id quod ita meracum est, vt nigrū appareat. At sanguine non multo permixtum flauum, in principio quidem salutare est, septima verò die, aut posterius, minus tutum. Sanguineum verò valde, aut liuidum, statim in principio periculosum est. Præua sunt etiam sputa, **E**
spumosa, & flaua, & nigra, & æruginosa ac viscosa, & quæcūque cito colorantur. At mucosa ac fuliginosa, & cito colorantur, & securiora sunt. Quæ verò intra quintum diem ad coctionem colorantur, meliora sunt. Omne porrò sputum non soluens dolorem, malum est: soluens autem, bonum. Quicumque verò cum bilioso purulentum educunt, aut seorsim, aut permixtum, plerunque decimaquarta die moriuntur, si non mali aut boni quippiam ex præscriptis superueniat. Sin minus, pro ratione, maximè autem his quibus eiusmodi pus septima die incipit. Bonū verò est & in his & in omnibus circa pulmonē morbis, facile ferre morbū, à dolore liberatum esse, sputū facile educere, bene spirare, & sine siti esse, & totū **F**
corpus æqualiter calefcere, ac molle esse. Et ad hæc somnos, sudores, vrinas, alui egestionem, bonas esse. Mala autē sunt his cōtraria. Si quidem igitur omnia bona ad hoc sputum accesserint, seruari homo poterit. Si verò partim affuerint, partim non, non vltra decimūquartū vita producta peribit. Quod si contraria signa accedant, citius etiam. Quicumque verò dolores in his locis non sedantur, neque ad expuitiones, neque ad venarum sectiones, ac victus rationes, suppurantur. Quibuscunque autem ex peripneumonia abscessus circa aurem, aut ad infernas partes fiunt, & suppurantur ac fistulantur, hi superstites euadunt. Fiunt autem his quibus & febris, & dolor affuerit, & sputum pro ratione non proderit. neque biliosa alui egestionem, solutūque faciles ac meracæ fiunt, neque **lutaria**
vrina crassa valde, & multam subsidetiam habens: & alia salu-

A lutaria habuerint. Fiunt autem ad infernas quidē partes, his quibus circa præcordia inflāmatio fit: ad supernas verò, quibus præcordiū molle & doloris exors fuerit, & vbi per tempus aliquod difficulter spirauerint, ac citra manifestam causam cessauerint. At abscessus ad crura in periculosis inflammationibus pulmonis, omnes quidē commodi sunt, optimi autem, sputo purulento pro fluo fiente. Non procedente verò sputo secundum rationem, neque vrina bonam subsidendam habente, periculum est claudum fore hominē, aut multum molestiarum exhibitura res est. Si verò recurrerint abscessus, febre consequente, & sputo non procedente, periculū est ne moriatur ac deliret. Quicūque verò peripneumonici nō purgati sunt iudicatoriis diebus, sed mēte moti quatuordecim dies effugerunt, eos periculum est suppuratos fieri,

B Peripneumoniæ ex pleuritide trāsmutatæ, securiores sunt his quæ ab initio fiunt. Corpora exercitata ac densa citiùs à pleuriticis ac peripneumoniciis morbis pereūt quàm inexercitata. Grauedines & sternutationes in morbis circa pulmonē, & antecessisse, & succedere, malū est. Reliquis autem sternutatio non incommoda est. Peripneumoniciis quibus lingua tota alba ac aspera fit, ambæ pulmonis partes inflāmatæ sunt, Quibus verò dimidiū, vna iuxta quam apparet, Et quibus ad vnā clauiculam dolor fit, his superna pulmonis ala vna ægrotat. Quibus autem ad ambas clauiculas dolor fit, ambæ supernæ pulmonis alæ ægrotant. Quibus iuxta
C mediam costam, media. Quibus ad discriminationem, inferna. At totam vnā partē dolentibus, omnia iuxta hanc partem dolent. Siquidem igitur aortæ appellatæ, vtrinque appendentes pulmonis partes, valde inflāmatæ sunt, vt ad latus assideant, hac corporis parte resoluuntur, & liuores foris circa costam habent. Hos autē veteres ictos, siue syderatos vocabant. Si verò non valde inflāmatæ sunt, vt nō assideant: dolor quidem fit per totum: non tamen resoluuntur, neq; liuores habent. Quibus verò totus pulmo inflāmatu fuerit, vnā cum corde, vt ad latus allabatur, hi toti resoluuntur, & iacet æger frigidus, sensus exors. Moriturque secunda aut tertia die. Si verò etiam sine corde contigerit, minus diu viuunt. Quidam autē etiā seruantur. Qui suppurati fiunt, maximè ex pleuritide ac peripneumonia, eos colores comitantur,

tur, interdiu tenues, noctu vehementiores, & nihil memora-
tu dignum spuunt, & circa collum ac claviculam sudant, &
oculi caui fiunt, maxillæ verò rubent. digiti summi deterius
calescunt ac asperantur. Ungues curuantur, ac perfrigerantur,
& circa pedes tumores habet, & circa corpus pustulas, & ab-
stinent à cibis. Diuturnæ igitur suppurationes, signa hæc ha-
bent. Quæ verò breui rumpuntur, ex notis ad eas consequen-
tibus cognoscere oportet, & ex doloribus in principio. Simul
autē & si aliquando difficilius spirauerit homo. Rumpuntur
autē plurimæ suppurationes, partim vigesima die, partim
quadragesima, partim sexagesima. Quibus igitur dolor in
principio incumbit intentus, & spirandi difficultas, & tussis
cum sputatione, ad vigesimū diem aut citius, eruptionem ex-
pecta. Quibus autem leuiora hæc sunt, iuxta rationē: Suppu-
tare autem oportet tempus, à quo primū doluit, aut graua-
tus fuit, aut febriit, aut si quando rigor corripuit. Necesse est
autem præcedere & dolorem, & spirandi difficultatē, & spu-
tationem, ante ruptionē. Quibus igitur & febris statim post
ruptionem decedit, & cibum appetunt, & pus facile educitur
album, inodorū, leue, eiusdem coloris, & à pituita liberū, &
alius parua cōpacta egerit, plerunque breui seruantur. Quos
verò & febres sequuntur, & sitis, & cibi fastidium, & pus liui-
dum, aut cum virore pallidū, aut pituitosum, aut spumofum,
& alius insuper liquida fit, moriuntur. At quibus aliqua ex
prædictis accesserint, aliqua non, horum aliqui pereunt, ali-
qui multò tempore seruantur. Qui suppurati futuri sunt,
primū salsuginosum spuunt, deinde dulcius. Quibus in
pulmone tubercula fiunt, pus educunt ad dies quadraginta
post ruptionem. Has verò transgredientes plerunque tabidi
fiunt. In lateris dolore, stillatio sanguinis de naribus, ma-
la est. Quos suppuratos mitius habentes, sputorum gra-
ueolentiæ sequuntur, eos recidiua occidit. Qui ex pleuri-
tici exspuunt purulenta, subsidiaria, rotunda: aut purulen-
ta subcruenta progressu tempore, perniciosè habent. Perni-
ciosè item qui nigra fuliginosa spuunt: aut quibus velut à vi-
no nigro sputa fiunt. Quicunque sanguinem spumofum
spuunt, dextrum præcordium dolentes, de hepate spuunt,
& multi pereunt. Quibus dum concutiuntur pus cœno-
sum & graueolens prodit, plerunque pereunt. Quibus à
pure

A pure specillum coloratur, velut ab igne, plerunque pereunt.

Cum lateris dolore, non tamen pleurítico, & turbulentis tenuibus lenibus, hi phrenetici euadunt. In morbis pulmonis valde rubicundæ sanguinis stillæ, malæ sunt. Cum raucedine, sputa viscosa, sanguinolenta, mala. Si verò etiam quid attollatur iuxta pectus, in his malum est. Dolores ad collum his attenuatis perniciosi. Raucedo cum tussi, & aluo liquida, pus educit. Quibus in peripneumonia urina crassa in principio, deinde ante quartum diem attenuantur, lethale est. Qui in peripneumoniis siccis pauca concocta educunt, horrida res est. Rubores in pectoribus sublatis, talibus perniciosi sunt. Lateris dolor in sputo bilioso præter rationem

B euanescebat, mentem emouet. Febres intermittentes ob suppurationem, pleræque sudorificæ sunt. Suppuratis surditas oborta, cruentam egestionem significat. His ad finem nigra prodeunt. Lateris dolor cum febre diuturna, puris educationem fore significat. Horrore affecti frequenter ad suppurationem deueniunt. Sed & febris tales ad suppurationem perducit. Quos ex lateris dolore cibi fastidia sequuntur, oris ventriculi dolore ac sudore aliquantulum vexantur. Facie flores habente, & aluo liquidior, suppurationes circa pulmonem habent. Erectæ cervicis spirationes facit hydrops siccus. Conuulsiones omnes quidem molestæ sunt, & dolores in principio intentos inducunt; & postea quoque aliquos commonefaciunt. Verum difficilissimæ sunt circa thoracem, &

C maximè periculosa. Quibus est vomitus sanguinis, febris multa, & dolor circa mammam, thoracem, & dorsum: quibus hæc omnia fiunt, breui moriuntur. Quibus autem non omnia, neque valde tardius. Inflammati autem sunt diebus quatuordecim ad summum. Sanguinem spuenter confert, ut sint sine febre, & tussiant, ac doleant leuiter, & ut sputum tenue fiat ad dies bis septem. Febrile verò & tussire, ac dolere pertinaciter, & sanguinem recentem semper spueri, incommodum est. Quibus latus subleuatum in tumorem ac calidus est, & inclinatis in alterum, grauitas aliqua impendere videtur, his pus ex vna parte est.

Suppuratis pulmonem per aluum pus secedere, lethale est. Quicumque vulnerati in thoracem, externa vulneris parte sanati sunt, interna non, periclitantur ne suppurati fiant.

fiant. Quibus autem debilis inducitur est intus cicatrix, facile ^D refringitur. Ex peripneumoniciis suppurationibus seniores magis pereunt, ex reliquis iuniores. Quibus suppuratis dum cōcutiuntur, multus strepitus de humeris fit, minus puris habēt hi, quā in quibus paucis, si difficilius spirent & meliorem colorem habeant. Quibus autem strepitus quidem nullus fit, verū difficultas spirandi fortis, & vngues liuidi, hi pleni sunt pure, & perniciosē habent. Qui spumofum sanguinem vomunt, dolore infra septum transuersum non existente, de pulmone vomunt. Ex quibus quidem magna in ipso vena rumpitur, multum vomunt, & in periculo versantur. Quibus verō minor, minus educunt, & securiores sunt.

Quibus tabidis sputum in igne grauem nidorem olet, & ^E capilli de capite fluunt, pereunt. Quibus tabidis in mare expuentibus, pus ad fundum fidit, breui pereunt. Sit autem mare in æneo vase. Quibus tabidis capilli ex capite defluunt, à profluuiio alui moriuntur. Et quibus tabidis alui profluvia accedunt, moriuntur. In tabescentibus sputa suppressa, mentem ad nugas garriendas emouent. His spes est hæmorrhoidem apparere posse. Tabes periculosissimæ sunt, à ruptione venarum crassarū, & à defluxu de capite. Aetates periculosissimæ sunt ad tabem, ab anno decimo octauo, vsq; ad trigelimum quintū. Pruriginosa corpora post aluum suppressam, in tabidis mala sunt. In habitibus tabescentibus cum febre, fluxiones ad gingiuas & dentes comparentes, malæ sunt. In omnibus in tumorem eleuata præcordia, mala ^F sunt, in tabidis autem pessima. Ex his qui diutina tabe perniciosē consumpti sunt, aliqui ante finem rigore apprehenduntur. Pustularum eruptiones velut ferro lancinata, habitus tabem significant. Difficulter spirantes ex putredine, multa cruda educentes in tabe, perniciosē habent. Quibus hepaticis multum est sputum cruētum, siue subputridum, siue biliosum meracum, statim perniciosum est. In hepatico colliquatio cum raucedine, malum, tum aliās, tum si aliquantum tussiat. Hepar dolentes, os ventriculi dolentes, soporosi, rigore habentes, & aluum turbatam, tenues, cibum auersantes, multum exsudantes, purulenta per aluum egerunt.

Hepar derepentē circumcirca dolentibus, febris accedens dolorem soluit. Qui sanguinem spumofum spuunt, præcordium

A dium dextrum dolentes, de hepate spuunt, & moriuntur.

Quibus hepar vstis, velut amurca prodit, lethale est. Hydrops ex morbis acutis dolorosi fiunt, ac perniciosi. Incipiunt autem plerique à laterum mollitudine, aliqui etiam ab hepate. His igitur quibus à laterum mollitudine initium sumunt, pedes tument, & alui profluvia diuturna sequuntur, aluum non mollietia, neque dolores ex lumbis & laterum mollitudine soluentia. Quibus verò ab hepate, tussis adhuc promptè oboritur, & pedes tument, & alius dura egerit, eamque ad necessitatem coacta, & tumores circa ipsam fiunt, partim in dextra, partim in sinistra, & rursus sedantur. In hydropicis siccis, vrinæ stillicidia mala. Malæ etiam vrinæ paruas subsidetias habentes. Hydropicis comitialis morbi affectiones accedentes perniciosæ sunt, & inter se signa prava sunt, & aluos humectant. In biliosis alius turbata, egerens parua genituræ similia, mucosa, & dolor circa pubem inducetia, & vrinæ non facile solubiles prodeunt, ex talibus in hydropem desinunt.

Hydropico febrienti, vrina parua, & turbata, perniciofa est. in aqua inter cutem incipiente, alui profluvium aquosum fiens, citra cruditatem, morbum soluit. In hydrope sicco sui significationem præmittente, tormina circa intestinum tenue insidentia, mala sunt. Et hydropicis comitiales perniciosi. Hydrops qui ad curationem remisit recurrens, desperatus est. Hydropicis circa venas aqua, in aluum prolapsa, solutio fit. Dysenteria intempestive suppressa, abscessum in costis, aut visceribus, aut in articulis facit. Nunc igitur biliosos abscessus in articulis, sanguineus in costis aut visceribus fit? Dysentericis vomitus biliosus in principio, malus est. Quibus ex dysenteria acuta, humor ad purulentiam devenit, his id quod superstat, valde album ac multum erit.

Dysentericæ, subrubræ, limosæ, largæ egestionis alui, in flammeis valde rubicundis coloribus solutæ, insaniam timorem inducunt. Dysenteria non longa splenicis commoda est, longa verò mala, desinente enim si hydropes, aut intestinorum leuitates fiunt, lethale est. In intestinorum leuitatibus, cum animalculis, dolores tormine soluti, partes circa articulos tumefaciunt, ex talibus squamulæ rubicundæ pustulosæ: hi ubi exudarunt velut flagris cæsi rubescunt. Qui in longis intestinorum leuitatibus, una cum animalculis, tormina

K k

na patiun

na patiuntur, & doloribus afficiuntur, his solutis intumescunt. **D**
 Insuper rigere his malum est. Intestinorum leuitates cum spirandi difficultate, & lateris punctura, in tabem desinunt. Voluulosis vomitus, & surditas, malum. Vesicae durae & dolentes, omnino quidem malae sunt, pessimae vero cum febre continua. Nam dolores ab ipsis vesicis, ad occidendum sufficiunt, & alui his non valde egerunt. Soluit autem hos urina purulenta prodiens, albam ac leuem subsidentiam habens. His vero non solutis, neque vesica mollescente, in primis circuitibus, agrum moriturum esse timor est. Fit autem hoc maxime a septem annis: usque ad decimum quintum. Calculosi ita figurati, ut lapis ad urinarium meatum non illabatur, facile mingunt.

Quibus tuberculum est circa vesicam, quod mingendi difficultatem inducit, ad omnis generis figuras vexantur: huius **E**
 autem solutio fit, pure erumpente. Quibus urina clandestine allabatur ad pudendum, exoluuntur desperati. In urinae stillicidio voluulus accedens, septima die perimit, si non febre accedente urina aceruatim prodeat. Torpores, & sensus stupiditates, praeter morem fientes, futurae syderationis signum sunt. Qui ex vulnere impotentes fiunt corpore, febre quidem accedente citra rigorem sanantur: non autem accedente, syderati fiunt dextra aut sinistra parte. Syderatis si haemorrhoides accedant, utile est: Si vero frigiditates & torpores, malum. In syderatis ex spiritus agra latione, sudor accedens, lethale. Rursus autem in his ipsis si febris accedat, solutio fit. Syderationes derepente exolutorio modo fientes, insuper temporis progressu accedente, perniciosae sunt.

Quibus ex aliqua aegritudine, ad aquam inter cutem res deuenit, his alui siccae excrementa caprini stercoreis pilulis similia egerunt, cum eliquidatione mucosa, & urina non bona, & distentiones circa praecordia, & dolores ac tumores circa ventrem, & dolores circa laterum mollitudinem, & iuxta spinam musculos accidunt: febres item, & sitis, & ruses siccae sequuntur, & circa motus spirandi difficultas, & crurum grauitas, & a cibis abstinere, & paucis ingestis explentur.

Hydropas leucophlegmatias appellatos, alui profluuium sedat. At tristitia cum silentio, & hominum auersiones, leniter eo modo affectos occidunt. Qui ex timore cum perfrigeratione mente mouetur, febres cum sudoribus, & somni

Ani vocem aliquantum intercipientes, hæc soluunt. Ex insania, ad raucedinem cum tussi, fit discessus. In furiosis conuulsio accedens, dissipationē facit. Mentis emotiones taciturnæ, non quiescentes, oculis circumspicientes, spiritum extra efferentes, perniciosæ sunt. Faciunt autem & leues syderationes diuturnas. Sed & ita affecti ad insaniam deueniunt. Qui verò in ventris turbatione ita exacerbatur, his nigra circa iudicationem prodeunt. Quibus sanis hyeme circa lumbos frigiditas, & grauitas ex leui causa, & aluus suppressa, superno ventriculo probè officium suum præstante, his coxendicum morbus, aut rhenū dolor, aut vrinæ stillicidium fortassis contigerit. Quibus infernæ partes affliguntur, pruritibus antea fortibus obortis, his arenosa vrina fit, & supprimitur. Qui verò ex his perniciosè habent, his mens obtorpescit. Qui circa articulos rubicundas in superficie pustulas habent, insuperque rigorem, hi circa ventrem & inguina rubesciunt, velut ex plagis dolorosis, & moriuntur.

Morbo regio affecti, non ita subtili sensu præditi, quibus singultus sunt, his alui erumpunt. Fortassis autē & suppressio fit, hi viridanti pallore inficiuntur. Dolores iuxta latus, in febribus tenuiter cōsistentes, citra notas, venæ sectio læferit, siue cibum auersetur æger, siue præcordium sublime habuerit: & in perfrigeratione, nō sine febre torpidos, sanguinis detractio lædit: & putantes se meliùs habere, hi moriuntur. Caput & pedes, & manus perfrigerari, aluo & lateribus calidis, malum est. Optimum autem est, totū corpus similiter calidum ac molle esse, Conuerti autem conuenit facile agrotum, & in attollendo se leuem esse. At grauitas totius corporis, & manuum ac pedum, mala est. Si verò etiā ad grauitatem liuidi fiāt digiti ac ungues, mors propinqua est. Si verò penitus nigrescāt, minus perniciosi sunt liuidis. Verum etiam alia considerare oportet. Si enim facile fert morbum, & aliud quoddā ex bonis signis subindicat, morbus ad abscessum vertitur, & partes corporis nigrefactæ decidunt.

Testes, & pudenda reuulsa, malum significant. Flatum sine strepitu ac crepitu prodire, optimū est. Melius autē est & cum strepitu exire, quàm isthic reuolui, etiam si tali modo progressus, dolorē & desipientiā significet: si non volens homo vltro flatum ita emittat. Vlcus liuidum & siccum, aut

cum virore pallidum, lethale est. Decubitus optimus est, D
velut quis sanus solitus fuit. At supinum iacere, cruribus ex-
tentis, bonum nō est. Si verò etiam delabatur pronus ad pe-
des, deterius est. Lethale autem est & hiare, & dormire sem-
per, & crura supinè iacentis valde incuruata esse ac compli-
cata. In ventrem autem decumbere, si quis non sit adfuetus,
delyrium significat, & dolores circa ventrem. At pedes nu-
dos habere & manus, si quis nō vehemēter calidus sit, & cru-
ra dissecta, malū est. Anxietatem enim significat. Caterū ere-
ctum sedere velle, malū est in acutis, pessimū autē peripneu-
monicis ac pleuriticis. Dormire verò oportet noctu, inter-
diu vigilare, Contrarium autē malū est. Minimè verò ladi-
æger poterit, si dormiat manè ad tertiam diei partē. Verūm E
postea somni mali sunt. Pessimum autē est nō dormire, neq;
die, neq; nocte: aut enim præ dolore & afflictione vigilarit,
aut ab hoc signo delyrabit. Quibus tempora secantur, con-
uulsio ex cōtrariis sectioni partibus oboritur. Quibus cere-
brum cōcussum fuerit & doluerit, percussis, aut aliàs lapsis,
hi statim voce priuantur, & neq; vident, neq; audiunt, & ple-
runq; moriuntur. Quibus cerebrum vulneratur, febris ple-
runq; ac bilis vomitus accedit, & corporis syderatio, atq; ta-
les perniciosè habent. Ex ruptis capitis ossibus, difficillima
cognitu sunt ea, quæ circa futuras rūpuntur. Rumpuntur au-
tem maximè à grauibus ac rotundis telis, & ex his quæ ex
subcontrario afferuntur, & nō ex plano loco. At verò de qui-
bus ambiguum est, rupta ne sint an nō, iudicare oportet, ex- F
hibito ad manducandum in vtranque maxillam asphodeli
caule, aut ferula, ita vt animaduertere iubeas, an os aliquod
ipsi strepere videatur. Nam fracta strepere videntur, Pro-
gressu verò temporis, fracta partim septima, partim decima
quarta, partim etiam aliter significationem de se præbent.
Nam & carnis ab osse discessus fit, & os liuidum, & dolores
sanie effluente. Hæc autem ægre iam auxilium admittunt.

Quibus omentum excidit, necesse est putrefieri. Si in-
testinum quoddam ex gracilibus dissectum fuerit, non co-
alescit. Nervus dissectus, aut genæ tenuis pars, aut præpu-
rium, non coalescit. Quodcunque os in corpore rese-
ctum fuerit, aut cartilago, non augetur. Ex vulnere con-
uulsio accedens, mala est. Ex vulnere bilis vomitus acce-
dens

A dens malum, & maximè in capitis vulneribus. Nerui crassi si vulnerantur, plerunque claudi fiunt, & si obliqui vulnerantur præsertim, & si musculorum capita, maximè in femoribus. Moriuntur maximè ex vulneribus, si quis cerebrum fauciatum fuerit, aut spinalem medullam, aut hepar, aut septum transversum, aut cor, aut vesicam, aut venâ crassam. Moritur autem etiam, si in arteriam & pulmonem valde magnæ plagæ fiant, ita ut pulmone percussio, paucior spiritus per os procedat, quàm is est qui ex vulnere elabitur. Moriuntur autem qui in intestina vulnerati sunt, siue ex tenuibus aliquod, siue ex crassis vulneratum fuerit, si per transversum fiat plaga, & magna. Si verò parua & recta, quidam euadunt. Minimè

B verò moriuntur vulnerati in partibus corporis ubi hæc non sunt, aut ab his quàm longissimè absunt. At verò visus obscuratur in vulneribus fientibus in supercilium, & paulo altius. Prout autè vulnus recentius est, maximè vident, cicatrice verò diutius tardante ac senescente, magis obscurari cōtingit. Fistulæ difficilimæ sunt, quæ in cartilaginosis & excarnibus locis sunt, & cauæ sunt, & procedunt ac sanie manāt semper, & carūcula in osculo ipsis inest. Curatu autè faciliores sunt, quæ in mollibus & carnosiss & non nervosis existunt. Morbi hi ante pubertatem non fiunt, peripneumonia, pleuritis, podagra, nephritis, varix circa tibiā, fluxus sanguineus, cæcer non congenitus, vitiligo leuce dicta non à natura insita, defluxus medullæ spinalis, hæmorrhoids, voluulus chordasus

C appellatus non cognatus. Horum morborum nullū ante pubertatem fore expectandū est. Verūm ab anno decimoquarto, usque ad quadragesimum secundum, natura corporis morborum omnis generis ferax fit. Rursus ab hac ætate, usque ad annos sexagintatres, non fiunt strumæ, neque lapis in vesica, nisi prius existat, neque defluxus medullæ spinalis, neque nephritis, nisi ex alia ætate comitetur, neque hæmorrhoides, neque fluxus sanguineus, nisi prius fuerit. Hi usque ad senectutē absunt morbi. In mensibus muliebribus qui aquosi ante partus prodeunt, mali sunt. Ora feruido aphthæ vlcere affecta, utrum gestantibus, non sunt bona. Num & alui humectantur? Dolores ex laterū mollitudine, ad intestinum tenue transeuntes, in morbis longis, ex corruptione fœtus non valde purgata, perniciosi sunt. Quæ ex partu ac fœtus cor-

Hippocratis

ruptione multa repente concitata, supprimuntur, difficilia **D**
sunt. Rigor his infestus est, & alui turbatio, tum aliàs, tum si
præcordium doleant. Vterum gestantibus dolores capitis so-
porosi, cum grauitate fientes ac conuulsione, plerunq; mali
sunt. Quibus dolores pertinaces ex mensibus, circa super-
nam partē, & intestinum tenue, aluos humectant, aliquātum
cibos auersantur. His circa iudicationē, delationes in somnū
fiunt, & impotentes ex capitis dolore exsudent, ac perfrige-
rantur. Tales recidiuæ plerisque fientes post remissionem,
cito occidunt. Spiritus qui cum suspiriis extra feruntur, &
colliquatio præter rationē, in uterum gestantibus abortum
facit. Dolor ventris post partum, in his purulenta purgat.

Torpidæ, & præsertim in motibus, cum impotentia fra- **E**
ctæ, circa iudicationem vexatæ, anxiosæ, multum exsudent.
Alui his humectæ, malum. Menses non supprimi commo-
dum est, ex talibus comitiales morbi fiunt, vt arbitror, qui-
busdam verò ventris subductiones diuturnæ, quibusdā hæ-
morrhoides. Prægnantibus præcordij dolor, malum & alui
his subeuntes, malum. & insuper rigere his malum. Dolor
ventris in talibus, minus malum, si limosa purgentur. Quæ
ex talibus facilè pariunt, post partum vehemēter molestan-
tur. Prægnantibus tabescentibus quibus rubor in facie fit,
stillationes de naribus fientes hunc auertunt. Quibus ex
partu prodeunt alba, his verò suppressis cū febre surditas, &
dolor acutus ad latus fit, mente mouentur, & perniciose ha-
bent. In gestantibus uterum salsuginosa, significant post par- **F**
tum molestias ex albis mordacibus. Tales purgationes in-
durant. singultus in his malum. Ad pedes & ad lumbos di-
stentiones ex mēsis, suppurationem inducunt, itēque ea
quæ de aluo viscosa graueolētia cū dolore prodeunt. Stran-
gulationes quoq; ex præscriptis suppurationē faciunt. Vte-
rinæ in ventriculis duricies dolorosæ acutè, perniciosum.

Vterum iam gestantibus ex feruido vlcere fluxiones do-
lorosæ, malum. Hæmorrhoids his pessimū. Quibus aluo tu-
mefacta, ad pudendū rubor deuenit, mensibus albis humidis
derepente progressis, in longis febribus moriuntur. Con-
uulsionis, si menses in principio apparuerint, febre non ac-
cedente, solutio fit. Vrinæ tenues cum aliquantula nubecu-
la in medio consistente, rigorem significant. Si à quarta die
sanguin

A sanguinis fluxus fiat, diuturnitatē significat, & alius erūpit, & crurum tumores. Vterum gerētibus capitis dolores, soporosi, cum grauitate fientes, mali sunt, fortassis autem his etiam conuulsoriū quid pati contingit. Quæ ante partum, iuxta modū bilis sursum ac deorsum erumpētis, doluerunt, facile quidē pariunt, verū si febricitent, malignē habēt: tum aliās tum si circa fauces quid vexet, aut aliquod signū in febre malignū appareat. Aquosa ante partus erumpentia mala. Vterum gestantibus saluuginosæ iuxta fauces fluxiones, malum. Ante partum rigorem habere, & partus circa dolorem, periculosi. Vterum gerentibus ex feruido vlcere fluxiones, malum: conuulsæ, exolutæ, & postea perfrigeratæ excalescunt acutē. Sed & difficiles fiunt prægnantibus tumores circa tenue intestinum, quales circa eminentias osculi vteri fiunt, erectæ ceruicis spirationem inducentes. Num tales tumores gemellorum partum significant? Num & conuulsione tales tumores faciunt? Quæ suspiriosum efferunt spiritum in febribus, abortiunt. Horrorem habentibus, lassitudine affectis, capite grauatis, menses erumpunt. Ad manū torpidæ, obaridæ, sitis exortes, menses multos emittentes, suppuratæ fiunt. Alba derepentē ex abortu decurrentia, si aliquantum riguerit: & ad femur impetus, in his tremor difficilis est. Ora feruido, aphtha appellato, vlcere affecta, vterum gestantibus alios humectant. Prægnantes præagrotantes ante partus insuper rigent. Torpefactoriæ exolutiones difficiles quidem ex partibus contingunt & mentem enouentes, non tamen perniciosæ. Sed & mensium copiam præsignificant. Quæ in partu os ventriculi prædolere, paulo post eiiciunt. Horrores, lassitudines, capitis grauitates, colli dolores, menses extrudunt. Circa iudicationem tale fiens cum tussicula rigorem insuper inducit. Quibus puellis erectæ ceruicis spiratio contingit vterum gestantibus, his mammae suppurantur, & menses apparere in principio, malum est. Infantiæ febres acutas turbulentas non bilioso os ventriculi dolenti solunt. In sterilibus, & non parientibus sanguinis vomitus ad conceptionem prodest. Caligines mensibus multis comparentibus soluntur. Quibus mulieribus ex febribus dolor mammarū fit, sputatio cruenta non faeculenta oborta, soluit dolores. Conuulsiones ex vtero affecto sine febre faciles

Hippocratis

sunt, velut etiam Dorcadi. Quibus ex rigore febris lassato- **D**
 ria, menses decurrunt, collū in his dolorosum sanguinis eru-
 ptionem inducit. Vomitus minimè molestus est ex pituita
 ac bile permixtus. verū ne valde multus vomatur. At me-
 raciores vomitione deteriores sunt. Prasīnus autē vomitus,
 & niger, & liuidus malus est. Si verò etiā omnes colores idē
 vomuerit, perniciosum est. Celerrimam autem mortē signi-
 ficat liuidus, & male olens. Est etiam lethalis ruber vomitus,
 & maximè si cum necessitate dolorosa vomatur. Qui anxie
 se iactantes, citra vomitum exacerbātur, male habēt, itēq;
 qui lancinantur citra vomitum. Parui vomitus biliosi sunt,
 tum aliās, tum si vigilauerint. In nigris vomitibus surdi-
 tas non nocet. Pauci sientes, celeres, biliosi, meraci vomitus. **E**
 mali sunt in alui subductione vberiore, & pertinaci lumbo-
 rum dolore. Ex vomitibus anxietates, clangores, oculi con-
 cretionē lanuginosam habētes, furiosa. Acutē infania corre-
 pti, voce intercepta, ita affecti moriuntur. In vomitu si quis
 siticulosus sit, & sitis exors fiat, malum est anxiosis vigili-
 bus. Abscessus iuxta aurem maximè fiunt anxiosis. Aluo
 turbata suppressa, breui velut culicum puncturæ erumpunt,
 & ad oculos lachrymosus abscessus deuenit. In meracis vo-
 mitibus singultus, malus, mala etiam conuulsio. Similiter
 etiam in nimis purgationibus ex medicamentis. Qui vo-
 mituri sunt, antea sputationes faciunt. Ex veratro conuulsio
 perniciosa. In omni purgatione redundante, frigiditas cum
 sudore, perniciosa est: & qui insuper vomunt, siticulosi in his, **F**
 malum. Anxiosi, lumbos dolentes, aluo humectantur. Pur-
 gationes valde rubicundorum, nigrorum, à veratro, malæ
 sunt: & tum talibus exolutio, mala. A veratro vomere rubi-
 cunda, spumosa, pauca prodest: facit tamē duricias, & suppu-
 rationes magnas abducit. Sunt autem qui talia vomunt aliās
 & pectus dolorosi, & in rigoribus exudātes, & testes intume-
 scunt, quod si cōtigerit, insuper rigent, & gracilescunt. Fre-
 quentes per eadem recidiunt vomitoria, circa iudicationem
 nigrorum vomitū faciunt. fiunt item tremulæ. Sudor opti-
 mus quidem est, qui febrem in die iudicatorio soluit. com-
 modus autem est & qui leuat. frigidus verò, & circa caput so-
 lūm ac collum fiens, malus est. Nam & temporis diuturnita-
 tem, & periculū significat. At frigidus in febre quidē acuta,
 lethalis

- A** lethalis est. In mitiore verò, diuturnitatem significat. Sudor unà cum febre fiens in acuto morbo, malus est. Urina in febre albam habens & leuem subsidentiam firmatam, celerem dimissionem significat. Celerem etiam ea quæ ex indiscreta, pinguedinem quandam habens, exaquescit. At subrubra, & subsidentiam subrubram habens & leuem, si quidem ante septimum diem prodeat, septima die liberat. Post septimum verò, tardius, aut omnino post tempus aliquod diuturnius. & quæ in quarto die nubeculam subrubram habet, septimo liberat, si reliqua iuxta rationem habeant. Cæterum tenuis & biliosa, & vix tenuem ac exiguam subsidentiam habens, & quæ ad melius, ac deterius mutatur, diuturna est. Hæc autem diutius consequens, aut temporis diuturnitate circa iudicationem fiens, periculo non vacat. Aquosa verò & alba perpetuò, in diuturnis morbis difficulter iudicat, & secuta non est. Nubeculae in urinis albæ quidem & infernæ, comodæ sunt. rubicundæ verò, & nigrae, ac liuidæ, difficiles sunt. Periculosa urina est biliosa, non subrubra, in acutis: & quæ crassiores farinae partes refert, albas habens subsidentias, & quæ varia est colore ac subsidentia, & maximè in fluxionibus de capite. Periculosa est & quæ ex nigra in tenuem biliosam transmutatur: & quæ ex subsidentia diuellitur: & quæ ex compactis innatantibus, subsidentiam habet subliuidam, limosam. Num ex talibus præcordium dollet? dextrum arbitror, aut etiam cum virore pallidi fiunt? & abscessus circa auræ dolentes? His paululum erumpens alius perniciosus est. Urinae quæ derepente citra rationem paulatim concoquuntur, malæ sunt: & in summa, quæ citra rationem matura est, in morbo acuto, mala est. Mala est etiã valde rubicunda ex his, florulentiam æruginosam continens. Alba verò & diffusa pellucida urina, mala est, maximè si in phreniticis cõparet. Mala est quoque quæ post potum cito mingitur, & præsertim pleuriticis ac peripneumonicis. Mala est & quæ ante rigorem oleosa mingitur. Malæ sunt & in acutis viridantis palloris, non existentes in colore. Perniciosus est urina nigræ subsidentiam habens, & nigra. In pueris verò tenuis, magis quàm crassa. Verum in tenuibus vice versa quàm in crassis. Et grandinosa geniturae similis diffusa, eademque dolorosa. Perniciosus etiam est omnis quæ latenter mingitur. At peripneumonicis perniciosus est quæ in principio quidem

Hippocratis

costa est, post quartū verò diem attenuatur. Pleuriticis vri- D
na cruenta, caliginosa, cum subsidentia varia, indiscreta, le-
thalis est plerunq; in quatuordecim diebus. Lethalis est item
in pleuriticis breui prasina, nigram subsidentia habens, aut
furfuraceam. Verum in febre ardenti stupefactorio modo de-
tentis, pessima est vrina valde alba. Vrina cruda multo tem-
pore manens, aliis signis salutaribus, abscessum & dolorē si-
gnificat, & magis in partibus sub septo trasuerso. Si verò do-
lores in lumbis oberrarint, ad coxā, & in febre, & sine febre.
At quæ emittitur vrina pinguedinem habens in subsidentia,
febrē significat. Cruenta verò in principio mista, diuturnā,
turbata, cum sudore, recidiuam. Alba velut iumentorū, capi-
tis dolorem, pelliculosa, cōuulsionē. Quæ sputo similes sub- E
sidentias, aut limosas habet, rigorem indicat: Quæ aranei te-
lis similes, colliquationem. At in febribus erroneis nigre nu-
berculæ, quartanā indicant. Decolores autē, nigra innatantia
in medio habentes, cum vigiliis & turbatione phrenitidem.
puluerulentæ, cum spirandi difficultate, aquā intercutē. Vri-
na aquosa aut turbata friabili asperitate, aluum liquidā fore
significat. Verū tenuis valde vrina si densa fiat, num sudorem
futurum indicat: iam verò factum, spumosa in seipsam con-
fidens. In tertianis cum horrore velut nuberculæ nigre, hor-
roris inconstantis indicia sunt. Et pelliculosa vrinæ, & cum
horrore subsidentes, conuulsoriæ sunt. Vrina bonam habens
subsidentiam, derepentē non habens, dolorem & mutationē F
significat. At subsidentiam habens turbata desinēs, rigorem
circa iudicationem. Fortassis autem & in tertianā aut quar-
tanam transitionem. In pleuriticis vrina subrubram ha-
bens leuē subsidentiam, securam iudicationem significat.
Cum leui virore ac pallore florulenta, albam subsidentia ha-
bens, etiam celerem. At rubicunda valde & florulenta, subsi-
dentiam cum virore pallidam, leuē, sinceram habens, diu-
turnum valde turbulentum morbum qui in alium trasmu-
tatur, non tamen perniciosum. Alba verò aquosa, subsiden-
tiam crassas polentæ partes referentem, fuluam habens, do-
lorem & periculum significat: & quæ cum virore pallida est,
fuluam crassas polentæ partes referentem subsidentiam ha-
bens, tempus & periculum significat. Vrina quæ in his qui
iuxta aures abscessus habent, cito & modicē concoquuntur,
malæ

A malæ sunt, & perfrigerari hoc modo, malum est. Vesica intercepta tum aliàs, tum cum capitis dolore, habet quid conuulsoriū. Quæ in his cum torpore exoluuntur, difficilia sunt, non tamen perniciofa. Num & aliquantū mente mouentur?

Rhenum dolor repentinus, cum vrinæ suppressione, calculorum aut vrinarum crassarum mictionem significat. Tremores senioribus in febre fiunt, atque sic comparentes, fortassis calculos per vrinam ægri eiiciunt. Vrinæ suppressio, & grauitas in imo ventre plerunque stillicidium vrinæ significat futurum. Sin minus alium morbum ex quo ægrotare solet. In biliosis vrinæ interceptio, breui occidit. Vrina

B in febre densitatem habens diuulsam, recidiuam aut sudorem significat. In febribus longis, tenuibus, erroneis, vrinarum tenuium mictiones, splenicæ sunt. In febre aliàs aliarum vrinarum mictiones, morbum producunt. Vrinæ quæ minguntur à non recordantibus nec commonefactis perniciofa sunt. Num his minguntur velut si subsidentiam conturbasset? Quibus vrinæ pauca, grumosa, non sine febre, copia ex his progressa tenuis prodest. Prodit autem talibus ab initio, aut breui subsidentiam habet. Quibus vrinæ cito subsidentiam habent, hi cito iudicantur. Comitiali morbo laborantibus vrinæ tenues & crudæ, præter morem, sine repletionem, morbi inuasionem significant, tum aliàs, tum si quis dolor, aut cōuulsio, in summū humerū, aut collū, aut dorsum incidat, aut torpor corporis fiat, aut turbulētum insomniū viderit. Parua comparere, veluti sanguinis stillas, & vrinam & vomitum, & alui egestionem, penitus quidem malum est. Pessimum verò si propinquè inter se prodeant. Alui egestio optima est mollis, cohærens ac compacta, subfulua, non valde graueolens, prodiens hora consueta, copia pro ratione ciborum ingestorum. Spissum autem fiat ad iudicationem. Commodum est & lumbricos rotundos exire simul vbi ad iudicationem tendit. In acutis spumosa, circumbiliosa alui egestio mala est. Mala item valde alba. Adhuc verò peior est, quæ farinæ ac sterquilini speciem refert. Sopor in his malus est, & cruenta egestio, & vaporum vacuatio præter rationem. Alui interceptio, parua nigra, velut caprarum stercora, ad necessitatem coacta emittens, natus his erumpens, malum. Viscosa meraca, aut alba

alui

Hippocratis

alui egestio, mala est. Mala est & abundè multū fermentata, **D** subpuitosa. Praua item ex compactis quibusdam innatantibus, subidentia subliuida, purulenta, cum biliosa. Sanguinem splendidū egerere, malum est, tum aliàs, tum si quis dolor affuerit. Spumosa circumbiliosa alui egestio, mala est. Sed & morbum regium ex talibus incurrunt. In biliosis alui egestionibus spumosa florulētia, mala est, maximè ei cui lumbi doluerint, & mente motus fuerit. Num autem his dolores? Tenuis spumosa alui egestio, aquosam cum virore pallidam habens subidentiam, mala est. Mala etiam purulenta & nigra cruēta mala, cum febre, & aliàs, & varia, abunde bile colorata egestio, mala est, tantōque deterior quantum colore magis horrenda est, præterquā in medicamentorum usu. **E** In hoc enim periculo vacat, si non copia excedat, & tenuis, mollis egestio, in febre mala est. Mala quoque sicca, friabilis, decolor, tum aliàs, tum si aluū humectet. Nigris verò antea egressis occidit. Liquida alui egestio, & aceruatim, & paulatim fiens, mala est. altera enim vigilias, altera exolutionē facere poterit. Liquida subtenuis alui egestio perfrigescens, non sine febre, mala est. Rigores in his vesicam & ventrem corripunt. Aquosa verò valde non desinens in acutis, mala: & magis si etiam sitim non habuerit. Valde rubicunda egestio in alui profluuium, mala est. Mala quoque valde cum virore pallida, aut alba, aut spumosa, aut aquosa, & parua, & viscosa, & leuis, & cum virore subpallida, mala est. Et soporosis torpefactis liquida egestio, pessima est. Lethale autē & aluū **F** sanguine manare, multa grumosa egestionē, itēmq; alba ac liquida, cum ventre in tumorem eleuato. Egestio alui nigra velut sanguis, & cum febre, & sine febre, mala est. Malæ item omnes variæ abundè ex bile coloratæ. Egestionē desinētes in spumosas meracas, omnes quidem exacerbat, conuulsos autem etiam valde. Ex talibus abscessus iuxta aurem emergunt. At quæ valde liquida fiunt, & rursus compactæ, meracæ, stercoracæ egestionē, longitudinem morbi significant. Valde rubicunda in febre delirium. Alba stercoracea morbo regio difficilis est, itēque liquida quæ seposita ruborem capit. In sanguinis eruptionibus viscosa egestio nigris variegata, maligna est, maximè autem valde albidis.

Valde alba egestio in febre, non bene iudicat. Aluus turbulenta

A bulenta paruis frequētibus ad egerendum progressibus, maxillas intendit. Soluit etiam rubores in facie fientes. Stercoracea cum contentione egestio, alui afflictionē significat. Pituitosa verò acutē cum oris ventriculi dolore, dysenteria: fortassis autē & lumborum dolorem. Talibus alui circumfensio ad necessitatem liquida dimittens, citiūs restitans, habet quid conuulsorium, Insuper rigere his perniciosum est.

Quibus nigra per aluum prodeunt, frigidum sudorē excludunt. Quibus aluus ab initio turbatur, vrinae verò paucæ sunt, & progressu temporis aluus quidem siccatur, vrina verò tenuis redundat, his abscessus ad articulos fiunt. Progressus ad egerendum paulatim fientes, horrore ac rigorem inducunt, & quibus larga sit egestio difficilimum est quartanis incipientibus. Frequentes ad egerendum progressus paulatim fientes, pauca stercoracea subuiscosa habētes, cum præcordij & lateris dolore, morbum regium denotāt. Num his suppressis hi cum virore pallidi fiunt? Arbitror autem & hoc sanguinem effundere. At dolores in lumbis, in his sanguinem fundentibus, sanguinem egerunt splendidum. Cum sopore, & capitis dolore, calefcere insuper, perniciosum est.

Viscosæ, biliosæ, magis abscessus iuxta aurem faciunt.

Quicumque tumores aluo humecta eleuantur, cum doloribus, malum, Aluo verò suppressa, & nulla alia re nouata, cito rumpuntur, & malignus est. Vomitiones in his malæ & ferinæ. Quibus & flammeis & valde rubicundis solutis, graueolens, larga, subrubra fit, hi ne insaniant timor est. Corpus squalidam aluum malè affectam significat, In his valde rubicundæ, instar purulentæ carunculæ, egestionēs maximè prodeunt. Ad aluum biliosam mollem stercoracea egerentem, ardores comparentes, tumorem iuxta aurem faciunt.

C Biliosas egestionēs surditas sedat, & surditatem sedat biliosa alui egestio. Pustulæ serpiginosæ supra inguina, ad laterum mollitudinē ac pubem fientes, aluum malè affectam significant. Exolutio dolorem soluens, aluum maximè humectat. Iuxta sedem dolorosæ suppurationes aluum turbāt. Lethales egestionēs sunt, pinguis, nigra, liuida cum graueolentia, & biliosa habēs in se simile quiddam ciceri aut fabis fressis, aut veluti floridos sanguinis grumos, & quæ odore similis est egestionī infantium, & varia eadēque diuturna,
Talis

Hippocratis Coacæ Prænotiones.

Talis autem fuerit cruenta, rametosa, biliosa, nigra, prasina, D
& simul, & permutatis vicibus. Lethalis quoque omnis est quæ
sensum ægri fugiens exit. Qui potum difficulter deglutiunt
spiritu tussiente, eructatio subtracta intro reuoluta dolorem
ventris significat. Malæ sunt etiam egestiones valde rubræ
æruiginosæ in quartanis. Et tales sanguinis fluxiones soporo-
sæ sunt, ex his couulsione moriuntur, nigris antea egressis.

Exolutiones alui repentinæ præter rationem, in diuturni-
tate tēporis consumptis, vnà cum vocis tremula interceptio-
ne, perniciosè habent. Tenuēs nigrorum egestiones horri-
ficæ, meliores talibus sunt. Tales profunt maximè in ætate
ante vigorem. Pruriginosæ affectiones omnibus nigrorum
egestionem significant, & vomitum grumofum. Et tremulæ E
affectiones cū morfu ac capitis dolore, nigras egestiones si-
gnificant. Ante tales, vomitus prodit, & vbi vomuerunt, mul-
tæ tales insuper detrahuntur. Quibus in alui turbatione
exacerbatur morbus, circa iudicationem nigra infernè pro-
deunt. Ex aluo diutinè affecta, vomentibus biliosis, cibum
fastidientibus, sudor multus cum impotentia repentina, oc-
cidit. In medicamentorum vsu, in defluxione tenuis abun-
de sanguis eliquescens, malum est. Duricies circa ventrem
cum sudore, in febribus cū horrore cibos auersantibus, aluo
parum ad purgationem humectata, non suppurantur. Vnà
cum febre aluus turbata salsuginoso modo, soporosos, torpi-
dos, non valde comitatur. Ex aluo liquida lassatos, caput
dolentes, siticulosos, vigilantes, valde rubicunda egestione so- F
lutos, timor est ad infantiā deuenturos esse, si difficulter spi-
rauerint. Ad hoc vbi quis cum virore pallescit, bene spira-
re noxium non est aluo insuper probè egerente. Adustræ ege-
stiones contentionem habentes, aluum malè affectam signi-
ficant, Biliosis aluus turbata, parua, frequenter egerens, disten-
dentiā cum paucis mucosis, dolorem circa tenue intestinum
hæc faciunt, & vrinam non faciliè prodeuntem, ex talibus ad
hydropem desinunt. Linguae tremulæ quibusdam alui eru-
ptionis futuræ signum sunt. Quibus ardor fit, & ad egres-
sas egestiones alui, insuper exsudant, his febris exacerbatur.

Ex aluis liquidis perfrigeratio cum sudore, mala. Ex aluis
liquidis, sanguis de gingiuis defluens, lethalis est. Alui ege-
stio pura superueniens, soluit febrem acutam cum sudore.

Hippoc

444
A H I P P O C R A T I S
C O I L I B E R D E C A P I T I S

V V L N E R I B V S, I A N O
C O R N A R I O M E D I.
C O P H Y S I C O

interprete.

*



B

Vllum capitis vulnus leuiter contemni debet. Sape enim cutis sola contusa ferro, aut alia aliqua re, si non diligēter, aut cum quadam cautione curetur: veluti si sanguis concretus non expurgetur: aut aliud quiddam negligatur: vlcus inrudescens non parum molestia exhibet, & aliquando etiam febrem inducit: & medico quidem negotia, agroto verò periculum non minus affert. Verùm hoc multò magis contingit, si caluaria, & cerebri mēbranæ rūpuntur. Quare si non singula hæc diligēter medicus curauerit, saepe mortis causa existit. Et de his quidē omnibus etiā alibi diximus, sed & nunc dicendum est.

Cutis capitis læsa periculosa.

Primū igitur capite vulnerato interrogare oportet: per quid vulneratū sit. Deinde quid homo fecerit, quum vulneratus fuit. Postea qua parte vulnus inflictum sit. Nam hominum capita nihil inter se similiter habent, neq; suturæ capitis in omnibus eodē loco cōsistunt. Verū quisquis ex prior capitis parte prominentiā habet: est autem prominentia, rotunda ossis pars eminens præ alia: huius suturæ consistunt in capite, velut litera græca tau T pingitur: Breuiorē enim lineam ad prominentiam transuersam cōstitutam habet: alteram verò lineā per medium caput, sed secundū longitudinem ad collum semper habet. Qui verò ex posteriore capitis parte prominentiā habet, huius suturæ etiam cōtrario prior modo cōsistunt. Breuior enim linea ad prominentiā trāuersa cōsistit: longior autem per mediū caput, secundū longitudinem ad frōtem semper cōstituta est. Quisquis autem ex vtraq; capitis parte, & anteriore, & posteriore, prominentiam habet: huic future sunt similiter cōstitutæ, velut litera græca

Suturæ capitis diuersæ.

Prominentia capitis prioris parte.

H scrib

Suturae ca H scribitur. Consistunt autem longae quidem lineae ad utramque; D
pitis H lite prominentiam transuerse. Brevis autem per medium caput
rae similes. secundum longitudinem ad utranque longam lineam definiens. At qui neutra parte ullam prominentiam habet, hic suturas habet velut litera graeca X pingitur. Consistunt autem

Aliae X similes.

Os capitis duplex.

Colorosis capitis.

hae lineae, altera quidem transuersa ad tempora pertingens, altera vero secundum longitudinem, per medium caput.

Duplex autem est os iuxta medium caput: durissima vero ac delissima suprema ipsius pars existit, & infima quae est ad membranam. Confinilis est color ossis sub carne: cōsimilis est color ossis infernè. Secedit autem à supremo ac infimo osse, à durissimis ac dentissimis, ad mollius, ac minus dēsum & cōmunius, ad duplicatam laminam. Est autem duplicata **E**
lamina cauiissima, ac mollissima, & maximè antrosa. Est aut & totum os capitis, excepta valde modica suprema ac infima parte, spongiae simile & habet os in seipso carunculas similes multas humidas, & si quis ipsas digitis conterat, sanguis utriusque ex ipsis prodierit. Sunt etiā in osse venulae tenuiores ac cauiiores, sanguine plenae. Quod igitur ad duriciem, & molliciē, & ciuitatem attinet, sic habet. Quod verò ad crassitudinem ac tenuitatem, hoc modo. Vniuersi capitis os tenuissimum est ac debilissimum, quod est circa sinciput: & carnem paucissimam ac tenuissimam hac parte os in seipso habet: & cerebrum hac capitis parte plurimum subest. Et quia haec ita se habent, ut & vulnera, & tela aequalia sint magnitudine, & minora: & similiter vulneratus quis sit, & minus: os hac capitis parte & magis cōtunditur, & rūpitur, & magis intrò contusum cedit: & lethaliora, ac ad curādum, & ad effugiendam mortē, difficiliora sunt vulnera hac parte, quā alibi in capite, & ut sint aequalia vulnera, & similiter vulneratus quis sit, & minus: homo ubi etiā aliās ex vulnere moriturus est, breuiore tēpore moritur, qui hac parte capitis vulnus habet, quā qui alia. Cerebrū enim & citissimè & maximè iuxta sinciput sentit mala, quae & in carne, & in osse fiunt. Sub tenuissimo enim osse, ac modica carne, cerebrū est hac parte: & plurimum cerebrum sub sincipite iacet. Caterū ex reliquis ossibus id quod circa tēpora est, debilissimum est. Commissura enim est infernae maxillae ad caluariam, & motus in tēporibus sursum ac deorsum, velut articuli: & auditus prope ipsum

Cur verticis vulnus ceteris periculosius sit.

Cerebri situs.

Tempora cur periculosa.

Ape ipsum est: & vena per tempora extenta est, caua ac fortis.

Omni verò capitis osse robustius est os verticis: & quod Capitisque est retro aures, robustius est quàm totum quod in anteriore parte duru est os.

os habet. Et sanè his ita se habentibus, si quis & vulneribus, & telis, omnibus aequalibus ac similibus, & maioribus ac minoribus, similiter sit vulneratus, & magis: hac capitis parte os minus rumpitur, & contunditur: & si homo aliàs moriturus est ex vulnere, si in posteriore capitis parte vulnus habet, diutius durans tempore morietur. In longiore enim tempore os suppuratur, & deorsum ad cerebrum transpuratur, propter ossis crassitudinem: & paucius etiam cerebrum hac

B parte subest: & plures mortem effugiunt plerunq; ex his qui posteriore capitis parte vulnerati sunt, quàm qui anteriore.

Sed & in hyeme diutius tempore viuit homo quàm in aestate, quisquis etià aliàs moriturus est ex vulnere, quacunque capitis parte vulnus habeat. At verò sedes telorum acutorum ac leuiorum, ipsæ in seipsis fientes in osse, & cum fissura, & cõusione, ac intrõ cessione: fiunt autem hæ similiter, & in anteriore & in posteriore capitis parte: ex his mors non contingit secundum iustitiam, etiam si contingat. Sutura verò in vlcere si compareat, osse denudato, quacunque capitis parte vlcere fiente, debilissimus ager est ad resistendum vulnere ac telo, si in ipsam suturam telu incubuerit: & maxime omnium si telum in sincipite, iuxta debilissimam capitis partem incussum fuerit, & suturam circa vlcus, si ita cõtingat, fuerint, & telum ipsas suturas contigerit. Vulneratur porro os in capite tot modis. Singulorum autem modorum plures species fracturæ in vulnere fiunt. Os vulneratum rumpitur, & ossi fissuram continenti ac ambienti necesse est contusionem accedere, si ruptum fuerit. Nam telu quod os rumpit, idem hoc etiam os, aut magis, aut minus cõtundit, id ipsum videlicet os, in quo fissuram rumpit. Atque hic vnus modus est, Species autem fissurarum omnigenæ fiunt. Nam & tenuiores, & valde tenues conspicuæ fiunt. Quædam verò neque statim post vulnerationem, neque in diebus, in quibus dolorum utilitas mors homini contingere potest. Rursus autem aliquæ fissuræ crassiores ac ampliores fiunt: quædam verò etiam valde amplæ. Et aliæ quidem in longiorem modum

Varij lasionis modi.

Modus primus.

LI

rumpunt

Hippocratis Liber

Secundus
modus.

rumpuntur, alia verò in breuiorem: & alia rectiores sunt, a-
lia etiam valde recta: alia verò curuiores & curuæ ac pro-
fundiores: alia autem ad infernam partem, & per totum os.
Poterit autem & os in sua ipsius natura contundi, ita vt nul-
la fissura ad contusionem ossi accedat. Atq; hic secundus mo-
dus est, Species autem contusionis plures sunt. Nam & ma-
gis, & minus contunditur, & altius ac per totum os, & mi-
nus in altum ac per totum os, & in ampliorem & minorem
tum longitudinem, tum latitudinem. Verum harum specie-
rum nullam oculis intuëti cognoscere datur, qualisnam spe-
cie existat, & quanta magnitudine. Neque enim etiam si sint
contusa, & malum factum sit, an cõtusa sint, oculis videre con-
spicuum sit, statim post vulnerationem: quemadmodum neq; **E**
aliquæ fissuræ videri possunt, quæ rupto osse procul absunt.

Tertius mo-
dus.

Intrò etiam cedit os ex natura sua, vnà cum fissuris: alias
enim nò intrò cesserit. Nā quod intrò cedit, abrumpiturque
ac frāgitur, intrò cedit ab alio osse, quod in sua ipsius natura
manet, & sic sanè fissura adest intrò cessione. Atq; hic tertius
modus est. Intrò autem cedit os per multas species. Nam &
maior ossis pars, & minor intrò cedit: & magis ac profundi-
deorsum, & minus ac magis in superficie. Quin & sede teli
in osse contingente, fissura utiq; ad sedem accesserit, & ad
fissurā etiam contusionē magis aut minus accedere necesse
est, si quidē & fissura accedat ea parte qua & sedes facta est:

Quartus
modus.
Teli sedes.

& fissura sit in osse continente & sedem, & contusionē. Atque
hic quartus modus est, in quo sedes teli sit in osse. Sedes autē **F**
vocatur, quum manēre osse in sua ipsius natura, telū quod in
os incubuit, manifestum fecerit vbi icubuit. Verū in singu-
lis modis plures species sunt. Et de cõtusione quidē ac fissu-
ra, si ambo hæc ad sedem accedant: & si cõtusio sola fiat, iam
dictum est quòd multæ species contusionis, & fissuræ sunt.

Hæc autem sedes ipsa in seipsa, longior ac breuior sit, &
curuior ac rectior, & orbiculatio: & multæ alia species talis
modi sunt, prout etiam figura teli fuerit: & eadem etiā pro-
fundiores deorsum, & magis & minus, & angustiores, & am-
pliores, & valde amplæ, si dissectione intercisa fuerit. Quan-
ta autem dissectio in longitudinē ac latitudinem fiat, in osse
sedes est, si alia ossa dissectionem ambientia in sua ipsorū na-
tura manserint, & nò vnà cum dissectione intrò cesserint ex
sua

De Capitis Vulneribus.

446

A sua natura. Nam si ita contingat, intro cecisio fuerit, & non amplius ossis sedes. Si verò alia capitis parte vulneratur, & vlcus habet homo, & os carne denudatū est, quintus hic modus est: & hanc calamitatē ubi facta est, nulla re iuuare queas. Quintus modus.
 Nam si passus est hoc malum, nō est quod ex ipso exquirere possis, an passus sit hoc malum, neq; qua capitis parte; & ex his fracturæ modis ad perforationem deuenit, tum si contusio ad visum incōspicua est, tū si aliquo modo manifesta fuerit: & fissura si inconspicua visui fuerit, & ad visum manifesta. Sed & si sede teli in osse fiēte, fissura ac cōtusio ad sedem accedat: & si cōtusio sola accedat ad sedem, absq; fissura: hæc quoq; ad perforationem deuenit. At verò os quod ex sua natura intro cecisit, parum perforatione opus habet: & quæ maximè intro ceciderunt, & maximè fracta sunt, & perforatione minimè opus habent. Neq; sedes ipsa in seipsa fiens, absque fissura ac cōtusione, perforatione indiget. Neq; dissectio ipsa si magna ac ampla fuerit. Dissectio enim & sedes idem sunt.

B Cæterum primum spectare oportet in vulnerato, qua capitis parte, & num in debilioribus vulnus habeat: & capillos considerare circa vlcus, an dissecti sint à telo, & an intus sint in vulnere: quod si est, periculū est os carne nudum esse. Itaque dicere oportet, os aliquam læsionem à telo habere. Atq; hæc longè prius considerasse ac dixisse oportet, anteaquam hominem contingas. Vbi verò iam cōtigeris, clarè nosse conari, an nudum carne os sit, aut non, & si quidem oculis conspicuum fuerit os nudum, bene habet: Sin minus, specillo cōsiderato, & si quidem inueneris os carne nudum esse, & non sanum à vulnere, eius quod in osse est dinotionem primum facere oportet, inspiciendo & quantū sit malum, & quo opere opus habeat. Oportet etiam vulneratum interrogare ut passus sit, & quo modo. Si verò non conspicuū fuerit os, multo adhuc magis interrogationem facere oportet, an habeat quid mali, aut nō habeat: & si nudum est os, ut fractum sit, & iuxta quem modum. Nam cōtusiones & fissuras in osse non apparentes, & tamen presentes, ex vulnerati responsione cognoscere primum conari oportet, an tale quid passum sit os, aut nō passum, deinde ratione & opere exquirere, citra specilli admotionem. Specilli enim admotio nō indicat, an tale quid mali os passum sit, & an habeat quid in seipso, aut non

Ll 2

pas

Hippocratis Liber

passum sit. Sed sedem teli indicat specillum, & an intro ces- D
serit os ex natura sua, & an vehementer fractum sit os: quæ
etiam oculis conspicua videnti cognoscere datur. Rumpitur
autem os & obscuris fissuris, & manifestis: & cõtunditur ob-
tusis contusionibus: & intro ex sua natura maximè cedit,
quum alter ab altero sauciatur, de industria sauciare volēs:
aut quum ex altiore loco sit iactus, aut plagæ ictus, vter tan-
dem fuerit, magis quàm ex plano loco: & si contineat manu
telum, siue iaciat, siue percutiat: & si fortior debiliorem vul-
nerat. Ex his verò qui cadentes vulnerantur ad os, aut in
ipsum os, is qui ex altissimo loco cadit, & in durissimum ac
obtusissimū: huic periculum est vt os & rumpatur, & cõtun-
datur, & intro cedat ex sua natura. Ei verò qui ex plano mō- E
gis loco cadit, & in molliorem, os minus hæc patitur, aut
etiam non patitur. Quæcunque verò illabentia in caput te-
la, ad os, vulnerant, ex his id quod ex altissimo loco illapsum
est, & minimè ex plano, & quod durissimū ac obtusissimum,
& grauissimum ac minimè leue est, & quod minimè acutū
ac molle: hoc & ruperit os, & contuderit, & maximè sanè pe-
riculum est vt os hæc patiatur, quum & hæc fiant, & è dire-
cto aduersus telum, os sauciari contingat, siue ex manu per-
cutiatur, siue iactum suscipiat, siue quid ipsi incidat, siue ipse
collapsus saucietur ita vt quomodocunque sauciatus, osse
aduersus telum occurrat. Quæ verò tela ex obliquo os sau-
ciant, minùs & os rumpunt, & intro ad caput contundunt,
etiam si carne fuerit os denudatum. Nam quædam vulnera F
ita inflicta, neque denudant os carne. Profectò ex telis maxi-
mè os rumpunt, & manifestis, & obscuris fissuris, & contun-
dunt, & ex natura sua os intro cedere faciunt, quæ sunt ro-
tunda, & orbiculata, & vndiquaque plana, & obtusa, & gra-
uia, & dura: & carnem hæc contundunt, & maturam faciunt,
ac concidunt: & vlcera fiunt à talibus telis in obliquum, Sed
& in circulum, subcaua, & suppurata magis fiunt, ac humida
sunt, & diutius tempore purgātur. Necesse est enim carnes
contusas ac concisas: pus fieri ac consumi. At tela oblonga,
multum tenuia, & acuta, & leuia, carnem magis dissecant
quàm contundunt, & os eodem modo. Et sedem quidem in-
ducit id ipsum quod etiā dissecauit. Dissectio enim & sedes
idem sunt. Verum non valde os contundunt talia tela, neque
rump

Cadentes
de alto &
ecōtraquid
patiantur.

Telorū va
rietas.

A rumpunt, neque ex natura sua intro cedere faciunt. Ceterum oportet supra conspectum tuum, quicquid tandem apparuerit in osse, etiam de omnibus his interrogationem facere. Nam magis & minus sauciari signa hæc sunt, si vulneratus soporẽ altiore incidit, & caligo offusa fuerit, & vertigo, & si ceciderit. Quum autem os carne denudatũ a telo fuerit, & circa ipsas futuras vlcus fieri contigerit, difficile est sedem teli

Sauciari
signa.

deprehendere, quæ in alio osse manifesta est, an insit in osse, aut nõ insit, & an sedes facta sit in ipsis futuris. Occultat enim ipsa futura, asperior existens reliquo osse, & non satis clarum est vbi in ipso futura est, & vbi ossis sedes, si non valde magna sedes fiat. Accedit etiam ruptio ad sedem, plerunque & ipsa in futuris siens, & fit etiam hæc ruptio rupto osse deprehensu difficilior, eo quod circa ipsam futuram ruptio fit, si rumpitur, vt plurimum. Procliue enim est hac parte os rumpi ac dissolui, propter ossis hac parte debilitatem ac raritatem, & propterea quod parata sit futura vt rumpatur ac dissoluatur. Nam reliqua ossa futuram ambientia ruptionis exortia manere possunt, eo quod robustiora sunt quàm futura: Verum ruptio circa futuram siens, etiam dissolutio futuræ est, & non facile est deprehendere, neq; si a tali sede fiat in futura, vbi rupta fuerint ac dissoluta. Verum difficilius est deprehendere fissuram ex contusione. Fallunt enim & mentẽ, & visum medici hæc futura, fissuræ speciem referentes, & reliquo osse asperiores existentes, nisi vehementer dissectæ fuerint ac dissolutæ.

C Dissectio autem & sedes idem sunt. Proinde si circa futuras vulnus factum fuerit, & ad os telum incubuerit, animaduersionem habere oportet, ac inuenire quod os passum sit. Nam ab æqualibus magnitudine telis, & similibus ac multo minoribus, & similiter & multo minus vulneratus, longè magis malum accipit, qui in osse in futuras telum recepit, quàm qui non in futuras id recepit. Et pleraq; horũ perforare oportet. Verum ipsas futuras perforare nõ oportet, sed secedendo in propinquo osse perforationem facere, si perfores. Porro de curatione vulnerum in capite. & quo modo deprehendere oportet affectiones in capite sientes non manifestas, ita mihi videtur. Vlcus in capite nullo humore humectare conuenit, ac ne vino quidem; neq; cataplasmate integere, neq; linamẽto curationem facere. Neq; verò comprimere oportet vlcus

Non per
fac. m.

Capitis vl
cus quĩ cu-
retur,

in capite, si non in fronte fuerit, aut in loco pilis nudato, aut D
circa supercilium & oculū. Hic enim sientia vlcera, caplas-
matis ac deligatione magis opus habent, quā in aliis capi-
tis partibus. Continet ac ambit reliquum caput totam fron-
tem, partes autem vlcus ambientes, in quacunque tandē par-
te vlcera fuerint, inflammantur ac intumescunt, propter san-
guinis influxionem. Oportet autem neque ea quæ in fronte
sunt vlcera, per omne tempus cataplasomatis integere ac deli-
gare, sed postquam inflāmatio sedata est, & tumor sedatus, à
cataplasomatis ac deligatione cessare. At in reliquo capite vl-
cus, neque linamentis, neque cataplasomatis, neque deligatio-
ne curare oportet, si non & sectione opus habeat. Secare au- E
tem oportet vlceribus in capite ac fronte sientibus, qua par-
te os carne nudum fuerit, & læsionem aliquam ex telo habe-
re visum fuerit. Vlcers verò quæ non habent sufficientem

Vlceraque
secanda.

magnitudinem longitudinis ac latitudinis, ad ossis inspe-
ctionem, an quid mali passum sit à telo, & quale id passum
sit, & quantum caro contusa est, & quantam os læsionem ha-
bet: & rursus an illa sum sit os à telo, & nihil mali passum sit
& ad curationem, qualinam opus habet vlcus, & caro, & os-
sis affectio: talia sanè vlcera sectione opus habet. Si verò etiā
os quidem carne fuerit denudatum, subcaua verò fuerint vl-
cera in obliquum, cavitatem quā plurimū refecare oportet
vbi nō facile est medicamēto quocunq; peruenire. Sed & or-
biculatiores vlcera, ac plurimū subcaua, etiā ipsa refecare o-
portet, circulo diuissim inciso secundum longitudinē pro ho F
minis natura, vt lōgius fiat vlcus. At verò in capitis sectione,
reliquæ quidem capitis partes securitatē habent dum secan-
tur. Verū tempora, & adhuc supra tempora venā, quæ per tē-
pora ferrur, secare nō oportet. Cōuulsio enim corripit sectū.
Et si quidem sinistra tempora secta fuerint, dextera cōuulsio
corripit. Si verò dextra secta fuerint, sinistra cōuulsio ap-
prehendit. Quum igitur vlcus in capite secas, ossium gratia
carne denudatorum, scire cupiens an habeat os quid mali à
telo, aut nō habeat, secare oportet: vulnus tanta magnitudi-
ne, quāta fursum opus habere visum fuerit. Secantē verò car-
nē ab osse diducere oportet, quæ ad mēbranam, & ad os exi-
stit. Deinde linamentū per totū vlcus adhibere oportet, quod
vlcus quā amplissimum in posterum diem faciat, cum mini
mo do

Amo dolore. vbi verò linamentum adhibuisti, cataplasmate
 vtere, quanto tempore etiam linamento, ita vt mazam ex te
 nui polenta in aceto subigas, aut coquas, & quàm maximè vi
 scosam facias. Postridie verò vbi linamentum exemeris, in
 spectro osse quod passum est, si non conspicua tibi sit vulnera
 tio, qualisnam sit in osse: neq; cognoscas an os aliquid mali in
 se habeat, aut non habeat: telum autem ad os peruenisse ac
 lassisse videatur: radere oportet specillo rasorio, secundū lon
 gitudinem ac profunditatem pro hominis natura. & rursus
 si etiam transuersum sit os, ruptionū gratia ad visum incon
 spicuarum, & contusionis obscuræ gratia, quæ non intrò ces
 sit ex natura alterius ossis capitis. Indicat enim ipsa ratio ma
 gis, si non etiam aliàs conspicuæ fuerint hæ affectiones, ex te
 lo in osse existētes. Et si sedem teli in osse videris, tum ipsam
 teli sedem radere oportet, tum ambientia ipsam ossa, ne sape
 ad sedem ruptio accedat, & contusio, aut sola contusio, & de
 inde lateant, quum non conspicua existant. Postquam autem
 os scalp pro raseris, si quidem ad perforationem tendere ossis
fauciatio videatur, perforare oportet, & citra perforationem
triduum non excedere, sed in hoc perforare, tum aliàs, tum
tempore calido, si ab initio curationem susceperis. Si verò su
 spiceris os ruptū, aut contusum esse, aut ambo hæc: coniectu
 ra facta quòd vehementer sauciatus sit, ex vulnerati verbis:
 & quòd à forti id contigit qui sauciauit, si alius ab alio vulne
 ratus fuerit: & quòd telum quo vulneratus est, ex malefico
 rum telorū ordine fuit: deinde quòd vertigo & caligo ipsum
corripuerit, & quòd in soporem profundiore incederit, &
quòd ceciderit: His ita fientibus, si non cognoscas an os ruptū
 sit, aut contusum, aut ambo hæc, neque aliàs videas: super os
 aliquid maximè nigri coloris, nigro medicamento liquato
subactum, imponere oportet: & subextento linteo oleo im
buto super vlcus, & deinde mazæ cataplasmate appposito de
ligare, postridie verò exoluto ac expurgato vlcere deradere.
 Et si sanum non fuerit, sed ruptum ac contusum, reliquū qui
 dem os rasum album erit, fissura verò & contusio, quæ nigrū
 medicamētum eliquatum in seipsam suscepit, in reliquo osse
 albo nigra erit. Caterum hanc fissuram conspectam rursus
 secundum profunditatem radere oportet. Et si quidē radens
 fissuram hanc conspectam nigrā exemeris, & deleueris è con

Cum os an
 ruptum sit
 ambiga
 tur.

spectu sublatam, contusio quidem ossis, aut magis aut minus **D**
 facta fuit, quæ sanè etiam fissuram à scalpro rasorio deletam
 rupit. Verùm minus horrenda hæc est, & minus negotij exhi-
 buerit, fissura deleta. Si verò in profundo sit, & dum raditur
 deleri nolit, ad perforationem deuenit hæc calamitas. Sed
 perforare oportet, ac de cætero vlcus curare. Cauere autem
 conuenit vt ne aliquid mali os contrahat ex carne, si malè cu-
 retur. Nam & perforato ossi, & aliàs denudato, sed sano: & si
 læsionem aliquam ex telo habeat, & tamen sanum esse pute-
 tur, periculum magis imminet vt suppuratum fiat, etiam si
 aliàs futurum non esset, si & caro os ambiens malè curetur,
 & inflammetur ac cōstringatur. Ignescit enim, & multa flam-
 ma impletur. Et sanè os ex ambientibus carnibus in seipsum **E**
 calorem & flammam, & quæcunq; mala in seipsa habet caro,
 trahit, & ex his ita suppuratum fit. Malum est etiam humi-
ppur:
et p
 dam esse carnem in vlcere, & putrescente, & ad multum tem-
 pus purgari. Quare suppuratum quidem quàm celerimè
 vlcus facere oportet. Sic enim ambientes vlcus partes quàm
 minimum inflammabuntur, & vlcus citissimè purum erit.
 Necesse est enim carnes concisas ac contusas à telo suppara-
 tas fieri ac cōsumi. Postquam autem purgatum fuerit, siccus
 fieri vlcus oportet. Sic enim citissimè sanum fiet, sicca carne
 germinante, & non humida. Et sic quoque vlceri caro non su-
 perincrescet. Eadem ratio membranæ circum cerebrum est.
 Statim enim osse perforato & exsecto, ac de membrana de-
 tracto, ipsam denudatam membranam puram quàm citissi-**F**
 mè ac siccam facere oportet, vt ne vbi ad multū tempus hu-
 mida sit, computrescat ac in tumorem attollatur. His enim
 ita fientibus, periculum est ipsam putrescere. At verò os quod
 discedere à quouis alio osse oportet vlcere in capite fiente, &
 sede teli in osse existente, aut aliàs osse plurimum denudato:
 discedit vbi plurimum exangue factum est. Resiccatur enim
 sanguis ex osse, & à tempore, & à plurimis medicamentis.
 Citissimè enim discesserit, si quis vlcus quàm citissimè pur-
 garit, & de cætero & vlcus, & os, tum maius, tum minus re-
 siccauerit. Quod enim citissimè resiccatum ac testaceum fa-
 ctū fuerit, ex hoc facto maximè dimittitur ab alio osse, quod
 sanguinolentum ac viuum existit, & quum exangue ac sic-
 cum fiat, à sanguinolento ac viuo valde discedit. Quæcunq;
 vero

A verò ossa intro contusa cedunt ex sua ipsorum natura, rupta aut etiam dissecta, valde ampla, talia minus periculosa sunt, Ossa fracta quæ minus periculosa ubi membrana sana fuerit: & quæ pluribus fissuris & amplioribus intro rupta sunt, adhuc minus periculosa sunt, & ad de tractionem faciliora fiunt. & nullum ex talibus perforare oportet, neque periclitari ossa auferre conando, priusquam sponte sua emergant, priore forma exoluta. Emergunt autem carne subnascente. Subnascitur autem ex duplicata ossis lamina, & ex sano osse, si superna ossis pars sola fuerit corrupta. Sic verò quam citissimè & caro subnasci ac germinare poterit, & ossa emerferint, si quis vlcus quàm citissimè suppuratum redditum, purum faciat. Et si per totum os ambae partes

B intro cõtusa cesserint ad membranam, & superna ossis pars, & inferna, si quis similiter medeatur, vlcus celerrimè sanum erit, & ossa quæ intro cesserunt celerrimè emergunt ac reuertuntur. At verò puerorum ossa, & tenuiora & molliora sunt, Puerorum ossa. ea de causa, quòd sanguinolentiora sunt, & caua, & neque antrofa, neque densa, neq; solida: & à telis æqualibus ac debilibus si similiter ac minus fuerint vulnerati, iunioris pueri vlcus, & magis & citius suppuratur, & in breuiori tempore quàm senioris: & si aliàs ex vulnere moriturus est, iunior seniore citius perit. Caterum si os denudatum carne fuerit, an in aduersione habita cognoscere conari oportet, si oculis videre ac noscere non datur, an ruptum sit os, & an contusum, aut solum contusum, & an sede teli facta, adsit contusio, aut

C fissura, aut ambo hæc. Et si quid horum os passum fuerit, de tracto sanguine, paruo terebello modicè & cum cautione, os terebrare oportet. Tenuius est enim os, & minus profundum iuuenibus, quàm senioribus. Quicumq; verò ex vulneribus in capite moriturus est, & fieri non potest vt sanus fiat ac seruetur, ex his signis dinotionem morituri facere oportet, & quod futurum est prædicere. Patitur enim hæc. Quum quis os fractum, aut ruptum, aut contusum, aut quocunque modo fractum intelligens, per errorem deliquerit, & neq; raserit, neq; perforauerit, veluti os non opus habeat, & velut os sanum existat: ante decimum quartum diem febris corripiet vt plurimum in hyeme. In æstate verò post septimum diem febris corripit. & postquam hoc factum fuerit, vlcus colorem amittit, & ex ipso sanies pauca fluit, & quod inflamatū est ex ipso

emoritur, & viscosum fit, & apparet velut salsamentum, colo-
 re fuluum, subliuidum. & os tunc corrumpi incipit, & fit val-
 de nigrum, postremum pallidum aut valde album euadens.
 Quum vero iam suppuratum fuerit, in lingua pustulae ob-
 oriuntur, & desipiens aeger moritur, & conuulsio plerumque cor-
 rigit in altera corporis parte: si quidem in sinistra parte capi-
 tis vlcus habeat, in dextra corporis parte conuulsio corrigit.
 Si vero in dextra capitis parte vlcus habeat, in sinistra corpo-
 ris parte conuulsio corrigit. Sunt autem & qui syderati fiunt,
 atque sic pereunt ante septimum diem in aestate, aut deci-
 mumquartum in hyeme. Similiter autem significant haec si-
 gna, & in iuniore, si vulnus existat. Quapropter ubi intellexe-
 ris febrem inuadere hominem, & ex aliis signis aliquod ipsi
 accedere non cunctari oportet, sed os usque ad membranam
 perforare, aut scalpro rasorio deradere. Est enim & ad perfo-
 rationem, & ad rationem, facile ac expeditum. Deinde reli-
 qua sic curare, prout conducere visum fuerit, respectu ad id
 quod sit habito. Quum vero in vulnere in capite, homine
 terebello perforato, aut non perforato, osse autem denudato,
 tumor rubicundus, ignis sacri speciem referens, accesserit in
 facie, & in oculis utriusque, aut altero: & si quis tumorem con-
 tingat, doleat: & febris corripiat ac rigor: & vlcus ipsum tum
 quod ad carnem attinet, tum quod ad os, bene habeat ad aspe-
 ctum: & ambientes vlcus partes bene habeant, excepto tumo-
 re qui in facie existit, & aliud peccatum nullum tumor ha-
 beat, quod ad reliquam victus rationem attinet. Huius in-
 fernam aluum deorsum purgare oportet medicamento, quod
 bilem ducit, & ubi sic purgatus fuerit, & febris dimittit, &
 tumor sedatur, & sanus euadit. Medicamentum vero dare
 oportet, ad vires hominis respiciendo, prout robore validus
 fuerit. Caeterum de perforationis ac terebrationis usu, ubi
 ea necessitas ingruat, ut necesse sit hominem perforare, sic
 statuendum est. Si ab initio assumptam curationem admi-
 nistras, non oportet statim os ad membranam perforare ac
 excindere. Non enim conducit membranam osse denuda-
 tam esse, ad multum tempus male afflicta: sed postremum
 ubi in aduere corrumpi ac putrescere ipsam periculum est.
 Est & aliud periculum, si statim osse ad membranam per-
 forato, ipsum auferas, ne in ipso opere membranam per te-
 rebellum

*in capite
fracti*

Medela hu-
ius.

Terebra-
tionis mo-
dus qui.

A rebellum vulneres. Verum terebrantem oportet, ubi iam valde parum abest ut os sit perforatum, & os iam mouetur, à terebratione desistere, & sinere ut os sua sponte discedat. Nam in osse perforato, & à perforatione relicto, nihil mali accedere poterit. Tenue enim iam id quod restat fit. Reliqua verò curare oportet, prout vlceri conducere visum fuerit.

Terebrantem autem frequenter eximere terebellum oportet, caliditatis ossis gratia, & in frigidam aquam immergere. Calefcens enim ex circumductione terebellum, etiam os exalfaciens ac resiccans adurit, & maius os perforationem ambiens discedere facit, quam aliàs discessurum fuisset. Si verò etiam statim volueris usque ad membranam perforare, & postea os auferre, eodem modo frequenter eximere terebellum oportet, & in frigidam aquam demergere. At si non ab initio curationem assumpseris, sed ex alio traditam susceperis, ita ut posterior tardè ad curationem deuenias, terebello exsculpto statim os ad membranam perforare ac exscindere oportet, & exempto saepe terebello speculari: tum aliàs, tum per admotum specillum, circumcirca ipsius terebelli viam. Nam multo citius perforatur os, si suppuratum iam ac transpuratum perforaueris. & saepe contingit ut non profundum os sit, tum aliàs, tum si ea capitis parte fuerit vulnus, qua tenuius magis quàm crassum os ipsum existit. Quare cauere oportet, ut in terebelli admotione ne fallaris, verum qua parte crassissimum os esse visum fuerit, in eam semper terebellum admotum adigito, ita ut frequenter consideres, ac comoueas os, & eiicere coneris. Postquam autem abstuleris, reliqua velut vlceri conferre visum fuerit curato.

Terebra
aqua intin-
genda.

H I P P O C R A T I S
C O I C H I R V R G I A E O F -
F I C I N A, I A N O C O R N A -
R I O M E D I C O P H Y -
S I C O I N T E R -
P R E T E.

Aus



Lux du-
plex.

Quæ chi-
rurgo pro-
spicienda.

Vt similia, aut dissimilia, à princi- D
pio, à maximis, à facillimis, ab his
quæ undiquaque penitus cogno-
scuntur: quæ & videre, & tange-
re, & audire licet: & quæ visu, &
tactu, & auditu, & naribus, & lin-
gua, & intelligentia sentire licet:
quæ & quibus cognoscuntur, om-
nibus cognoscere licet. Quæ ve-
rò ad chirurgiæ officinam. Aegrotans, agens, ministri, in-
strumenta, lumen, vbi, quomodo, quot, quomodo. quando,
corpus, vasa commoda. Tempus. modus. locus. Agens aut se-
dens, aut stans, moderatè ad seipsum, ad id quod tractatur, E
ad splendorem lucis. Lucis igitur species duæ sunt, altera
communis, altera artificialis. Communis, in nobis non est.
Artificialis, etiam in nobis est. Vtriusque verò duplices vsus
sunt, aut ad lucem, aut sub lucem. Sub lucē, & modicus vsus
est, & moderatio manifesta. Ad lucem verò, ex praesentibus,
ex conferentibus luminibus, ad splendorem cōvertere oportet
id quod tractatur, exceptis his quæ aut latere oportet,
aut videre turpe est: ita vt id quod tractatur ex aduerso sit
luci, qui verò tractat ex aduerso eius quod tractatur, verum-
tamen vt ne tenebras inducat. Sic enim & qui agit videre po-
terit, & quod tractatur non videtur. Ad seipsum verò, si qui-
dem sedeat, pedes secundum rectitudinem sursum versus e di F
recto ad genua sint, distantia autem parua in cōsistendo in-
tercedat. Genua autem superiora sint inguinibus modicè di-
stantia, pro commoda cubiti positione ac appositione. Vesti-
tus expeditè, distinctè, æqualiter, similiter, cubitis, humeris.
Ad id verò quod tractatur, ultra & propè, & sursum ac de-
orsum, & hac aut illac, aut in medio. Ultra quidem & propè
termini sunt cubitorū gibbi, ita vt in anteriorem partem nō
excedant genua in posteriorem costas. Sursum verò, vt non
supra mammas, summas manus habeat. Deorsum vt nō infe-
rius quàm vt vbi pectus ad genua habet, summas manus an-
gulares ad brachia figuret. & in medio quidem hoc modo se
habet. Hac verò aut illac, vt non extra sedem: sed pro ratio-
ne conuersionis & corpus, & operantē corporis partem pro-
ducat. Si verò stet, vtrisque pedibus ex æquo insistere satis
est.

A est. Agere verò oportet ita vt altero pede inscendat, non eo qui est ad manum agentem, genu ad inguem sublato, velut in sede, sed & alij termini iidem sunt. At qui tractatur, reliqua corporis parte tractati inseruiat, aut stans, aut sedēs, aut decumbens, quo quàm facilius ita velut figurā habens perseueret, seruans subfluxionem, subsidentiam, euerisionem, decliuitatē. Sic quæ debet seruari & figura, & forma eius qui tractatur in exhibitione, in tractatione, in habitu postea sequente. Ungues neque præminere oportet, neque deficere. Digitorū vertices ad vsum exercere, digitis quidem summis pleraque, indice ad magnum admoto. Tota verò manu prona, ambabus autem aduersis. Digitum extendere cogit

Vngues & digiti chirurgi quales esse debeant.

B magnum quiddam in medio digitorum positum, & oppositum facere magnū digitum indici. Morbum autem esse manifestum est, per quem etiā læduntur hi quibus ex natiuitate, & educatione, assuevit magnus digitus ab aliis contineri. Opera omnia exercere oportet vtrisque seorsim agendo, & ambabus simul. Similes enim sunt: ambabus cōiectando bene, pulchre, citò, non laboriosè, concinnè, expeditè. Instrumenta quidem, & quando, & qualiter dicitur. Vbi oportet, vt ne quid impediatur opus, neq; impedimento sit inter accipiendum circa operatē corporis partem. Si verò alius det, paulò prius paratus sit, & faciat vbi iusseris. Qui verò circa ægrotantē sunt, id quod tractatur exhibeāt prout visum fuerit. Reliquum autem corpus detineant, vt totum quiescat, ta-

Instrumenta in promptu sint & ministri.

C centes, & præfecto obedientes. Deligationis species duæ sunt, quæ facta est, & quæ adhuc fit. Quæ adhuc fit, citò, non laboriosè, expeditè, concinna. Cito quidem perficiendo opera. Non laboriosè, facile agēdo. Expeditio verò ad omnia parata est. Concinnitas autē iucunda aspectu est. Ex quibus verò exercitationibus hæc cōtingant, dictū est. Quæ facta est, benè, pulchrè. Pulchrè quidē, simpliciter, distinctè: aut similia ac æqualia, æqualiter ac similiter: aut inæqualia ac dissimilia, inæqualiter ac dissimiliter. Species verò hæ sunt, simplex rotunda in orbem, ascia, lima, oculus, rhombus, & semisecta: ita vt species congrua sit speciei & affectioni eius quod deligatur. Eius verò quod bene deligatur, duæ sunt species, roboris quidem, aut compressione, aut copia linteolorum, & partim quidem ipsa deligatio sanat, partim curantibus

Deligatio duplex.

Ligationū species.

Modilig:
di.

Nexus.

bus inferuit. Ad hæc igitur lex hæc est. In his autem maxi- **B**
ma deligationis vis est. Compressio quidē, vt incumbētia
non abscedant, neq; penitus innitantur: sed sint quidem fir-
mata, non autem coacta, & minus quidem extrema, minimē
verò media. Nexus & filum procedant non deorsum, sed
fursum, in exhibitione, & præparatione, & deligatione, &
habitu postea sequente. Initia non super vlcus iniicere oportet, sed hinc aut illinc facere nexum. Nexum verò neque in
semita, neque in opere, neque illic vbi inane est, vt ne in va-
num iaceat. Nexum autem & filum, mollia non magna. Hoc
tamen probè nosse conuenit, quòd omnis deligatio ad decli-
uia & acuminata fugit, velut in capite, ad partem supernā:
in tibia, ad infernam. Deligare oportet dextras partes, in **E**
sinistras: & sinistras, in dextras: excepto capite. Hoc verò se-
cundum rectitudinem. Verum cōtraria ex duobus initiis. Si
verò ex vno, ad id quod simile est, ad subtilitatem: velut est
media pars capitis, & si quid aliud huiusmodi. Quæ vero mo-
uentur, velut articuli, qua quidem parte infestuntur, quàm
minimis ac expeditissimis linteis obuoluere oportet, velut
poplitem: qua vero circumtenduntur, expasis ac latis, velut
est patella. Circundare quoque insuper oportet, compre-
hensionis quidem gratia eorum quæ circa hæc sunt, appen-
sionis vero vniuersi deligamenti, in quiescentibus & depres-
sioribus corporis partibus, qualis est & supra, & infra genu.
Conuenit autem in humero quidē, circumductio circum al-
teram alam: In inguine vero, circum alterā lateris mollitu- **F**
dinem: in tibia, supra suram. & quibuscunq; fursum contin-
git fuga, his infernè appensio conuenit: quibus autem deor-
sum, vice versa. Quibus verò non est, velut in capite, his in
æqualissima parte cōprehensiones facere oportet, & minimē
obliquo deligamēto vti. Nam stabilissimū postremum cir-
cundatum, vel maximē vagabunda continet. Quibuscunque
autem neque comprehensio, neque appensio linteorum, com-
modè se habet: his per fila appensiones facere conuenit, ex
iniectione, aut confusione. Deligamenta sint pura, leuia,
mollia, tenuia. Obuoluere verò oportet ambabus simul, aut
vtrisque seorsim exercere. Conueniente autem deligatione
vtri, coniectura ad latitudinem ac crassitudinem partium fa-
cta. Obuolutionis capita dura, æqualia, distincta sint. In
quibus

Deligamē
ta qualia.

- A** quibus autem futurum est ut decidant, ea peiora sunt, quam si cito decidant. Quædam verò sunt eiusmodi, ut neque comprimere, neque decidere oporteat. Quæ verò spectat deligatio, aut subligatio, aut ambo, hæc sunt. Subligatio, quidem in causa est, ut aut disparata attrahantur, aut expansa contrahantur, aut contracta diducantur, aut distorta dirigantur, aut vice versa. Preparare autem oportet lintea leuia, tenuia, mollia, pura, lata, non confuta, neque extuberantias habentia, & sana, ut extensionem ferant, & paulò præstantiora, non sicca, sed succo imbuta singulis affectionibus familiari: & ea quidem quæ disparata abscesserunt, ita ut sublimia sedem quidē contingant, non tamē comprimant. Initium autem sumere
- B** oportet ex sana parte, & ad vlcus desinere, quo id quidem quod subest exoletur, aliud autem non amplius colligatur. Deligare autem oportet recta quidem, in rectum: obliqua verò, oblique, in figura doloris exorte, in qua neque constrictione, neque discessio contingat: ex qua ubi translatio fit ad appensionē, aut positionē, non transmutent, sed similia habeant hæc, musculos, venas, nervos, ossa, & bene posita, & bene dentata. Appensa verò aut posita esse conuenit, in figura doloris exorte, quæ est secundum naturam. In quibus verò discesserint, vice versa. At quibus expansa sunt, contrahere oportet quod ad alia quidem attinet eodē modo ex multo verò temporis spatio interposito contractionem facere oportet, & sensim progressu facto cōpressionē, primū minimē, deinde
- C** magis, ita ut terminus quod maximē facta sit, mutuus contactus fiat. Quibus verò contracta sunt, diducere: cum inflammatione quidem vice versa, sine hac autem, præparatione quidē eiusmodi, diligatione verò contraria. Distorta verò dirigere oportet, quod ad alia quidem attinet eodem modo. Verū quæ quidem abierunt, ea reducere oportet, subligatione, agglutinatione, appensione. Contraria verò contrario modo. Spleniorum longitudinem, latitudines, crassitudines, multitudines. Longitudo, quāta est deligatio. Latitudo, quatuor aut trium digitorū, crassitudo, ut triplices aut quadruplices sint. Multitudo, ut dum circundantur non excedant, neque deficient. Quibus verò ad directionem, in longitudinem circundando, latitudinem ac crassitudinem defectu coniectare oportet, ita ut non acervatim expleamus. At verò

Lintea quæ
lia.Deligatio
qualis.

Spleniorum.

Hippocratis

Linteorum verò linteorum subligationes duæ sunt, prima ex loco læso **D**
subligatio. ad supernas partes delinit: altera ex loco læso, ad infernas.

Deligamē iuxta locum affectum maximè comprimere oportet: Mi-
sa qualia. nimè extremas partes: Reliqua verò pro ratione: Deligatio
autem multam sani loci partem occupet. Deligamentorū
multitudo, longitudo, latitudo. Multitudo quidem, vt ne su-
peretur à loco læso, neque per ferulas illisio fiat, neque pon-
dus, neque circuncirca inclinatio, neque effceminatio deli-
gamenti contingat. Longitudo verò & latitudo, trium, aut
quatuor, aut quinque, aut sex, cubitorum quidem longitu-
do, digitorum autem latitudo. Et affulcimentī circunductio-
nes tot sint, vt ne comprimant. Molliā verò & non crassā
sint hæc omnia, pro longitudine & latitudine, & crassitudi- **E**

Ferulæ. dine partis affectæ. Ferulæ porrò sint leues, æquales, iuxta
extremitates simæ, hinc atque illinc paulò minores deliga-
tione, crassissimæ autē ea parte qua extat fractura. Quacūq;
verò partes incuruæ sunt, & excarnes, in his quæ præminent
cauendæ sunt, velut circa digitos & malleolos, aut positione
aut breuitate. Affulcimentis autem fulcire ac firmare o-

Ceratum. portet, non comprimere primū. Ceratum molle, & le-
Aqua. ue, & purum sit. In aqua spectatur caliditas, multitu-
do. Caliditas, vt supra suam ipsius manum medicus affun-
dat. Multitudo, ad laxandum quidem & attenuandum, plu-
rima optima est. Verū ad incarnandum ac molliendum, **F**
moderata. Moderatio autem in perfusione ea est, quòd dum
adhuc attollitur pars, priusquam confidat, desistere oportet.
Primū enim attollitur. Postea verò attenuatur. Positio
sit mollis, æqualis, sursum vergens, in eminentibus corpo-
ris partibus, velut calcaneo, & coxa, vt neque refrangatur,
neque euertatur. Canalem toti potius cruri quàm dimidio
adhibere oportet. Ad affectionem tamen respicere oportet:
& reliqua quæ lædere solent, manifesta sunt. Exhibitio ve-
rò & distentio, & restitutio, & reliqua secundum naturam
fiant. Natura in operibus est: operis actione quid illa velit
coniectandum est. Ad hæc autem ex quiescente, ex commu-
ni, ex consuetudine. Ex quiescente quidem ac remisso, recti-
tudines considerare oportet, velut in manus figura. Ex com-
muni verò, extensionem & inflectionem, veluti figura cubiti
ad brachium, quæ prope ad angularem accedit. Ex consuetu-
dine.

A dine, quod non alias figuras magis ferre possunt, velut cura extensionem. In hac enim figura plurimum tempus facili-
mè durarint, nulla facta immutatione. In immutatione ve-
rò ex distentione, similia hæc habent, ad habitum aut posi-
tionem, musculos, venas, neruos, ossa, & bene posita, & bene
detenta. Distentio fit maximè circa maxima, & crassissima, **Distentio.**
ac æqualia, & vbi ambo ossa læsa sunt. Secundo loco vbi sub-
iectum, minimè vbi supernum. Si verò magis moderato fiat,
detrimentum affert: pueris exceptis. Oportet autē ipsa pau-
lulum accliuia habere. Directionis exemplum, æquiuocū,
coniugatum simile, sanum. Defricatio potest soluere, ligare, **Defricatio.**
incarnare, minuere. Dura, ligare. Molliā soluere. Multa, mi-
nuere. Moderata, crasse facere. Deligare verò oportet, pri-
mū vt is qui deligatur, dicat, maximè se compressum esse
circa læsam partem, minimè circa extremas: & firmatum se
esse, non compressum, copia linteorum, non robore: & hac
die ac nocte paulò magis, postridie minus, tertia laxè. Repe-
riatur autem postridie in extremis partibus tumor mollis.
Tertia verò die deligatum solutum gracilius sit, atque hoc
per omnes deligationes. Secunda verò deligatione an iustè
deligatum apparuerit discere oportet. Hinc autem magis &
pluribus comprimatur. Tertia adhuc magis, itēque pluri-
bus. Septima verò à prima deligatione soluta, inueniantur
gracilia ossa ac depressa. At verò in ferulas deligata, si graci-
lia & pruritus exortia, & sine vlcere fuerint, sinere oportet
vsque ad dies viginti à læsione. Si verò quid suspectum sit,
soluere in medio tempore, & ferulas tertio quoque die fir-
mare. Appensio, positio, deligatio, vt in eodem statu sint cu-
stodire oportet. Figurarum summa hæc est, consuetudines, **Figura.**
naturæ singulorum membrorum species excurrando,ambu-
lando, stando, decumbendo, ex opere, ex remittendo. Nam
usus corroborat, ociū autē colliquat. Aut compressione, aut
copia linteorum. Quæcunque verò effuso sanguine sugilla-
tiones, aut contusiones, aut vulsiones, aut tumores inflam-
mationis exortes, ex vulnere oboriuntur, ad supernam par-
tem plurimum, ad infernam etiam parum deligare oportet.
ita vt manum aut crus non habeat in decliue, & initium su-
pra vulnus ponat, ac maximè firmet, minimè extremas par-
tes, medio modo medias, vltimam partem ad supernas cor-
poris

M m

poris

poris partes distribuendo, deligatione, compressione. Sed & D
hæc copia magis quàm robore. Maximè autem his lintea te-
nuia, leuia, mollia, pura, lata, sana debentur, vt pote sine fe-
rulis: & vberiore perfusione vti oportet. At verò elapsiones
aut luxationes, aut tortiones, aut distantia disparata, aut a-
uulsiones, aut abruptiones, aut distortionem, veluti mutilatio-
nes ad alteram partem vergentes, vnde quidem excesserunt,
remittendo deligare oportet: quò verò accesserunt, intendē-
do deligamentum, vt ad contraria vergant deligata, etiam
priusquam fuerint deligata, paulò magis quàm vt ex æquo
sint, & deligamentis, & spleniis, & appensionibus, & figuris,
extensione, defriktione, directione: & hic etiam vberiore per-
fusione. Cæterum imminutiones multam sanam partem oc-
cupando deligare oportet, vt ex influxione qua colliquata E
plus quàm sua sponte imminuta sunt, alia deligatione per-
mutata ad augmentum declinent, & carniū efformatio-
nem faciant. Melius autem est, vt & superna pars simul deli-
getur, velut tibia, & femorum, & alterum crus cū sano cru-
re, quo similis sit, & similiter quiescat, & similiter alimen-
tum excludant, & suscipiant. Linteorum verò copia, non cō-
pressionem vtendum est, remittendo primū id quod maxi-
mè opus habet, & vtendo defriktione incarnante, & perfusio-
ne absque ferulis. Fulcimenta porrò ac stabilimenta adhi-
bere oportet, veluti pectori, costis, capiti, & aliis quæ eiusmo-
di sunt: partim pulsum gratia, vt ne concutiantur: partim
etiam distantiarum disparatarum gratia. circa iuncturas, in F
ossibus capitis, quo firmentur. Et in tussibus, aut sternutatio-
nibus, aut alio motu, qualia sunt circa thoracem & caput sta-
bilimenta. Horum omnium eadem sunt deligationis com-
moderationes. Qua enim parte læsiones sunt, maximè com-
primendum est. Supponere igitur oportet lanam mollem,
affectioni conuenientem: deligare verò non amplius com-
primendo, vt ne pulsus concutiat: neque amplius quàm vt
distantiam iuncturarum extremitates mutuò se cōtingant.
Neque vt ruses & sternutationes fiāt, sed vt prohibeantur
stabilimentum adhibeatur, quo neque cogatur quid, neque
concutiatur.

HIPPO

Fulcimen-
ta quibus
aptanda.

454
HIPPOCRATIS
COI LIBER DE FRACTURIS, IANO CORNARIO MEDICO PHYSICO INTERPRETE.



Portet medicum & luxationum, & fracturarum extensiones quàm directissimas facere. Hac enim iustissima natura est. Si verò quid vel hac, vel illac inclinarit, ad pro-
nam partem vergere cōuenit. Minus enim hoc peccatū est quàm ad supinam. Qui igitur nihil prāmeditati sunt, plerunq; nihil peccāt. Ipse enim qui deligatur, manum porrigit, vt qui ita à iusta natura cogatur. Qui verò sapientes sibi videntur medici, hi sunt nimirū qui peccant. Studij igitur non multi est manum fractā tractare, & quilibet vt ita dicam, medicus hoc potest. Verūm
cogor plura de hoc scribere, quod sciam medicos esse, qui sibi sapientes esse videntur ex figuris manus in deligatione, ex quibus ipsos indoctos esse putare oportebat. Sed enim multa in hac arte hoc modo iudicantur. Quod enim peregrinum est, quum nondum intellexerint an bonum sit, magis laudāt quàm familiare, quod iam bonum esse sciunt: & alienū magis laudant quàm probè notum. Dicendum igitur, quanam medicorū peccata de natura manus, tum dedocere, tum docere velim. Nam & aliorū corporis ossiū doctrinā hic sermo affert. Manū itaq; de qua nobis sermo est, quidam pronā deligandam dedit, ille verò coge-
bat sic tenere velut sagittātes, quū humerū iniiciunt, atq; ita habentē deligabat: hoc ipsum illi secundum naturā esse existimans, & in testimoniū adducebat, tum omnia cubiti ossa, quòd directionem inter se haberent, tum coloris cōcordiam, quod ipsa per seipsam rectitudinē haberet, idque hoc modo & externa & interna parte. Hoc modo etiā dicebat & carnes, & neruos, à natura productos esse, & artem sagittandi in testimoniū citabat, & hac di-

Quæ medicus in his præstare debeat.

Medicos imperitos taxat.

M m 2 cens

cens ac faciens, sapiens esse sibi videbatur. Verum aliarum artium oblitus erat, & eorum quæ robore, & eorum quæ artificijs operantur ac efficiunt: non animaduertens aliam in alio figuram secundum naturam esse, & in eodem opere alias dextræ manus figuras secundum naturam esse, alias sinistræ, si ita contingat. Alia enim figura in iaculatione secundum naturam est, alia in fundæ iactu, alia in lapidis iactu, alia in pugilatu, alia in quiescendo. Quot verò artes inuenire quis possit, in quibus non eadem figura manuum naturalis est? & in vnaquaque arte, aliter ad instrumentum quod quisque habet, & ad opus quod perficere vult manus figurantur. Ei verò qui sagittandi artem exercet, hanc figuram alterius manus optimam esse consentaneum est. Cardiniformis enim brachij pars, in cubiti sede in hac figura innitens, ossibus cubiti & brachij rectitudinem facit, veluti totum vnum esset, & refectio articuli fracta est in hac figura. Verisimile est igitur hoc modo minimè flexibilem & rigidissimum esse hunc locum, & non superari, neque remittere, dum à dextra manu nervus trahitur, & sic nervum quidem quam plurimum trahet, à firmissimo verò ac confortissimo emitteret. Ex talibus enim sagittarum emissionibus, celeres & vehementiæ, & longinquitates fiunt. Deligationi verò cum arte sagittandi nihil commune est. Nam & ubi deligauit, si manum ita habiturus esset, multos utique dolores maiores vulnere adderet: & si flectere iuberet, neque ossa, neque nervi, neque carnes in eodem permanerent, sed suppurata deligatione alio transferrentur. Et quæ tandem est figuræ sagittarij utilitas? Et in hac parte fortasse non peccaret is qui sibi sapiens esse videtur, si ipsum vulneratum sibi manum exhibere permetteret. Alius porro medicus supinam manum præbens, ita extendere iubebat, atque hoc modo habentem deligabat, hanc figuram naturalem esse putans, coniectura ex colore facta: & ossa hoc modo secundum naturam esse existimans, eo quod os eminens circa manus iuncturam, ubi parvus digitus est, è directo esse apparet eius ossis, ex quo videntur homines metiuntur, & hæc testimonia adducebat, quod secundum naturam hoc modo figura se haberet, & rectè dicere putabatur. At verò siquidē manus supina extendatur, vehementer utique doluerit. Cognoscere autem poterit hoc quisque sua manu ita extenta, quod dolorosa est hæc figura. Nam & debiliior vir, fortio

Modus alius deligendi.

A tiores ita manibus suis comprehensum, ut cubiti flexura supina frangitur, quocumque voluerit duxerit. Neque enim si gladium in hac manu habeat, eo uti poterit, adeo violenta haec figura est. Deinde si ubi deligauit quis, in hac figura sinat, maior quidem dolor ubi obambularit, magnus autem etiam ubi decubuerit, sentietur. Quin & flectere manum si opus fuerit, omnino necesse est & musculos & ossa aliam figuram habere. Sed & citra reliquam perniciem, in hac figura haec ignorabat. Os enim circa iuncturam manus eminens, iuxta paruum digitum, hoc quidem cubiti est. Quod verò in flexura est, à quo vlna homines metiuntur, id brachij caput est. Ille verò idem os esse, & hoc & illud putabat: itemque multi alij. Est autem idem cum illo, is qui cubitus siue cubiti gibbus vocatur, in quem innitimur. Si quis igitur ita supinam manus habeat, tunc & os distortum apparet, & nervi à manus iunctura tendentes, ex interna parte & de digitis, distorti fiunt. Tendunt enim hi nervi ad os brachij, unde vlna mensuratur. Tanta sane ac talia sunt peccata, & ignorantiae naturae manus. Si verò velut ego iubeo, manum fractam quis extendat, os quidem quod est circa paruum digitum, ad cubiti flexuram tendens, in directum conuertet, rectitudinem verò habebunt nervi à manus iunctura ad brachij summas partes tendentes: & manus dum appensa excipitur, in consimili figura erit, in quali etiam erat dum deligaretur, ita ut neque ambulanti, neque decumbenti, ullus dolor aut fatigatio accedat. Desidere verò hominem ita oportet, ut ossis pars ad clarissimam praesentem lucem constitutur, ne is qui extensionem tractat circa sufficientem directionem fallatur. Nam periti artificis manum admotam, ne os quidem eminens in contactu latere poterit. Porro ex cubiti ossibus ubi non ambo fracta sunt, facilius curatio est, si supernum os sauciatum est, etiam si crassius id existat: partim quod sanum subterventum fundamenti loco ipsi est, partim quod facilius occultari potest, nisi iuxta manus iuncturam sauciari contigerit. Crassa enim est caro quae supernum nascitur. Infernum verò os excarne est, & non facile occultari potest, & vehementiore extensione opus habet. Si verò hoc contritum non fuerit, sed alterum illud, vilior extensio sufficit. At si ambo fracta fuerint, fortissima extensione opus habent. In puero etenim vidi extensa magis quam oportebat. Verum plerique minus quam

Cubiti ossa
si fracta
fuerint.

M m 3 opor

oportet extenduntur. Conuenit autem facta extensione, vo- **D**
Deligatio. lis ad motis dirigere: deinde cerato illito non ita multo, vt
 ne deligamenta circumfluitent, ita deligare, vt summā manū
 non inferius cubiti flexura habeat, sed etiam paulo superius
 ne ad summā partem sanguis influat, sed intercipiatur. Post-
 ea linteo deligare, initio eius supra fracturam iniecto, ita vt
 firmet quidem, nō tamen admodū premat. Postquā autē cir-
 cundedit eodem loco bis aut ter, ad supernā partem deligās
 distribuatur, quo sanguinis influxiones intercipientur, & illic
 delinat. Conuenit autem prima lintea non esse longa. Secun-
 dorum verò linteorū initium supra fracturā iniicere, ita vt
 semel circundet eodē loco, deinde deorsum distribuatur, & mi- **E**
 nus premēs, & magis traducēs, quo linteam ipsi sufficiens sit,
 ad recurrēdū eō vbi alterum defuit. Hic igitur lintea ad si-
 nistram, aut dextrā deligētur, aut ad vtrā partē contulerit ad
 fracturæ figurā, & in vtram declinare expedierit. Postea ve-
 rō splenia extēdere oportet modico cerato illita. Nam sic &
 mitius & stabilius se habent. Deinde sic linteis deligare alter-
 natim, modò in dextrā, modò in sinistram: & plerunq; infer-
 nē initio facto, sursum ducere aliquādo etiam supernē deor-
 sum. Extremitates autē subaridas, & in acutū abeuntes, sple-
 niis obuolutis curare oportet, ita vt copia opertiorū non
 totū aceruatim, sed particulatim corrigat. Insuper autē cir-
 ca manus iuncturā siue articulum laxē circumdare splenia co-
 portet aliās atq; aliās. Copia verò linteorum sufficiens pri- **F**
 mum, duæ partes sunt. Signa autē bene curati, & terminus re-
 ctē deligati, hæc sunt: si interrogaueris ipsum an compressus
 sit, & si cōpressum quidē se esse dixerit, sed leniter, & maxi-
 mē circa ipsam fracturā. Huiusmodi ita facta esse perpetuò
 dicere oportet eum qui rectē deligatur. Signa verò medio-
 critatis hæc sunt. Ea die ac nocte qua deligatus est ipse sibi ip-
 si videatur non minus, sed magis compressus esse. Postridie
 verò tumorem paruum, mollem, ad summam manum obor-
 tum esse. Mediocritatis enim factæ à te compressionis si-
 gnum hoc est. Desinente autem die minus compressus esse
 sibi videatur. Tertia verò die deligamenta laxa esse ipsi vi-
 deantur. Et si quid horum iam relatorum defecerit, nosce-
 re oportet deligationem moderata laxiorem esse. Si verò
 quid ex relatis abundauerit, nosse oportet ultra modum
 compress

A compressum esse. Et ex his coniectura facta, postea deligans aut laxabis, aut comprimes magis. Resolvere autem oportet tertia die, ubi extēderis. Et si primū moderatē deligasti, hāc deligationem paulo magis quā illā cōprimere oportet, & initia supra fracturā iniicere, quēadmodū etiā antea. Si quidem enim hanc prius deligaueris, sanies ex hac ad extremitates hinc atque illinc exhauritur. Si verò aliquā aliā partē prius cōprefferis, in illā ex cōpressa exhauritur. Intelligentia autē ad multa vtilis existit. Sic igitur semper incipere oportet & deligationē, & cōpressionem ex hoc loco. Reliqua verò iuxta rationē, ita ut quāto longius à fractura digressus fueris, minus cōprimas, nunquā quidem laxa omnino circūdando, sed adhaerentia. Postea verò pluribus linteis deligare oportet in singulis deligationibus. Et si interrogetur, dicat se paulo magis cōpressum esse quā prius, & praesertim circa fracturā. Sed & alia, & circa tumorē, & circa dolorē, & circa alleuationē, pro prioris deligationis ratione fiant. Postquā verò tertius iam aderit dies, laxiora esse ipsi videātur deligamenta. Deinde resolvere oportet, & rursus paulo magis comprimendo deligare, & hoc cum omnibus linteis quibus deligandus erat. Et postea omnia ea ipsum apprehendant, quae etiam in primis deligationum circuitibus contigerant. Vbi verò tertius aderit dies, & septimus à prima deligatione, si quidem rectē deligatus fuerit, tumor in summo manu, atq; hic non valde magnus erit: locus autem qui deligatur, in omnibus deligationibus tenuior ac gracilior cōperietur: Verū in septimo etiam valde tenuis, & ossa fracta magis mouentur, & facilius ad correctionem ducuntur. Et si hae huiusmodi fuerint, facta coaptatione velut ad ferulas adhibendas deligare oportet, paulo magis cōprimendo quā antea, si nō dolor aliquis maior fuerit ex tumore qui est in summa manu. Postquam autem linteis deligaueris, ferulas circumponere oportet, & vinculis quā latissimis circūdare, quietis saltē gratia, ut ferularum appositio ad compressionē manus nihil faciat. Postea verò & dolor, & alleuatio, eodem modo fiant, velut in primis deligationū circuitibus. At verò ubi tertio die laxas esse dixerit, tunc postea ferulas firmare oportet, maximē quidem circa fracturam, sed & alia iuxta rationem, si quidem & deligatio magis laxa fuerit quā compr-

Ferulae
quando appo-
nenda.

M m 4 mat.

mat. Crafsissimam autem ferulā esse oportet, qua parte ex-
tat fractura, non tamen multum. Et ad hoc studium vel ma-
ximè adhibendum est, vt ferula è directo magni digiti. non
ponatur, sed hac vel illac: imò neque à directo parui digiti,
qua parte os superminet in manus articulo, sed hac vel illac.
Quòd si ad fracturam conferat, hac parte aliquas ferulas po-
ni, breuiores ipsas aliis esse oportet, vt ne perueniant ad ossa
præminētia, iuxta manus articulum. Periculum est enim vl-
cerationis, & denudationis neruorum. Oportet autem tertio
quoq; die ferulis valde leniter firmare, hoc cogitantes, quòd
ferulæ deligationis conseruandæ gratia apponuntur, non au-
tem compressiōis gratia alligantur. Si quidem igitur pro-
bè noueris, quòd in prioribus deligationibus ossa sufficien-
ter sunt directā, & neq; pruritus infestent, neq; vlla aliqua vl-
ceratio suspecta sit: ita cum ferulis deligatum sinere oportet
donec viginti dies transgressus fuerit. In triginta enim die-
bus vniuersis maximè ex toto cubiti ossa corroborantur. Cer-
tum tamen nihil est. Nam & natura à natura, & ætas ab æta-
te valde differt. Postquam autem solueris, aquam calidam af-
fundere oportet, & postea deligare, paulo minus comprimē-
do quàm antea, & paucioribus linteis quàm prius. Et postea
tertio quoq; die soluere, ac rursus deligare, ita vt minus com-
primas, & paucioribus linteis vtaris. At verò si vbi ferulis de-
ligatus est, ossa nō rectè posita esse suspiceris, aut aliud quid
vulneratū vexet, in dimidio temporis spatio, aut paulo prius
soluere, & rursus deligare oportet. **Victus** porro his quibus
ab initio vlcera non facta fuerint, neq; ossa extra eminēt, suf-
ficit aliquanto simplicior. Verum pauciore victu vtendū est
ipsis, vsq; ad diem decimum, vt qui iam etiam quiescant: &
obsoniis tenellis vtendum, quæ transitui mediocritatem ex-
hibent. A vino verò & carnis esu abstinendum. Postea tamē
sensim progressu facto reficiēdi sunt. Hic sermo velut lex iu-
sta posita est de fracturarum curatione, & quomodo tractare
oporteat, & quomodo euentus sequi, ex iusta tractatione.
Quicquid verò non ita euētū habuerit, scire oportet, quòd in
tractatione quid defectuose, aut redūdāter factū est. Quin
& hæc insuper in hoc simplici modo cōsiderare oportet, quæ
non ita valde curare solent medici, & quidem quum omnē
curationem, & totam deligationē corrumpere possint, si nō
rectè

**Victus ho-
rū qualis.**

A rectè fiant. Si enim ambo ossa fracta fuerint, aut infernum so-
 lum: is verò qui deligatus est, in fascia quadam manum exce-
 ptam ac appēsam habeat, & plurima fasciæ pars circa fractu-
 ram existit, ita ut manus hinc atque hinc pendeat: hunc ne-
 cesse est reperiri os ad supernam partē distortum habētem.
 Si verò sic fractis ossibus, & summam manum in fascia ha-
 bet, & partem iuxta cubiti flexurā: reliqua verò cubiti pars
 nō sit eleuata: hic ad infernam partem os distortum habere
 comperietur. Proinde in fascia molli latitudinē habēte ma-
 ximam cubiti partem, & manus articulum, æqualiter suspē-
 dere ac eleuata gestare oportet. At verò si brachium fractum
 fuerit, si quidem quis extentam manum in hac figura exten-
B dat, musculus brachij extētus deligabitur. Postquam autem
 deligatus cubiti flexuram intlexerit, musculus brachij aliam
 figuram habebit. Iustissima igitur brachij extensio hæc est.
 Lignum cubitale aut paulo breuius, qualia sunt ligna quę in
 foramina ligonū immittuntur, suspendere oportet, hinc atq;
 illinc catena deligatum. Hominem verò in alta quapiam se-
 de collocatū, ita manu superincumbere oportet, ut lignum
 id sub ala sit moderatè habens, ut homo vix sedere possit, &
 ferè subleuatus sit, supposito postea alio quopiā fulcimento,
 & coriaceo puluino vno aut pluribus subiectis, quo modera-
 tam altitudinem habeat cubitus, ad rectū angulum obliqua-
 tus. optimum quidem est corium latum ac molle, aut fasciā
 latam circumdare, & magnum aliquod pondus appendere,
C quod moderatè intēdere possit. Sin minus, vir aliquis robu-
 stus in hac figura cubiti, circa cubiti flexuram deorsum co-
 gat. At verò medicus erectus stans, & alterū pedem in altio-
 re quopiā habens, aggressionem faciat, ita ut volis os diri-
 gat ac componat: facile autem dirigetur. Nam hæc extensio
 bona est, si quis ipsam rectè præparet. Deinde deliget fasciā
 rū principiis supra fracturā iniectis: & reliqua omnia, quę
 admodum prius monuimus, tractet: & easdem interrogatio-
 nes faciat. & iisdē signis vtatur, an moderatè habeat, aut se-
 cus. Et per tertium diem deliget, & magis comprimat. Et se-
 ptima aut nona die cum ferulis deliget. Et si suspicionem ha-
 beat, os non bene positum esse, intermedio tēpore soluat, &
 ubi probè collocauit, rursus deliget. Corroboratur autē ma-
 ximè os brachij in xl. diebus. Postquam verò hos excefferit, coalescat.

Qui bra-
 chiū fractū
 coapsetur.

Quo rem
 pore bra-
 chiū fractū
 coalescat.

M m s soluere

soluere oportet, & minus comprimere, & paucioribus quoq; D
 linteis deligare. Caterum victum quendam exquisitiorem quam
 prius constituere oportet, & ad longius tempus. Eius vero con-
 iecturam facere oportet, ad tumoris qui in summa manu est
 robur respiciendo. Insuper autem & ad hanc animum aduer-
 tere oportet: quod brachium à natura ad externam partem in-
 curuatum est, & distorqueri solet, si non bene curetur. Sed &
 alia omnia ossa, quæ à natura ad hanc partem distorta sunt,
 etiam dum curantur ubi fracta sunt, distorqueri solent. Vbi
 igitur tale quippiam in suspicionem venerit, lata insuper fascia
 brachium circumcirca complecti oportet, & circum pectus de-
 ligare: & ubi quiescere volet, inter cubiti flexuram & costas, E
 splenium quoddam multiplex conuolutum ac complicatum
 supponere: aut aliud quid quod huic simile existat. Hoc enim
 modo incuruatio ossis recta euadet. Cauere tamen oportet,
 ut ne minus ad internam partem vergat. Pes vero hominis
 ex multis ac paruis ossibus compositus est quemadmodum
 etiam summa manus. Franguntur quidem non ita valde hæc
 ossa, si non una cum corpore, ab acuto aliquo aut graui vul-
 nerato. Vulnerata igitur quomodo curare oporteat, in vlce-
 rationum parte refertur. Si vero quid è loco suo motum fuerit,
 aut digitorum articulus, aut aliud quoddam ex ossibus sum-
 mi pedis, vnumquodque in suum locum cogere oportet, quem-
 admodum & ea quæ in manu sunt. Curare vero oportet cera-
 to, & spleniis, & linteis velut etiam fracturas, exceptis feru-
 lis, eodem modo comprimendo, & per tertium diem deligā- F
 do. Interrogetur item is qui deligatur similiter velut in fra-
 cturis, & de compressione facta, & an laxa sit deligatio. At ve-
 rò sana fiunt in xx. diebus perfecte omnia, exceptis his quæ
 cum tibiæ ossibus communionem habent, & cum ipsa è dire-
 cto. Conducit autem hoc tempore decumbere. At non tole-
 rant continentes morbum. Verum priusquam sani fiant obam-
 bulant: & propterea plurimi non perfecte sanantur, sed dol-
 lor ipsos sæpe merito commonefacit. Totum enim corporis
 pondus pedes vehunt. Quum igitur nondum sani iter faciunt,
 articuli moti male curantur, ideoque alias atque alias hi qui ad
 tibiæ sunt, dolent. Quæ vero cum tibiæ ossibus communionem
 habent & maiora aliis sunt, & ubi hæc mota sunt diuturnio-
 rem medelam requirunt. Curatio tamen eadem est. Verum
 linteis

Pes & ossa
 eius fracta
 qui curen-
 tur.

Quoto tem-
 pore hæc
 sanescant.

A linteis & spleniis pluribus uti oportet: Et in totū hinc atque illinc deligare, cōprimere item velut alia omnia, ea maximē parte qua emota sunt, & primas quoq; linteorū obvolutiones eodem modo facere. In vnaqua; verò resolutione, multa, calida aqua uti oportet. In omnibus enim circa articulos lēſionibus, multa aqua calida affundēda est. Cæterū cōpreſſiones & laxationes in iisdem tēporibus eadem signa ostendunt, quæ in superioribus: & religationes eodē fiant. Sani verò perfectē hi sūt in xl. maximē diebus, si decumbere sustinerint. Sin minus, eadē patiuntur quæ prius relata sunt, & adhuc amplius. Porro quicunq; saltu de alto quopiam loco

Qui de alto
desiliūt.

B disparantur, venulæ verò sanguinē effundunt, carne circa os contusa, tumor autem accedit, & dolor multus. Os enim hoc parū non est, & supereminet quidem sub tibiæ rectitudinē, cōmunionem verò habet cum venis ac nervis principalibus. Tendo autem posterior huic ossi annectitur.

Curatio
horum.

Hos curare oportet cerato, & spleniis, & linteis, & aqua plurima calida, & linteis pluribus. Et ab his opus est etiam aliis quā optimis ac lenissimis, & si quidē mollis fuerit à natura cutis circū calcaneum, sic sinere oportet. Si verò crassa & dura veluti quidā habent, incidere oportet, æqualiter, & attenuare, ita tamē ut ne vulneretur. At verò talia bene deligare non cuiusvis est. Si enim deliget quis, quomodo alia circa malleolos deligantur, ita ut aliquando circū pedem, aliquando circum tendi-

C nem, fasciæ circūdentur: hæ cōſtrictiones calcaneū separant: qua parte contusio facta est. Atq; ita periculum est, ne calcanei os corrumpatur: & sanē si corruptum fuerit per omne ævum morbus durare potest. Nā & alia quæ non ex tali modo sunt, ipsum corrumpūt, sed in decubitu denigrato calcaneo, ex figuræ neglectu: aut in tibia vulnere sientē periculoso, ac diuturno, & communionem cum calcaneo habente: aut in femore: aut ubi ex alio morbo diuturnus decubitus contingit. Attamen & talibus diuturnæ ac molestæ affectiones sūt, & quæ sæpe refringantur, si nō bona diligentia, & multa quiete curentur. Quare etiā ea quæ ex tali modo corrumpuntur, supra aliquā lēſionem, magna corpori pericula inducunt. Febres enim peracutæ oboriuntur, continuæ, tremulæ, singultuosæ, mentem contingentes, paucis diebus durantes ac occiden-

occidentes. Fieri etiam possunt venarum sanguifluarū liuo- D
res venarū nausæ, & cancerationes ex compressione. Fieri
autem possunt hæc absque alia corruptione. Atque hæc qui-
dem relata sunt, ubi vehementissima contusiones sunt. Plu-
rima tamen leniter circumcirca cōtunduntur, neque vllum
magnum curationis studium exigunt, sed rectè tamē tracta-
re oportet. Quū verò vehemens in fulciēdo illisio facta esse
visa fuerit, tūc sanè relata facere cōuenit, & deligationē plu-
rimam facere circum calcaneum obuolutam, ita vt aliquan-
do ad summas pedis partes, aliquando ad medias, aliquando
ad tibiæ partes, ex opposito lintea obuoluantur. Deligare in-
super oportet & vicina omnia, hinc atq; illinc, velut etiam E
prius dictum est, & vehementem compressionem non face-
re, sed cum multis linteis. Præstat autem & veratrum biben-
dum dare eadem die, aut postridiē: & tertia die resolvere ac
rursus deligare. Signa porrò an recrudescant, aut non, hæc
sunt. Quum sanguis è venis effusus, & denigrationes, & his
vicina, fiunt subrubra & subdura, periculum est ne recrude-
scant. At si quidem febre careat, sursum purgās medica-
mentum dandum est, velut dictum est: itémque si non continua
febre laboret. Si verò continua fuerit febris, medica-
mentum dandum non est. Verùm & à cibis, & à sorbitionibus
abstinendum. Potu verò vtendum aqua, non vino, sed fauo-
rum cremore decocto, aut aceto mulso dulci. Si verò non re-
crudescant, sanguis è venis effusus, & denigrationes, & vici- F
næ partes, cum virore subpallidæ fient, & non duræ, & bo-
num est hoc testimonium in omnibus sugillatis, sanguine è
venis subter cutem effuso, quòd non recrudescant. Quæcun-
que verò cum duricia liuescunt, ea vt denigrescant, pericu-
lum est. Cæterum hoc studio habere oportet, vt pes ple-
runq; paulo altius reliquo corpore habeatur. Sanus autē fie-
ri poterit in sexaginta diebus, si quieuerit. At verò tibiæ duo
ossa sunt, quorum alterum altero hac parte multo tenuius
est, illa verò parte nō multo tenuius. Cohærent autem inter
se iuxta pedem, & appendicem communē habent. Verùm in
rectitudine tibiæ non cohærent. Iuxta femur autē cohæret,
& appendicem habent, & appendix discriminationem. Lon-
gius verò paulo alterum os est, quod secundum paruum di-
gitum est. Et talis quidem est natura ossium in tibia. Luxa-
tura aut

Tibiæ ossa.

A tur autem aliquando iuxta pedem ambo ossa, quandoque cum appendice, quandoque verò appendix tantum emouetur, quandoque alterum tantum os. Hæc autem minus molesta sunt, quàm ea quæ in articulo manus existunt, si quiescere homines sustineant. Curatio verò cõsimilis est velut illorũ. Nam & repositionem ex extensione, velut in illis facere oportet. Verũ vehementiore extensione opus habet, quanto fortius est ea parte corpus. Plerũq; tamẽ sufficiunt viri duo, alter hinc alter illinc extendentes. Si verò nõ satis robusti fuerint, facile est vehementiorem extensionem facere. Aut enim rotæ modiolũ, aut aliud quid huic simile defodere oportet, & molle quiddã pedi circumdare, & postea latis bubulis loris pede deligato, principia lororũ aut ad paxillũ, aut ad aliud lignũ alligare, atq; ita ligno in summũ modiolũ indito refringere, ita vt alij contra extendant humeris & poplite apprehensis. potest etiã superna corporis pars necessitate hac extensionis vrgeri, partim quidẽ si ita voles, ligno rotũdo leuigato altẽ defosso, partem quandã ipsius supereminentem intra crura iuxta ani & scroti intercapedinẽ applicato, quo corpus sequi prohibeat ad eos qui à pedibus extendunt. Deinde ad crus quod extenditur declinare non oportet, sed aliquem à latere assidere, qui nates retrudat, ne corpus circumtrahatur: partim verò si etiã circa alas hinc atque illinc ligna affigantur, manus autẽ extensione seruentur, apprehendat autem qui circa genu, atque ita contra extendat: partim item si quis velit, aliis loris circa genu aut circa femur deligatis, & alio rotæ modio supra caput defosso, & loris ex ligno quopiã alligatis, & ligno ita in rotæ modiolũ defixo, ad contrariã partem his qui à pedibus extendunt, adtrahere potest. Quin & si voles, pro rotarum modiolis trabem mediocrem sub lectum extendes, deinde ad trabis hinc atq; illinc caput ligna fulciens ac refringens, lora ipsis alligata intendes. Si verò & hoc velis, asellis hinc atque illinc constitutis, in ipsis extensionem facies. Sunt autem & alij multi extensionum modi. Optimum autem fuerit, si quis in magna ciuitate medicum agit, vt lignũ habeat præparatum, in quo omnes necessitates insint, tum ad omnes fracturas, tum ad omnes articulorum repositiones, ex extensione, ac vectium vsu. Satis autem est si lignum fuerit & longitudine, & latitudine, & crassitudinetale, quales columnæ quernæ

Tibiæ ossa
quæ luxan-
tur.

quernæ quadrangulæ fiunt. Postquàm autē sufficienter ex- **D**
 tenderis, facile iam est articulum reponere. Eleuatur enim
 in directum supra pristinam sedē. Dirigere itaq; manuum
 volis oportet, ita vt his partim in id quod eluxatum eminet
 innitaris, partim ab altera parte infra malleolum renitaris.
 Vbi verò reposueris, si quidem fieri poterit, extentum ita de-
 ligabis. Si verò præ loris impediaris, his exolutis distentionē
 facias, donec deligaueris. Deligare autem eodē modo oportet,
 & fasciarum initiis similiter in id quod luxatum eminet,
 iniectis, & primis obuolutionibus plurimis suprà id factis
 imò etiam spleniis plurimis supra id impositis, & compres-
 sione maximè isthic fiēte. Sed & hinc atque illinc multum
 insuper deligare oportet. Magis autem hic articulus cōpres- **E**
 sione opus habet: in prima deligatione, quàm is qui in manu
 est. Postquàm autem deligaueris, sublimius reliquo corpore
 deligatam partem habeat. Positum autem ipsius ita facere
 oportet, quo quàm minimè pes dependeat. At verò attenua-
 tionem corporis ita facere oportet, prout talem vel talem
 vim ipsa luxatio habet. Aliqua enim parum, aliqua multum
 luxantur. In totum verò magis & longiore tempore, in vul-
 neribus circa crura, quàm his quæ circa manus fiunt, at-
 tuare oportet. Nā & maiora & crassiora hæc quàm illa sunt:
 & sanè etiam necessariū est quiescere corpus ac decumbere.
 Verum postea deligare articulum tertia die, neque prohibet **F**
 quicquam, neq; vrget, & alia omnia similiter velut superius
 relata curare oportet. Et si quidem quietè decumbet, suffi-
 cient quadraginta dies, si solum in suum locum ossa rursus
 defederint. Si verò quiescere nolet, non facilè quidem crure
 vti poterit, & deligatione ad multum tempus vti cogetur.
 Quæcunq; verò ossa non perfectè desident in suum locū, sed
 aliquid deficit, progressu tēporis attenuatur coxa, & femur &
 tibia. Et si quidē intro luxata fuerint, externa pars attenua-
 tur. Si verò extra, interna. Plurima autem ad internam par-
 tem luxantur. Postquàm verò ambo tibiæ ossa fracta fuerint,
 citra exulcerationē, extensione vehementiore opus habent,
 Extendere autem oportet quibusdam modis ex prædictis, si
 magnæ emotiones fuerint. Sufficiunt etiam à viris fientes
 extensiones. Plerunque enim suffecerint duo viri robusti, al-
 ter hinc, alter illinc distendentes. Intendere autem oportet
 in

Tibiæ vtra-
 que ossa cō-
 fracta sunt.

A in directū, secundū naturā, & secundum rectitudinē tibiae ac femoris, siue tibiae fractae, siue femoris ossa extenderis. Sed & deligare sic oportet vtriusq; extentis, vtrū tandē horū deligaueris. Nō enim eadē cruri & manui cōferunt. Nam vbi cubiti & brachij ossa fracta fuerint deligata, manus appensa excipitur. At si extenta deligaueris, figuræ carniū alterantur inter flectendum in cubiti flexura. Fieri enim non potest, vt cubiti flexura ad multū tempus maneat extenta. Non enim saepe in hac figura, sed in flexione esse consuevit. Quin & quum homines obambulare possint, vbi circa manum sauciati fuerint, opus habent flexione in cubiti flexura. At crurum & in ambulando, & in stando consuevit, aliquando

B quidem extentum esse, aliquando verò ferè extentum esse, ad infernam partem secundum naturā: & sanè etiam ad hoc vt reliquum corpus vehat: propterea facile est ipsi extentum esse, vbi eius necessitatem habuerit. Quin & in cubilibus saepe in hac figura est, vt videlicet sit extentum. Postquam autem vulneratum fuerit, necessitas animi propositum in seruitutem adigit. Impotentes enim fiunt ad se attollendum, adeò vt ne meminerint quidem, vt inflectāt ac exurgant: sed quiescunt in hac figura decumbētes. Propter has igitur causas, neq; extensionis, neque deligationis figura eadem, manui & cruri conducit. Si quidem igitur suffecerit extensio quæ per viros fit, nihil aliud laboris frustra insumere oportet. Imperitiam enim arguit, machinas adhibere vbi ipsis non est

C opus. Si verò non sufficiens fuerit extensio per viros, etiam ex aliis necessariis quædam adhibere oportet, si quæ commoda fuerint. Quum autē satis iam extenta fuerint, facile est dirigere ossa, & ad naturam reducere, manuum volis ac palmis corrigendo ac coaptando. Vbi verò direxeris, linteis deligare extenta, siue ad dextram partem, siue ad sinistram circumducere prima lintea conducatur. Initia autem ipsorum supra fracturam iniiciantur, & circū hanc primæ quoq; obuolutiones circumducantur, deinde deligando sursum ad tibiam distribuuntur, velut in fracturis dictū est. Cæterum lintea latiora esse oportet, & lōgiora, eaq; multò plura circa crurum quàm in manu. Vbi verò deligaueris, super planum quoddam & molle deponere conuenit, vt neq; hac, neque illac distorqueatur: neque repandū, neque gibbum fiat. Maximè autem cōfert puluim

Canales an
sint suppo-
nendi.

puluinar, aut lineum, aut laneum non durum, laxū, per me- **D**
dium secūdum longitudinē subiectum, aut aliud quid quod
huic simile existit. Nam de canalibus qui sub crura fracta
subiiciuntur, quid cōsulam ambigo, an supponere ipsos con-
ueniat, aut non: profunt enim, non tamen quantum putāt hi
qui ipsos supponunt. Non enim quiescere cogunt canales, ve-
lut illi putant. Nam neq; dum reliquum corpus aut hāc, aut
illāc vertitur, cogit canalis vt crus ne sequatur, si non ipse ho-
mo huius rei curam habeat: Neq; rursus absq; corpore crus
moueri canalis prohibet, vel in hāc, vel in illam partē. Quin
& crudelius est lignum subiicere, si non simul molle quiddā
in ipsum indatur. At utilissimum est in strato permutando,
& in progressibus ad aluum exonerandam. Licet igitur, & **E**
cum canali, & sine canali, & bene, & malè rem moliri. Verū
vulgò persuasum est, etiam medicum minus delinquere, si
canalis subiiciatur, etiam si minus hoc artem referat. Opor-
tet enim super plano quopiam ac molli cubare crus ipsum,
penitus in directum: alioqui necesse est deligationem su-
perari à distortionē, quæ in positu contingit, quocunque &
quantumcunque tandem inclinarit. Respondeat autem deli-
gatus eadem quæ etiam prius dicta sunt. Nam & deligatio-
nem talem esse oportet, & tumorem ita attolli ad extremas
partes, & laxationes ita, & religationes per tertium diem: &
quod deligatur gracilius inueniri, & deligationes magis fa-
cere, & pluribus linteis, & circūdare pedem laxè, si non vul- **F**
nus valde propinquum genu fuerit. Extendere autem mo-
deratè, & dirigere ossa, in vnaquaque deligatione oportet.
Si enim rectè curetur, & tumor secundum rationem proce-
dat: tum locus qui deligatur tenuior ac gracilior erit, tum
ossa adducta faciliora, & extensioni magis obedientia. Post-
quam autem septimus aut vndecimus aderit dies, ferulas ap-
ponere oportet, quemadmodum & in aliis fracturis dictum
est. Ceterū ferularum locationes vitare oportet, & se-
cundum malleorum rectitudinem, & supra tēdinem, qui est
in tibia pedis. Ac tibiæ ossa corroborantur in quadraginta
diebus, si rectè curentur. Si verò suspicionem habeas, os ali-
quod directione opus habere: aut de vlceratione aliqua ti-
meas, intermedio tempore soluere, & probè coaptata reli-
gare oportet. Porro si alterum tibiæ os factum fuerit, ex-
tensione

Ferulæ quā
do apponē
dæ.

Tibiæ ossis
coalescētia
quota.

A tensione quidem debiliore opus habet, non tamen deficere, neque segniter agere, in extendendo conuenit: & maximè quidem omnes fracturas in prima deligatione, quātum eius fieri debet, extendere oportet: Sin minus, quā citissimè. Quodcunque enim os non recto modo coaptatum deligans quis compresserit, locus maiori dolore vexabitur. Reliqua verò curatio eadem est. At verò ex ossibus his internum, tibia & prima tibia appellatū, molestiā maiore in curādo exhibet, & extēsiōne magis opus habet: & si non rectè coapta ossa fuerint, occultari nō possunt. Est enim totum conspiciū & carnis exors, & hoc facto lōgè tardius progredi eo crure poterint. Si verò externum os fractum fuerit, & multò facilius ferunt, & multò melius occultare possunt, etiā si non bene fuerit coaptatum. Est enim carnosum, & cito in pedes consistunt. Plurimum enim oneris interdum tibiæ os vehit. Nam simul & vnā cum ipso crure: & oneris secundum crus rectitudine, maiore laboris partem internum os suffert. Femoris enim caput supernam corporis partem sustinet. Hoc autē intra crus est, & nō extra, sed secundum tibiæ rectitudinem: & simul reliqua dimidia corporis pars huic rectitudini magis appropinquat, & non externæ: & simul crassius est internum quā externum, quēadmodum etiam id quod in cubito est, secundum parui digiti rectitudinem, tenuius est & longius. In articulo tamen inferno nō similis est ossis longioris cōstitutio. Inæqualiter enim cubiti gibbus siue flexura, & poples flectūtur. Propter has igitur causas, externo quidem osse fracto, celeres progressus sūt, interno verò fracto, tardi. At verò si fœmoris os fractum fuerit, extensionē præ omnibus facere oportet, ita vt ne defectuosius fiat. Amplior enim facta nihil læserit. Neq; enim si quis distantia ex vehementia extensionis ossa deligauerit, fieri poterit vt deligatio ipsa teneat, vt ita distent: sed coeūt inter se ossa, quā citissimè, vt intendentes ipsa remiserunt. Crassissimæ enim ac fortissimæ quum sint hac parte carnes deligationem superabunt, non ab ipsa superabuntur. Magnum enim dedecus est ac detrimētum, femur breuius efficere. Nam si quidem manus breuior fiat, & occultari poterit, & nō est magnus error. At crus si breuius fiat, claudum hominē efficiet. Sanū enim crus lōgius est, & id redarguit. Quare utili⁹ fuerit, vt si quis

Fœmoris
os fractum.

N n malè

Curatio.

Femur fractum quomodo coalescit.

malè curādus sit, ambo potius crura fracta habeat, quàm alterum tantū: æquilibrium enim ipse sibi ipsi fuerit hoc modo. Postquam verò sufficienter extenderis, directione ac coaptatione per manuum volas facta, eodē modo deligare oportet, velut etiam prius scriptū est, iniectis etiam fasciarum initiis velut dictum est, & deligationis distributione sursum versus fiente: & deligatus eadem respondeat, velut etiam prius: & doleat eodē modo, & melius habeat, & similiter rursus deligatur: & ferularum appositio eadem sit. Corroboratur autē femur in quinquaginta diebus. Insuper verò & hoc considerare oportet, quod femur gibbosum magis est ad externam partem, quàm ad interuā, & magis ad anteriorem, quàm posteriorem. In has itaq; partes etiam distorquetur, si non probe curetur, & sanè iisdem partibus etiā ipse seipso magis excarnis est, ut neq; occultari possit in distortionem. Si igitur huiusmodi quippiam suspectum habueris, machinari ea oportet, quæ in brachio distorto consulimus. Pauca insuper lintea circa coxam, & locum inter coxas & lumbos, circumdare oportet, quo & inguina, & articulus circa intermediam crurū ac inguinam partē plecada appellatum, insuper deligetur. Nam & aliàs confert, & ut ne extremæ ferularum partes lædant, si non ad deligata adhibeantur. Deficere autem oportet semper ferulas, à nuda parte, & hinc atq; illinc multum: & positionem ferularum semper ita providere conuenit, ut neque super os aliquod circa articulos natura prominens, neq; super neruum circa articulū fiat. Tumores verò iuxta poplitem, aut circa pedem, aut iuxta aliam quampiam partem, ex compressione eleuatos, multis lanis succidis probe carminatis, vino ac oleo respersis, cerato sublito, deligare oportet, & ubi presserint ferulæ, citius laxare. Graciles autem fieri poterunt, si supra ferulas gracilibus linteis tumores deligaris, ab infima parte initio facto, ad supernam procedendo. Sic enim quàm citissimè tumor gracilis fieri poterit, & transcendit supra priores deligationes. Verū hoc deligationis modo uti non oportet, si non periculum fuerit in tumore, pustularū, aut denigrationis. Tale verò nihil fit, si non quis valde premat fracturā, aut suspensam habeat, aut manu scalpat, aut aliud quid quod irriter corpori allabatur. At verò canalem si quis sub ipsum femur supponat, qui poplitem

Canalis quātus esse debeat.

noa

A nō excedat, læserit magis quàm profuerit. Neq; enim prohibuerit, quo minus & corpus, & tibia, sine femore moueatur. Noxius enim erit ad poplitem pertingens, & quod minimè oportet, id facere impulerit. Minimè verò oportet genu flectere. Omnè enim turbationē deligationibus inducit, & femore, & tibia deligata, quisquis genu flexerit. Necesse enim erit propter hoc, musculos aliàs atq; aliàs aliam figurā habere. Necesse est item ossa fracta moueri. Præ omnibus itaque faciendum, vt poples sit extentus. Videtur igitur canalis similiter prodesse, qui à coxa ad pedem vsque subiectus contineat, & aliàs circa poplitem, fasciam cum canali laxè circumdare oportet: quemadmodū infantes in cunis fasciis obuoluuntur. Deinde si femur ad supernam partem distorqueatur, aut ad latus, melius ita cōtineri poterit vnà cum canali.

B Caterūm calcanei summi valde magnā curam habere conuenit, vt & in tibiæ, & in femoris fracturis, aptè se habeat. Si enim dependeat pes, reliqua tibia firmata, necesse est iuxta anteriorem tibiæ partē, ossa incurua esse. Si verò calcaneum quidem moderato altiùs fuerit firmatum, reliqua verò tibia aliquantulū eleuata, necesse est huic ossi, vt circa anteriorem tibiæ partem, moderato cauius appareat: atque hoc adhuc magis, si calcaneum hominis natura fuerit magnū. Sed & omnia ossa tardius corroborantur, si nō secundum naturam posita fuerint, itémque ea quæ non in eadem figura quiescunt: & calli quoque debiliores ipsis obducuntur. Atque

C hæc quidem de his quibus ossa quidem fracta sunt, non autem extra eminent, neque aliàs vlcus factum est. Quibus verò ossa fracta sunt simplici modo, & non multifido: ita vt eadem die reposita sint, aut postridie in sedem suam recepta, & nullus timor sit fissorum ossium discessionis: aut etiā quibus vlcus quidem factū est, ossa verò fracta non extra eminent, neque modus fracturæ talis est, vt sint segmenta à fissis ossibus separata: tales spes est simplici modo curari posse.

Et quidem sanè neque magni quippiam boni, neque mali faciētes, vlcera quidē curant aliquo purgatorio, aut picatum ceratum, vt emplastrum cruentis vulneribus idoneum, aut aliud quid ex his quæ facere solent, imponētes: Ego verò eos laudo qui splenia vino imbuta, aut lanas succidas, aut aliud quid huiusmodi deligant: Vbi verò vlcera pura facta fue-

Calcanei in
his cura.

rint, & iam coalescunt, tunc multis linteis deligare, & ferulis dirigere conantur. Hæc quidem curatio boni aliquid facit, nihil autem magni mali: Ossa tamen non similiter in suam sedem firmari possunt. Verum corpora aliquanto tumidiora ea parte fiunt, quam sit opportunum, fiunt autem & breviora his quibus utraque ossa, aut cubiti, aut tibiæ fracta sunt. Alij vero rursus sunt, qui talia statim linteis curant, & hinc atque illinc linteis deligant, vlcus verò ipsum relinquunt, & perfrigerari sinunt. Deinde super vlcus purgatorium aliquod imponunt, & splenis vino imbutis, & lanis succidis curant. Hæc curatio mala est, & verisimile est eos qui ita curant, tum in aliis fracturis, tum in huiusmodi maximè imprudenter se gerere. Maximum enim est cognoscere quomodo initium lin- E rei iniicere oportet, & qua parte maximè comprimere: & quæ utilitas contingat, si quis initium lintei rectè iniiciat, & quæ maximè oportet parte premat: & quæ detrimenta inducantur, si quis non rectè iniiciat, neque qua maximè oportet premat, sed hinc atque illinc id faciat, & dictum quidem est etiã in superioribus, quæ ex utrisque eneniant. Testatur autem & ipsa hæc medicina. Necesse est enim ei qui ita deligatur, tumorem ad ipsum vlcus eleuari. Etenim si sanum corpus hinc atque illinc fuerit deligatum, in medio verò relictum, iuxta relictum utriusque spatium maximè intumuerit, ac decoloratum reddetur, quo modo vlcus hæc non perpetietur? Necesse igitur est, ut vlcus quidem decoloratum sit, & labiis eversum ac protuberans, verum lachrymosum & non suppurans: F ossa verò etiam quæ discessura non erant, discedant: sed & pulsans, & febriens vlcus fuerit. Coguntur autem propter tumorem cataplasmata insuper imponere, quod & ipsum incommodum est his qui hinc atque illinc deligantur. Pondus enim inutile ad reliquum pulsum accedit. Postremum verò deligamenta resoluunt, ubi iam malum ipsis recrudescit, & de cætero citra deligationem curant. Neque verò minus, etiam si aliud quoddam eiusmodi vulnus acceperint, eodem modo curant. Non enim deligationem hinc atque illinc factam, & vlcus perfrigerationem, in causa esse putant, sed aliud quoddam infortunium. Attamen de hoc tam multa non scripsissem, si non certo scirem incommodam esse hanc deligationem, & multos esse qui ita curent, & magni momenti esse hanc rem dedicere

Quid potius
si in his,

A scere, & testimonio hæc esse, quod rectè scripta sint ea quæ prius scripta sunt, siue maximè præmendæ sint, siue minimè ipsæ fracturæ. Oportet autem ut in summa dicā, his quibus non est futuri discessus ossis expectatio, eandem curationem adhibere, veluti his quibus os fractum fuerit, vlcus autē non habent. Nam & extentiones, & directiones ac coaptationes ossium eodem modo facere oportet, & consimilem deligationem. Super ipsum enim vlcus splenium tenue duplex, picato cerato illitum deligandum est, & circumstitæ partes cerato albo illinendæ. Verum lintea, & reliqua latiora, aliquantum fissa sint magis, quàm si nō vlcus haberent: & id quo primū deligamus, multo latius sit ipso vlcere. Quæ enim angustiora sunt quàm vlcus, cinctum vlcus tenent, id quod fieri non conuenit, sed prima circumductio totum vlcus comprehendat, & linteam hinc atque illinc præmineat. Itaque secundum vlceris rectitudinem, linteam iniicere oportet, & premere paulo minus, quàm si vlcus nō haberent. Distribueda verò est deligatio, velut etiā prius dictum est. Lintea autem semper quidē mollis modi sint, magis tamē in talibus, quàm si vlcus non esset. Copia verò linteorum nō minor sit prius relatis, sed etiam aliquanto amplior. Si verò deligatus fuerit, videatur is sibi lintea firmata quidē esse, nō autem compressa: dicatq; super vlcus maximè firmata esse. Eadem autē tempora esse oportet, ad hoc ut magis firmata esse videantur, & ad hoc ut magis laxa videātur, quemadmodum etiā in superioribus dictū est. Deligatio etiā postea facienda per tertium diē, ita ut omnia postea faciamus cōsimili modo, velut prius dictū est, præterquā quod in totū, minus aliquatō hæc quā illa comprimenda sunt. Quod si secundū rationem, quæ fieri par est, facta fuerint, gracilior quidē semper cōperietur vlceris pars, graciliores autē & reliquæ omnes, quæ à deligatione continentur: & suppurationes citiores erunt, quàm in vlceribus aliter curatis: & quæcunque carunculæ in vulnere denigratæ sunt & mortificatæ, citius abrumpuntur ac excidunt in hac curatione, quā in aliis: & ad cicatricē citius peruenit vlcus, si hoc modo quàm si alio curetur. At omnium horum causa est, quod & locus circa vlcus gracilis sit, & quæ circumstita sunt gracilia omnia sunt. In reliquis igitur omnibus consimiliter curare oportet, velut ossa sine vlcerationibus

Ligationis
modus.

fracta, Verū ferulas apponere non oportet. Et propterea lin- **D**
 tea his, plura esse debent quā aliis, & quod minus compri-
 mantur, & quod ferule tardius apponantur. Si tamen ferulas
 apposueris, non secundum rectitudinem vlceris appones, sed
 ita vt laxæ adhibeantur, prouidendo vt nulla magna ab ipsis
 constrictio fiat. Dictum autem hoc quoque est in his quæ
 prius scripta sunt. Victus autem rationem exquisitiorem, &
 longiori tempore constituere oportet, his quibus ab initio
 vlcera fiunt, & quibus ossa extra eminent, & vt in summa di-
 catur, in vehementissimis vulneribus exquisitiore, eoque
 diuturniore victu vti conuenit. Eadem etiam curatio vlce-
 rum est in his quibus ossa quidem fracta sunt, sed vlcus ab **E**
 initio non fuit. Verū inter medendum factum est, aut vlce-
 re linteis magis compresso, aut à ferularum infessu, aut ab
 alia quapiam causa. Cognoscuntur autē tales fracturæ, an vl-
 cus subsit, & dolore, & pulsibus, & tumor qui in extremis par-
 tibus est, talibus durus efficitur, & si digitum admoueris, at-
 tollitur: sed & cito rursus subterfugit. Si igitur tale quid su-
 spicatus fueris, soluere oportet: & si quidem pruritus circa
 subligationes fuerit, aut alia quapiam parte deligata, cerato
 picato pro altero vti. Si verò horū nihil fuerit, verū ipsum
 vlcus irritatum, reperitur nigrum valde aut impurum: & fu-
 turum est vt & carnes suppurētur, & nerui insuper excidant,
 hos omnino perfrigerare nō oportet, neq; quicquā has sup-
 purationes vereri, sed curare in reliquis omnibus consimili **F**
 modo, velut eos quibus ab initio vlcus factū est. Linteis verò
 deligare incipere oportet valde laxis, à tumore qui in extre-
 mis partibus consistit, atq; ita deligationem distribuere sem-
 per sursum versus, nusquā quidem cōprimendo, sed maximē
 super vlcus firmādo, super alia verò minus, & prima quidem
 linthea hæc munda sint, & nō angusta. Copia verò linteorum
 tanta sit, quāta est si cum ferulis deligatio fiat, aut paulo mi-
 nor. Super ipsum autē vlcus sufficiens est splenium cerato al-
 bo illitum. Siue enim caro, siue neruus denigratus fuerit, ex-
 cidet. Talia enim acris curare non oportet, sed mollibus,
 velut ambusta. Deligare verò postea per tertiū diem conue-
 nit, ferulas autē non apponere. Quiescere verò magis quā
 prius, & modico cibo vti. Scire verò expedit, siue caro, siue
 neruus sit, id quod excidet, q̄ hoc modo multo minus vltra
 depasci

Linteorum
 quantitas.

- A** depascitur, & multo citius excidet, & multo graciliores circumsitæ partes erunt, quã si quis exolutis linteis, aliquid medicamentorum purgatoriorũ super vlcus imponat. Quin & si exciderit id quod suppurasset, & citius carne repletur, & citius ad cicatricem peruenit, quã si illo aut alio modo curetur. Omnia sanè in hoc sita sunt, vt quis hæc rectè & moderatè deligare sciat. Conferūt insuper & figuræ quales esse oportet, & reliqua victus ratio, & linteorum aptitudo. Si verò in recens vulneratis decipiaris, ossiũ discessum non fore putās, quum tamē expectatio sit illa emersura esse, modum curationis timere non oportet. Nihil enim magni mali cōtigerit, si modo bonas ac innoxias deligationes manu facere noueris.
- B** Signum autē hoc est, si ossiũ discessus in hoc curationis modo futurus est. Pus enim multũ fuit ex vlcere, & gliscere ac rurgere affecta pars videtur. Frequētius igitur deligare oportet, ob nimiam humiditatē, & quòd aliàs etiã febres fiunt. Et si quidē valde præmantur à deligatione & vlcus, & circumsitæ partes graciles fiunt. Quicunq; itaq; valde tenuium ossium discessus fiunt, hi nulla magna mutatione opus habēt, nisi vt laxius deligatio fiat, vt ne pus intercipiatur, sed facilè effluere possit. Sed & frequētius deligare oportet, donec os discesserit, & ferulas non apponere. Quibus verò maioris ossis discessus expectatur, siue hoc à principio prænoueris, siue etiam postea cognoueris, non amplius eadē curatione opus habet. Sed extensiones & directiones ita facere oportet, velut dictũ
- C** est: splenia verò duplicata, latitudine quidē dimidio palmo non minora: quale tamē fuerit vulnus iuxta hoc coniectura facienda est: longitudine verò paulo quidem breuiora, quã vt bis circum fauciatum corpus circumduci possint, multo verò longiora quã vt semel. Copia verò tot sint, quot facere cōducit. Hæc in vino nigro austero madefacta, ex medio initio factò circūuoluere oportet, quemadmodũ fascia ex duobus initiis deligatur: & deinde asciatim alternatione ipsorũ facta, initia dimittere. Hæc & super ipsum vlcus adhibenda sunt, & ab vtraq; vlceris parte, & ne comprimantur, sed salte fulciendi vlceris gratia incūbant. Supra ipsum verò vlcus, ceratũ picatum imponere oportet, aut aliquod ex emplastris eruentis vulneribus destinatis, aut aliud quoddam medicamentum, quod familiare acidoneum sit humectationi adhibendæ

Ossis maioris abscessus.

**Quid estas
& hyēs in
his poscat.**

**Quis sine li
gatione cu
retur.**

**Hæ pilæ
quid sibi
velint.**

**Virgæ cor
neæ.**

bendæ. & si quidem æstatis tempus fuerit, vino madefacere **D**
splenia frequenter oportet. Si verò hyems, lanas succidas mul
tas vino & oleo imbutas adhibeto. Oportet autē capræ pel
lem substernere, & defluxiones obseruare, vt facile effluere
possint, ita vt meminerimus quòd hi loci in iisdem figuris
multo tempore permanentes, intertrigines curatu difficiles
faciūt. Qui verò deligatione sanari per aliquē ex relatis, aut
referendis modis non possunt, eos magnam huc curam adhi
bere conuenit, vt fractam corporis partē commodè positam
habeant secundum rectitudinem, animaduersione ad hoc ha
bita, vt sursum magis quàm deorsum vergat. Si verò quis be
ne ac facilè opus perficere velit, operæ precium est etiam ma
chinamenta facere, quo iustam & non violentā extensionem **E**
pars corporis fracta habeat. Maximè verò in tibia machina
mēta adhibere expedit. Sunt igitur aliqui qui in omnibus ti
biæ fracturis, & quæ deligantur, & quæ non deligantur, pe
dem summum ad lectum alligant, aut ad aliud quoddam li
gnum iuxta lectum defossum. Hi itaq; omnia mala faciunt,
nihil autem boni. Neque enim vllam opem affert extēsiōi,
hæc pedis alligatio. Nihilo enim minus ad pedem concedet
reliquum corpus, atq; sic non amplius extenditur: neque rur
sus ad rectitudinem quicquam prodest, sed etiā obest. Dum
enim vertitur reliquum corpus, aut hac, aut illac, nihil prohi
bebit vinculum illud, quo minus & pes, & ossa pedi annexa,
reliquū corpus sequantur. Imo si pes alligatus non fuisset, mi
nus distorqueretur. Si verò quis pilas duas ex corio Aegyptio **F**
consuat, tales quales gestāt hi qui multo tempore in magnis
compedibus vincti sunt: habeant autem pilæ hinc atq; illinc
tunicas, ad vulneris quidē partes, profundiores: ad articulo
rum verò partes, breuiiores: Sint itē tumidæ ac molles, & cō
gruentes ad hoc, vt altera supra malleolos, altera infra genu
coaptetur. Habeat insuper vtrāq; duas vtrinq; appendices à
latere, aut ex simplici, aut ex duplici loro, breuiiores velut an
sas, ita vt alteræ sint ab vtraque malleoli, alteræ ab vtraque
genu parte: & superna pila alteras tales habeat secundum
eandem rectitudinem. Postea virgis corneis acceptis, æqua
lem inter se magnitudinem habentibus, crassitudine qui
dem digitali, longitudine verò vt flexæ appendicibus con
gruant, huc diligētiam adhibeas, vt extremæ virgarum par
tes

Ates non ad corpus, sed ad summas pilarum eminentias inni-
tantur. Oportet autem esse tria virgarum paria, aut etiam
plura, & alias aliis aliquanto longiores, & aliquanto breuio-
res ac minores, vt si velis magis distendere possis. Locentur
autem virgæ vtræque hinc atque illinc à malleolorû vtraque
parte. Hæc itaque si bene machinatus fuerit, & extensionem
iustam exhibuerint, & secundum rectitudinem æqualem, &
vulnere nullus dolor accesserit. Nam quæ expressa fuerint, si
quid tamen exprimeretur, partim ad pedem abducentur, par-
tim ad femur: & virgæ hinc atque illinc à malleolis accom-
modatiores erunt, vt tibiæ positio non impediatur, & vulnus
probè impingat ac sustentetur. Neque enim impedimento
Best, si quis velit duas virgas superiores, ipsas inter se coniun-
gere, & si quis leuiter quid superimponere velit, vt id quod
superimponitur, à vulnere eleuatum sit. Si quidem igitur
& pilæ lenes, & molles, & bonæ, & recenter consutæ fuerint:
& virgarum intentio probè intenta fuerit, velut iam dictum
est, commodum erit machinamentum. Si verò quid horû
non rectè habuerit, læserit magis quàm profuerit. Conuenit
autem & alias machinas, aut bene machinari, aut non ma-
chinari: Turpe enim est & minimè artificiosum, in machinis
struendis à machinis aberrare. Plerique porrò medici fra-
cturas, & cum vlceribus, & sine vlceribus, primis diebus la-
nīs succidis curant, & nihil ab arte alienum iplis hoc esse vi-
detur, & qui quidem à recens vulneratis coguntur, ex linteo-
Crum inopia lanis vti, his plurimus veniæ locus patet. Non
enim habuerit qui in linteorum penuria, aliud quid multo
melius ad tales deligādas quàm est lana. Verū omnino mul-
tæ lanæ esse debent, & valde bene carminatæ, & non asperæ.
Nam paucarum & malarum vires etiam modicæ sunt. Qui
verò ad vnum ad duos dies, lanis deligare iustū esse censent,
tertia verò ac quarta linteis deligātes premunt, ac extēdunt
tunc vel maximè, hi in re multi adeo ac magni in medicina
momenti, se imprudenter gerunt. Minimè enim tertia ac
quarta die omnia vulnera mouere oportet, & vt in summa
dicam, etiam omnes specillorum admotiones vitare conue-
nit in his diebus, & alia quoque quibus vulnera irritantur.
In totum etiam tertia ac quarta dies in plerisque vulneribus
recrudescantias pariunt, & quæ ad inflammationem ac im-

munditiam procedunt, & quæ ad febres deueniunt. Et hæc D
res multi momenti est vt discatur, vt si qua alia. Cum qua
enim ex vtilissimis in medicina rebus, non solum circa vul-
nera, verum etiam circa alios multos morbos, cōmunionem
non habet: nisi quis etiam alios morbos vlcera esse dixerit,
Habet enim & hic sermo aliquam verisimilitudinē. Multis
enim modis alij aliis cognati sunt. Quicunque tamen iu-
stum esse putant lanis vti, donec septem præterierint dies,
deinde verò extendere ac dirigere & linteis deligare, hi non
similiter imprudentes videri poterint. Nam & maximum
inflammationis periculum præterit, & ossa laxa ac apta post
hos dies sunt. Longè tamen & hæc curatio superatur, ab ea
deligatione quæ ab initio linteis fit. Ille enim modus prepa-
rat ac efficit vt septima die ferulis perfectè deligari possint. E
Hic autem modus multò tardior est. Sed & alia quædam de-

Cum ossa
fracta &
extantia nō
redeunt.

trimenta habet. Verum longum esset omnia scribere. Qui-
bus verò ossa fracta & extra eminentia in suam sedem col-
locari non possunt, his hæc restitutio debetur. Ferramenta fa-
cere oportet ad eum modum quem vestes habent illi qui-
bus lapidæ vtuntur, alia latiora, alia angustiora. Esse verò
conuenit tria, aut plura etiam, quo quis maximè congruis
vtatur. Postea cum his vnà cum extēsiōne motionem aggre-
di oportet, ita vt ad inferiorem ossis partem subiicias ad su-
periolem verò partem ossis, superiorem ferramenti partem
innitendo firmes, In summa, quemadmodum si quis lapidē
aut lignum vehemēter veste cōmoueat. Sint autē valida fer-
ramenta quantum eius fieri potest, vt ne flectantur. Hoc ma- p
gnum auxilium est, si & ferramenta idonea fuerint, & si quis
velut conuenit commotionem faciat. Nam ex omnibus in-
strumētis quæ homines machinati sunt, fortissima hæc tria
existunt, aselli circunductio, per vestes commotio, & cuneo-
rum vsus. At sine horum vno aliquo, aut sine omnibus, nullū
vehementissimum opus homines perficiūt. Non igitur sper-
nenda est hæc per ferreos illos vestes commotio, aut enim
hoc modo, aut nullo alio, in sedem suam collabentur. Si verò
superna ossis pars immutata fuerit ac confracta, vt vesti ad-
hibendo locus non sit commodus, sed acutum quid pro-
minet, tunc osse scalpendo derafo, securam vesti sedem fa-
cere oportet. Hanc autem per vestes commotionem & ex-
tensio

A tensionem, eadem die aut secunda facere oportet. Non autem tertiam tertiam. Minimè verò quarta aut quinta. Nam etiam si non reponas, sed aliàs molestiam exhibeas in his diebus, inflammationem induxeris: quanto magis si reponas. Conuulsionē tamen multo magis induxeris si reponas, quam si reponere omittas. Atque hæc probè nosse conuenit. Si enim reponenti conuulsio accesserit, non multa salutis spes est. Commodum autem est rursus eicere os à sua sede, si hoc fieri citra molestiam possit. Non in laxioribus quàm opportunum est, cōuulsiones ac distensiones accedunt, sed in his quæ magis extenta sunt. Cæterum de qua re nunc nobis sermo est, in prædictis illis diebus molestiam exhibere nō oportet, & curam adhibere ut vlcus minimè inflāmetur, & maximè suppuretur. Postquam verò septem præterierint dies, aut paulo plures si sine febre fuerit, & vlcus non inflammatū sit, tunc minus vetat ut reponere tentes, si speres obtenturum te esse. Sin minus non oportet frustra molestiam suscipere & inferre. Si igitur ossa reposueris in suam sedē, iam scripti sunt modi quomodo curare oportet, siue ossa discessura esse, siue nō, expectatio sit, & si quidem ossium discessus expectatio sit, eo quem dixi modo cum linteis, in omnibus talibus deligationem facere oportet, ex medio linteo initio facto ut plurimum, velut ex duobus initio fascia deligatur. Coniecturam autem facere oportet iuxta vlceris formā, quo sit quam minimum hians ac labiis protuberans & expassum. Aliis enim ad dextram deligare commodū est, aliis ad sinistram, aliis ex duobus initiis. Quæcunque verò ossa repositionem effugerunt, ea discessura esse nosse oportet: itēque ea quæ carnibus penitus nudata sunt. Nudatur autem quorundam superna pars, quorundam verò carnes circumcirca mortiferantur. Et quibusdam quidem ex veteri vulnere aliqua ossa emarcuerunt: quibusdam verò non. & aliquibus magis, aliquib⁹ minus, & partim parua, partim magna. Propter hæc igitur relata, vno morbo dici non potest, quādo ossa sint discessura. Aliqua enim ob paruitatem, aliqua ex eo quod in summa parte existunt, citius discedunt: aliqua eo quod non discedunt, resiccata & marcida fientia desquamantur. Præterea differt curatio à curatione. In totum igitur ossa citissimè his discedunt, quibus citissimæ fiunt suppurationes & citissimæ

Tertius,
quartus,
quintusq;
dies repositio-
nem nō
admittit.

& citissimæ ac optimæ carnis productiones. Subnascentes D enim iuxta læsam partē carnes, plerunque ossa ipsa eleuant. Totum tamen ossis circulus, si in quadraginta diebus discesse rit bene discedet. Quædam enim ad sexaginta dies perueniunt. Nā & rariora ossa citius discedunt, solidiora verò tardius. Alia autē minora: multo minore temporis spacio, alia aliter. Cæterum os extra eminens his de causis præsecare oportet, si reponi nō possit, & si nūm absit vt reponi posse videatur, & fieri poterit vt auferatur, & si noxium fuerit, & de carnibus quid rumpat, & sensus molestiam exhibeat. Sed & si nudum fuerit, tale auferre oportet. Reliqua siue præseces, siue non præseces, non multum refert. Hoc enim certo scire expedit, quòd ossa quæ carnibus perfectè priuantur, ac exa- E rescunt, omnia penitus discedent. A quibus verò squamæ discessuræ sunt, ea præsecare non oportet. Coniecturam verò eorū quæ discedent, ex constitutis signis facere oportet. Curare autem tales spleniis & vinosa curatione, velut etiā prius de discessuris ossibus scriptum est. Sed cauere decet ne primo tempore frigidis madesiant. Rigorū enim febrilium periculum est. Periculū item cōuulsionum. Frigida enim semper conuulsionem prouocant quandoque verò etiam vlcera. Nosse quoque id conuenit, necesse esse ibi corpora breuiora fieri, vbi ossa fracta ac immutata curātur, & quibus totus ossis circulus discessit. At verò quibus femoris aut brachij os extra eminet, hi non valde superstites euadunt. Nam F & ossa magna sunt, & multū medullæ habent: & quæ si mulvulnerantur, multa sunt & magni momenti, & nerui, & musculi & venæ. Et si quidem reposueris, conuulsionem accedere solent. Si verò non reposita fuerint, febres acutæ, & biliofa, & singultuosæ oboriuntur, & denigrātur. Non minus autem superstites euadunt hi, quibus reposita non sunt, neque tentatum est vt reponeretur. Adhuc verò magis euadunt, quibus inferna ossis pars eminet extra, quàm quibus superna. Euadunt etiā quibus reposita fuerint, attamen raro. Nam & curationes à curationibus multū differunt, & naturæ corporum à naturis, ad facile tolerādum. Multum etiam differt an in interna brachij ac femoris partē ossa extra promineāt. Multæ enim & periculosa venarum extensiones in interna parte sunt, quarum aliquæ si vulnerentur, lethales sunt. Sunt
autem

A autem & in externa parte, verū minus. In talibus igitur vulneribus, qualia pericula immineant, ignorare nō oportet, & ad temporum occasiones prædicere. Si verò reponere hæc ossa cogaris, & reponendi aliqua tibi spes sit, & non multa ossis immutatio fuerit, & masculi non cōcurrerint: solent enim concurrere: vectis mollitio etiam his cum extensione, opem bene ferre poterit. Vbi verò reponis, veratrum molle bibendū dare oportet eadem die, si eadem die reposita fuerint. Sin minus, ne aggredi quidem oportet. Verū vlcus curare oportet velut in capitis ossibus fractis, & frigidi nihil adhibere, & cibos penitus auferre. & si quidē amara bile præditus natura fuerit, fauorum cremorem odoratū coctū, aut acetum mulsum dulce, in aquam instillato, eoque pro victu vtatur. Si verò amara bile præditus nō sit, aquæ potione vtatur. Et si quidem continua febre laborarit, ad quatuordecim dies vt minimū hoc victu degat. Si verò sine febre sit, septē diebus, Postea sensim progressu fiente secūdam rationem ad vulgarem victum adducatur. Et quibus ossa nō reposita fuerint, eandem itidem medicamēti purgationem facere oportet, & vlcus curationem, eundem item exhibere victum: & dependentem de corpore partem non extendere, sed magis adducere, quo laxior sit pars circa vlcus. At ossiū discessus diuturnus est, velut etiam prius dictum est. maximè verò talia fugere oportet, si modo quis honestam fugam habeat.

C Nam & spes pauca sunt, & pericula multa. & si quis non reponat, artis expertus esse videri poterit: & si reponat, propinquius ad mortem quā ad salutem perduxerit. **Cæterum** Luxatum
genu facile
reponitur. luxationes & emotiones ossiū circa genua, multo mitiores sunt emotionibus ac luxationibus circa cubiti flexurā. Nam femoris articulus pro magnitudine expeditior est quā brachij, & iustam naturam solum habet, eāq; rotundam. Brachij verò articulus & magnus est, & sinus plures habet. Tibiæ &
cubiti ossa
qualia. Ad hæc verò, tibiæ ossa longitudine inter se similia sunt, & externum os paululum, ne memorabili quidem modo excedit, nullum magnum impedimentū asserens, à quo externus tendo circa poplitem enascitur. At cubiti ossa inæqualia sunt, & quod breuius est, multò crassius est: quod verò tenuius est, multum superat & excedit articulū. Dependet tamen & hoc ex neruis, iuxta communem ossium cōnexionem. **Maiorem autem**

Cubiti re-
aptatio.

autem partem connexionis neruorū in brachio os tenue ha- D
bet, quā crassum. Horum itaque articularum & ossiū fle-
xuræ cubiti natura huiusmodi est, & propter naturæ modū,
ossa circa genu sæpe quidem luxantur, facile autē rursus in-
cidunt ac reponuntur. Inflammatio verò nō magna accedit,
neque vinculum articuli. Luxantur autem plerunque in in-
ternam partem, aliquando etiam ad externam, quandoque
etiam ad poplitem. Horum omnium repositiones non sunt
difficiles. Verū si quidem foras aut intro luxentur, hominē
in humili aliquo sedili sedere oportet, ita vt crus altiū, non
tamen multò habeat. Extensio autem plerunque moderata
sufficit, ita vt ab altera parte tibia, ab altera femur in diuer- E
sum extendatur. At ossa circa cubiti flexurā molestiora sunt,
quā quæ circa genu sunt, & difficilius reponi possunt, etiā
ob inflammationē, si quis non statim reponat. Luxantur qui-
dem minus quā illa, verū difficilius reponuntur ac co-
aptantur, insupérq; inflammātur, ac callum acquirunt. Sunt
autem & horum plerunque parux inclinationes, aliquando
ad partem ad costas, aliquādo ad externam, non vt totus ar-
ticulus sit emotus, sed manet quid iuxta ossis brachij cauita-
tem, qua parte cubiti os excedēs habet. Talia igitur siue hac,
siue illac luxentur, facile est reponere: & sufficit extensio in
directum fiens, secundum brachij rectitudinem, ita vt alter
iuxta manus iuncturam extendat, alter locū sub alis ample-
ctatur: Medicus verò altera manu ad emotum articulū ad- F
mota, volis impellat, altera propè ad articulū iniecta retru-
dat. Obediunt autem tales luxationes, & non tardè reponun-
tur, si quis antea quā inflammentur, reponat. Luxantur au-
tem plerunque magis ad internam partem: luxantur etiā ad
externam. Innotescit id ex figura: & talia sæpè etiam absque
vehementi tensione rursus incidunt. Oportet autem in his
quæ intro luxātur, articulum quidem ad naturam suam re-
pellere, cubitum verò magis in pronam partem vergentem
circūducere. Et plerūque sanè cubiti luxationes huiusmo-
di sunt. Si verò trāsgressus fuerit articulus, aut hac, aut illac,
supra cubiti os, quod ad brachij cauitatē excedit: fit quidem
raro hoc, si verò fiat, non ampliū similiter extensio in dire-
ctum fiens, talibus luxationibus idonea est. In tali enim ex-
tensione, os à cubito excedens, brachij transgressionem pro-
hibet,

A libet. Oportet itaque sic emotis extensionē tali facere, qualis prius descripta est, ubi quis ossa brachij fracta deligat, ut ab alia quidem in supernam partem tensio fiat, ab ipsa verò cubiti flexura, ad infernam cogatur. Sic enim brachium supra suum sinum maximè eleuabitur. Si verò eleuatū fuerit, facilis est restitutio cum volis manū, ita ut emotā quidem brachij partem apprehendentes impellamus, os verò cubiti iuxta articulum retrudamus, vtraq; eodem modo, minus tamen. Atque talis extensio huiusmodi luxationis iustissima est. Poterit etiam reponi per extensionem in directū, verū minus, quā hoc modo. At si in anteriorem partem brachiū luxetur: rarissimè autem hoc contingit. Sed quid repentina

Brachium
antrorsum
luxatum
quale.

B eluctatio nō eiecerit? Multa enim etiā prater naturā suam excidūt, etiam si magnum quid sit quod prohibeat. Huic autem eluctationi magnū quoddam obstaculum est, & os crassius quod superexcedit, & multa nervorum extensio: attamen quidam sanè eluctantur. Signū autē his qui ita eluctati sunt. Nihil enim de cubito flectere possunt. Manifestus est etiam articulus ad contactum. Si quidem igitur non statim repositus fuerit, vehementes ac violentæ inflammationes, itēque febriles fiunt. Si verò statim quis occurrat, facile reponi potest. Oportet autem linteum durum conuolutum (suffecerit nō magnum) imponere obliquum in cubiti flexuram, & de repente cubitum inflectere, & manū quā maximè ad humerum adducere. Sufficiens igitur fuerit hæc repositio his

C qui ita eluctati sunt. Sed & extensio in directum, hunc repositionis modum coaptare potest: volis tamen manus in eminentem brachij partem iniectis, iuxta flexuram retro impellere oportet, ita ut aliquis infernè iisdem in cubiti gibbū iniectis, ad cubiti rectitudinem retrudat. Efficax est etiam in hoc luxationis modo illa extensio quæ prius scripta est, quomodo ossa brachij fracta extendere oportet, ubi sunt deliganda. Postquam verò extenta fuerint, sic cū manum volis iniectis coaptationes facere, velut etiam prius scriptū est.

Cæterū si in posteriorem partem brachium exciderit, rarò autē hoc contingit, hæc luxatio omnium maximè dolorosa existit, & febres continuas meracæ bilis paucorum dierum ac maximè lethales inducit: & tales extendere brachiū non possunt. Si igitur statim affueris, extēto cubiti gibbo cogere

Brachium
retrorsum
luxatum.

gere oportet, & sponte incidit. Si verò febris præuenerit, non D
 amplius reponere oportet. dolor enim in cogendo augefcet,
 Vt autem in summa dicam, neq; alium articulum febrienti
 reponere oportet, minimè verò cubiti gibbum. Sunt autē &
 aliæ læsiones ac molestiæ circa cubiti gibbum. Hoc enim os
 crassius, si quando ab altero emotum est, neque flecti, neque
 extendi similiter potest. Manifestum autem fit ex contractu,
 iuxta cubiti flexuram, circa venæ discissionem supra muscu-
 lum tendentem. Quibus autem tale accidit, his non amplius
 facile est ad suam naturā reducere. Neq; enim aliam vllam
 communem duorum ossium connexionem emotam, ad pri-
 stinam naturam collocare facile est: sed necesse est tumorē E
 habere ipsam disparationem. Quomodo verò deligare opor-
 tet in articulo, dictum est in deligatione circa malleolum.
 Quibusdam autem os cubiti brachio subiectum frangitur,
 quandoque quidem cartilaginosa ipsius pars, ex quo tendo
 retrò brachiū enascitur, & vbi hæc emota fuerit, febrile est
 ac malignum. Articulus tamen manet in suo loco, æqualiter
 enim basis ipsius hac parte excedit. Quum autem abductus
 Caput bra- fuerit ea parte qua caput brachij excidit, vagabundus magis
 chij fractū. fit articulus, quàm si penitus sit abruptus. Nam vt in summa
 dicam, omnia ossa quæ franguntur, minus noxia sunt, quàm si
 ossa quidem non franguntur, venæ autem & nerui alicuius
 momenti in his locis contendantur. Vicinius enim ad mor-
 tem accedunt hæc quàm illa, si febris cōtinua accefferit. Pau- F
 ca tamen tales fracturæ fiunt: quandoque verò hoc brachij
 caput iuxta appendicem frangitur, atq; hoc quum videatur
 multò magis noxiū esse, lōgè mitius noxis circa cubiti gib-
 bum contingentibus existit. Quomodo igitur singulas lu-
 xationes reponere, & præsertim curare oportet, scriptū est:
 & q̄ statim reponere articulum maximè confert, propter ce-
 leritatem inflammationis neruorū. Nam etiam si elapsa sta-
 tim reposita fuerint, similiter tamen nerui distentionem fa-
 cere solent, & ad tempus aliquod tum extensionem, quam fa-
 cere solent, tum influxionem impedire. Confert autem om-
 nia hæc similiter curare, & quæ franguntur, & quæ disparan-
 tur, & quæ luxantur. Omnia enim multis linteis, & spleniis,
 & cerato curare oportet, velut etiam alias fracturas. At figu-
 ram cubiti gibbi in his etiam omnino talem facere oportet,
 qualem

A qualem in his quibus brachium fractum, & cubitus deligabatur. Communissima enim omnibus luxationibus, & emotionibus, & fracturis, hæc figura est. Communissima item ad distentionem postea fiendam, & ad singula extendenda, ac inflectenda. Hinc enim viæ sunt ad utrasque partes consimiles. Commodissima est etiam hæc figura ipsi agroto, ut ipsum & gestet, & appensum excipiat. His adde si à callo apprehensus fuerit, si quidem extenta manus apprehendatur, melius fuerit si non adlit: multis enim impedimento erit, paucis adiuumento. Si verò inflexa, magis quidem comoda fuerit. Verum longè commodior, si mediam figuram obtinens callo apprehendatur: & hæc quidem de figura. Deligare verò oportet, primum lintei initio super ipsam læsam partem iniecto,

B siue fracta fuerit, siue emota, siue disparata, primas etiam obvolutiones super ipsam facere, ita ut maximè hac parte inniantur, minus verò hinc atque illinc. Deligationem autem communem facere oportet, & cubiti & brachij, utriusque multò plus quàm plerique faciunt, quo quàm remotissimè à læsa parte tumor hinc atque illinc exprimatur. Circundetur insuper etiam acuta cubiti pars, siue læsio in hac fuerit, siue nò, ut ne tumor ibi circa ipsam colligatur. Fugiendum verò est in deligatione, quantum eius fieri potest, ut ne circa flexuram multa lintea coaceruata sint. Compresio autem quàm maximè circa læsam partem facienda est. Sed & reliqua compressio ac laxatio eadem adhibeatur, & iisdem temporibus singula quemadmodum in ossium fractorum curatione antea scriptum est. Et religationes postea per diem tertium fiant. Videatur autem laxa esse deligatio tertia die velut etiam tunc. Et ferulæ conueniente tempore adhibeantur. Neque enim alienum hoc est, & in his quibus ossa fracta, & quibus nò fracta sunt, si non febriant. Sint autem quàm laxissimæ partim à brachio extentæ, partim ad cubitum positæ: & nò sint crassæ. Necesse est etiam inequales ipsas esse inter se, ut vicissim permutentur qua par parte conducit, coniectura iuxta inflexionem fiende. Quin & spleniorum appositionem eiusmodi facere oportet, velut de ferulis dictum est, ita tamen ut paulò tumidiora super læsam partem apponantur. Tempora verò ab inflammatione, & ab his quæ prius scripta sunt, coniectare oportet.

Ferulæ quales in his ponendæ.

*42^{ca}
16^{lib}
26^{lib}
Hipp. lib.*

HIPPOCRATIS^D

COI LIBER DE AR-

TICVLIS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

Humerorū
luxatio.



Vmeri verò articulum vno modo luxari
nouī, ad locum sub alis. Sursum autem nun-
quam, neque ad externam partem. Non
tamen affirmauerim an luxetur, aut non,
etiamsi habeam quod dicam de ipso. Sed
neque in anteriorem partem vnquam vidi,
neque videtur mihi vnquam excidisse. Medicis tamen vide-
tur valde in anteriorem partem luxari, & maximè decipiun-
tur in his, quorum carnes tabes circa articulum & brachiū
occupauit. Apparet enim in talibus caput brachij omnino in
anteriorem partem eminens. Atque ego tale aliquando non
excidisse asserens, ob hanc rem apud medicos & vulgus ma-
lè audiui. Solus enim ipsis ignorare videbar, alij verò omnes
cognoscere. Nec potui ipsis persuadere, nisi admodum diffi-
culter, rem ita se habere. Si quis in brachio supernam hume-
ri partem carnibus denudarit, denudarit autem qua parte
musculus sursum tendit. Nudarit autem tendinem, qui sub
alis, & iuxta clauiculam ad pectus est: apparuerit vtique ca-
put brachij in anteriorem partem vehementer eminens,
etiamsi non sit elapsum. A natura enim prouultum est brachij
caput in anteriorem partem, reliquum autem brachij os, ad
externam partem incuruum. Conuersatur autem brachium
cum scapulæ cavitatē obliquū, quum iuxta costas fuerit por-
rectum. Quum verò ad anteriore partē extensa fuerit tota
manus, tūc brachij caput ē directo est in scapulæ cavitatē, &
non amplius in anteriorem partem eminere conspicitur. Ve-
rū de quo nunc est sermo, nunquā vidi in anteriorem par-
tem elapsum: non tamen affirmarim ne de hoc quidē, an ita
excidat, necne. Quum igitur exciderit brachiū ad locum sub
alis, multi reponere nouerunt, utpote quòd multis elabatur.
Erud

- A** Eruditi autem est omnes modos nosse, quibus medici id reponunt, & quo modo quis his modis quam optimè vtatur. Optimo verò horum modorum vti oportet, si fortissimam necessitatem videris. Optimus autem est qui postremus describetur. Quibuscunq; igitur frequenter humerus excidit, hi plerunque ipsi sibi ipsis ad reponendum sufficientes sunt. Immissis enim alterius manus digitis ac nodis in locum subalarem, articulum sursum cogunt, cubiti verò gibbum ad pectus adducunt. Eodem etiam modo medicus reponet, si ipse quidem sub alam, articulo magis intro elapso, subtentis digitis à costis diducat, ita vt capite suo in summum humerum iniecto, renitendi gratia, genibus verò iuxta cubiti gibbum ad brachium admotis, ad costas retrudat. Conducit autem eum qui reponit fortes manus habere: aut ipse quidem manibus & capite ita faciat, alius verò quidam cubiti gibbum ad pectus adducat. Est autem & humeri repositio, vt cubitus retrorsum ad spinam subducatur, deinde altera manu in summam gibbi cubiti partem iniecta retortio fiat, altera verò iuxta articulum retro innitatur. Hæc repositio, & ea quæ prius dicta est, quum non sint secundum naturam, tamē articulum circumagitantē incidere cogunt. Qui verò calcaneo reponere conatur, propinquum quid ei quod est secundum naturam cogunt. Oportet autem hominem humi supinum reclinare, eum verò qui reponit humi sedere qua parte articulus excidit. Deinde apprehensam manum læsam, cum suis manibus extendere, calcaneo verò in subalare locum iniecto, dextro in dextrum, sinistro in sinistrum, retrudere. Oportet autem in cavitatem sub ala rotundum quid congruens indere, commodissime verò fuerint pilæ valde parvæ ac duræ, quales multæ ex coriis consuuntur. Si enim non eiusmodi quid inditum fuerit, calcaneum ad brachij caput peruenire non potest. Dum enim manus extenditur, locus sub ala cauatur. Tendines enim qui hinc atq; illinc locum sub ala constringunt, contrarij sunt. Oportet autem aliquem ab altera parte eius qui extenditur confidentem, sanum humerum continere, vt ne corpus circumtrahatur, dum læsa manus in alteram partem extenditur. Postea ubi pila sub alam subdita fuerit, molle lorum sufficiens latitudine præditum circum pilam circumdare oportet, ita vt quidem eo loco ex vtrisque initiis appreheso sursum retrahat, à capite eius qui extenditur confidens

Humeri laxati repositio.

Alia repositio.

Alia repositio.

fidens, & pede ad summi humeri os innitēs. Pila verò quàm D
penitissimè & maximè intus ad costas sita sit, & non ad brachij caput. Est & alia repositio, quum humerum alter subdit. Maiorem tamen esse oportet eum qui humerum supponit, ita vt apprehēsa manu humerum suum acuminatū sub illius luxati alam supponat & deinde aliquantum verset, vt velut sedi insideat, ea coniectura facta, vt homo ille circa humerum suum ex ala pēdeat, ipse verò seipsum in hūc humerum altiorē faciat quàm in alterum, brachiū autem pendens ad pectus suum quàm citissimè cogendo adducat. In hac verò figura insuper concutiat vbi hominē sustulerit, quo reliquum corpus in aduersam partem brachio quod cōtinetur vergat. Si verò valde levis fuerit homo, puer aliquis levis insuper ex ipso retrorsum dependeat. Atque hæc omnes repositiones in palæstra vsitatae sunt eo quòd non opus habēt aliorum instrumentorū importatione. Poterit tamē quis etiam

Alij repositionis modi.

alibi his vti. Sed & qui circum pistillum cogunt, propemodum secundum naturam reponunt. Oportet autem pistillū molli quadam fascia esse inuolutū: minus enim ita labarit: & inter costas ac brachij caput subter intrusum, & si quidem breue fuerit pistillū, collocare hominē in sedili aliquo oportet, quo vix brachium circum pistillum circūdare possit. Sit autem potius longū pistillum, quo homo stans fermè circū pistillum dependeat. Postea brachiū quidem & cubitus circa pistillum porrigantur, ab altera verò corporis parte, quis manibus circa ceruicē ad clauiculam circumiectis deorsum F

Repositio per scalam,

cogat. Hæc repositio moderatè secundum naturā est, & repositionem facere potest, si probè ipsam tractent. Quin & per scalam alia quædā huiusmodi repositio fieri potest, & adhuc melior, eo quòd corpus hinc atque illinc eleuatum, securius librando adæquari potest. Nam circum pistillū etiam si humerus fixus maneat, periculum tamen est ne corpus hac aut illac circūagatur. Oportet tamē & super scalā supernè rotundum quid deligatum esse, quod ad loci sub ala cavitatem congruum sit, & quod brachij caput ad naturam redire insuper cogat. Optima verò ex omnibus repositionibus talis est. Lignum esse oportet latitudine quidē quinque aut quatuor in totum digitorum, crassitudine verò duorum digitorum, aut etiam tenuius, longitudine autem bicubitali, aut paulò breuius.

Repositio optima.

A breuius. Sit autem altera parte summa rotundū, & angustissimum ac tenuissimum hac parte, habeatq; crepidinem paululum supereminentē, in extrema rotunditatis parte, sed nō ea quæ ad costas, verū ea quæ ad brachij caput existit, quo sub alam congrua sit, iuxta costas sub brachij caput subdita. Linteo autem vel fascia molli, lignū summa parte obuoluetur, quo leuius reddatur. Deinde subdito ligni capite quā penitissimē sub alam, inter costas ac brachij caput, totam manum ad lignum porrectam alligare oportet, iuxta brachiū, iuxta cubitum, & iuxta manus iuncturam, quo quā maximē sit quieta. præ omnibus autē curandum est, vt summa ligni pars, quā penitissimē intra subalarē locum recipiatur, brachij caput trāsgressa. Postea inter duas columnas trabē transversam probē alligare oportet, & deinde manum cum ligno supra trabē transmittere, quo manus ab altera parte sit, corpus ab altera, trabs verō sub ala, & postea ad alteram partē manum deorsum cogere vnā cum ligno, circum trabē: ad alteram verō reliquum corpus. Trabs autem ea altitudine alligetur, vt reliquum corpus eleuatum summis pedum digitis innitatur. Hic modus repositionis humeri lōgē optimus est. Iustissimē enim commotionem facit, si solū penitius intus ad brachij caput lignum fuerit. Iustissimæ item sunt in vtrāque partem adæquationem facientes librationes, & ad hæc ossi brachij securæ. Recentes itaque luxationes citius incidunt, quā quis putare possit, & priusquam extentæ esse videantur. Sed & veteres sola hæc repositio reponere potest, si non iam ob vetustatem, caro quidem in acetabulū deuenit, caput autem brachij in loco ad quem declinauit, semitā sibi ipsi iam fecit. Veruntamē etiam ita inueteratum brachij elapsū, mihi posse reponere videtur. Quid enim iusta molitio nō nouerit: manere tamen in loco posse, nō ita mihi videtur sed prout conuenit rursus luxabitur. Idem facit etiam si circum scalam, eodem modo velut dixi præparatam coactio transmissi brachij fiat. Abundē item sufficit circum magnam sedem Thessalicam coactionem facere, si recens fuerit luxatio. Præparatum autem esse oportet lignum, velut dictum est: hominem verō locare oportet in sede obliquum, deinde brachium vnā cum ligno supra sedis reclinatorium transmittere, & ad alteram partem corpus deorsum

Quæ in his
perpenden-
da.

cogere, ad alteram brachium cum ligno. Idem quoque fa- D
cit coactio supra biforem ianuam. His autem quæ forte præ
sentia fuerint vtendum est. Nosse igitur expedit, quòd na-
turæ à naturis multum differunt, ad hoc vt elabentia faci-
le rursus incidant: differt etiam acetabulum ab acetabulo,
quum aliud facile transcendendi possit, aliud minus. Plurimum
item differt neruorum ligamentum, quum in quibusdam re-
missum sit, in quibusdam intentum. Nam humiditas homi-
nibus fit ex articulis, propter neruorum connexionem, si la-
xa fuerit, & intensiones facile ferat. Multos enim videas qui
adeò humidi sunt, vt quando velint, articuli ipsis citra dolo-
rem excidunt, & absque dolore restituantur. Differt etiam
habitus quidam corporis. Nam his quibus bene se habet E
membrum, & carnosius, & minus excidit, & difficilius inci-
dit. Vbi verò ipsi seipsis tenuiores & magis excarnes fuerunt,

Exemplo
comprobat

tunc & magis excidit, & facilius incidit. Argumentum au-
tem quòd hæc ita se habeant, hoc est. Bobus enim tunc ma-
gis femora excidunt ex acetabulo, quum tenuissimi existunt.
Fiunt autem tenuissimi boues ad finem hyemis. Tunc igitur
etiam maximè luxantur: si tamen & huiusmodi quiddam
in medicina scribere conuenit. Verum conuenit utique. Be-
ne enim Homerus didicit, quòd ex omnibus pecudibus bo-
ues quàm maximè laborēt hoc tempore, & ex bobus potissi-
mum aratores, eo quòd hyeme operentur. His itaque maxi-
mè excidunt articuli. Hi enim maximè attenuantur. Nam
reliqua quidem pecora breuem herbam depasci possunt, F
Bos autem non ita valde priusquam alta fiat. Reliquis enim
tenuis est labri prominentia, & tenuis item superna maxil-
la. Boui verò crassa est labij prominentia, crassa ita & obtu-
sa superna maxilla. Quapropter in breues herbas subiicere
non potest. Rursus solipeda animalia vtpote vtrinque denta-
ta, & dentes inter se committere possunt, & sub breuem her-
bam dentes subiicere queunt, delectanturque tali herba ma-
gis quàm alta. Breuis enim herba in totum melior ac solidior
est quàm alta, adde quòd alta etiam prius fructum effert. Ob
hoc igitur ita cecinit,

Herba bre-
uis melior
pecoribus.

*Haud secus ac bobus nigris gratissima veris
Tempora proueniunt.*

quia

A quia gratissima apparet ipsis alta herba. Sed & aliàs bos laxū habet hunc articulū. magis quàm alia animalia: & ob id etiā magis quàm alia pedē trahit, & maximè quum macilentus est, & iam senex. Propter omnia hæc etiā maximè boui excidit. Plura autē de ipso à me scripta sunt, eo quòd omniū antea relatorum testimonia hæc sunt. Verūm de quo nunc sermo est, excarnib. magis excidit, sicut etiā citius incidit, quàm probè carnosīs: & humidis ac excarnibus minus inflammatur, quàm siccis ac carnosīs: & in posterum tempus quoq; minus vincitur: sed & mucus amplior moderato subest, si non adsit inflāmatio, & sic sanè lubricus fuerit. Mucosiores enim omnino sunt articuli excarnibus quàm carnosīs. Nam &

B ipsæ carnes eorum qui nō rectè ex arte fame macerati sunt, in macilentis mucosiores sunt, quàm in crassis. Quibus tamen cum inflammatione mucus subest, his inflāmatio vinculo facto articulum cōtinet: & ob id hi qui submucosī sunt articuli non valdè excidunt, & exciderent vtique si non plus aut minus inflammationis accessisset. Quibus igitur quum articulus excidit, circumlitæ partes non inflammantur, & statim citra dolorem humero vtī possunt, hi putant quidē nihil opus esse vt sui ipsorum curā gerant, medici tamē est vt contra tales vaticinetur: talibus excidit rursus magis quàm his quibus nerui sunt inflāmati. Atque hæc res in omnibus in homine ita habet, & maximè circa humerum & genu. Maximè igitur etiam hæc excidunt. Quibus autem nerui inflāmati sunt, hi humero vtī nō possunt. Prohibet enim dolor & inflāmationis distentio. Tales igitur curare oportet cerato, & spleniis, & linteis multis deligando. Sub alam verò lanam mollem pura conuolutam subiicere oportet, ad cavitatē explendam, quo fulcimentū quidem sit deligationi, articulum verò sustentet. At brachium plerunq; sursum vergens tenere oportet. Sic enim procul fuerit humeri caput à loco, in quem excidit. Oportet autē postquam humerum deligaueris, brachium ad costas adalligare, fascia quadam in orbem circum corpus obducta. Fricare quoq; humerum oportet placidè & accuratè. Multarum autē rerum peritum medicū esse expedit, & non minus frictiois. Ex eodē enim nomine, non idem euētus subsequitur. Nam & vincere potest frictio articulum iusto laxiorē, & soluere articulū iusto duriorē. Verūm de fri-

Curatio
horum.

Brachium
an excide-
rit, signum.

Etione in alio opere à nobis tractabitur. Talem igitur hume-
rum mollibus manibus fricare cōuenit, cōfert enim, & aliàs
leniter. Articulū autē commouere non violenter, sed intan-
tum vt circa dolorem cōmoueatur. Restituūtur verò omnes
articuli partim longiore, partim breuiore tēpore. An autem
brachium exciderit, his signis cognoscere oportet. Nam vbi
iustū corpus habent homines, manus itē ac crura, sano in exē-
plum vti oportet, ad non sanum: & non sano ad sanum, non
alienos articulos inspiciendo, (alij enim aliis magis extanti-
bus sunt articulis) sed ipsos eius qui affectus est, an dissimilis
sit sanus ægroto, & hoc rectē quidē dictum est, multā tamen
erroneam intelligentiam talia habent: & non satis est solum
sermonis doctrina artem hanc nosse, sed conuersatione etiā
versare oportet. Multa enim præ dolore, aut ex alia causa, E
quā non exciderint ipsis articuli, tamē nō possunt in similes
figuras restitui, in quales sanum corpus figuratur. Proinde &
talem figuram insuper intelligere ac cōsiderare oportet. Sed
& in loco sub ala, caput brachij multo magis incumbere vi-
detur, in luxato quā in sano. Quin & supernē iuxta super-
nam humeri partem, cauus apparet locus: & summi humeri
os extans conspicitur, vtpote articulo ad infernum locum di-
gresso, & est etiam aliqua erronea in hoc intelligentia, sed
postea de ipso scribetur. Est enim dignum de quo scribatur.
Præterea in luxato cubiti gibbus magis à costis distare, vide-
tur quā in altero. Si tamē quis vim afferens cogat, adduci-
tur quidē, sed cū dolore. Sed & sursum ad aurē manum attol-
lere cubiti gibbo extento, non valde potest, velut sanam: ne- F
que hac & illac similiter diducere. Hac igitur signa sunt hu-
meri luxati, repositiones item præscriptæ & curationes hæ-
sunt. Operæ precii verò est discere, quomodo frequenter ex-
cidentes humeros curare oporteat. Multi enim à certamini-
bus iam prohibiti sunt, ob hanc calamitatem, quum aliàs pe-
nitus fuerint inculpabiles. Multi etiam ad res bellicas inuti-
les fuerunt, & ob hanc calamitatem perierunt. Sed & pro-
pterea res digna est quæ discatur, quòd nullum nouerim qui
rectē medeatur, sed alios ne aggredi quidem sciam, alios cō-
tra quā conducit & sentire, & facere. Multi enim medici
humeros luxatos vsserunt, & iuxta supernam humeri partē,
& iuxta anteriore, qua parte caput brachij extuberat, & iu-
xta

Axta posteriorem paululum retro supernam partem. Hæ igitur vstiones, si quidem sursum brachiū excidisset, aut in anteriorem aut posteriorem partem, rectè inusta essent. Nunc verò quū deorsum excidit. eiiciunt magis hæ vstiones quàm impediunt. A superna etiam spacij amplitudine caput brachij excludunt. Verūm hæc ita vrere oportet. Cutem sub ala digitis apprehensam attrahere oportet, secundum ipsam maximè rectitudinem, secundum quam brachij caput excidit. Deinde ita attractam cutem in vltioriē partem perurere. Ferramentis autem talia vrere oportet non crassis, neq; valde caluis, sed oblongis. Citius enim penetrant, & manu firmata transigi possunt, pellucidis item his vrere oportet, quò quàm celerrimè pro viribus penetrrent. Nam crassa tardè penetrantia, latiores crustarum elapsiones faciunt, & periculū est ne cicatrices rumpantur, & nihilo quidem deterius hoc esset, verūm turpius & ab arte alienius. Postquam autē in vltiorem partem perusseris, in plurimis satis est vt infernæ parti soli has crustas inuras. Quòd si periculum esse non videatur ne cicatrices rumpantur, sed multum spacij interpositum sit, tenue quoddā specillum per inusta foramina traicere oportet, cute adhuc attracta. Neque enim aliàs traicere possis. Vbi verò traieceris, cutem dimittere. Postea inter crustas aliam crustā tenui ferramēto infligere ac inurere, donec specillum contingas. Quantū verò de cute sub ala apprehendere oportet, hinc coniectare licet. Glandulæ sub ala sunt sicut etiā in aliis corporis partibus. Verūm in alio libro de tota glandularum natura scribetur, quòd sint, & qualia in quilibet significant ac possunt: glandulas igitur simul apprehendere non oportet, neque ea quæ glandulis sunt interiora. Magnum enim afferunt periculum. Sunt enim nervis maximi momēti vicina. Quantū verò extra glandulas est, eius quàm plurimam partem apprehendere oportet. Nihil enim periculi est. Nosse tamē hoc expedit, quòd si fortiter brachium extenderis, nihil cutis sub ala apprehendere poteris, quòd sanè attractu memorabile sit. Distrahitur enim in extēsiōne. Nec verò nervos vlla machina vulnerare oportet. Hi enim prompti expositi sunt ac extenti in hac figura. Si verò parum brachium eleuaris, multum quidē cutis apprehendes: Nerui verò quorum curam gerere oportet, intus vltra apprehensionē

Excidentes
humeri qui
vrantur.

Ferramēta
qualia ad
hūc vsum.

Glandulæ
periculoſæ.

Nerui non
lādendi.

O o s confi

consistent. Nōne igitur in omni arte pro omnibus curan- dum est, vt in singulis figura iuste inueniantur. Atq; hac qui- dem de loco sub ala, & sufficiunt hæ apprehensiones, si cru- stæ rectè fuerint iustæ. Extra verò alam duo solū loci sunt, vbi quis crustas inurere queat huic affectioni auxiliantes. Vnam in anteriore parte, inter brachij caput, & tendinem iu- xta alam. Et hac quidem parte cutem penitus perurere oportet, sed non altius. Vena enim crassa propinqua est, & nerui, quorum neutra igne calfaciēda sunt. Retrorsum autem alte- ram crustam inurere licet, multum supra tendinē, qui est iu- xta alam, & paululum infra brachij caput. Et cutē quidē pe- nitus perurere oportet. Verū neq; hic valde altam crustam facere. Inimicus enim est ignis neruis. Curare igitur vlcera E per omnem curationem oportet, ita vt brachium nunquam vehementer extendas, sed moderatē, vlcerum saltem curan- dorū gratia. Minus enim ita perfrigerantur. Conducit enim omnes vstiones tegere, vt etiam leniter curentur, & minus disparentur, minūsq; sanguinis erūpat: & minus conuulsio accedat. Vbi verò pura facta fuerint vlcera, & ad cicatrices deuenerint, tunc sanē penitus brachium semper die ac nocte costis alligatū esse oportet. Sed & quū sana facta fuerint vlce- ra, similiter ad multum tempus, brachium ad costas alligan- dum est. Sic enim maximē cicatrix induci poterit, & spatij amplitudo intercipietur, in quam maximē luxatur brachiū. Quibuscunque verò humerus repositione fuerit destitutus, siquidē homines adhuc crescant, os brachij non similiter vt F sanum coangescit, sed augetur quidem, verū altero bre- uius aliquanto efficitur. Et qui mustelle cubito præditi sunt, paruūque ac macilentum brachium ex natiuitate habent, galeancones vocati, ob duplices has calamitates fiunt tales, rum si talis aliqua luxatio ipsos dum in vtero sunt corripue- rit, tum ob aliam calamitatem, de qua postea aliquando scri- betur. Quin & hi quibus dum adhuc infantes sunt, profun- da ac submersa suppurationes circa brachij caput sūt, om- nes galeancones efficiuntur: & siue secti fuerint, siue vsti, si- ue sua spōte ipsis eruperint, hac ita se habere nosse oportet. Qui tamen ex natiuitate galeancones sunt, etiam si manu po- tentissimē vti possint, tamen neque ipsi extento cubiti gib- bo, brachium ad aurem extendere ac eleuare possunt. Sed multo

Ignis inimi-
cus neruis.

Galeanco-
nes.

- A** multo minus hanc quā sanam manum. Quibus verò iam vi-
ris exciderit numerus, & repositus non fuerit, his superna hu-
meri pars magis excarnis efficitur, & habitus hac parte te-
nuis fit. Quum tamen dolor cessauerit, non omnia ea simili-
ter operari possunt, quæ eleuato cubiti gibbo à costis in obli-
quum operari oportet. Quæ verò transmoto brachio iuxta
costas, aut in anteriorem, aut in posteriorem partem operari
oportet, ea operari possunt. Nam & scobinam, & ferram tra-
here poterunt, securi item findere, & fodere, si non valde sur-
sum cubiti gibbum attollant, sed & alia iuxta tales figuras
operantur. At verò quibus summus humerus fuerit auulsus,
his os auulsum extra eminens apparet. Est autem hoc velut
B vinculum clauiculæ & scapulæ. Alia enim est hominis natu-
ra hac parte quā aliorum animalium. Medici igitur in hoc
vulnere maximè falluntur. Nam quū os auulsum emineat,
superna humeri pars humilis & caua apparet, vt etiam velut
humeri elapsi curam adhibeāt. Multos igitur noui medicos
aliās nō malos, qui grauitè afflixerunt, tales humores repo-
nere conantes, ita excidisse rati, & non prius desistunt ipsi exi-
stimare se humerum reponere, quā vel desperarint, vel
frustrati fuerint. His curatio quidem eadem quæ etiam a-
liis huiusmodi, ceratum, splenia, & lintea, & deligatio eius-
modi, deorsum tamen cogere os supereminens oportet, &
splenia super hoc ponere plurima, & hac parte maximè pre-
mere: & brachium ad costas adalligatum ad supernam par-
C tem tenere. Sic enim os auulsum maximè appropinquaret.
Hæc tamē probè nosse expedit, & velut certa prædicere, si a-
lioqui voles, quòd nullum detrimētum, neque paruum, neq;
magnum, humero contingit ex hoc vulnere. Sed locus tur-
pior euadit. Neq; enim hoc os in pristinam sedē similiter fir-
mari poterit, velut natura exigit, sed necesse est plus aut mi-
nus tumidum esse ad supernam partē. Neq; enim aliud vllū
os in eundē locum restituitur, quod cum alio osse cōmunio-
nem habet, & adhærens à veteri naturali sede auulsum fue-
rit. Paucis autem diebus summus humerus doloris exors fit,
si probè deligetur. Clauicula porrò fracta, si quidem peni-
tus caulatim hoc contigerit, curatu facilius est. Si verò oblō-
ge, difficilius sanatur: & contraria in his contingunt, aliter
quā quis putauerit. Nā quæ penitus caulatim fracta est, cogi
magis

Humerus
summus 2-
uulsus.

Curatio.

Clauicula
fracta.

magis poterit vt ad naturam redeat. Et si diligens cura adhi **D**
 beatur, parum quæ superior est, inferiorē fecerit figuris ido
 neis, & deligatione cōueniente. Si verò perfectē non firmata
 fuerit, attamen supereminens ossis pars non valde acuta fit.
 At quorū os in longitudinem fractum fuerit, his similis of
 fibus auulsis calamitas contingit, de quibus antea scriptum
 est. Neq; enim ipsum ad seipsum valde firmari solet. & sum
 ma ossis eminētis, valde acuta fit. In vniuersum igitur nosse
 expedit, quòd nullum detrimentū neque humero, neque re
 liquo corpori, ob clauiculæ fracturam accedit, si non insuper
 corruptio aliqua contingat. Raro autem hoc fit. Deformitas
 tamen circa clauiculæ fracturā accedit, primū turpissima,
 deinde verò minor fit. Coalescit autem clauicula cito, itē **E**
 que alia ossa laxa. Celere enim calli obductionem talia fa
 ciunt. Quū igitur recens fracta fuerit, vulnerati ad curatio
 nem festinant, maius malum esse putātes quā est, & medi
 ci quoque prompti sunt ad rectē curandum. Progressu verò
 temporis & vulnerati, vtpote qui neque dolent, neq; iter fa
 cere, neque cibum capere prohibentur, negligunt: & medici,
 vtpote qui suis sedibus restituere nō possunt, aufugiunt, ne
 que vulneratorum negligentiam a gre ferunt. In hoc autem
 calli obductio acceleratio. Deligatiōis verò modus plerisq;
 cōsimilis est, vt cerato & spleniis, & mollibus linteis curatio
 fiat. Insuper autem & hæc curatio, & hac animaduersio ha
 benda est, & præsertim in hac aggressione: q̃ plurima sple
 nia iuxta eminentem partem imponere oportet, & plurimis **F**
 deligationibus maximē circa hanc partē premere. Sunt au
 tem aliqui quibus cōplacuit plumbum graue insuper ad al
 ligare, vt supereminentem partem deorsum cogat. Fortassis
 autem neque intelligunt qui simpliciter deligant. Sed neq;
 hic modus ad clauiculam fractā pertinet. Neque enim fieri
 potest vt id quod eminet memorabili modo deprimat. Alij
 verò quidē sunt, qui quum cognouerint quòd hæ deligatio
 nes erroneæ sunt, & non secū dum naturam supereminentia
 deorsum cogunt: deligāt quidē ipsos spleniis & linteis vten
 tes, velut etiam alij. Verū cincto homine fascia quadam
 qua parte maximē cingi solet, postquā splenia supra eminen
 tes fracturas imposuerunt, ita vt isthic magna mole extube
 rent, tunc initium linteī ad cincturam ex anteriore parte al
 ligant,

Deligatio.

A ligant, atq; ita deligant in directum clauiculæ extendentes ac retrorsum ducentes, & isthic cincturæ circūdatum in anteriorem partem reducunt, & rursus in posteriorem. Aliqui verò non cincturæ linteum circundant, sed circum interfœmineum iuxta sedem, & per spinā linteum circūdantes, hoc modo fracturam comprimunt. Hæc itaq; si quis inexpertus audit, prope secundum naturam esse videntur, verum si quis vtatur inutilia existunt. Neq; enim stabilia sunt, etiam si decumbat quis, quamuis ita vel maximè stabilitas cōtingat: atamen si decumbens aut crus inflexerit, aut ipse se inclinet, omnia deligamēta mouebuntur: & alioqui noxia est hæc deligatio. Nam & sedes intercluditur, & lintea in hac angustia

B aceruata fiunt. & quæ rursus cingulo circundantur, non ita valida facta cinctura circundari possunt, vt non cingulū sursum ascendere cogant, neque ita necesse est omnia deligamenta laxari. Quam proximè verò quis rem conficere videri possit, etiam si non magna faciat, si quibusdam linteis cingulum circūdet, plurimis autem linteis priorem deligationem perficiat. Sic enim maximè stabiles fuerint deligationes & mutuam inter se opem tulerint. Plurima igitur ex his quæ cōtingunt his quibus clauicula fracta est relata sunt. Insuper autē & hoc adintelligere oportet, quòd clauicula plerunq; frangitur ita vt os quod à pectore est, ad supernā partem emineat: quod verò à summo humero est, in infernam partem subsidat. Causæ verò horū hæc sunt, quòd pectus neque multo inferius, neq; superius procedere potest. Nam articuli in pectore motus paruus est. Ipsum enim sibi ipsi, & spinæ, ex continuitate commissum est. Proximè quidem clauicula ad humeri articulum fluctuat. Cogitur enim frequentē motum habere, propter summi humeri connexionē, & alioqui vbi vulnerata est, ad supernam partem defugit ea pars quæ pectori adhæret, & non valde ad infernam partem cogi potest. Nā & à natura leuis est, & loci amplisudo ipsi supernè maior est, quàm infernè. At humerus, & brachium, & quæ his annexa sunt, à costis ac pectore facilè exolui possunt: & propterea multo superius ac inferius abduci queunt. Quum igitur fracta fuerit clauicula, os quod ad humerū est magis deorsum repit. Huc enim ipsum vnà cū humero & brachio defluere procliuius est quàm sursum ferri. Quū igitur hæc

ita

ita se habeant, imprudenter se gerunt qui supereminentem ossis partem deorsum cogere oportere putant. Nam infernam ad supernam adducendam esse manifestum est. Hæc enim motum habet. Hæc est quæ à natura discessit. Clarum itaque est aliter nullo modo ipsam cogi posse. deligationes enim nihilo magis appellant quam repellunt. Si verò quis brachium quam maximè ad costas admotum sursum cogat, ut quam acutissimus esse humerus videatur, perspicuum est quod sic adaptari poterit ad os quod à pectore est, unde est diuisa. Si quis igitur legitima deligatione utatur, celeris curationis gratia: & reliqua omnia frustra fieri putet, præter figuram relatam, is & rectè intellexerit, & celerrimè ac optimè curauerit.

Alia clauicula fractura.

Decumbere tamen hominem multum refert, & sufficiunt dies quatuordecim si quieverit, aut ad summum viginti. Si tamen contrario modo clauicula fracta fuerit, quod non valde contingit, ut os quod à pectore est subsidat, quod verò à summo humero est supereminet, alterique superstet: nulla magna curatione in his opus fuerit. Ipse enim humerus & brachium si demittatur, ossa inter se committere ac firmare potest, & vilis quæpiam deligatio suffecerit, & pauci dies satis erunt ad callum obducendum.

Alia.

Quod si hoc modo fracta non fuerit, sed in obliquum hæc vel illac luxata, ad naturam reducere oportebit, humero cum brachio sursum adducto, velut etiam ante dictum est. Quum autem ad pristinam naturam resederit, reliqua curatio velox erit. Pleraque igitur immutationes, ac luxationes, brachium si sursum cogatur corrigit. Quæcunque verò luxationes ex supernis oblique ad latus fiunt, aut deorsum, his correctio præparatur, si homo supinus decubuerit. iuxta medias autem scapulas aliquid altius superpositum fuerit, quo pectus maximè in utranque partem inflexum sit: & brachium adducat quis ad costas porrectum. Medicus autem altera manus vola in brachij caput iniecta retrudat, altera ossa fracta componat. Sic enim quam maximè ad naturam reduxerit. Verum quod iam dictum est, supernum os facile ad partem subsidere solet. Plerisque igitur ubi deligati fuerint, figura ipsa opitulatur, ita ut ad ipsas costas cubiti gibbum habentes, hoc modo humerum ad supernam partem cogit. Quibusdam verò humerum quidem sursum velut dictum est, cogere oportet: cubiti autem gibbum ad pectus adducere

A ducere: summam verò manum ad summum sanū humerum adhibere. Siquidem igitur decumbere sustinet, fulcimētum aliquod quod obfirmet apponere oportet quo humer⁹ quāmaximè supernè maneat. Si verò obambulare volet, fundā ex fascia factam, & acutæ gibbi cubiti parti circumdatam, de collo appensam gestare oportet. Cubiti porrò gibbi articulus vbi motus ac luxat⁹ est, ad costas, aut foras, acuta ipsius parte in brachij cavitatem manente, extensione in directum facta, id quod eminet retrorsum & in obliquum repellere oportet. Vbi verò perfectè excidit, aut hanc aut illam, extensio in qua brachium fractum deligatur requiritur. Ita enim incurua gibbi pars non impedit. Excidit aut maximè ad partem versus costas. Correctiones verò facere oportet quā plurimum abducendo, & ut ne brachij caput cornicem contingat, sublimem circumducere ac inflectere, & non in directum cogere, simul autem contraria in utranque partem detrudere, & in sedem compellere. Cōtulerit etiam in his gibbi cubiti inuersio, modò in supinā, modò in pronā partem. Curatio verò ex figura est, ut summam manum paulò altiorē cubiti gibbo habeant, brachiū verò ad costas. Sic etiam appenli exceptio, & positio, & gestandi facilitas, & natura, & vsus, in communi sunt, si modò non malè callus obducatur. Obducitur autem cito. Curatio fit linteis iuxta legem articulare, ita ut acuta eius pars insuper deligetur. Recrudescit autem maximè cubiti gibbus febribus, doloribus, nausea & vomitu meracæ bilis, præsertim si retrorsum luxat⁹ fuerit, ob torporē: deinde, si in anteriorem partem. Verū curatio eadem est. Repositio verò retrorsum luxati, ut extensum distendamus: Signū autem est, quòd extendere ipsum non possunt, sicut in anteriorem partem luxati, quòd inflectere nequeunt. Verū tunc durum quiddā inuolutum indere oportet, & circum hoc ab extensione derepentè inflectere. Disparationis autem ossium signum est manifestum ex contactu iuxta venam quæ in brachio finditur. At verò callus cito his obducitur. Ex natiuitate autem breuiora sunt ossa infra noxam. plurimū quæ proxima sunt, cubiti. deinde manus, postea digitorum. Verū brachium & humerus robustiora sūt. propter inuersionem. At altera manus propter opera adhuc fortior est. Imminutio verò carniū fit, si foras excidit, intrinsecus:

Cubiti luxatio.

Curatio.

secus, Sin minus, in contrarium ponit, excidit. Cubiti verò **D**
gibbus si intrò, aut extra exciderit, extensio fit in communi
figura cubiti ad brachiū: fascia enim sub alā data, ipsam ex-
ceptam suspendere oportet: ad summum verò cubiti gibbū
iuxta articulum pondus appēdere, aut manibus deorsum co-
gere. Vbi verò articulus vltra eleuatus est, coaptationes ma-
num volis fiunt, velut etiam in manibus. Deligatio quoque
in hac figura, & exceptio appēsi, & positio. At si in posteriōre
excidit partē, statim extensum palmis dirigere ac coaptare
oportet. Simul autē in directione etiā aliis opus est. Si in an-
teriorē, circum linteum conuolutum iustā molis inflectēdo
simul directionē facere oportet. Si verò in alteram partē in-
clinarit, in directione simul vtraq; facere oportet. Verū cu **B**
rationi cōmunis est figura & deligatio. Possunt autē ex di-
stentione omnia in cōmuni cōtingere. At verò repositiones
aliae ex supereluatione reponūtur, aliae ex extēsiōne, aliae ex
circūuolutione. Hae verò ex figurarū excessibus, aut hāc, aut
illāc celeriter fiunt. Manus articulus aut intrò, aut extra lu-
xatur, plerūq; verò intrò. Signa autē facilia cognitu sunt. Si
enim intrò luxatus est, digitos inflectere non possunt. Si ex-
tra extēdere nequeūt. Repositio fit, digitis supra mēsam posi-
tis, vt ab aliis atque aliis in diuersum extensio fiat, & id quod
eminet, aut vola aut calcaneo retrudatur, & in anteriōre par-
tem deorsum protrudatur. Infernē verò iuxta alterū os mo-
les aliqua conuoluta mollis supponatur, si supra eminet, ma- **F**
nu prona locata: si infrā, supina. Curatio verò linteis fit. Tota
porrò manus, aut intrò, aut extra, aut hāc, aut illāc luxatur.
Maximē verò intrò. Quandoque autem & appendix emota
est. Quandoque verò alterū os disparatum distat. His exten-
sio foris facienda est, & quod quidem eminet retrudatur, al-
terum verò contra trudatur, duabus speciebus simul contin-
gētibus, & retrorsum, & in obliquū, aut manibus supra men-
sam, aut calcaneo. Quae verò recrudescūt ac deformia sunt,
tempore ad vsum corroborantur. Curatio fit linteis cum ma-
nu & cubito: & ferulae vsque ad digitos ponuntur. At ferulis
hāc deligata frequentius quā fracturas soluere oportet, &
perfusionem ampliorem adhibere. Ex natiuitate autem ma-
nus breuior fit, & carnes imminuuntur maximē in cōtraria
parte ei in qua luxatio facta est. At adulto iam ossa manent.

Digitū

A Digiti verò articulus luxatus facili cognitu est. Repositio Digitus luxatus.
fit extendens in directum, ita ut quod eminet os protrudatur, contrariū verò contra trudatur. Curatio fit fasciis ac linteis. Repositio.
Si verò nō reponatur, forinsecus callo obducitur. At si hi ex Curatio.

breuiora fiunt infra luxationē & carnes imminuuntur cōtraria maximè parte ei in qua luxatio facta est. In adulto verò ossa manēt. Maxilla verò paucis iam perfectè luxata est. Os Maxillæ luxatio.
enim quod à superiore maxilla prodit, cū eo osse subiugatū est, quod sub aurē annexum est, quodq; capita infernæ maxillæ concludit, ac dirimit, cū altero capite superius sit, altero inferius: & extremæ infernæ genæ partes ita se habēt, ut alte

B ra ob longitudinē non facile accessum admittat: altera verò cornix est, & supra iugale os excedit. Simul autē & ambarū harum extremitatū neruosi tendines existunt, ex quibus musculi dependent, qui tēporales ac manducatorij appellantur. Propterea autē appellantur, & propterea mouētur, eo quod hinc dependent. Nā in edendo, & in loquendo: & in reliquo oris vsu, superna quidē maxilla quiescit. Est enim capiti connexa, & nō coarticulata. Inferna autē maxilla mouetur. Coarticulata enim est à superna maxilla, & à capite. Cur igitur in conuulsionibus ac distentionibus hic articulus distentus primus de se significationē præbeat: & cur plagæ tēporales periculosæ sint, ac soporē inducant, alio libro referetur. Quod verò non valde luxetur, causæ hæ sunt. Sed & hæc quoq; causæ

C sa est, quod non valde tales ciborum necessitates hominem apprehēdunt, ut magis quàm potest, hiet. Excederit autem à nulla alia figura, quàm si quis valde hiās maxillam in alterā partem diducat. Confert tamē ad hoc ut excidat, hoc ipsum. Quicūq; enim nerui, & quicūq; musculi circa articulos sunt aut ab articulis ex quibus colligantur, horū quicūq; in vsu sæpe mouentur, hi etiam maximè ad extensiones remittunt, quēadmodum etiam pelles mollissimæ multū remittunt. De quo igitur sermo est, luxatur quidē & excedit maxilla raro: laxatur tamen sæpe in hiatibus, velut etiam aliæ musculorum ac neruorū immutationes hoc faciunt. Manifestū verò ex his maximè fit, vbi excidit. Prominet enim inferna maxilla in anteriore partem, & in cōtrariam luxationi partem abducitur, & ossis cornix circa supernam maxillā tumidior

P p fit, &

repositio. fit, & infernas maxillas difficulter cōmittunt. Quæ verò re- D
positio his conueniat, manifestum est. Oportet enim aliquē
vulnerati caput detinere, & alterum infernā maxillam in-
trinsecus ac extrinsecus ad mentum digitis apprehēdere, &
primū maxillam aliquē diu hāc atq; illā manu abducere, &
ipsum hominē iubere, vt maxillam laxā habeat, & simul ad-
ducat ac quā maximē remittat. Deinde repēte tribus figu-
ris simul laxare oportet, diligēti in hoc animaduersione ha-
bita. Nam & ex distortionē ad naturam deducere oportet, &
infernā maxillam retrorsum protrudere, ita vt aggre-
quatur, & maxillas cōmittat, ac non hiet. Atq; hāc quidem
Curatio. repositio est, & neque aliis figuris fieri poterit. Curatio verò
breuis sufficit. Splenium enim incertum apponitur, ac laxo
deligamento deligatur. Securius autem hāc aggressio perfici-
tur, homine supino reclinato, & coriaceo puluinarī plenissi-
mē factō capiti supposito, vt in ipsum innitēs quā mini-
mū cedat. Insuper autem & caput vulnerati aliquis detine-
re debet. Si verò ambæ maxillæ luxatæ fuerint, curatio qui-
dem eadem est, verū hi os minus committere possunt. Nā
his genæ prominentiores sunt, sed indistortæ. Quod verò
distortæ non sint, maximē cognoueris ex dentium tum su-
periorum tum inferiorum terminis, ē directo inter se cor-
respondentibus. His confert vt quā citissimē reponantur.
Repositionis autem modus prius dictus est. Si verò nō repo-
nantur, animæ periculum imminet præ febribus continuis,
& torpido sopore. Soporiferi enim hi muscoli sunt, & dum
alterantur, & dum intēduntur præter naturā. Solet etiam al-
uus his biliosa, meraca, pauca egerere. Et si vomuerint, mera-
ca vomūt. His igitur etiam moriuntur decima maximē die.
At si fracta fuerit inferna maxilla, si quidem nō omnino cau-
latim hoc contigerit, sed cohæret adhuc os, confractum ta-
men fuerit, dirigere quidem os oportet digitis circa linguā
obliquam subiectis, forinsecus verò, contra niti, prout contu-
lerit. Et si distorti fuerint dentes iuxta vulnus cōmoti, post-
quam os directum fuerit, dentes inter se coniungere oportet,
non duos solū, sed etiam plures, atq; hoc maximē auro, sin-
minus, lineo filo, donec os corroboret. Postea cerato, & sple-
niis paucis, & linteis modicis deligare, non nimīū firmis, sed
laxis. Nam hoc probē nosse expedit, quod deligatio per lin-
tea

470

Atea, maxilla fracta parū quidem contulerit, si recte fiat: magnopere verò laeserit, si prauè deligetur. Frequenter autē circa linguā explorare oportet, & multo tempore reniti ac digitis dirigere os confractum, optimūque esset si hoc semper fieri posset. sed fieri nequit. Si verò os penitus caulatim diffractum fuerit, raro autem hoc cōtingit: dirigere quidem os oportet velut dictum est. Vbi verò direxeris, dentes coniungere, quemadmodum antea dictum est. Magnopere enim contulerit ad quietem, & adhuc magis si quis recte cōiungat, & velut oportet suturas consuat. At enim nō facile est omnem chirurgiam scripto exquisitè prodere, sed ex his quae scripta sunt, formam & imaginem cōcipere oportet. Postea corio opus est Carthaginēsi, & si quidem iunior fuerit vulneratus, satis est squama inde detracta vti. Si verò adultior, ipso corio ita vt defecta inde particula trium digitorum latitudine, aut prout cōgrua fuerit, sublata prius ē gūmi maxilla, ita enim mitius fuerit, glutine agglutinetur summa sui parte, ad diffractam maxillae partem, digiti aut paulo ampliore distātia à vulnere. Et haec quidem particula ad infernā partem agglutinanda est, & habeat fissuram ē directo menti quo acutam eius partem circuncirca complectatur. Alterum autem eius modi lorum, aut paulo latius, ad supernam maxillae partem agglutinare oportet, tanta à vulnere distātia, quanta illa altera lori particula abfuit. Sit autem & hoc fissum, vt circuncirca aurem ambiat. Sint autē haec lora acuta, qua partē cōmittuntur, & vbi ipsorum extremitates connectere accolligare oportet. In agglutinatiōe verò, caro, corij ad cutē vergat. Sic enim magis agglutinatum adhærescit. Postea extento hoc loco, magis autem eo quod circa mētum est quā maximè, ne maxilla exacuatur, lora ipsa circa verticem connectere oportet, & deinde linteo frontem deligare, & superiniectū quid esse oportet, velut moris est, quo vincula quiescent ac firma. Decubirum autē faciat in sanam maxillam, nō maxillae, sed capiti innitens. Attenuandum verò est corpus vsque ad dies decē, deinde renutriendum nō tardè. Si enim primis diebus inflammatio non accesserit, in viginti diebus maxilla corroboratur, perfecte enim callo obducitur, quēadmodum etiā alia ossa rara, si nō corruptio infestaret. Verū de corruptionibus omnium ossium alia longa tractatio restat. Hæc exte-

Hippocratis
sio per agglutinenta fiens, mitis est, & prompta ad mode- **D**
rationem faciendam, & ad multas ac multis locis faciendas
directiones accommodata. At medici non intelligētia æquē
ac manibus prompti, tum in aliis vulneribus, tum in maxil-
larum fracturis tales existunt. Variis enim modis, & bene &
male, maxillam fractam deligant. Omnis enim deligatio
maxillæ sic fractæ, ossa ad fracturam magis vergentia incli-
nat, quàm ad naturam ducit. St verò interna maxilla circa
connexionem ad mentum diuulsa fuerit. Sola autē hac con-
nexio in inferna maxilla est. Verùm in superna multa. Sed
non volo sermone longius aberrare. In aliis enim morborū
speciebus de his dicendum est. Si igitur connexio ad men-
tum disparata fuerit, ipsam coaptare cuiuslibet viri est. **E**
enim quod eminet, ad internam partem digitis admotis de-
trudere oportet. Quod verò intrò vergit, ad externam par-
tem digitis immisis reducere. Hæc tamē extensione disten-
dendo facere oportet. Facilius enim sic ad naturam redibūt,
quàm si quis ossa inter se complicans cogere conetur. Vbi ve-
rò coaptata fuerint, coniugare oportet dentes inter se hinc
atque illinc, velut prius dictum est. Curare verò cerato, &
spleniis paucis ac linteis. Deligationem autem breuem po-
tius quàm variam hic locus maximè admittit. Nā vt æqui-
libris non est, propè tamen ad æquilibrium accedit. At linte-
obuolutionem facere oportet, si quidem dextra maxilla emi-
net, in dexteram. In dexteram enim fieri putatur, si dextra
manus deligationi præit. Si verò altera maxilla eminuerit, **F**
aliter deligationem ducere oportet, & si quidem rectè quis
coaptationem adeptus fuerit, & velut cōuenit quieuerit, ci-
ta curatio continget, & dentes illæsi manent. Sin minus, diu-
turnior fiet curatio, & distortionem habebit, dentes autē læ-
si & inutiles fiunt. Porro si nasus fractus fuerit, fracturæ mo-
dus non vnus est. Verū qui pulchris deligationibus gaudent
citra intelligētiam, tum in aliis multis damnum incurrunt,
tum in fracturis circa nasum vel maximè. Ex deligationib⁹
enim hæc maximè varia est, & quæ plurimas ascias habeat,
& interruptiones ac interceptiones cutis maximè varias rhō-
biformes. Sicut igitur dictū est, qui nulla intelligentia præ-
diti aggressioni studio tenentur, vltro se offerunt ad nasum
fractum deligandum. Vna itaque alteraque die lætatur me-
dicus,

Nasi fra-
ctura.

A dicus, gaudet quoque is qui deligatur. Deinde cito quidē is qui deligatur, satiatur. Noxia enim & molesta est gestatio: satis autem est medico ostentasse, quod nasum variē deligare novit, facit autem talis deligatio omnia contra quā convenit. Partim enim qui propter fracturam limi fiunt, si supernē quis magis premat, limiores nimirum fient, partim verò quibus nasus hac aut illac distorquetur, aut circa cartilaginē, aut superius, palam est quod neque ipsis supernē deligatio proderit, sed etiam magis lædet. Non enim ita congruit splenii altera nasi pars, quanquam neque hoc faciant deligantes. Proximē verò deligatio resistere mihi videtur, si iuxta medium nasum circa acutam partem, confusa caro ad os fuerit, aut

B etiam os parum, & non multum confusum sit. Talibus enim nasus callo obducitur, & aliquanto asperior euadit. Sed tamen neque his deligatio multo negotio opus habet, si modo etiam deligare oportet. Sufficit autem super contusionē splenii inceratum extendere. Postea velut ex duobus initiis deligatio fit, ita semel linteum circundandum est. Optima tamen curatio est, per farinam triticeam hornam, lotam, viscosam, subactam, modicā, ita ut talia ex illa velut cataplasmate integantur. Si igitur triticea farina bona fuerit, & tractu facilis, ea ad omnia huiusmodi uti oportet. Si verò non facilis tractu sit, modicam mannam leuissimē tritam, & aqua dilutam, cum farina subigere oportet, aut gummi parum, similiter ammiscere. Quibuscunque igitur nasus fractus est,

C ut deorsum & in sinum vergat, si quidem ex anteriore parte iuxta cartilaginē subsidat, fieri potest ut aliquid quod ipsum dirigat in nares indatur. Si minus, omnia talia digitis in nares iniectis dirigere oportet, si id fieri datur. Si minus, crassum specillum nō in anteriorem narium partem digitis indere oportet, sed qua parte nasus subsidit: extrinsecus autem ab utraque parte nasum apprehendere, simulque cogere ac sursum ducere. Et si quidem valde in anteriore parte fuerit fractura, fieri poterit, ut aliquid intra nares indatur, velut iam dictum est, nimirum linteī rasura, aut aliud quid huiusmodi, linteo inuolutum, aut potius in corio Carthaginensi confutum; ea figura quæ congruat loco cui incumbet. Si verò ulterius facta fuerit fractura, fieri non potest ut aliquid indatur. Si enim in anteriore parte molesta

pp 3 est

est gestatio, quomodo non sit in interiore? Primum igitur & intrinsecus conformando, & forinsecus non parcendo, ad pristinam naturam reducere ac dirigere oportet. Valde enim conformatur nasus fractus, maximè quidem eadem die: si minus, paulo postea. Verùm segniter agunt medici, & leuius quàm conuenit primum contingunt. Iniicere enim manus hinc atque illinc iuxta naturam nali quàm infime oportet, ex infernis sursum cogendo, & sic quàm maximè erigere, vnā cum interna directione etiam extrinsecus dirigendo. Postea ad hæc nullus talis medicus est, si studium adhibere ac tolerare vult, velut ipsius digiti indices. Hi enim maximè secundum naturam sunt. Vtrunque enim digi-
 gitum iniicere, eoque totum nasum firmare oportet, atque
 ita in quiete habere, si quidem fieri posset, semper donec
 corroboretur: si minus, plurimo tempore velut dictum est. E
 Quod si fieri nequeat, aut puer aut aliqua mulier hoc faciāt. Molles enim manus esse oportet. Sic enim quàm optimè nasus curari poterit, vbi non in obliquum, sed ad infernam partem æqualiter subsidat. Ego igitur nullum vnquam nasum vidi, qui sic fractus dirigi non potuisset, si statim ita cogeretur priusquā callus obduceretur, si modo quis rectè curare velit. Verū homines vt ne deformes fiant, multo quidem precio coemerint, studium autem adhibere non sciunt, si-
 mūlque non tolerant, si non dolore vexentur, aut mortem timeant: quanquam breui tempore nasus callo obducatur. decem enim diebus corroboratur, si non corruptio insuper
 accedat. Quibuscunque verò os in obliquum frangitur, cura-
 ratio quidem eadem est. Verùm directionem non æqualem
 vtrinque facere oportet, sed quod inclinatum est, intrinse-
 cus cogendo ad naturam compellere, & in nares facta cōtre-
 ctatione, ea quæ intrò repunt impigrè dirigere, donec cor-
 recta fuerint: ita vt eius probè memineris, quòd si non sta-
 tim corrigantur, fieri non possit vt nasus non distortus fiat. F
 Postquam autem ad naturā reduxeris, digitos plures aut vnū digiti ad locum ad mouere oportet, qua parte eminebat, atque ita aut ipsum, aut alium quendam sustentare, donec vulnus corroboratum fuerit. Sed & in narem parū digiti immittere oportet, & aliās atque aliās impellendo ea quæ inclinata sunt dirigere. At si quid inflammationis his
 accedat

Accedat, farina subacta vti oportet: & tamen incumbente etiam farina digitos similiter admouere opus est. Si verò iuxta cartilaginem in obliquum fractus sit, necesse est summum nasum distorqueri. Talibus igitur in summam narcm aliquid quod dirigat ex relatis, aut quod his simile sit, indere oportet. Poterit autem quis multa idonea inuenire, quę neq; odorem habeant, neque aliàs lenia sint. Ego verò quandoque pulmonis ouilli frustū defectum indidi. Hoc enim forte obtingebat. Nam spongię indite humiditates suscipiūt. Postea Carthaginēsis corij squamā magni digiti latitudine, aut prout contulerit resectam, extrinsecus ad nasum inclinatum agglutinare oportet, & deinde hoc corij lorum prout contule-

Brit extendere. Paulo tamen amplius extendere conuenit, quo erectus & absolutè directus sit nasus. Longum autē sit hoc lorum, vt postea infra aurē abductū circū caput obducatur: & licet quidē lori extremitatem ad frontem agglutinare, licet etiā longius deducere, & deinde capiti obductum deligare. Hic modus simul iustam directionem habet, & simul ad moderationē faciendā promptus est, vt si quis magis aut minus nasi inclinationē ad contrarium facere velit. Nam quibus in obliquū nasus frangitur, eos in reliquis velut relatum est curare oportet. Plurimis tamen insuper opus est, vt inclinationis in cōtrarium gratia, lorum ad summū nasum agglutinetur. Quibuscunq; verò cum fractura etiā vlcerata sunt, eos ea propter turbari non oportet. Verū super vlcerata ceratum picatū imponere, aut ex emplastris aliquod cruentis vulneribus idoneum. Facilia enim curatu talia sunt. Similiter etiā, si ossa discessura sunt. Primam directionem impigrē facere oportet nihil omittendo, & directionem per digitos etiā postero tempore, ita vt laxius quidem admoucas, admoucas tamē. Ex omnibus enim corporis partibus nasus facili mē conformari potest. Ceterum lororum agglutinatione ac in contrarium inclinatione vti omnino nihil prohibet, siue vlcerata fuerint, siue inflammatio. Nullam enim molestiā exhibēt.

At verò si auri fracta fuerit, deligationes omnes inimicae sunt. Neq; enim ita laxam quis circū dare poterit. Si verò magis premit, maius malum operabitur. Nam & sana auri deligatione pressa, dolore, & pulsatione, & febre afficitur. Sed & cataplasmata pessima quidē omnino sunt quę grauissima

Auricula
fractura.

Pp 4 sunt.

sunt. Verum & alia pleraque omnia mala sunt, & abscessus inducunt, & mucum ampliorem suggerunt, & deinde suppurationes noxias. His autem fracta auris minimè opus habet. Proximum tamen locum habet, si quid imponi debet, farina viscosa, quam neque ipsam grauem esse oportet. Contingere verò quàm maximè conducit. Bonum enim aliquando medicamentum est, etiam nullum adhibere medicamentum, & ad aures, & ad multa alia. Vellicationem insuper ac scalpturam vitare oportet. Corpus autem attenuare, & magis in quo periculum est ne auris suppuretur, melius est quoque; alium molliere. Si verò quis facile vomat, ex moderata aliqua purgatione vomitum faciat. At si ad suppurationem deueniat, cito quidem aperire non oportet, multa enim ex his quæ suppurari videntur quæ edoque resorbentur, etiam si nōdum quis vllum cataplasma imposuit. Si verò quis aperire cogatur, celerrimè quidē sana fit, si in vltiorem partem perurat. Illud tamē certo scire expedit, quod mutila fiet auris, & minor altera, si perusta fuerit. Si verò non in vltiorem partē peruratur, tumidam partem non valde parua sectione incidere oportet. Sub crassiore enim cute pus reperitur quàm quis putauerit. Verū vt in summa dicam, alia quoque omnia mucosa, & mucos facientia, vtpote quæ sunt viscosa, ad contactum sub digitis hac atque illac cito dilabuntur: & propterea sub crassiore cute medici talia inueniunt, quæ putarint. Nam & aliquas neruorum contortiones, ganglia appellatas, quæ sanè laxæ ac fluidæ sunt, mucosamque carnem habent, multi aperiunt, humorem in talibus se inuenturos esse putantes. Medicus quidē igitur sententia sua fallitur, verum rei huiusmodi nullum ex apertione accedit detrimentum. Qui verò aquosi loci sint, aut mucos pleni: & in quolibus locis singula si aperiatur mortē afferant, aut etiā alia detrimenta inducant, de his in alio opere scribetur. Quum igitur inciderit quis aurem, ab omnibus quidē cataplasmatibus, & ab omni linamentorum usu abstinere oportet. Curare autem vel emplastro aliquo cruentis vulneribus idoneo, vel aliquo alio, quod neque grauitatē, neque dolorem inducat. Si enim cartilago denudari inceperit, & subsidencia purulenta aut mucosa haberit, molestum est: Fit autem & hoc propter illas curationes. Cæterum omnium eorum quæ recruderunt, perustio in vltiorem partē sufficientissima medela est. Verticula verò spinæ quibus

Auris inci-
sa.
Curatio.

Verticula
spinæ.

A quibuscunq; in gibbum trahuntur ex morbis, pleraq; ut soluantur fieri non potest. Insuperq; & quæ supra septi transuer si iuncturam ac connexionem gibba fiunt. Quæ verò infra, eorum aliqua soluunt varices in cruribus fientes. Magis autē hæ varices quæ in vena iuxta poplitem fiunt, quibuscunque gibbositas cōtigerit, eam soluunt. Fiunt autem & in vena circa inguina. Iam verò quibusdā etiā dysenteria diuturna soluit. Et quibus quidē gibba sit spina dum pueri sunt, priusquā corpus ad augmentum plenum perfectum fuerit, his corpus iuxta spinam coaugeri non solet. Sed crura quidē ac manus perficiuntur, illæ verò partes defectuosiores fiunt, & quibus supra septum transuersum gibbositas est, his & costæ in amplitudinem augeri non solent, sed in anteriorem partē: & pectus acutum fit, sed non latum: ipsique & difficulter spirant, & stridulam faucium asperitatem habent. Nam vetriculi qui spiritum suscipiunt ac emittunt, minorem amplitudinem habent. Sed & iuxta magnum verticulum ceruicem repandā habere coguntur, ut ne caput ipsis pronum sit. Multa igitur angustiam faucibus exhibet etiā hoc os intro vergēs. Nam & his qui natura recti sunt, spirandi difficultatem hoc os inducit, si intro vergat, donec repressum fuerit. Ob talē igitur figurā eiusmodi homines eminentis gutturis, magis quā fani apparent: & tuberculis circa pulmonē duris ac crudis plerūque tales affecti sunt. Nam & gibbositatis occasio, & distensio ple risque propter tales collectiones fit, cum quibus vicini nervi cōmunionē habent. Quibus verò infra septum transuersum gibbositas est, horum quibusdam morbi rhenū ac vesicæ accedunt. Sed & abscessus ad suppurationem, & circa laterum mollitudines, & inguina diuturni ac agrè curabiles, & neutri horum gibbositates solvunt. Coxæ verò his magis excarnes fiunt, quā his quibus supernè gibbositas cōtigit. Vniuersa tamē spina his longior est quā supernè gibbosis. Pubes verò & barba tardior ac imperfectior. Sed & infecundiores hi sunt quā supernè gibbosi. At verò quibus iam aucto corpore gibbositas facta fuerit, his palam presentis tūc morbi iudicationem gibbositas facit, per tempus tamē, aliquid ex iisdem significationem de se plus aut minus præbet, quemadmodum etiam in pueris. Minus autem malignè in totum talia se habent, & multi sanè iam facilè ac sano modo gibbositatem su-

P p s finuer

Spina gib-
bosa.

stinuerunt, usque ad senectutem: & maximè hi quibus ad car-
nositatem ac pinguitudinem promotū fuerit corpus: pauci
tamen talium sexaginta annos transgressi sunt plerique ve-
rò breuioris vite sunt. Quibusdam etiā in latus, aut hac aut
illac, verticula obliqua sūt. Et omnia aut pleraque talia, pro-
pter collectiones intra spinam fiunt. Quibusdā vnā cū mor-
bo etiam figuræ insuper conferunt, ad quas reclinari consue-
uerunt. Verū de his in diuturnis pulmonis morbis dicitur.
Illic enim de his quæ futura sunt, pulcherrimæ prænotiones
habentur. Porro quibus ex casu spina gibba fit, horum sa-
nè pauca superantur, ita vt dirigi possint. Nam quæ in scala
fiunt extensiones, nihil direxerunt quod ego sciam. Vtuntur
enim ipsa maximè hi medici, qui multitudinis famam auen-
pantur. Apud tales enim hæc in admiratione sunt, si aut pen-
dentem, aut proici aliquem aut quæ his similia sunt videāt,
& hæc celebrant semper, neque ipsis cura est quale quid eue-
niat ex hac aggressione, siue bonum id sit, siue malum. Medi-
ci tamen qui talia studio habent, quos sanè ego noui imperi-
ti sunt. Inuentum equidem vetus est, & laudo sanè vehemen-
ter eum qui primus excogitauit & hoc machinamentum, &
quoduis aliud secundum naturam inuentum. Nihil enim de-
spero, si quis rectè constructum concutiat, fieri posse vt quæ-
dam dirigantur. Ipse tamen omnia huiusmodi hoc modo cu-
rare erubui: propterea quod impostorū magis tales sunt mo-
di. Quibus igitur prope ceruicem gibbositas fuerit, his veri-
simile est has in caput extensiones minus prodesse: paruum
enim pondus habet caput, & summi humeri deorsum vergē-
tes. Verū tales verisimile ex magis dirigi posse, si in pedes
cōcutiantur. Ita enim maior propensio ad huiusmodi fieret.
Quibus autē magis inferius gibbositas est, hos par est vt ma-
gis in caput concutiantur. Si quis igitur concutere volet, re-
ctè sanè hoc modo præparare poterit. Scalam coriaceis aut
laneis puluinaribus insternere oportet probè alligatis, paulo
amplius & in longitudinem, & in utrāque partē, quàm quan-
tum corpus hominis occuparit. Deinde hominem supinum
supra scalam reclinare, & postea pedes quidē alligare iuxta
malleolos ad scalam non disparatos, vinculo quidem satis va-
lido, verū molli, alligare verò etiam oportet infra & supra
vtrunque genu, itémque circa coxas. Circa laterum autem
mollit

A mollitudinem, & circa pectus, laxas fascias circumdare, ita ut ne impediunt concussione. Manus verò ad costas extensas, ad corpus applicare, & non ad scalam. Vbi verò hæc præparaueris, scalam ita ad turrim aliquam altâ, aut ad domus lacunar attrahere oportet. Locus autem in quo concussione facis, renitens sit. Eos verò qui extendunt probè doctos esse conuenit, quo æqualiter, & probè, & ex æquilibrio, ac derепente demittant, ut neque scala in alteram partem repens ad terram deueniat, neque ipsi pronui sint. Quod si tamen à turri, aut malo defixo carthesium habente, quis demittat, adhuc melius præparabit, ita ut ex trochlea aut asello laxatis instrumentis ac funibus demissio fiat. Verum iniucundum est de his longius verba facere: attamen ex his structuris maximè quis concuti poterit. Si verò valde supernè fuerit gibbositas, & concutere sit opus, omnino in pedes id faciendum est, velut dictum est. Ita enim maior propensio ad hæc contingit. Et firmare quidem oportet iuxta pectus ad scalam fortiter deligando, iuxta ceruicem verò fascia quàm laxissima directionis saltem gratia. Sed & ipsum caput iuxta frontem ad scalam alligare oportet, manus autem porrectas ad corpus alligare non ad scalam. Reliquum verò corpus indeligatum esse oportet, nisi quantum satis est directionis gratia, alia atque alia laxa fascia circumdatum esse. Verum considerandum est ne concussione impediunt hæc vincula. Crura verò ad scalam quidem ne deligentur, sed inter se, ita ut secundum spinam in directum vergant. Atque hæc quidem hoc modo facienda sunt, si omnino opus fuerit in scala concussione fieri. Turpe tamen est & in omni arte, & non minimè in medicina, multâ turbam, & multam ostentationem, & multum rumorem cõcitare, deinde nullam vtilitatem afferre. Oportet autem primum spinæ naturam qualis est cognoscere, ad multos enim morbos ea opus fuerit. Nam qua parte ad ventrè vergit, verticula intus inter se paria sunt, & inter se ligata vinculo mucoso ac nervoso de cartilaginibus exorto vsq; ad medullam. Alij verò nerui nervosi perpetui annexi, hinc atq; illinc iuxta ipsa porriguntur. Verum venarū & arteriarū cõmunitates, in alio sermone declarabuntur, quot & quales sint, & vnde proficiantur, & in qualibus qualia possint. Itémque quibus inuolucris ipsa medulla intecta sit, & vnde profect

*Quid turp
m' n' h' r'*

Spinæ natura pernoscenda.

Arteriarum

profectis, & ubi desinentibus, & quibus cū communione ha- D
bentib⁹, & qualia potētib⁹. At in vltiore parte in articulis
verticula inter se cardinis in modum cōserta sunt. Nerui ve-
rò communes iuxta omnia, & in externis, & in internis par-
tibus porriguntur. Et processus ossis ad externā partem, ab
omnibus verticulis vnus de vnoquoq; tum à maiorib⁹, tum
à minoribus. In his autem processibus cartilaginum appen-
dices, & ex illis neruorum progerminatio, cognata ac confi-
milis extremis neruis. Costæ verò annexæ sunt, ad internam
partem magis quàm ad externam capitibus vergentes, ad
vnumquodq; autem verticulum adarticulatæ sunt. Curuissi-
mæ autē sunt hominis costæ obtorto modo. Intermediā ve- E
rò partem costarum & ossium de verticulis procedentium,
expleant vtrinque muscoli, à ceruice initio sumpto, vsq; ad se-
pti transuersi annexionē. Ipsa autem spina secundū longitu-
dinem rectobliqua est, à sacro quidē osse vsque ad magnum
verticulū, iuxta quod crurum annexio depēdet, gibbosa est.
Nam & vesica, & genitura, & intestini recti laxa pars, in hac
parte constituta sunt. Inde verò vsque ad septi annexionem,
in directum repāda est, & musculos ad nates habet solus hic
locus, ex internis partibus, quos lumbarios vocāt. Ab hac au-
tem parte vsq; ad magnū verticulū, quod supra supernas hu-
meri partes est, è directo gibbosa est, imò magis esse videtur
quàm est. Nam spina media sui parte, altissimas ossiū propa-
gines habet, hinc autē atq; illinc, minores. Ipse verò ceruicis F
articulus repandus est. Quibuscūq; igitur gibbositates iuxta
verticula fiunt, his expulsiō magna à connexionē abrupta,
vnus aut plurium verticulorū, nō ita multis, sed paucis con-
tingit. Neq; enim talia vulnera fieri facile est, neq; ad exter-
nam partem expelli facile est, si non ex anteriore parte, forti
aliqua re per ventrē quis vulneratus fuerit: Sic autem vtique
perierit: aut nisi quis ex alto loco delapsus, coxis aut hume-
ris impegerit. Sed & hic vtique morietur, etiam si statim nō
intereat. At ex posteriore parte ad internam, huiusmodi ex-
pulsionem fieri non est procliue, si non in immensum graue
aliquod onus irruat. Nam ex ossibus quæ foras enata sunt,
vnumquodq; eiusmodi est, vt prius ipsum frangatur, quàm ma-
gnam intrò inclinationē faciat, ita vt & ligamenta, & articu-
los inter se alternatos ac articulatos violet. Præterea & spi-
nalis

A nalis medulla affligeretur, si ex modico loco inflexionem haberet, ubi verticulū tali expulsiōe exiluiſſet: & verticulum quod exiluiſſet, ſpinalem medullā utiq; premeret, ſi non etiā abrumperet: At ea preſſa ac intercepta, multarū & magnarū & nobilium partium torpore induceret. Quare neq; curę foret medico, quomodo verticulū dirigat ac coaptet, quū multa & violenta alia mala adſint. Itaq; ſi tale contingat, palām eſt quod neq; concutiendo, neque alio quodam modo, reponi poſſit, niſi quis diſſecto homine, & manu in ventrem iniecta inqueſitionem faciat, & ex interna parte ad externam manu retrudat. atq; hæc in mortuo quidē fieri poſſent, in viuo autem non ita. Cut igitur hæc ſcribo? Quia ſunt quidam qui

B putant ſe curaſſe homines, quibus intro exciderint verticula articulos penitus tranſgreſſa: & tanē facillimam hanc diſtortionē eſſe, ut quis inde cōualeſcat, aliqui cenſent, eāque nulla repositione opus habere, ſed ſua ſponte talia ſaneſcere. Ignari autē multi ſunt, & lucro hoc habēt quod ignorāt. Perſuadent enim alios. Verū fallūtur hi hæc de cauſa. Spinā quæ in ſpina ipſa eminet, verticula ipſa eſſe putāt, quia vnūquodque ex his oſſibus ad contactū rotundum apparet, ignorātes quod hæc oſſa ſunt ea quæ à verticulis enata ſunt, de quibus paulō antē dixi. At verticula longē magis in anteriore partem abſunt. Anguſtiſſimum enim ventrem ex omnibus animalibus homo habēt, quantum ad magnitudinem attinet, à posteriore ad anteriore partem, inſuperq; etiā iuxta pectus.

C Quum igitur horum ſupereminentiū oſſium aliquod vehementer fractum fuerit, ſiue vnū, ſiue plura, ea parte humilior locus redditur, quā hinc atq; illinc: & propterea decipiuntur putātes verticula intro abiſſe. Decipiunt autem inſuper ipſos etiā figuræ vulneratorū. Si enim inclinare ſe conantur, dolent: quū ea parte qua vulnerati ſunt, cutis ſit circuntenta: & ſimul oſſa fracta ita magis corpus affligunt. Si verō in repandum recuruantur, melius habēt. Nam & cutis iuxta vulnus laxior fit, & oſſa minus affligunt. Sed & ſi quis ipſos contingat, ea parte repādi cedunt, & locus vacuus ac mollis hæc parte ad contactum apparet. Hæc omnia relata inſuper medicos decipiunt. Verū tales cito ſani & illaſi ſua ſponte ſūt. Cito enim omnia eiufmodi oſſa quæ laxa ſunt, callo obducuntur. Obliquatur igitur ſpina etiam ſanis iuxta multos modos,

*Auguſtu
ventre
m. alar
labet ſan*

*Spinæ obli
quatio.*

modos. Nam & in natura, & in usu ita se habet. Sed & pre se- D
 neſtute, ac doloribus. Nā hæc colligādi vim habent. At gib-
 boſitates ex caſibus contingentes plerunq; ſiunt, ſi aut in co-
 ſtas innitatur ac impingat, aut in humeros cadat. Neceſſe eſt
 enim foris apparere in gibboſitate vnum aliquod altiſſimū
 verticulū, minus verò ea quæ ſunt hinc atq; illinc. Nō igitur
 proſilit multū ab aliis, ſed parū, quū ſingula, aceruatim con-
 cedāt. Propter hoc igitur etiā ſpinalis medulla eiufmodi di-
 ſtortiones facilè fert, eo q̃ circularis ipſi diſtortio contingit,
 non angularis. Oportet autem fabricam inſtrumēti coactio-
 rij huiufmodi cōſtruere. Licet equidē lignum robuſtū & la-
 tum, inciſuram oblongam habens, deſodere. Licet etiā pro li-
 gno, in pariete inciſuram oblongā facere, quæ aut cubiti al- E
 titudine, aut prout congruum fuerit, à pavimēto extet. Poſt
 ea columnā querneam, quadrangularem, obliquā ad parietē
 adſcere oportet, tanto ſpacio in medio relicto, vt aliquis
 pertranſire poſſit, ſi forte opus ſit. Et ſuper columnā quidem,
 aut tunicas, aut aliud quid molle, quod tamē non multū ce-
 dat, inſternere oportet, homini verò fomentum adhibere. Si
 verò admittat, ipſum etiā lauare. Deinde pronū extentū re-
 clinare, & manus ipſius ſecundum naturā extentas ad corpus
 alligare. Poſtea verò loro molli ſatis lato ac lōgo, ex duobus
 perpetuis inter ſe aduerſariis loris conſtante, ex media ipſius
 parte, iuxta medium pectus quā proximè ſub alas, bis cir-
 cundare oportet, & quod ſuper eſt de loris vtriſq; iuxta alam
 circum humeros obuoluatur, & initia ipſorū ad lignū quod- F
 dam piſtilloforme alligentur, ita vt congruant ſecundū lon-
 gitudinē ſubiectæ columnæ, ad quam lignū illud piſtillofor-
 me apponere, & retinendo extensionem facere oportet. Tali
 verò quodam alio vinculo & ſupra genua, & ſupra calcanea
 alligato, initia itē ad eiufmodi lignū alligare oportet. Poſt-
 ea autē alio loro lato ac molli & robuſto faciæ formā habē-
 te, longitudinēq; ac latitudinē ſufficientē, partem inter co-
 xas & lumbos, quā proximè ad coxas, circum circa fortiter
 deligare, atq; ita tum huius lori, tum aliorū duorum capita,
 ad lignū à pedibus extās alligare. & poſtea in hac figura hinc
 atq; illinc, æqua ſimul inclinatione, ſimulq; in directū exten-
 ſionē facere. Nullū enim magnū malū talis extenſio induxe-
 rit, ſi cōmodè preparata fuerit, niſi quis de induſtria ſe exten-
 dendum

De Fracturis.

404

A dendum exhibeat. At medicus, siue alius quisquam fortis & nō imperitus imposita manus vola supra gibbū, & altera manu insuper alteri superimposita, deorsum cogat, animaduersione habita an in directum deorsum cogere oporteat, siue ad caput, siue ad coxas. Atque hæc coactio maxime innoxia est. Sed & si quis insideat super gibbum, & attollēdo se dum ille distēditur incutiat, innoxium est. Neque quicquā prohibet pede inscendere ac gestari supra gibbum, atq; ita sensim incurere. Ad hoc autem moderatē faciendum idoneus quis fuerit ex his qui in palestra adsuēti sunt. Efficacissima tamē coactio est si aut partes incisuram habeat, aut lignum defossum infra spinæ altitudinem incisum sit, quantum moderatē habere videatur, ita vt tabula tiliacea, aut cuiusdam alterius ligni, non tenuis, incisuræ indatur, & postea linteum quoddā multiplex, aut parū quoddā coriaceum puluinar, super gibbū imponatur. Quā paucissima tamen imposita esse cōducit, cauendi saltē gratia, vt ne tabula præ duritie dolorem aliquē importunē inducat. Sit autem gibbositas ē directā maxime incisuræ in pariete, quo qua parte maxime extat, ea quā maxime tabula imposita premat. Vbi verō imposita fuerit, aliquis extremū tabulæ partem deprimat, aut duo hoc faciāt, si vnus nō suffecerit. alij verō corpus secundū longitudinem velut dictum est extendant, partim hinc, partim illinc cōstituti. Potest etiam asellis extensio fieri, aut iuxta lignum defossis, aut in ipso ligno asellorū postibus constructis, siue erectos velis vtrinq; paululum supereminētes, siue hinc atq; illinc iuxta ligni verticem. Hæ coactiones moderationem admittūt, vt & vehementissimē, & moderatē fieri possint. Talem autem vim habent, vt si quis etiam ad perniciem tales necessitates adhibere velit, & nō ad curationem, tunc quoq; multum possint. Nam si quis secundum longitudinem hinc atq; illinc saltem sic extendat, & nullam aliam necessitatem addat, tamen sic etiam extensionem facere poterit. Sed & si non extendat, & tabula solū ita quis vtatur, etiam sic sufficienter deorsum cogere poterit. Bonæ autem sunt huiusmodi violentiæ, quibus & vehementioribus & debilioribus vt licet, vsu ipsorum prout quisq; vult moderato. Et sanē etiam secundū naturam coactionem faciūt. Nam ea quæ extant, ad locū suū redire cogit depressio. Quæ verō

præter

præter naturam coiuerunt, ea extendunt extensiones secundum naturam. Proinde neque meliores his necessitates ego habeo, neque iustiores. Rectitudo enim extensionis iuxta ipsam spinam, infernè & iuxta os sacrum appellatum, nullam ansam habet: supernè verò iuxta ceruicem & caput, habet quidam ansam, sed in speciem indecora est: & si hac parte extensio fiat redundans, etiam alias læsiones inducere poterit. Experimentum autem aliquando feci, ut hominem supino extento utrem non inflatum sub gibbum subderem, & postea folle ex officina fabri in subiectum utrem immisso inflarem. Verum res mihi non successit. Quum enim bene extenderem hominem, vincebatur vter, & non poterat flatus aliquam coactionem facere. Sed & alias hæc res prompta erat ad dilapsionem, nimirum quum in idem & hominis gibbositas, & utrisque pleni incurua turgiditas cogatur. Quum autem rursus non valde extenderem hominem, vter quidem præ flatu incuruus turgebat, homo verò omnino magis quam conducebat repandus fiebat. Scripsi autem hoc de industria. Pulchrum enim est etiam ea discere quæ in experimentum assumpta successu caruerunt, &

Verticula cur successum non habuerunt. Quibuscumque porro verticula obliquata. In intro obliquantur, aut ex casu, aut graui aliqua re illapsa, his nullum quidem verticulum extat plerumque ita multum ab aliis. Si verò extiterit multum, aut unum aut plura, mortem inducunt, velut etiam antea dictum est. Circularis etiam hæc & non angularis emotio existit. Vrinæ igitur talibus magis F. supprimuntur, itemque alui egestio, quam his qui extra gibbosum fiunt: & pedes ac tota crura magis perfrigerantur, & lethalia sunt hæc magis quam illa quæ dixi. Sed & si superstites euadunt hi, magis profluam urinam habent, & cruribus impotentiores ac torpidiores fiunt. Si verò etiam in superna parte magis repandi fiant, totius corporis impotentia ac torpor accedit. Atque ego sanè nullam machinam habeo, per quam talia in idem restitui possint, si non alicui cōcussio per scalam opem tulerit, aut etiam alia quædam eiusmodi curatio aut extensio, qualis est ea quæ paulò antea relata est. Ad coactionem unam cum extensione nullam habeo, quæ sanè fieri ita posset, velut in gibbo tabula coactionem faciebat. Quomodo enim quis ab anteriore parte per ventrem coactionem facere possit? Neque enim fieri hoc potest. Sed neque tusses, neque sternutatio

A nutationes vllam vim habent, vt extēſioni auxiliari poſſint.

Nec verò flatus immiſſio in vētrem quicquā efficere poterit. Quin & ſi magnæ cucurbitæ affigatur, attractionis nimium gratia verticulorum intrò repētium, magno hoc mētis errore contingit. Propellunt enim magis quā attrahunt, & neque hoc animaduertunt hi qui ipſas affigunt. Quāto enim magis ipſas quis adigit, tanto magis repandi ſunt hi quibus affiguntur, cute ſimul ſurſum coacta. Poſſem autē & alios cōcuſſionū modos, quā hi ſunt quos antea retuli, exponere, quos ſanè affectioni magis conuenire quis putare poſſit, verū non valde ipſis fidem habeo, & propterea non ſcribo. In ſumma igitur de his quæ relata ſunt, ita aceruatim cōſtitue-

B re oportet, quòd ea quidem quæ in repādum emota ſunt, lethalia ſunt ac noxia: quæ verò in gibbum, innoxia in totum, quantum ad mortem, & vrinæ ſuppreſſionem ac torporem attinet. Non enim riuos qui ſunt in ventre gibboſitas ad externam partē intendit, neq; fluidos eſſe prohibet. Repāditas verò ambo hæc facit, & ad alia multa hæc accedunt. Nā multo plures & cruribus & manibus impotentes ſunt, & corpore torpeſcunt, & vrinæ his ſupprimuntur, quibus gibboſitas quidem neque extra neq; intrò extiterit, verū in reſtitutionem ſpinæ vehemēter concuſſi fuerint. Quibus verò gibboſitas extat, hi minustalia perpetiuntur. Multa verò etiam alia in medicina quis videre poterit, ex quibus ea quidem quæ fortia ſunt, innoxia ſunt per ſe totā morbi iudicationē

C inducētia: quæ verò debiliora, noxia, ita vt & diuturnos morbos progenerent, & cum reliquo corpore ampliorem cōmunionem habeant. Nam & coſtarum fractura eiufmodi quid perpetitur. Quibus enim fracta fuerit coſta vna, aut plures, velut plurimis frāgitur, ita vt oſſa ad internam partem non vergant, neq; denudata ſint, ex his pauci iam febricitarunt. Sed neque ſanguinem multi iam expuerunt, neq; ſuppurati multi ſunt. neque curatione medicamentorum ex illitis linamentis opus habent, neq; oſſium corruptiones accedunt, & viſtus vulgaris ſufficit. Si enim febris continua ipſos non corripuerit, etiam vaſa per inediaſ his vacua fieri deterius eſt, quā ſi nō vacua ſiant. Maiorem item dolorē ac febrem & tuſſim inducit. Moderata enim ventris repletio, coſtarum ſit directio. Verū vacuatio pendentes coſtas facit, & hæc

Qq

depen

dependentia dolorem inducit. Extrinsecus autem vulgaris **D**
 deligatio talibus sufficit, ita ut cerato, & spleniis, & linteis,
 plana deligatio placide firmeretur, aut etiam laneum quiddam
 insuper opponatur. Corroboratur autem costa diebus vigin
ti. Celeriter enim his ossibus calli obducuntur. At contusa
 circa costas carne, aut ex plaga, aut ex casu, aut renisu, aut a
 lio quopiam eiusmodi, multi iam multum sanguinem spuerunt.
 Riui enim in molli ad vnamquamque costam extenta parte, &
 nerui, à principalissimis in corpore partibus progressus ha-
 bent. Multi itaque iam tussiculosi, & tuberculosi, ac suppurati
 facti sunt, & linamentis opus habuerunt, & costa ipsis corru-
 ptionem sensit. Sed & quibus nihil tale accessit, carne circa
 costas contusa: tardius tamen dolor in ipsis sedatur, quam in **E**
 his quibus costa facta fuerit: & in talibus vulneribus locus
 dolorum recidiuas magis habet. Proinde aliqui tales noxas
 magis contemnunt, si costa ipsis fracta fuerit. Quin & cura-
 tione exactiore tales indigent, si modò sapiant. Victum enim
 contractum esse conducit, & corpore quam maximè quiesce-
 re, & à venere abstinere, edulibusque pinguibus, & fauces exa-
 sperantibus, ac fortibus omnibus: Venamque in cubiti flexu-
 ra secare, & quam maximè filere. Deligare verò locum con-
 tusum conducit spleniis non multiplicibus, sed multis &
 multò latioribus tota contusione, & cerato sublinere, & lin-
 teis latis cum fasciis latis ac mollibus deligare, & moderatè
 firmare, ut deligatus non valde se compressum esse dicat ne-
 que rursus laxum. Initium autem sumere debet qui deligat **F**
 in ipsa contusione, atque isthic maximè firmare, facienda
 verò est deligatio velut à duobus initiis, deligandumque ut
 ne circumflua sit cutis circa costas, sed æquilibris. Deli-
 gandum autem aut singulis aut alternis diebus. Præstat
 autem & aluum mollire leui aliquo medicamento, cibi sal-
 tem euacuandi gratia: & ad decem quidem dies attenuare.
 Postea verò corpus renutrire ac tenerum facere. Quandiu
 verò attenuas, deligatione magis firmata vtendum est.
 Quum autem ad teneritudinem deducis, laxiore. Et si
 quidem sanguinem ab initio expuerit, quadraginta die-
 rum curationem ac deligationem facere oportet. Si verò
 sanguinem non spuat, sufficit viginti diebus ut plurimum
 curatio. Verum ex robore vulneris tempora coniectare
 oportet

A oportet. Qui porrò tales contusiones neglexerint, etiam si aliud nihil maioris mali ipsis contingat, tamen locus contusus mucosiores carnem habet, quàm antea habebat. Vbi verò tale quippiam relinquitur, & curatione non probè exprimitur, deterius quidem est si iuxta ipsum os mucositas relicta fuerit. Neque enim caro amplius similiter os contingit, & os ipsum morbosius redditur, & corruptiones ossis diuturnæ, multis iam ex huiusmodi occasionibus factæ sunt. Sed & si iuxta os non fuerit, verùm ipsa caro mucosa sit: attamen etiam sic recidivæ, ad dolores, aliàs atque aliàs fiunt, si quis forte corpore ægrotaverit. Quapropter deligatione vti oportet bona, simulque multum conueniente, quo ad ea humoris effusio, quæ in contusione facta est, relicet ac resorbatur, locus autem carne sana augeatur, & ossis quoque caro augeat. At quibus ex neglectu vetustatem contraxerit, ita ut locus sit dolorosus, & caro submucosa, his vltio medela optima est. Et si quidem ipsa caro mucosa fuerit, vlque ad os vrere oportet, non tamen ut os percalescat. Si verò inter costas mucositas fuerit, ne sic quidem in superficie vrere oportet, cauere tamen ne in vltiorem partem peruras. Si verò ad os ipsum contusio esse videatur, & sit adhuc recens, & nondum os corruptionem sentiat: si quidem parua admodum fuerit, sic vrere oportet veluti dictum est. Si verò oblonga fuerit iuxta os contusionis eleuatio, plures crustas incutere oportet. Caterùm de corruptione costæ, vnâ

Cum eorum, qui linamentis opus habent curatione, dicitur. Si verò femoris articulus ex coxa exciderit. Excidit autem iuxta quatuor modos, intrò quidem sæpe, foras autem præ aliis sæpe. Verùm in posteriorem ac anteriorem partem excidit quidem, sed raro. Quibus igitur intrò exciderit, his longius apparet crus, si ad alterum comparatur, atque hoc merito, propter duas causas. Nam os quod à coxa procedit, & sursum ad pectinem fertur, fundamentum sit capitis femoris, & articuli ceruix in acetabulo vehitur: & nates forinsecus caux apparent, utpote quum intrò cesserit femoris caput. Et rursus summa femoris pars iuxta genu, extra repere cogitur. Tibia itē, & pes, eodem modo. Quum igitur foras repat pes, medici ob imperitiā, sanum pedem ad hunc adhibent, & nō hunc ad sanum; & propterea multò longius

Femoris articulus quatuor modis excidit.

læsum crus apparet quàm sanum. Multis autem etiã aliis lo-
 cis talia sinistram intelligentiam habent. Nec verò flectere
 iuxta inguen similiter vt sanum possunt. Sed & si femoris ca-
 put in interfœmineo contingatur, palàm extuberare com-
 peritur. Signa igitur hæc sunt, in his quibus femur intrò ex-
 cidit. Quibus igitur articulus elapsus nō fuerit repositus, sed
 aut frustra tentatus est, aut neglectus, his & ambulatio per
 cruris circumuolutionem, velut in bobus fit, & plurima ve-
 xatio ipsis in sano crure contingit: & coguntur iuxta lateris
 mollitudinem, aut iuxta elapsum articulum, mutili ac obli-
 qui esse. Iuxta sanum verò crus, nates ad externam partem
 rotundæ esse coguntur. Si quis enim sani cruris pede extra
 ambularet, protruderet vtique reliquum corpus, vt ad læ-
 sum crus veheretur. Læsum autem vehere hoc non poterit.
 quomodo enim posset? Cogitur igitur sic sani cruris pede
 intro ambulare, & non extra. Ita enim maximè vehit sa-
 num crus, & suam ipsius, & læsi cruris, partem corporis vtrif-
 que incumbentem. Quum autem iuxta lateris mollitudinē,
 ac iuxta articulum cauentur, parui apparent, & baculo in-
 niti coguntur à latere iuxta sanum crus. Hac enim parte ful-
 cimento opus habent. Ad hanc enim & nates repunt, & in
 hac corporis pondus vehitur. Coguntur intem se inclinare.
 Manum enim quæ est à parte cruris læsi, ad obliquū femur
 firmare coguntur. Non enim potest læsum crus vehere cor-
 pus, in crurum permutatione, si non detineatur dum ad ter-
 ram premitur. In his igitur figuris esse coguntur hi quibus
 intrò elapsus, non fuerit repositus articulus, homine non præ-
 meditante vt quàm facilimè sit figuratus. Sed ipsa hæc cala-
 mitas ex præsentibus ea quæ facilima sunt eligere docet.
 Nam & qui vlcus habent in pede aut tibia, non omnes cru-
 re valde ingredi possunt, & infantes sic iter faciunt, extra
 enim ingrediuntur læso crure. Et duplex lucrum conse-
 quuntur. Duplici enim opus habent. Nam & corpus non si-
 militer vehitur in eo crure quod extra ingreditur, sicut in
 eo quod intrò. Non enim secundum rectitudinem ipsi in-
 cumbit pondus, sed multò magis ei quod subingreditur. Ipsi
 enim è directo incumbit pondus, tum in ipsa ambulatione,
 tum in crurum permutatione. In hac enim figura sanū crus
 celerimè supponere poterit, si eo quod læsum est, exterius:
 sano

A sano interius ingreditur. Verum de quo nunc sermo est, Bonum est ut corpus ipsum sibi ipsi facilimas figuras inueniat. Quibus igitur nondum perfectis ad augmentum, elapsus articulus non fuerit repositus, his femur decurtatur, & tibia, & pes. Neque enim ossa similiter in longitudinem augescunt, sed breuiora fiunt. Maxime autem femoris. Ex carne item & emusculatum, ac effœminatum & tenuius totum fit crus, simul quidem propter priuationem loci articuli, simul autem quod eo uti non possunt, eo quod secundum naturam situs non est. Vfus enim aliquis liberat ab effœminatione, liberat etiam aliquantum ab intercepto in longitudinem augmentum. Maxime igitur læduntur hi quibus dum in ventre sunt, hic articulus fuerit luxatus. Secundo loco hi quibus valde infantibus idem contigit. Minimè verò hi qui perfecti sunt. Qualis igitur ambulatio perfectis contingat, dictum est. Quibus verò dum infantes sunt calamitas hæc incidit, plerique ad corporis directionem tardi sunt, imò male ad sanum crus deoluuntur, manu quæ est ad sanum crus, ad terram se fulcietes. Sed & ex perfecta ætatis hominibus quidam, quibus hæc calamitas contigit, ad ambulationem restant cunctantur. Quicunque verò infantes hac calamitate pressi, rectè educati fuerint, sano quidem crure in rectum utuntur, verum sub alam secundum sanum crus scipionem ferunt, aliqui etiam sub utranque alam. Crus autem læsum eleuatum habent, & tanto melius habent, quanto breuius ipsius læsum crus fuerit. Sanum autem crus nihilominus ipsis robustum est, quàm si ambo sana essent.

C Effœminantur tamen omnibus talibus carnes cruris, & plerumque hoc magis perpetiuntur hæc quæ sunt ab externa parte, quàm quæ ab interna. Cæterum quidam fabulantur Amazonides masculam suam sobolem statim dum infantes sunt luxare, aliàs circa genua, aliàs circa coxas, quo nimirum claudi fiant, & masculum genus fœmineo insidias non struat. Utuntur itaque his pro opificibus, ad coriaria, aut fabrilia, aut alia sedentaria opera. An equidem vera hæc sint, ego non noui: quod autem tales fiant, scio, si quis ipsos statim dum infantes sunt luxet. Iuxta coxas igitur magna differentia est, an extra, an intrò fiat luxatio. Iuxta genua verò, differentia quidem aliqua est sed minor. Modus autem utriusque claudicationis propius est. Decurtantur enim magis hi quibus

Ossium co-
auctio.

extra luxatio facta est. Recti autem minus stant, quibus in- **D**
trò luxatio cōtingit. Eodem modo etiam si iuxta malleolum
luxatio fiat, si quidem ad externā partem id contingat, mu-
tuli quidem fiunt, verū stare possunt. Si verò ad internā val-
gi quidem fiunt, minus autē stare possunt. At verò coauctio
ossium talis fit. Quibus quidem circa malleolum tibiæ os
excelsit, his pedis quidē ossa minimē coaugescunt, hæc enim
proximē ad vulnus sunt. Verū tibiæ ossa augentur quidem
non multo defectuosius, carnes tamen minuuntur. Quibus
verò iuxta molleolum manserit articulus secundum natu-
ram, iuxta genu autem excesserit, his tibiæ os similiter coau-
gescere non solet, sed breuius fit. Hoc enim proximē ad vul-
nus est. Pedis autē ossa minuuntur quidem, sed non similiter, **E**
velut paulo ante dictum est, quia articulus circa pedē saluus
est. Si verò ipso etiam uti possent, velut mutilo, minus adhuc
pedis ossa his minuerentur. At quibus circa coxā luxatio con-
tingit, his femoris os non similiter coaugescere solet: Hoc
enim proximē ad vulnus est: sed breuius sano fit. Tibiæ tamē
ossa nō similiter his augmento destituuntur, neq; ossa pedis,
atq; hoc ea de causa, quòd femoris articulus qui ad tibiā est,
& tibiæ articulus qui ad pedem est, in sua natura manet. Car-
nes tamen minuuntur his totius cruris. Si verò uti crure pos-
sent, adhuc magis ossa augerentur, velut etiā prius dictū est,
excepto femore, & minus excarnes essent. Multo tamen mi-
nus carnosī quā hi qui sunt, essent. Argumento autē quòd ta- **F**
lia ita se habent, hoc est. Quicunq; enim brachio elapso, mu-
stellæ cubito præditi sunt, parūmq; ac macilentū brachium
habent, aut ex natiuitate, aut etiā dum augescunt, priusquā
perfecti euadant, galeācones appellati, hi os quidem brachij
breue habent, cubitum autē & summā manum paulo defe-
ctuosiorē quā sani propter relatas causas, eo quòd brachiū
vulnerato articulo proximū est, ut ideo breuius factū sit. Rur-
sus autē cubitus propterea nō similiter calamitatē percipit,
quia brachij articulus qui est ad cubitū, in veteri natura ma-
net. Et rursus manus adhuc longius abest à calamitate quā
cubitus. Propter has igitur causas cōtingit, ut & ossa quæ non
coaugētur, nō coaugescāt, & quæ coaugētur, coaugescāt. Cæ-
terū ad carnositatē & manui & brachio multum profuerit, si
quis manu laborādo se fatiget. Quæcunque enim manuum
opera

A opera sunt, plurima ex ipsis Galeancones hac manu operari conantur, velut altera possunt, & nihilo defectuosius quam cū illæsa efficiūt. Non enim supra manus, velut supra pedes, corpus vehi necesse est. Verū leuia sunt ipsis opera. Propter vsum autem non minuuntur carnes Galeanconibus, neq; circa manum, neque circa cubitum. Sed & brachium propterea aliquam opem sentit ad carnositatem. Quum autem coxa eluxata fuerit ad internā partem à natiuitate, aut adhuc infanti, carnes ideo magis minuūtur quam in manu, quòd crure vti non possint. Quòd autem hæc hoc modo se habeāt, testimonium vnum quoddam in paulo posterius referēdis habebitur. At quibus in exteriorē partē femoris caput excesserit, his crus breuius apparet, si ad alterum extendatur, atq; id merito. Non enim super os fundamētum fit capitis femoris, sicut quum intro excidebat, sed iuxta os quod inclinatam naturam habet in carne humida ac cedente firmatur: & propterea quidem breuius apparet. Intrinsecus autem iuxta plechada; intermediā crurū ac inguinum partem, femur magis mutilum & excarne fit. Nates autē extrinsecus incuruiores, vtpote quum extra femoris caput elapsū sit. Sed & superius apparent nates, vtpote cū caro quæ isthic est, femoris capiti cesserit. Summa verò femoris pars circa genu, intro repere videtur. Tibia item & pes. Sed neque inflectere velut sanum crus possunt. Et signa quidem femoris extra elapsi hæc sunt. Quibus igitur perfectis iam elapsus articulus nō fuerit repositus, his totū crus breuius apparet. In ambulatione autem calcaneo terram pertingere non possunt. Verū pectore pedis in terra consistunt ac progrediuntur, parū autem ad internam partem summis digitis vergunt. At crus læsum in his multo magis corpus vehere potest, quam quibus ad internam partem excidit, partim quòd caput femoris, & ceruix articuli, quum natura obliqua sit, sub multam coxæ partē substitit: partim quòd summus pes non ad externam partem inclinatus esse cogitur, sed propè est ad rectitudinem corporis, & tendit etiā interius. Quum igitur semitam ac callem acceperit articulus, in carne ad quam elapsus est, & caro viscositatem contraxerit, doloris exors progressu temporis fit. Quum autem doloris exors factus fuerit, possunt quidem absq; baculo iter facere, si aliàs voluerint, possunt autem &

Qq 4 vehere

11
vehere corpus supra crus lesū. Itaque propter vsum, carnes D
talibus minus effœminantur, quàm illis de quibus paulo
ante dictum est. Effœminantur autem aut plus, aut minus.
Magisque adhuc effœminantur plerunque iuxta internam
partem, quàm iuxta externam. Plerique tamen ex his calcea
mentum sibi inducere non possunt, propter cruris inflexibi
litate. Quidam verò etiā hoc possunt. At quibus dum adhuc
in ventre sunt, hic articulus fuerit luxatus, aut dū adhuc
augefcunt, vi elapsus, non fuerit repositus, aut etiā præ mor
bo hic articulus excefferit, ac luxatus fuerit: multa enim
huiusmodi fiunt: talium quibusdam si corruptionem sense
rit femur, suppurationes diuturnæ & linamentis indigen
ges fiunt, & aliquibus ossium denudationes. Similiter autem E
& quibus corruptionem femoris os sentit, & quibus non sen
tit, multo breuius fit, & velut sanum coaugefcere non solet.
Tibiæ tamen ossa breuiora quidem fiunt quàm alterius tibi
e, sed paululum, ob causas antea relatas. Ambulare verò ta
les possunt, & quidam ex ipsis eo modo quo perfecti, quibus
elapsus articulus repositus non est, aliqui verò etiam toto
pede consistentes progrediuntur, declinant tamen inter am
bulandum propter cruris breuitatem coacti. Hæc autē hoc
modo fiunt, si diligenter educati fuerint in figuris, & rectē
in quibus oportet, priusquam ad iter faciendum corroborari
fuerint, diligenter item & rectē, postquam corroborati
fuerint. Plurima autem diligentia opus habent hi, quibus
dum maximè iafantes sunt, hæc calamitas cōtigerit. Si enim
neglecti fuerint dum iafantes sunt, inutile penitus, & omni F
augmento priuatum, totum crus euadit, & carnes totius cru
ris magis minuuntur quàm sani. Multo tamē minus his mi
nuuntur quàm illis quibus intro excidit, propter vsum & la
borem, ita vt statim crure vti possint, velut etiam paulo an
te in Galeanconibus dictū est. Sunt autem aliqui, quibus par
tim statim à natiuitate, partim præ morbo, amborū crurum
articuli exciderunt ad externam partem. His igitur ossa qui
dem easdem affectiones habent ac perpetiuntur. Carnes ta
men minimè effœminantur. Sed & Satis carnosæ crura fiūt,
præterquam si quid sanè circa internā partem paululum de
ficiat. Propterea verò Satis carnosæ sunt, quia vtrisque cruri
bus similiter vtuntur. Similiter enim fluctuant hac atque
illac

A illac inter ambulandum : & vehementer eminentibus nati-
bus hi videntur, propter articulorum excessum. Si verò ossa
ipsis corruptionem non senserint, neque gibbosi supra co-
xas fiant: nonnullos enim etiam talia corripunt. Si igitur
tale quid non contigerit, satis sani de cætero durant. Totum
tamen corpus hi minus augescens habent, capite excepto.
At verò quibus in posteriorem partem femoris caput excide-
rit: paucis autem excidit: hi crus extendere non possunt, ne-
que iuxta articulum elapsum, neq; ita valde circa poplitem,
& multo minus quàm hi quibus iamdudum id contigit. Hi
enim magis & circa inguē, & circa poplitem, articulum ex-
tendunt. Illud tamen insuper intelligere oportet: Et enim
commodum, & magni faciendum, & plerisq; ignotum: Quod
B neq; sani articulum circa poplitem extendere possunt, si non
simul extendant etiam articulum circa inguen, præterquàm
si pedem valde sursum attollant. Sic enim poterunt. Hi itaq;
neq; inflectere articulum circa poplitem similiter possunt,
sed multo difficilius, si non etiam articulum circa inguen in-
flexerint. Multa verò etiam alia circa corpus huiusmodi fra-
ternitates ac cognationes habent, & circa neruorum disten-
tiones, & circa musculorum figuras, plurima, & pluris facien-
da ut cognoscatur, quàm quispiam putauerit. Item circa in-
testini naturam, & totius ventris, & circa vterorum errores
ac distentiones. Verùm de his alibi nobis sermo erit cogna-
tus his quæ nunc dicuntur. Sed de quo nunc sermo est, neque
extendere possunt, velut iam dictum est, & brevius crus ap-
C pareret, atque hoc ob duas causas, & quòd non extenditur, &
quòd ad natium carnem elapsum est. Natura enim ossis co-
xæ ea parte est, qua & caput & ceruix femoris existit. Vbi ve-
rò luxatum fuerit, pronum ad externam partem natium de-
fertur. Inflectere tamen possunt, si dolor non prohibeat, & ti-
bia & pes moderatè recta apparent, & neq; hæc, neque illac
multum inclinata. Iuxta inguen verò caro insuper aliquāto
mollior esse videtur, præsertim ad contactum, ut pote articu-
lo ad alteram partem elapso. Ad ipsas autem nates si attrecte-
tur femoris caput, aliquanto etiā magis extuberare videtur.
atque hæc quidem signa sunt, si cui in posteriorem partē fe-
mur excidit. Cui igitur iam perfectò elapsum non fuerit, re-
positum, hic ambulare quidem potest, ubi tempus interces-

serit, & dolor sedatus fuerit, & articulus in carnem versati **D**
 adsuenerit. Cogitur tamen vehementer se inflectere circa
 inguina dum iter facit, atque hoc ob duas causas, tum quod
 multo breuius crus fit, ob ea quæ antea dicta sunt: tum quod
 multum valde abest ab eo, ut calcaneo terram contingat. Si
 enim conaretur vel paululū pede illo vehi, ita ut nihil aliud
 habeat quo se firmet, retro sane corruerit. Magna enim fue-
 rit momenti inclinatio & coxis multum in posteriorem par-
 tem supereminentibus super pedis gressum, & spina insuper
 ad coxas vergente. Vix autem pectore pedis terram attingit,
 & ne sic quidem, nisi ipse se ipsum circa inguina inflectat,
 & altero crure circa poplitem insuper se inflectat. Ob hæc
 autem cogitur, ut manum quæ est secundum latus crus, ad
 supernam femoris partem in singulis gressibus firmet. Co-
 git igitur aliquantum hoc ipsum, ut circa inguina inflecta- **E**
 tur. Nam in permutatione crurum in ambulando, corpus su-
 pra latus crus vehi non potest, si non insuper firmetur crus
 per manum ad terram, nimirum quum non sub corpora ar-
 ticulus subsistat, sed ad posteriorem partem iuxta coxam extat.
 Absq; tamen baculo tales iter facere possunt, si alias adsueue-
 rint, eo quod gressus pedis in vteri rectitudine manet, & non
 ad extremam partem inclinatus est. Quapropter nihil opus
 habent baculi fulcimento. Quicumque tamen pro femoris
 per manum apprehensione, supposito sub alam, quæ ad fini-
 strum crus est, scipione inniti volunt, hi siquidem longiorem
 scipionem supposuerint, erectiores quidem iter faciet, pede **F**
 autem ad terram non innituntur. Si verò pede inniti vo-
 lent, breuior ipsis baculus faciendus est, & ad inguina, ut se
 inflectant necesse fuerit. Cæterum carnium in minutio-
 nes etiam his secundum rationem fiunt, velut antea dictum
 est. Qui enim eleuatum habent crus, & nihil laborant, his
 etiam maximè minuuntur. Si verò plurimo vtuntur ingres-
 su, his minimè minuuntur. Sanum tamen crus nihil inde vti-
 litatis consequitur, sed etiam deformis sit, si laeso crure ad
 terram innitentes vtantur. Illi enim simul inferuiens, & ex-
 tra prominente coxa esse cogitur, & citra poplitem se infle-
 ctere. Si verò quis laeso crure non ad terram vtatur, sed ele-
 uatum habeat, & scipioni innitatur, sic sanum crus robu-
 stum fiet. Nam & in naturali statu degit, & exercitationes
 ipsum

A ipsum corroborant. Possit aliquis dicere, extra medicinam talia esse. Quid enim opus est de his quæ incurabilia iam facta sunt, amplius tractare? At hoc facere multum refert. Eiusdem enim professionis est & hæc cognoscere. Non enim fieri potest, ut inter se dirimantur. Oportet enim curabilia ita tractare, ut ne incurabilia fiant, ea intelligentia ut quàm maximè prohibeamus, ne ad hoc deueniant ut incurabilia reddantur. Oportet autem & incurabilia cognoscere, ut ne maximè lædant. Prædictiones autem splendidae sunt ac gloriosæ ex cognitione, quò & qualiter & quando, singula desinent, siue eo vertantur ut incurabilia fiant, siue curationis spem exhibeant. Quibuscunque verò ex natiuitate, aut dum adhuc aliàs augescunt, ita elapsus fuerit articulus, & non repositus, siue ex violentia elapsus sit, siue præ morbo: Multæ enim huiusmodi luxationes fiunt in morbis: Qui verò sint hi morbi, in quibus articuli elabuntur, postea scribetur: Si itaque elapsus non fuerit repositus, femoris quidem os breue fit, affligitur autem totum crus, & augmento destituitur, & multo magis excarne fit, eo quòd ipso non utantur. Nam & articulus circa poplitem his affligitur. Nervi enim ob ea quæ antea dicta sunt intenduntur. Quare articulum circa poplitem extendere non possunt hi quibus hoc modo coxa excidit. Ut enim in summa dicam, Omnia quæ in corpore ad usum facta sunt, si quis moderatè ipsis utatur, & in his laboribus exerceat, ad quos singula sunt adsueta, sic quidem sana sunt, & augescunt, & probè consenescent, Si verò quis non utatur, sed quiescat, morbosiora fiunt, & non augescunt, & cito consenescent. Inter hæc autem non minimè perpetiuntur hoc & articuli, & nervi, si quis non ipsis utatur. Propter has igitur causas, magis in hoc luxationis modo quàm in aliis affliguntur. Totum enim crus & in ossium, & in carnum natura, augmento destituitur. Tales igitur ubi iam in viros euaserunt, eleuatum ac inclinatum crus hoc habent, altero verò vehuntur baculo innitentes, aliqui vno, aliqui duobus. Quibus porro in anteriorem partem femoris caput elapsus fuerit: paucis autem hoc contingit: hi extendere quidem eius perfectè possunt, inflectere autem se minimè hi possunt circa inguen. Affliguntur autem etiam, si circa poplitem se inflectere coguntur. Longitudo

Articulus
cum repositus
non fuerit.

Femur ant-
riorum e-
lapsum.

gitudo verò cruris confimilis apparet, & circa calcaneum **D**
 quidem valde. Verùm summus pes aliquanto minus in an-
 teriorem partem prominere solet. Totum autem crus recti-
 tudinem habet secundum naturam, & neque hanc, neque il-
 lac vergit. Caterùm hi statim dolore corripuntur maxi-
 mè, & vrina imprimis supprimitur, aliquanto magis quàm
 in aliis luxationibus. Caput enim femoris proximè his in-
 cumbit ad præcipuos nervos, & circa inguen quidem extu-
 berantes videtur, & locus extentus apparet, Verùm circa na-
 res rugosior, & maximè excarnis. Atque hæc quidē quæ re-
 lata sunt, signa sunt eorum quibus ita femur excidit. Qui-
 buscunque igitur viris iam factis, hic articulus elapsus, non
 fuerit repositus, hi vbi dolor ipsis sedatus fuerit, & articulus **E**
 in eo loco in quem excidit versari adsueuerit, statim ferè re-
 cti ambulare possunt, absque baculo, & valde quidem recti,
 vtpote quum ad læsum crus, neque circa inguen, neque circa
 poplitem, facile se flectere possint. Propter inguinis itaque
 inflexibilitatem, rectiore toto crure in ambulando vtuntur,
 quàm quum sani essent. Sed & aliquando ad terram pedem
 trahunt, vtpote quum supernos articulos non facile infle-
 ctant, & toto pede ingrediuntur. Nihilominus hi cal-
 caneo ingrediuntur, quàm anteriore pedis parte. Si verò ma-
 gnis gressibus progredi possent, etiam valde calcaneo insi-
 stentes progredierentur. Nam & sani quāto minoribus gres-
 sibus iter faciunt, tanto magis calcaneo ingrediuntur, alte- **F**
 rum pedem deponentes, contrarium eleuantes. Quibus-
 cunque itaque hoc modo excidit, adhuc etiam magis calca-
 neo terram contingunt, quàm anteriore pedis parte. Ante-
 rior enim pedis pars, vbi reliquum crus extensum fuerit, nō
 similiter in anteriorem partem inflecti potest, sicut vbi crus
 fuerit inflexum: Neque rursus sinuari pes potest crure infle-
 xo, sicut vbi crus fuerit extētum. Sana igitur natura hoc mo-
 do est, veluti dictum est. Quum verò elapsus articulus repo-
 situs non fuerit, sic iter faciunt, velut dictum est, ob prædi-
 ctas has causas. Magis tamen excarne crus fit quàm alterū,
 & iuxta nares, & circa suram, & iuxta posteriorem rectitudi-
 nem. At verò quibus dum adhuc infantes sunt, articulus sic
 elapsus, nō fuerit repositus, aut etiam à natiuitate ita habue-
 rint, & his femoris os aliquāto magis minuitur, quàm tibiæ
 aut ped

- A** aut pedis ossa. Et minimum quidem in hoc luxationis modo femur minuitur. Carnes tamen vndique minuuntur, maxime circa posteriorem rectitudinem, quemadmodum etiam prius dictum est. Quicumque igitur recte educati fuerint, hi ubi augescunt, crure uti possunt, breuiore aliquantulum existente quam altero, ita tamen ut baculo innitatur ea parte qua laesum crus est. Non enim absque calcaneo, pedis pectore admodum uti possunt, ut in id innitantur, quemadmodum in aliis claudicationibus aliqui possunt. Causa vero cur non possint, ea est quae paulo ante relata est. Ob id igitur baculo insuper opus habent. Qui vero neglecti fuerint, & crure ad terram non utuntur, sed eleuatum id habent, his minuuntur quidem ossa,
- B** ubi augescunt, magis quam his qui eo utuntur. Minuuntur autem & carnes magis multo quam his qui utuntur. Verum circa articulos in directum mutilatur his crus aliquanto magis, quam quibus alio modo luxatio facta est. Quo igitur in summa dicatur, Articuli excident ac qui luxantur, inaequaliter inter seipsum excidunt ac luxantur, aliquando multo plus, aliquando multo minus. Et quibus quidem multo plus luxati aut elapsi fuerint, his omnino difficilius reponuntur. Et si repositi non fuerint, maiores & manifestiores mutilationes ac afflictiones tales habent, & ossium, & carnum, & figurarum. Vbi vero minus exciderint & luxati fuerint, tales facilius quam alij reponi possunt. Si vero frustra tentati, aut neglecti fuerint, minores ac minus noxae mutilationes his sunt, quam
- C** illis de quibus paulo ante dictum est: Reliqui igitur articuli etiam valde multum differunt ad hoc ut aliquando minor, aliquando maior luxatio fiat. Verum femoris & brachij capita, quam simillime inter se utraque excidunt. Nam capita prout rotunda sunt, simplicem & caluam rotunditatem habent. Orbiculatiores autem sinus sunt, qui capita excipiunt, capitibus tamen ipsis congruentes. Quapropter fieri non potest ut dimidium articuli ex ipsis elabatur. Nam ob rotunditatis circumferentiam, aut ad externam, aut internam partem luxari poterit. Sed de quo nunc sermo est, perfecte excidunt, nam alioqui non excidunt. Attamen & hi aliquando plus, aliquando minus, a naturali statu profiliunt, & femur aliquanto magis quam brachium patitur, Nam aliqua etiam ex his luxationibus quae a natiuitate sunt, si parum elapsae fuerint, ad naturalem

rum reduci possunt, & maximè articuli circa pedē. Quicun- **D**
 que à natiuitate mutili fiunt, pleriq; ex his curabiles sunt, si
 non valde magna emotio facta fuerit, aut etiam præuictis
 iam pueris contigerit. Optimum igitur est vt talia quàm ce-
 lerrimè curentur, priusquàm valde magnus ossium defectus
 fiat, & priusquàm admodum magnus carniū defectus circa
 tibiam contingat. Modus itaq; mutilationis nō vnus est, sed
 plures. Plurima quidem eluxata non sunt penitus, sed per fi-
 guræ cōsuetudinem, in quadam pedis interceptione mutila-
 ta. Animaduertendum autem in horū curatione est, vt tibiæ
 circa malleolum os, quod extrinsecus est, ad internā partem
 detrudatur ac dirigatur, & calcanei os quod è directo illi
 subiaceret, ad externā partem retrudatur, quo ossa quæ eminet **E**
 sibi ipsis occurrant iuxta medium ac obliquum pedem. Digi-
 ti verò aceruati vnā cū magno digito ad internam partē in-
 clinentur, atque ita circuncirca cogantur. Probè autem deli-
 gare oportet cerato resinato, & spleniis, & linteis mollibus
 nō paucis, neq; nimis compressis, atq; ita deligationis circun-
 ductiones facere, velut etiam manibus directo pedis fiebat,
 quo pes paulò magis ad valgum vergere videatur. Soleam
 etiam quandā facere oportet, aut ex pelle nō nimis dura, aut
 è plumbo, eāmq; insuper alligare nō ad corpus positam, sed
 vbi iam postremis linteis deligare voles. Quū verò iam deli-
 gatus fuerit, vnus alicuius linteī ex his quibus deligatur, ini-
 tium, ad deligamēta quæ infra pedem sunt assuere oportet, **F**
 è directo parui digiti, & postea sursum extendere, ita vt mo-
 deratè habere videatur, atq; sic supra suram circundare, quo
 sic extantum ac collocatum stabile maneat. In summa, quasi
 quis ceramingat, ad naturā iustam adducere oportet, ita vt
 & inclinata, & distenta præter naturam, & manibus sic diri-
 gamus, & similiter deligatione adducamus autem non vio-
 lenter, sed leniter. Assuere verò ita oportet lintea, vt cōducant
 ad reparationes ac appensiones faciendas. Aliæ enim clau-
 dicationem alia reparatione ac appensione opus habent. Cal-
 ceum insuper plumbeū facere oportet, extra deligationem
 adalligatum, qualem modulum crepidæ chiæ habebunt. Ve-
 rùm nihil ipso opus est, si quis & manibus rectè direxerit, &
 linteis rectè deligauerit, & appensiones ac reparationes per
 assuta lintea rectè fecerit. Atque hæc quidem est curatio, &
 neque

A neque sectione, neq; vstione, neque alia varietate quicquam opus habet. Citius enim talia medicinae obtēperant, quam quis putarit. Deuincire tamen tempore oportet, donec in iustis figuris corpus auctū fuerit. Vbi verò calcei ratio habenda est, Arbylæ lutigrade, calceamēti ita appellati species, accommodatissimæ existunt. Hoc enim calceamentū minimè à pede superatur, sed potius ipsum superat. Idoneus est etiā creticus calceamentorum modus. At verò quibus tibiæ ossibus luxatis, ac vlcere indulto, articuli circa pedem penitus eminent, siue intrò vergant, siue extra, tales reponere non oportet, sed permitttere vt quicunque velit medicus reponat. Illud enim clarè scire oportet quòd homo morietur, si repositi permanserint. Sed & vita paucorum dierū his continget. Pauci enim ex ipsis septimū diem transgrediuntur. Conuulsio enim est quæ ipsos occidit. Sed & cancerari contingit tibiā ac pedē. Hæc ita futura esse certo scire oportet. Et neque veratrum mihi videtur profuturū esse, & eadem die datum, & rursus epotum: proximè autem si quicquā huiusmodi facit, non tamen mihi hoc videtur. Si verò repositi nō fuerint, & ne tentati quidem ab initio, pleriq; ipsorū superstitēs euadunt. Sic autem & tibiā & pedem coaptari oportet, prout ipse volet, modò non sint dependentia, aut commota. **Curatio.** Curatio verò faciendā est cerato picato, & spleniis vino imbutis paucis nō valde frigidis. Frigiditas enim in talibus conuulsione accersit. Idonea etiam sunt folia betarum, aut tussilaginīs, bechij appellatæ, aut alicuius alterius huiusmodi, in vino nigro austero semicocta ac imposita. Et faciendā est curatio super vlcus, & super partes adiacentes, Et cerato tepido ipsum vlcus illinendum. Si verò hyemis tēpus fuerit, etiā lanæ succidæ vino ac oleo tepidis imbutæ supernè ipsum madesfaciant. Deligatio verò nulla, neque vllum cataplasma adhibendum est. Probè enim nosse conuenit, quòd compressio ac omnis oneris gestatio, talibus omne malū affert. Accommodata autē sunt ad talia, & ex emplastris aliqua quæ cruentis vulneribus destinata sunt, quibus videlicet ex ipsis cōfert, vt lanæ superimpositæ vino madesfiant, & multo tempore sinantur. Quæ verò ex illis cruētis emplastris, paucissimis diebus incumbere dehent, & quæ resina comprehenduntur forinsecus adiecta, non similiter vt illa idonea sunt: diuturna enim

Tibiæ ossa
luxata.

Curatio.

enim fit horum vlcerū purgatio, quum multo tempore ma- D
dore abundant. Quosdam tamē ex his deligare, bonum est.
Verū illud clarē nosse oportet, quod necesse est hominem
turpiter claudum fieri. Nam pes in talibus in supernā partē
retractus est: & ossa luxata, extra eminētia apparent. Neque
enim vllum ex talibus ossibus plerunque denudatur, nisi le-
uiter aliquantum: neque abscedit, sed tenuibus ac debilibus
cicatricibus circumducitur: atq; hoc si multo tempore quie-
uerint: Sin minus, periculum est ne vlcusculum immedicabi-
le relinquatur. Verū de quo sermo est, qui sic curantur, ser-
uantur. Si verò repositus fuerit articulus ac permanferit, mo-
riuntur. Eadem ratio est, si etiam cubiti ossa circa manus ar-
ticulum vlcere facto emineāt, siue ad internam manus par- E
tem, siue ad externam. Clarē enim nosse id oportet, quod is
moriatur intra paucos dies tali morte, qualis antea dicta est,
cui reposita ossa permanferint. Quibus verò reposita nō fue-
rint, neque repositio tentata est, hi multò plures superstites
manēt. Curatio autem eiusmodi etiā talibus commoda est,
qualis iam dicta est. Figuram verò claudicationis turpē esse
necesse est, & digitos manus debiles ac inutiles. Sin enim ad
internā partem ossa laxata fuerint, digitos inflectere non po-
test. Si verò ad externam, extendere nequit. Quibus verò
tibiæ os facto vlcere, circa genu eminuerit foras, siue ad ex-
ternā partem siue ad internā, his si quis reponat, adhuc prom-
ptior mors adest quā aliis, etiam si etiam illis prompta ade-
rat. Si verò omīssa repositione medearis, spes quidem salutis F
hoc solo modo existit. Verū periculosa hęc ossa sunt, quan-
to superiora ac robustiora sunt, & à fortioribus elapsa. At
si os femoris quod ad genu est, vlcere facto elapsum fuerit
& repositū permanferit, mortē adhuc violentiorē citius in-
duxerit quā prius relata. Si verò repositum non fuerit, lon-
gē magis periculosum est quā priora. Sola tamē hęc salu-
tis spes est. Eadē verò ratio est, & de articulis circa gibbū cu-
biti, & de cubito ac brachio. Quęcunque enim ex his luxa-
ta, vlcere facto eminuerint, ea omnia si reposita fuerint mor-
tem inducunt: non reposita, spem salutis: claudicationem ve-
rò superstitibus. Lethaliores autē sunt superiores articuli, si
reponantur. Sed & si non reponantur, periculosiores iidem
sunt. Si verò alicui superiores articuli luxati, facto vlcere
emineant

Ostibia
eminens.

O, femoris
quā peri-
culosum.

A emineant, hi & si reponantur celerrimam mortem inducunt: & si non reponantur, periculosiores sunt. Curatio verò iā re- **Curatio.**
lata est, quæ mihi accommodatissima esse videtur. At verò qui
bus articuli digitorum aut pedis, aut manus luxati, facto vl-
cere eminuerint, osse nō fracto, sed circa ipsam connexionē
auulso, his si repositi permanferint, adest quidem periculum
conuulsionis, si non bene curati fuerint: at tamen operæ pre-
cium est vt repositio fiat, cum prædictione quòd multa cu-
stodia ac cura opus habet. Reponere verò facilimum est, ef-
ficacissimūq; ac artificiosissimum per vesticulū, velut etiā
antea dictū est in fractis ac eminētibus ossibus. Postea quie-
scere quā maximè conuenit, & decumbere, ac pauco cibo
B vt. Melius est & pharmaco sursum purgāte leui aliquo vt.
Vlcus verò curare oportet, aut cruentis emplastris quæ ma-
desiūt, aut polyophthalmi siue buphthalmi foliis impositis,
aut quibus ossa in capite fracta curantur. Nihil autem valde
frigidum adhibere. Minimè igitur primi articuli periculosi
sunt. Superiores autem periculosiores. Reponere verò opor-
tet eadē die aut postridie: Tertio ac quarto minimè. Quarto
enim die maximè recrudescere solent. Quibus autem nō sta-
tim repositi fuerint, in his dictos dies transgredi. oportet.
Quicquid enim intra decem dies repositum fuerit, omne id
continetur. Si verò reposito osse conuulsio accedat, articulū
statim eiicere oportet, & calida quā sapissimè humectare,
& totum corpus, & præsertim circa articulos, calidè & leni-
C ter ac molliter tractare. Verū inclinātū magis quā ex-
tentum totum corpus esse oportet. Expectandū tamē est ar-
ticulos circa digitos qui reponuntur abscessuros esse. Plerū-
que enim ita contingit, si vel quæuis inflāmatiō subsit. Qua-
re si non propter vulgi imperitiā, modico verēda esset ac-
cusatio, nullum penitus reponere oportebat. Atque ad hunc
modum periculosa sunt ossa, circa articulos eminētia foras,
si reponantur, quemadmodum dictum est. Quæcūque verò
circa articulos digitorum penitus resecātur, ea plerūq; in-
noxia sunt, si nō quis in ipsa vulneratione ex animi deliquio
lædatur. Et curatio vulgaris talibus vlceribus sufficit. Sed &
quæ nō circa articulos sed iuxta aliam quandam ossium re-
ctitudinem resecantur, & hæc innoxia sunt, & adhuc aliis cu-
ratu facilia. Ex quæ iuxta digitos ossa fracta extra eminēt,
R r non

non ad articulum, & hæc si reponantur, innoxia sunt. At re- **D**
 sectiones ossium perfectæ circa articulos, & in pede, & in ma-
 nu, & in tibia ad malleolos, & in cubito ad iuncturâ manus,
 plerisq; quibus refecantur innoxie sunt, si non statim animi
 deliquiū euertat, aut quarta die febris cōtinua accedat. Cor-
 ruptiones tamen carniū contingunt, & in vulneribus san-
 guifluis fientibus, & vehemētibus cōstrictionibus, & in ossiū
 fracturis magis quàm oportet compressis: & aliis vinculis
 violentis intercepta plerisq; decidunt. Et plerique ex talibus
 superstites euadunt, & quibus femoris pars aliqua & carniū
 & ossis decedit, & quibus brachij pars (Minus autem si cubi-
 ti aut tibiæ pars deciderit) & amplius facilè ferentes super-
 stites euadūt. Quibus igitur fractis ossibus corruptiones sta- **E**
 tim fiunt, & denigrationes, his abruptiones corporis celeres
 circūcirca fiunt, & decidentia cito decidunt, vt cū ossa iam
 antea remiserint emollita. Quibus verò dum ossa sana sunt,
 denigrationes fiunt, carnes quidem etiā his cito moriuntur,
 ossa verò tardè abscedūt, qua parte termini sunt denigatio-
 nis, & ossis nudatio extat. Oportet autē partes corporis quæ
 cunq; infra terminos denigrationis sunt, quum iam penitus
 mortuæ fuerint, & doloris exortes, iuxta articulum auferre,
 prouidendo vt ne vulneret. Si enim is cui resectio fit, dolore
 affectus fuerit, & corpus nōdum mortuū fuerit ea parte qua
 refecatur, magnum periculum est ne præ dolore animi deli-
 quium incidat. Talia verò animi deliquia multos iam euesti **F**
 gio peremerunt. Femoris itaque os tali modo denudatum
 octogesimo die abscedere vidi. Tibia tamen huic homini cir-
 ca genu vigesima die ablata fuerat, aut vt mihi videbatur
 etiā citius. Non enim simul, sed ad maiorē prouidētiam fa-
 cere quid mihi visum fuit. At tibiæ ossa ex eiusmodi deni-
 gratione circa mediā tibiā, sexagesimo die mihi deciderunt,
 quæcunq; ex ipsis fuerunt denudata. Differt equidem & cu-
 ratio à curatione, ad hoc vt ossa denudata citius aut tardius
 decident. Differt etiam cōpressio à compressione, prout ve-
 hementior aut debilior fit, ad hoc vt citius aut tardius nervi
 denigrati emoriantur, carnes item & arteriæ ac venæ. Nam
 quæcunq; non vehementer intercepta moriuntur, ex talibus
 quædā ad ossium denudationes non perueniūt, sed magis in
 superficie decidunt. Propter has igitur causas, non vnum nu-
 meri

Ameri nomen tēpori poni potest, in quāto singula ex his iudicantur. Assumere verò valde oportet tales curationes. Sunt enim magis horrēdi aspectus quā curationis, & curatio lenis omnibus talibus sufficit. Ipsa enim seipsa solū iudicāt: & circa victū diligentia adhibere oportet vt pro viribus febris exors sit: & in iustis figuris corpus collocare. Iustæ autem hæ sunt, vt neq; sublimius eleuatum sit neq; deorsum repat. Sed magis praterea sursum vergat, donec perfectè fuerit circum circa abruptū. Nam in hoc tempore sanguinis eruptionū periculum imminet. Ob id igitur vulnera deorsum repetia facere non oportet, sed vice versa. Alioqui vbi tempus ampliùs accesserit, & vlcerà pura facta fuerint, non ampliùs hæ figuræ cōmodæ sunt, sed positio recta, & aliquando deorsum repentes. Temporis enim progressu quibusdā horum oris dissections fiunt, & subligaminibus opus habent. Expectare tamen oportet, vt tales per tempus à dysenteria corripiantur. Nam in plerisq; denigrescentibus dysenteria accedit, & in sanguinis eruptionibus ex vlceribus. Accedit autem iudicatis iam denigrationibus ac sanguinis eruptione, & procedit quidē large ac vehementi impetu, sed nō ad multos dies durat, neque lethalis est. Neq; enim valde cibum auersantur tales, neque aliàs vasa vacua facere conducit. Femoris porò

Femoris luxati repositio.

Ctationis habēs, si quis talium rerum iactatione superbire velit. Ex pedibus hominē ad transuersam mediæ domus trabē suspendere oportet, vinculo forti, sed molli ac lato, ita vt pedes quatuor digitorū spatium, aut minus, inter se distantes habeat. Sed & supra genua latum ac molle lorum circūdatum esse oportet, quod itē ad trabem illam extendat. Crus autem læsum duobus digitis ampliùs quā alterum extensum esse oportet. A terra verò absit caput ad duorum cubitorum spatium, aut paulò plus, aut minus. Manus autē iuxta latera extentæ, aliquo molli sint alligatæ. Omnia verò hæc supino iacenti ipsi præparentur, vt quā breuissimo tēpore pendeat. Postquā verò suspensus fuerit, virum peritum & non debilem immisso inter femora cubito ita agere oportet, vt cubitum inter caput femoris elapsum, & inter femineū locum-

R r 2 que

que inter anum ac pudendū ponat, & postea altera manu ad D
illam interpositā coniuncta, rectus astans ad suspēsi corpus,
derepente se appēdens sublimis quā æquabilissimè depen
deat. Hæc repositio omnia quibus secundum naturam opus
est exhibet. Nam & ipsum corpus suspensum sua ipsius gra
uitate extensionem facit: & is qui appendet, vnā cum exten
sione, femoris caput super acetabulum eleuari cogit, simulq;
cum cubiti osse, velut cum veste molitur ac cogit, vt ad pri
stinam naturam relabatur. Oportet autem vincula omnino
bene constructa esse, & curare vt fortissimus sit is qui se ap
pendit. Quēadmodum igitur etiā antea dictum est. Magna
est differentia naturarum in hominibus, ad hoc vt vel facilè,
vel difficulter repositio fiat. Et cur magna sit differentia di E
ctum est antea, vbi de humero egimus. Quibusdam enim fe
mur rursus incidit nullo adhibito apparatu, sed ex modica
extensione, quantum manibus directio fieri potest, & ex leui
cōmōtione. Multis autem qui crus iuxta articulū inflexerūt,
iam facta circūagitatione rursus incidit. At multò plura vul
gari cuilibet apparatui non obtemperant. Quapropter scire
quidē oportet de singulis optima in omni arte, vtī verò his
quæ singulis vicibus idonea visa fuerint. Relati igitur sunt
extensionum modi etiā in superioribus, vt quis vtī possit ex
his qui fortè affuerint. Oportet enim in cōtrarias partes fie
ri extensionē vehemēter, in alteram, cruris: in alterā, corpo
ris. Si enim probè extensio facta fuerit, femoris caput supra
pristinā sedem eleuabitur. Et si quidē ita super eleuatum fue F
rit, ne prohibere quidē facile sit, quo minus ipsum in suā sedē
insideat. quare omnis iam vestis molitio ac directio suffi
cit. sed enim in extēsiōne deficiūt, & ob id maiorē turbatio
nem exhibet repositio. Oportet igitur non solū iuxta pedem
vincula alligata esse, sed etiā supra genu, quo non magis cir
ca articulum sit deligatio in extēsiōne, quā circa coxæ ar
ticulum. Sic igitur extēsiōne ad pedis partē præparatam fa
cere oportet. Sed & in alterā partem extensionē, non solū
ex deligatione circa pectus & alas, in contrarium extendere
oportet, sed etiā loro longo, duplicato, robusto, leni, circa in
terfœmineum inserto. & à posteriore parte ad spinam porre
cto, ab anteriore verò ad clauiculam tendente, ibiq; ad alte
rum initiū alligato, ita coactionē facere oportet, vt alij hinc,
alij

A alij illinc extensionē faciant, ita tamen vt lorum circa interfœmineū, non super femoris caput porrectū sit, sed inter caput & interfœmineū. Verūm inter extendendū pugno ad femoris caput quis innixus, id ad exteriorē partē propellat. Si verò is qui trahitur eleuetur, iniecta manu, & cū altera manu cōiuncta simul deorsum trahat, simulq; ad externā partē cogat. Alius verò quispiā partē femoris ad genu, placide ad internam partē dirigat. Dictum autem est etiā antea, operæ precium esse vt si quis in vrbe populosa medicinā exerceat, lignū possideat quadrangulare sex cubitorum, aut paulo minus latitudine bicubitali: crassitudo autē sufficit dodrantalis. Id secundū longitudinē hinc atq; illinc sectionē incisam

B habere oportet, vt ne altior quā oportet machinatio fiat deinde postes aselli breues, robustos, vtrinq; inaptatos habere. Postea sufficit quidē in dimidia ligni parte, nihil tamē vetat etiā per totum, velut fossas longas quinq; vel sex, quatuor digitorū spacio inter se distantes, incisas esse: & satis est vt sint hę & latitudine & profunditate triū digitorū. Habere etiā in medio hoc lignū debet excuationē profundiorē quadrangulā trium digitorū quo in hanc excuationē, vbi opus esse visum fuerit, lignū cavitati congruum infigatur, quo supernē sit rotundū. Infigendū autem hoc est, si quādo conducere visum fuerit, inter caput femoris & locū inter anum ac pudendū. Hoc lignū erectum stans prohibet ne cōcidat corpus, dū à pedibus extēditur: Quādoq; enim hoc ipsum lignū sufficit pro extensione in contrariū supernē faciēda. Aliquādo etiā dum hinc atq; illinc crus extēditur, hoc ipsum lignū hac vel illac laxum incūbens cōmodum ad hoc fuerit, vt instar vectis, caput femoris ad externam partem extrudat. Ob hoc enim etiam fossę incisę sunt, quo in quibuscunq; ex ipsis cōgruū id facere fuerit, vectes ligneus immissus molitionē faciat, aut circa articularū capita, aut ad ipsa penitus capita infixus, vnā cū extensione, siue ad externā partē, siue ad internam, molitionē facere expedierit: siue etiam rotūdum vectē esse conducat, siue latū, alius enim alij articulo conuocit. Cōmoda autē est in omniū articularum cruris repositione, hęc per vectes molitio vnā cū cōcussione. Verūm de quo nunc sermo est, teretē ac rotundum vectem esse conuenit. Ex his machinis ac coactionibus, nō videtur mihi fieri posse vt

Hippocratis Liber

vilius articuli repositio frustra tentetur. Inuenire tamē quis **D**
 possit etiam alios modos repositionis huius articuli. Si enim
 lignū hoc magnū, habeat in medio à lateribus duos postes
 pedales, eius altitudinis, quæ cōferre videtur, alterum hinc,
 alterū illinc. Deinde lignū transuersum, velut scalæ gradus,
 postibus impositū sit: atque ita sano crure inter postes trans-
 misso, lesū crurē suprà gradum adaptatū habeat. Verū ad al-
 titudinem, & ad articulum qua parte excidit faciliē quiddam
 adaptare oportet. Gradum enim moderato altiore facere
 oportet, & stragulum multiplex prout congruum fuerit, sub
 corpus subextendere. Deinde lignum moderatam latitudi-
 nem ac longitudinem habens, sub crure ad malleolum vsque **E**
 extentū esse oportet, quōd vltra femoris caput, quātum eius
 fieri potest porrigatur, & ad crurē alligetur quotiescūq; opus
 fuerit, vt moderatē habeat. Postea dū extenditur crurē, siue li-
 gno pistillo formi, siue aliqua alia ex his extensionibus, crurē
 simul circū gradū vnā cū alligato ligno, deorsum cogere o-
 portet, ita vt aliquis supra articulū iuxta coxam hominē de-
 tineat. Hoc enim modo simul & extēsiō femoris caput su-
 per acetabulū attollet, simulq; mollitio femoris caput in pri-
 stinā naturā detrudet. Hæ omnes relatæ necessitates ac co-
 actiones fortes sunt, & omnes calamitate superiores, si quis re-
 ctē ac bene præparet. Quemadmodum autē etiam antea di-
 ctum est, à longē debilioribus extēsiōibus, & viliore appa-
 ratu plerisq; rursus incidit. At verō si ad externam partē fe-
 moris caput luxatū fuerit, extensiones quidē hinc atq; illinc **F**
 facere oportet, eodē modo velut dictū est. Verū molitionē
 cum veste lato, vnā cum extēsiōe facere cōuenit, ab externa
 parte ad internā cogendo, ita vt ad ipsas nates, & paulo supe-
 rius vestē adhibeas. Ad sanam verō coxā iuxta nates aliquis
 manibus renitatur, vt ne cedat corpus: aut alio quopiam hu-
 iusmodi veste submisso, & ex fossa conueniente fulcito con-
 tra obnitatur. Partē autē femoris luxati quæ ad genu est, ab
 interna parte foras placide abducatur. Cæterū suspēsiō in hoc
 modo luxationis articuli non conuenit. Cubitus enim eius
 qui se appendit caput femoris ab acetabulo propellit. Moli-
 tionem tamen cū ligno subiecto, ita quis adaptare possit, vt
 hinc luxationis modo conueniat, si forinsecus adhibeat. Sed
 quid opus est plura dicere? Si enim rectē, extēsiō fiat, & rectē
 per

Apet vestes molitio cōtingat, quī articulus hoc modo elapsus nō reponi possit: At si in posteriorem partē femur exciderit, extēSIONES & in diuersum tēSIONES ita facere oportet, velut dictum est, ita tamen vt super lignum multiplex stragulum infertatur, quo mollissimum sit, & homo pronus reclinetur ac sic extendatur. Verū vnā cum extensione, etiā tabula deorsum cogere oportet eodē modo veluti gibbositates, ē directo natium tabula collocata, aut magis ad infernam quā ad supernā coxarū partem, & incisura in pariete ad tabulā excipiendā non recta sit, sed paululum decliuīs ad pedū partem. Hac repositio maximē secundum naturā est huic luxationis modo, & simul fortissima. Suffecerit autem fortassis pro tabula, vt aliquis infideat, aut manibus innitatur, aut inscendat derepente, simulq; cum extensione incūbat. Nulla verò alia ex relatis repositionibus secundū naturā est huic luxationis modo. Si verò in anteriore partem elapsus fuerit, idem quīdem modus extensionū faciendus est. Verū virū & manibus validissimū, & aliās peritissimū, vola manus alterius circa inguina firmata, & altera manu insuper iniecta, simul luxationem deorsum propellere, simulq; femoris partem quæ ad genu est ad anteriore partem compellere oportet. Hic enim modus repositionis, huic luxationi maximē secundum naturā est. Sed & suspensio finitimum quid secundum naturam habet. Oportet tamen eum qui se appendit peritum esse, vt ne cubito articulum excutiat, sed circa medium inter anum ac pudendum locū, & iuxta os sacrū se appendat. Laudatur etiā is qui per vtrē hunc articulū reponere conatus est. Et iam sanē aliquos vidi, qui prę imperitiā, etiā extra & retro luxatos, per vtrē reponere conabātur, nō animaduertentes q̃ magis ipsum eiicerent quā reponerēt articulū. Nā qui primus excoGITAVIT, haud dubiē ad intrō elapsos articulos, per vtrē repositionem tētauit. Nosse igitur oportet q̃ alia multa vtre sunt potiora. Oportet autē vtre non inflatum infra femora ponere, quantū fieri potest supremē ad locū inter anū ac pudendum adductum: & facto à patellis genu initio, femora per fasciam vsq; ad mediā femorum partē deligare, deinde in partem vtris solutam folle ex officina fabri immisso inflare, & vtrē cogere vt distēdatur. Hominē verò in latus decumbere oportet, & læsum crus supernē habere. Atq; hic quidē est ap-

Rr 4 parat

Hippocratis Liber

paratus: sed plerique; peius præparant quam ego nunc dixi. Non enim deligant femora ad multam partem, sed solum genua, & non insuper extendunt, est autem insuper extensio quoque facienda. Attamen aliqui iam reposuerant, facile rem assequuti. Non autem ita facile est coactionem hoc modo perficere. Nam & vter, dum inflatur, tumidissimas partes suas ad articuli caput non habet, quod maxime emoliri oportet: sed inferius ipso, medius ipse locatus est circa media femora, aut adhuc inferius: & rursus femora ipsa natura sunt curua. Supernè enim carnosa sunt, & inter se sociata. Infernè verò sicca, ut etiam natura femorum vterem ab opportunissimo loco repellat. Si verò quis paruum vterem imponat, fieri non potest ut paruum robur articulum cogat. Si itaque; vtre vti velis, femora inter se ad multam partem colliganda sunt: & vità cum corporis extensione vter inflandus est. Crura verò ambo deligenda sunt usque; ad finem in hoc repositionis modo. At verò in vniuersa arte hoc plurimi facere præ omnibus oportet, ut id quod agrotat sanum facias. Si verò multis modis fieri possit sanatio, ut cum qui minime molestus est eligas. Nam & virum bonum, & artis peritum, hoc declarat, qui populo imponere non studeat. Verum de quo nunc sermo est. Tales quædam sunt familiares extensiones corporis, ut ex his quæ adsunt expedita ac facilis reperiri possit. Nam si vincula ex loris mollia ac lenia non affuerint, sed aut ferrea, aut funes nautici aut domestici, fasciis aut paniculis laneis ea maxime parte amplius obuoluere oportet, qua vincula detentionem factura sunt, atque ita F vinculis deligare. Deinde in lecto robustissimo & ex præsentibus maximo. hominem bene extendere oportet, hoc modo. Lecti pedes qui ad caput sunt, aut à pedibus, ad limen ianuæ, intus aut foris prout commodum fuerit firmentur. Ad alteros autem lecti pedes lignum quadrangulare transuersum obiciatur, ita ut à pede ad pedem pertingat. Et si quidem tenue fuerit lignum, ad pedes lecti deligetur. Si verò crassum, non est opus. Deinde initia vinculorum, & eorum quæ à capite sunt, & eorum quæ à pedibus, vtraque; alligentur ad pistillum, aut ad aliud huiusmodi lignum: ita ut è directo corporis sint, aut paulò superius. Moderatè verò extendantur ad pistilla erecta consistentia, quorum alterum ad limen, alterum ad lignum obiectum firmetur, atque sic refractis pistillis extensio fiat,
Sufficit

A Sufficit autem scala quæ robustos gradus habet, sub lectum extenta, pro limine ac ligno obiecto, quo pistillis ad conuenientes gradus hinc atq; illinc firmatis, ita vinculorum extensio fiat. Porro reponitur femoris articulus etiam hoc modo, si ad internam, & ad anteriorem partem luxatus fuerit. Supra scalam in terram defixam hominē collocare oportet, deinde sanum crus placidè externum deligare, vbi commodum fuerit ex sinistro verò vas testaceum aqua plenum, aut sportulam lapidibus refertam appendere. Alius repositionis modus, si ad internā partē luxatus fuerit: inter duas columnas trabē moderata altitudine deligare oportet. Præmineat autem vna pars trabis pro magnitudine natium, & vbi stragula circū pectus hominis deligaueris, ipsum hominē supra præminentem trabis partem collocato, & deinde pectus ad columnam lato aliquo vinculo alligato. Postea sanum quidē crus detineat aliquis, vt ne circumagatur. Ex laeso verò appē datur pondus quantum congruit, velut etiam prius dictū est. Primum igitur scire expedit, quòd omnium ossium cōmissuræ plerunq; sunt caput & acetabulum. In quibusdā verò & locus acetabuli formam refert, & oblongus est. Quidam verò loci leuiter sinuosi sunt. Semper autem reponere oportet omnes articulos elapsos, maximè quidem statim dum adhuc calidi sunt. Sin minus, quàm celerrimè. Nam & ei qui reponit, facilius ac citius reponere contingit, & ægroto multo minus doloris affert repositio priusquam intumuerit. Omnes etiam articulos vbi reponere voles, præmollire ac commouere oportet. Sic enim facilius reponi solent. Circa omnes autem articulorum repositiones hominem attenuare oportet, maximè circa maximos articulos & repositu difficilimos minimum circa minimos & faciles. At verò si digitorum articulus, siue primus, siue secundus, siue tertius in manu exciderit, idem ac æqualis repositionis modus est, difficilius tamen semper maximi articuli reponuntur. Excident autem quatuor modis, aut sursum, aut deorsum, aut in obliquum vtrinq; maximè quidem supernè, minimè autē in obliquū, in vehementi motu. Vtrinq; autē in ea parte in quam exciderunt, velut crepido est. Si quidē igitur ad supernā aut infernam partem exciderit articulus, eo quod leuior est hic locus quàm à lateribus, & simul parua facta est transgressio, facile

Digitorū
articuli.

R r s est

est reponere. Modus autem repositionis sic habet. **D**igitum summū aut deligamento aliquo, aut alia quapiā huiusmodi reobuoluto, ut ne ubi summū digitum apprehensum extendis, elabatur. Quum autē obuolueris, alter quispiā manum supra iuncturam apprehendat, alter digitū obuolutum, atq; ita vterque ad seipsum probè extendat, simulq; elapsū articulum ad sedem suā detrudat. Si verò in obliquum excidit, extensionis quidem idem modus est. Vbi verò iam visus fuerit tibi articulus lineam transgressus esse, simul cum extensione statim ad locum suum detrudere oportet, ita ut alius quidam ex altera digiti parte obseruet ac repellat, ut ne rursus illic elabatur. Moderatè quoque repositionem faciunt vimineæ texturae, sauræ id est lacertæ appellatae, ex palmis con- **E**textæ: ita ut dum digitum hinc atque illinc distendis, altera manu lacertam, altera manus iuncturam apprehendas. Postquam autem reposueris, deligare oportet linteis quàm citissimè tenuissimis inceratis, cera neque valde mollī, neque valde dura. Dura enim de digito abscedit. Mollis autē & liquefcens eliquatur, & digito calefiente deperit. Soluendus autem est digiti articulus tertia aut quarta die. In summa si inflammatus fuerit, frequētius soluendus est: sin minus, rarius. De omnibus articulis hæc dico. Restituitur digiti articulus decima quarta die. Idem verò est curationis modus digitorum manus ac pedis. Circa omnes autem articulorum repositiones attenuare oportet ac fame macerare vsq; ad septimū diem: & si inflammati sint, frequentius soluere: sin minus, rarius. **F**Quietem verò semper habere oportet afflictum articulum, & quàm optimè figuratum positum esse. Genu porro propter expeditam ac facilem naturam, mitius est quàm cubiti gibbus. Quare etiam facilè excidit. Excidit autem saepe intrò. Sed & extra, & in posteriorem partem. Repositiones autem fiunt ex repētina conflexione aut ex calcitrations aut conuolutam fasciæ molem in poplitem ponito, & circū illā corpus ita ad flectendū gēua in terrā dimittito. Potest etiā ubi in posteriorem partem excidit, moderata extensione reponi, veluti cubiti gibbus. Si verò hac aut illac excessit, ex conflexione aut ex calcitatione reponitur. Caterum directio ex moderata extensione omnibus cōmunis est. Si verò non inciderit, hi quibus in posteriorem partem excidit, flectere

Astere nō possunt: Sed neq; alij ita valde: minuitur autem femoris & tibiæ anterior pars. Si verò intrò, valgiore sunt. Minuuntur autem externæ partes. Si verò extra, magis varij ac detorti, minus claudi fiunt, crassiore autē osse vehūtur, & internæ partes minuuntur. At si ex natiuitate, aut in augmento hæc fiant, iuxta priorē rationem res se habet. Cæterū articuli circa malleolos luxati extensione vehementi opus habent, aut manibus, aut alijs huiusmodi: & simul directione vtrunq; præstāte. Cōmune autem hoc est omnibus. At verò luxationis articulorum in pede, velut eas quæ in manu sunt Luxationis articulorū pedis. sanabis. Qui verò cum tibia cōmunionem habent, & ex natiuitate elapsi sunt, aut etiā in augmento luxati, eandem cum

B manu repositionem expetunt. Quicunq; verò facto saltu ex supernis, calcaneo innitentes se firmarunt, sic vt ossa disparata sint, & venæ humores effuderint, & nerui contusi sint: si grauitè hæc acciderint, periculum est ne corruptione accedente per omnem vitam affligantur, obtorta enim sūt ossa, nerui autem inter se cōmunionem habent. Quin & quibus fractis, aut ex vulnere, vel in tibia, vel in femore: aut neruis exolutis qui his cōmunicant: aut ex negligenti decubitu, calcaneum fuerit denigratū, etiā his maximæ recrudescētiæ ex talibus fiunt. Quandoq; etiā ad corruptionē accedunt febres acutæ, singultuosæ, mentē percellētes, citā mortem inducētes, & insuper venarū sanguifluarum liuores. Signa recrudescētiarū sunt, si effuso sanguine sugillata, & denigrata, & vicina his, subdura ac subrubra fuerint. Si enim cū duricia liuescant, periculum est ne denigrescant. Si verò subliuida sint, aut etiā liuida mollia & diffusa: aut cū virore subpallida ac mollia: hæc in omnibus talibus bona sunt. Curatio si febris absit, veratro in potu dato sit: sin minus non, sed potu si opus sit, fauorū cremor decoctus, aut acetum mulsū dulce detur. Deligatio conuenit qualis in articulis. Ad contusiones autem magis quàm ad omnia, linteis pluribus ac mollioribus vtendū est, & minus comprimēdum, & plurima insuper calcaneo obuoluenda. Figura sit velut deligatio postulat, vt ne ad calcaneum exprimatur. Ferulis vtendum nō est.

Quibus verò aut ipse pes solus excesserit, aut cum appendice, excidit quidem magis ad internam partem: his si non rursus incidat, attenuatur progressu temporis & coxa
& femur

Hippocratis Liber

& femur, & tibiæ pars luxationi opposita. Repositio est velut iuncturæ ad manum. Extensio autem vehemens. Curatio pro lege articulorum. Recrudescit, sed minus quàm manus articulus siue iunctura, si quieuerint. Victus parcius quiescentibus expedit. Quæ verò ex natiuitate, aut in augmento fiunt, iuxta priorem rationem.

H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE VL-

CERIBVS, IANO CORNARIO MEDICO PHY-

SICO INTERPRETE.

*al. somn
ip. viij
p. h. Hipp. t. 6.*

Quæ vlcera
curentur.



Lcera vniuersa, nisi vino, humectare non oportet, si non in articulo fuerit vlcus, Nam siccum sano propius est, & humidum non sano. Est enim vlcus humidum: quod verò sanum est, siccum. Præstat autem absque deligatione finire, præterquam quod cataplasma imponitur: quanquam aliqua vlcera neque cataplasma ferre possint, magis autem recentia quàm vetustiora, & quæ sunt in articulis. Modicus cibus, & aqua, quàm maximè omnibus vlceribus conducunt, & magis recentioribus quàm vetustioribus, & si quod aliud vlcus inflammatum est, aut inflammationem minatur, & si periculum est corruptionis: & vlceribus ac inflammationibus in articulis: & vbi conuulsionem fieri periculum est: & vulneribus in ventre. Maximè verò omnium, fracturis in capite ac femore, & si cui alij parti fractura contigerit. Stare autè vlceri minimè cōducit, præsertim si quis in crure vlcus habeat: imò neque sedere, neque ambulare. Verùm otium & quies maximè conferunt. At verò recentia vlcera omnia, tum ipsa, tum circumlitæ partes, minimè inflammationem incurrent, si quis quàm citissimè suppurèt, & pus ab osculo vlceris non interceptum supprimatur: aut si quis auertat, ut omnino non suppurentur, præterquam necessario, eoque paucissimo

Vulnus omne quietem postulat. Vlcerum ne inflammationem.

A cisimo pure, & sicca sint quàm maximè ex medicamēto nō molesto. Igneum enim fernorem hoc inducit, vbi horror & pulsatio accesserit. Inflammātur enim vlcera tunc quum ad suppurationem tendunt. Suppurantur autē alterato sanguine ac calefacto, donec putrefactus talium vlcum pus fiat. Pus
Quum verò cataplasmate opus esse visum fuerit, non ipsum vlcus cataplasmate integere oportet, sed circumsitas partes, quo pus decedat, & quæ indurata sunt, mollescant. Ceterum ex vlcibus si quod acuto specillo incisum aut dissectum fuerit, cruentis vulneribus aptum medicamētum suscipit, & resicatorium quoddam, quod prohibet suppurationem. Si qua caro ex telo contusa & dissecta est, eam curare oportet, quo quàm celerrimè suppuretur. Nam & minus inflāmur, & necesse est carnes contulas ac dissectas, putrescere ac pus fieri, & eliquari ac consumi: & postea nouas carnes nasci.
B Omni recēti vlcēri, præterquàm in ventre, cōducit frequenter sanguinem defluere facere, prout opportunū esse visum fuerit, & ab ipsis partibus vlcus complectentibus, tum aliàs, tum si in tibia vlcus fuerit, aut in digito pedis aut manus, magis quàm si alicubi in alia corporis parte. Sanguine enim defluēte gracilescētia sicciora fiunt ac minora. Prohibet enim hoc maximè talia vlcera humectari. Deinde verò in omnibus. Putredo sanguinis ex sanguinis trāsmutatione fit. Confert autē post sanguinis defluxionē in talibus vlcibus, etiā spongiā deligare densam, mollem, cōcisam, sicciorē quàm humidiorē, aut super spongiā supernē folia multa ponere. At oleum, & quæcunque mollia, aut oleosa sunt medicamenta, talibus vlcibus non conducunt, si non valde iam ad sanitatem tendant. Neq; vlcibus ex recenti vulnere oleum conducit, neque mollientia, neq; adiposa medicamenta, tum aliàs, tum quòd vlcus ampliore purgatione opus habet. Ut autem in summa dicā, oleo illitio facienda est, & in æstate, & hyeme, in his ad quæ talibus medicamentis opus habemus.
C Depurgatio ventris deorsum plurimis vlcibus confert, & in vulneribus quæ sunt in capite, & in ventre, & in articulis, & in quibus corruptionis periculum est, & in his quæ confuta sunt, & in exedentibus ac serpentibus, & aliàs inueteratis vlcibus. At vbi deligare voles, pharmaca non prius imponere oportet, quàm vbi valde siccū feceris vlcus. Tūc verò apponere

Sanguinis
defluxio in
his quid fa
ciat.

Oleū qui-
bus inutile.

Purgatio
ventris con
fert his.

Tempus ca-
lidius qui-
bus vulneri-
bus proficit.

Vlceraque
non coeunt.

Ignis sacer
vulceris.

ponere oportet, vlcus autem saepe spongia detergere, & rur-
sus linteam siccum ac purum saepe adhibere, atque sic impo-
sito medicamento quod conferre videtur, deligare, aut non
deligare. Plerisque vlceribus tempus calidius commodius
est hyeme, exceptis his quae in capite sunt ac ventre: magis
verò aquinoctij tempus. Vlcera quaecunque probè & pro-
ut oportet purgata sunt, semper ad licciorem modum germi-
nationem faciunt. Hæc autem plerunq; carne non superex-
crescunt. Si vndecunque tandem os discesserit, aut vltum, aut
sectum aut alio modo, horum vlceru cicatrices cauiores fiunt.

Vlcera non purgata, non committi solent etiam si adducan-
tur, neque sua sponte coeunt. Vbi circumsita vlceris partes
inflammatae sunt, quandiu durat inflammatio vlcera coire non
solent. Sed & vbi circumsita partes denigratae fuerint, & san-
guinis putredine, aut etiam varice, influxione sanguinis ex-
hibente, neq; hæc coire solent, si non circumsitas vlceris par-
tes sanas feceris. Ex vlceribus rotunda si subcaua fuerint, ex-
cidere oportet vndiquaque in orbem ea quae discesserunt, aut
omnia, aut ex dimidio circuli, secundum longitudinem na-
turae hominis. In omni vlcere igne sacro accedente, cor-
pus purgationem facere oportet, in vtram partem vlceri con-
tulerit, siue sursum, siue deorsum. Cui tumor obortus fuerit
circa vlcus, vlcere non inflammato, huic postea temporis pro-
gressu tumor puris subsidentiam habet. Quodcunque vl-
cus ex inflammatione tumidum non sedatur, dum alia quae
simul inflammari ac tumescere coeperunt sedantur, etiam hoc
non coalescere periculum est. Quaecunque verò ex casu, aut
alio quopiam modo dissecantur, & contunduntur, & intume-
scunt, ita ut vicinae circuncirca partes suppuratae, pus de tu-
moribus per vlcus egerat: in talibus quicquid cataplasmate
opus habere visum fuerit, non super ipsum vlcus cataplasma
ponere oportet, sed super circumsitas partes, quo pus secedat,
& indurata molliantur. Postquam autem mollita fuerint, &
inflammatio sedata, spongiis super ea quae obcesserunt deli-
gatis compescito, initio à sana parte facto, atq; ita proceden-
do. Supernè verò super spongiam folia sint multa. Quum ve-
rò compesci non poterit caro quae humida existit, in causa est
ut hæc eiicias. Si sub profunda carne vlcus fuerit, ex vtriusq;
& ex deligatione, & ex eo quod insuper compressit, hoc sa-
nè

A nē incuruū subattollitur, & si quis id secet specillo, si fieri poterit ad fluxionem accommodatum ab ore vlcus refecare oportet, vbi commodū tempus esse visum fuerit, atq; ita curationem adhibere, qualicunq; tandem indigere videbitur. Plerunque verò in omni vlcere quod ventrem habet, in directum ad visum conspicua sunt omnia, tumore non præsente. Et si quidem in ipso fuerit putredo, aut caro suberit humida ac putrida, hoc vlcus & complectentes vlcus partes, aspectu nigra subliuida erunt. Et in excedentibus vlceribus, qua parte phagedæna affuerit, vehemētissimēq; depascitur ac cedit, ea parte circūlita vlcis pars colorem habebit nigrum, subliuidum. Cataplasma tumorum & inflammationis in circūlitis partibus sunt, verbascum coctū, & trifolij folia cruda, & ligustri folia cocta, & polium. Si verò etiā purgari opus habuerit vlcus, omnia quidem etiam hæc purgāt: Sed & fici & oleæ folia, & marrubium. Coquere autem oportet hæc omnia, & maximē viticē, & fisci & oleæ folia: & mali punicæ folia similiter coquere oportet. Crudis verò his vtēdum est. Maluæ folia terito cū vino, & rutæ folia, & origani viridis. Omnibus his lini semen torrefactum ac tustum quam leuissimē, ammiscere oportet. Vbi verò periculū est ignem sacrum in vlceribus oboriturū esse, isatidis folia trita cruda cum lini semine imposito. aut lini semen solani aut isatidis succo subactum imposito. Quum autem vlcus purum quidē fuerit, verū inflammatum est & vlcus, & circūlitæ itidem inflammatae partes, lentem vino coctam, ac leuiter tritā, oleo modico subactā imposito, ac deligato: & rubi canini folia in aqua cocta, leuiter trita imposito, linteo tenui subextento, puro, vinòq; ac oleo madefacto. Et vbi committere ac coalescere vlcus voles, rubi canini folia velut lentem præparato. Nasturtium item sauridion à lacerti similitudine appellatum vinum, & lini semen tenuiter tritum commiscentur. Et hæc, lini semen, & vitex crudus, & alumē melium: hæc aceto subacta. Vuam albā immaturā per colum in vas æris rubri expressam, per dies ad solem exponito, noctu autem tollito, vt ne irroretur. Per dies verò indefinenter terito, vt aqualiter siccetur, & de æneo vase quā plurimum assumat. Tanto autem tempore ad solem exponere oportet, donec ad mellis crassitudinem deuenierit. Postea & hūc succum, & mel quā optimum

Ignem sacrum quæ prohibeāt.

Hippocratis Liber

Medicamē
ta varia ad
vlcera.

optimum, & vinum dulce, in æneam ollam infundito, ita ta-
men vt prius resinam terebinthinam in vino coquas, donec
dura fiat instar mellis cocti, & postea resinā eximas, & vinū
affundas. Sit autem plurimus vuæ immaturæ succus. Secūdo
loco vinum. Tertio mel. Myrrham etiam statim quā opti-
mam leuiter tritam, eodem vino paulatim affuso diluito, &
postea ipsam per seipsam cum vino sæpe agitādo coquito, &
vbi ad bonam crassitudinē deuenisse videbitur, ad vuæ im-
maturæ succum affundito, & nitrum optimum torrefactum
sensim ad pharmacū ammisceto, & flori eris minus quā ni-
tri. Hæc postquam miscueris, coquito non minus tribus die-
bus, lignis ficulneis nō multis succensis, aut prunis, vt ne tor-
reatur, & vbi hoc pharmacū illinitur, omnia quæ imponun-
tur sicca sint, & vlcera non humectentur. Vtēdum autem est
hoc pharmaco ad vlcera inueterata ac recentia, & ad pu-
dendi, & capitis ac aurium vlcera. Aliud ad eadem vlcera.

Fel bubulum siccum, mel quā optimū, vinū albū in quo
cocta sint loti ramenta, thus, myrrha æqualis, crocus æqua-
lis, flos æris similiter. Ex liquidis autem vinum sit plurimū,
deinde mel, paucissimum verò fel. Aliud. Vinū, mel, oleū
cedrinum. Sicca verò sint, flos æris, myrrha, malicoriū siccū.

Aliud. Flos æris tostus dimidia parte, myrrhæ duæ partes
dimidiæ, croci partes tres, mel modicū, cum vino hæc torren-
tur. Aliud. Thuris pars, gallæ pars, croci tres. Hæc singula
sicca q̄ leuissimè terito, deinde mixta ad solem calidissimū,
affuso vuæ immaturæ succo, donec viscosa fiant, per tres dies
terito, postea vino austero, nigro odorato paulatim affuso di-
luito. Aliud. In vino dulci albo, ilicis radices coquito, & vbi
probe habere visum fuerit, de vino defuso duas partes sumi-
to, & amurcæ olei quā siccissimæ partē vnā. Postea agi-
tādo coquito, vt ne torrefiant, lento igne donec ad bonā cras-
situdinē deueniant. Aliud. Reliqua quidem eadem sint,

Alumen
melium.

Verū pro vino, acetum sit album acerrimū, in quo tinctæ
sint succidæ lanæ. Postea ammixta amurcæ coquito, & succū
caprifici affundito, & alumen melium, & nitrum ac æris flo-
rem, vtraque tosta ammisceto. Hoc magis priore vlcera pur-
gat. Verū prius non minus resiccat. Aliud. Lanæ suc-
cidas paucissima aqua tingito, deinde vini tertiam partē ad
aquam misceto, ac coquito donec bona prouenerit crassitu-
do. Ex

Ado. Ex his recentia vulnera quàm citissimè suppurari possunt. Aliud. Aron siccum inspergito ac adaptato. Aliud. Fici dum succulenta est corticem viridem, in vino tritum immittito: & sine vino: ipsum etiam cum melle. Aliud. Ad acetum in quo cocta sunt loti ramenta: sit autem acetum album: amurcam oliuarum, & picis serum crudum ammisce-
to, & illinito, & instillato, & deligato sicca. Hoc recentia vulnera auertit, ne suppurentur: aut aceto abluito, & vino imbuta, sponsia extergito. Aliud. Plumbum tritum cum spodio cyprio leuigatum inspergito. Et loti ramenta inspergito, & squamam aris, & chalcitidem cum ære, & solam per se, & cum loti ramētis. Et aliàs vbi siccis opus fuerit, talibus uten-

Bdum est, & spodio Illyrico trito cum ramētis, & ipsis solis ramentis, & flore argenti solo quàm leuissimè trito, & aristolochiam rasam ac tritam leuiter, inspergito. Aliud ad cruenta vulnera. Myrrha, thus, galla, ærugo, flos eris tostus, Alumen Aegyptium tostum, ænanthe, lanarum sordes, plūbago. Horū singulorū æquale pondus diluitur cum vino velut superius, & reliqua præparatio fit eodem modo. Aliud. Acetum quàm acerrimum album, mel, alumen Aegyptium, nitrum optimū leuiter tostum, fellis parū, simul coquito. Hoc carnem superexcrecentem consumit, & cauat, & non mordet. Aliud, Herba est paruis foliis prædita, cui nomen est Parthenium microphyllū. Hæc verrucas de pudēdo aufert: & chalcitis ex insula Melo cruda, & elaterium tenue siccum lum.

Partheniū
microphil-

Cadstringit: & malicorium tenue siccum eodem modo. Maximè autē replet caua, pura, herba Lagopyrus nomine: est autem tritico similis vbi arescit, folio paruo velut olea, sed longiore: & marrubij folium cum oleæ foliis. Aliud. Caricæ siccissimæ internam partem pinguem, mellis speciem referentem duabus portionibus, cum seminis lini tosti non admodum, ac triti quàm tenuissimè parte vna. Aliud. Caricæ partem internam, & florem aris tenuem modicū, & fici succum. Aliud. Caricæ partem internam, chamaeleonem nigrum, bubulum fel siccum. Aliud. Reliqua quidem eadem sint. Verū sicca, nasturtium tenue crudum, irio, vtrunque pari pondere: caricæ verò partes duæ, sint, & seminis lini partes duæ, cum fici succo. Quum autem aliquo horum pharmacorum vteris, splenia aceto imbuta supernè imposito, &

Lagopyrus

S s

sponsia

Hippocratis Liber

spongia super splenia imposita deligato, & paulò magis ap- **D**
 primito. Si verò circūsitæ partes inflāmatæ fuerint, quicquid
 conferre visum fuerit circūponito: Si liquido vti voles, etiā
 caricum pharmacum illinito, & velut suprā scriptū est deli-
 gato eodem modo. Est autem ex his pharmacum factum, ve-
 ratro nigro, sandaracha, squama æris, plumbo vsto, cū multo
 sulphure, auripigmento, cantharide. Ex his prout visum fue-
 rit cōponito, ac vtor. Diluuntur oleo cedrino. Postquā verò
 satis fuerit illitū, pharmacū eiicito, & aron coctum, tritū im-
 ponito: aut siccum, tritū, oleo subactum. Et si sicco Carico vti
 voles: liquida remouere oportet, & pharmacum inspergere.
 Facit autem siccum ex veratro solo constans ac sandaracha.

Aliud liquidum. Herba est cuius folium simile est aro na- **E**
 tura, verūm albū, lanuginosum, ad hæderæ folij magnitudi-
 nem. Hæc herba cum vino imponitur. Aut ilicis partem eā
 quæ est circum truncum, cum vino tritam imponito. Aliud.
 Vux immaturæ succus, acetum acerrimum, flos æris, nitrū,
 succus caprifici. Ad vux immaturæ succum alumen iniicito
 tenuissimè tritum, & in vas æris rubri immissum ad solem
 exponito ac agitato, & vbi ad bonam spissitudinem deuen-
 rit, tollito. Sicca ad cruenta vulnera hæc faciunt. Vera-
 trum nigrum tenuissimè tritum inspergitur, quandiu ali-
 quid humoris inerit ac depascentis. Deligatio verò eadē est
 quæ in emolastris. Aliud. Salis grana siccissima in æneam
 ollam aut fictilem nouam immittito, magnitudine maximè
 æqualia, non magna: & mel optimū dupla salis mensura pro **F**
 cōiectura facta, ad salem affundito: deinde ollam prunis im-
 ponito, & dum totū combustum fuerit sinito, Postea exterso
 ac expurgato per spongiā vlcere inspergito, & velut prius
 deligato, & paulò magis cōprimito. Postridie verò qua par-
 te nō adhæserit pharmacum inspergito, comprimito ac de-
 ligato. Vbi verò pharmacum discedere voles, acetum calidū
 affundito, donec discedat, & rursus eadem facito, si opus fue-
 rit extersione per spongiā facta. Aliud siccum mordax.

Myfi quā leuissimè tritum inspergito ea quæ humida
 sunt ac putrida: & florem æris tenuem non penitus leuiter
 tritum. Aliud siccum similiter mordax. Vbi spongia ex-
 teristi, lanas quā maximè succidas in testa exurito, face
 admota donec totas combusseris, hoc pharmacū leuiter tri-
 tum

A tum inspergito, & eandem deligationem adhibeto. Aliud ficcum ad eadem vlcera. Chamæleo niger, alumen fici succo subactum, subigito autem tostum, & anchusam misceto.

Aliud. Anagallis & alumen Aegyptium tostum. Aliud. Puluillum inspergilem Orchomenium inspergito. Cæterum ad nomas proserpendo depascentes, alumen Aegyptium tostum, itémq; Meliū facit. Verum nitro tosto insperfo prius præparare ac spōgia extergere oportet. Facit & chalcitis tosta. Torrere autem oportet, donec flammæ speciem induat.

Ad vetera vlcera in tibiis fientia, fiunt autē sanguinolenta & nigra, meliloti florem tritum, melle subactum, cataplasmati modo vttere. At verò supra neruos dissectos, myrti syluestris radices contusas ac cribratas, & oleo subactas deligato. Et herbam quinque folium: est autem alba & lanuginosa, & altior à terra, quàm nigrū quinquefolium: in oleo tritum deligato, & tertia die exoluito. His autem medicamentis in hyeme potius quàm æstate vtendum est. Medicamenta mollientia, quæ etiam cicatrices pulchras faciunt. Scillæ internam partem mucosam terito, & resinā de picea, cum recenti adipe suillo & oleo modico, resināque ac cerusa modica. Et adipem anserinum, ac suillum recentem purum, & oleum modicū, & scillam, & ceram albissimā. Aut scillam, oleum albū, resinæ parum, cerā, adipem, suillū veterē ac recentem. Facit & oleum, & ærugo, & scilla, & resina. Sint autem duæ partes veteris adipis ad recētem. De reliquis autem quantum opportunum esse visum fuerit. Adipem recentem liquefactum in aliam ollam defundito, & plumbaginē leuissimē tritam ac cribratā commiscero ac coquito, & primū agitato. Coquito autem donec destillatū in terram congeletur, deinde tollito, ac reliquum diffundito, præter lapidē subidentem: & resinā iniicito ac agitato, & modicū oleū cedrinum, & quod prius diffusum ac ablatū fuit ammisceto. Porro in omnibus mollibus in quibus resinam ammisces, vbi pharmacū ab igne abstuleris, in calidum adhuc resinam immittito ac agitato. Aliud. Adeps suillus vetus & nouus, & cera, & oleū: Sicca verò, loti ramenta, thus, plumbago: thuris videlicet pars vna, plumbaginis vna, & ramentorū loti vna. Sint autē adipis veteris partes duæ, ceræ vna, & noui adipis vna. Aut adipem solum veterem suillum, & cum ipso adi-

Hippocratis Liber

pem caprinum recētem, quā minimē cum membrana, sed **D**
 purgatum, parum terito aut contundito, & oleum affundito,
 & plumbum cum spodio inspergito, & ramentorū loti dimi-
 dium. Aliud. Adeps caprinus, spodium, chalcitis cærulea,
 oleum. De Ambustis. Illicis radices coquere oportet tene-
 ras. Quarum si cortex crassissimus est ac viridissimus, cōse-
 ctum in tenues partes, vino albo affuso, lento igne coquito,
 donec ad bonā crassitudinem deueniat, vt illini possit. Po-
 test & in aqua coqui eodē modo. Aliud non mordax. Suil-
 lum adipem solū veterem liquefactū illinito. Superne ve-
 rō scillæ radicem dissectam imposito ac deligato. Postridie
 verō foueto ac perfundito, & adipem suillum veterem liqua-
 to, & ceram ac oleum ammisceto, thus item, & loti ramenta, **E**
 ac minium, hoc vbi illeueris, ari folia in vino ac oleo cocta
 apponito ac deligato. Aliud. Postquā suillo adipe illeue-
 ris vetusto, hastulæ regiæ radices in vino coctas ac tritas su-
 perillinito. Aliud. Adipem suillum veterem liquato, & re-
 sinam ac bitumen ammisceto, & hæc linteo illita, ad ignem
 calefacta, imposito ac deligato. Quum in dorso ex plagis,
 aut aliās vlcus factum fuerit, scilla cocta, trita, ac linteo illita
 deligato. Postea verō adipem caprinū, & recentem suillum,
 & spodiū, & oleū, & thus illinito. Tumores in pedibus fien-
 tes, & sponte, & non sua sponte, in quibus neq; tumores, ne-
 que inflammatio, à cataplasmatibus sedatur: & si quis spon-
 gias deliget, aut lanas, aut aliud quia super sanam partem, postea **F**
 intumescunt sua sponte, ac inflammantur: influxio sanguinis
 per venas in causa est, si cui nō contusio causa est. Et si alicu-
 bi alia in corporis parte tale quid fiat eadē ratio est. Verū
 sanguinem detrahare oportet, de venis præsertim influenti-
 bus, si conspicuæ fuerint. Sin minus, pertundere tumores
 oportet, profundioribus ac frequentioribus vulnusculis impa-
 ctis: Sed & in aliis omnibus quæ pertūdis, sic facere oportet,
 atque hoc acutissimis ac tenuissimis ferramentis. Quum ve-
 rō sanguinem detrahis, specillo ne valde premas, vt ne con-
 tusio accedat. Aceto autem perluito, & grumū sanguinis in
 hiatibus ne relinquito: & illito cruentis vulneribus destina-
 to medicamēto, lanas succidas, carminatas, molles deligato,
 vino & oleo resperfas. Et pertusam partem æger ita habeat,
 vt refluxus sit sanguinis, non defluxus; & omnino nō hume-
 ctet;

Dorsivlcus

Pedum tu-
mor.

- A** cet: & parum cibi capiat, & aquā bibat. Si verò vbi solueris, fissuras repereris inflammatas, cataplasma ex vitice ac lini semine imposito. Si verò vlcerata fuerint fissuræ ac eruperint, ad rē respiciens, & quod opus fuerit adhibens, de cætero curato. At vbi varix inest in tibia, aut conspicuus, aut in carne, & tibia est nigra & videtur opus habere sanguine ab ipsa defluente: talia nequaquā pertundere oportet. Plerunq; enim magna vlcera ex fissuris fiūt, propter varicis influxū. Verū varicem ipsum aliās atq; aliās compungere oportet, vbi opportunum esse visum fuerit. Cæterū quū venam secueris, postquā sanguinem dimiseris, & fasciam solueris, & nō sistatur, in contrarium, partē habeat, quò refluxus sanguinis fiat, siue manus fuerit, siue crus, utpote sanguine retrò fluente, atque ita tempus longius aut breuius decumbens expectet. Postea ipsum sic habentē deligato, nullo grumo existente in fissura. Deinde spleniū duplum vino imbutum apponito, & super ipsum lanam puram oleo imbutā. Nam etiam si influxus sanguinis fuerit violentus, suppressio fit influentis. Et si grumo in fissura manēte sic inflammetur, suppuratur. Præsum autē & potum plus aut minus venā secare sinere oportet, & aliquantū calefactum: & die calidiore quā frigidiorē. Si verò influat sanguis, cucurbitam affigere oportet, & si ablata cucurbita, multū sanguinis, aut serosus sanguis fluat, cito priusquā repleatur rursus affigere & quod uestat extrahere. Sin minus, grumi in fissuris inhaerent, & deinde ex ipsis inflammata vlcera fiunt. Aceto autem omnia talia perluere oportet, & postea nō humectare, neque in fissuras decumbere. Verū aliquo medicamento cruentis vulneribus destinato fissuras illinere. Et quum infra genu aut ad genu affigere cucurbitas oportuerit, stanti erecto, si stare potuerit, affigantur.

Varices tibiz.

HIPPOCRATIS

COI LIBER DE FI-

STVLIS, IANO CORNA-

RIO MEDICO PHY-

SICO INTER-

PRETE.

Ss 3

Fistulæ

Causa &
origo fistu-
la.



Medela.

Istulae fiunt quidem ex contusionibus & tuberculis, fiunt autem & ex remigatione ac equitatione, quum in natibus congregatus fuerit sanguis prope sedem. Putrescens enim distribuitur ad molles partes nimirum quum & intestinum rectum sit humidum, & caro mollis, in qua distribuitur, donec tuberculum eruperit, & deorsum ad rectum intestinum computruerit. Postquam hoc factum fuerit, in fistulam abit, ac sanie manat, & stercus per ipsam fluit, & flatus, & abominatio multa. Ex contusionibus itaque fit fistula, ubi aliquis circa rectum intestinum locus contusus fuerit ex plaga, aut ex casu, aut vulnere, aut equitatione, aut remigatione, aut quacunque talia sunt. Congregatur enim sanguis. Putrescens autem suppuratur: à suppurato verò ea quae de tuberculis dicta sunt patitur. Primum igitur quum tale quoddam tuberculum nascens senserit, crudum quam citissimè secare oportet, priusquam suppuretur ad rectum intestinum. Si verò iam agrotatem ex fistula assumpseris, alij caulem recentè accipe, & homine supino reclinato, diductis cruribus altero huc, altero illuc, caulem immitte donec offendas ac impinguas, & fistulae profunditatem per caulem metire, & fescelis radicem tenuissimè tritam, aqua affusa ad dies quatuor macerato, eamque aquam triū cyathorū mensura, melle ammixto ager bibat. Fieiunus. Cum hac etiam ascaridas purgato. Quicumque verò relictī fuerint nō curati, moriuntur. Postea linteū byssinum rithymalli magni succo imbutū, flore aris tosto trito insperso, in penicilli figurā intorque longitudine fistulae aequalem, filo per summū penicillū trāsmisso, & rursus per summū caulem: & homine supino reclinato, adhibito catoptere instrumento sedem expandente, corrosam recti intestini partem inspicito, & sic caulem immitte: & ubi in intestinum incidit, apprehensum retrahito, donec penicillus fuerit intrusus, & superiori ac inferiori parti adaequatus. Postquam verò fuerit intrusus, glandē corneam in intestinum indito, & podice ex terra cimolia oblito finito. Vbi verò ventrem exonerat, eximito, ac rursus indito, donec ad quintū diem peruenerit.

Sexta

- A** Sexta autē eximito, extrahens penicillū ex carne, & alumen terito, eoque glandem expleto, & in intestinū indito ac finito, donec alumen liquidum fiat. Podicem verò myrrha illinito, donec coaluisse visus fuerit. Alia curatio. Crudum linum tenuissimum accipito, & ad palmi longitudinem quincuplicato, & pilum equinum circumdato. Deinde facto specillo stanneo in summa parte perforato, & initio lini complicati in specillum immisso, specillum in fistulam demittito, & simul sinistrae manus digitum indicem in sedē indito: vbi verò specillum contigerit digitū, inflexa summa specilli parte, initium lini quod est in specillo per digitum adducito: & specillum quidē rursus extrahito, lini verò initia bis aut ter
- B** connectito, & reliquam lini partem intortam ad nexum deligato. Postea verò dimissum negocia sua obire iubeto. Ceterum quantum putrescente fistula de lino laxatur, tantum augere oportet, ac intorquere semper singulis diebus. Si verò linum crudum computrescat, priusquam fistula corrodat, aliud linum ad pilum innecte, immitte ac connecte. Pilus enim ea de causa ad crudum linum additur, quod non putrescit. Postquam verò fistula computruerit, spongiam mollem in tenuissima frusta concisam apponere oportet, deinde in fistulam quidem, florem æris tostum multum per specillum immittere. Spongiam verò melle illinere, & subiecto digito indice sinistrae manus, ultra protrudere: & appositam alterā spongiam deligare, eodem modo velut in hæmorrhoidibus.
- C** Postridie verò exoluere, & aqua calida abluere, & cum spongia per sinistrae manus digitum fistulam purgari conari: & rursus æris florem immittere, ac spongiam deligare. Atque hæc facere oportet per dies septenos. In his enim maxime tunica fistulae computrescit, de cætero verò donec sanata fuerit spongiam deligare. Nam dum per hunc modum fistula à spongia cogitur ac explicatur, neque rursus concidere poterit, neque alia ipsius pars sanabitur, alia verò rursus complebitur, sed in seipsa tota sana erit. Verū in hac curatione multa aqua calida proluere oportet, & fame macerare. Si verò non corrosa fuerit fistula, specillo immisso secato donec duxeris, & æris florem inspergito, & ad dies quinque finito. Deinde aquam calidam affundito, & polentam aqua subactā superimponito, & betarum folia deligato. Vbi verò excide-

Medela altera quā & Celsus sum pñt.

Curatio fistulae.

Medela alia.

Intestinum
rectum in-
flammatū.

Curatio.

Stranguria
quare hisu
perueniat.

rit æris flos, & fistulæ vlcus purum fuerit, velut priorem cu- D
rato. Si verò in loco sit vbi fieri id non possit, & profunda
etiam sit fistula, flore æris, & myrrha, & nitro in vrina dilutis
colluito: & in fistulæ osculum plumbeam glandem indito,
vt ne coalescat. Collutio verò facienda est, pennæ fistula ad
vesicam alligata, & fistula intro immissa, atque sic collutio-
ne infusa. Verum sanus non fit, si non secetur. Si intestinum
rectum inflammatum fuerit, & dolor habeat & febris, & fre-
quenter ad exonerandum aluum desideat, & nihil egerat, &
præ inflammatione sedes exiisse videatur, & aliquando vri-
næ stillicidium corripiat: hic morbus fit, quū pituita ex cor-
pore ad intestinum rectum decubuerit. Conferunt autem ca-
lida. Quum enim hæc adhibentur, pituitam attenuare ac cō E
sumere possunt, & simul acrimonia sua falsam pituitā aquo-
sam reddere, vt non sit ardor, neque morsus aliquis in inte-
stino. Curare itaque oportet hoc modo. Aegrum in cali-
dam aquam collocato, & trita grani cniidij grana sexaginta,
in vini hemina, & olei hemina dimidia diluto, tepefacito, &
infundito. Hæc & pituitā educunt & stercus. Si verò in aqua
non sedet, oua cocta in vino nigro odorato, ad sedem appo-
nito, calido quopiam infernè substrato, aut vesica aqua cali-
da plena. Aut lini semen tostum, mollitum, tritum pari fari-
na, in vino nigro odorato, & oleo ammixta, cataplasmatibus
modo calidissimè imposito. Aut ordeum & alumen Aegy-
ptium tritum misceto, & glandem oblongam efformato, & F
ad ignem tepefaciens digitis effingito, deinde summè tepi-
dam effectam in sedem indito. Forinsecus autem cerato ob-
linito, & allium in vino nigro diluto coctū pro cataplasmate
imposito. Postquam verò exemeris, in aquam calidam collo-
cato: & solani succū, & anserinum ac suillum adipē, & chry-
socolam, & resinam, & ceram albam commisceto. simulque
liquefacito, & cum his illinito, & quandiu inflammatio du-
rauerit, allium coctū cataplasma adhibeto. Et si quidem ad
hæc à dolore liberetur, satis fit. Sin minus, bibat peplum, me-
conium album appellatum, aut aliud quoddam quod pitui-
tam purgat. Et quam diu durat inflammatio, eduliis leuibus
nutriatur. Vrinæ stillicidium ex his incidit. Vesica ex in-
testino recto calefscens, caliditate pituitam adducit: à pituita
verò urinae stillicidium fit. Si quidem igitur vnà cum mor-
bo

A bo sedetur, solet enim plerunque ita fieri, satis est. Sin minus, medicamenta ad vrinæ stillicidium destinata exhibeto. Si verò sedes elabatur, fomento per mollem spongiam adhibito, & cochleæ mucō illito, è manibus deligatum suspendito ad modicum tempus, & redibit. Si verò amplius excidat, & non maneat intus, laterum mollitudines præcingito, & retrorsum fasciam ex cingulo submittitō, & vbi sedem intro protrusisti, spongiam mollem aqua calida, in qua loti ramenta cocta sunt, imbutam imponito. Sed & de aqua ipsa ad sedem affundito, spongiam verò exprimito, deinde fasciam per media crura superextentā, circa vmbilicum deligato. Vbi verò aluum exonerare volet, inter tabulas angustissimas insidens id faciat. Si verò puer fuerit, intra mulieris pedes ad genua acclinatus. Dum autem ventrem exonerat, crura extendat. Sic enim minimè sedes exciderit. At si intestinum rectum humidum fiat, & sanies defluat, face vini vsta & aqua ex myrti decocto abluito, & adiantū siccum, tusum, cribratum inspergito. Si verò sanguis profluat, ablutione ex iisdem facta chalcitidem, & cupressi, aut cedri, aut pini, aut terebinthi ramēta, inspergito, pari mensura de his ad chalcitidē ammixta. Forinsecus autem ceratum crassum oblinito. Quum sedes siue rectum intestinum exciderit, & in loco suo manere noluerit, silphium optimum ac densissimum derafum tenue inspergito: & sternutatorium medicamentum ad nares apponito, & hominem ad iram exacerbato. Aut vbi aqua calida abluisti, malicorium, & alumen, in vino albo trita, ad sedem affundito, deinde panniculos apponito, & femora per dies tres colligato, & ieiunet. Vinum autem bibat dulce. Si verò neq; sic retrocedat, miniū mixtum cum melle illinat. Intestinum rectum si procidat, & sanguis profluat, de ari radice detractum corticem in aqua coquito, deinde tritum farina ammixta calidum imponito. Aliud. Vitis sylvestris, quam aliqui pilothrion vocant, radices tenerimas derafas in vino nigro meraco austero coquito, deinde tritas tepidè imponito. Sed & farinam ammisceto, & in vino albo ac oleo subigito, & tepidè imponito. Aliud. Cicutæ semen vino albo odorato instillato terito, deinde tepidè imponito. Si verò inflammatum fuerit, hæderæ radicem in aqua coctam, leuiter tritā, ammixta farina optima, in vino

Sedis proci
dentia.Sedis proci
dentis va-
ria medela.

S s albo

Hippocratis Liber

albo subactam imponito, & oleū ad hanc ammisceto. Aliud. D
Mandragoræ radicem maximè viridem, sin minus, siccam:
viridem itaq; lotam ac concisam, in vino diluto coquito, ac
imponito: siccam verò tritam similiter imponito. Aliud.
Cucumeris peponis internam partem leuiter tritam impo-
nito. Si verò dolor fiat, & inflammatorum non sit, nitrum ru-
brum assato, ac leuiter terito, & alumen ac salem torreto ac
leuiter terito, & pari mensura singula misceto, deinde ad pi-
cem optimam ammisceto, & linteo illita apponito ac deliga-
to. Aliud. Capparis folia viridia trita, in marsupium con-
iecta adalligato: & ubi vrere videberis auferto, ac rursus ap-
ponito. Si verò folia non affuerint, corticem radice capparis
contusum, vino nigro subactum, eodem modo alligato. Hoc E
etiam ad splenis dolorem bonum est. Ex his cataplasmatibus
quæ quidem frigefaciunt, fluere prohibent: quæ verò mol-
liunt ac calefaciunt, diffundunt: quæ in sese trahunt, siccant
& attenuant. Porro hic morbus fit, quum bilis & pituita ad
hos locos decubuerit. At recto intestino inflammato medica-
mento in quod resina, & oleū, & cera, & plumbago, & adeps
calidissimus commiscetur, illinere oportet.

H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE HAEMOR-

RHOIDIBVS, IANO COR-

NARIO MEDICO

PHYSICO IN-

TERPRETE.

*

Causa hæ-
morrhoidū



Hæmorrhoidum morbus hoc modo fit.
Quum bilis aut pituita ad venas recti inte-
stini decubuerit, sanguinē qui in venis est
calefacit. Calefcentes autē venæ ex vicinis
venulis sanguinē attrahunt: & ubi replen-
tur, interna sedis pars intumescit, & capita
venarum supereminēt: & partim dum à stercore exeunte
compri-

A comprimuntur, partim dum à coaceruato sanguine coguntur, sanguinem eiaculantur: atque hoc maximè quidem vnà cum stercore, aliquando verò etiā sine stercore. Curare autē oportet hoc modo. Primū equidē nosse oportet in quo loco sint hæmorrhoides. Rectum enim intestinum & secans, & resecans, & consuens, & vrens, & putrefaciens, etiam si grauissima hæc esse videantur, nihil laferis. Iubeo autem præparari ferramenta septem aut octo, magnitudine palmi, crassitudine specilli crassi, ex summa parte reflexa ac lata, velut in obolo paruo. Et vbi priore die purgatorio medicamēto purgasti, ea qua rem aggredieris vrito, & homine supino reclinato, & puluinari sub lumbos subiecto, sedem quā maximè per digitos foras extrahito: ferramentāq; candētia facito, ac vrito, donec resiccaueris, & hoc ita vt ne contingas. Vrere enim oportet, & nullam hæmorrhoidem sine vstione finire, sed omnes exurere. Cognosces autem hæmorrhoidas non difficulter. Supereminet enim in internam recti intestini partem, velut vix acini, liuidæ, & simul vt sedes extrahitur, sanguinem eiaculantur. Detineant autem aliqui ipsius caput & manus, dum vritur, vt ne moueatur: & dum vritur vociferetur, sedes enim magis inde eminet. Postquam verò vsseris, lentes ac eruum coquito, & ex aqua trita imposito, ad quinque aut sex dies. Septima verò die spongiā mollem in tenuissima frusta concidito. Sit autem latitudo spongiæ vndiquaq; sex digitorum, deinde super spongiā linteum tene, ac leue, spōgiæ æquale, melle illitum imposito, & postea subiecto digito indice sinistra manus, mediam spongiā in sedem quā penitissimè protrudito, deinde supra spongiā lanā apponito, quo in sede quieta permaneat. Et laterum mollitudines præcingito, & retrorsum fasciam ex cingulo submittito, quam per media crura receptam, ad cingulum circa vmbilicum deligato. At pharmacum de quo dixi, ad densam ac robustam carnem faciendam ac producendam deligatur, & non minus quā viginti diebus hæc deligare oportet. Sorbenda autem est semel in die farina, aut milium, aut furfurum decoctum: & aqua bibenda. Si verò ad aluum exonerandam desideat, aqua calida proluito, & tertio quoque die lauet. Alia curatio. Extractā quā maximè sedē, aqua calida perfundito, deinde summas hæmorrhoidū partes præsecato. Phar

Curatio
quæ.Curatio
alia.

Hippocratis Liber

Alia.

to. Pharmacū autem ad sectionē preparatū sit hoc. In creum **D**
 vas mingito, & in vrinā, aris florem tostum, tritum, leuem in
 spergito, deinde diluito, ac vas agitato, & in sole siccato. Vbi
 vero siccatum fuerit, eradito, terito, & leuigatū ad anum ap-
 ponito, & splenia oleo imbuta addito, ac spongiā supra de-
 ligato. Alius modus. Ad nascitur ad venā sanguis suā ex-
 tuberantē, velut mori fructus, & si quidem valde extra fuerit
 exuberantia, carnis testoriū circum ipsam nascitur. Homine
 igitur flexis genibus in duo mortaria siue excisos lapides lo-
 cato, ac videto. Cōperies enim inflatas partes inter nates cir-
 ca sedem, sanguinē verò intrinsecus procedere. Si itaq; mol-
 lis sit, & sub testorio cedat extuberantia, digito ipsam aufer-
 re oportet. Nihilo enim plus difficultatis hæc res habet, quā **E**
 si quis dum ouicula excoriatur, digitū inter cutē ac carnem
 adigat. Atque hæc interim dum loqueris, agro non animadu-
 uertēte facito. Postquā autē extuberantiā abstuleris, necesse
 est sanguinis cursus ex tota detractione promanare. Itaq; vi-
 no austero in quo gallæ macerate sunt, cito abluere oportet:
 & vena sanguisua vnā cum extuberantia peribit, & testo-
 rium sedabitur, & quanto vetustior affectio fuerit, tanto fa-
 ciliior sanatio erit. Si verò penitus intus delituerit extube-
 rantia, per catopterem inspicito, & ne à catoptere decipiaris
 videto. Cum enim aperitur, extuberantiā explanat: dū verò
 rursus cōtrahitur, rectē ostendit. Auferre autē oportet, vera-
 tro nigro in anum sublito: deinde tertia die auferre, ac vino **F**
 austero infuso colluere. Caterum quòd sanguis non fluit,
 quū abstuleris extuberantiā, mirari non oportet. Neq; enim
 si in articulis disseces manus aut crura, sanguis profluet. Si ve-
 rò supra aut infra articulos secueris, cauas ac sanguisuias ve-
 nas cōperies: & difficile fuerit vt expeditē listas. Sic etiā hæ-
 morrhoidem in sede, si supra aut infra extuberantiæ detra-
 ctionem feces, sanguis profluet. Si verò ipsam exuberantiā
 in connexu abstuleris, non profluet. Si quidem igitur ita se-
 datur, bene habet: Sin minus, vrito, cauendo vt ne contingas
 ferro, sed propè ad motis ferramentis resiccato, & florem
 aris ex vrina apponito, Alius modus curationis hæmorrhoi-
 dum. Clysterem facere oportet, velut arundinem sepiariam,
 phragmiten appellatam, & in ipsum ferramentū probè con-
 gruū adaptare. Deinde indita in sedē clysteris fistula, fer-
 rament

Alia cura-
tio.

A ramentum candens immittere, ac frequenter eximere, quo magis calefieri sustineat, & neque vlcus ex calore habeat, & venæ resiccatae sanæ fiant. At verò si neque vrere, neq; resicare voles, vbi multa calida aqua proluxi, & sedem euersam extraxisti, myrrham tritam, leuigatā, & gallam, & alumen Aegyptiū vstum vna & dimidia ac reliqua parte, & melanteriae tantundem accipe, atque siccis his vttere. Haemorrhoids enim ab his medicamentis decedet, velut coriū combustum, Hæc facito donec omnes extirpaueris. Et dimidia chalcitidis vstæ pars idem efficit. Si verò glandulis sanare voles, sepiæ testam, plumbaginis tertiam partem, bitumen, alumen, florem æris modicum, gallam, æruginem modicam, commi

B sceto & mel coctum affundito, & formatam ex his glandem oblongiorem apponito, donec extirpaueris. Muliebre

hæmorrhoidē hoc modo curato. Multa calida aqua prolui-
to. In aqua verò odorata, velut est myrica trita coquito. De-
inde spumam argenti tostam, & gallam misceto, & vinum
album, & oleum, & anseris adipem affundito, omniāque si-
mul trita, post factam prolutionem illinenda dato. Proluere
verò oportet sede quā maximè extracta.

Muliebris
hæmor-
rhois.

H I P P O C R A T I S

COI LIBER DE VISU,

IANO CORNARIO

C

M E D I C O P H Y -

S I C O I N T E R -

P R E T E .

*



Culi corrupti sponte quidem carulei fi-
entes, derepente tales fiunt, & vbi facta fue-
rint, non est talium sanatio. Qui verò ma-
ris speciem referūt, paulatim per multum
tempus procedendo corrumpuntur, & sæ-
pe alter oculus in multo tempore postea
corruptus est. Huius caput purgare oportet, & venas vrere. Et si quis ab initio curatus fuerit hoc mo-
do,

Visus corru-
ptus qualis.

Medela.

do, malum sedatur, & in deterius non procedit. At qui colo-
 rem inter cæruleum ac marinum medium referunt, si qui-
 dem puero tales fiant, ubi senior sit, sedantur. Si verò senio-
 ri septimum annum egresso fiant, melius videt magna val-
 de & splendida: & videt quidem procul, sed non clarè: & si
 quid valde ad oculum admouerit, etiam hoc videt, aliud au-
 tem nihil. Confert autem huic capitis purgatio, & capitis
 vstio. Sanguinem verò his detrahare non conducit, neq; cæ-
 ruleo, neque maris speciem referenti. Et visum oculorum,
 oculo sano existēte, in iunioribus hominibus, tum fœmellis,
 tum masculis, quicquam faciendo nihil iuueris, quandiu ad-
 huc augefcit corpus. Quum autē nō ampliùs augefcit, ipsius
 oculi palpebras intuitus radendo attenuato, & si opus esse
 visum fuerit, etiam ferramentis non admodum candenti-
 bus intrinsecus inurito. Quum verò palpebras oculi raseris,
 lana milesia, crispa, pura, circumfusus obnoluta, radito,
 ipsam oculi coronam vitando, vt ne ad charta liginem vsque
 peruras. Signum autem sufficientis rasuræ est, si non am-
 pliùs splendidus sanguis exit, sed sanies cruenta aut aquosa.
 Tunc verò liquido aliquo medicamento, in quo flos æris est,
 defricare oportet. Postea autem ubi & rasionis, & vstionis
 crustæ exciderint, & vlcera purgata fuerint ac germinaue-
 rint, fissuram per sinciput secare oportet, & quum sanguis
 defluxerit, medicamento cruentis vulneribus idoneo illi-
 nere: Deinde verò & huius, & omnium caput purgare ope-
 ræ precium est. Palpebræ si crassiores quàm pro natura
 fuerint, ex inferna parte carne quantum potes quàm expe-
 ditissimè resecta, postea palpebram inurito, non candenti-
 bus ferramentis, vitando naturam pilorum: aut flore æris
 tosto tenui adstringito. Quum autem crusta exciderit, ve-
 lut reliqua curato. Quum palpebræ scabie laborant, &
 pruritus habet, floris æris glebulam ad cotem terito, & ex
 ipso palpebram defricato. Et tunc squamam æris quàm te-
 nuissimè terito, deinde vix immaturæ succum excolatum
 affundito, ac leuiter simul terito. & postea reliquum suc-
 cum in vase æris rubri affundens, paulatim terito, donec
 crassitudo fiat velut allij intritum, & ubi resiccatum fuerit
 Nyctalops medicamentum, leuiter trito vtire. Nyctalops medica-
 quæ curetur mentum bibat deorsum purgans, & caput purgetur, & cer-
 uicem

Palpebra-
 rum cura-
 tio.

Palpebræ
 curatio.

Nyctalops
 quæ curetur

- A** uicem eius quàm maximè scarificato, & fame ad multũ tem-
pus premito. Vbi verò remiserit, vnũ aut duo frustra, prout
maxima deuorare potest, de hepate bubulo crudo in melle
tincto exhibeto. Si cui oculi dum sani sunt visum corrum-
pant, huic sectione & insuper excoriatione, in sinciput facta,
os exscindere, & aquam auferre oportet, sicque curare: & ita
sani fiunt. Ad lippitudinem annuam ac popularem condu-
cit purgatio capitis, & ventris inferni. Et si corpus habeat,
sanguinis detractio ad quosdam eiusmodi dolores confert.
Conferunt & cucurbitæ circa venas affixæ. Cibus modicus
& aquæ potus. Decumbat autem æger in tenebris, procul à
fumo, & igne, & aliis splendidis. atque hoc in obliquum, mo-
B dò in dextram, modò in sinistram partem. Caput verò ne hu-
meat, neque enim conducit. Cataplasma si dolor nõ adest,
verũ velut ad fluxionem cohibendam, non confert, quum
tumores sint doloris exortes. Verũ post acria medicamen-
ta, quæ ad dolorem illinũtur, postquam dolor sedatus fuerit
ac separatus, post medicamenti illinitionem, tunc cataplas-
mata imponere cõducit, si quod commodum fore visum fue-
rit. Nec verò ad multum tempus contentè intueri confert.
Lachryma enim prouocatur, quũ non possit oculus ad splen-
dida officio suo fungi. Sed neque ad multum tempus clau-
dere oculos conducit, maximè si fluxionem calidam habeat.
Lachryma enim suppressa, calefacit. Si verò fluxio non sit,
C cum puluillo sicco sublitionem facere conducit.

Medela cũ
quis tanis
oculis non
videt.
Lippitudi-
nis curatio.

HIPPOCRATIS

COL. LIBER APHORIS-
MORVM, IANO CORNA-
RIO MEDICO PHY-
SICO INTER-
PRETE.

*

Vita



Ita brevis, ars longa, tempus princeps, experimētum periculosum, iudicium difficile. Oportet autem nō solum seipsum exhibere quæ decet facientem, sed etiā agrotum, & praesentes, & quæ externa sunt. **II.** In perturbationibus alui, & vomitibus sponte fientibus, si quidem qualia purgari oportet purgentur, confert, & leuiter ferunt: Sin minus, vice versa. Sic & vasorum vacuatio, si quidem talis fuit, qualis fieri debet, confert, & bene ferunt: Sin minus, vice versa. Inspicere itaque oportet regionem, & tempus, & aetatem, & morbos, in quibus conuenit, aut non. **III.** In exercitationibus boni habitus ad summum progressi periculosi sunt, si in extremo fuerint. Non enim manere possunt in eodem, neque quiescere. Quum verò non quiescant, non amplius in melius augescere possunt. reliquum est igitur ut in deterius. Ob has igitur causas bonam habitudinem non tardè soluere cōfert, quo corpus rursus renutritionis principium sumat. Neque verò collapsiones ad extremum ducere oportet: periculosum enim est. Sed qualis natura est eius qui perferre debet, ad hoc ducere conuenit. Similiter autem & euacuationes ad extremū ducētes periculosæ sunt. & rursus renutritiones in extremo existentes, periculosæ sunt. **IIII.** Tenuis & exacti victus, & in **F** longis semper affectionibus, & in acutis, ubi non expedit, periculosi sunt. & rursus victus ad extremam tenuitatem progressi, difficiles sunt. Et repletiones ad extremum progressæ difficiles sunt. **V.** In tenui victu delinquentes agrotantes, magis læduntur. Omne enim delictum quod committi poterit, magis magnum committitur in tenui quàm in paulò pleniore victu. Quapropter etiam in sanis periculosus est valde tenuis, & constitutus, ac exactus victus, quoniam delicta grauius ferunt. Ob hoc igitur tenuis & exactus victus periculosus est magis quàm paulò plenior. **VI.** Ad extremos morbos, exactè extremæ curationes, optimæ sunt. **VII.** Vbi igitur peracutus est morbus, statim etiam extremos labores habet, & extreme tenuissimo victu
ubi

A uti necesse est. Vbi non, sed pleniore victu uti licet, intantum subdescendendum est, inquā tum morbus extremis mollior fuerit. **viii.** Quum in vigore fuerit morbus, tūc tenuis-
simo victu uti necesse est. **ix.** Simul autem coniectare o-
porteret, an æger ex victu durare possit ad morbi vigorem: &
vtrum ille prius deficiet, & ex victu durare non possit: aut
morbus prius deficiet ac obtundetur. **x.** Quibus igitur
statim vigor est, his statim tenuis victus exhibendus est.
Quibus verò vigor posterius, his ad illud, & paulò ante illud
tempus subtrahendus est. Antea verò mitius æger victu tra-
ctandus est, quo durare possit. **xi.** In exacerbationibus
subtrahere victum oportet. Nam apponere noxa est. Ex qui-
B bus per circuitus exacerbationes fiunt, in exacerbationibus
subtrahere oportet. **xii.** Exacerbationes & constitutio-
nes indicabunt morbi, & tempora anni, & circuituum inter
se collata incrementa, siue quotidie, siue alternis diebus, siue
per amplius temporis interuallum fiant. Sed & ex apparen-
tibus indicia fiunt, velut in pleuriticis, si sputum statim ap-
pareat incipiente morbo, ipsum abbreviat. Si verò posterius
appareat, producit, & vrinæ, & alui egestionem, & sudores ap-
parentes indicant & agrè & facillè iudicandos, & breues &
longos morbos. **xiii.** Senes facillimè ieiunium ferunt,
Deinde ætate consistentes. Minimè adolescentes: omnium
verò minimè pueri, inter hos ipsos qui ipsi seipsis alacriores
C fuerint. **xiiii.** Qui crescunt, plurimum habent innatū
calorem: plurimo igitur opus habent alimento. Sin minus,
corpus consumitur. Senibus autem modicus est calor: qua-
propter paucis fomitibus opus habent, à multis enim extin-
guuntur. Ob hanc etiam causam febres senibus non simili-
ter acutæ fiunt. Frigidum est enim ipsorum corpus.

xv. Ventres hyeme & vere natura calidissimi sunt, &
somni longissimi: Quapropter in his temporibus alimenta
plura exhibenda sunt. Nam innatum calorem ampliorem
tunc habent, alimento igitur ampliore opus habet. Signum
sunt ætates, & athletæ. **xvi.** Victus humidi omnibus fe-
bricitantibus conferunt. Maximè verò pueris, & aliis ita ali
adsuetis. **xvii.** Et quibus semel aut bis, & plus aut mi-
nus, & ex parte exhibere oportet, considerandum est. Dan-
dum verò etiam aliquid est tempori, & regioni, & ætati, &

T t

consue

consuetudini. xviii. Aestate & autumnno cibos difficil- D
limè ferunt: hyeme facillimè, deinde vere. xix. His qui
in circuitibus exacerbantur, nihil dare oportet, neque cogere
sed auferre de appositionibus ante iudicationes.

xx. Quæ iudicantur, & iudicata sunt integrè, neque mo-
uere oportet, neque nouare, neque medicamentis, neq; aliis
irritamentis, sed sinere. xxi. Quæ ducere oportet, quò
maximè repunt, eò ducere oportet, per conuenientes locos.

xxii. Concocta medicamentis aggredi oportet, & mo-
uere non cruda, neque in principiis, si non turgent. plurima
verò non turgent. xxiii. Quæ prodeunt non multitu-
dine æstimare oportet, sed quandiu prodeant qualia oportet,
& facillè æger ferat. Et vbi opus est, vsque ad animi deliquiũ E
ducere oportet: & hoc facere, si sufficiat æger. xxiiii. In
acutis affectionibus rarè etiam in principiis medicamentis
vti oportet: atque hoc facere diligenti prius æstimatione fa-
cta. xxv. Si qualia oportet purgari, purgentur, confert
& facillè ferunt. Contraria verò difficulter.

SECTIO SECVNDA.

I IN quo morbo somnus laborem facit, mortale: Si verò
somnus profit, non lethale. ii. Vbi somnus delirium
sedat, bonum est. iii. Somnus, vigilia, vtraque mo-
dum excedentia, malum. iiii. Non satietas, non fa-
mes, neque aliud quicquam bonum est, quod naturæ modũ F
excedat. v. Lassitudines spontaneæ denunciant morbos.

vi. Quicumque aliqua corporis parte dolentes, plerun-
que dolores non sentiunt, his mens ægrotat. vii. Quæ
multo tempore attenuantur corpora, lentè reficere oportet.
Quæ verò breui, breui. viii. Si ex morbo cibum ca-
piens quis non fiat validus, significat quòd corpus vberiore
alimento vtitur. Si verò cibum non accipiente hoc cõtingat,
nosse oportet quòd euacuatione opus habet. ix. Corpo-
ra quocunque quis purgare voluerit, fluida facere oportet.

x. Non pura corpora quanto plus nutries, tanto magis
lædes. xi. Facilius est repleti potu, quàm cibo. xii. Quæ
relinquuntur in morbis post iudicationẽ, recidiuam faciũt.

xiii. Quibuscunque iudicatio fit, his nox grauis ante
exacerbationem. Quæ verò sequitur plerunque tolerabilior
est. xiiii. In alui fluxionibus, mutationes egestionum
profunt

aphorismorum. 310
A profunt, si non ad prauas mutantur. xv. Vbi fauces agrotant, aut tubercula in corpore nascuntur, excretiones considerare oportet. Si enim biliosae fuerint, corpus simul agrotat. Si verò similes sanis fiant, tutum est corpus nutrire. xvi. Vbi fames, non oportet laborare. xvii. Vbi cibus præter naturam copiosior ingressus fuerit, morbum facit. Ostendit autem sanatio. xviii. Eorum quæ acruatim & velociter nutriunt, veloces etiam egestionem fiunt. xix. Acutorum morborum non omnino tutæ sunt prædictiones, neque mortis, neque sanitatis. xx. Quibus dum iuuenes sunt, ventres humidi sunt, his senescentibus resiccantur. Quibus verò dum iuuenes sunt, ventres sicci sunt, his senescentibus humectantur. xxi. Famem vini potus soluit.

B xxii. Quicumque morbi ex repletionem fiunt, euacuatio sanat. Et quicumque ex euacuationem, repletio. Et aliorum contrarietas. xxiii. Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. xxiiii. Septimæ quarta index est. Alterius hebdomadæ octaua principium est. Consideranda verò est undecima. Hæc enim quarta est secundæ hebdomadæ. Consideranda rursus decima septima. Ipsa enim est quarta quidē à decima quarta, septima verò ab undecima. xxv. Aestiuæ quartanæ plerunque sunt breues. Autumnales verò longæ, & maximè quæ ad hyemem pertingunt. xxvi. Febrem in conuulsione fieri melius est, quàm conuulsionem in febre. xxvii. His quæ non secundum rationem le-

Cuant, non oportet credere. neque valde timere ea quæ praua fiunt præter rationem. Pleraque enim ex talibus inconstantia sunt, & non valde permanere, neque morari solent.

xxviii. Febricitantium non omnino leuiter, permanere, & nihil minui corpus, aut etiā magis quàm pro ratione colliquari, malum est. Illud enim morbi longitudinem, hoc verò debilitatem significat. xxix. Incipientibus morbis si quid mouendum videtur, moue: vigentibus verò, quietem agere melius est. xxx. Circa principia & fines, omnia debiliora sunt. Circa vigores verò, fortiora. xxxi. Ex ægritudine bene cibum accipienti, nihil augescere corpus, malum est. xxxii. Plerunque omnes malè habentes, ab initio cibum bene capientes, & nihil augescentes, ad finem rursus cibos fastidiunt. At ab initio quidem valde ci-

Tt 2 bum

bum auersantes, postea verò bene cibum capientes, melius **D**
liberantur. **xx xiii.** In omni morbo valere mente, &
bene se habere ad ea quæ exhibentur, bonum, contrariū ve-
rò, malum. **xx xiiii.** In morbis minus periclitantur,
quorum naturæ, & ætati, & habitui, & tempori morbus ma-
gis affinis fuerit, quàm hi quibus non affinis in aliquo horū
existit. **xx xv.** In omni morbo partes circa vmbilicum
& pectinem, crassitudinē habere melius est. At vehemens te-
nuitas & eliquatio, praua est. Periculosa verò talis est etiam
ad infernas purgationes. **xx xvi.** Sana habentes corpo-
ra, dum medicamentis purgantur, cito exoluuntur. Itēque
qui prauo cibo vtuntur. **xx xvii.** Qui bene habent
corpore, eos operosum est medicamentis purgare.

xx xviii. Paulò deterior & potus & cibus, verū iu-
cundior, melioribus quidem, sed iniucundioribus præferen-
dus est. **xx xix.** Senes iuuenibus plerunque minus agro-
rant. Quicunque verò ipsis fiunt morbi diuturni, vt pluri-
mum commoriuntur. **xl.** Raucedines & grauedines, in
valde senibus non concoquuntur. **xli.** Qui exoluuntur
sæpè & fortiter, absque manifesta causa, derepente moriun-
tur. **xlii.** Syderationem fortem quidem soluere, im-
possibile est: debilem verò, non facilè. **xliii.** Ex his
qui strangulantur, & submerguntur, nondum autem mor-
tui sunt, non reconualescunt quibus spuma circa os fuerit.

xliiii. Crassi admodum secundum naturam, magis
cito moriuntur, quàm graciles. **xl v.** Iuuenibus comitia-
libus liberationem faciunt mutationes, maximè ætatis, &
regionum, & victuum. **xl vi.** Duobus doloribus simul
fientibus, non secundum eundem locum, vehemētior obscu-
rat alterum. **xl vii.** Circa generationem puris dolores
& febres magis cōtingunt, quàm factō iam ipso. **xl viii.**
In corporis motu: quum incœperit dolere, quiescere statim
lassitudinem eximit. **xl ix.** Adæti consuetos labores
ferre, etiam si fuerint debiles, aut senes, non adæti fortis-
sime ac iuuenibus facilius ferunt. **l.** Ex multo tempore con-
sueti, etiam si deteriora fuerint, inconsueti minus molesta-
re solent. Oportet igitur etiam ad inconsuetam transmutatio-
nem facere. **li.** Multum & repente euacuare, aut replere,
aut calefacere, aut frigefacere, aut omnino quomodocunque
corpus

A corpus mouere, periculosum est. Et omnis multitudo naturæ contraria est. Quod verò paulatim fit, tutum est, tū aliàs, tum si ex altero ad alterum transitus fit. **LII.** Omnia secundum rationem facienti, si non secundum rationem fiant, non transire oportet ad aliud, manente eo quod visum est ab initio. **LIII.** Quicunque ventres humidos habent, dum quidem iuuenes sunt, melius degunt quàm hi qui siccos habent. Verùm ad senectutem deterius degunt. Resiccantur enim plerunque senescentibus. **LIIII.** In corporis magnitudine iuuentutem quidem degere, liberale est, & non indecorum. Senectutē verò degere, inutile, & deterius paruitate.

SECTIO TERTIA.

B Mutationes temporum maximè pariunt morbos, & in temporibus magnæ mutationes frigoris, aut caloris, & reliqua iuxta rationem hoc modo. **II.** Naturarum aliæ quidem ad æstatem, aliæ verò ad hyemem, bene aut male se habent. **III.** Morborum alij ad alia tempora, bene aut male se habent: & ætates quædam ad tempora, & regiones, & victus. **IIII.** In temporibus quum eadem die, modò calor, modò frigus fit, autumnales morbos expectare oportet. **V.** Austri auditum grauantes, caliginosi, caput grauantes, torpidi, dissoluentes. Quum hic præualuerit, talia in morbis patiuntur. Si verò Aquilo fuerit, tussis, fauces, alui duræ, vrinæ difficultates, horrores, dolores costarum, pectoris. Quum hic dominatur, talia in morbis expectare oportet. **VI.** Quum æstas fit veri similis, sudores in febribus multos expectare oportet. **VII.** In siccitatibus febres acutæ fiunt, & si quidem annus ampliùs talis fuerit, qualem constitutionem fecerit, plerunque tales etiam morbos expectare oportet. **VIII.** In constantibus temporibus, si tempestiuè tempestiua reddantur, morbi constantes & iudicatu facilimi fiunt. In inconstantibus autem inconstantes, & qui difficulter iudicantur. **IX.** In autumno morbi acutissimi, & omnino mortiferi. Ver autem saluberrimū & minimè lethale. **X.** Autumnus tabidis malus. **XI.** De temporibus si quidem hyems sicca & aquilonaris fuerit, Ver autem pluuiosum & australe, necesse est æstate febres acutas, & lippitudines, & dysenterias fieri, maximè mulieribus, & viris natura humidioribus. **XII.** Si verò hyems australis, &

Tr 3

pluuio

pluuiosa, ac clemens fiat, Ver autē siccum & aquilonare, mu- D
 lieres quidem quibus partus ad ver instat, ex omni occasione
 abortiunt. Quæ verò pariunt, impotentes ac morbosos pue-
 ros pariunt, ita vt aut statim pereant, aut tenues ac morbofi
 viuant. Aliis autem dysenteria, & lippitudines sicca fiunt.
 Senioribus verò defluxiones breui perimentes. xiii. Si
 verò aestas sicca fiat & aquilonaris: Autumnus autem pluui-
 osus & australis, capitis dolores ad hyemem fiunt, & tusses, &
 raucedines ac grauedines: quibusdam etiam tabes. xiiii.

Si verò aquilonaris & aquarum exors autumnus fuerit,
 his quidem qui humiditas naturas habent, & mulieribus com-
 modus erit. Reliquis verò fient lippitudines sicca, & febres
 acuta, & grauedines. Quibusdam verò etiam atra biles. E

xv. Ex anni verò constitutionibus, in summa siccitates
 pluuiosis salubriores sunt, & minus lethales. xvi. Mor-
 bi in pluuiosis quidem plerunque fiunt, febres longa, & alui
 fluxiones, & putredines, & comitiales, & syderationes, & an-
 gina. In siccitatibus verò, tabes, lippitudines, arthritides, vri-
 nae stillicidia, & dysenteria. xvii. Quotidianæ verò con-
 stitutiones, aquilonares quidem corpora compingunt, & ro-
 busta, & ad motum idonea, & bene colorata, & melius au-
 dientia faciunt, & ventres resiccant, & oculos mordent, & si
 circa thoracem aliquis dolor prius est, magis affligunt. Au-
 strales autem corpora dissoluunt, & humectant: & grauem
 auditum, ac capitis grauitatem, & vertigines faciunt. In oculis F
 autem & corporibus egrum motū, & ventres humectant.

xviii. Secundum tempora vere quidem & prima aestate,
 pueri, & qui his ætate cohærēt, optimè degunt, & maximè
 sani sunt. Aestate verò & autumno aliquandiu, senes. Reli-
 quo autumno & hyeme, mediam ætatem habentes. xix.

Morbi omnes quidem in omnibus temporibus fiunt.
 Quidam tamen magis in quibusdam ipsorum, & fiunt &
 exacerbantur. xx. Vere insania, & atra biles, & comi-
 tiales, & sanguinis fluxiones, & angina, & grauedines, & rau-
 cedines, & tusses, & lepra, & impetigines, & vitiligines, &
 pustulae ulcerosa plurima, & tubercula, & morbus articula-
 ris. xxi. Aestate verò & quidam ex his, & febres con-
 tinua, & ardentes, & tertiana plurima, & quartana, & vo-
 mitus, & alui profluvia, & lippitudines, & aurium dolores,
 & oris

A & oris exulcerationes, & pudendorum putredines, & papulae sudorosa. **xxii.** Autumno autem & ex aestiuis multi, & febres quartanae, & erroneae, & splenes, & hydropes, & tabes, & urinae stillicidia, & intestinorum leuitates, & dysenteriae, & coxendices, & anginae, & anhelationes, & voluuli, & comitiales, & infaniae, & atrae biles. **xxiii.** Hyeme verò pleuritides, peripneumoniae, grauedines, raucedines, tussis, dolores pectorum, laterum ac lumborum, capitis dolores, vertigines, syderationes. **xxiiii.** In aetatibus autem talia contingunt, paruis ac recens natis pueris feruida oris vlcera, vomitus, tussis, vigiliae, tumores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates. **xxv.** Ad dentitionem verò accedentibus, gingiuarum pruritus, febres, conuulsiones, alui profluvia, & maximè ubi dentes caninos producant, tum crassissimis pueris, tum his qui duros ventres habent. **xxvi.** Senioribus autem sientibus, tonsillae, verticuli in occipitio intro, luxationes, anhelationes calculorum generationes, lumbrici rotundi, ascarides, verrucae, tumores glandularum circa aures oblongi satyriasmii appellati, strumae, & alia tubercula, maximè verò praedicta. **xxvii.** Adhuc verò senioribus, & ad pubertatem accedentibus, pleraque ex his, & febres diurnae magis, & ex naribus sanguinis fluxiones. **xxviii.** Plurimae verò affectiones pueris iudicantur, partim in quadraginta diebus, partim in septem mensibus, partim in septem annis, partim ad pubertatem accedentibus. Quae

C verò permanferint pueris affectiones, & non exolutae fuerint circa pubertatem, aut foemellis circa mensium eruptiones, diurnae fieri solent. **xxix.** Iuuenibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutae, comitiales, & alij morbi, maximè verò praedicti. **xxx.** His verò qui hanc aetatem excesserunt, anhelationes, pleuritides, peripneumoniae, lethargi, phrenitides, febres ardentes, alui profluvia diurna, bilis sursum ac deorsum effusiones, dysenteriae intestinorum leuitates, haemorrhoides. **xxxi.** Senibus autem spirandi difficultates, & defluxiones cum tussi, urinae stillicidia, urinae difficultates, articulorum dolores, nephritides, vertigines, syderationes, mali habitus, pruritus totius corporis, vigiliae, alui, oculorum, & narium humiditates, visus hebetudines, glaucedines, auditus grauitates.

SECTIO QVARTA.

Pragmantes medicamentis purgare oportet, si turget humor, quarto mense, & vsque ad septimum. Minus verò has. Iuniores autem & seniores fœtus vereri oportet. **i i.** In medicamentorum vsu, talia ex corpore ducere oportet, qualia etiam sponte prodeuntia commoda sunt. Contrario autem modo prodeuntia, sedare. **i i i.** Si qualia oportet purgari, purgentur, confert & facile ferunt. Contrario verò difficulter. **i i i i.** Medicamentis purgare oportet æstate quidem superiores magis: hyeme verò inferiores. **v.** Sub canem, & ante canem, operosæ sunt medicamentorum purgationes. **v i.** Graciles, & facile vomentes, sursum purgare oportet, vitantes hyemem. **v i i.** Difficulter vomentes, & moderate carnosos, deorsum, vitantes æstatem. **v i i i.** Tabescentes autem, vitantes superiores. **i x.** Atrabiliarios verò plenius inferiores. Eadem ratione contraria apponens.

x. Purgare oportet in valde acutis, si humor turget, eadem die. Morari enim in talibus malum est. **x i.** Quibus tormina, & circa vmbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neq; à medicamento, neq; aliàs soluitur, in hydropē siccum firmatur. **x i i.** Quibus alui intestinorum leuitate affecti, eos hyeme sursum purgare malum est. **x i i i.** Ad veratrum, his qui non facile sursum purgantur, ante potionem corpora humectare oportet, ampliore cibo ac quiete.

x i i i i. Vbi biberit quis veratrum, ad motus quidem corporum magis ducere oportet, ad somnos autem & quietem minus. Declarat autem nauigatio, quòd motus corpora turbat. **x v.** Vbi volueris magis ducere veratrū, corpus moueto. Vbi verò sistere, somnum facito, & ne moueto. **x v i.** Veratrum periculosum est sanas carnes habentibus. Conuulsionem enim inducit. **x v i i.** Sine febre existenti cibi fastidium, & oris ventriculi morsus, & vertigo, & os amarescens, medicamento sursum purgante opus habere significat.

x v i i i. Dolores supra septum transversum, qui purgatione opus habent sursum versus purgatione indigere significant: qui verò infra, deorsum. **x i x.** Qui in medicamentorum potionibus, dum purgantur non sitiunt, non cessant priusquam sitierint. **x x.** Non febrientibus si fiat tormentum, & genuum grauitas, & lumborum dolor, deorsum medica

- A** dicamento purgante opus habere significat. **xxi.** Egestiones alui nigrae, velut sanguis niger, sua sponte prodeuntes, & cum febre, & sine febre, pessimae sunt: & quanto plures fuerint peiores colores, tanto magis malum est. Cum medicamento vero melius, & quanto plures fuerint colores, non malum est. **xxii.** Quibuscunque morbis incipientibus, si atra bilis, aut sursum aut deorsum prodierit, lethale est. **xxiii.** Quibuscunque ex morbis acutis, aut ex diuturnis, aut ex vulneribus, aut alias attenuatis, atra bilis, siue qualis sanguis niger subierit, postridie moriuntur. **xxiiii.** Dysenteria si ab atra bile inceperit, lethalis est. **xxv.** Sanguis sursum quidem qualiscunque fuerit, malus est, deorsum vero bona sunt nigrae subeuntia. **xxvi.** Si a dysenteria occupato, veluti carnes subierint, lethale est. **xxvii.** Quibus in febribus sanguinis multitudo erumpit vndecunq; his in refectionibus alui humectantur. **xxviii.** Quibus biliosae sunt egestionis, surditate fiens cessant. Et quibus surditas, biliosis egestionibus fiens cessat. **xxix.** Quibus in febribus sexta die rigores fiunt, difficulter iudicant. **xxx.** Quibus exacerbationes fiunt, quacunque tandem hora febris dimiserit, si postridie eadem qua antea hora corripuerit, difficulter iudicant. **xxxi.** De lassatis in febribus ad articulos, & circa maxillas maxime, abscessus fiunt. **xxxii.** Quibuscunq; resurgentibus ex morbis, si quid doluerit, isthic abscessus fiunt. **xxxiii.**
- Sed & si ante morbum quid doluerit, isthic morbus incubit. **xxxiiii.** Si a febre occupato, tumore non existente in faucibus, suffocatio derepente contingat, lethale est. **xxxv.** Si a febre occupato collum repente obuersum fuerit, & vix deglutire poterit, tumore non existente, lethale est. **xxxvi.** Sudores febricitanti si inceperint, boni sunt tertia die, & quinta, & septima, & nona, & vndecima, & decimaquarta, & decima septima, & vigesima prima, & vigesima septima, & trigesima prima, & trigesima quarta. Hi enim sudores morbos iudicant. Qui vero non sic fiunt, dolorem significat, & longitudinem morbi, & recidivas. **xxxvii.**
- Frigidi sudores cum acuta quidem febre fiens, mortem significant: cum mitiore vero, morbi longitudinem. **xxxviii.** Et ubi in corpore sudor est, illic morbum esse declarat. **xxxix.** Et ubi in corpore frigiditas aut caliditas, isthic
- Tc s morb

morbus est. x l. Et ubi in toto corpore mutationes, & si **D**
 corpus perfrigeretur, aut rursus calefiat, aut color alius ex
 alio fiat, longitudinem morbi significat. x l i. Sudor multus
 ex somno, citra manifestam causam fiens, corpus multo ali-
 mento vti significat. Si verò cibum non capienti hoc fiat, si-
 gnicat quòd euacuatione opus habet. x l i i. Sudor multus,
 frigidus aut calidus, semper fluēs: frigidus maiorem calidus
 minorem morbum significat. x l i i i. Febres quæcunque
 non intermittentes per tertiam fortiores fiunt, magis pericu-
 losæ sunt. Quocunque verò modo intermiserint, quòd sine
 periculo sint significant. x l i i i i. Quibus febres longæ,
 his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt. x l v. Quibus
 tubercula ad articulos, aut dolores, ex febribus longis fiunt,
 hi pluribus cibis vtuntur. x l v i. Si rigor incidat febre nō **E**
 intermittente ægroto iam debili, lethale est. x l v i i. Ex-
 creationes in febribus non intermittētibz, liuidæ, & cruen-
 tæ, & graecolentes, & biliosæ, omnes malæ sunt. At probè se-
 cedētes, bonæ, & per alui egestionē, & per vrinas. Si verò nō
 aliquid ex conducentibus excernatur per hos locos, malū est.

x l v i i i. In non intermittētibz febribz, si externæ
 quidem partes frigida fuerint, internæ verò ardeāt, ac sitim
 habeant, lethale est. x l i x. In febre non intermittēte, si
 labium aut palpebra, aut superciliū, aut oculus, aut nasus di-
 storqueatur: aut non videat, aut non audiat, æger iam debilis
 existens, quicquid horum fiat, propinqua mors est. l. Vbi
 in febre non intermittēte difficultas spirandi, & delirium **F**
 fit lethale est. l i. In febribz abscessus qui non soluun-
 tur ad primas iudicationes, longitudinem morbi significāt.

l i i. Quicunque febribz, aut aliis ægritudinibz, ex vo-
 luntate lachrymātur, nihil absurdi est. Qui verò nō ex volun-
 tate, absurdum. l i i i. Quibus circa dentes in febribz vi-
 scosa adhærēt, his fortiores febres fiunt. l i i i i. Quibus ple-
 runque tusses siccæ, parum irritantes, in febribz ardentibz,
 hi non ita valde siticulosi sunt. l v. Ex glandularum tumo-
 ribz febres omnes malæ sunt, exceptis diariis. l v i. Fe-
 bricitanti sudor oboriēs febre non remittēte, malum. Morā
 enim trahit morbus, & multam humiditatem significat.

l v i i. A conuulsione, aut distentione neruorum vexato,
 febris accedens morbum soluit. l v i i i. A febre ardente
 occup

A occupato, rigore accedente, solutio fit. **LIX.** Tertianæ exacta in septem circuitibus ad summum iudicatur. **LX.**

Quibus in febribus aures obsuruerunt, his sanguis e naribus effusus, aut alius exturbata, morbum soluit. **LXI.**

Febrientem si non in diebus imparibus febris dimiserit, recidiuare solet. **LXII.** Quibus in febribus morbus regius fit ante septimum diem, malum. **LXIII.** Quibus in febribus quotidie rigores fiunt, quotidie febres solvuntur.

LXIII. Quibus in febribus morbus regius septima, aut nona, aut decima quarta accedit, bonum, si non præcordium dextrum durum fiat: sin minus, non bonum.

LXV. In febribus circa ventrem æstus vehemens, & cordis siue oris ventriculi morsus, malum. **LXVI.** In febribus acutis conuulsiones, & circa viscera dolores fortes, malum.

LXVII. In febribus, ex somnis, timores aut conuulsiones, malum. **LXVIII.** In febribus spiritus offendens, malum. Conuulsionem enim significat. **LXIX.** Quibus urina crassa, grummosa, paucæ, non sine febribus, ubi copia ex his successit, tenuis prodest. Tales autem maximè prodeunt his quibus ab initio, aut breui subsidentiam habent. **LXX.**

Quibus in febribus urina conturbata, velut iumentis, his capitis dolores, aut adsunt, aut aderunt. **LXXI.** Quibus septima die morbi iudicantur, his nubeculam habet urina, quarta die rubrum, & alia secundum rationem. **LXXII.**

C Quibus urina pellucida, albæ, malæ. Maximè autem in phreneticis comparent. **LXXIII.** Quibus præcordia eleuata, permurmurantia, lumborum dolore accedente, his alui humectantur, si non flatus erumpant, aut urina copia prodeat. In febribus autem hæc. **LXXIII.** Quibus spes eū abscessum fore ad articulos, eos liberat ab abscessu urina multa, & crassa, & alba prodiens, qualis in febribus laboriosis quarta die quibusdam fieri incipit. Si verò etiam ex naribus sanguis eruperit, breui admodum soluitur. **LXXV.** Si quis sanguinem aut pus mingat, rhenum aut vesicæ ulcerationem significat. **LXXVI.** Quibus in urina crassa existente, caruncula parua, aut veluti pili simul exeunt, his de rhenibus excernuntur. **LXXVII.** Quibus in urina crassa existente, fursuracea quædam simul minguntur, his vesica scabie affecta est. **LXXVIII.** Qui sua sponte sanguinem mingunt, his

his in renibus venæ ruptionem significat. LXXIX. Qui- D
bus in vrina, arenosa subsidunt, his vesica calculo laborat.

LXXX. Si quis sanguinē mingat, & grumos, & vrinæ stil-
licidium habeat, & dolor incidat in imum ventrem, & ani ac
scroti intercapedinem, partes circa vesicam affectæ sunt.

LXXXI. Si quis sanguinem & pus mingat, & squamas,
& odor grauis sit: vesicæ exulcerationem significat.

LXXXII. Quibus in vrinaria fistula tuberculum nascitur
his suppuratione facta & eruptione, solutio fit. LXXXIII.
Mictio noctu multa fiens, modicā alui egestionem significat.

SECTIO QUINTA.

I COnuulsio ex veratro lethalis est. II. Ex vulnere
conuulsio lethalis est. III. Sanguine multo effuso E
conuulsio aut singultus accedens, malum.

IIII. Ex superflua purgatione, conuulsio aut singultus
accedens, malum. V. Si quis ebrius derepente voce pri-
uetur, conuulsus moritur, si non febris corripuerit, aut vbi
ad horam qua crapulæ soluuntur peruenit, loquatur.

VI. Quicunq; à distentione antrorsum ac retrorsum cor-
ripiuntur, in quatuor diebus pereunt. Si verò has effugerint,
sani fiunt. VII. Quibuscunq; morbi comitiales ante pu-
bertatem fiunt, transmutationē habent. Quibuscūque verò
vigintiquinque annos natis fiunt, his plerunq; cōmoriuntur.

VIII. Quicunque pleuritici fienses, in quatuordecim
diebus non repurgantur, his ad suppurationem transitio fit. F

IX. Tabes maximè fit ætatibus, ab anno decimo octauo,
vsque ad trigesimum quintum. X. Quicunque anginam
effugiunt, his ad pulmonem vertitur, & in septem diebus
moriuntur. Si verò has effugerint, suppurati fiunt.

XI. Qui tabe infestantur, si sputum quodcunque tussien-
do reiecèrint, grauè olet, dum prunis iniicitur, & capilli de
capite defluunt, lethale est. XII. Quibuscunque tabe la-
borantibus capilli de capite defluerint, hi alui profluuium ac-
cedente moriuntur. XIII. Quicunque sanguinem spu-
mosum spuunt, his ex pulmone eductio fit. XIV. A ta-
be occupato, alui profluuium accedens, lethale est.

XV. Quicunq; ex pleuritide suppurati fiunt, si in quadra-
ginta diebus repurgati fuerint, ab ea die qua ruptio facta fue-
rit, liberantur. Si verò nō, ad tabem transeunt. XVI. Cali-
da freq

A da frequenter ea videntibus, has noxas inducit, carniū effec-
minationem, neruorum impotētiā, mentis torporem, san-
guinis eruptiones, animi deliquia. Hæc quibus mors. xvii.

Frigida verò cōuulsiones, antrorsum ac retrorsum disten-
tiones, nigrores, rigores febriles. xviii. Frigida inimi-
ca ossibus, dentibus, neruis, cerebro, spinali medullæ. Calida
verò grata. xix. Quæcunque perfrigerata sunt, excale-
facere oportet, præterquā à quibus sanguis erumpit, aut
erupturus est. xx. Vlcerebus frigida mordax, cutem obdu-
rat, dolorem non suppurātem facit, nigrefacit, rigores febrile-
inducit, conuulsiones, distentiones. xxi. Quandoque
verò in distentione sine vlcere, iuueni carnosio, ætate media,
B frigida multæ affusio, caloris reuocationem facit. Calor au-
tem hæc soluit. xxii. Calida suppuratoria est, non in
omni vlcere, maximū signum ad securitatem, cutem mollit,
attenuat, dolores eximit, rigores, conuulsiones, distentiones
mitigat, capitis grauitatem soluit. Plurimum autem cōferre
ad ossium fracturas, maximè denudatas. Ex his autem maxi-
mè his qui in capite vlcera habent, & his quæ à frigiditate
moriuntur, aut vlcerantur, & herpetibus exedentibus, sedi,
pudendo, vtero, vesicæ. His calida grata est & iudicās. Frigi-
da verò inimica & occidens. xxiii. In his frigida vti
oportet vnde sanguis erumpit, aut erupturus est: non super
ipsas partes, sed circa ipsas vnde fluit. Et quæcūq; inflamma-
C tiones, aut flammei ardores, ad ruborem & subcruentum co-
lorem ex nouo sanguine tendunt, ad eas ipsas. nam veteres
nigrefacit, & ad sacrū ignem non exulceratum: nam exulce-
ratum lædit. xxiiii. Frigida velut nix, glacies, pectori
inimica sunt, tussis mouent, & sanguinis eruptiones, ac de-
fluxiones inducunt. xxv. Tumores in articulis, & dolo-
res absque vlcere, & podagricas affectiones. & conuulsiones:
Horū plurima frigida multa affusa leuat, & attenuat, & do-
lorem soluit. Topor enim dolorem soluit. xxvi. Aqua
quæ cito calefcit, & cito perfrigeratur, leuissima est. xxvii.
Quibus bibendi appetētiæ noctu valde sitientibus, si ob-
dormierint bonum est. xxviii. Menses ducit aroma-
rum suffitus. Multis autem modis etiam ad alia commodus
esset, si nō capitis grauitatem induceret. xxix. Prægnan-
tes medicamentis purgare oportet, si turget humor quarto
mense

menſe, & uſque ad ſeptimum. Minus uero has. Iuniores uero D
& ſeniores foetus uereri oportet. xxx. Mulierem uterum
gerentem ab aliquo acuto morbo corripì, lethale eſt. xxxi.

Mulier uterum gerens ſecta uena abortit, & magis ſi ma-
ior fuerit foetus. xxxii. Mulieri ſanguinem uomenti,
menſibus erumpentibus ſolutio fit. xxxiii. Mulieri men-
ſibus deficientibus, ſanguinem ex naribus fluere, bonum eſt.

xxxiiii. Mulieri uterum geſtanti ſi alius multum flu-
xerit, periculum eſt ut abortiat. xxxv. Mulieri quæ ab
uteri ſtrangulationibus vexatur, aut difficulter parit, ſternu-
tatio accedens, bonum. xxxvi. Mulieri menſes deco-
lores, & non eodem tempore ſemper ſientes, purgatione
opus eſſe ſignificant. xxxvii. Mulieri uterum geſtanti, E
ſi mammae repente graciles ſiant, abortit. xxxviii. Mu-
lieri uterum geſtanti, ſi altera mamma gracilis fiat, gemellos
geſtans alterum abortit. Et ſi quidem dextera gracilis fiat, ma-
ſculum: ſi uero ſiniſtra, foemellam. xxxix. Si mulier quæ
neque prægnans eſt, neque peperit, lac habet: menſes ipſius
defecerunt. xl. Mulieribus quibuſcunq; ad mammæ ſan-
guis colligitur, inſaniam ſignificat. xli. Mulierem ſi ve-
lis cognoscere, an prægnans ſit, ubi dormire uolet, aquam mul-
ſam bibendam dato. Et ſi quidem tormen habuerit circa ven-
tre, prægnans eſt. Si uero non, prægnans non eſt. xlii. Mu-
lier prægnans ſi quidem maſculum geſtat, bene colorata eſt.
Si uero foemellam, malè colorata. xliiii. Si mulieri præ-
gnanti ignis ſacer in utero fiat, lethale eſt. xlv. Quæ- F
cunque præter naturam tenues exiſtentes, uterum geſtant,
abortiunt priuſquam craſſeſcant. xlv. Quæcunque uero
moderatè corpus habentes, abortiunt bi-meſtres & tri-meſtres,
ſine cauſa manifeſta, hiſ uteri acetabula muco plena ſunt, &
non poſſunt foetum continere præ grauitate, ſed abrumpi-
tur. xlv. Quæcunque præter naturam craſſæ exiſtentes,
non concipiunt in utero, hiſ omentum oſculum uteri compri-
mit, & priuſquam attenuentur, non concipiunt. xlvii.

Si uterus in coxam incumbens, ſuppuratus fuerit, neceſſe
eſt curationem ex medicamentis, per linamenta ipſi adhibe-
re. xlviii. Foetus maſculi quidem in dextris, foeminae
uero in ſiniſtris magis. xlix. Ut ſecundæ excidant, ſter-
nutatorio indito, nares & os apprehendito, l. Mulieri
menſes

A menses si cohibere voles, cucurbitā quā maximā ad mammas appone. **L I.** Quæcunque vterum gestant, his osculum vterorum clausum est. **L II.** Mulieri vterum gestanti si multum lac ex mammis fluat, debilem fœtum significat. Si verò solidæ fuerint mammae, saniozem fœtum significant. **L III.** Quæ corrupturæ sunt fœtus, his māmæ graçiles fiunt. Si verò rursus duræ fiant, dolor erit aut in māmīs, aut in coxis, aut in oculis, aut in genibus, & non corrumpunt. **L IIII.** Quibus os vterorum durum est, his necesse est osculum vterorum clausum esse. **L V.** Quæcunque in vtero habentes, à febris corripuntur, & fortiter attenuantur sine manifesta occasione, difficulter pariūt & periculosa, aut **B** abortum facientes periclitantur. **L VI.** In fluxu muliebri, conuulsio & animi deliquium si accedat, malum est. **L VII.** Mensibus pluribus prodeūtibz morbi fiunt, & non prodeuntibus, ab vtero morbi contingunt. **L VIII.** Ex intestino recto, & vtero inflāmato, vrinæ stillicidium accedit, & ex renibus suppuratis vrinæ stillicidiū accedit. Verūm ex hepate inflāmato, singultus accedit. **L IX.** Si mulier in ventre non concipit, velis autem scire an conceptura sit, vestimentis circūtectam ex infernis suffito. Et si quidem odor per corpus tibi procedere videatur ad nares & ad os, scito quòd ipsa non propter seipsam infœcunda est. **L X.** Si mulieri vterum gestati purgationes prodeunt, impossibile est fœtum sanum esse. **L XI.** Si mulieri purgationes non prodeunt, neque horrore, neque febre accedente: verūm cibi fastidia ipsi accidunt, hanc in ventre habere existimato. **L XII.** Quæcunque frigidos ac densos vteros habent, non concipiunt: & quæcunq; humidos habent vteros, non concipiunt. Extinguitur enim in ipsis genitura. Et quæcunq; siccos magis & adustos. Præ inopia enim alimenti corrumpitur semen. Quæcunque verò ex vtrisque temperamentum habēt moderatum, tales fœcundæ fiunt. **L XIII.** Similiter autem in masculis. Aut enim propter corporis raritatem, spiritus extra fertur, vt semen non deducat: aut propter densitatem, humor non procedit foras: aut propter frigiditatem non cōcalescit, vt ad hunc locum congregetur: aut propter caliditatem, hoc idem contingit. **L XIV.** Lac dare caput dolentibus, malum. Malum etiam febricitantibus, & quibus præcordia eleuata per
murmur

murmurantia, & siticulosi. Malum & quibus biliosa alui D
 egestiones in febribus acutis sunt, & quibus sanguinis multi
 egestio facta est. Conuenit autem exhibere tabescentibus,
 non valde multum febrientibus, & in febribus longis debi-
 libus, nullo ex prædictis signis præsentē, sed præter rationē
 consumptis. L x v. Quibus tumores in vlceribus appa-
 rent, non valde conuelluntur, neq; insaniunt. His autem de-
 repente dissipatis, retrorsum quidem conuulsiones & disten-
 tiones fiunt: antrorsum verò, insanix, lateris dolores acuti,
 aut suppuratio, aut dysenteria, si rubicundi magis fuerint tu-
 mores. L x v i. Si in vulneribus fortibus ac prauis, tumor
 non appareat, magnum malum. L x v i i. Tumores laxi
 boni, crudi mali. L x v i i i. Dolenti posteriorem capitis E
 partem, vena recta in fronte secta prodest. L x i x. Rigo-
 res incipiunt, mulieribus quidem ex lumbis magis, & per dor-
 sum ad caput. Verum & viris magis posteriore corporis par-
 te quam anteriore, velut ex cubitis ac femoribus. Sed & cu-
 tis rara est. Indicat autem pilus. L x x. Qui à quartanis
 corripuntur, non ita valde à conuulsionibus corripuntur. Si
 verò prius corripiantur, & quartana insuper accedat, cessant.
 L x x i. Quibus cutis circuntenditur arida ac dura, hi si-
 ne sudore moriuntur: Quibus verò laxa ac rara, cum sudore
 moriuntur. L x x i i. Morbo regio laborantes, non ita
 valde flatuosi sunt.

S E C T I O S E X T A.

F

I N diuturnis intestinorum leuitatibus, ructus acidus acce-
 dens, qui prius non erat, signum bonum. i i. Quibus
 nares natura humidiores, & genitura humidior, morbosius
 sani sunt: quibus verò vice versa, salubrius. i i i. In longis
 intestinorum leuitatibus, cibi fastidium malum, & cum febre pe-
 ius. i i i i. Vlcera circunglabra maligna sunt. v. Dolo-
 res in lateribus, & in pectoribus, & in aliis partibus, an mul-
 tum differunt, considerandum est. v i. Rhenū affectiones,
 & quæ circa vesicam consistunt, operosè sanantur in senibus.
 v i i. Dolores circa ventrem fientes, sublimes quidem
 leues sunt, non autem sublimes, fortiores. v i i i. Hy-
 dropicis fientia vlcera in corpore, non faciliè sanantur.
 i x. Latæ pustulæ non valde pruriginosæ sunt. x. Ca-
 put dolenti & circundolenti, pus, aut aqua, aut sanguis fluens
 per

A per nares, aut os, aut aures, soluit morbum. x i. Atrabilia-
riis, & Phreniticis, hæmorrhoides accedentes, bonum. x i i.
Hæmorrhoidas sananti diuturnas, si non vna seruata fuerit,
periculum est hydropem aut tabem accedere. x i i i. A sin-
gultu detento, sternutationes accedentes solunt singultum.

x i i i i. Ab hydropse detento, vbi aqua in venis ad ven-
trem confluit, solutio fit. x v. A profluuiio alui longo cor-
repto, vomitus sponte accedens, soluit alui profluuium.

x v i. A pleuritide aut peripneumonia occupato, alui pro-
fluuium accedens, malum. x v i i. Lippientem alui proflu-
uio corripit, bonum. x v i i i. Vesicam dissectam habenti,
aut cerebrum, aut cor, aut septum trāsuersum, aut tenue ali-

B quod intestinum, aut ventriculum, aut hepar, lethale est.

x i x. Vbi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut neruus, aut
genæ pars tenuis, aut præputium, neque augetur, neque coa-
lescit. x x. Si in ventrem sanguis effusus fuerit præter natu-
ram, necesse est suppurari. x x i. In insanientibus, varici-
bus aut hæmorrhoidibus accedentibus, insanix solutio fit.

x x i i. Quicumq; dolores ex dorso ad cubitos descendūt,
venæ sectio soluit. x x i i i. Si timor & tristitia multo tem-
pore perseueret, atrabiliarium hoc signum est. x x i i i i. Si
ex intestinis tenuibus aliquod dissectum fuerit, nō coalescit.

x x v. Item sacrum ab externis intrò conuerti, non bo-
num: ab internis verò extra, bonum. x x v i. Quibus in fe-

C bribus ardentibus tremores facti fuerint, mentis emotio sol-
uit. x x v i i. Quicumque suppurati aut hydropici, secantur,
aut vruntur, hi purè aut aqua acervata effluente omninò mo-
riuntur. x x v i i i. Eunuchi non laborant podagra, neque
calui fiunt. x x i x. Mulier non laborat podagra, si non men-
ses ipsi defecerint. x x x. Puer non laborat podagra, ante ve-
neris vsum. x x x i. Oculorum dolores meri potus, aut bal-
neum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut medicamenti po-
tio soluit. x x x i i. Balbi ab alui profluuiio longo maxime
corripiuntur. x x x i i i. Acidum rusticum habentes, non ita
valde pleuritici fiunt. x x x i i i i. Quicumq; calui sunt, his
varices magnæ non fiunt. Quibuscunque verò caluis varices
accedunt, hi rursus hirsuti sunt. x x x v. Hydropicis tussis
accedens, malum. x x x v i. Vrinæ difficultatem soluit ve-
næ sectio. Secare verò oportet internas. x x x v i i. Ab angina

V v

detento

Hippocratis Liber

detento tumorem fieri foris in collo, bonū est. xxxviii. **D**
 Quibuscunq; occulti cancri fiunt, eos non curare melius est.
 Si enim curantur, citius moriuntur. Si verò nō curētur, mul-
 tum tempus perdurant. xxxix. Conuulsio fit aut à re-
 pletione, aut euacuatione. Sic autem & singultus. xl. Qui-
 buscunque citra præcordium dolores fiunt, absq; inflamma-
 tione, his febris accedens dolorem soluit. xli. Quibuf-
 cunq; suppuratum quid in corpore existens, significationem
 de se non præbet, his propter puris aut loci crassitudinem,
 sui significationem non exhibet. xlii. Morbo regio la-
 borantibus hepar durum fieri malum est. xliii. Qui-
 cunque splenici à dysenteria corripiuntur, his longa accedē-
 te dysenteria, aut hydrops accedit, aut intestinorū leuitas, & **E**
 pereunt. xliiii. Quibuscunque ex vrina stillicidio vol-
 uulus accedit, hi in septem diebus pereunt, si non febre acce-
 dente vrina satis fluxerit. xlvi. Vlcera quæcunq; annua
 fiunt, aut diutius tempore durant, necesse est os abscedere,
 & cicatrices cauas fieri. xlvii. Quicunq; gibbosi ex an-
 helatione, aut tussi fiunt, ante pubertatē pereunt. xlviii.
 Quibuscunque venæ sectio, aut medicamentū conducit, his
 verē venam secare, aut medicamentum purgans exhibere
 conuenit. xlviii. Splenicis dysenteria accedens, bo-
 num. xlix. Quicunque podagrici morbi fiunt, hi sedata
 inflammatione, in quadraginta diebus restituuntur. l. Qui-
 bus cerebrum dissectum fuerit, his necesse est febrem, & bi-
 lis vomitum accedere. li. Quibuscunque sanis derepen- **F**
 tē dolores fiunt in capite, & statim voce intercepta iacent, ac
 stertunt, in septem diebus pereunt, si non febris apprehen-
 dat. lii. Considerare verò oportet etiam sub oculis ap-
 paritiones in somnis. Si enim albæ partis quid subapparue-
 rit non cōmissis palpebris, si id nō ex alui profluuiio, aut me-
 dicamenti potione fuerit, malum signum & valde lethale
 est. liii. Desipientiæ cum risu quidem fientes, securio-
 res sunt: cum studio verò serio, periculosiores. liiii. In
 acutis affectionibus, quæ cū febre fiunt, luctuosæ respiratio-
 nes, malum. lv. Podagricæ affectiones vere & autum-
 no vt plurimum mouentur. lvi. Atrabiliariis morbis
 periculosi humorū à loco ad locum decubitus, aut syderatio-
 nem corporis, aut conuulsionem, aut insaniam, aut cæcita-
 tem

Atem significant. LVII. Syderationes verò maximè fiunt, ætate à quadragesimo anno vsque ad sexagesimum. LVIII.

Si omentum exciderit, necesse est putrefieri. LIX. Quibuscunq; à coxendicum morbo vexatis, coxa excidit, & rursus incidit, his mucii accedunt. LX. Quibuscunque à coxendicum morbo diuturno vexatis, coxa excidit, his crus tabescit, & claudicant, si non vsi fuerint.

SECTIO SEPTIMA.

IN acutis morbis frigiditas extremarum partium, malum. I.

II. Ex osse ægrotante, caro liuida, malum. III. Ex vomitu singultus, & oculi rubicundi, malum. IIII. Ex

B sudore horror, non bonum. V. Ex infania, dysenteria, aut hydrops, aut mentis emotio, bonum. VI. In morbo diuturno cibi fastidiū, & meracæ alui egestiones, malum. VII.

Ex multo potu rigor, & delyrium, malum. VIII. Ex tuberculi intus ruptione, exolutio, vomitus, & animi deliquiū fit. IX. Ex sanguinis fluxu delyrium, aut etiā conuulsio, malum. X. Ex voluulo vomitus, aut singultus, aut conuulsio, aut delyrium, malum. XI. Ex pleuritide peripneumonia, malum. XII. Ex peripneumonia phrenitis, malum.

XIII. Ex ardoribus vehemētibus conuulsio, aut distentio, malum. XIIII. Ex plaga in caput, stupor, aut delyriū, malum. XV. Ex sanguinis sputo, puris sputum, malum.

XVI. Ex puris sputo, tabes, & fluxus, malum. Postquā verò sputum supprimitur, moriuntur. XVII. Ex hepatis inflammatione singultus, malum. XVIII. Ex vigilia cōuulsio, aut delyriū, malum. XIX. Ex ossis denudatione, ignis sacer. XX. Ex igne sacro, putrefactio, aut suppuratio.

XXI. Ex forti pulsu in vlceribus, sanguinis eruptio.

CXXII. Ex dolore diuturno partium circa ventrem, suppuratio. XXIII. Ex meraca alui egestione, dysenteria.

XXIIII. Ex ossis dissectione delyrium, si ad vacuum vsque processerit. XXV. Ex medicamento potione conuulsio, lethale. XXVI. Ex dolore forti partium circa ventrem, frigiditas extremarum partium, malum. XXVII. Mulieri vterum gerenti, tenesmus accedens abortire facit. XXVIII.

Quodcunque os præsectum fuerit, aut neruus, in corpore, neque augescit, neque coalescit. XXIX. Si à pituita alba

Hippocratis Liber

detento, vehemens alui profluuium accedat, soluit morbum. D

xxx. Quibuscunque spumose alui egestionis sunt in alui profluuijs, his de capite pituita defluit. xxxi. Quibuscunque febricitantibus, in vrinis subsidentia crassiores potentia partes referentes sunt, longum morbum significant.

xxxi. Quibus verò biliose subsidentia, ab initio tenues, acutum morbum significant. xxxii. Quibuscunque disparata vrina sunt, his vehemens turbatio in corpore est. xxxiii. Quibus in vrinis bullae superstant, rhenum affectiones significant, & morbum fore longum. xxxv.

Quibus pingue est id quod superstat, & aceruatum, his rhenum affectiones, easque acutas significat. xxxvi. Quibus verò iam nephriticis ex rhenibus affectis praedicta signa E
accidunt, doloresque circa musculos spinales fiunt, si quidem circa externos locos fiant, etiam abscessus extrinsecus futuros expecta. Si verò dolores magis circa internos locos fiant, etiam abscessus magis intus fore expecta. xxxvii. Quicunque sanguinem vomunt, sine febre quidem, salutare est: verum cum febre, malum, Perfrigerantibus autem & adstringentibus curare oportet. xxxviii. Defluxiones in ventrem supernum, in viginti diebus suppurantur. xxxix.

Si quis sanguinem mingat, & grumos, & vrinae stillicidium habeat, & dolor incidat in ani ac scroti intercapedinem, & imum ventrem ac pectinem, partes circa vesicam agrotare significat. xl. Si lingua derepente impotens F
fiat, aut aliqua corporis pars syderata, atrabiliarium tale existit. xli. Si senioribus nimium purgatis singultus accedat, non bonum est. xlii. Si febris non à bile habeat, aqua multa calida in caput affusa, febris solutio fit. xliii.

Mulier ambidextra non est. xliiii. Quicunque suppurati vruntur, si quidem pus purum fluat & album, euadunt. Si verò subcruentum, & carnosum, ac graueolens, pereunt. xlv. Quicunque hepar suppuratum vruntur, si quidem pus purum fluat, & album, superstites euadunt. In tunica enim pus his inest. Si verò velut amurca fluat, pereunt. xlv. In doloribus oculorum, ubi merum bibendum dedisti, & multa calida lauisti, venam secato. xlvii.

Hydropicum si tussis vexat, desperatus est. xlviii.

Vrinae stillicidium, & vrinae difficultatem, vini potus & venae

A venæ sectio soluit. Secare verò oportet internas.

XLIX. Ab angina detento, tumor & rubor in pectore accedens, bonū. Foras enim vertitur morbus. **L.** Quibuscunque corruptum fuerit cerebrum, in tribus diebus pereunt. Si verò has effugerint, sani fiunt. **LI.** Sternutatio fit ex capite, percalescente cerebro, aut vacuo quod est in capite perhumefcente. Aer enim qui intus est, foras erumpit. Strepitum verò edit, quia transitus est ipsi per angustum.

LII. Quibuscunque hepar circumcirca dolet, his febris accedens soluit dolorem. **LIII.** Quibuscunque sanguinem de venis auferre conducit, his vere venam secare conuenit.

LIIII. Quibus inter vētrem & septum transuersum pituita conclusa est, & dolorem exhibet, nō habens exitum ad neutrum ventrem, his per venas ad vesicam cōuersa pituita, morbi solutio fit. **LV.** Quibus hepar aqua repletum, ad omentum eruperit, his venter aqua impletur, & moriuntur.

LVI. Anxietatem, oscitationem, horrorem, vinum æ quali mensura aquæ ammixta potum soluit.

LVII. Quibus in vrinaria fistula tubercula fiunt, his supuratione facta & eruptione, soluitur dolor. **LVIII.** Quibus cerebrū concussū fuerit ex aliqua causa, eos statim voce priuari necesse est. **LIX.** Corporibus humidis carnes habentibus, famem inducere oportet, fames enim corpora ficit.

LX. Vbi in toto corpore mutationes, & corpus perfrigeratur, & rursus calescit, aut color alius ex alio mutatur, longitudinem morbi significat. **LXI.** Sudor multus calidus aut frigidus, semper fluens, humorem abducere oportere significat, forti quidem supernè, debili verò, infernè.

LXII. Febres non intermittentes, si per tertiam fortiores fiant, periculosa sunt. Quocunque verò modo intermiserint, sine periculo esse significat. **LXIII.** Quibus febres longæ sunt, his aut tubercula, aut ad articulos dolores fiunt.

LXIIII. Quibus tubercula diutina, aut ad articulos dolores, ex febribus fiunt, hi cibis pluribus vtuntur.

LXV. Si quis febricitanti cibum det, quem sano exhibet, sano quidem robur, ægroto verò morbus est.

LXVI. Quæ per vesicam prodeunt inspicere oportet, an qualia sanis prodeunt. Quæ igitur minimè similia his sunt ea morbosiora sunt. Quæ verò similia sanis, ea minimè morbo-

Hippocratis Liber

LXVII. Et quibus alui egestionibus, si stare permiseris, & **D** non moueris, subsistunt veluti ramenta: si paucae fuerint, modicus morbus est: si multae, multus. His confert subpurgare aluum. Si verò non purgata aluo, sorbitiones dederis, laedes, & quanto plures dederis, magis laedes. **LXVIII.** Quibuscumque cruda deorsum secedunt, ex atra bile sunt: si plura copiosiore: si pauciora pauciore. **LXIX.** Excreationes in febribus non intermittentibus liuidae, & cruentae, & graeuolentes, & biliosae, omnes malae sunt. At probe secedentes, bonae, & per aluum, & per vesicam, & ubi sanè quid secedens constiterit non purgatum, malum. **LXX.** Corpora quocumque quis purgare voluerit, fluida facere oportet. Et si quidem sursum, sistere aluum. Si verò deorsum, humectare.

LXXI. Somnus, vigilia, utraq; modum excedentia, morbus. **E**

LXXII. In non intermittentibus febribus, si externae quidem partes frigidae fuerint, internae verò ardeant, & febris habeat, lethale est. **LXXIII.** In febre non intermittente, si labium, aut nasus, aut oculus, aut supercilium distorqueatur: aut non videat, aut non audiat, aeger iam debilis existens: quicquid horum fiat, propinqua mors est.

LXXIII. Ex pituita alba, hydrops accedit. **LXXV.** Ab alui profluuiio, dysenteria. **LXXVI.** A dysenteria, intestinorum leuitas accedit. **LXXVII.** Ex corruptione, abscessus ossis. **LXXVIII.** Ex sanguinis vomitu, tabes, & puris purgatio sursum. Ex tabe, fluxus ex capite. Ex fluxu, alui profluuium. ex alui profluuiio, suppressio purgationis sursum verus, ex suppressione, mors. **LXXIX.** Qualia etiam sunt in vesicae ac alui egestionibus, inspicere oportet, & in his quae per carnes excernuntur, & sicubi alibi à natura recedat corpus, si parum, parvus est morbus: si multum, multus: Si verò valde multus sit recessus, lethale hoc est. **LXXX.** Quicumque supra quadraginta annos phrenitici fiunt, non ita valde sani fiunt. Minus enim periclitantur, quorum naturae, & aetati, morbus affinis fuerit. **LXXXI.** Quibuscumque in aegritudinibus oculi ex voluntate lachrymantur, bonum. Quibus verò citra voluntatem, malum. **LXXXII.** Quibus in febribus quartanis sanguis ex naribus fluxerit, malum est. **LXXXIII.** Sudores in diebus iudicatoriis fientes, vehementes & veloces periculosi sunt, qui expelluntur ex fronte velut guttae, &

Aguttæ, & aquæ salientes, & frigidi valde ac multi. Necesse est enim talem sudorem prodire cum violentia, & doloris excessu, ac expressione diuturna. LXXXIII. Ex morbo diurno, etiam alui defluxus, malum. LXXXV. Quæcunque non sanant medicamenta, ea ferrum sanat. Quæ ferrum non sanat, ea ignis sanat. Quæ ignis non sanat, ea incurabilia putare oportet.

H I P P O C R A T I S
C O I E P I S T O L A E, I A N O
B C O R N A R I O M E D I C O
P H Y S I C O I N -
T E R P R E T E.
*

Rex regum magnus Artaxerxes, Peto gaudium.



Orbus pestilens appellatus, inuasit exercitus nostros: & quum nos sæpe multa fecerimus, nihil adhuc remissit. Quare magnopere, & per omnia tibi à me data dona, te rogo, vt aut aliquid ex natura tua excogitatum, aut aliquam ex arte actionem, aut aliquod alterius viri mederi potentis consilium, celerrimè ad nos mittas. Propulsa oro hoc malum. Multa enim anxietas populum corripuit, quæ spiritum magnū ac densum habet. Non beligerantes debellamur: quum hostem habeamus bestiam illam ouilia deuastantem. Sauciauit multos: agrè curabiles fecit: amara spicula immittit. Consilij inops sum. Non amplius habeo quod cum viris natura prudentibus consultem. Solue hæc omnia, neq; nos bono tuo consilio destituas. Vale.

Patus, Regi regum magno Artaxerxe gaudium.

Naturalia auxilia pestilentis morbi popularem grassationem non soluunt. Qui enim ex natura sunt mor-

Vv + bi

Hippocratis

Hippocratis laus.

bi: eos ipsa natura iudicās sanat. Qui verò ex populari grassa D
tione: eos ars curat, artificiose iudicans corporum mutatio-
nem. Hippocrates autem medicus curat hoc malum. Et ge-
nere quidem est Doriensis: ex ciuitate verò Co, patre Hera-
clida, qui filius fuit Hippocratis, qui Gnosidici, qui Nebri,
qui Sostrati, qui Theodori, qui Cleomittada, qui Chrsami-
dis. Hic diuina natura præditus est, & ex paruis ac vulgari-
bus ad magna ac artificiosa, medicinam euexit. Est igitur di-
uinus Hippocrates nonus quidē à Chrsamide rege: decim⁹
autem & octauus ab Aesculapio: vigesimus verò à Ioue: ex
matre verò Praxithea Phænaretes filia, ex familia Heraclida-
rum. Quare ex utroque semine à diis ortum habet diuinus
Hippocrates: ut qui à patre quidem Asclepiades est, à matre E
verò Heraclides. Didicit autem artem, tum à patre Heracli-
da, tum ab auo Hippocrate. Verum ab his quidem primū,
velut verisimile est, in re medica initiatus est, quantum sanè
credibile est hos nouisse. Vniuersam vero artē ipse seipsum
docuit, diuina natura vsus, & in tantum animi industria pro-
genitores transgressus, quantum etiam artis præstantia eos-
dem superauit. Tollit autem non bestiarum genus, sed fero-
rum ac agrestium morborum, per magnam terræ ac maris
partem Aesculapij auxilia, quemadmodum Triptolemus
Cereris semina dispergens. Proinde iustissimè in multis ter-
ræ locis diuinos honores etiam ipse cōsequutus est, & iisdem
donariis cū Hercule & Aesculapio ab Atheniensibus dignus F
factus est. Hunc ipsum accersere, & auri atque argenti quātum
voluerit, ipsi dare iube. Hic enim non vnum modum cura-
tionis huius morbi nouit. Hic est sanitatis pater, hic serua-
tor, hic dolorum curator. In summa, hic diuinæ sciētiae prin-
ceps est. Vale.

*Rex regum magnus Artaxerxes, Hystani-
di Helleponti præfecto.*

Hippocratis medici Coi ab Aesculapio originem ducen-
tis, gloria artis etiam ad me peruenit. Dato igitur ipsi
auri quantum voluerit, & reliqua abundè, quibus opus habet
& ipsum ad nos mittito. Nam optimatibus Persarum æqua-
lis erit. Et si quis alius bonus vir est in Europa, cum domus
regiæ

A regia amicum facito, nihil diuitiis parcens. Viros enim inuenire, qui consilio præstent, non est facile. Vale.

*Hystanis Helleponti præfectus, Hippocrati ex
Asclepiadis prognato gaudium.*

Magnus rex Artaxerxes te opus habet, & misit ad nos præfectos, iubens tibi argentum & aurum, & reliqua quibus opus habes, & quæcunque voles, dare, & breui ad se mittere. Fore enim te optimatibus Persarum æqualem. Tu itaque cito adsis. Vale.

Hippocrates medicus, Hystanidi Helleponti præfecto gaudium.

B Ad epistolam quam misisti, à Rege venisse adferens, remitte Regi quæ dico, quàm celerimè scribens: Quòd & victu, & vestitu, & domo, & omni ad vitam sufficienti opulentia fruimur. Persarum autem diuitiis uti, fas mihi nō est: neque barbaros homines à morbis liberare, qui hostes sunt Græcorum. Vale.

Hippocrates Demetrio sanitatem.

Persarum rex nos accersiuit, ignarus quòd apud me maior est sapientiæ ratio, quàm auri. Vale.

C *Regi regum meo magno domino Artaxerxa, Hystanis Helleponti præfectus gaudium.*

Quam misisti epistolam, iubēs demittere ad Hippocratem Coum ab Aesculapio originem ducentem, demissi. Sed & ab ipso responsum tuli, quod scriptum tradidit, & ad domum tuam transmittere iussit. Itaque eius latorem ac nuncium Gymnasben Dieutythen ad te misi. Vale.

Rex regum magnus Artaxerxes Cois hæc dicit.

Date meis nunciis Hippocratē medicum malignis moribus præditum, & in me, & in Persas petulanter se gerentem. Sin minus, cognoscetis, etiam primi peccati pœnam vos daturos esse. Urbem enim vestram deuastatam, & insulam distractam, in pelagus conuertam, ut in posterum tempus nemo sciat, an in hoc loco fuerit insula, aut vrbs Cos.

Vv 5 Coorum

Hippocratis

Coorum responsum.

D

Visum est populo, respondere nuntiis ab Artaxerxe missis. Coi nihil indignum facient, neque Merope, neque Hercule, neque Aesculapio. Quapropter omnes ciues nō dabunt Hippocratem, etiam si pessima morte sint interituri. Nam quum Darius & Xerxes epistolas scripserint, & terram ac aquam à patribus nostris petiuerint, populus non dedit: quum eos ipsos se impetentes, similiter velut alios homines, mortales esse videret. Et nunc idem responsum dat. A Cois discedite: quoniam Hippocratem in manus vestras nō dant. Renuntiate igitur ipsi vos nuntij, quòd neque dei ipsi, nostri negligentes erunt.

Senatus populusq³ Abderitarum Hippocrati gaudium.

E

Nunc maximè vrbi nostræ in periculo versatur vir noster, ô Hippocrates, qui & præsenti tempore & futuro semper gloria vrbi sperabatur. Neq; nunc, ô vos dei omnes, nobis inuideatur, hic præ multa quæ detinet ipsum sapientia ægrotat, vt timor non vulgaris sit, si Democritus mente motus fuerit, reuera urbem nostram Abderitarum pessum ituram esse. Etenim oblitus omnium, & primùm sui ipsius, vigilans & noctu & interdiu, & singula parua ac magna deridens, & totam vitam nihil esse putans, vitam transigit. Ducit aliquis vxorem, alius mercaturam exercet, alius concionatur, alius imperat, alius legatum agit, eligitur, abrogatur, ægrotat, vulneratur, moritur. At hic ridet omnia, dum alios mœstos ac tristes, alios gaudentes videt. Quin & de his, quæ apud inferos sunt, hic vir perscrutatur, & hæc scribit, Et idolis aerem plenum esse dicit. Et volucrum voces intentis aurbus explorat. Et sæpe noctu exurgēs, solus cantilenas sensim canenti similis est. Et se aliquando in rerum immensitatem proficisci dicit, & Democritos esse similes sub ipsi innumera biles. Et corpus vnà cum mente corrumpens viuit, hæc timeamus ô Hippocrates, ob hæc perturbati sumus. Quapropter nos serua, & patriæ nostræ cōsulturus cito ad sis: neq; nos contempseris. Nam neq; ita viles sumus: & in nobis testimoniū situm est. Ob ipsum enim conseruatam, & gloriam, & pecunias,

F

A nias, & doctrinæ famā consequeris: quanquam doctrinæ ratio multo potior apud te est, quàm fortunæ. Attamen & huius bona multa ac luculenta tibi à vobis obuenient. Et enim animæ Democriti gratia, etiam si vrbs aurum esset nō nostræ voluntati responderet, aut quacunque tandem re illi carendum esset. Leges nostras putamus ægrotare ô Hippocrates, leges præuaricari. Adsis optime vir, curaturus virum insignem. Non medicus. sed conditor, sacrationem tota Ionia murum nobis circundabis. Ciuitatem, non virum curabis: & Senatum ægrotantem, & ne claudatur periclitantē, aperies. Ipse legissator, ipse iudex, ipse princeps, ipse seruator, & horū artifex aduenies. Ob hæc te exspectamus ô Hippocrates, atque hæc etiā fient vbi veneris. Vna ciuitas nō ignobilis, imò tota Græcia rogat te, serua corpus sapientiæ. **B** Quin potius ipsam apud te legationem agere puta doctrinā, ab hac præuaricatione liberari supplicantem. Cognata equidem res est omnibus, velut apparet, sapientia. Verum his qui propius ipsam complexi sunt, velut nobis, etiam longè amplius. Et, sicut probè nosti, gratificaberis etiam futuro seculo, si nō destitueris Democritū propter veritatem, cuius primas se ratum esse sperat. Tu enim & genere, & arte coniunctus es Aesculapio. Hic verò Herculis est ex fratre nepos. A quo est & Abderus, quemadmodum omnino audiuiisti, cuius cognomē vrbs nostra refert. Quare etiam illi grata fuerit Democriti sanatio. **C** Quum igitur videas ô Hippocrates, & populum, & virum insignem, ad stupiditatem diffluentem: festina, rogamus, ad nos. Heu vt etiam bona redundantia morbi existunt. Quantum enim Democritus ad summam sapientiam generosè peruenit, tantum nunc pariter periclitatur, ne meritis stupore & stoliditate affligatur. At reliquum vulgus Abderitarum, quod mansit absque eruditione, communem sanè sensum habet. Imò nunc prudentiores sunt ad sapientis morbum iudicandum, qui prius desipuerunt. Adsis igitur cum Aesculapio patre. Adsis cum Herculis filia Epione. Adsis cum Aesculapij filiis, qui ad Ilium militarunt. Adsis nunc praxias adferens morbi medelas. Nunc terra radicibus, & herbis, & auxiliariis floribus, insanixque medicamentis fœcunda est. Fermè igitur nunquam fertilius producent, neque terra, neque montium cacumina, quàm nunc profer

Hippocratis

proferunt ea, quæ pertinent ad Democriti sanitatem. Vale. D

Hippocrates Senatui populoque Abderitarum gaudium.

C Iuis vester Ameleslagoras venit in Co, & erat tunc in illa die Virgæ assumptio, & annua festiuitas, ac publicus, velut nostis, cōuentus, & pompa sumptuosa fiebat, quā mos est eos, qui deo dicati sunt, ad Cyparissum deducere. Quādoquidem autē & ex verbis, & ex aspectu, Ameleslagoras festinare videbatur, credens, velut erat, rem ipsam vrgere epistolā vestram legi, & admiratus sum quod ob vnum hominē velut si vnus homo esset ipsa ciuitas, turbati estis. Et beati profectō sunt populi, qui sciunt bonos viros sua esse munimēta, & non E turre, neq; muros, sed sapientium virorū sapientia consilia. Ego verō, qui credo atque quidē esse Deorum dona, homines autē naturæ opera (& ne agrè feratis viri Abderitæ) non vos puto, sed ipsam naturam me vocare, ad conseruandum ipsius opus, quod periclitatur, ne præ morbo collabāt. Quare præ vobis ego nunc, naturæ ac Diis obediens, festino agrotatem Democritū sanare: si quidē sanē & hoc morbus est, & non potius error vobis tenebras offundit: id quod cpto, atque vtinā sit hæc vberius vestræ benevolentix, signū. q̄ etiam ad suspicionem turbamini. Argentū autem mihi venienti, neq; natura, neq; Deus promittere poterit. Quare neq; vos viri Abderitæ cogatis: sed liberæ artis etiam opera libera esse sinatis. Qui verō mercedē capiunt, hi scientias seruire cogunt, velut F captiuas faciētes ipsas ex priore libertate. E inde, velut veri simile est, mētiri etiā poterint, velut de magno morbo: & negarint, velut de paruo: & polliciti nō venerint, & rursus venerint nō vocati. Misera est profectō humana vita: qm̄ per totam ipsam intolerabilis auaritia, velut hybernus vētus, distributa est ac penetrauit. Ad quam vtinā potius omnes medici cōuenissent, quō grauiorem insaniam morbum curarent: quoniā quum morbus sit, & affligat, etiā laudatur. Ego verō arbitror etiam animæ morbos omnes vehementes esse insanias, quæ opiniones quasdam ac imaginationes rationi inducunt. A quibus qui per virtutem depurgatus est, sanus euadit. Quod si ego omnino ditescere voluissem, viri Abderitæ, non utiq; decem talentorū gratia ad vos proficiscerer: sed ad
Magnum

- A** Magnū accessissem Persarū regem, vbi totæ ciuitates humanis opibus refertæ mihi obtigissent: sanassem autē illic ipsorum pestem. Verū denegaui, inimicam Græciæ regionem à malo morbo me velle liberare. Ego, quantum in me fuisset, Barbaros expugnassem. Habuissem autē ignominiā ipsas à rege diuitias, & opulentiam patriæ inimicā. Hæc verò mihi adfuissent, velut ei qui vrbium Græciæ deuastator esset. Non sunt diuitiæ, vndiquaq; lucrari. Magna enim sunt sacra virtutis, quæ à iustitia non occultantur, sed manifesta existunt. Aut nō æquale peccatum esse putatis, hostes seruare, & amicos mercede sanare? At non hoc modo se res nostræ habent, o Abderitæ. Non capio fructum ex morbis, neq; libenter audiui Democritum mente motum esse. Qui siue sanus est, amicus est: siue agrotat, curatus magis amicus erit. Audio autem ipsam grauib; ac solidis moribus præditum esse, & vrbis vestre ornamentum. Valete.

Hippocrates Philopæmeni gaudium.

- L** Egati, qui vrbis epistolā mihi reddiderūt, etiā tuā traderunt. Et valde gauisus sum, & hospitium, & reliquū vitū te promittente. Veniemus autē bona fortuna, & meliore spe, velut arbitramur, accedemus, prout in literis est declaratum: quum nō insaniā: sed quandā excellentē mentis sanitatem vir ille declaret, dum neq; liberorū, neq; vxoris, neq; cognatorū, neq; res familiaris, neq; omnino alicuius curam gerit: sed & diu & noctu apud seipsum cōsistit, & priuatim vitā degit, plerunq; in antris & solitudinibus, aut sub arborū vmbis, aut in mollibus herbis, aut apud frequētia aquarū fluentia. Contingunt igitur talia plerunq; atrabile percitis. Taciturni enim aliquādo sunt, & solitarij, ac deserti amātes, & rerū familiariū cōspectū auersantur, alienū putātes. Nec verò dissimile vero est, etiā his qui circa disciplinas versantur ab vna erga sapientiā adfectione, alias curas exclusas esse. Quēadmodū enim famuli ac ancillæ in domibus tumultuātes, & seditionē agentes, vbi derepente ipsis hera cōparuit, consternati cōquiescunt: sic etiā reliquæ in anima cupiditates malorum sunt hominibus ministræ. Postquā autē sapiētiæ cōspectus seipsum ingesserit: reliquæ affectiones velut famulæ discedunt. Non autē omnino insani antra & quietē experūt: sed

Hippocratis

sed etiā hi qui humana negotia contemnunt, ob tranquillitatis cupiditatē. Quum enim mens ab externis curis vexata, corpus reficere voluerit, tūc cito ipsum quieti tradit. Deinde recta exurgens, circūcirca veritatis regionē collustrat, in qua non est pater, nō mater, non vxor, non liberi, non frater, non cognati, non famuli, non fortuna, non omnino quicquam ex his, quæ tumultū inducunt. Omnia autē perturbātia, exclusa stant præ timore: & neq; appropinquare audēt præ reuerentia eorū, quæ isthic habitāt. Habitant autē illam regionē, & artes, & virtutes omnis generis, & Dei, & dæmones, & senatus, & consilia. Et magnus polus in illa regione, stellis multū mobilibus coronatus est: in quam fortassis etiā Democritus præ sapiētia trāsmigravit. Deinde quum nō videat amplius eos qui sunt in vrbe, vtpote procul profectus: insanix morbo laborare putatur, propter solitudinis amorē. Student autem Abderitæ argenti amorem & studium detegere, & in se manifestum facere, eo quod Democritum non intelligunt. At tu hospitium nobis ò amice Philopœmen præpara. Non enim volo perturbatē vrbi molestiam exhibere, quum veterem te proprium hospitem, velut nosti, habeam. Vale.

Hippocrates Dyonisi gaudium.

A Ut in Halicarnasso me expecta, aut ipse ad me venire ò amice festina. Per summā enim necessitatē abeundum est mihi in Abderam, Democriti caussa, ad quē ægrotantem vrbs me accersuit. Caterū admiranda est hominū, ò Dionysy, si, per cōsensum adfectio: velut vna anima cū ciue coægrotāt. Quare mihi vidētur etiā ipsi curatione opus habere. Ego vero neq; morbū ipsum esse puto, sed immodicam doctrinam: quæ reuera nō est immodica, sed ab idiotis putatur. Nā nunquam nociua est virtus immodica. Excellentia verò, morbi opinionē de se præbet, propter iudicantiū imperitiā. Vnūquisq; enim ex his, quæ ipse nō habet, iudicat, id quod in alio abundat, superflūū esse. Sic sanē etiā timidus fortitudinē immodestiā putat, & avarus magnanimitatē. Et omnis defectus, virtutis moderationē excedere putatur. Illū igitur vbi viderimus, cū prænotione hinc contingente, & vbi sermones eius audiuerimus: melius cognoscemus. Tu verò, ò Dionysy, studio habe vt ipse accedas. Volo enim te in patria mea cōmorari

A rari donec rediero: quo & rerum nostrarum, & in primis vrbis nostræ curâ geras. Nam haud scio, quomodo ex casu con-
 rigit, ut saluber sit annus, & pristinam naturâ habeat. Quare
 neq; multi infestabunt morbi: attamen venito, Inhabitabis au-
 tem meam domum nimis quàm opportunâ, nimirum quum
 & vxor apud parêtes maneat propter meam profectiorem.
 Attamen & illius res inspecta, quo pudicè degat, & non ob
 viri absentiam alios viros approbet. Honeſta equidem ab ini-
 tio fuit, & parentes bonos habuit. Patrē autem mirificè viri-
 lem, & malos valde odio habentem, egregiè senem. Attamen
 semper opus habet mulier moderatore. Habet enim à natu-
 ra in se lasciniam: quæ, nisi quotidie refecetur, velut arbores
B in materiæ multæ effusionem, exuberat. Ego verò amicum
 parentibus diligentiorē puto ad vxorē custodiendā. Non
 enim, velut illis, etiam huic cohabitāt beneuolentiæ adfe-
 ctio, per quam sæpe vmbra admonitioni obtenditur. In om-
 nibus autem rebus prudentior est alienitas ab adfectione, ut
 quæ minimè à beneuolentia infringatur. Vale.

Hippocrates Damageto gaudium.

Q uum apud te Rhodi essem Damagete, vidi nauē illam
 cui solis inscriptio erat, penitus pulchram, & in puppi
 probè instructam, & sufficientem carinam habentem. Habe-
 bat & trāstra multa. Et tu laudabas etiam in ipsa nauigandi
 præstatiā, quæ velox esset, & tuta, & ad inseruiendum artificio
C sa. Et insuper prædicabas probū in ipsa nauigatiōis cursum.
 Hæc mitte nobis: verū si fieri potest, non remis, sed alis ad re-
 migium instructā. Vrget enim res ipsa ò amice, ut valde ci-
 to in Abderā nauigē. Volo enim ægrotantē curare vrbē, pro-
 pter vnum ægrotantem Democritum, si vnquam viri fama
 ad aures tuas peruenit. De hoc patria dicit, quòd insania ad-
 flictus sit. Ego autē cupio, imò magis opto, non reuera ipsum
 insanire, sed illos ita putare. Ridet, inquiunt, semper, & ridere
 nō cessat in oībus negotiis. Et hoc ipsis insaniæ signū esse vi-
 detur. Quare tuis in Rhodō amicis dicito, ut semp modera-
 tē se gerāt, & nō multū rideant, neq; multū tristes sint: sed
 inter ambo hæc modū teneant, ut aliis comis esse videaris,
 aliis sollicitus, de virtute cogitās. Est pfectō mali quiddā dū
 ad singula ille ridet. Si enī immodestia malū est: ea sanè ppe-
 tua

Hippocratis

tua longè peior est. Et dicam sanè ad ipsum: Democrite, & si **D**
quis agrotat, & occiditur, & mortuus est, & obsidetur, &
quoduis malum ingruit: singula quæ fiunt, materiam risus ti-
bi præbent. Nō autē repugnas deo, si, quum duo sint in mun-
do, Gaudium & Tristitia, tu alterum ipsorū eiecisti? Beatus
profectò fueris (Verū impossibile est) si neque mater tibi
ægrotat, neq; pater, neq; postea liberi, aut vxor, aut amicus,
sed propter tuum risum conseruantur, penitus felix es. At
si dum ægrotant, rides: dum moriuntur, gaudes: & si quid ma-
li audieris, exhilararis: pessimus es ó Democrite, & procul
sanè à sapientia. Si verò putas hæc ipsa neq; mala esse, certè
atrabile percitus es Democrite, periclitans ne & ipse Abde-
rita sis, prudentior autē sit ipsa ciuitas. Caterū de his exa- **E**
ctius illic dicemus Damagete. At verò naus etiam hoc tem-
pus, quo hæc tibi scribo, remoratur. Vale.

Hippocrates Philopœmeni gaudium.

COgitans ac sollicitus de Democrito, illa ipsa nocte dor-
miens, sub ipsius auroræ initium somniū mihi oblatū
habui, ex quo puto nihil valde periculosi fore. Mirabiliter
enim expergefactus sum. Videbar mihi videre Aesculapiū
ipsum corā, & iā ad ipsas Abderitarū portas aderamus. Aescu-
lapius autem non vt imagines eum aliās ostendunt, mitis ac
blandus apparebat: sed habitu concitato, & aspectu horren-
do. Sequebantur autē ipsum dracones reptilium generis im- **F**
manes, longum tractū ducentes, & horribile quiddam velut
in desertis ac saltibus subsibilantes. Sequebantur & socij, py-
xides medicamentarias probè obsignatas gestantes. Deinde
porrexit mihi manum deus: quam vbi libētissimè apprehen-
dissem, rogabā vt simul mecū peregeret, & ne me in meden-
do destitueret. Verū is: Nihil, inquit, in præsens me opus ha-
bes: sed hæc immortalī ac mortaliū communis dea te pere-
grinū deducet. Et ego cōuersus video mulierē pulchram ac
magnā, simpliciter ornatā, splēdidam, cuius oculorū circuli
puro lumine micabāt, vt stellarū fulgorē putares. Et de⁹ qui-
dem disparuit. Mulier verò illa apprehēsū ne manu, lento
gradu benigniter per urbē ducebat. Et vbi prope domū esse-
mus, in qua hospitīū mihi paratū esse putabā, velut spectrū
disparuit, hoc saltem dicens: Cras te apud Democritum de-
prehen

Aprehendam. Cū verò iam se illa cōuerteret: Rogo, inquā, opti-
ma fœmina, quæ nā es, & quo nomine vocari debes? Veritas,
inquit illa. Cæterū quē accedentē vides (& derepentē altera
quædā mihi apparuit) neq; ipsa mala videtur, audacior autē
aspectu & concitatio: Opinio, inquit, appellatur, & habitat
apud Abderitas. Ego igitur vbi de somno surrexissem, mihi-
ipsi somnium interpretatus sum, quòd non indigeret medi-
co Democritus, quando sanè ipse medendi Deus discessisset,
velut qui medendi occasionem & materiam nō haberet, Sed
ipsa quidem veritas, quòd Democritus sanus sit, apud Demo-
critum manet. Opinio verò, quòd Democritus agrotet, reue-
ra apud Abderitas habitat. Atq; hæc vera esse, mi Philopœ-
Bmen, credo, & sunt sanè. Et non contemno somnia, maximè
vbi etiam ordinem conseruant. Medicina autem & vaticina-
tio valde cognatæ sunt: quandoquidem & pater ambarū ar-
tiū vnus est Apollo progenitor noster, & præsentēs & futuros
morbos prædicens, & agrotos & agrotaturos sanans. Vale.

Hippocrates Crateua gaudium.

Scio te, ò amice, optimum radicifecam esse, & propter
tuam ipsius exercitationem, & propter progenitorū glo-
riam, adeò vt in hac facultate Crateuæ proauo minimè ce-
das. Proinde nunc, si vnquā aliàs, herbas collige, quot & qua-
les poteris: vrget enim necessitas: atq; has mihi trans mitte,
C ad virum toti ciuitati cōparandum, Abderitam quidem ve-
rum Democritum. Agrotare enim ipsum dicunt, & purga-
tione valde opus habere, vt qui insania sit correptus. Non
vtemur fortassis medicamentis, quemadmodum etiā credo.
Attamen vndiquaque instructum esse oportet. At verò rem
herbariam apud te saepe admiratus sum, quemadmodum
etiam vniuersorum naturam ac constitutionē, & sacerrimū
terræ fundamentum, ex qua animalia, & plantæ, & alimēta,
& medicamēta, & fortuna, & ipsæ diuitiæ exoriuntur. Ne-
que enim aliàs haberet vbi cōsisteret Auaritia, neq; sanè Ab-
deritæ nunc decem talentis inescassent me, pro medico mer-
cenarium declarantes. Si verò possis Crateua amaram aua-
ritiæ radicem exscindere, vt nullæ ipsius reliquiæ restent,
probè scito, quod hominum vnà cum corporibus etiam ani-
mas agrotantes purgassemus. At hæc quidem vota sunt. Tu

X x

verò

verò, quod fieri potest, nobis mōtanas maximè & in altis col
libus nascentes herbas radicitus refeca. Sunt enim aquosiori
bus solidiores & acriores, propter terræ densitatem, & aeris
tenuitatem. Nam quod attrahunt, frigidius est. Conare ta
men vt etiam de his quæ circa stagna nascuntur, & de palu
stribus, & fluuiatilibus, aut fontanis flores colligas: quas sa
nè debiles, & exolutas ac dulcis succi esse scio. Omnia autem
medicamenta quæ succi & liquores fluidi sunt, in vitreis va
sis ferantur: quæ verò folia, aut flores, aut radices sunt in ficti
libus nouis probè obturatis: vt ne ventis perflata, medica
menti vigorem velut in animi deliquium collapsa, amittāt.
Cæterum statim nobis hæc mittito. Nam & tēpus anni con
gruum est, & necessitas dictæ insanix vrget. Ab omni equi
dem arte aliena res est dilatio, verū maximè à Medicina, in
qua dilatio est animæ periculum. Curationum verò animæ
sunt temporum opportunitates, quarum obseruatio finis est.
Spero quidem sanum esse Democritū, etiam citra medelā.
Si verò aliquis error naturæ, aut temporis, aut alterius alicu
ius causæ contingat: multa enim nos qui mortales sumus, la
tent, vtpote non omnino per veritatem corroboratos, ad id
quod obscurum est, omnem vim congregatam esse oportet.
Non enim contentus est is, qui in periculo versatur, his quæ
possumus: sed concupiscit etiam ea, quæ nō possumus. Et fer
mè semper ad duos fines militamus, alterum hominis, alte
rum artis. Quorum alter obscurus est, alter scientiæ determi
natus. Opus est autem in vtrisque his etiam fortuna. Incerta
enim est coniectura eorum, qui in purgationibus cautè pro
cedunt. Nam & stomachi afflictionē veremur, & medicatio
nis congruentiam, ad naturā ignotam cōiectamus. Nō enim
vna & eadem est omniū natura, & aliud semper sibiipsi de
cernens adsimilat ac familiare facit. Aliquādo verò totū per
dit. Sed & herbis multa reptilia venarum immittunt, & hia
tu suo internæ ipsarum tenēritudini adfectionem pro auxi
lio inspirant. Et huius rei ignorantia erit, nisi sane nota ali
qua aut macula, aut odor ferus & grauis rei factæ indicatio
nem fecerit. Deinde ipsa ars propter fortunæ casum, à rectè
faciendi proposito aberrat. Stabiliiores autē semper sunt pur
gationes per veratrū, quibus etiā Melampus in Præti filia
bus, & Anticyreus in Hercule vti esse narrantur. Minimè ve
rò

A rō vtemur nos villo aliquo ex his in Democrito: sed contigerit opto illi sapientia, efficacissimorum ac medicatissimorū pharmacorum finis. Vale.

Hippocrates Damageto gaudium.

Hoc erat illud Damagetes, quod cōiectabamus: non infanit Democritus, sed super omnia sapit, & nos sapiētiores effecit, & per nos omnes homines. Remisi autē tibi amice reuera Aesculapeam nauem: cui cum solis signo etiā sanitatis insigne apponito. Nam reuera secundo numine vela fecit: & illa die in Abderam nauigauit, qua scripserā ipsis, meperuenturū esse. Omnes igitur ante portas cōgregatos inuenimus, nos, velut verisimile est, expectantes, nō viros solū, **B** sed etiā mulieres: insupérq; senes & pueros. per deos, tristes, itémq; infantes. Atque hi quidē sic habebant, velut ob Democritum insanientē. Ille verò syncere tūc in philosophādo excellēbat. Postquā autē me vidissent, visi sunt mihi paululum ad seipsos rediisse, & bonas spes ostentabāt. At Philopœmen me ad hospitium ducere gestiebat, & hoc ab illis cōprobabatur. Ego verò, ò viri Abderitæ, inquā, nullū mihi maius operæprecium est, quā Democritū videre. Illi verò hoc audito, collaudarūt, & gauisi sunt, & cōpendio duxerūt me per forū, partim sequētes, partim præcurrētes, alij ab vtraq; parte: Serua, clamātes, auxiliare, medicare. Et ego adhortabar ipsos vt **C** cōsiderent, tanquā fortassis nihil esset mali: aut si quid esset, modicū id esset, & correctu facile, cōfusus horis anni Etesiiis. Et simul hæc dicens ibam. Neq; enim procul erāt ædes: imò neque tota ciuitas. Aderamus igitur: propinquæ enim muro erāt, & me placidè eò deducūt. At retro turrim collis erat altus, lōgis ac dēis populis nigris vmbrosus, vnde Democriti habitacula cōspiciebātur. Et ipse Democritus sub ampla ac humilima platano sedebat, in veste crassa citra humeros desinente solus, discalceatus, super lapidea sede, valde pallidus ac macilētus. promissa barba. Iuxta ipsum verò à dextra, tenuis aqua per decliuē collē decurrēs leniter resonabat. Erat autē delubrū quoddā super illū collem, quantū equidem cōiectura assequor, Nymphis dicatū, sponte enatis vitibus circundatum. Ipse verò cum multo ornatu super genibus librū habebat. Sed & alij quidem ex vtraque parte adiacebant. Ac

11
cumulata erant etiam animalia multa, per totum resecta. Et **D**
ipse aliquando concitate incumbens scribebat, aliquando
quiescebat, diu multumque se continens, & in seipso medi-
tans. Deinde non longè post, his peractis, exsurgens deambu-
labat, & viscera animalium inspiciebat, & depositis ipsis di-
gressus, rursus desidebat. At Abderitæ circumstantes me tri-
stes, & non procul à lachrymantibus oculos habentes: Vides,
inquiūt, Hippocrates Democriti vitam, quàm insanit, & ne-
que quod vult nouit, neq; quod facit. Et quidam ex ipsis ap-
huc ampliùs ostendere volens ipsius insaniam, alta voce plo-
rauit instar mulieris ob filij mortē lamentantis. Deinde rur-
sus cum gemitu eiulauit, personā agēs viatoris, qui aliquid
ex his quæ portabat, amisit. Verùm Democritus cum hæc au- **E**
disset, partim ridebat, partim cachinnis explodebat, & nihil
ampliùs scribebat. Caput autem frequēter cōcutiebat. Ego
verò: Vos, inquam, ò Abderitæ, hīc manete: ipse verò vbi &
verbis, & corpori viri propior factus fuero, viderēque ac au-
diero, cognoscā adfectionis veritatē. Et hæc loquutus, placi-
dè descendebar. Erat autem locus ille asper ac decliuus. Ita-
que vix me suffulciens penetraui. Cū autem appropinquas-
sem, incidi in ipsum nescio quid, quasi ex numinis afflatu &
cum concitatione scribentē. Stabam igitur isthic expectans
tempus quietis ipsius. Ipse verò paulò post, intermisso scri-
bendi imperu, & stilo scriptorio deposito, respexit ad me ac-
cedentem, &: Salue, inquit, hospes. Et ego: Plurimum & tu,
inquam, Democrite vir sapiētissime. At ille, verecundans ar- **F**
bitror, quòd nō nomine me compellasset: Te autem, inquit,
quo nomine vocabimus? Ignorantia enim tui nominis, cau-
sa erat, cur te hospitem appellarem. Hippocrates, inquā, me-
dicus est mihi nomen. Is verò: Asclepiadarum, inquit, nobili-
tas, & magna sapientiæ tuæ in re medica gloria multum ce-
lebris, etiā ad nos peruenit. Quid autem negotij, ò amice,
te huc perduxit? Imò potius præ omnibus confide. Vides au-
tem quòd hæc sedes foliis instrata non est iniucunda, viri-
dis adhuc ac mollis, & ad insidendum lenior inuidiosis for-
tunæ sellis. Cū autem consedissem, rursus inquit. Priua-
tūne, aut publicum negotium agens huc peruenisti? Dic
apertè, nam nos, quantum poterimus, adiuuabimus. Et ego:
Quæ vera causa est, inquam, tui gratia huc venio, vt sapien-
tem

Atem virum conueniam. Habet autem causam patria, cuius legatum ago. Ille verò: Hospitio itaque, inquit, primùm vtere nostro. Ego verò per omnia virum pertentans, etiam mihi manifestum esset, ipsum nō insanire: Philopœmenem, inquam, nosti ciuem vestrum? Etiam, inquit, valde: Damonis filium dicis, qui habitat apud Hermaidem fontē? Hunc ipsum, inquam, cuius ego sum ex patribus peculiaris amicus. At tu Democrite potiore me hospitio excipe, & primùm sanè quid sit hoc, quod hic scribis, dicito. Ille verò ubi paululum se continuisset: De insania, inquit. Et ego, ô rex Iupiter, inquam oportune profectò scribis contra ciuitatem. At ille: Qualem, inquit, ciuitatem Hippocrates? Ego verò: Nihil, inquam, ô Democrite, sed haud scio quomodo hoc verbum mihi excidit. Verùm quid de insania scribis? Quid enim, inquit, aliud quam quid sit, & quomodo in hominibus generetur, & quomodo alleuetur? Nam animalia hæc, quæ vides, inquit, huius gratia refeco, non quòd odio habeam opera dei, sed bilis naturam ac sedem quærens. Nosti enim quòd hæc furoris hominum causa est, ubi nimium redundarit. In omnibus equidem à natura inest: sed in quibusdam minus, in quibusdā amplius. At immodestia ipsius morbi sunt, ipsa velut materia, aliquando bona, aliquando mala subiacente. Et ego, Per Iouem, inquam ô Democrite verè hæc & sapienter dicis. Quare beatum te iudico, qui tanta quiete frueris. Nobis autem huius participes esse non permissum est. Interrogante verò illo: Cur ô Hippocrates, permissum non est? Quoniam, inquam, aut agri, aut res domesticæ, aut liberi, aut vīræ, aut morbi, aut mortes, aut famuli, aut nuptiæ, aut eiusmodi quædam opportunitatē nobis commodam eripiunt. Hic sanè vir ille ad solitam adfectionem delatus est, & valde effusè risit, ac cachinnatus est. Et de cætero quiescebat. Et ego: Quid verò, inquam, Democrite rides? vtrum bona quæ dixi, aut mala? Ille verò adhuc magis ridebat. Et Abderitæ de colle id videntes, partim capita sua cædebant, partim frontem. Alij verò capillos euellebant. Nam, velut postea dixerunt, ampliorem quàm aliàs solitus esset, risum effuderat. At verò, inquam, sapientum optime Democrite, cupio causam huius tuæ adfectionis cognoscere: quo risu ego tibi dignus visus sum, aut ea quæ dixi: quo

Hippocratis

c
 hoc cognito, à causa desistam, aut tu reprehensus, intēpesti. D
 quos risus coerceas. Ille verò: O Hercules, inquit, si me repre-
 hendere potes, curationem perficies, qualem nullam vnquā,
 ò Hippocrates. Et quomodo non reprehendaris, ò optime?
 Aut nō absurdum te esse putas, dum rides hominis mortem,
 aut morbum, aut mētis emotionem, aut insaniam, aut atrā
 bilem, aut cædem, aut aliud quid peius? Aut vice versa nu-
 ptias aut festiuitates, aut liberorum procreationem, aut my-
 steria, aut magistratus, aut honores, aut aliud quid omnino
 boni? Nam quorum misereri oportet, ea tu derides, & ob
 quæ latari conueniebat, ea itidem derides. adeò vt neque bo-
 num, neque malum apud te sit discretum. At ille: Hæc quidē,
 inquit, rectē dicis, ò Hippocrates: sed non nouisti risus nostri E
 causam. Vbi verò cognoueris: satis scio quod meum risum,
 meliorem legatione medelam ac curationem, tuæ patriæ &
 tibi ipsi auferes, & alios prudentes facere poteris. Et pro hoc
 fortassis me vicissim medicinam docebis, vbi cognoueris
 quanto studio circa res nullo studio dignas versantes, & ea
 quæ nullius prætijsunt facere conantes, omnes homines vi-
 tam cōsumunt, risu digna tractantes. Ego verò: Dic, inquam,
 per deos, nunquid vniuersus mundus agrotare se non ani-
 maduertit? & non habet qua legationem demittat ad sui cu-
 rationem? Quid enim extra ipsum esse poterit? Ille verò ex-
 cipiens: Multæ, inquit, sunt mundorum infinitates, & nequa-
 quam, ò amice, diuitem naturam maligne extenues. At hæc F
 quidem, inquam, Democrite suo tempore docebis. Vereor
 enim ne fortè dum infinitatem recēses, ridere incipias. Scias
 autem nunc, de tuo risu rationem vitæ te reddere debere. Il-
 le autē toruē me intuitus: Duas, inquit, risus mei causas esse
 putas, bona & mala. Ego autē vnum hominem rideo, demen-
 tia quidem plenū, rectis autem actionibus vacuum, in omni-
 bus consiliis pueriliter ac stultè se gerentē, nullius vtilitatis
 gratia labores nunquā absoluendos tolerantem, fines terræ
 & infinitos recessus ex immodicis cupiditatibus penetrantē,
 argentum & aurum quærentem, & nunquā ab his adquiren-
 dis interquiescentem: sed semper circa plura adipiscenda tu-
 multuantem, quo ipse inferior non sit, & neq; pudeat si non
 felix appelletur. Rideo itē ipsum eo q̄ hiatum terræ effodit
 manibus eorum perquirens, qui partim à laxa irruēte terra
oppressi

A oppressi sunt, partim diutissimè in hac necessitate detenti, in supplicio velut in patria permanent, argentum & aurum inquirentes, vestigia pulueris ac ramenta perscrutantes, arenam aliam aliunde eruentes, & terræ venas exscindentes, ad opulentiam semper glebas confluantes, ex matre terra hostilem terram, quum tamen eadem sit, facientes, & hanc admirantes pedibus calcant. Quanto verò risu dignum est, quòd ærumnosam & occultam terram amant, manifestam contumelia afficientes? Alij verò canes emunt, alij equos: alij multam regionem circumscribentes, propriam sibi inscribunt: & multis imperare volentes, neque sibiipsis imperare possunt. Vxores ducunt, quas paulo post eiiciunt. Amant, **B** deinde odio habent. Cum magna cupiditate liberos generant: deinde adultos eiiciunt. Quæ est illa vana ac absurda diligentia, nihil ab insania differens? Bellum intestinum gerunt, quietem non amplectentes. Reges alios deponunt, alios surrogant: occidunt homines: terram fodientes, argentum quærunt. Argento reperto, terram emere volunt. Empta terra, fructus vendunt: fructibus diuenditis, rursus argentum accipiunt. In quot mutationibus versantur? in quanta malitia? dum opes non habent, opes expetunt: dum habent, occultant, dissipant. Rideo, dum improbè agentes video. Intendo risum, dum infelicitè agentes cerno. Veritatis enim Leges transgrediuntur: contentionis studio hostilem inter se litem habent, & cum fratribus, & parentibus, & ciuibus: atque ad hæc, pro eiusmodi opibus, quarum nemo, ubi mortuus est, dominus est, se mutuo occidunt. Illicitam vitam degentes, amicorum ac patriæ penuriam contemnunt. Res indignas & inanimatas diuitiarum loco habent: pro vniuersa opulentia statuas emunt, quoniam effigies ita expressa est, vt loqui videatur. Eos verò qui verè loquuntur, odio habent. Res insuper non faciles expetunt. Nam continentem habitantes, mare cupiunt. Et rursus, cum in insulis sunt, continentem desiderant, & omnia peruertunt ad propriam cupiditatem. Et in bello quidem fortitudinem laudare videntur. Vincuntur autem quotidie à petulantia, ab avaritia. Ex omnibus adfectionibus ægrotant. Theriæ verò vitæ omnes sunt. Cur verò meum risum reprehendisti ô Hippocrates? Non enim quispiam suam ipsius

X x 4 demen

dementiam, sed alius alterius deridet: hi quidem ebrios, cum D
 ipsi sibi sobrij esse videntur: alij verò amantes, quàm ipsi gra-
 uiore morbo laborēt: alij nauigantes: alij eos, qui circa agri-
 culturam occupati sunt. Non enim concordant neque arti-
 bus, neque operibus. Ego verò: Hæc quidem, inquam, vera
 sunt Democrite: neque alius aliquis conuenientior sermo
 esse poterit: ad mortalium miseriam declarandam: verum
 ipse res sancit necessitatem, & domestica dispensationis,
 & nauium fabricationis gratia, reliquæ item vitæ, in qua
 necesse est hominem esse. Non enim ad otium natura ipsum
 genuit. Ex his autem rursus ambitio effusa, multorum rectè
 sentientem animam decepit, qui omnia quidem rectè ac se-
 rio agere student, velut re certâ ac stabili futura. Non autem E
 ita validi sunt, vt obscuritatem præuidere possint. Si enim
 quisò Democrite vxorem ducens, separationem aut mor-
 tem timeret: aut quispiam liberos educans, ipsorum interi-
 rum: imo neque in agricultura, & nauigatione, & regno, &
 magistratu, & omnibus quæ sunt in vita, vllus vnquam de
 errore præsumpsit, sed vnusquisque horum bona spe alitur,
 deteriorum verò ne meminit quidem: nunquid igitur risus
 tuus his minimè conuenit? At Democritus: Valde, inquit, tar-
 do ingenio præditus es, & longè à sententia mea abesò Hip-
 pocrates, qui tranquillitatis & perturbationis modum non
 consideras, præ ignorantia. Si enim hæc ipsa prudenti men-
 te disponderent: & ipsi facillè liberarentur, & meum risum le-
 uarent. Nunc autem, velut rebus in vita firmis, dementes illi F
 superbiunt, ob ratiocinationis expertem mentem, inordina-
 tum impetum suum agrè discantes. Sufficiens enim ad-
 monitio ipsis esset, omnium rerum vicissitudo, quæ subitis
mutationibus irruit, & derepentè omnigenam circunrota-
tionem inducit. At ipsi, velut hæc firma sit ac stabilis, obli-
 ti adfectionum assiduè incidentium, aliter alias ea, quæ tri-
 stitiam inferunt, cupientes, & quæ non conferunt, quæren-
 tes, multis calamitatibus inuoluuntur. Si verò quis iuxta
 propriam facultatem omnia facere cogitaret: stabilem sanè
 vitam custodiret, seipsum cognoscens, & sui ipsius compara-
 tionem clarè considerans, & non cupiditatis studium in infi-
 nitum extendens: sed opulentam naturam, & omnium nu-
 tricem, per sufficientiam intuens. Quemadmodum autem
 in opti

- A** in optimo corporis habitu, adfectionum periculum manifestum est: ita successuum fortunæ magnitudo periculosa est. Insignes autem palam in infelicitatibus conspiciuntur. Alij vero velut proximorum facta non videntes, à propriis malefactoris pereunt, tam manifesta, quàm obscura non prævidentes, quum longam vitam exemplum habeant eorum, quæ fiunt, & quæ non sunt, ex quibus etiam futurum considerare oportebat. Hæc sunt quæ mihi risus materiam præbent, o dementes homines, prauitatis pœnas pendentes, avaritiæ, insatiabilitatis, inimicitie, insidiarum, doli, inuidentiæ (difficile est enumerare multiplices malorum versutias: sunt enim infinitæ) & in his dolosis versutiis vicissim conuersantes, & maligne sentientes. At virtutis apud ipsos modus est, id quod deterius est. Mendacij enim studium exercent, voluptatem consectantur, legibus non obediunt. Quidam verò ex ipsis prævidentiam in hominibus esse negat, ut qui neque visus, neque auditus participes sunt. Solus autem sensus hominis recta intelligentia lucidus, & præsens & futurum prævidet. In omnibus displicentiam habent, & rursus ad eadem accedunt, abnegata nauigatione, nauigant, reiecta agricultura, rursus agrum colunt, eiecta vxore, aliam inducunt, genitos sibi liberos sepeliunt: & his sepultis, alios generant, ac rursus educant. Senectam optant: ad ipsam autem peruenientes, gemunt, in nullo rerum statu constantem mentem habentes. Principes ac Reges priuatum prædicant: priuatus autem regnum appetit. Qui Rēipūb. magistratum gerit, artificē laudat, velut extra periculum constitutum: artifex autem illum, velut per omnia potentem. Rectam enim virtutis viam, purā & leuem ac inoffensam, non vident, quam nemo ingredi audeat. Feruntur autem in contrariam, difficilem & tortuosam, per aspera incedentes, lapsantes ac offendentes, plerique vero excident, anhelantes velut si quis persequatur, litigantes, modo posteriores existentes, modo præcedentes. Et quidam ipsorum petulanti alieni cubilis corrumpendi amore ardent, per impudentiā inducti, alios avaritiæ morbus infinitus consumit, alij mutuo insidias struunt, alij ab ambitionis studio in aerē sublatis, per malitiæ grauitatem in profundū perniciē præcipites deferuntur. Quidam destruunt, deinde rursus ædificant: largiuntur, deinde pœnitentia ducti, amicitie iura tol-

Xx 5 lunt

Hippocratis

lunt, malefici per inimicitiam cognationis iura bello impe-
 tentes. Et horum omnium causa est Avaritia. Qua in re hi à
 pueris ludentibus differunt: apud quos consilium quidem iu-
 dicio caret: quod verò se forte fortuna obtulit, id incundum
 est. At verò in desideriis quid brutis animantibus reliqui fa-
 ciunt, quàm quòd intra sufficientiam feræ ipsæ se cōtinent?
 Quis enim leo aurum in terram occuluit? Quis taurus vbe-
 rioris alimēti gratia depugnauit? Quam pardalim vnquam
 infatiabilitas cœpit? Sitit quidem aper, sed vsque ad aquæ ap-
 petentiam. Lupus autem, deuorato necessario alimēto obla-
 to, quiescit. Si dies ac noctes confingat homo, non sentit con-
 uiuandi satietatem. Et annuorum quidem temporum ordo,
 terminus est brutis ad coitum: at homo perpetuo infano li-
 bidinis cestro stimulat. Quæso te Hippocrates, non ridere
 debeo plorantem propter amorem, eo, quòd commodo suo
 exclusus est: maximè verò si quis periculorum contemptor
 sit, & per præcipitia, aut pelagi profunditates feratur, risum
 non extendam? Non ridebo autem eum, qui nauem multis
 mercibus onustam demersit, deinde mari indignatur, quòd
 ipsam plenam submersit? Ego quidem nequaquàm mihi ride-
 re videor. Vellem autem potius aliquid molesti contra ipsos
 excogitare. At neq; medicinam pro his esse oportebat, neque
 aliquem præonia pharmaca præparantem: atq; huius rei do-
 cumentum præbeat tibi tuus ille progenitor Aesculapius,
 qui dum seruaret homines, fulminis ictus gratiam accepit. F
 Non vides quòd & ego malicie pars sum, dum infantia cau-
 sam inquirens, animalia mactō ac refeco? Oportebat autem
 ex hominibus causam perscrutari. Non vides quòd etià ipse
 mundus odio in homines plenus est? Infinitas enim contra
 ipsum adflictiones accumulauit. Totus homo ex natiuitate
 morbus est. Dum educatur, inutilis est, & alienum auxilium
 implorat. Dum crescit, proteruus, insipiens, pædago opus
 habens. Dum in vigore est, audax est. Dum decrescit, misera-
 bilis, ubi labores suos imprudenter recolit ac iactat. Ex ma-
 ternis enim vteri inquinamenti talis prodiit. Et propterea
 alij indignatione ac immodica ira pleni, in calamitatibus ac
 pugnis versantur: alij semper in adulteriis & corrupendis
 puellis: alij in ebrietatibus: alij in rerū alienarū cupiditati-
 bus: alij in suis prodigiis. Utinam facultas esset nobis, vni-
 uersor

A uersorum habitationes reuelare, & nullum rerū in ipsis ve-
lumentum dimittere, atq; ita ea, quæ intus aguntur, videre:
videremus vtrique alios edentes, alios vomentes, alios suppli-
ciis torquentes, alios pharmaca miscentes, alios insidias con-
struentes, alios supputantes, alios gaudentes, alios plorantes,
alios amicos aculantes, alios propter ambitionem amētes.
Quamquam sint quædam actiones profundiores, quæ in ani-
mo occultantur. Et ex his quidā sunt iuuenes, quidam senes:
petentes, negantes, pauperes, opulenti: fame pressi, luxu gra-
uati: sordidi, vincti, alij deliciis diffuentes, famulitium ma-
gnū alentes: alij trucidantes, alij sepelientes: alij ea quæ ha-
bent contemnentes, & speratis possessionibus inhiantes: alij
B impudentes: alij parci: alij inexplēbiles: alij occidentes: alij
vapulantes: alij superbientes, alij vana gloria elati. Et ex his
aliqui apud equos spectatores consistunt: aliqui apud viros,
aut canes, aut lapides, aut ligna, aut æs, aut picturas. Et aliqui
legationibus, aliqui militiæ, aliqui sacerdotiis præsumt. Et
alij coronas gestāt, aliqui armati sunt, aliqui occiduntur. Sin-
guli verò ex his feruntur, partim ad pugnam naualē, partim
ad militiam, partim ad rusticationē: alij ad onerarias naues,
alij ad forum, alij ad concionem, alij ad theatrum, alij ad fu-
gam, alij aliò. Et rursus, quidam ad voluptatem deliciāsq; ac
intemperātiā: quidam ad otium ac socordiam. Quum igitur
tot indignas ac infelices animas videamus: quomodo nō
C vitam ipsarum eiusmodi intemperantia præditam risu exsi-
bilarimus? Quin & valde timeo, neq; medicinam tuam ipsis
placere. Nam præ intemperatiā omnia ipsis displicent, & in-
saniam sapientiam putant, profectò suspicor pleraq; in scien-
tia tua palam contumelia adfici, aut propter inuidiam, aut
propter ingratitudem. Aegrotantes enim simul vt ser-
uantur, causam diis aut fortunæ attribuunt. Plerique verò
sux naturæ hoc adscribentes, benefactorem odio habent,
& parum abest vt indignè ferant, si debiliores esse putentur.
Sed & plerique artis ignorantiam in seipsis habentes, & im-
periti existentes, id quod melius est, purgant. Inter stūpi-
dos enim fiunt suffragia, & neque aegroti attestari volunt,
neque eiusdem artis artifices testimonium præbere. Inui-
dia enim obstat. Non autem inexpertus es tu talium nuga-
rum: imò probè scio, ob hæc te sæpe in memorabilibus
adfici

Hippocratis

ad afflictionibus accersitum fuisse, & neque causam, aut in- **D**
uidiam libenter derisisse. Veritatis enim neque cognitio
vlla est, neque vllum testimonium. Hæc autem cum dice-
ret, subridebat, & mihi, ò Damagete, diuina specie appare-
bat, & velut qui priorem suam formam exuisset. Et ego: O
magnifice Democrite, inquam, magna xenia & hospitali-
tatis tuæ munera, in Co mecum auferam. Multa enim me sa-
pientiæ admiratione impleuisti, Discedo enim veritatis tuæ
præco, qui humanam naturam inuestigasti ac considerasti.
Quum autem mentis meæ medelam à te acceperim, ab eo
nunc tempore hoc expetente, itémque corporis curatione.
Cras verò, & deinceps, hoc loco rursus conueniemus. Atque
hæc loquutus, surrexi. Et ille paratus erat me sequi. Cùm ve- **E**
rò quidam accederet, haud scio vnde, tradebat ipsi libros. Et
ego concitatus festinaui, & ad Abderitas in specula me ex-
spectantes: Viri, inquam, pro legatione vestra ad me, magna
sit vobis gratia. Vidi enim Democritum virum sapientissi-
mum qui solus potentissimus est homines prudentes facere.
Hæc habui Damagete, quæ de Democrito valde magna ani-
mi lætitia tibi recensere volui. Vale.

Democritus Hippocrati felicitatem.

Accessisti ad nos velut insanos, ò Hippocrates, veratrum
nobis daturus, persuasus à viris stolidis, apud quos la- **F**
bor virtutis insania iudicatur. Tunc autem de mundi dispo-
sitione, & de polis ac astris cœlestibus scribebamus. Cum ve-
rò horum naturam cognouisses, quòd omnia valde commo-
dè essent creata, & quòd procul ab insania ac desipientia
abessent: meam quidem naturam laudasti: desipientes au-
tem & crudeles ac furiosos illos iudicasti. Nàm quæ simula-
chris per aërem vagantia nos decipiunt, quæ sanè mundus
esse comprehenduntur, & vicissitudinem habentia creata
sunt: ea mens mea, naturam perscrutata, verè in lucem pro-
duxit. Cuius rei testes sunt libri à me conscripti. Oportebat
igitur te, ò Hippocrates, cum viris eiusmodi moribus præ-
ditis minimè congregi ac conuersari, quorum mens super-
ficiaria & inconstans est. Si enim ab illis persuasus, mihi, ve-
lut insano, veratrum bibendum dedisses, prudentia insania
facta

A facta fuisset: & artem tuam reprehendissent, velut quæ insan-
 iæ fuisset causa. Veratrū enim sanis datum, menti tenebras
 offundit. Insanis autem valde prodesse consuevit. Arbitror
 equidem, si non deprehendisses me scribentem, verū re-
 cumbentem, aut fortè deambulantem, & mecum colloquen-
 tem, & nunc quidem indignantem, nunc verò ridentem, ob
 ea, quæ mente reuoluam, & familiaribus me alloquentibus
 non attendentem, sed cogitatione instantem, & mirum in
 modum speculantem putasses sanè Democritum, iuxta ocu-
 lorum iudicium, ex his, quæ vidisses, insanix imaginem præ
 se ferre. Oportet igitur Medicum non solum visu adfectio-
 nes iudicare, sed etiam re ipsa: & rythmos ac consonantias
 B vt plurimum indagare: & vtrum incipiat morbus, aut me-
 dium teneat aut desinat, perscrutari: & differentia, ac anni
 tempore & ætate obseruata, adfectionem curare: itémque to-
 tius corporis naturam considerare. Ex his enim omnibus
 facile morbum inuenies. Porro remisi ad te de insania tra-
 ctationem à te conscriptam. Vale.

Hippocratis Coi, de insania scriptum.

Q Vemadmodum in libello de morbo sacro dixi, Insa-
 nienti necesse est præ humiditate cerebrum, in quo
 animæ sunt opera, moueri: vbi videlicet humidius quàm
 C pro natura fuerit. Eo verò commoto, neque visum, neque au-
 ditum quiescere: sed aliàs alia & videre, & audire: & linguā
 talia loqui, qualia singulis vicibus viderit ac audierit. Quan-
 diu verò cerebrum quieuerit, tandiu etiam homo sapit. Fit
 autem corruptio cerebri à pituita & bile. Vtriusque verò co-
 gnitio sic contingit. Etenim qui à pituita insaniunt, quieti
 sunt, & non vociferantur, neque tumultuantur. Qui verò à
 bile, percussores sunt, & malefici, ac non quieti. Et si quidem
 assidue insaniāt, hæc causæ sunt. Si verò terrores & timores
 fuerint, à transmutatione fiunt, cerebro à bile calescente
 quæ ad ipsum per venas sanguinarias procedit. Cùm autem,
 bilis discesserit rursus in venas, etiam corpus quiescit. Tri-
 statur autem & angitur homo, & præter temporis rationem
 obliuiosus fit, dum cerebrum à pituita perfrigeratur, & præ-
 ter solitum morem compingitur. Postquàm verò cerebrum
 derep

derepente à bile calefactum fuerit, sanguine in prædictis venis efferuescente : insomnia vident horrenda, & facies velut in vigilante flammescit, & oculi rubescunt, & mens aliquid mali operari cogitat. Atque hoc in somno homo patitur. Cum autem sanguis rursus ad venas dispersus fuerit, quiescit. Porro in quinto popularium morborum libro quædam recensui, cui fiebat vocis interceptio, ignorantia, frequentes delirationes, & reuersiones. Lingua autem dura, &, nisi collutione usus esset, loqui non poterat, & plerunque etiam valde amara. Venæ sectio exsoluit, aquæ potus, aqua mulsa, veratrum potiones. Hic ubi modicum tempus superuixisset, mortuus est. Erat & alius quidam, quem, ubi noctu ad conuiuium progredere, timor tibicinæ corripiebat, ubi audiret ipsam tibia canentem. Interdiu verò audiens, nihil patiebatur.

Hippocrates Democrito felicitatem.

Artis Medicæ recta facta, ò Democrite, plerique è vulgo hominum non omnino laudant, verum Diis sæpe attribunt. Si verò natura reluctata perdiderit eum, qui curatur : medicos reprehendunt, numen prætereuntes. Et ego sanè mihi videor, maiorem reprehensionem quàm honorè artis me assequutum esse. Ego enim ad finem Medicinæ non perueni, etiamsi iam senex sim. Neque enim ipsius inuentor Aesculapius, sed & ipse in multis à seipso dissensit, quem admodum nobis scriptorum libri tradiderunt. Proinde epistola à te ad nos missa, veratri medicinam reprehendebat. Inductus equidem sum, ò Democrite, velut insanienti veratrum daturus, non perscrutatus qualis quis tandem esses. Vbi verò tecum congressus, cognoui non per Iouem desipientiæ opus, sed ferme omni laude ac commendatione dignum, valde laudaui naturam tuam, optimumque naturæ ac mundi interpretem te iudicaui. Eos verò qui me induxerunt ad te, velut insanientes reprehendi. Nam ipsi medicamento opus habebant. Quandoquidem igitur casus nos in diem coniunxit, rectè feceris si ad nos frequentius literas dederis, & libros à te cōscriptos impertiueris. Misi autem etiam ipse tibi de veratri usu libellum. Vale.

Hippocr

A

Hippocratis de veratri usu libellus.

His qui non facile sursum purgantur, ante potionē corpora præhumeſtare oportet vberiore alimēto & quiete. Vbi verò quis bibit veratrum, ad motus corporum magis ducere, quàm ad ſomnos. Declarat autem nauigatio, quod motus corpora turbat. Cùm veratrum magis ducere voles, corpora moueto. Veratrum periculofum eſt ſanas carnes habentibus. Quicūq; in pharmacorū portionibus non ſitiunt, dum purgantur, non ceſſant purgari prius quàm ſitierint. Conuulſio ex veratro, lethale. In nimia purgatione, conuulſio aut ſingultus ſuccedens malum. In turbationibus ventris & vomitibus ſpontaneis, ſi quidem qualia purgari oportet, purgantur, conducit, & leuiter ferunt. Sin minus, vice verſa. Quemadmodū autem in prænotationibus dixi, purgatio ſurſum verſus commodat ei, in quo ſine febre eſt cibi faſtidium aut ſtomachi punctura, aut vertigo, aut os amarum, & in ſumma doloribus ſupra ſeptum tranſuerſum; aut deorſum verſus, vbi ſine febre eſt tormen, lumborum dolor, genuum grauitas, menſes agrè prodeuntes, dolores in partibus ſub ſeptotranſuerſo. Vitare verò oportet in pharmacorum portionibus eos, qui bona habent corpora, maximè autem nigros, & humida carne præditos, ſed & ſubſiccos, & balbos, ac blæſos. Quicunque verò inflammata in principio morbi, velut in libello de priſana dixi, ſtatim medicamento ſoluere aggrediuntur, hi de eo quidem quod diſtentum eſt ac inflammatum, nihil auferunt. neque enim remittit qui crudus eſt adfectus. Ea verò quæ morbo reſiſtunt, & ſana ſunt, conſumunt. Corpore verò debili fiente, morbis ſuperat & immedicabile malum habent. Cæterum veratrum hiſ dare oportet, quibus de capite fluxus fertur. Non autem dandum eſt pectore iuppuratis. Neque medicamenta danda ſunt decoloratis, raucoliſ, lienoliſ, exanguibus, ſpirituoliſ & ſiccum tuſſientibus, ſiticololiſ, flatuoliſ, & hiſ qui præcordia, & latera, ac dorſum diſtenta habent, & torpentibus, & obſcurè videntibus, & quibus aurium ſonitus ſunt, & vrinæ meatus impotentibus: neque item morbo regio laborantibus, aut ventre debilibus, aut hiſ qui ſanguinis eruptiones aut tubercula habent. Si verò medicandum eſſe videbitur,

veratro

videtur
leniter
ex lib.
Hippocr.

veratro securus sursum purga, deorsum verò non. Optimum D
autem his est victus rationem cōstituere. Quemadmodum
autem in prædictionibus dixi, non sunt medicamenta danda
his qui nigra euomunt, neq; cibum auersantibus, neque de-
lyris & parum dormientibus, neque dolore vexatis, neq; vi-
sum temerarium inclinatum habentibus, neque tumefactis,
neque vertiginosis, neque decoloratis, neque his qui in febre
æstuosi sunt ac confracti. Sicut autem de ptisana dixi, Sesa-
moides sursum purgat. potio eius est drachma dimidia in
aceto mulso trita. Commiscetur etiam veratris tertia potio-
nis pars, & minus suffocat. Purgat item quartanas diurnas
& diurna febre lipyria vexatos: & eos, in quibus non est fi-
tis, neque excretio. Hos verò non ante tres hebdomadas. E
Aliquando etiã pleuriticos ac voluulosos. Et sicut in mulie-
bribus morbis dixi, purgandum est etiam si vteri purgatio-
ne opus habuerint.

Hippocrates ad Thessalum filium.

A D cognoscendam Geometriam & numerorum scien-
tiam, mi fili multum studij adhibeto. Non enim solùm
vicam tuam illustrem, & ad multa commodam, in humana-
rum rerum statu efficient: sed etiam animam acutiorem &
clariorem reddent, ad omnium, quorum vsus in medicina
expetitur, vtilitatem consequendam. Etenim Geometriæ co- F
gnitio, quæ multiformis ac variã est, & omnia cum demon-
stratione transigit, utilis erit & ad ossiũ situs, & ad exarticu-
lationes, & reliquum membrorũ ordinem. Nam ad multi-
plicem horũ adfectionem, & articulorum luxatorum repo-
sitione, & ossium contritorum refectione, & perforatione,
& compositione, & exemptione, & reliqua curatione, maio-
re industria vtetur quisquis nouerit qualis est locus, & quale
est os, quod ex eo eluxatum est. At verò numerorum ratio,
& ad circuitus, & ad transmutationes febrium præter ratio-
nem fientes, & ad iudicia ægrotantium, ac securitatis in mor-
bis, sufficiens erit. Præclara enim res est, tale ministerium
in medicina habere, quod tibi partes intentionis ac remis-
sionis, cùm ex parte inæquales fuerint, faciliè cognobiles
exhibet, citra errorem. Quapropter ad huiusmodi experien-
tia

A tix facultatem peruenire sedulo stude. Vale.

Democritus Hippocrati, De natura humana.

OMnes homines artem medicam nosse oportet, ò Hippocrates. Est enim res honesta simul ac utilis ad vitam: & ex his maximè eos, qui eruditionis ac eloquentiæ cognitionem habent. Nam sapientiæ cognitionem medicinæ fororem ac contubernalem esse puto. Sapientia enim animam ab adfectibus liberat; medicina verò morbos à corporibus aufert. Augescit autem intelligentia, præsentē sanitatē: cuius prouidentiam habere, honestum est, eos qui rectè sentiunt, At ubi corporis habitus agrotat: neque mens ipsa alacritatem habet ad virtutis meditationem. Morbus enim præsens animam vehementer obscurat, intelligentiam ad affectionem per consensum ducens. Caterùm naturæ humanæ descriptio, eiusmodi speculationem habet. Cerebrum quidem supremam corporis partem custodit, & securitatis tutelā sibi commissam habet, intra membranas neruofas cohabitās. Super quod duplicatorum ossium naturæ necessariae firmata, dominum mentis custodem, ipsum cerebrum tegunt. Pilorum decor est, cutem ornare. Oculorum verò vis visiva in multiplici tunica latitatus, ob humeris instantias sub frontē in medellā collocata est, & est vidēdi causa. Pupilla verò syncera, palpebræ marginem opportunitatis custodem sustinet. Duplices autem nares olfactum dinoscentes, oculorum vicinitatem dirimunt. Mollis verò labiorum contactus os circumplicans, verborum sensum, exactāque articulationem gubernans exhibet. Mentum autem in extremitatem desinens, ac lyræ simile, dentium clavis coaptatū est. At sermonum receptacula aures, opifex aperuit: in quibus dum est sermo, non certus temeritatis minister existit. Loquelæ mater lingua, animæ nūcius, gustum custodiens, munitis dentium septis custodita est. Guttur autem & Gula inter se coniuncta, vicina sunt. Illud enim in viam spiritus: hæc in profundum ventris, alimētum demittit, largè id propellens. Regium verò cor, cono ac pineæ nuci simile, irā nutriendum, aduersus omnes insidias thoracem induit. Frequenter autem flatuum ca-

Y y uern

uernæ aere per ipsas erumpente vocis causam flatû pariunt. **D**
 Quod verò sanguinem supeditat, & in alimētum transmutat, cum apicibus sepe vena caua circumfluum, hepar est. cōcupiscentiæ causa. Viridis autem bilis iuxta hæpar manens, vbi superebullit, humani corporis corruptio est, & nocius ac inutilis corporis humani inquilinus. Veruntamen vice versa dormit, nullum negotium exhibens. Inter hæc autem medius omnia suscipiens venter chorum ducit, & accumbit: concoctionem gubernans. Obnoxia verò ventris compositioni, per opificium cōuoluta, circum ventrem euoluuntur intestina, adsumptionis & excretionis causæ. Gemini autem rhenes in coxis firmati, & pinguedine intecti, ab vrinarum excretionem non sunt alieni. At dominus totius ventris, qui **E**
 Omentum vocatur, totum ventrem complectitur, solo splene excepto. Consequenter, neruosa vesica in coxa osculum firmatum habens, venis complicatis, vrinarum excretionis causa est. Huic autem vicina mater puerorum, vehemens illud malum, infinitarum ærumnarum in muliere causa, vterus ipse latitat. Pylorus autem siue lauator, ex coxarum recessu emergens caro, neruis adstringitur. Verum de plenitudine naturæ ventris effundit, ex opificij prouidentia. Porro extra corpus pensiles domum incolunt, ad generationem destinati, conditores testiculi, multis tunicis præditi. Iucundum ex venis ac neruis plicamentum est pubes, quæ vrinarum effusionem facit, & ad coitus ministerium à natura creata est, **F**
 & pubertatis appetentiam tegit. Crura verò & brachia, & extremæ partes his annexæ, totum ministerij principium coaceruatum habentes, tutum neruorum ministerium perficiunt. At verò incorporea in recessibus natura, omnifaria viscerum genera fabricauit. Quæ sanè mors instans, celeriter à ministerio quæta reddit.

*Hippocrates Cous, Demetrio
 regi gaudium.*

NOse quidem etiam prius, ò Rex, studio habentes naturæ humanæ partes in summa considerare, has conscriptas quemadmodum voluisti demisimus. Nunc autē ea, quorum maximè studiosos esse oportet prudētes, partim à prioribus

Aribus transumpta, partim nunc per nos ipsos comperta, tibi conscripsimus. Quæ si tu priorum morborum signis fientibus sequutus, & iisdem sæpe usus fueris: per omne vitæ tempus morborum exors esse poteris. Duo sunt morborum vniuersorum animalium genera, alterum secundum genus, alterum secundum adfectionem, inter se dissimilia. At verò concupiscentias iuxta alimentum, ex subcontrariis cognoscas, dum ea quæ euacuantur, indicant ea quæ plena sunt: & quæ implent, coniecturam præbent eorum quæ vacua sunt. Morbos autem omnes ex subcontrariis constitutos cognoscas, & morbos à morbis fieri. In conuulsionibus febris succedens, sistit morbum: capitis autem dolores, sanguis ex auribus erumpens, aut ex naribus. Conuulsionibus omnibus morbis atræ bilis succedentes, atram bilem sedant. Et in summa, radix humanorum morborum est caput, & maximi morbi ex hoc accedunt. Quum enim ori velut cucurbita medica incumbar: contingit, vt ipsum omnium eorum, quæ ingeruntur, superfluitates attrahat, & tenues humores. Oportet autem animum aduertere, & peculiariter viuere, vbi te ipsum præparaueris in has partes, quo morbi accidentes nullum augmentum capiant, per curam diligentem & per bonum ordinem apud te fientem: ita vt neque rei venerex intemperantia, neque diuersorum eduliorum incontinentia, neque somnis immodicis, in exercitato corpore vtaris: sed signa in corpore contingentia sequaris, & vniuscuiusque corporis occasionem conserues: quo morbum irruere paratam vites, & medelis, quas ego perscribo, vtens, à morbis exors perseueres. Vale.

Decretum Atheniensium.

Visum est ac decretum Senatui & populo Atheniensi. Quandoquidem Hippocrates Cous Medicus, & ab Aesculapio originem ducens, magnam beneuolentiam vnâ cum salute Græcis ostendit, quando etiam peste à barbaris in Græciam proficiscente, discipulis suis ad locos dimissis, indicauit quibus medelis vti oporteat, & accedentem pestem securè effugere, quo medicina Græcis data, ipsorum ægotos tutò seruaret. Sed & scripta sua de arte medica ex-

Yy 2 acta

Hippocratis

asta edidit, multos esse volens Medicos qui seruare possent. D
Et Persarum rege ipsum accersente, & honores optimatibus
Persarum æquales promittente, & dona quæcunque tandem
ipse Hippocrates vellet offerente, Barbari promissiones con
tempnit, eo quòd hostis & communis inimicus Græcis esset.
Quo igitur appareat, populum Atheniensem semper ea quæ
utilia sunt Græcis consultare: & vt gratiam condignam Hip
pocrati pro benefactis referat: visum est populo, ipsum pu
blicè magnis mysteriis initiare, quemadmodum Herculem
filium Iouis: & coronare ipsum corona aurea mille aureo
rum: & ipsam coronam Quinquatriis magnis Mineræ fe
stis, in certamine gymnico per præconem proclamare. Et
licere omnibus Coorum liberis, vt Athenis pubescant, quem
admodum liberi Atheniensium: quandoquidem patria ipso E
rum huiusmodi virum genuit. Esse verò Hippocrati, & vitam,
& victum prouisum in Pritaneo per omnem vitam.

Oratio Hippocratis ad aram consistentis.

OVos multi & multarum urbium habitatores, in magna
dignitate constituti, communi nomine Thessali, omni
bus hominibus amara necessitas incumbit, vt quæ à fati sta
tuta sunt ferant. Quapropter ego nunc cedens cum mea so
bole, oleæ ramulis coronatus, ad Mineræ aram supplex con
fisto. Quis sim, ignorantibus dicere oportet. Hippocrates, ò
viri, medicus Cous, non per piam & honestam causam, me ip
sum & liberos meos vobis commendo. Cognoscitis me ò
plebs. Nam profectò vos estis viri mihi familiares, inter
quos, vt verum dicam, inter plerosque vestrum & in multis
urbibus vestris cognitus sum, vt in summa dicam. At verò
nomen meum longè vterius, quàm formæ meæ aspectus,
processit. Atque hæc causa ex arte mea sanitatis ac vitæ or
tum habuisse videtur, quòd non solum hominibus vestram
regionem habitantibus, sed etiam multis Græcis vobis vici
nis cognitus sum. Iam verò qua de causâ tantum negotium
ope re peragendum adsumpsi, referam. Athenienses male ha
bebunt, ò viri Thessali, qui Metropolim ac patriam no
stram

Astram Co deuastrantes, in seruitutem redigunt ea, quæ libera sunt ex progenitorum acquisitione, priuatim sibi parta facientes: neque cognationem reueriti, quæ ipsis est ab Apolline & Hercule, quæ sanè ad Aenium & Sunium filios illorum peruenit, neque Herculis malorum domitoris beneficia mente recolunt, quæ ille communis & vobis & nobis bene faciēs deus, in illos contulit. At vos per Iouē supplicationibus colēdū, & per cognatos deos, egredimini, vindicate, liberate, propriæ virtutis memores, & nihil ad gloriam vestram spectans intermittentes.

Oratio Legati Thessali filii Hippocratis, ad Athenienses.

B

Conuenire arbitror viri Athenienses, constitutum apud vos, qui non omni multitudini cognitus est, primū in- Exordium
dicare quis sit, & vnde sit: postea verò reliquam orationem adocilare
persequi. Mihi equidem pater est Hippocrates: qui quantam in medicina facultatem habeat, vos nouistis. Nomen autē est Thessalus. Cognitus verò & ego sum nō in postremis, neque paucis vestrū. Patria verò mihi est Cos: quæ quomodo vobis cognata sit ab antiquo, alij dicunt, qui in recensenda historia sunt præstantiores. Veni autem missus à patre, quatuor beneficia à nobis in vos collata prolaturus. Primum quidem Amphy-
C vetus quoddam, tempore progenitorum nostrorum cōmu- tyones.
ne in omnes Amphictyonas, quorum vos non minima pars estis. Alterum verò illo adhuc maius, & ad plurimos Græcorum progressum. Atque hæc quidem vrbs & progenitorum meorum esse apparebunt. Tertium autem patris proprium est, & tantum, quantū nemo vnus vir, & vobis & multis Græcis contulit. Postremū verò ex quatuor cōmune est patris & meū, & quod non ad plures, sed ad vos ipsos peruenit. Quod quidem priorum beneficiorum comparatione exiguum videri poterit: verū ad aliorum beneficia collatum, magnū est. Et sanè huiusmodi beneficia sic se habent, quemadmodū esse dixi, vt summam dicam. Oportet autē non solum dicere, sed etiā demonstrare quòd vera sunt. Principiū igitur sermonis, ipsum ministeriorum nostrorum principiū faciam. Narratio

Yy 3

Verust

Hippocratis

Crisæi.
Pythicum
templum.
Locri.

Vetustissima verò primùm referam in quibus fortassis lon- **D**
giora ac altius repetita me dicere deprehenderitis. At quis-
que vetus dici expetit. Erat enim tempus quādo Crisæa gens
erat, & habitabat quidem circa pythicum templum: terram
verò habebat, quæ sanè nunc Apollini consecrata est. Appel-
latur autē Crisæus quidem campus, iuxta quem Locri habi-
tant, & cui Melæna adsunt: Cirrhæus verò mons, cui Phocen-
ses adiacent. Hi porrò Crisæi cum essent aliquādo populosi,
& fortes, & opulenti, his bonis ad malum vti sunt. Per insolē-
tiam enim multa horrenda ac iniqua facta perpetrarunt, in
deum impietatem exercentes, Delphos in seruitutem redi-
gentes, vicinos deprædantes, agricolas spoliantes, vxores ac
liberos abducentes, & corpora ipsorum constuprantes. Qua **E**
de causa Amphictyones ira commoti, & exercitu in terram
ipsorum inducto, & ipsis pugna deuictis, regionem deuasta-
runt, & vrbes expugnarunt. Vbi sanè illi, qui multa & impia
perpetrarunt, miserè accepti sunt, non minores pœnas per-
soluentes, quàm ipsi aliis intulerunt. Felicissimi verò ex ipsis
fuerūt, qui intra manus hostium perierunt. Secūdo loco, qui
manu capti sunt, & qui ad aliā regionē ac vrbes trāsuerunt,
Crisæorum Sua enim mala ob oculos nō habuerunt. Qui verò ex capti-
calamitas uis isthic manserunt, infelicissimi fuerunt, quicunque in sua
quanta. ipsorum regione torquebantur. Nam cum vxoribus & libe-
ris, agros & vrbes igni tradi videbant. His verò adhuc peius
degebant hi, qui intra mœnia perseuerabant, quando relata
mala partim videbāt, partim percunctabātur, plura veris au-
dientes. Sic enim fieri solet. Et sanè malam salutis spem ha-
bebant. Erat autem ipsis vrbs propè hunc locum maxima,
vbi nunc certamen equestre peragitur: cuius muros extru-
xerant, & eos qui ex aliis vrbibus transfugerant, exceperant.
Inutilia verò eiecerant, & necessaria importauerant. Et co-
gitabant obsidionem sustinere, bona spe præditi, neque ma-
nuum pugna, neque longi temporis obsidione, urbem capi
posse. At verò Amphictyones, tum alia deuastarunt, tum ad
hanc urbem præsidio constructo, & ad expugnationem præ-
Pestilentia parato, reliquum exercitum per vrbes dimiserūt. Temporis
obsidentiu autē progressu, cum pestis in exercitū illapsa esset, & milites
summa. agrotarent: quidam verò etiā morerentur: alij verò, propter
morbum

A morbum, praesidium reliquissent: Amplietyones turbabantur. Et alij alia consultabant. Solet autem in rebus communibus sic ferè fieri. Tandem verò additionem molestè ferentes, & de bello desperantes, Deo rem commiserunt: & quid facere oporteret, interrogauerunt. Ille verò bellum gerere iussit, & ad victores fore promittebat, si ad Co profecti, cerui filium in auxilium adducerent, cum auro: atque hoc festinabundi, vt ne Crisei prius in adyto tripodem deprædarètur. Sin minus, urbem capi non posse. Ipsi verò, his auditis, & ad Apollinis
responsum. Co profecti, oraculum proposuerunt. Cùm autem Coi dubitarent, & oraculum non intelligerent: surrexit vir genere quidem Asclepiades, progenitor autem noster. Medicus verò Græcorum eius temporis omnium confessione optimus:

B nomen autem ipsi erat Nebrus: qui oraculum dicere inquit, vt ad seipsum venirent. Nam Deus, inquit admonuit vos, vt profecti ad Co. cerui filium in auxilium adducatis. Cos equidem hæc est. Ceruorum autem filij Nebri appellantur, hoc Nebri. est, hinnuli. Nebrus autem est mihi nomen. Quod verò aliud auxilium potius contigerit exercitui ægrotanti, quàm medicus? Et profectò non videtur mihi id consequens esse, quòd in tantum diuitiis Græcos omnes superantes, Deus ad Co proficisci iusserit, & aureum numisma petere. Verùm hoc oraculum in meam domum progreditur. Chrysos enim, hoc Chrysos. est aurum vocatur masculus meus filius nati minimus. Est autem omnino & corporis specie, & animi virtute, quantum patri dicere licet, inter omnes ciues præcellens. Ego quidem igitur, nisi vobis aliud videatur, & ipse proficiscar, & filium mecum adducam, naue quæ quinquaginta remis agatur instructa meis sumptibus & ministeriis medicis ac bellicis referta, quo in vtranque partem auxilium feramus. Et hic quidem dixit: illi verò approbauerunt, qui missi fuerunt. Calydoni?

C At Nebrus hic etiam virum Calydonium apud se educatum, in nauem adsumpsit: de quo statim, vbi res tulerit, dicemus. Cùm igitur peruenissent hi viri ad castra, Deus gaudebat. Nam & mortes militum cessabant, & cum diuina fortuna equus Eurylochi (qui belli dux erat, Theffalus genere, & ex Heraclidis ortum ducens) canalem, per quem aqua in urbem ducebatur, vngula percussisset, vbi in puluere volutari voluisset: Nebrus aquam medicamentis infecit,

Chryfus
primus mu-
rum con-
scendit.
Mermodes

Templum
Apolinis.
Equestre
certamen.

Chrysi se-
pultura.

Persarum
rex.

unde ventres Chryseorū corrupti sunt: & sanè multum cōtu-
lit ad hoc vt ciuitas caperetur. Atq; hinc iam animi obsiden-
tium elati sunt, velut deo iam manifestè auxilium ferente.
Cum autem impetus facerent, & prēmia proponerēt his qui
primi muros conscendissent: certamen erat fortissimum, &
vrbs capiebatur. Primus enim muros conscendit Chrysus, &
turrim occupauit. Sequebatur autem ipsum euestigio vir il-
le Calydonius, sub communi scuto auxiliū ferens, de quo an-
tea dixi. Et Chrysus quidem hasta percussus cecidit ex sum-
ma turri: percussus est autem à Mermode Lyci fratre, qui la-
pidibus obrutus mortuus est, cū in adytum irrupisset, tripode-
m deprædaturus. Hi igitur ciuitatem sic cœperunt: & Ne-
bri auxilium cum Chryso, & secundum medicam, & secundum
bellicam facultatē rectè successit: & deus vera dixit, &
quæ proniserat fecit. Qua de causa Amphictyones Apollini
quidem templum consecrarunt, quod nunc est in Delphis: &
certamen gymnicum ac equestre prius non peragentes, nūc
peragunt: & Chryseorū regionem vniuersam dicarunt Deo
contributori, reddentes ea quæ dedit in eo quòd oraculum
dedit. Et Nebri filiū Chrysum in circo equestri sepelierunt:
& Delphis publicè ipsi parentare præceperunt. At Clepiadis
verò in Co attributa est prudentia vaticinandi, quemadmo-
dum his qui mittuntur ex vrbibus ad sacrum Amphictyonū
concilium: atq; hoc Nebri gratia. Calydoniis autem ab illo
viro & illo ministerio, etiam nunc in Delphis primæ vatici-
nandi partes, & alimenta dantur. Verū redeo ad nostra. Nam
quod vera dico, hinc clarū est. Cum enim pater & ego acces-
sissemus, Amphictyones hæc renouarunt, & attribuerunt, &
in columna descripta in Delphis dedicauerunt. Atque huius
quidem sermonis finis clarè ostendit, nostros progenitores
esse vestros benefactores. Cæterum hoc relicto, alium de iis-
dem non eundem sermonem, adsumam. Cum enim magnus
ille rex Persis & aliis Barbaris bellū gereret contra Gre-
cos, qui aquam & terram non dedissent: patria nostra maluit
in totum pellundari, vt ne contra vos, & eos qui vobiscum
sentirent, hostilia arma sumeret, & in nauibus militarem
expeditionem mitteret. Sed abnuit, honestum quid & di-
gnum patribus meditata, qui Gigantes & Heracidae esse di-
cuntur. Visum igitur est in ipsis, cum quatuor essent muri in
insula

A insula, omnes relinquere, & ad montes cōfugere, & salutem tutari. Vnde sanè quid non mali obuenit? dum regio fuit deuastata, & corpora libera mancipata, & hostili lege occisa, & vrbs & alia munimenta, ac templa, ad fauillam exusta. Insuper autem & filia Lygdamis Artemisia, circa patrum victoriam datum est, omnia quæ reliqua essent expiscari ac exportare. At enim, velut apparet à diis non sumus neglecti: verum tempestatibus ingentibus exortis, & naues Artemisiam omnes in periculo fuerunt, & multæ perierunt: & in exercitum ipsius multa fulmina inciderunt, quum insula nostra paucis fulminibus impeteretur. Dicitur etiam spectra Heroum mulieri conspecta esse. Quorum sanè omnium timore perterrefacta, ab immedicabilibus cœptis destitit, amara confessione facta, quæ & relatu amara est. Quare omittatur. Attribuiam autem & hic progenitoribus meis propriis si me minimè falsa, quod neque contra vos, neque contra Lacedæmonios, aliósque Græcorum socios, Coi voluntaria arma sumperint: & quidem quum multi tum insulas, tum Asiam habitantes, cum Barbaris in bello coniuncti fuerint, nulla violentia coacti. Equidem præfecti vrbis tunc fuerunt Cadmus & Hippolochus. Verum autem est, & Cadmum, & Hippolochum meos progenitores esse. Nam Cadmus qui & Senatum regebat, matris meæ progenitor est: Hippolochus verò ex Asclepiadis, quartus à Nebro, cuius auxilio Chiræi sunt deuastati. Nos autem ex virili genere Asclepiadæ sumus. Quare & hoc bonum à progenitoribus nostris profectum amplectimini. Redeo ad Cadmum. Hic sanè vir ad eò commodi Græcorum studiosus fuit, vt cum regio ab Artemisiam obsidione liberata esset, isthic relictæ vxore ab sobole, abiuerit cum his qui eadem sentirent in Siciliam, quo Gelonem & fratres eius prohiberet, ne amicitiam cum Barbaris contraherent contra Græcos. Perpetrauit & alia multa egregia facta, quæ longius producere non est tempestiuum. Atque hæc quidem & huiusmodi multa sunt publica progenitorum nostrorum in vos & alios Græcos beneficia. Nam deficit me dicendi facultas. Venio autem iam ad hoc, vt beneficium Hippocratis patris mei apud eos, qui id sciunt, producam: quod hoc modo recensens, vera dicere Pestilentia cognoscat. Cùm pestis ex Barbaria adueneret, quæ supra Illyrica.

Artemisia
Lygdamis
filia.

Cadmus.
Hippolochus.

Gelon.

Yy 5 Illyr

Illyrios ac Pæonas sita est, & cùm malum in hanc regionem D
venisset: harum gentium Reges ad famam medicam, quæ
vera erat, & vndiquaque processerat, & ad patrem meum,
nuncios miserunt in Thessaliam (illic enim pater meus &
prius, & nunc domum habet) vocantes ipsum ad auxilium
ferendum. Et non solum argentum, & aurum, & alias opes
se missuros esse receperunt: sed etiam reportaturum esse quæ
cunq; ipse vellet, si auxilium tulisset. Ipse vero quum inter-
rogasset quales motus partiales fierent, & æstus, ac ventos, &
caligines perscrutatus, itémque alia quæ habitus ex præsen-
ti statu commouere solent: cum sane omnia didicisset, illos
quidem retro discedere iussit, & nullam sibi facultatem esse
ad illorum regionem proficiscendi, pronunciauit. Verum
ipse quàm citissimè Thessalis denunciare studuit, quibus E
modis malum accedens ciuerent: medelam conscriptam
per vrbes proponebat. Me verò in Macedoniam demisit.
Cum regibus enim Heraclidarum, qui isthic imperium ob-
tinent, paterna nobis intercedit amicitia. Et ego quidem
ibam à Thessalia eo, quo me pater iussit, auxilium his qui
isthic essent laturus. Iniunxit autem mihi vt etiam vrbi

Dracon vestræ opem ferrem. At fratrem meum Draconem ex Pa-
Thessali gæsis profectum, in Hellespontum nauigare iussit, consimili
frater. consilio instructum, quali etiam ipse utebatur. Non enim

Polybius. omnes loci eadem auxilia ferunt, eo quòd non omnis am-
biens nos aer similis est. Polybium verò, qui filiam ipsius,
meam autem sororem habet, & alios discipulos, ad alios F
aliorum conuentus & vias profecturos emisit, quo quàm plu-
rimis opitularetur. Postquam autem ipse res in Thessa-
lia perfecit, ad vicinas gentes auxilium laturus proficisceba-
tur, & ad pilas profectus, Doriensibus, & aliis, simulque Pho-
cenibus auxilium tulit. Et quum sanè ad Delphos perue-
nisset, supplicationem Deo pro Græcis fecit: & sacrificio
facto, iter ad Boetos arripuit. Et cum ipsis opem tulisset,
similiter ad vos progressus est, & sufficientia vobis ad salu-
tem, quæ sanè nunc ego produco, ex animo penitus dixit.
Arbitror autem multos vestrum nosse, quòd vera dico. Non
enim ita diu est, sed nonus hic est annus, quando abiui, & in
Peloponnesum missus sum, isthic habitantibus opem laturus.
At verò vndiquaque nobis, & verbis, & re ipsa, dignus honor
contigit

A contigit, ut minimè poeniteat nos, quòd non hunc cum qua-
 sta ex Illyricis ac Pæonibus oblato permutauimus. Verùm
 præ reliquis ciuitatibus magna sunt quæ à vobis data sunt.
 Nam & respublica vestra alias excedit. Athenæ enim al-
 tius quiddam sunt aliis vrbibus, quantum ad gloriam atti-
 net. Et corona illa aurea in vestro theatro patri imposita, ad
 summam, æmulationem ac felicitatem ipsum euexit. Sed
 & hoc beneficium superastis, dum & patrem, & me publicè
 Cereris & Proserpinæ mysteriis ac sacris initiastis. Atque
 hæc quidem tria sunt beneficia, quantum ego verbis conse-
 qui potui, & fracta voce proferre, vrbis, & progenitorum, &
 patris mei, in vos simulque multos Græcos. Quantum nunc
B dicere aggrediar, quod, velut antea dixi, in vos ego & pater
 meus collocauimus. Cùm enim Alcibiadem emitteretis in
 Siciliam, multa quidem potentia, non autem ita multa, velut
 admiranda: & sermo in concione incidisset de Medico, quem
 exercitum sequi oporteret: pater meus progressus, me ad cu-
 randa corpora vestra se daturum esse promisit, propriis sum-
 ptibus instructum, & citra mercedis exactionem, quàm diu
 classis abesset, paruipendens suam vtilitatē, ut qui sibi per-
 suasisset, hoc in vestrum commodum cessurum esse. Ego
 enim non solum res meas insumebam, id quod faciebam vo-
 bis inseruiens: sed etiam ad alia magna opera destinatus fui.
 Et hoc minimū est ex his, quæ sum dicturus. Decevit enim
C pater ob me filium fortunæ fluctibus agitari, & in terra alie-
 na, & in mari, & in periculis bellicis, & in egritudinibus, quæ
 his qui erroneam vitam degūt, magis accedere solent, quàm
 his qui ordinatæ vitæ rationem habent. Nouit enim benefi-
 cium beneficio metiri: & non velut qui aliquid emisset, con-
 tractu ex manu in manum facto semel, discedere. Et hic qui-
 dem talia præstitit. Ego verò, ut qui filius illius sim, nihil stu-
 dij & artis prætermisi, auxilium ferens, & periclitatus vobis-
 cum, si quando occasio tulisset. Et ad hæc ambo præstanda,
 neque morbus, neque adflictio, neque timor in mari, & in-
 tra hostium manus, me prohibuit. Testes autem huius rei
 non alios aliquos, sed vos ipsos habeo. Quare si quis con-
 tradicere volet, is nihil cunctatus exsurgat. Verùm non pu-
 to me mentiri. Cùm autem hæc præstitissem ad annos tres,
 & aurea

Hippocratis

& aurea corona coronatus, & adhuc pulchrius laudatus: do-
 mum redij ad nuptias, quo & artis, & generis nostri successo-
 res producerem. Et quæ quidem à ciuitate, à progenitori-
 bus, à patre, & à me, vobis obtigerunt, hæc sunt. Dictum
 est autem & quæ nos à vobis oblata tulimus. Arbitror autē
 multos è vobis admirari, quæ de causâ hæc à me ex tam lon-
 gino principio repetita sunt. Quo igitur & vos cognosca-
 tis, & mihi ea quæ cupio, contingant: tempestiuum est vt
 hoc dicam. Pater meus, ò viri Athenienses, & ego petimus
 vos (sic enim liberos & amicos loqui decet, quò id quod
 petunt ab amicis liberis consequantur) contra patriam no-
 stram hostilia arma ne sumatis. Si verò oportet, quemad-
 modum fortassis oportet eos, qui sua ipsorum causâ pro-
 gressi sunt, etiam rogamus, vt ne nos, qui eiusmodi & tam
 magna beneficia in vos priores contulimus, seruorum loco
 habeatis. Insuper autem (nam & sic dicere conueniet) sup-
 plicamus, vt ne nostra faciatis vobis ipsis in bello captiua, si
 contigerit vt multo inferiores superetis. Verùm & hoc con-
 siderate, quòd fortuna aliàs alia cito versat: & aliquando
 magni paruis opus habuerunt: & fortes per debiles salutem
 adepti sunt. Puto autem clarum esse, vt ne clarissimum di-
 cam, quòd ob vnum virum non ciuitas, sed multæ gentes
 iam quandoque vtilitatem in rebus bellicis cōsequuta sunt.
 Et vbi ars in precio est, neque nos contemnere poteritis.
 Nam neque ita viles ac contemnendi sumus, quemadmo-
 dum in vobis testimonium situm est. Verùm ab initio qui-
 dem dei, vnde genus nostrum esse gloriatur, Aesculapius
 & Hercules in hominum vtilitatem prognati sunt. Et hos
 propter virtutem, quam hîc exercuerunt, omnes deorum
 loco habent. Vrbs autem mea, & ego qui ad vos verba fa-
 cio, ad tales originem nostram referimus, quemadmodum
 sanè hominum traditiones habent. Vnde profecto etiam
 pro Græcis ambo hac parte, & in omni bono, ad ipsos tu-
 tandos sterisse apparebimus. Non enim fabula sunt res ad
 Troiam gestæ sed factæ, in quibus Cos cum insulis suis non
 minima, sed maxima ad ferendum auxilium existit. Sic ve-
 rò etiam Aesculapij filij, non arte solùm, sed etiam armis,
 Græcis auxilium tulerunt. Machaon equidem animam in
 Troade

Aescula-
 pius, Her-
 culēsq; ho-
 mines vt iu-
 uar. nt, po-
 tissimum
 nati sunt.

- A Troade deposuit, quando, velut scriptores de his prodentes dicunt, ex equo in Priami urbem venit. Proinde neque eo quod contribules, neque eo quod ex auxiliariorum numero, auxiliares etiam ipsis Græcis sumus, nos iniuria adfeceritis. Non in longum extendam sermonem, res Chætorum, aut Persæ iterum repetendo, quando & ipsas audiistis, & in manibus magis sunt, quàm ea quæ paulo ante relata sunt. Quin & sic cogitate, minimè pium esse benefactores iniuria adficere. Nos autem benefactores esse, facta ipsa clamant. Ex quibus partibus prognati esse videbimini (quemadmodum fabulatores dixerunt) si iniuria adficere, quàm benigni esse malueritis? Neque enim amarulentius quicquam dicere volo. Illi enim, ò viri Athenienses, Heraclidis quidem gratias rependerunt. Aliis autem multis, beneficio adfecti, vicissim auxiliati sunt. Deficiat profectò me dies longius narrantem, si recensere velim quot hominibus quanta bona obuenerint, qui nihil de vobis bene meriti fuerunt. Circumspicite vos ipsos, & me nullo dicente, considerate qualia perpetretis. Mala res est potestas, ò viri Athenienses. Non enim quæ sua sunt, mensura disponere nouit. Sed & urbes quasdam & gentes iam perdidit. Si verò ad alios velut in speculum respexeritis, videritis ipsi quæ facitis, & ego vera dico. Quin & lex noua est: Quicumque felici rerum successu cõsilius, non etiam ad rerum difficultates respicit: Non est hoc vestrum viri Athenienses. Multum enim etiam sic Deum tentaretis. Nullam vobis iniuriã intulimus.
- C Si verò etiã intulimus: non armis, sed verbis iudicemur. Deprecamur autem vos etiam hoc, vt ne faciatis nos aliis gratiam debere, qui nobis auxilium ferent, auxiliũ enim nobis ferent, si rectè fecerint. & qui intra Thessaliam, Argos, Lacedæmonia, Macedoniam, sunt reges. & sicubi alij Heraclidæ, aut Heraclidarũ cognati habitant. Præstat citra violentiam, quàm vi coactos facere quæ iusta sunt. Non dico de insolenti aduersum vos rebellionem: verum hoc vobis manifestum facio, quod multi nostri curam gerunt, aut certè curam habebunt, nisi vndiquaque de terra periit, benignos adhuc esse homines. Ego quidem igitur (exiguæ enim mihi sunt ad dicendum vires, utpote qui aliarum rerum studio sim ad dictus)

Hippocratis Epistola.

dictus) hic desinam. Rogo autem vos per hospites nostros, D
& per eos qui nobis consiliarij esse consueverunt, & per Deos,
& Heroas, ac gratias, quæ hominibus ab hominibus contin-
gunt, vt inimicitias quidem vestras aduersum nos depona-
tis: ad amicitiam verò vos conuertatis. Si enim non in vestra
ciuitate hæc consequemur: haud scio quò progressi, eorum,
quæ cupimus compotes fitemus.

HIPPOCRATIS COI OPERVM

quæ ad nos extant omnium finis, Iano

Cornario medico physico

interprete.

*

AHIPPOCRATIS

COI, LIBER DE HOMI-

NIS STRUCTURA, AD PER-

DICCAM MACEDONVM

REGEM, NICOLAO

PETREIO COR-

CYRAEO IN-

TERPRETE.

*

Opus antea non editum.



Mundus quatuor ex elementis consti- Mundus ex
quibus ele-
mentis, ex
isdem etiā
constat ho-
mo
stit, igne, aëre, terra, & aqua: calido
videlicet, humido, frigido, & sicco.
Iisdem ex elementis quatuor to-
tidemque humoribus & homo con-
sistit: sanguine scilicet, pituita: flaua,
& atra bili. Et sanguis quidem
aëri, pituita aqua, flaua autem bilis
igni, atra verò terræ similatur. San- Humores
quatuor,
eorumque
natura.

Cquis enim gustu dulcis est: pituita, salsa: flaua bilis, amara:
atra verò acetosa, & flauescens. Sanguinis autem locus, &
spiritus in corde est: A dextris quidem eius sanguis, à sinistris
verò, spiritus consistit. Flauæ bilis in iecinore: atræ in liene:
pituitæ quidem in cerebro locus. Sanguis autem calidus,
& humidus: pituita frigida & humida: flaua bilis, calida &
sicca: atra verò sicca & frigida. Arteriæ quidem à corde pu-
rum sanguinem, & spiritum recipiunt. Venæ autē & ipsæ
à corde sanguinem sumunt: per quas corpori distribuitur,

Arteriæ aq
venæ qui-
bus disse-
rant.
Iecur.

Sed iecur cordi sanguinem non præter veri fidem affatim
suppeditat. Nam ignis absque materia permanere neutiquā
potest. Quo fit vt nonnulli hominum semper quasi rideant,
quidam verò tristentur: huius rei ex elementis causam esse
dicimus. Qui enim puri sanguinis non inexpertes sunt, hi

Risus unde.
Humores
quatuor
quid effi-
ciāt in ho-
mine.

vsqueq

Cerebri ef-
fectus, Re-
miniscētia,
Obliuio,
Phrenesis,

Lethargus
Paralyfis.
Cerebrum
purgantia.

Capitis pas-
siones ex sto-
macho
Capitis su-
turae tres.

Capillorum
color iuxta
varietatem
humorum.
Vocis to-
nus à spiri-
tu.

Iecur tripli-
citer dige-
rit.

Excremen-
torum ratio.

vsquequaq; rident, & aspectu ac corpore floridi necnon per-
spicui coloris existunt. Qui verò flauē bilis participes sunt,
desides, pusillanimes, pauidi, imbecillēsque esse solent. Pi-
tuitosi verò inertes & frigidi sunt. Reminisci autem, &
esse prudentia prāditum, ex cerebro, inter calidum frigi-
dūque admodum temperato prouenit. Obliuio vero, ex ce-
rebri frigiditate procedit. Passio autem, quē phrenesis nūcu-
patur, ex perurentibus febribus fit. Vaporibus enim, ex vi-
sceribus per dorsum ad cerebrum emissis, eius humidū are-
scit, & homo mente captus efficitur: & cerebrum oleo quo-
cunque frigidaē qualitatis per aures, vomitūsque humectare
oportet. Lethargus verò & ipse cerebri passio est: cum enim
cerebrū frigidis humoribus repletū fuerit, hinc passio quā
Lethargus appellatur, hominem occupat: & calefacientibus
cerebro opitulari expedit. Paralyfis verò fit à frigido, cru-
dōque humore, qui à cerebro demissus in oculum, siue in ali-
quam labiorum partem, seu in totam dimidiāue faciem
descendit. Per nares cerebrum purgantia adhibere opor-
tet: & extrinsecus isobrium contusum (herba est quā & Ma-
ros, & Origanis dicitur) ignis suffitu, seu cauteriis per aures
applices. Quaecunque autem passiones in capite fiunt,
ex stomacho oriuntur, exempli causa: Vomica, struma, den-
tium dolores, tonsillae, angina, suffocationes, anhelitus diffi-
cultas, & reliqua. Caput autem suturas habet tres; inue-
nitur & solidum absque futuris caput, & hoc quidem humi-
dum est. Crispos verò capillos habere, calidioris capitis si-
gnum est. At recti crines, ex superuacuo qui in capite est hu-
more fiunt. Flauedo capillorum, ex flaua bile; caluities verò
ex caliditate prouenit. Articulae vocis species tres ha-
bentur: Grauis, acuta, & media: haec à spiritu procedūt. Ie-
cur autem, ipsum alimentum triplici digestionē in succum
redigit. Ex prima digestionē cor alimentī qualitatem, sapo-
rem videlicet, suscipit, & puri sanguinis procreatio fit. Se-
cundam digestionem iecur desumit, & corporis partibus ali-
mentum largitur: vnde flaua bilis constitutio fit: lien verò
ex sanguinis fece alitur: vnde & melancholicum humorem
constitui certum est. Cerebrum autem à stomacho hume-
ctatur, & pituita exuberantiam peragit. Tertia digestionē
alimentum supernè in stomacho in succum vertitur: & tunc
referatur

Areferatur ianitor qui ventriculus nuncupatur, quoniam transitus tantum facultatem subministrat. Inde alimentum in inferiore ventrem demittitur. Alius verò à pituita ciborum acerbitalis gratia, oblectamentum sentit. Humidum autem excrementum, per renes, ac seiunctos ipsius excrementi meatus in vesicam, id est in phuscam descendit: in vesicam enim aqua ingreditur. Sensus in homine quinque habentur, visus, olfactus, auditus, gustus, & tactus. Nam visus ex æthere: olfactus ex aere: auditus ex igne: gustus ex humido: tactus vero ex terra fit. Homo autem ex quatuordecim quibusdam

Sensus in homine quinque.

Homo ex quatuordecim quibusdam consistit.

Bribus quidem sicco & humido excremento, vomitibus, oculis, naribus, sputis, sudoribus, venereis, incertis meatibus, capillis & vnguibus fiunt: Fœminis verò ad hæc duo adduntur, purgationes, lactis videlicet, & menstruorum. Lac autem & eodem modo genitale semen hominis ex sanguine gignuntur, & hoc certum est: si enim homo genitali plus nimio utetur, sanguinem pro semine emittere. Similiter autem & fœminæ, si plus nimio lactare cogentur, sanguis elicitur. Spina autem hominis habet vertebrae xiiij. costas totidem. Dentes cum maxillaribus duo supra xxx. sunt, anteriores autem diuidentes, qui & secantes appellantur. Stomachus palmos habet quinque. Intestina cubitos

Fœminarum lac & menstrua.

Spinæ vertebrarum numerus, costarum item, ac dentium.

Stomachi amplitudo Intestinorum longitudo Digitorum nomina.

Cresdecim. Nomina digitorum, Pollex, Index, Medius, Annularis, Auricularis. Vngues frigidi sicci que temperamenti sunt. Anni verò tempora quatuor habentur, ver, æstas, autumnus, & hyems. Ver, calidum & humidum est: ideo sanguinis in corpore incrementum fit. Æstas calida & sicca: ideo flauam auget bilem. Autumnus siccus & frigidus: ideo atram bilem, & sanie auget, sanies quidem sanguinea & aquosa est. Hyems verò pituita in corpore adauget. Nam quatuor hominis elementa, id est humores, ad tempora quatuor diuiduntur. Ideo solarem conuersionem speculari, & affecti temperamentum, & adhæc curationibus uti opus est. Si enim verno tempore iuuenis aduersa premetur valetudine, sanguinis exuperantiæ causa patitur, quem per venæ sectionem emittere opus est. Et si pleuresi vnius diei spatio, vel duorum ti.

Anni tempora quatuor, eorumque natura.

Quæ vitæ hominis ratio singulis annis temporibus.

Venæ sectio quando quætopere con-

ferat sanita-

Zz

seu

Medicina-
lis sphaera.

Pituita, san-
guis, ac bi-
lis quibus
anni tempo-
ribus au-
geantur: &
quæ vitæ ra-
tio tunc ser-
uanda.

seu trium laborauerit, venæ sectione affecto opitulandum, D
priusquā ipsum opprimat palsio, & affecti vires deficient.
Homini verò venæ sectio perutilis est: & tempus quidem
quo ipsa vtendum, à Februario incipit: & rursus à Septem-
bri principium sumendo, ad septimam eiusdem perduret.
Aestate aliquo ægrotante, ad passionis initia purgamina
adhibenda. Si considerantes (ò Rex) & aliorum curam a-
gentes, quid ad vitæ rationem corporibus præstet, & quod
congruè alimenta suggerat, ac debito apponat ordini, non
satis pro diligentia nostra, & qui humana aggrediuntur cor-
pora morbos deprehenderimus, nunc accuratius perspicien-
tes, summatimque describentes, medicinalem sphaeram ad
te mittimus, per quam ægritudines, quæ humana corpora E
occupare solent, pernoscere, & ad præsentem horam, ac
decurrentis anni tempora, huiusmodi calamitatibus opitu-
lari queas. Si autem hæc accuratius egeris, diu citra om-
nem aduersam valetudinem per omne tempus vita frueris.
Et si hæc quæ potissimum optimæ valetudini tuæ vim præ-
beant, quæque hominum generi conducant, peregeris, ita
in omnibus te incolumem vitam deprehendes elegisse. Et
quamuis ardua admodum sphaeræ ratio habeatur, eam ta-
men perscriptam tibi præbemus. A Vergiliarum occasu F
ad hyemale solstitium, dies I L. hoc est, à xij. Nouembris,
ad Decembris finem sunt. Hi quidem dies pituitam au-
gent: Balneis autem ieiunus, sudores excitando, detergen-
doque, & venereis ac laboribus vteris. Ab hyemali solsti-
tio, ad vernale æquinoctium, dies LXXXIIII. à prima vi-
delicet Ianuarij, ad quintum supra xx. Martij. hi dies hu-
miditatum, & sanguinis exuberantiam peragunt: Deam-
bulationibus, & siccis quæ ad vi sum pertinent, deliciisque
ac venereis, benèque alentibus vtendum. A vernali æqui-
noctio, ad Vergiliarum ortum, dies I L. à xxv. Martij.
ad xlii. Maij. hi dies sanguinem augment: Redolenti vino,
& venereis, ac laboribus vteris. A Vergiliarum autem exor-
tu ad æstiuum solstitium, dies XXXXII. à tertia decima
Maij, ad xlii. Iunij. hi enim dies flauæ bilis augendæ
facultatem obtinent, dulcibus & aquosis vtendum, ducen-
dæ alui cura agenda, & à venereis, ac laboribus abstinèn-
dum est. Ab æstiuo verò solstitio, ad æquinoctium autum-
nale.

nale, dies xciiii. ab xxxiiii. Iunij, ad xxv. Septembris: hi dies atram bilem augent, frigidis & aquosis, redolenti vino, ac salitis vti opus est: à venereis verò abstinendum censemus. Ab autumnali æquinoctio, ad Vergiliarum occasum, dies iil. à xxv. Septembris ad xii.

Nouembris: hi enim dies saniem augent, acetosis, acerbisque, & venereis, ac laboribus vti expediet.

Si ad hæc obseruanda curam, ò Rex, impenderis, citra omnem tristitiam dolorémque in reliquum, vita frue-

ris. Hac se diuisione sic habente, annus in dies v.

ac lx. supra tre-

centos colligitur.


gitur.

*

Annus in
dies 365.
colligitur.

H I P P O C R A T I S

*Coi Operum, quæ ad nos
extant, omnium
finis.*



EVGDVNI,
Excudebat Symphorianus
Barbier.

De pueris
 De pueris 3
 De pueris 4
 De pueris Med 8
 De pueris 16
 De pueris ^{tu} 14
 De pueris 21
 De pueris 23
 De pueris 29
 De pueris 31
 De pueris 34
 De pueris 44
 De pueris 48
 De pueris 52
 De pueris 53 ^{Ha}
 De pueris 58
 De pueris 59
 De pueris 60

De pueris
 De pueris 71
 De pueris 83
 De pueris 94
 De pueris 98
 De pueris 99
 De pueris 124
 De pueris 128
 De pueris 131
 De pueris 139
 De pueris 140
 De pueris 144
 De pueris 192
 De pueris 201
 De pueris 229
 De pueris 229
 De pueris 229
 De pueris 229
 De pueris 230
 De pueris 230
 De pueris 230

De iudiciis 496

De dec. iud. 399

Prophetas 401

Prophetas 408

Contra perversos 423

De ap. vulgatis. 444 ~~invenit~~ / 10

(Singulari off. 450) 116 ~~invenit~~

De p. et. 454 ~~invenit~~

De p. et. 469 ~~invenit~~

De p. et. 498

De p. et. 506

De p. et. 505

De p. et. 507

De p. et. 508

De p. et. 520

De p. et. 116

De p. et. 116

